

痢疾丛谈

閩縣
王壽仙採集

痢疾叢談

二十二年
國厲題
夜日

痢疾叢談目錄

閩縣王濤仙採編

二十二年暑期作

甲 導言

乙 名稱考釋

丙 病源與症候

丁 治法大綱

戊 痢疾類別

(詳述原因與治法)

二 一
燒 休
蟲 息
痢 痢

十三 膿血痢
十四 暑痢

廿五 酒客痢
廿六 下痢
腹 痛

三 四
噤 奇
口 恆
痢 痢
(冥屋)

十五 積痢
十六 虛痢

廿七 下痢
廿八 下痢
脫 肛
肛 門
腫 痛

五 六
水 涇
穀 痢
痢

十七 滑痢
十八 勞痢

廿九 下痢
三十 下痢
裏 急
孔 後
大 重

七 八
涇 熱
熱 痢
痢

十九 氣痢
二十 風痢

卅一 下痢
卅二 下痢
乾 嘔
虛 坐
努 責

九 十
寒 赤
痢 痢

廿一 毒痢
廿二 疫痢

卅三 下痢
卅四 下痢
呢 色
噦 黑

十一 十二
白 赤
痢 痢

廿三 五色痢
廿四 久痢

卅五 下痢
卅六 下痢
發 譏
熱 語

醫來儀製

廿七 下痢身腫
廿八 痢後瘡

四九 瀉痢
五十 痢疾初起

九 痲脹心煩自痢瘡黑
十年久痢飲食不減

廿九 瘧後痢
四十 痢風

巳

痢疾醫案

選粹

十一 咳嗽而兼瀉痢
十二 瘧疾變痢

四一 痢後風
四二 下痢青色

一 痢經一月神煩氣虛
二 畏寒食減痢下肛門大痛

庚
痢疾驗方

四三 痢後便血
四四 痢前痢

三 老人痢下一月有餘
四 陳積不行變為休息痢

一 治熱性痢疾方
二 治熱痢便膿血方

四五 產後痢
四六 老年痢

五 下痢甚瘳壯熱如火
六 痢下純紅後傷土類七

三 痢疾效方
四 治噤口痢方

四七 痢疾吐衄
四八 烟痢

七 胎前下痢產後未止
八 由瀉成痢正虛而表邪未清

五 噤口痢外治方
六 熱痢腹痛七劇方

七 久痢膿血方

八 痢久勢執生毒方

三 枳壳湯
四 前防敗毒散

癸

補遺

九 痢疾通用駱方

癸 痢疾初起方

五 白朮氣湯
六 芍子湯

十一 治痢疾兼有表症者

十二 治久痢不止

七 木五楨柳丸
八 枳實導滯丸

十三 赤痢駱方

十四 五色痢方

九 魚鱗丸
十 桃花湯

辛 痢疾要方

十一 溫脾湯

一 葛根黃芩芍藥湯

二 白芷芍藥湯

壬

結論

醫來儀製

痢疾叢談

(甲) 尊言

吾人生存天地間。端賴飲食以資養之。衣服以衛護之。故飲食衣服。兩大問題。務求飽煖適當而後已。若夫夏令。暑溼升騰之際。民多畏熱而喜涼。飲食生冷。袒衣露宿。祇求一時之舒適。而不知內之飲食生冷。

外之風寒暑濕。乘此羈留于体内。受之重者。當時即發為霍亂吐瀉。受之重者。入秋復以新涼。偏于表者則成瘧。偏于裏者化為痢矣。

(乙) 名稱考釋

痢疾之名。考內經謂之腸辟。古今方書。因其閉滯不利。故又謂之滯下。後又稱之曰痢。近世則名目煩夥。

蓋隨其各症候，病因，夾症，以定名。故其治法亦各異焉。

(丙) 病源與症候

夫痢疾之因，由於消化機能受生冷之壓迫，暑溼之阻滯，腸胃蠕動力因之薄弱，上不能運化水穀精氣，下不能分泌水穀糟粕，上下交相淆混，應當排洩之。

廢物。留滯不出。經幾度變化。成一種白色或紅色之
毒質。由便道排洩而出。痢疾成矣。總之。其病源不外
手暑溼寒滯。塞窒凝澀。阻滯腸中為病也。若在西醫
解剖觀察。腸壁間患有爛斑。或腸癰瘍等。此說正與
內經所稱為腸癖者同義。

其症候初起。覺大便不爽。甚則澀澀有聲。赤白相雜。

或膿或血。或無糟粕。或糟粕相雜。或腸垢。或發熱。或不發熱。腹中作痛。裏急後重。及如圓則又不爽。至于夾症異同。則在其人感受而見焉。

(丁) 治法大綱

其治法當分為四步。第一步宜攻下。第二步宜清化。第三步固澀滑脫。第四步調理善後。

(一)攻下

痢症初起。乘勢凶凶。邪盛氣足。可任攻擊。

如

木香

枳榔

大黃

枳實

神曲

青皮

黃連

黃芩

全瓜蒌

姜

黑白丑

如挾表邪。可參用

荊芥

薄荷

防風

羌活
...
等

(二)清化

既經攻下。其勢稍殺。血熱轉盛。法從清化。

如黃連 黃芩 赤芍 木香 製附

白頭翁 黃柏 秦皮 等

(三)固澀

症延日久。正氣虧弱。須以固澀之品。防其

消脫。如赤石脂 禹餘糧 炒白芍

阿膠 訶子肉 炒棗肉 御米壳

痢疾類別

(四) 調補

邪勢既清。以調理為急務。四君子湯。人參

白朮 茯苓 甘草 加減。

(戊) 痢疾類別

(一) 休息痢

名稱 此證時作時止。經年不愈。故稱休息。

原因 多因收澀太早。致邪氣留于衝任。久則氣血

愈陷。清湯不升。

症狀

乍作乍止。久久不愈。或愈半月。或愈一星期。

旋復者。作纏綿不已。

治療

法當雙補脾腎。助脾消積。

處方

用補中益氣

人參 柴胡 當歸 黃芪 甘草 白朮 升麻 陳皮

參芍

人參 茯苓 白芍 炙朮 附子 五味

四君子

人參 白朮 茯苓 甘草

等湯隨症施治。

結果

倘眼前方後不應。反下血塊者。此肝木不能

藏血。宜三奇湯

生枳壳 黃芪 防風 未破或管下

倍防風

加 羌活 升麻 柴胡 葛根

禁忌

一切破氣利水之劑。皆所禁忌。

補遺

朱振聲先生。沈休息痢。助脾消積方。

炒白朮 三錢

炒枳實 二錢

炒六曲 二錢

炙肉金 二錢

白茯苓 三錢

炒麦芽 三錢

新會皮 一錢

製半夏 二錢

春砂仁 五錢

(二) 蟯蟲病

名稱

因蟯蟲作祟為病。故名。

原因

此症多因胃弱腸虛。滯執蘊釀而生蟲。其形

極小。九蟲之一也。

症狀

其症腹大青筋暴露。面目皮膚呈萎黃色。肛

門或痛或癢。蟲從穀道溢出。形細如線。以小

蟯蟲病

兒患者為多。

治療

宜逐瀉驅蟲兼補脾胃。

處方

先以雄黃銳散

雄黃 杏仁 苦考 黃連 蘄芥 青相子

蕪荑丸

蕪荑 黃連 胡蛇胆

烏梅丸

烏梅 細辛 肉桂 人參 附子 川椒 干姜 黃柏 黃連 芍藥

等殺蟲之劑甚者

加大黃。蟲淨乃已。

繼以參苓白朮散

人參 茯苓 白朮 扁豆

陳皮 山藥 甘草 蓮肉 砂仁 苧仁 桔梗 大棗

四君子湯(見前)

調補腸胃兼

醫來儀製

清溼執。

時賢朱振聲先生治本症屢方附下

炒白朮

三錢

花楸柳

錢半

白雷丸

二錢

使君肉

一錢

赤白苓

各三錢

炒薤白

三錢

烏梅肉

五个

玄砂仁

壳五分

炒苡仁

四錢

(三) 噤口痢

(腸胃火執)

名稱

痢疾飲食不下。口噤閉。

原因

由于腸胃灼執。津液枯涸。舌乾。

噤口痢

症狀

舌乾咽澀。飲食不下。

治療

法宜救火生津。津液上承。則飲食自然得下。

處方

以五汁飲

蘆根汁 雪梨汁

麥冬汁 葛根汁

老藕汁

為主方。次以救

胃煎

生地 杏仁

白芍 麥冬

黃連 栝柳

黃芩 石膏

玉竹 枳壳

花粉 厚朴

甘州

開喉湯

人參 梔子 黃連 射干

麥冬 杏仁

天冬 黃芩

生地 黃柏

白芍 栝柳

芍藥 枳壳

甘草 煨石膏

白頭翁

之屬。

(附)

朱氏虛症噤口痢療法

原因

痢下過久。脾胃虛弱。無運化之權。故不能食。

症狀

頻之下痢。神形羸瘦。不欲食。脈虛數。

治療

宜培養中焦

處方

潞朮參 二錢
焦白朮 二錢
淡乾姜 五分
赤砂仁 五分
石蓮子 三錢

陳廬皮 一錢
炒白芍 一錢
姜半夏 二錢
廬木 五分
丁白皮 八分

(附) 朱氏寶症噤口痢療法

噤口痢

原因 飲食過飽。或生冷失宜。脾不健運。以致飲食

不入。

症狀 下痢不食。腹滿飽悶。脉勁有力。苔黃厚。

治療 積滯在胃。宜用消導之品。

處方 熟地黃 二錢 炒枳實 錢半 花檉柳 錢半 萊服子 三錢 穀麥芽 各三錢

南查炭 二錢 炙肉桂 二錢 新會皮 一錢 白蔻仁 五分 白茯苓 三錢

炒竹茹
錢華

(四) 奇恆痢

名稱 因其症頗連烈。有奇于恆之謂。

原因 乃火毒上攻肺金。故喘逆氣噎而下痢。

症狀 咽喉作痛。其來也速。有立時敗絕之勢。

治療 急投涼下之品。去其火毒。

處方

速用白虎湯

石膏 知母 甘草 粳米

合大承氣湯

大黃 枳實 厚朴

涼

而下之。然多難愈。

(五) 水穀痢

名稱

由水穀為病。故名。

原因

此証乃脾胃氣虛。不能腐化水穀。

症狀

大便不爽。所泄出之物。如膠如膿。稠黏腥穢。

上則飲食不入。

治療

宜破積益氣補脾胃。

處方

用保和丸

神曲 山楂 陳皮 連翹

茯苓 半夏 藜蘆子

調中益氣湯即補中

益氣湯中加白芍五味子。

（又一方去當歸。白朮加木香蒼朮。）

（六） 瀉痢

名稱

由瀉為病故名。

原因 滯氣留于腸胃迫而成痢。

症狀 腹大身重。滯下赤黯如豆汁。或如魚腸者。最

為險惡。

治療 宜去滯運脾為主。

處方 用加味除滯湯。
半夏 厚朴 赤苓 木香 蒼朮 肉桂 藿香 陳皮 大棗
或平

胃散。
蒼朮 陳皮 厚朴 甘草
加木魚黃連。

(七) 澀執痢

名稱

由澀執交病故名。

原因

澀執凝滯。

症狀

此症裏急後重。登圜而下無多。立起則腹痛

不已。

治療

宜去澀清熱為主。

處方

宜藿香正氣散

藿香 紫蘇

白芷 甘草

厚朴 桔梗

白木 茯苓

生薑 大棗

大腹皮 半夏

合升

陽除濕湯

蒼朮 澤瀉

升麻 猪苓

柴胡 陳皮

羌活 麥芽

防風 甘草

神曲

之屬

(八) 熱痢

原因

驟受暑熱。腸胃為熱毒所乘。侵蝕腐爛。致成

熱痢。

症狀

燥渴引飲。口乾背寒。面垢煩冤。一晝夜下痢

醫來儀製

数十行。肛门如火燎。面赤壮热。

治療

宜清熱解毒。

處方

用黑豆甘草湯

黑豆 甘草

芍藥湯

白芍 甘草

黃芩 肉桂

黃連 芍藥

檉柳 木魚

霍

香正氣散(見前)或溫脾湯

人參 芍藥

附子 芒硝

干姜 大黃

甘草

白

頭翁湯

白头翁 黃連

秦皮 黃芩

皆為主方。

附朱氏方

生川軍

二錢

小川連

五分

淡黃芩

二錢

炒赤芍

二錢

炒枳殼

二錢

熱痢

連翹壳

三錢

湖丹皮

錢半

炒六曲

三錢

生銀花

三錢

赤芍藥

三錢

塊滑石

五錢

生甘草

六分

(九)

寒痢

名稱

此症又名冷痢。以其因寒冷而痢也。

原因

俸弱者。過食生冷。滯滯于大腸。致奔迫下

痢。素問所云。飲食不節。起居不時。則陰受之。

入五腑則脹滿閉塞。下為殮泄。久為腸辟者。

是也。(古之謂腸辟指痢疾而言。已詳述上釋各條)

症狀

腹痛裏急。或少腹痠痛。胸膈不曠。結滯不快。
下痢其色多白。食不消。脈沈而滑不數。苔白。
白。即黃膿不必潤澤。

治療

宜用溫固法。

慶方 宜溫脾湯。平胃散。或以大承氣湯下之。俱見前

附朱氏方 紫朴一錢 法乾姜五分 白蔻仁五分 炒白朮三錢 河子肉八分

御朱亮二錢 傳桂枝一錢 白扁豆三錢 雲茯苓三錢

(十) 赤痢

名稱 此證又名血痢。

原因 腸胃滯濁。膠阻不化。腸壁受損。血液滲出。與

溼滯混合而下。此熱極之候也。

症狀

裏急後重。煩渴引飲。喜冷畏熱。少溲短少而

赤。痢下赤色。苔黃。脈象滑數而有力。

治療

宜清熱導滯。

處方

有血色鮮紅者。宜香連梅芍湯。

木香 蓮肉 烏梅 白芍

合黑豆

甘州湯。

(見前)

因心經伏熱者。宜犀角丸。

犀角 黃芩 苦參 黃柏

當歸

或白頭翁湯。(方見前)有血如瘵塊者宜桃

花湯

赤石脂 陳皮

炮姜 白木

地黃禹糧石湯

熟地 禹糧石

倘服涼藥而痢愈甚者當作冷痢治宜理中

湯

甘草 白木

人參 炮姜

或附子理中湯(即理中湯加附子)

有表証者宜倉廩散

人參 前胡

蒼朮 羌活

甘草 獨活

枳殼 川芎

核梗 蘇荷

柴胡 生姜

果

有熱渴者宜白朮湯(見前)

有因脾經受溼者宜蒼朮地榆湯

蒼朮地榆

有因熱毒凝滯者宜鬱金丹

鬱金丹 白朮 朱砂

有因溼熱傷血者宜五苓散

白朮 澤瀉 茯苓 桂枝 枳殼

有日久不痛裏不急而後不重者宜槐花丸

槐花 青皮 荆芥

赤痢

有痢久不止。陽虛而陰欲脫者。宜八珍湯。人參 白朮

茯苓 甘草 芍藥 白芍

若手足厥冷。脈見微縮者。此元氣欲絕也。急

宜附子理中湯。見前。遲則不救。

有日久百藥不效。但見紫黑血水者。此瘀血

也。宜乳香沒藥當歸桃仁木香白芍之屬。古

醫家儀製

者加大黃

附朱氏方

小川連

三分

生山軍

一錢

炒枳壳

錢半

白头翁

錢半

北秦皮

錢半

淡黃芩

錢半

廣木香

七

新合皮

一錢

花楸柳

一錢

赤茯苓

三錢

六一散

三錢

(十)

白痢

名稱

因痢色白故名。

白痢

原因

腸胃虛弱。冷熱相搏。傳化失職。變而為痢。傷

于氣分。

症狀

腹痛下痢。其色白。裏急後重。至圓而所下無

多。腥穢難聞。脈濡數。苔厚膩。

治療

宜化滯推蕩。

(朱氏方)

處方

廣藿香

三錢

赤砂仁

五分

炒枳殼

二錢

花檉柳

二錢

製川朴

七分

青陳皮各一錢
 南查炭三錢
 炒六曲三錢
 香石芽三錢
 香連丸一錢

類別

屬寒者宜平胃散蒼朮 厚朴 陳皮 甘草
 或溫脾湯見前加

肉桂。

有因澀執而痢者宜胃苓湯蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 官桂 白朮 澤瀉 猪苓

蒼朮

有因虛寒而痢者宜二陳湯半夏 陳皮 茯苓 甘草合平胃

白痢

散(見前)

若便後而下白物者。此屬勞倦氣虛。便消頻
見汚衣者。此為氣脫。宜四君子湯(見前)加附
片。吐者加粟壳。如氣瀦者。宜甘葯補氣。兼當
安卧。而若真元。

(士) 赤白痢

名稱 痢之赤白並下者故名。

原因 複雜

症狀 不定

治療 隨症施治

處方 裏急後重。腹滿脹痛。口渴引飲。宜芍藥湯見

前合大承氣下之。兼肢倦乏力者。宜在芍藥湯

赤白痢

茯苓 澤瀉 芍藥 芎藭 羌活 獨活 生薑 君後重 遲瀼者宜感石丸

南木香 肉桂 丁香 炮姜 巴豆 姜厚
 杏仁 百味藥 黃脂 滑石 酒 因冷 執不調 或傷冷

食者宜連理湯（即理中湯加黃連在卷）加枳壳 砂仁

身發熱而小便不利兼嘔噎者宜葛根芍連

湯葛根 黃芩 黃連 甘草

(三) 膿血痢

醫來儀製

名稱

此因所下純係膿血故名。

原因

不一。

症狀

隨病因而異。

治療

對症下藥。

處方

此症初起膿血稠黏勢甚劇者宜下之大承

氣湯(見前)主之。

腹痛心重身熱。日久不愈者。宜吞芍湯即芍藥

湯

滯下無度。小便不通。腹中痛者。宜當歸導氣

湯

芍藥 當歸 桂枝 芍藥 甘草 木香 生地 枳實

骨熱煩渴。臍下迫痛。至夜轉劇者。此屬陰虛。

急宜救陰為主。如阿膠梅連丸。

阿膠 烏梅 黃連 黃芩 芍藥 當歸 枳實 地姜

醫來儀製

黃連阿膠湯

黃連 阿膠 芍藥 甘草

白头翁加甘草阿膠

湯(即白头翁湯中加甘草阿膠)之屬均可酌用

赤黃多者為熱宜堅中丸

黃連 黃柏 澤瀉 赤苓 白芍 官桂

辛赤連丸見前之屬

青白多者為寒宜白膠赤散

白膠 赤石脂 枯礬 乳 沒 輕粉

若執一多一寒一少一宜水煎木魚膏

木魚 丁香 當歸 厚朴

膿血痢

甘州 陳皮 炮姜 大棗 御米壳 煉茶
 乳香 砂仁 枳壳 訶子皮 肉豆蔻 為丸

虛滑頻數者宜止宜澆用真人壽藏湯

訶子 粟壳 當歸 肉桂

木香 白木 白芍 人參 甘草 肉豆蔻

(高) 暑痢

名稱 因受暑氣而痢故名

原因 乃伏暑所致

醫來儀製

症狀

自汗發熱。面垢嘔逆。渴欲飲冷。腹由攻刺。小

便不通。痢血交下。

治療

清暑為主。

處方

宜黃連赤芍飲

香薷 厚朴 白扁豆 黃連

為之主方。佐以五苓

散。見前或益元散。

消石 甘草 辰砂

若腹中痛甚。食不

進者。宜六和湯

藿香 赤苓

厚朴 白朮

杏仁 人參

砂仁 甘枳

半夏 生薑

木瓜 大棗

白扁豆

暑痢

藿香正氣散（見前）

（五）積痢

名稱 又名實痢。蓋因積實而痢也。

原因 飲食不節。傷其腸胃。或多服生冷。凝滯不化。

敗毒下注。

症狀 腹滿脹。陣々作痛。裏急後重。頻々如廁。則又

醫來儀製

不暢。一日如廁之數。多至八九十次。少至三

三十次。初則尚能飲食。繼則飲食苦味。惡食

惡心。脈弦數。痢下色黃。或如魚腸者。

治療

宜通因通用。

處方

宜保和丸

(見水穀痢條)

腹中急痛。宜木香、檳榔。

丸

木香 三棱

檳榔 莪朮

青皮 黑丑

陳皮 香附

枳壳 大黃

黃連 芒硝

或神保丸

木香 乾薑

胡椒 砂

豆豉

積 痢

之處。

附朱氏方

生白朮 三錢
小枳實 二錢
花柳柳 錢半
小青皮 一錢
廣木香 七

炒蒼朮 三錢
炒六曲 三錢
桑內聖 二錢
赤茯苓 三錢

(去) 虛痢

名稱

因虛而痢故名。

原因

脾胃虛弱之人。偶為外邪所乘。或傷飲食生

冷。寒澀凝滯。漸至下痢。

症狀

腹痛裏急。下痢清白。發熱甚。煩渴不寧。腹

中似飢。得食則脹。

治療

所謂虛痢者。倖虛之人。感染痢疾。非証情之

虛也。不可妄用補劑。宜瀉熱養陰法。

朱氏方

炙生地

四錢

焦梔

二錢

石蓮子

三錢

炒白芍

二錢

粉丹皮

二錢

肥知母

三錢

玉核棟

一錢

陳廬皮

一錢

赤白苓

各一錢

分別

此症有血虛氣虛之分。類皆四肢困倦。穀食

難化。腹痛或微或劇。血虛則下流紅。宜通元

二八丹

黃連 白芍 當歸 生地 烏梅 雄豬肚 並兼姜湯下

日久者。宜四物湯

熟地 當歸

白芍 川芎

加升麻以舉之。

倘因下後。而痛墜不減。虛坐努責者。胃風湯

醫來儀製

人參 白朮 茯苓 白朮 白朮
為之主方。

氣虛則痢下凍膠宜四君子湯見前或理中

湯見前

日久氣虛下陷者宜補中益氣湯見前

虛長厥逆脈微弱者宜四順散附子 乾姜 甘草或黑

錫丹硫黃 皂角 胡盧巴 茴香 沉香 肉豆蔻

之類。

泄痢

名稱

痢下極滑。不能自禁之謂也。

原因

因虛而致。亦虛痢之一。

症狀

痢下流澀。不能禁止。古則肛門脫落。

治療

有血虛氣虛之不同。故治法亦隨之而異。

處方

血虛者宜回物湯。見愈。加人參、白朮、地榆、檉。

皮氣虛者。宜真人養臟湯（見前）

(六) 勞痢

名稱

狀類虛勞之謂。故名。

原因

痢久不愈。耗損精血。

症狀

腸胃空虛。五心煩熱。狀類虛勞。

治療

調補為主。

處方

宜讀連丸

乾山藥
石蓮肉

異功散

(即回春子湯加陳皮)

七珍

湯

人參
白朮

雲苓
粟米

甘草
芍藥

山苒

之類調補之。

先

氣痢

名稱

因氣鬱而得故名。

原因

由七情氣鬱所致。

症狀

精神恍惚。痢下若蟹沫。

(三) 風痢

原因

此证由於風入腸胃。

症狀

純下清血。白內有痢。

治療

去風為主。兼理腸胃。

處方

宜胃風湯見卷虛痢條加枳壳 荆芥 防风

若痢下色青綠什見者。宜神木湯寸木 藜本 羌活 白芷 甘草

醫來儀製

御年 生薑
然為白

(廿) 毒痢

原因 感毒而作。

症狀 暗中劇痛。如刺如刺。下痢赤白。日夜無度。口

渴引飲。百藥不效。

治療 敗毒為急務。

風痢 一 毒痢

處方

宜梔子金花丸

梔子
苦杏仁

生銀花
益母草

大黃
黃柏

黑豆甘草湯見

暑熱痢條重加穀蟲以敗毒勢。

(廿) 疫痢

名稱

此症與天時^行疫相似故稱疫痢。

原因

感受疫氣而然。

症狀

此症多見惡寒身痛^甚熱嘔吐傳染極速。

醫來儀製

治療

敗毒和中

處方

直人參敗毒散(即倉廩散去粳米)汗之。

裏急証也。宜平胃散(見發溫病條)加羌活獨活柴

胡

(芒)五色痢

名稱

此症痢下五色故名。乃毒痢中之一。

五色痢 疫痢

原因 由飲食積滯。溼熱大盛所致。

症狀 痢下五色。

治療 去積清熱為主。

處方 宜芍芍湯見卷里豆甘州湯見卷木魚樞柳

丸見卷

倘消泄去度。蓄熱煩渴。睛下急痛。宜存陰為

主 赫連丸

當歸 黃連 阿膠 芍藥

黃柏 黃芩

阿膠 極連丸 (見前)

黃連 阿膠丸

黃連 阿膠 芍藥 白芍

之屬 均可酌用

(苗) 久痢

名稱

此症痢下纏綿。久久不愈。故有是名。

原因

由治療不得其法。邪氣久羈。正氣被奪。比及

邪氣盡去。而正氣已傷。不能恢復。其素有能力

久痢

力。故此症屬於虛者居多。然其間有積滯者。蓋因正氣虛怯。胃陽薄弱。積滯無從運化之故。所以此症雖有幾種派別。總不出虛之一字。

症狀

腹痛後重。納穀減少。面色萎黃。伴弱神疲。脈

細數。舌光。苔。

治療

宜扶正祛邪

處方

(氏朱)

炒党参

三钱

炮姜炭

三钱

焦白朮

三钱

炒当归

二钱

炒白芍

三钱

软柴胡

三钱

大砂仁

三钱

焦山查

三钱

赤砂糖

三钱

厚木水

外

或烏梅丸

(见方)

桃花湯

(见方)

木皮散

(见方)

木皮散

(见方)

木皮散

木皮 煎在 粟壳 生薑

甘州

訶黎勒丸

訶子 附子 龙骨 犀角

肉苁蓉 白茯苓 生薑

木皮 吳萸

等剂

木皮 煎在 粟壳 生薑

木皮散

(见方)

兼症

兼腎虛不能收攝者

宜酌加

桑螵蛸

痢下久

久痢

久痢

久痢

久痢

久痢

久痢

久痢

久痢

久痢

久痢

久痢

久痢

脱。虚冷白滞者。宜大桃花汤。

赤石脂 牡蛎

乾姜 附子

芍药

人参 龙骨

甘草

津液枯燥。肛门澹痛者。宜千金羊脂煎。

羊脂 白腊 黄蘗 蜂蜜

乌梅 乱发

虚冷消脱。脉细皮寒。气少不能言。憺进穀食。

时者。虚热者。宜理中汤。见前。合前子散。见前。

續來儀製

冷痢日久難愈。非藥力所能得効者。是病在
曲腸。直桂丸。肉包。雞。蛋。子。仁。食。後。服。至。大。便
解。下。魚。腦。色。或。結。囊。為。驗。

脾胃下陷。後重裏急者。宜補中益氣湯。見
倚積滯未去。而膿血稠黏。心重裡急者。宜單
用大黃一味。溫煎服之。得大解通利之後。以

久痢

与药温气逐和之。

由积食累下。久不止者。宜通之。然及调补为

宜。

(茎) 酒客痢

名称

酒客得痢故名。

原因

嗜酒之人。致湿热下注。迫而成痢。

借来仪製

症狀 面目淡黃。沉困乏力。而飲食如故。久痢不愈。

治療 去濕清熱。

處方 宜茵陳白朮湯。
茵陳 白朮 秦皮 蒼朮 蒼皮 蒼魚 之湯。

(共) 下痢腹痛

原因 此症有虛寒、實熱之分。

症狀 實熱之痛。或因食積。或因火邪。其痛堅硬而

酒客痢——下痢腹痛

拒按。

虛寒之痛。或因正虛。或因胎寒。

治療

實熱——微甘宣而蕩之。古者瀉而逐之。

虛寒——虛者溫而補之。實者煖而下之。

處方

實熱——如木香檳榔丸，芍藥湯，五連丸

，大承氣湯，調胃承氣湯，（得見至）皆唯

醫來儀製

一之劑。

虛寒

如金匱建中湯

甘草 桂枝 干姜 大棗 欖

四君子湯

、溫脾湯、理中湯、附子理中湯、(俱見前)

是為不二良方。

(芫) 下痢肛門腫痛

原因

此症因久痢之故。有寒熱之異。

下痢 肛門 腫痛

分
別
處
方

因于寒者——內以理中湯（見前）或黃耆建中

湯（即至靈建中湯內加黃芪）外以炒食鹽熨之。

因于熱者——宜用栝柳木灸黃連黃芩干姜

之虜兼當忍痛安卧戒慎口腹為要。

（共）下痢脫肛

原
因

此症因痢而肛門下脫也。

醫
來
儀
製

分
方別

有邪壓大腸而脫者宜木
有濕熱迫腸裏急後重而脫者宜地榆芍藥

木
大黃
當歸
麝香

有濕熱迫腸裏急後重而脫者宜地榆芍藥

湯

地榆
芍藥
寸木

有氣虛而脫者宜補中益氣湯見前

有氣血俱虛虛中夾寒致滑脫不收者宜真

人壽藏湯(見前)

下痢脫肛

有感受寒邪。氣泄不同而脫者。宜訶子散。

訶子散

栗壳 桔紅

(先) 下痢孔大

原因

因痢久之故。

症狀

此症痢久而肛門擴張如竹筒。下痢不禁。

治療

用酸澁固腸之法。

醫來儀製

用藥

如粟壳、訶子、之類。以收之。或用桂圓肉、
包雅蛋子仁食之。古驗。

(卅) 下痢裏急後重

原因

此症原因古影。然皆不出寒熱虛實之外。

症狀

下痢時裏急後重。

治療

熱者清之。寒者溫之。滯者導之。積者下之。血

虛宜補。氣虛宜升。此大法也。

虛分別

倘因肺氣鬱于大腸。宜理氣為中。入桔梗以
開之。

脾胃氣虛下陷。宜補血中病加升柴以舉之。

例如大便秘澀。數至圜而不便者。亦有虛實
之別。虛者宜補中益氣湯。見益實者宜大承

氣等湯（見前）

下墜異常。積中有紫黑。而腹痛不可忍。此
死血也。又當化血行瘀為主。如婦人桃仁大
黃等。或桃仁承氣湯（見前）

（世） 下痢虛坐努責

原因

血虛所致

下痢虛坐努責

症狀

澄圓而痢不下

治療

補血為主

處方

宜當棟，芍藥，生地，陳皮，之屬

(三) 下痢乾嘔

原因

此症多由胃氣不和，寒熱錯雜所致。

症狀

下痢兼乾嘔。

治療

止痢去嘔

處方

宜外臺黃芩湯

黃芩 甘草 芍藥 大棗

亦有毒氣上逆或肝

旺而嘔者宜桑連二一丸

吳茱萸 黃連

(世) 下痢呃噦

原因

此症多因妄食生冷

症狀

下痢兼呃噦口渴

下痢乾嘔，呃噦

次 痰

止痢止呃

處分 方別

宜丁姜柿蒂散

丁姜 柿蒂 人參 干姜

桂皮竹茹飲

桂皮 竹茹 人參 甘草

半夏 麥冬 大棗 赤苓 生薑

為之主方

至若血痢呃逆而渴。心煩不眠。小便不通。宜

猪苓湯

猪苓 茯苓 澤瀉 白朮 芍藥

白痢呃逆者。宜五苓散。見前

醫來儀製

倘痢必呃逆者。多屬胃氣敗壞。最為惡候。

(苗) 下痢色黑

原因 此症屬三焦熱極者居多

症狀 下痢色純血黑

治瘥 清三焦之熱。止痢去瘀

處方 直芍藥湯。見前。屬瘀血者。必光亮如漆。直桃

仁湯承氣見益

(廿五) 下痢發熱

原因

眾多

症狀

不一定

治療

此症當從表解。

處方

統宜倉廩散見益汗之。

有邪氣下陷而背熱者。直主次藥中。加葛根
以升胃氣。

有至夜背熱煩渴引飲。此陰液受傷。直錢氏

白朮散

白朮
芍藥

人參
葛根

白朮

蒼朮

木香

加烏梅

有陰盛格陽而背熱者。最為危候。然用溫藥。

亦有生者。

(廿六) 下痢瀉語

原因

此症有因熱傷心營。神昏瀉語者。有因結毒

而瀉語者。

症狀

熱傷心營。則大渴飲冷。毒痢、疫痢、恆見

之。

處方

熱傷心營。宜白虎湯。見瀉為主。結毒者則必

以小承氣湯覓愈下之。

(艾) 下痢身腫

原因

此症多因收澀太早。腸胃積滯未清。邪氣未
盡。不能由便道出者。勢必泛濫於週身。亦有

因痢後腸胃虛弱。誤食葷麪而生。在病者。

症狀

痢愈之後。週身腫浮。

下痢譫語，身腫

沈療

統作水腫沈

處方

如五苓散(見前)五皮飲

陳皮 五加皮 茯苓皮 姜皮 大腹皮

實脾飲

茯苓 寸木 木水 甘草 木色 疏鑿飲 栝柳 商陸 蒼皮 大腹皮 附子 厚朴 炒薑 炮薑 蘇子 花椒 赤豆 生薑皮 秦丸

姜活 澤瀉 等方。滲利其水。古者以舟車丸

牽牛 大黃 甘草 大戟

芫花 木色 青皮 枳皮 輕粉 下之。

(廿八) 痢後癰

原因

此症邪氣自裡傳表。痢止而瘧作也。

症狀

陽虛則發熱。陰虛則惡寒。故發熱為瘧。

治療

宜大劑。

處方

補中益氣湯見前

(芩) 瘧後痢

原因

此症乃元氣下陷。邪氣由表入裡之故。瘧止

痢後瘧——瘧後痢

而痢作也。

症狀

寒熱往來

治法

宜大劑

方

宜黃芪建中湯見多或補中益氣湯見多

(罕) 痢風

名稱

又名鶴膝風

原因

由病後陰氣虛損。寒濕趨下而成。

症狀

此症上下腿細。膝部腫大。形如鶴膝。

治療

去風和濕。

處方

宜多服陽和湯。

熟地 肉桂

麻黃 甘草

白芥子 鹿角膠

丸姜

倘寒熱互盛者。宜大防風湯汗之。大防風湯

防風 附子

白木 牛夕

人參 肉桂

姜活 蒼朮

川芎 杜仲

白芍 甘草

熟地 黃

（一方苦肉桂有芍藥）

(里) 痢後風

原因

此症多因痢後不善調攝。或勞役遠行。或色慾不節。或受濕氣。而感冒風寒者。

症狀

覺足部輻痛。或周身骨節疼痛。

治療

去風為主

處方

覺足部痿軟而疼痛者。大防風湯(見系)主之。

若週身骨節疼痛者。表為痛風。宜獨活寄生。

湯

搜風

桑寄生

秦艽

防風

細辛

川芎

當歸

杜仲

或補中益

氣湯。見氣隨症施治。

(三)

下痢青色

原因

青為肝色。肝本乘脾。脾失健運之常。穀食入

胃。不能生化精微。而變為敗濁。下注大腸。而

痢後風——下痢青色

下痢青色。

症狀

痢下色青。為籃心煩。口渴引飲。穀食減少。小

便稀少。舌中剝。

治療

宜泄肝培脾。

處方

平疝氏方
小川連 五分
軟紫胡 五分
炒白芍 二錢
湖丹皮 二錢
黑山梔 二錢

香薷芽 三錢
炒枳實 錢半
焦查肉 二錢
焦白朮 錢半
陳皮 二錢

醫來儀製

赤茯苓 三錢

(四三) 痢後便血

原因 汗腐久滯。侵蝕腸壁。腸中血絡受損。

症狀 腹痛下痢。痢後便血。或多或少。

治療 常分大傷。津液內竭。宜和營瀉血。清熱。

處方 北沙參 三錢 炙甘草 四錢 製丹參 二錢 炒白芍 三錢 銀花炭 三錢

痢後便血

北秦皮 一錢半
炒槐米 三錢
桂身炭 二錢
地榆炭 二錢
撲枳皮 錢半

荷葉蒂 錢
香連丸 一錢

(四) 胎前痢

原因 有感于外邪者。有傷于生冷者。與常人同。

症狀 腹痛下痢。肛門腫痛。陰門亦脹。滯不通。胎兒

時、躍動。

治療

治孕婦下痢。不可守通。因通用之。常法直顧。

全其胎孕。以調氣為先。調氣之法。如次鑪分。

金已敗之精血。則隨氣而下。未傷之津液。可。

挽之而安。

處方

製以朴 卅 焦白朮 二錢 淡黃芩 二錢 仁好丸 二錢 廣藿香 三錢

製半夏 二錢 黃芩皮 各八分 炒麦芽 三錢 炙甘草 三錢

胎前病

(五) 產後痢

原因 多因飲食不調。貪吃生冷。或起居不慎。衝寒

胃暑所致。

症狀 腹痛後重。下痢不爽。

治療 產後氣虛血虧。抵抗力薄弱。一切賊邪外氣。

每易乘虛而入。若用普通治法。以蕩腸胃。則

鼓氣不足。药力難施。濁邪不能盡去。且虛者
 不勝其擊奪。元氣益踣。邪氣益張。不臨於絕
 地。不止。即壯突之婦。元氣未敗。再當于消導
 之中。加入調氣養血之药。

虛方

焦白朮 二钱
 白扁豆 三钱
 炒橘身 二钱
 淡黄芩 二钱
 炒枳壳 钱半

新会皮 一钱
 炒六曲 二钱
 炒藜蘆 三钱
 白茯苓 三钱
 炙甘草 五分

產後痢

炒白芍 二錢

(四六) 老年痢

原因

老年氣血衰弱。不能固攝。偶受寒滯。皆為下

痢。

症狀

大便黏賸。下痢不爽。舌滑脫液。脈沉大。或細

弱。

治療

宜培補攝納

處方

淮山藥

三錢

潞黨參

三錢

山東黃

二錢

五味子

七分

煨牡蛎

八錢

建蓮肉

三錢

白茯苓

三錢

炙甘草

三分

法干姜

五分

（胃）

痢疾吐蚘

原因

溼熱薰蒸胃口。蚘動不安。下既滯阻必反之。

于上。

老年痢——痢疾吐蚘

症狀

下痢。反嘔吐。魃。

治療

但治其胃。則魃自安。

處方

製川朴 七分
炒枳壳 錢半
焦白朮 二錢
烏梅肉 五枚
製半夏 二錢

新會皮 一錢
廣木香 七分
喜功仁 五分
沙參 二錢
白茯苓 三錢

赤芍藥 三錢

(四) 烟劑

醫來儀製

原因

痢有因于消昡使然者。然烟性止澀。痢有因

于溼釀而成者。然烟性燥烈。西醫則謂痢由

感染微菌而起。然烟含毒質。亦能殺菌。其所

以患者。乃大腸之陰精。耗燥殆盡。一有感染。

失其抵抗力矣。

症狀

裏急後重。奔迫下墜。較常人為苦。

烟痢

治療

直著白固脫防腐並用

處方

生石膏

五錢

沙阿膠

三錢

赤石脂

四錢

煨肉蓯蓉

炒棘身

二錢

生銀花

二錢

炒白芍

二錢

粉甘林

一錢

苦參子

肉子者
五枚

芩

瀉痢

原因

經云。暴注下迫。皆屬於熱。証之經驗。瀉痢多

屬虛寒。腸胃失收攝之作用故也。

症狀

裏急後重。然如圜古爽。不志努責。

治療

宜用溫固法

處方

見空痢條

(辛) 痢疾初起

原因

痢疾初起。邪未旺。正尚實。滯澀欬。失于宣

化。

症狀

胸膈脹滿腹痛拒按小便不利。

治療

宜法裏導滯

處方

藿香梗 一錢

川厚朴 七

左金丸 八分

廣木 七

炒檳榔 一錢

焦麥肉 二錢

粉葛根 一錢

炒枳壳 一錢半

炒黃芩 一錢半

炒白芍 一錢半

陳腐皮 一錢

已

痢疾

醫案選粹

(一)

痢經一月神煩氣虛

痢經一月赤白相雜。檢閱醫方。一派攻伐。遂致
肝脾營陰受傷。腸胃脂膏。斃盡。氣虛下陷。圍時後重。
臍肚。眼眶。內陷。神煩。全不思食。延成噤口重症。慎防
汗喘。虛脫之變。服虛數。近弦。舌苔。光紅。姑擬人參。石
蓮。飲。為法。冀其轉機。

痢經一月神煩氣虛

江枳壳 錢半
地榆炭 錢半
高豆蔻 三錢
石蓮肉 三錢
東白芍 錢半
野於木 二錢

所膠珠 三錢
硃砂神 三錢
建澤瀉 三錢
煨木皮 七分
(四錢五分)

老考款 三錢
(詳佛手露考為引代水燉沖)

(二) 畏寒食減痢下肛門大痛

夜半肛門痛甚。陰分邪氣之羈。今日漸覺畏寒。陽明
久不納穀。胃氣不沖之故。未可純任苦寒。今擬暫用

備來儀製

白头翁湯法加溫藥。

白头翁

錢半

秦皮

錢半

厚朴

芍藥

二錢

桂枝

錢半

丹皮

錢半

廣楮皮

一錢

川雅連

五分

防風

一錢

上肉桂

五分

飯心者

(三)

老人滯下一月有餘

七旬以外之老人滯下紅白積業已一月有餘二脈

洪大數而且歇止乃痢疾之大忌。舌苔老黃積滯未

畏寒食減痢下肛門大痛——老人滯下一月有餘

清。腹。痛。當。臍。匠。者。一。味。收。補。置。積。滯。于。不。回。邪。去。出。
 路。焉。得。成。功。勢。已。重。大。之。極。勉。此。化。滯。兼。和。溫。通。下。
 焦。

姜芽反 二錢
 炒白芍 二錢
 焦神曲 三錢
 杏仁泥 二錢
 淡黃芩 錢半
 真川連 三錢

廣木香 七分
 花檳榔 錢半
 廣皮炭 一錢
 川椒炭 五分
 烏梅肉 五分
 公丁香 七分

(四) 陳積不行 變為休息劑

醫藥儀製

休息痢本係不洗之症。為其久久累贅。氣血虛盡矣。
 且喜年輕形壯。而又欲便先痛。便後痛減。陳積不行。
 尚可惜手于一下。所謂網開一面。至墮謂病至年月
 日時復發者當下云。

生大黃 二錢
 當歸 錢半
 降香末 五分
 上安桂 三分
 花柳柳 錢半
 廣木香 七分

炒白芍 錢半
 小川連 三分
 炒黃芩 錢半
 廣陳皮 一錢
 烏梅肉 五枚
 炒紅曲 二錢

陳積不行。愛為休息痢。

(五)

下痢黃赤壯熱如火

腸癖身熱本所大忌。又加溫者。現正斑疹已過四日。

未有漸化之機。壯熱如火。澹語煩燥。起卧不安。滯下

紅積。後重太甚。欲便先痛。便心痛減。責之積重。當先

通滯為先務。

生大黃 二錢

瀉黃芩 二錢

炒紅曲 二錢

炒白芍 二錢

錢半

安肉桂 三

錢半

錢半

醫來儀製

廣木文 七分
以雅連 三分
烏梅肉 五分

(二) 診 滯下紅積。狂執。譫語。及重。欲便先痛。昏而溫。

下法。蘇大執。而譫語均退。惟及重未除。滯下未清。腰

痠。特止。再守。為法而變化之。

炒黃芩 二錢
川桂枝 三分
廣木文 七分
炒白芍 二錢
神曲 三錢
陳皮炭 一分

枳柳尖 錢半
以雅連 三分
烏梅肉 五分
以椒炭 五分
神曲 一錢

下痢。甚。疼。壯。熱。如。大。

(六)

痢下純紅後墜頗甚

痢下純紅後墜頗甚法當調氣行血俾心重便膿漸

愈擬用蘇馬大劑湯加味主之

常棣二錢 白芍二錢 佩蘭二錢 海南子二錢 萊菔子二錢 川連五分

木香五分 枳實二錢 車前子三錢 陳紅茶錢半 藜蘆附二錢 溫脾丸三錢
(吞服)

(七)

胎前下痢產後未止

醫來儀製

腹下痢。延及產後。惡露不行。腹中疼痛。症勢殊厲。
 棘手。切不可服生化湯。服則痢石增劇。約擬一方。獲
 效為順。

炒萊木

錢半

澤蘭

錢半

川芎

五分

黑荆芥

錢半

炒白芍

錢半

炙甘草

五分

西血珀

五分
另吞

(八)

由瀉成痢。正虛而表邪未清。

痢下純紅。後墜頗甚。——胎前下痢。產後未止。——由瀉成痢。正虛而表邪未清。

由馮成痢。是戊病尅癸也。已經旬日有餘。表邪未清。

適未正氣已損。穀食不思。恐成噤口之患。

桔皮 一錢 佩蘭 錢半 甘枙 五分 苡蒂 一錢 葱豉 活 防風 一錢

枳椇 分 太子參 五分 川朴 七分 赤苓 三錢 陳米 一撮

(九) 痧脹心煩白痢瘵黑

經來觸暑穢。痧脹心煩。白痢瘵黑。

醫來儀製

淡黃卷 二錢
江松尖 錢半
川黃連 五分
石膏屑 一錢
川玉金 錢半
枳皮 一錢

(十) 十年久痢飲食不減

十年久痢。酒客滯腸中。非風藥之輔佐。苦味入腸。何以勝溼逐熱。久病腸甲飲食不減。腸中病也。

棉茵陳 二錢
香白芷 一錢
北秦皮 錢半
蒼朮皮 四錢
以黃栢 二錢
藿香 三錢

(十一) 咳嗽而兼瀉痢

癆脹心煩自痢瘵血——十年久痢飲食不減——咳嗽而兼瀉痢

痢疾驗方

咳嗽瀉痢。治相背。治肺碍脾。治脾碍肺。方今文冬。

治痢為要。病人謂早食相安。晚食脹滿。脾胃陽氣已

乏。勿徒消滯。勉之。

白芍桂枝拌

錢半 煨益智錢半

陳皮一錢

茯苓三錢

焦白朮二錢

炙甘草五分

右芽

三錢

砂仁壳

五分

(十一)

瘧疾變痢

癯邪執氣。內陷變痢。延已三月。脾胃氣衰。面浮肚脹。仍有裡急欲墜之象。中虛邪伏。進以和解。

柴胡 一錢

黃芩 錢半

人參 八分

母皮 錢半

炒芍藥 二錢

炒白芍 錢半

右茅 三錢

炒山查 二錢

庚 痢疾驗方

(一) 治熱性痢疾方

癯疾便痢

治熱性痢疾方

若參子(即雅胆子)七粒。以桂元一張包之。七包為一日量。分三次服。

(按)若參子味苦性寒。為涼血解毒之要藥。用治熱

性赤痢。洵屬對症良藥。惟以桂元包。不若以豆腐皮包。蓋腸中溼熱方熾。不宜以補藥助邪也。

(二)

治熱痢便膿血方

白头翁

北秦皮

各三錢

黃柏

三錢

黃連

五分

水煎服

(按)

此方出張仲景傷寒論原治協熱下痢。白头翁

秦皮黃柏黃連性俱苦寒。寒以清血分之火。苦

以燥脾胃之濕。濕熱為痢之病原。濕熱剷除。下

痢自瘳。且秦皮能固下焦。黃連培厚腸胃。于清

治熱痢便膿血方

執之中。萬固嚮之意。余療赤痢。輒用是方。奏效
古確也。

(三) 痢疾効方

廣木皮買苦考二升為末。將甘州一斤。煎膏和丸如
板子大。每服三錢。

(按) 苦考大者大寒。既能消腸中之炎。又治殺痢疾

之菌。用以為君。木魚。辛溫。除心重。甘。升。甘。平。和。
中宮。所以佐君。藥以主功也。

(四) 治噤口痢方

上不納食。下痢不止。痢中重症也。用老藕搗汁煎熟。
稍和砂糖頻服。

(按) 下痢而至不能食。痢中重症候也。此胃氣已竭之

微。然大劑補藥。又非虛名者所能受。故石以甘
平善胃之品。如汁者。緩之調補。冀其胃氣之後。
而後。可以收斂劑止其痢也。

(五) 噤口痢外治方

凡患痢。見食物則嘔。不能下咽。或不要吃。此症最險。
方用雄黃一分。巴豆二分。去油。硃砂一分。葶麻子七

粒。麝香三厘。密丸。灸穴大。放兩眉心正中。鼻之上膏藥。
蓋之。約一小時。天腹響而思飲食矣。

又內服方

炒神曲一司 山查一司 白砂糖一司 川連一錢二分 真烏梅三斤

粉甘升五 嘉肉七斤 用三大碗煎湯服。且吐且飲。自

然思食。止痢。虛誠奇効。不可輕視。

噤口痢外治方 又內服方

(六)

熱痢腹痛甚劇方

熱痢下重。腹痛甚劇。及患痢之人。從前曾有鴉片之嗜好者。方用生懷山萸一司。白朮。生枳實。各錢。秦皮。生地榆。旱三七。細末。各三錢。甘竹。雅胆子。去皮。揀成。苦者二十粒。右藥八味。三七雅胆子。分兩次送服。每藥急服。此方。

(七) 久痢膿血方

痢久膿血腥臭。腸中腐爛。兼下焦虛憊。氣化消脫者。
方用生懷山藥。軋細。可早三七軋細。錢雅胆。子去皮。
揀成實者五十粒。右藥三味。先將涼水。回茶鍾。調和。
山藥末。煮成粥。煮時。不住以箸攪之。一二沸。即熟。約
得粥一大碗。隨便調以白糖。取其適口。即用此粥送服。

熱痢腹痛甚劇方——久痢膿血方

三七雅胆子。

(八)

痢久鬱熱生毒方

下痢日久鬱熱生毒腸中腐爛時時切痛必重所以

多似爛矣且有腐敗之色甚者方用金銀花牙生托

牙錢粉甘味三錢早三七錢細末三錢雅胆子俗名鴨蛋子去皮揀成莢

者六十粒。右藥五味先將三七雅胆子用白糖水送

服。即將湯葯煎渣再服。病重劇者一日復服兩劑。方
能見効。

(九) 痢疾通用驗方

余家每至冬日，恒以白蘿蔔置在屋上。任其日曬風
吹。霜打雪飄。直至立春為一日。始行取下。懸于去日
處陰乾。遇有患痢者。即和砂糖煮而食之。痢疾不愈。

(十) 痢疾初起方

葛根

炒善參

陳皮

陳枳殼茶各一斤

赤芍

酒炒

炒麥芽

炒山查羣蟲

研細末。每服四錢。水煎。連

末藥服下。

小兒減半。忌葷腥麪食。並灯烟氣。昔氣此

物。

(按) 痢之病原。總由先感暑熱。繼食生冷。暑熱留陰

寒所過。遂鬱伏腸間而成痢。故以葛根鼓舞胃
氣。陳茶善化暑氣。麥芽山查以消宿食。赤
芍行血。則便膿瘕。陳皮調氣。則水重除。惟祇宜
于腹不脹痛者。蓋去腹滿拒按之症。便不須下
也。

(十一)

治痢疾兼有表症者

痢疾初起方——治痢兼表症方

葛根

錢半黃芩一錢

黃連

芍

甘草

分

水煎服

(按)

痢疾去表症者易治。有則難治。所謂表症者。即

除大便下痢之向部症狀外。復有身熱怯寒頭

疼脈浮之全體症狀也。是項全體症狀。最為沉

痲之掣肘。蓋以下劑葛根湯。腸胃垢則表邪即有肉

陷之虞耳。本方以芍連治痢。即以葛根解表。肉

外合名。並行不悖。此仲景立方之神妙。是方出傷
寒論。所以為百世推崇也。

(三)

治久痢不止

石榴皮燒灰存性研末。米湯飲下二錢。

(按)初痢必兼通下。久痢則當止瀉。此治痢大法

也。石榴皮味酸氣溫。瀉腸止痢。功與御米壳赤

石脂相若。故克治之。

(十三) 赤痢驗方

陸定圃云。白槿花治赤痢甚効。余于杭郡學署。植數株。秋間花繁茂。凡患赤痢者。以花五六朵。置瓦上炙研。調白糖服之。皆愈。荷花池頭陳某。秋間下痢。月餘。諸藥不効。已就危篤。亦以此獲愈。採花晒乾藏之。

次年治痢亦效。

(十四)

五色痢方

五色痢用鳳尾牒。此牒有二種。一由貫仲之別名。一
為金星鳳尾。治痢者。乃金星鳳尾也。金星鳳尾葉細
碎。形似鳳尾。種不滿尺。三月昔苗。背有點子二行。相
對有數粒。至數千粒。秋收。乃煮。生古墻。及山下。小

痢疾要方

者佐名骨牌州。性至冷。治按毒下痢。有人患五色痢。
泔首。用劬。用鳳尾州一大握。老倉米一斗。連殼筍白
三根。帶皮老姜三片。用水三大盞。煮至一盞。去渣。入
燒酒小半盞。真蜜三茶匙。調極勻。乘熱服一小盞。後
時再服。一日服。盡服。二劑痢止。調理而愈。

辛
痢疾要方

名稱

葛根黃芩黃連湯

藥品

葛根 黃芩 黃連

主治

協熱下痢。脈數。葛根。喘而汗出者。宜矣。

方義

以葛根能升清而解肌。熱。芩連能清肉。熱。且

可燥。溼。堅。腸。也。

名稱

白芷寇湯

痢疾要方

藥品

薏仁

訶黎勒

陈皮

乾姜

厚朴

主治

寒濕停中。脾胃升降失司。嘔吐瀉痢。

腹痛而滿。脈沈細弦者。皆白。

方義

以此方有溫運化濕之力也。

名稱

枳壳湯

藥品

枳壳

黃連

厚朴

甘草

阿膠

醫來儀製

全沈

血痢已久。濕熱猶有未清。

方義

方中攻補兼施。

名稱

荆防敗毒散

藥品

荆芥

防風

茯苓

甘草

桔梗

枳殼

柴胡

芍藥

羌活

獨活

川芎

薄荷

生姜

主治

痢扶表邪而散寒熱者宜以方。

方義

冀其邪從表達而溷痢自止。喻氏所謂逆流

換舟之法也。

名稱

白朮湯

藥品

白朮

芍藥

黃芩

黃連

主治

温热壅盛。迫血妄行。大便脓血。脉数苔黄者。

宜之。虚寒者服之。祸不旋踵。

方义

白头翁有风不动。去风自摇。性味苦寒。合之

秦柏连等。大能清化温热也。

名称

白头汤

药品

芍药 当归 黄芩 黄连 大黄 木香

檉柳

甘肫

肉桂

主治

法濕熱。高積滯。和營理氣。兼有其功。

方義

此為法。友秋濕熱。痢之正方。但肉桂為久痢

腹痛。長者設尋常。初起。勿用。為宜。

名稱

木香檉柳丸

藥品

木香

檉柳

黃柏皮

枳壳

黃柏

黃連

醫來儀製

山稜
義逆
大黃
魚附
芒硝
白黑丑

主治

溼熱積滯之痢初起。乘其正氣未虛。亟宜用

此攻之。日久則胃氣敗壞。難為力矣。

方義

以走利三焦之氣通暢。溼熱之積自行。况益

以峻速推蕩之藥乎。

名稱

枳實導滯丸

痢疾要方

藥品

大黃

枳實

黃芩

黃連

神曲

白朮

茯苓

澤瀉

(加木香枳柳名木香導滯丸)

主治

痢疾常用

方義

此方利氣消積。不若芩方之猛。痢疾用此較

妥。或加木香枳柳以利其氣。其勢稍烈。

名稱

香連丸

藥品

木皮

黃連

主治

痢下內熱口乾氣阻腹痛。

方義

木皮辛燥利氣機黃連苦寒化溼熱合而為

丸。有相得之妙。脹痛而口不渴者忌服。

名稱

桃花湯

藥品

赤石脂

乾姜

糯米

主治

大便膿血。小便不利。悶闌不固。下焦滑脫。脹

微欲絕。

方義

此方甘溫因瀉。但祇可暫用。痢止即可勻服。

以其粘膏之性。防其壅滯之患也。

名稱

溫脾湯

藥品

大黃

人參

甘草

乾薑

熟附子

醫家儀製

主症

稍久熱痢赤白。纏綿不愈。攻補難。

方義

此方用過下法。虛寒者宜加桂心。重用炮

姜附子。減大黃。

壬 結論

時醫治痢。概施敗毒散。偏于表者。一汗而解。偏于裏

者。徒傷元氣。或喜兜澀之法。邪淺者。原無大害。倘邪

結論

氣深伏。功未獲奏。而害已隨之矣。蓋人有稟賦厚薄
之分。病有寒熱虛實之異。居者貴賤之不同。年壽老
幼之各別。豈可以一定之法。而測非常之變耶。是編
篇之作。係採集當代名醫朱振聲余駕山先生等學
說。供諸當世。使患是疾者。有所指治。不至為庸醫誤
也。傳仙附記。

癸

補遺

補遺