

精校
張氏醫通

本經逢源 卷三

出版 上海錦章書局

穀部

諸米 甘平無毒 發明 米受坤土精氣而成補五臟而無偏勝。穀者曰穀穀者曰黍資生之至穀也其味淡而微溫。北杭涼。東杭熱。白杭平晚白杭涼新杭熱陳杭涼新陳黃白總謂之粢通名曰穀。雖穀益人然不可過食。食多則傷中州之氣也。有人嗜食生米久成米癰治之以雞屎白取其殺蟲也未經霜熟者尤大所生不復生。急作火動麻氣陳者下氣益脾。病人尤宜。本草言。杭米溫中和胃氣長肌肉。仲景白虎湯。桃花湯。竹葉石膏湯並用之。皆取晚杭得金之氣居多故也。○陳倉米開胃進飲食。平久者治久痢甚良。○林米俗云糯米。益氣補脾胃。但磨粉作稀糜。庶不粘滯。且利小便。以滋肺而氣化下行矣。若作糕餅性難運化。病人莫食。○泔水善消鴨肉。又製二丸宜之。○紅蓮米入心脾補血。○籼米溫中益氣除濕止渴。○穀芽啟脾進食。寬中消穀而能補中。不似麥芽之前耗也。○稷米苗高如蘆俗名蘆粟穗曲下垂。如鈎者良。治熱壓丹石。益解苦瓠毒。不可與附子同食。○粟即小米。利小便止痢壓丹石。熱解小麥益發熱。○梗木厚腸胃濟饑其苗根治金瘡血出不止。搗爛或研末掺之。其血即止。○菰米即雕胡艾草之子。止渴解煩。○春杵頭糠能治噎膈取其運動之性以消磨胃之陳積也。然惟暴噎為宜。

諸麥 甘平皮寒無毒 發明 素問云。麥屬火心之穀也。鄭玄云。麥有孚甲屬木。許慎云。麥屬金。金旺而生火旺而死。三說各異而別錄云。麥養肝氣與鄭說合。孫思邈云。麥養心氣與素問合。參考其功除煩止渴。收汗利溲止血。皆心之病。當以素問爲準。蘇恭云。小麥作湯不令皮折。折則性溫不能消熱止渴也可知方中用麥皆取外慾之力。仍取溫性內存以輔助之。惠增五穀中。惟麥得春升之氣最早。故爲五穀之長。察其性之優劣。則南北地土所產之不同。北麥性溫。食之益氣添力。南麥性熱。食之助濕生痰。故北人以之代飯。大能益人。養肝氣去客熱。止煩渴。利小便。止漏血。唾血。令婦人得孕。南方氣卑地濕。久食令人發熱。鄉土不同故也。乾麵益胃強肝。濕麵生殘助濕初夏新者尤甚。新麥性柔助濕熱尤甚。而收穫時遇雨色變者食之令作嘔能傷胃氣。○麸皮多筋而性寒。能發肝風傷脾氣。且最難消化。受其傷者惟草果能消去之。其治走氣作痛。用醋醃拌麸皮炒熟。袋盛熨之。○小麥粉乃穀度洗筋

溢出積善堂方。烏龍膏治一切腫毒未消者。用陳年小麥粉炒黑。醋調糊熬如漆。磁罐收貯。用時摊紙上剪孔貼之。其腫自消。華力盡。白脫用經霜桑葉大黃末和蜜調傅尤良。○浮參輕虛。象肺能散盜汗。取其散皮腠之熱也。○麥
以乃麥。將熟時上有黑微者。朱肱治陽毒溫毒熱渴。斑狂。麥奴九用之。方用小麥奴梁上塵。金底煤。蜜突墨。同黃芩
麻黃硝黃等分。爲末。蜜丸。彈子大水化服一丸。汗出或微利即愈。取從火化之象也。○大麥即牛麥。健胃化食。主消
渴除熱。久食令人多力健行。○大麥作羹。溫中消食。既經發芽。大能耗伐督氣。凡人小便多者禁之。王好古云。麥蘖
神麩二藥。胃氣虛人宜服之。趙養葵曰。此不稽之言也。今人造飴必用麥蘖。始化傷中消導可知。產婦乳腫不欲乳
哺。用麥蘖半兩入四物湯服之。卽斷傷耗精血可知。○雀麥一名杜鵑草。益肝和脾丹方。以此草同苦瓠葉。醋清炮
熱內口中齒外。遇熨之冷則易熱者再熨。更取銅器置水浸熟。早與葉乘熱漱痛齒。得蟲長三分者黃色。小者白色。
多者得數十枚。少者得三十枚。出十金方。○蕎麥甘平。動風發熱能鍊腸胃。滓穢積滯。降氣寬胸。治白濁白帶。
氣盛而濕熱者宜之。孟說言益氣力者殆不然也。炒焦熱水衝服。治絞腸沙腹痛。小兒丹毒。赤腫。醋調塗之。然須北
方者良。南方者味苦性劣。不堪服食。久食令人動風頭眩。不可與猪羊肉食。令人鬚眉脱落。又不可合黃魚食。其禪
燒灰淋汁。卽鹹。化石灰能去蠶蟲惡肉。

諸豆 甘平無毒。發明 大豆曰。綠色黃入脾。瀉而不補。色黑入腎。濡中寓補。○本經云。生研和醋。塗癰腫。煎汁
飲殺鬼。毒止痛日。娶云。制金石藥毒。特珍云。水浸搗汁。解磬石砒石。烏附射罔。甘遂巴豆。芫青斑蝥。百藥之毒。古方
取用甚多。炒熟酒淋治風毒脚氣筋脈拘攣。產後中風口喝頭風破傷。並宜炒熟酒淋服之。○黃大豆生泄利。熟壅
氣生痰動噦。諸病皆非所宜。惟痘後餘毒發癰。炒黑研末。以香油調傅之。生浸細磨。和滓炒熟傅腫瘍。背癰冷則換
熱者。煩傅卽消。誤食毒物。生搗研水灌吐之。諸菌毒不得吐者。濃煎汁飲之。又試內癰及臭毒腹痛。並與生黃豆嚼
甜而不恶心者。爲上部有雜濃及臭毒發癰之真候。○其生黃豆葉嚼爛罨蛇蠍傷立効。○白扁豆入脾經氣分。能
和中止嘔。得木瓜治傷暑霍亂。金匱云。扁豆病寒熱者不可食之。以其能滯氣也。若脾虛寒熱不止。則扁豆又非禁
劑。一種紫東者。入脾經血分。治失血血痢俱炒黑用之。○扁豆花治下痢膿血。赤白帶下。葉治霍亂吐下。吐利後轉
筋。生搗一握。入酢少許。绞汁服之立瘥。○細黑豆一名稽豆。俗名科豆。入腎經血分。同青鹽旱蓮草。何首烏。蒸熟。但

食黑豆則鬚髮不白。其補腎之功可知。今人以製何首烏取其引入腎經也。黑豆炒焦淋酒。即豆淋酒也。頭風脚氣咸取用之。以其直達腎督血分也。○大豆黃卷。黑大豆發芽是也。本經治濕。脾筋掣膝痛。除胃氣結積。益氣解毒。金匱薯蕷丸用之。取其入脾胃散濕熱也。○赤小豆即赤豆之小而色黯者。俗名豬肝。亦其性下行通利。小腸故能利水降火。久食令人枯燥。瓜蒂散用之。以泄胸中寒實。正以其利水清熱也。生末敷癰腫。爲傷寒發頤要藥。發芽同當歸。治便紅腸癰。取其能散萬積之毒也。○綠豆甘涼解毒。能明目解附子砒石諸石藥毒。而與榧子相反。誤犯傷人。○綠豆粉。治癰疽內托護心丹。極言其効。○真粉乃綠豆所作。取陳者蜜調敷痘瘡。痘瘡不結。加元者乾搘之良。○綠豆殼。治痘生日醫。○蠶豆甘溫性滯。中氣虛者食之。令人腹脹積善堂方。言一女子誤吞針入腹。諸醫不能治。有人教令煮蠶豆同韭菜食之。針自大便同出。誤吞金銀物者。用之皆効。○豌豆一名畢豆。補中益氣。燒灰治痘疹黑疔。○神黃豆。產緬甸形如槐子。近時婦痘方用之一。陽日用清水磨服。○淡豆豉。用黑豆淘淨。伏天水浸一宿。蒸熟摊乾。蒿覆三日候。黃色取晒。下甕菜實。葉厚蓋泥封七日。取出又晒。酒拌入甕。如此七次。再蒸如前。即是。主傷寒頭皮。寒熱煩悶。溫毒發斑瘡。氣惡毒入。吐劑發汗。并治虛勞喘吸脚膝疼。大病後。胸中虛煩。之聖藥。合施子治心下懊憹。同葱白治溫病頭痛。兼人中黃山施臘茶。治溫熱疫癥。虛煩喘逆。與甘桔姜棗。治風熱標冰。皆齊效。為聖藥。蓋瓜蒂。吐胸中寒實。五更吐虛熱。懊憹得葱則發汗。得鹽則湧吐。得酒則治風。得薤則治痢。得蒜則止血。生用則發散。炒熟則止汗。然必江右製者。方堪入藥。入發散藥。陳者爲勝。入涌吐藥。新者爲良。以水浸绞汁。治誤食鳥獸肝中毒。服數升愈。○豇豆補腎健胃。解莽草毒。○刀豆暖補元陽。其子治病後呃逆不止。燒灰存性。白湯調服二錢。即止。亦取其降濁氣之力也。

胡麻本經名巨勝子。千金名烏麻子。即黑芝麻。葉名青葵。莖名麻蕪。甘溫無毒。○本經主傷中虛羸。補五內。益氣力。長肌肉。填髓腦。久服輕身不老。發明。胡麻甘溫質潤。性燥。專入足少陰血分。巨勝子丸以之爲君。專補腎臟陽虛。兼行肝心脾肺四經。益脾滋肺。降心包之火。滋肝木之陰。平補五臟。但不若附桂之雄健耳。其白者名白油麻。亦能潤肺除燥。下通脾約。便難。赤者專發腎經之毒。錢氏治小兒痘疹變黑歸腎。用赤芝麻煎湯。送百祥丸。○青葵巨勝苗也。本經主五藏邪氣。風寒濕痹。益氣補腦髓。堅筋骨。○胡麻花爲末。麻油塗生禿髮。長眉毛外臺子。金用之。○麻莖燒灰。點痣去

惡肉。又治小兒鹽喙。以淡豆腐蘸麻莖灰食之。○白麻作油微寒。解毒潤腸。主產婦胞衣不落。慈養生肌長肉。止痛消腫。○燈盞油。吐風痰食毒。

亞麻俗名蕷
胡麻微溫無毒。發明。亞麻性潤入陽明經。專於解散風熱濕毒。爲大麻風必用之藥。故醉仙散用之。
麻子仁即麻子實甘平無毒。入藥微炒研用。入丸湯泡去殼取帛包煮沸湯中浸至冷出之。要在中一夜勿著水。次日
日中曝乾。按去殼破揚取仁。本經寶名麻仁。補津益氣久服肥健。不老神仙。○花名麻勃。治二十種惡風黑面遍
身苦癢。逐風惡血。女人經候不通。發明。麻仁入手陽明足太陰。其性滋潤。初服能令作渴。若久服之能令肥
健。有補中益氣之功。藏府結燥者宜之。仰景治陽明病。汗多胃熱便難。脾約丸用之。取潤脾土祐燥也。日半止消渴。
通乳汁。主催生難產。及老人血虛產後便祕。宜之。麻勃治身中伏風。同優鉢羅化爲麻藥。破癰腫不知痛。煎汁服
五合。下蛇蟲。搗爛敷蠍毒俱効。黃麻破血利小便。麻根搗汁。治產難胞衣不下。煮服治崩中不止。生走而熟守也。併
治熱淋下血不止。根葉並治搗打瘀血。心腹滿痛。搗汁服之皆效。陳黃麻燒灰酒服方寸匕散。內傷瘀血。

薏苡仁即米仁甘微寒無毒。入理肺藥。善汗拌炒。入利水濕藥生用。本經主筋急拘攣。不可屈伸。久風濕痹。下
氣久服輕身益氣。根下三蟲。發明。薏苡甘寒升少降多。能清脾濕。祛肺熱及虛勞欬嗽。肺痿肺癰。虛火上乘。皆
宜用爲下引。又能利筋去濕。故本經治久風濕痹。拘急不可屈伸之病。蓋治筋必取陽明。治濕必扶土氣。其功專於
利水濕。去則脾胃健。而筋骨利。脾愈則拘攣退而脚膝安矣。然脾濕須分寒熱。蓋寒則筋急。熱則筋緩。大筋受熱弛
緩。則小筋縮短而掣急不伸。故宜用此。若因寒筋急而痛者不可用也。其治虛人小便不利。獨用數兩水煎數沸服
之。卽通。若津枯便祕。陰寒轉筋。及妊娠禁用。以其性專下泄也。取根搗汁。治蛇攻心痛。生根下三蟲。又肺癰以根汁。
沖鼻灰酒服。初起可消。已潰可飲。屢效。

瞿粟穀子名
御米溫溫微毒。蜜炙止嗽。醋炙止痢。發明。粟穀性溫。刲瘻喉。止下利。肺虛大腸滑者宜之。若風寒嗽

阿芙蓉一名阿片
俗名鴉片酸溫溫微毒。天方國以瞿粟蕊竹針刺破青色。次早液出竹刀刮取陰乾者是也。○土鴉片亦
能濬精止瀉。但力薄。少效。發明。京師售一粒金丹。通治虛寒百病。用阿芙蓉一分。梗米飯搗作三丸。每服一丸。

不可多服。忌酸醤犯之，傷斷。又忌葱蒜漿水。古方治漏利脫肛，久利虛滑，用一二分米飲送下。其功勝於粟穀，又痘瘡行癧時，瀉泄不止，用四五釐至一分，未有不止者。今世服餌少用，惟房中術外用之，誠為漏精助火之首列也。

蒸餅 甘平無毒，食日以單麵所造，酵水發成。發明 溫中健脾，消食化滯，和血止汗，利三焦，通水道，用以打

糊丸，健脾胃藥良。

神麵酒曲紅女麵 甘微苦辛，平無毒。造神麵法：夏日用白麵五斤，入青蒿、蒼耳、野葵自然汁各一碗，杏仁泥四兩，赤小豆二兩，煮研拌麵作麵風乾，陳久者良。妙香用，舉世以相思子作小豆大謬。發明 神麵入陽明胃經，其功專於消化穀食，酒積陳久者良。但有積者能消化無積而久服，則消人元氣，故脾陰虛胃火盛當禁也。○酒麵亦能消食去滯，氣行藥力，但力峻傷胃。○紅麵乃梗米所造，然必福建製者為良。活血消食，有治脾胃榮血之功。女人經血阻滯，亦痢下重，宜加用之。○女麵是女人以完參，卷成黃子，消食下氣，止漏痢，破冷血，千金方恆用之。

膠鈎鈎鈎 甘溫無毒，白色者良。發明 鈎糖甘溫，入脾經，氣分潤肺，氣止暴欬，補虛冷，益津氣，除喉血。仲景建中湯用治腹痛，取稼穡之甘以緩之也。治傷寒腎虛，尺脈不至，是寶上以隄水，非伐腎也。而中滿吐逆，宿病皆不可食，以其生痰助火，最當心。丹溪云：大發濕中之熱。小兒多食，損齒生蟲。熬焦酒服，能消食積，下瘀血，解附子烏頭毒，拌輕粉熬焦，為丸噙化，療癰瘍，喉核，大吐調疫，即愈。

醋即酢一
醋名苦酒
苦酒 酸寒無毒，凡制肝藥用為引導。發明 醋名苦酒，專取米釀成者，味帶酸苦。若酒餠所造，則兼酸甜矣。然酒之與餠，總皆米製，但功力稍遜耳。宋夷曰：米醋比諸醋最醕。入藥多用，穀氣全也。仲景少陰病，咽中傷生瘡，不能語言，聲不出者，苦酒湯主之。內有半夏之辛，以發聲音。雞子之甘以緩咽痛。苦酒之酸以飲咽瘡也。調敷藥則消癰腫，制藥味則斂毒性。諸惡症狂妄，及產後血量，燒炭淬醋以辟惡寒也。北人感冒風寒，用醋湯胡椒雞麵熱食，汗之則愈。以北方素鮮生發之氣，但取以助方，宜之不足，則邪自不能為虐耳。東南木氣用事，肝火易動，諸病皆當忌食。酸喜入肝，酸寒收斂病邪，得之難於發泄耳。

酒燒酒 平甘大熱，新者有毒，陳者無毒，味甜者曰無灰酒，方可入藥。發明 酒嚴冬不冰，其氣悍以侵，明其性熱而升走，醉後則體軟骨昏。振寒戰栗，本草止云有毒，不知其溫中發熱，近於相火也。酒類多種，醞釀各異。甘苦懸

殊甘者性醇苦者性烈然必陳久為勝其色紅者能通血脉養脾胃色白者則升清氣益肺胃至於扶肝氣悅顏色行藥勢辟寒氣其助大邪。資痰濕之性則一醉當風臥成惡風醉治冷水成痹痛醉飽飲水成癆積皆宜切慎○五淋酒以黑豆炒焦紅酒淋之破血去風治男子中風口渴陰毒腹痛及小便尿血婦人產後一切諸證○燒酒一名火酒又名氣酒與火同性得火則然其治陰寒腹痛最捷然具毒發熱誤用立斃又入鹽少許治冷氣心痛下咽則安其性大熱與薑同飲令人生痔○糟性最助濕熱病水氣浮腫勞嗽吐血人忌食惟卷搗搗行於止痛及浸水洗凍瘡敷蛇咬蜂叮蟲有效

菜部

韭 生平溫熟甘溫無毒葉細根紫者良韭子入藥蒸熟曝乾去黑炒黃研用韭初生芽食之傷人心氣發明韭入足厥陰經下散血精生用治死血留於胃口作痛及婦人經脈逆行打撲損傷搗汁和童便飲然須善食便實者宜之有督氣上攻心角者宜用韭汁和五苓散為丸空心茴香湯下昔人言治噎膈惟死血在胃者宜之若胃虛而噎勿用恐致嘔吐也其心腹有痼冷者勿食食之必加劇黃帝云凍韭不可生食動宿飲飲盛必吐水○韭花食之動風風氣人勿食○韭子辛溫壯火治夢泄溺血白帶白淫男子隨溲而下女子綿綿而下惟督氣過勞不能收攝者為宜若陰虛火旺及亢陽不交獨陰失合誤用是抱薪救焚矣大抵韭之功用全在辛溫散結子則包含少火未散故能養精而壯大威盛則為戈戟今人以韭子薰蠶蟲出蟲然能傷骨壞齒不可不知。

薤 辛苦溫無毒似韭而葉潤者是黃帝云薤不可共牛肉作羹食之成瘕薤之氣味相類功用亦相類如無薤處以韭代之本經治金瘡瘍敗輕身不饑耐老發明薤白味辛氣溫入手陽明除寒濕溫中去水專泄氣滞故四逆散加此治泄利下重胸痹薤白酒湯專用以泄胸中痹氣也本經治金瘡瘍敗取半以泄氣溫以長肉也弘景云仙方及服食家皆須之即本經輕身不饑耐老之謂諸瘡中風寒水腫生搗敷之搗汁生飲能吐胃中痰食蟲積屢驗金匱收半搗汁灌鼻中効薤葉治肺氣喘急半金方用之以薤善散結蒜能消癰各適其用也葱
葱頭葱良噏葱即龍爪葱辛平無毒服地黃常山蜜桂者犯之無効生葱尤忌生葱與雞雜犬肉食之令人動血本經作湯治傷寒寒熱中風面目浮腫能出汗發明葱薑白平溫上升入手太陰足陽明經專主發散以通上下陽氣即

本經作湯已下主治。故傷寒頭痛如破用連鬚葱白香豉湯少陰病下利清穀裏寒外熱厥逆脈微者。白通湯內用葱白。以其辛溫通陽氣也。妊娠風邪喘吸非葱白橘皮不除且能安胎順氣。金瘡折傷血出疼痛不止者。用葱連草根熟傅之。冷即頓易其痛立止更無瘢痕也。以葱葉專散血氣。葱鬚專行經絡。葱花主心肺痛如刀刺。葱子明日補中氣不足。蠅葱專主冷熱疝氣。胡葱化五石消桂爲水療腫。

蒜小者曰蒜大者曰胡蒜 辛溫小毒服雲母人切禁胡蒜獨顆蒜尤忌。發明 胡之與蒜功用彷彿並入手太陰陽明氣味薰烈能通五藏。達諸竅去寒濕辟邪惡消癰腫化癥積肉食。主溪毒下氣治蠱敷蛇虱瘧此其功也。夏月食之解暑多食傷氣損目養生者忌之。又大灸用獨顆蒜甚良以其力專也。凡中暑毒人爛嚼三四瓣下咽即知。又鼻衄不止者。擣貼足心効止即拭去之。蒜薑水頓服二升。吐腹中蟲精噎膈食不得下。腹熱如火手不可近者皆效。但胃虛少食者誤投是速其咎也。脚氣風病及時行病後忌食爲其能鼓舞餘毒也。服雲母鍾乳人勿食爲其能攪散舉力犯之必腹痛泄利前功盡棄也。○小蒜主霍亂腹中不安。溫中除邪燭毒氣黃帝云。食小蒜噉生魚令人奪氣陰核疼不可共韭食令人身重。

薑臺即油 辛溫無毒。發明 薑臺破血。故產婦宜食之然須藏久者庶無泄漏之虞若雋患脚氣者不可食。胡臭人不可食。食之加劇遊風丹腫取葉搗敷加神無葉時以子代之時病癢後不可食一切生菜令手足腫。○其子打油名香油。癰疽及痔漏中生蟲以香油塗之即盡。臘肉蛀孔中滴入其蟲即滅治蟲之功可知。

白芥子 辛溫微毒。發明 痘在脇下及皮裏膜外非此不能達控涎丹用白芥子正此義也。辛能入肺溫能散表故有利氣豁痰散痛消腫辟惡之功昔有胸痛諸治不效因食芥羹而愈者偶中散結開癆之效其治射工疰氣上氣發汗者亦取辛散祛毒力耳此雖日用常品然多食則昏目動火泄氣傷精肺經有熱症火亢者切忌。○陳年鹹芥酒治肺癰。吐盡臭屎穢盡即愈然惟初起未潰宜之。

蕷青一名蔓青一名蔓蕷即諸葛菜 苦溫無毒。發明 蔷青治熱毒風腫乳癰寒熱和鹽少許生搗塗之熱即易不過三五次瘥子能明目。千金面脂方用之令人面潔白悅顏色但不可久食令人氣脹。

茱萸子 辛甘平微溫無毒。其子多種惟春種夏收子細面色黯者佳服地黃何首烏人忌之。發明 茱萸子治瘧。

有推牆倒壁之功長於利氣生能升。熟能降升則吐風痰降則定痰嗽皆利氣之效。同蘇子白芥子爲三子散治療喘胸滿。其根生升熟降。生則冠血消痰熟則生痰助濕生藥服汁。治大傷寒死灌之即蘇打摸損傷青紫。搗爛置之即散。煨熱揩摩凍瘡二三日即和偏頭風痛取近希青色者半寸許搗汁滴鼻孔。左痛滴右右痛滴左左右俱痛兩鼻皆滴滴後臥少頃日滴三次不過六七日永不復發。欲令鬚髮白者以生地黃汁一升合生藥服汁一升飲之即白。傷血之驗可徵也。小兒丹瘤遊風搗塗立消能消麵積解附子毒性最耗氣傷血。故脾胃虛寒食不化者勿食丹方取苗葉陰乾治痢隨色之紅白用赤者砂糖調服白者糖霜調服然惟初痢爲宜若久痢胃虛畏食者不可用也。

生薑宿根謂之母薑

辛溫無毒解半夏良岩厚朴毒。本經久服去臭氣通神明。發明 生薑辛溫而散肺脾藥也。散風寒止嘔吐化痰涎消脹滿治傷寒頭痛。鼻塞欬逆上氣嘔吐等病辛以散之。即本經去臭氣通神明不使邪穢之氣傷犯正氣也。同大棗行脾之津液而和榮衛。凡藥中用之使津液不致沸騰不獨專於發散也。煨熟則降而不升。止腹痛泄利。扶脾氣散鬱結故道逆散用之。同蜂蜜熬熟治風熱欬逆痰結。取蜜之潤以和辛散之性也。生薑搗汁則大走經絡與竹沥則去熱痰同半夏則治寒痰凡中風中暑及犯山嵐霧露毒惡卒病。薑汁和童便灌之立解。薑能開痰下氣重便降火也。甄權云。搗汁和蜜食治中熱嘔逆不能下食取薑以治嘔蜜以和胃也。薑爲嘔家聖藥。蓋辛以散之。嘔乃氣逆不散以其能行陽散氣也。○乾生薑溫中主噦。治脹滿霍亂嘔吐不止腹痛者宜之。較生薑稍守。較乾薑稍緩爲屑和酒服治偏風頭痛。○薑皮辛涼能消四肢浮腫腹脹痞滿五皮散用之。古云秋不食薑。令人瀉氣而新薑尤當忌之。目疾痔瘡勿食。患癰疽人食之則生惡肉。妊娠嗜食令子餘指。

乾薑其微者曰白薑辛熱無毒或生用或炮黑用炮法厚切鐵鉗內烈火燒勿頓動俟鉗面火然略啜以水急挑數轉入罐中勿泄氣候冷則裏外通黑而性不烈也。本經主胸滿効逆上氣。溫中止血出汗逐風濕痹腸澼下痢生者尤也。生者能助陽去藏府沉寒發諸經寒氣腹中冷痛霍亂脹滿皮膚間結氣止嘔逆治感寒腹痛督中無陽脈氣欲絕黑附子爲引理中湯用之以其溫脾也。四逆湯用之以其回陽也。生則逐寒邪而發表胸滿欬逆上氣出汗風濕痹宜之。炮則除胃冷而守中。溫中止血腸澼下利宜之。禹觀小青龍四逆等方並用生者甘草乾薑湯獨用炮者其

理中丸中。雖不言是在溫帶例治。不妨隨緩急裁用。然亦不可過多。多用則耗散元氣。辛以散之。是壯火食氣也。少用則收攝虛陽。溫以順之。是少火生氣也。同五味子以溫肺。同人參以溫胃。同甘草以溫經。凡血虛發熱。產後大熱。須炮黑用之。有血脫色白。天然不澤脈濡者。宜乾薑又辛溫以益血。乃熱因熱用。從治之法也。又入肺利氣。入腎燥濕。入肝引血。藥生血於亡血家。有破宿生新。陽生陰長之義。如過用涼藥。血不止。脈反緊疾者。乃陽虧陰無所附。加用炮薑又甘草可也。陰虛有熱。血熱妄行者勿用。以其散氣走血也。

胡荽一名芫荽 辛溫微毒。服白朮牡丹皮者忌食。發明 胡荽辛溫香竄。內通心脾。外達四肢。能辟一切不正之氣。酒後煎湯漱洗。則絕無酒氣。痘瘡出不快者。搗潔衣被。發之如春夏發陽氣。越時用之。反助熱毒。恐變黑陷。不可不慎。華陀云。患狐臭人勿食口氣蟲。蟲人食之。加劇。服雲母鍾乳人勿食。為其辛溫。能解諸藥之力也。

懷香 辛平無毒。發明 草懷香入足太陽手足少陰。能開胃進食。專治膀胱疝氣及腎氣衝脣。如刀刺痛。喘息不便者。生搗熱酒絞服。以其辛香不竄。善降濁陰之氣也。下焦多火。強陽易舉者勿食。

斬水俗名水芹 甘微辛小毒。本經主女子赤沃下血。養精保血。脈益氣。令人肥健嗜食。發明 按斬有兩種。一種生平田者曰旱斬。青陽之氣而生氣味。辛竊能清理胃中濁濕。故本經主女子赤沃濁濕去。則胃氣清純而精血有賴。令人肥健嗜食。一種水陂澤者曰水斬。得濕淫之氣而生氣味。辛濁有蟲子在葉間。視之不見。食之令人為患。面青手青。腹滿如妊娠。不可忍。作蛟龍病。但服鞭錫二三升。吐出便差。大抵是蛇蠍之毒爾。其根白盈尺者曰馬斬。食之令人發瘡。以其濕熱之氣最盛也。和醋食之。損齒有齶。廢人不可食。

波穀 甘冷滑無毒。發明 凡蔬菜皆能疏利腸胃。而波穀冷滑尤甚。多食令人脚弱。發腰痛。動冷氣與餽氣。同食發霍亂。取汁煉霜制砒。采伏雌黃硫黃益。

薤菜 甘平無毒。發明 薤菜幹柔如蔓而中空。以之橫地節節生根。南方之奇蔬也。專解野葛毒。生搗服之。尤良。搗汁和酒服治產難。取汁滴野葛苗。當時萎死。其相畏如此。

同蒿 甘溫無毒。發明 同蒿氣濁。能助相火。禹錫言。多食動風氣。薰人心。令人氣滿。千金言。安心氣。養脾胃。消痰飲利腸胃者。是指素稟火衰而言。若腎氣本旺。不無助火之患。

折莧子 薔薇 辛微溫無毒 本經明日治目治目痛淚出除癆補五藏益精光 發明 折莧即薺之大而有毛者與薺之性不甚相遠其子專於明日千金治目暗去腎方用之亦治目中胬肉搗篩為末夜夜點之久久其膜自落甄權以養治青盲不見物補五藏不足二藥之性總不出本經主治也

覓子 甘冷利無毒 本經主青盲明日除邪利大小便去寒熱 發明 時珍曰 覓子去青盲白翳與青相同類異種故其治目之功彷彿聖惠以覓子治大小便不利無外乎本經主治也

馬齒覓 酸寒無毒恭曰平溫卽覓之赤色者 發明 馬齒覓功專散血消腫故能治血瘤及多年惡瘡搗敷不過兩三遍卽愈解馬汗射工毒塗之瘥燒灰和梳垢封疔腫先灸後封之其根卽出不可同齧食令成竈臼

翻白草根 甘微苦平無毒 發明 翻白草出救荒本草楚人謂之湖雞腿淮人謂之天鵝時珍曰湖雞腿生近澤田地高不盈尺一莖三葉尖長而厚有皺紋鋸齒面青背白四月開小黃花結子如胡荽子中有細子根狀如台朮兩頭尖剝去赤皮其內白色如雞肉食之有粉小說生食之荒年掘以和飯食兒科痘瘡拔疔方用之取其涼潤解毒也

蒲公英 一名奶奶草苗 甘平無毒 發明 蒲公英屬土開黃花味甘解食毒散滯氣然必鮮者搗汁和酒服治乳癰效速服罷欲喫是其功驗微汗而愈

落葵 一名藤葵亦名臘菜俗名翠蝶子 酸寒滑無毒 發明 落葵蔓生葉圓厚如杏葉子似五味子生青熟紫所在有之採取汁紅如臘脂女人飾面即作染布帛謂之胡胭脂亦曰染綠子但久卽色易變別錄言滑中散熱時珍云利大小腸子仁可作面脂和白蜜塗鮮華立見

蕺草 一名魚腥草 辛微溫小毒 發明 魚腥草方藥罕用近世僅以煎湯薰浴痔瘡及敷惡瘡白堊又治咽喉乳鵝搗取自然汁灌吐頑疾殊效別錄主蛇蠍尿瘡又云多食氣喘患脚氣人勿食千金言素有脚氣人食之一生不愈時珍云散熱毒癰腫脫肛斷痔解酒毒合上諸治總不出辟諸蟲毒瘡毒卽治痔瘡亦是濕熱生蟲之患專取蕺惡之氣以治穢惡之疾固氣利感之力也

蕨 甘寒滑無毒 發明 嚴性寒滑不可生食搜神記言有甲士折蕨食之覺心中泱泱成疾後吐一小蛇漸乾

成族孫真人云久食成瘕信與前說相符耳

黃獨即土 甘平寒小毒。不可溺灌灌之則苦。發明 土半解諸藥毒。生研水服當血出惡物便山煮熟食甘美不饑。厚人腸胃去熱。喫小兒熟食能稀痰解痘毒。瘡毒其藤燒灰敷痘癰成瘻可無瘢痕。

薯蕷即山藥。唐宋名薯。宋名薯蕷。名山藥。

甘平無毒。同飼食發動氣微培用。本經治傷中補虛羸。除寒熱邪氣。補中益氣力。

長肌肉強陰久服耳目聰明。輕身不饑延年。發明 山藥入手足太陰。色白歸肺味甘歸脾。大補黃庭。治氣不足而清虛熱。故本經治傷中寒熱邪氣。補而不滯。溫而不熱。又能益氣力。長肌肉。強陰固腎。止泄精小便。順數肺為腎

之上源。源既有滋流。豈無益。金匱八味丸用以強陰也。薯蕷丸以之為君。而主虛勞不足。風氣百病。甘溫平補。而不礙久積之邪也。其鮮者和生鯽魚腦搗敷腫。又搗爛和烏芻末。白糖霜塗乳癖結塊及諸癟。日火堅硬不潰。但塗上奇癧不可忍。忍之良久漸止。不過數次即愈。○子名零餘子。補虛損強腰脚益腎。一種曰甘藷。色較薯蕷稍紫。味較薯蕷稍甜。質較薯蕷稍膩。性較薯蕷稍溫。補脾強腎之功。較薯蕷稍勝。廣人以之代糧。今微益亦多種之。名曰薯音孺。與諸字形切音並相類。傳久之訛耳。

百合 甘平無毒。白花者補肺。赤花者名山丹。散發血藥用之。本經主邪氣腹脹心痛利大小便。補中益氣。

發明 百合能補土清金。止嗽利小便。仲景百合病兼地黃用之。取其能消瘀血也。本經主邪氣腹脹心痛。亦是散積畜之邪。今世所昧也。其曰利大小便者。性專降泄耳。其曰補中益氣者。邪熱去而脾胃安矣。然性專降泄。中氣虛寒。二便滑泄者忘之。○紅花者活血。治婦人崩中。其蕊敷疔腫惡瘡。按中吳紀聞云。百合乃蚯蚓所化。此洵有之。余親見包山土鱉中有變化不全者。大略野生百合。蚯蚓有之。其清熱解毒。散積消瘀乃蚯之本性耳。

茄一名落麻 甘寒小毒。發明 茄性寒利。多食腹痛下利。女人能傷子宮。發動痼疾。秋後多食損目。老變者燒灰。治

乳裂根治凍瘡破裂者。湯潰之良。其白茄根入風濕藥浸酒服。其白茄蒂瀝硫黃末擦白癬。紫茄蒂瀝硫黃末擦紫癩。取其散風毒瘀血也。升方治腦疽初起。用茄蒂燒灰存性酒服。未潰即消。又方用茄蒂中骨七枚。生何首烏一兩。煎服連進三服即愈。

苦瓠即細頭葫蘆 苦寒有毒。本經治大水面目四肢浮腫。下水令人吐。發明 瓢有甜苦二種。甜者雖言無毒。亦

不利人。扁鵲云患脚虛脹者不得食之。患水不差者尤傷胃氣不可輕試。凡苦寒藥皆能伐胃。不獨瓠也。本經治大水浮腫。又云下水令人吐。大傷中氣。今人治黃連水氣大小便不通。或浸大酒飯上蒸。或寶糖霜煅存性。必暴病實證麻可利之。若久病虛誤服必致吐利不止。往往致癱。可不慎歟。其子煎汁或酒浸治鼻塞氣塞。少少滴入。又目疾。努內血。腎藥中亦有用者。取苦寒以降火也。○長柄胡蘆燒灰存性。腋下磨瘤研末擦之以愈為度。

冬瓜子

冬瓜仁

甘寒。子甘平無毒。

本經令人悅澤好顏色。益氣不饑。輕身耐老。

發明。冬瓜利大小腸。壓丹石。

毒其子治腸癰。

去面黑。

潤肌膚及作面脂。即本經悅澤好顏色之用也。

○瓜練絞汁服治五淋。

壓丹石毒。

越瓜

即菜瓜俗名生瓜長可尺餘有青白二色青者尤勝

甘平小毒。發明。越瓜生於越中。今湖州等處最多。僅供蔬采。故名菜瓜。生食

動氣。令人心痛脣下癢。結腳弱不能行。天行病後不可食。惟解酒毒利小便宜之。燒灰敷口瘡及陰莖熱瘡。以其能解熱毒收濕氣也。

胡瓜

今名黃瓜張騫使西域得種改名胡瓜隋時避石勒名改呼黃瓜至今因之

甘寒小毒。發明。黃瓜甘寒。改能清熱利水。善解火毒。北人坐臥

炕席。故以此為珍品。南人以之供蔬甚不益人。多食動氣。發寒熱。發瘡疥。發脚氣。令人虛熱上逆。天行後不可食。小兒切忌。作瀉生瘡。其治咽喉腫痛。用老黃瓜去子。以芒硝填滿。陰乾爲末。每以少許吹之。枝瘡城腫。取黃瓜入磁瓶中。河水浸之。每以水掃瘡上。立效。火眼赤痛。老黃瓜挖去瓤。入芒硝令滿。陰處待硝出刮下。磁罐收貯。留點眼甚。殘湯大傷灼。五月五日。以黃瓜搗碎入瓶內。封掛簷下。取水刷之。皆取其甘寒以解毒也。

南瓜

種出南蕃改名

甘溫有毒。發明。至賤之品。食類之所不屑。時珍既云多食發脚氣。黃連不可同羊肉食。令人氣

壅。其性滯氣助濕可知。又言補中益氣耶。前後不相應如此。

絲瓜

甘寒無毒。發明。絲瓜嫩者寒滑。多食瀉人。蔬菜中最不足取。其老者經絡貫串。房隔聯屬。故能通人經脈支絡。而解熱消腫。祛毒殺蟲。及治諸血病。故痘瘡不快。用老絲瓜近蒂三寸。連皮燒灰存性爲末。砂糖水服。甚效。

以其甘寒解毒。而無滑瀉之虞也。其立冬後小絲瓜煅入硃砂。服之能稀痰。其絲瓜藤取近根三五寸。燒灰存性。爲未治鼻渊時流臭濁水。酒調日服方寸匙效。其葉搗汁生服。解一切蛇傷之毒。即以滓盦傷處。卽易之。

苦瓜

一名錦苦瓜一名苦寒無毒

發明。錦荔枝有長短二種。生青熟赤。生則性寒。熟則性溫。閩粵人以長者去子。但取

青皮煮肉充疏爲除熱解煩清心明目之品。短者性溫。其子苦甘內藏真火故能壯陽益氣。然須熟亦方有殊功。紫菴甘鹹寒無毒。發明。凡癰結積塊之疾。宜常食之。鹹能堅之義。多食令人腹痛。發冷氣吐白沫。飲熱醋少許即消。

石花菜 甘鹹寒滑無毒。發明。石花煮肉。夏月必凍下部虛寒及脾氣不充者勿食。

木耳 甘平小毒。發明。木耳稟濕土之氣而生於朽株故有衰精冷腎之患。然治療瘡痏腫崩中漏下大驗俱炒見烟爲末酒服方寸匙效。

桑耳桑上寄生 甘平有毒。有桑蠶桑雞桑黃桑巨等名。本經黑者主女子漏下。赤者治血病。癥瘕積聚陰痛陰瘻。寒熱無子。發明。桑耳涼潤善祛子藏中風熱。不但主漏下血病併可以治寒熱積賁積聚去不難成孕。本經專取黑者達腎。赤者走肝補中寓漏瀉中寓補之機。具見言外矣。其黃熟陳白者止久洩益氣金色者治癬飲積聚及腸風漏血。五痔下血。血痔虛勞。咽喉脾痛。一切血證咸宜用之。○槐耳治五痔脫肛。○柳耳治反胃吐痰。○柘耳治肺癰欬吐濃血。不問已成未成皆可用之。

香蕈 甘平無毒。發明。諸蕈稟土之熱毒。浮長所以有毒傷人。惟香蕈柄木上糯米種出大益胃氣與磨菰雞塽性味不殊。磨菰亦埋桑楮諸木於土中澆以米泔而生。其長大色白柔軟中空如雞腿者名雞腿磨菰狀如羊肚。有蜂窠眼者名羊肚菜。其出雲南生沙地間高脚纖頭者曰雞塽菜皆能益胃清神。磨菰兼能化痰。雞塽兼能治痔。一得辛耆餘墨一鍾山川靈氣故其性各有不同耳。

土蕈蕈通作菌 甘寒有毒。發明。處處山中有之。以其得嵐嶂鬱蒸之氣而生。助長濕熱最甚。過食令人腹痛頭脹。或發痰氣嘔逆。其在初春蟄蟲未起之時。爲毒尚淺。夏秋濕熱盛行之時。毒邪尤甚。以其多有蛇蠍之毒也。即生朽株上者除槐榆松柳杉桑及蘿蔭根者食之無虛然日久蟲生味苦。亦不宜食他如兒茶苦竹芳根生者不無小毒。食之多發瘡疥而生於楓樹上者食之毒攻心已令人笑不止。急以苦茗地漿或生白礬研新汲水解之。諸因之可食者首推雷鷺菌次則塘菌松花菌味極鮮美若味苦或辣皆爲有毒切不可食至如光白如銀中夜有光上有毛下無根底無根頭仰卷色赤欲爛無蟲洗之水黑煮之不熟者並有大毒傷人中其毒者非地漿清裏不能救之。昔

聞有人得一大函。光潤可愛。置之瓶中。蠅蚋撲上即死。究其听得之處。乃在古塚穴中。洵為妙物。之毒無疑。今人煮菌。每以銀飾併燈心草置鍋中。但驗其銀色黑者。即為有毒。近見食蕈而死者。與河豚無異。持表而出之。

果部

李根白皮 苦微鹹寒無毒。又黃用。發明 藥性論云。入藥用苦李根皮。而仲景治奔豚氣。貢脈丸用甘李根白皮。時珍疑為二種。不知仲景言甘。是言李之甘。藥性言苦。是言根之苦。但宜用紫李根。則入厥陰血分。若黃李根。則入陽明氣分矣。別錄治消渴奔豚。大明治赤白痢下。千金燒存性敷小兒丹毒。甄權治消渴脚氣。益說治婦人赤白帶下。皆取苦鹹降逆丸也。李核仁。苦平入肝。療僵仆瘓血骨痛。又能清血海中風氣。令人有子。故承澤丸用之。其性散結。故能解硫黃白石英附子毒。為木和雜子白敷面黓。一宿即落。千金方也。黃帝云。李子不可和白蜜食。蝕人五內。

杏仁 苦平甘溫小毒。湯泡去皮尖研如泥。用兩仁者有毒傷人。凡果核六出者必雙仁。得純陰之氣也。本經主欬逆上氣。雷鳴。喉痹下氣。症乳。金瘡。寒心。貢脈。發明 杏仁入手太陰經。半能橫行而散。苦能直行而降。遂為散邪降氣定喘泄滯散結潤燥除肺中風熱欬嗽總不出本經主治也。千金以童便浸七日研如泥。治欬嗽寒熱。仲景麻黃湯用杏仁者。為其利氣瀉肺解肌也。至於陷胸麻仁等圓。皆熟黑研臘加油。則知此物之性愈熬黑愈潤下矣。入肺寒喘逆發散集連皮用之。又能治瘡殺蟲。用其毒也。本經治金瘡寒心者。傷處風氣入胞絡而心下惡寒。用以塗封瘡口。拔散風熱之邪也。言治貴脈者。半能散結潤能下氣也。元素言潤大腸氣祕。之才言解錫毒。別錄言殺狗毒。炒香消狗肉及零粉積。故六神鈞用之。扁鵲云。杏仁不宜久服。令人面目鬚髮落。耗氣之驗也。今人以之混治陰虛喘噦轉耗肺中大氣。為患不淺。亡血家尤為切禁。以其味辛性溫。大能破血也。雙仁者搗爛以車脂調塗。鍼斷入肉。及背鏘在咽隔諸隱處敷之。即出。巴旦杏仁。則甘平無毒。能止欬下氣。消心腹逆悶。杏實味酸。傷人筋骨生者尤甚。

梅榔梅 酸平無毒。本經主下氣除熱煩滿。安心止肢體痛。偏枯不仁死肌。去青黑惡蝕惡肉。發明 梅花開於冬而實熟於夏。得木之全氣。故其味最酸。人古下有四竅。兩竅通膽液。故食則津生。類相感應也。所主之病。皆取

酸收之義梅之種類最多。惟棚梅最勝。相傳是真武折梅枝插棚樹株而誓曰。吾道若成花開果實。其種從均州太和山水棚即榆樹中之一種。其梅如杏而鬆脆異常。故近世謂之消梅。食之開胃生津清神安睡。乃棚之本性也。本經下氣除熱煩滿安心止肢體角皆指陳藏者而言。若青梅則凝滯氣決非偏枯不仁者所宜。凡殺食采果皆爾。不獨青梅為然。烏梅酸收益津開胃同建茶乾薑治休息痢能飲肺濡腸止嘔欬汗定喘安蛇仲景治蛇厥烏梅丸用之。蟲得酸即止。用丸不用湯者欲留有形之物入於蟲口也。今治血痢必用之中風驚瘧喉痹腫痛厥僵仆牙關緊閉者取烏梅擦牙齦即開血痢不止。以烏梅燒存性末湯服之漸止惡瘡瘍內亦燒灰研敷。惡肉自消。此即本經去死肌惡肉之驗。又丹方治女人脚上雞眼。烏梅肉飯上蒸爛和米醋研如糊塗上一夕即去。白梅鹹酸主中風牙關緊閉擦牙根涎出即開去瘧肉方多用之。竹木鍼利在肉中者。嚼敷即出。○梅核仁明日益氣除煩熱能清婦人子藏中風積滯千金承澤丸用之。梅葉煮汁治休息痢及乾霍亂效。以之漬水洗葛則不脆洗夏衣生微點即去有驗。

桃仁 苦甘平無毒。去皮尖生用即和血。連皮尖炒用即破血。同乾漆拌炒大破宿血雙仁者有毒勿用。本經主瘀血血閉癥瘕邪氣殺三蟲。發明 桃仁入手足厥陰血分。爲血瘀血閉之專藥。苦以泄滯血。甘以生新血。必竟破血之功居多。觀本經主治可知。仲景桃核承氣抵當湯皆取破血之用。又治熱入血室。瘀積癥瘕經閉瘻疽心腹痛。大腸祕結亦取散肝經之血結。熟香治癰疽痛癰千金法也。○桃實甘酸多食令人腹熱作瀉。○桃奴殺百鬼精物療中惡腹痛瘀血癥堅破血酒磨服止血燒灰服。○桃樹上膠最通津液能治血淋石淋痘瘡黑陷心胸膏用之。○桃葉治傳屍有水火法。方用桃葉一斗。艾葉厚朴各二兩。分二囊盛置以大酒數斤煮沸更迭煎藥。熨患人背脊酒盡爲度。不過三次。疼痛永絕又瘡中小蟲掘爛塗之。

粟 煎溫無毒。發明 粟腎之果也。腎病宜風乾者食之。若脾腎虛寒暴注須煨熟食之。粟楔一粒三顆中扁者。療筋骨風痛又能破冷症癖生嚼署忌利出前頭粟搗肉上薄皮也。燒存性治骨鯁在喉吹入即下。粟殼煮汁治反胃消渴。毛球外刺已也。煮汁洗大丹毒腫粟治瘰疬粟樹皮煮汁洗沙蟲濕毒并丹毒瘡毒根治偏墜腎氣酒煎服之。

大棗 甘平無毒入藥取大紅棗擘去核用多食令齒生蟲。本經主心腹邪氣安中養脾氣平胃氣通九竅助十二經補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥。發明 棗屬土而有火爲脾經血分藥甘先入脾故用薑棗心下痞者減飴棗與甘草同例此得用棗之法矣。金匱治婦人藏燥悲愁欲哭有甘麥大棗湯亦取其助肝脾肺三經之津液以滋其燥耳。本經主心腹邪氣亦是和榮衛邪之義平胃氣者以其甘溫健運善平胃中乾旱之氣也。素問以棗爲脾家之果故本經又主身中不足大驚四肢重用此補益脾津而神氣自寧肢體自捷矣。古方中用大棗皆是紅棗取生能散表也。人補脾藥宜用南棗取甘能益津也。其黑棗助濕中大損齒生蟲入藥非宜生棗多食令人熱渴氣脹瘦人多火者彌不可食。

梨 甘微酸寒無毒。發明 別錄著梨止言其害不錄其功蓋古人論病多主傷寒客邪若消成降火除客熱止心煩梨之有益蓋亦不少近有一人患消中善饑諸治罔效因煩渴不已恣噉梨不懶不藥而瘳一婦鬱抑成癰欬嗽吐血右側不得貼席者半年或令以梨汁頓熱服盞許即時吐稠痰結塊半盞是夜便能向右而臥明日復飲半盞吐痰如前已後飲食漸增雖尋常食品單刀直入可以立破沉疴而梨之種類最多惟孔稚鵠梨消梨可以療病然須審大便實者方可與食元氣虛者不慎而誤服之往往成寒中之患豈可概謂食之有益乎。

木瓜 酸溫無毒。發明 木瓜酸收下降所主霍亂轉筋吐利脚氣皆取收攝脾胃之濕熱非肝病也轉筋雖屬風水行脾胃由濕熱或寒濕之邪襲傷脾胃所致用此理脾而伐肝也多食木瓜損齒及骨皆伐肝之明驗患頭風人以鮮者放枕邊引散肝風日久漸安凡腰膝無力由於精血虛陰不足者及脾胃有積滯者皆不利於酸收也山楂卽棠棣子俗作山楂 甘苦微酸溫無毒去核則不發熱童便浸薑汁拌炒黑去積血甚捷。發明 山楂入足陽明太陰厥陰三經血分大能融化飲食本經言其酸冷然其功長於消肉積行滯血性溫可知若胃中無食積脾胃不能運化不思飲食者服之反冠伐脾胃生發之氣良非所宜炒黑治產後兒枕作痛亦以其能消血也今刷瘀初起多積垢者用薑汁炒治偏墮疝氣爲散酒服不過半月效用核光復若外感風寒兼傷飲食舉世以發表消導並進中氣實者幸而獲痊癒者表邪未虛陷入於府而生內癰者多矣○東魯案珠子酒後嚼數顆良與塘作膏尤爲精品

秦俗名
秦醫名
甘溫無毒。發明。秦生北地與南方林檎同類異種雖有和脾之能。多食令人肺壅脣脹。病人尤當忌食。

林檎俗名
溫溫無毒。發明。林檎雖不傷脾。多食令人發熱。以其味溫性溫也。病人每好食此。多致復發。或生痰涎而為歎逆。壅閉氣道。使然其核食之煩心助火可知。

柿蒂
溫平無毒。柿蒂同食則吐利腹痛。木香可解。發明。柿之生青熟赤。生溫熟甘。渾是陰內陽外之象。獨蒂之溫。始終不改。故取以治陰內陽外之病。濟生方治呃逆。專取柿蒂之溫。以斂內蘊之熱。丁香生薑之辛。以散外鬱之寒。深得寒熱兼濟之妙用。嘗考古方中有單用柿蒂以降逆氣者。是以丹溪但執以寒治熱之理。而不及從治之法。矯枉過矣。至三因方。又於濟生方中加良薑之類。是真為寒而反助其熱乎。○其乾柿白霜。專清肺胃之熱。在元氣未滿。可勝寒潤者。用之固宜。但虛勞煩噦喘乏。得此鬱閉虛陽。病根日固。與埋薪灰燼何異。

安石榴
子甘酸皮溫無毒。發明。榴味甘酸。具木火之象。故多食傷肺損齒。而生痰涎。其皮溫能治下痢滑脫。一種小者曰酸石榴。治痢尤捷。千金治痢方皆用之。酸兼收斂。故能止下痢漏精。崩中下血。丹方以酸石榴連皮子搗汁。入薑茶煎治寒熱利。又久痢用榴皮燒灰。人參湯下一錢。屢驗。○榴花曝乾研細吹鼻。止衄最速。千瓣者更良。功在山茱萸之上。

橘皮
苦辛溫無毒。產粵東新會。陳久者良。陰虛乾咳。蜜水製用。婦人乳房癰癧。醋拌炒用。本經主胸中痰熱逆氣。利水穀。久服去口臭。下氣通神。發明。橘稟東南陽氣而生。故以臘與者最勝。其輸淮而北則變爲枳。此地氣使然。與人之鄉音習俗無異。橘之文米換發於外。故其功用都在於處。專行脾肺二經氣分。本經主治胸中痰熱逆氣。為消痰運脾之要藥。留白則補脾胃。去白則理肺氣。同人參白朮則補脾胃。同人參甘草則補肺。獨用則瀉肺損脾。其治百病。總是取其理氣燥濕之功。同補藥則補。同瀉藥則瀉。同升藥則升。同降藥則降。脾乃元氣之母。肺乃攝氣之籥。故為二經氣分藥。但隨所配而補瀉升降也。同生薑則止嘔。同半夏則豁痰。同杏仁治大腸氣祕。同桃仁治大腸血祕。皆取其通滯也。○橘紅專主肺寒痰嗽。多痰虛損方多用之。然久吸氣泄。又非所宜。按橘皮下氣消痰。其釀生痰聚飲一物而性之殊異如此。

青橘皮 辛溫無毒。醋炒用。剗去酸水作四界者。曰蓮花青皮。細如豆者爲青皮子。中有小橙。莫能辨別。發明。青橘皮古方所無。至宋時醫家乃用之。入足太陰厥陰。破滯氣。削堅積。及小腹疝疼。用之以疏通二經。行其氣也。小兒消積多用之。青皮最能發汗。多汗者勿用。久瘧熱甚。必結癥塊。宜多服清脾飲。內有青皮疎利肝邪。則癥自不結也。中氣虛人禁用。以其伐肝太甚。而傷生發之氣也。

橘核 苦溫無毒。去殼焙香。研碎用。細者爲橘核粗即橙核。發明。橘核沉降。入足厥陰與青皮同功。故治腰痛。瘡疽在下之病。不獨取象於核也。然惟實證爲宜。虛者禁用。以其味苦。大傷胃中沖和之氣也。

橘葉 苦平無毒。發明。橘葉苦平。導胸膈逆氣。消乳癰。搗爛和麵。熨傷寒胸膈痞滿。又治肺癆。故汁一盞服吐出。膿血愈。

柏辛苦微寒無毒。發明。柏皮產廣東化州者最勝。與橘皮雖同爲下氣之品。然性之溫寒各異。故開寶取利。腸中熱毒。解丹石。止暴渴。利小便。皆取辛寒以散熱滯也。世罕知用。惟千金方中用之。云甘皮者即此。

橙酸寒無毒。發明。橙性酸寒。方藥少用。其鮮者惟殺魚蟹毒。和鹽貯食。止恶心。解酒病。疝寒熱。禁食。以其酸寒能滯邪氣也。其核治門柱腰痛。炒研酒服三錢即愈。

柚酸寒皮甘辛無毒。發明。柚能解酒辟。飲酒人口氣皮能下氣化痰。與金橘性相類。但金橘甘酸下氣尤捷。相櫟字樣舊作枸櫞。辛形相似之誤。辛苦甘溫無毒。發明。相櫟乃佛手香櫟兩種。性味相類。故綱目混論不分。蓋相者佛手心專破滯氣。今人治痢下後。重取陳年者用之。但痢久氣虛。非其所宜。櫟者香櫟也。兼破痰水。近世治欬嗽。氣壅亦取陳者。除去穰核用之。庶無酸收之患。丹方治鼓脹諸藥不效。用陳香櫟一枚連穰。大核桃肉二枚。連皮縮砂仁二錢。去膜。各煅存性。爲散砂糖拌調空腹頓服。服後水從臍出。屢驗。

金橘一名金柑 酸甘溫無毒。發明。金橘形如彈丸。金柑形如牛奶。一皆酸甘香竈。並能下氣快膈。止渴解醒。而圓者尤佳。

枇杷葉 辛苦平無毒。刷去毛。蜜炙用。發明。枇杷味甘色黃。爲脾家果。然必極熟。乃有止渴下氣潤五臟之功。若帶生味酸。力能助肝伐脾。食之令人中滿泄瀉。○其葉氣味俱薄。故入肺胃二經。治夏月傷暑氣逆最良。近世治

勞嘯無不用之。蓋取其和胃下氣，下則大降痰，消胃和則嘔定，噦止，然胃寒嘔吐及風寒發嗽忌之。○其核大寒而伐肝脾，以之同落蘇入麸醬，則色青，同蟹入鍋煮，則至熟不赤，性寒走肝可知。

楊梅 甘酸溫無毒。發明 楊梅為心家血分之果，兼入肝脾，心色能止渴除煩，燒灰則斷瘻，敷城則止嘔，嘔消酒，但血熱火旺人不宜多食。恐動經絡之血而致衄也。其性雖熱，而能從治熱鬱解毒，其根皮煎湯能解砒毒，燒灰油調塗湯火傷核，仁療脚氣，然須多食，以柿漆拌核，爆即自裂也。

櫻桃一名含桃 甘熱小毒。發明 櫻桃屬火而發濕熱，舊有熱病及喘嗽者得之立發，一種小者名山櫻桃，性味甘平而不發熱，能止腸澼滑精，宜以形之不材而反食之無害耶？其核今人用以升發麻斑力能助火，大非所宜，在春夏尤為切忌。

銀杏俗名白果 甘苦平溫無毒。發明 銀杏定喘方用之，生嚼止白濁降痰，消毒殺蟲，塗鼻面手足去皰皰，點生搗能浣油膿，同水搗漿，取殺蟲蟲去疾滌垢之功，可例推矣。熟則壅遏閉氣，多食令人腹脹昏悶，昔有饑者薄暮食此過多，次日脹悶欲死，急以鵝翎蘸香油探吐，方可得生。奠清灌之亦生。取其能降泄也。

胡桃一名核桃 甘平溫無毒。入藥連皮用。發明 补骨骼屬火，能使心色與命門之火相通，胡桃屬水，潤燥養血，佐補骨骼，有水火相生之妙。胡桃肉類三焦，而外皮水汁皆青黑，故能通命門助相火，同補骨骼，杜仲青鹽名青蛾丸，治腎虛腰痛，以其能補腎也。同人參名應夢散，治肺寒喘嗽，以其能斂肺也。同生薑咀嚼亦治寒痰喘嗽，若多食動風脫人眉毛，詳其同錢細嗑，即與銅俱化，與甘蔗同嚼，則液查消融，其消肺燉肝可知。丹方用其燉燒令黑，和松脂傅瘡瘍有效。又以連皮胡桃肉同貝母全蠍枚數相等蜜丸，治風癰瘍，極總取以通經絡也。但肺有痰熱，命門火熾者勿食。其殼燒灰存性，治乳癰，取灰末二錢酒調服之，未腫即消，已潰即斂，但不可以其烟薰衣，衣即易毀，胡桃皮塗髡髮皆黑。

長生果一名落花生 甘溫無毒。發明 長生果產閩地，花落土中即生，從古無此，近始有之。味甘氣香，能健脾胃，飲食難消運者宜之。或云與黃瓜相反，予嘗二者並食，未蒙其害，因未表出之。

貢貢葡萄 甘微鹹溫無毒。發明 貢貢葡萄似葡萄而貢細，故有貢貢之名。生於漠北，南方間亦有之。其核類

木而係藤本。其子生青熟赤。乾則紫黑。能攝精氣歸宿腎臟與五味子功用不甚相遠。凡藤蔓之類皆屬於筋草木之實。皆達於藏。不獨此味為然。此物向供食品。不入湯藥。故本草不載。近時北人以之強腎。南人以之稀痘。各有攸宜。強腎方用貴貴葡萄。人參各一錢。火酒浸一宿。侵晨塗手心。摩擦腰脊。能助腎力強壯。若臥時摩擦腰脊。能助陽事。堅強服之尤為得力。補虛方用貴貴葡萄一歲一錢。神黃豆一歲一粒。杵為細末。一陽夜蜜水調服。併擦心窩腰眼能助腎。法邪以北地方物。專助東南生氣之不足也。然惟稟質素弱者用之有益。若氣壯偏陽者勿用。恐其助長淫火之毒也。

橡實 苦溫無毒。發明 橡實消殺止痢。厚腸胃。令人強健。且能治療漏脫肛。千金方治石癰堅硬如石。不作膿。用橡子一枚。蘸醋於石上磨汁塗之。乾則易過十度。即平。共殺為散。及煮汁服。止下痢併染鬚髮。

槲皮龍皮 一名赤 苦溫無毒。發明 槲皮煎服除蟲。及漏惡瘡。甚效。能治赤白痢。腸風下血。肘後方治下部敗爛瘡。

赤龍皮散以之為君。千金方治附骨疽。瘻瘍。及蟲毒多用之。皆取苦澀化毒也。

荔枝 肉甘溫核滿無毒。治疝取建康潤肩之核良。發明 荔枝實氣味純陽。能散無形之滯氣。留督赤腫宜之。多食發熱。渴口乾齶。血而核入厥陰經行散滯氣。其實雙結而核似墨丸。故治癰疝囊腫。有通類象形之義。時珍治癰疝氣刺痛。婦人血氣刺痛。小而肉似龍眼。其核尖小。僅堪噙磨。療癰治疝無效。

龍眼俗名眼 甘平無毒。桂產者佳。粵東者性熱。不堪入藥。發明 龍眼補血益肝。同枸杞熟膏。專補心脾之血。歸脾湯用之。治思慮傷心脾。皆取甘味歸脾。能益人智之義。然中滿家嘔家勿食。為其氣壅也。師尼寡婦勿用。以其能助心包之人。與三焦之火相煽也。

橄欖青果 溫甘溫無毒。發明 橄欖先瀝後甘。生津止渴。開胃消痰。醉飽後及寒痰結喉。宜之。熱嗽不可誤食。病人多食令氣上壅。以其性溫而濁。聚火氣於胃也。又能消酒。解鯈鮑河豚諸魚蠶毒。觀朱魚食橄欖。查郎斃能解魚毒。可知。故嚼汁漱之。能治魚骨哽。有效。患痘瘡者。宜多食。以其解毒而助胃中溫和之氣。令痘起發也。又核燒灰蜜丸。同黃獨服。能稀痘。但性專。搜滌胎毒。過服令人嘔瀉。嬰兒初生。胡桃肉連皮三枚。橄欖核燒灰一核。硃砂雄黃各一分。研細和甘草汁生白蜜。絞去滓。開乳前頓熱服之。可代化毒丹。但化毒丹治胎熱面赤。此治胎寒面白。不可

混也。又灰末敷金瘡與癰生核磨水搽癰漸滅。

榧子 甘溫溫有毒。本經主腹中邪氣去三蟲蛇蠍鹽毒。鬼疰伏尸。發明 椎實肺家果也。性溫散氣。故能去腹中邪氣。三蟲諸疾。大炒食之。引火入肺。多食則大腸受傷。小兒黃瘦有蟲積者。宜食。與使君子同功。觀本經主治可知。

松子 甘溫無毒。發明 海松子甘潤益肺。清心止嗽潤腸。兼柏仁麻仁之功。溫中益陰之效。心肺燥煩乾渴之良藥也。

檳榔 苦辛溫無毒。發明 檳榔泄胸中至高之氣。使之下行。性如鐵石之沉重。能墜諸藥。至於下極。改治衝脈爲病。逆氣裏急。及治諸氣壅。腹脹後重。如神。胸腹蟲食。積滯作痛。同木香爲必用之藥。其功專於下氣消脹。逐水除痰。殺蟲治痢。攻食破積。止癰癧疝。脚氣癰癧。若氣虛下陷人。及隔上有癰疾。婦氣者得之。其痞滿自塞愈甚。又凡渴後。瘧後。虛剝切不可用也。閩廣聲毒之鄉人。常食此。必以蒟葉裹嚼。之所云飽能使之饑。醉能使之醒者。以其能下氣也。云饑能使之飽。醒能使之醉者。以蒟葉辛溫能開發中外之氣。以散瘧屬之邪也。

大腹子榔榔 辛溫溫無毒。此味與檳榔皆性堅難切。須用滾水泡清切之。若以水浸濁。不但失其性味。反有傷於胃氣也。發明 大腹子偏入氣分。體豐濕盛者宜之。夫檳榔偏主血分。枳溝多火者宜之。時珍謂大腹與檳榔同功。似未體此。

大腹皮 辛溫溫有毒。鳥多集其樹上。宜酒洗後。再以菉豆湯洗過。用其內粗者耗氣。宜摘去之。發明 檳榔性沉重。泄有形之積滯。腹皮性輕浮。散無形之滯氣。故瘧滿。腳氣壅逆者宜之。惟虛脹禁用。以其能泄真氣也。

馬檳榔 苦甘寒無毒。發明 馬檳榔生滇南夷地。不入湯藥。熱病食數枚。冷水下之。腫毒惡瘡。嚼一枚。并塗腫處。產難臨時細嚼數枚。井花水送下。須臾立產。再以四枚去殼。兩手各握一枚。惡水自下。欲斷產。常嚼一枚。久則子宮冷。自不孕矣。

無花果 實甘平。葉微辛無毒。發明 無花果出雲南。揚州亦多有之。今吳楚閩越人家折枝插成枝柯。如枇杷

樹三月發葉。五月不花而實，實出枝間，狀如木饅頭，熟則紫色軟爛，其味如柿而無核也。食之開胃止渴，治咽喉痛。

葉主五痔，腫瘡煎湯頻薰之。

枳椇一名雞距子

俗名蜜麻律

甘平無毒

發明 枳椇金鉤樹之子也。本草止言不能敗酒。屋外有此木，屋內釀酒皆不住。

丹溪治酒病，往往用其實。又能止渴除煩，去膈上熱潤五臟，利大小便。多服發蛇蟲。以其大甘，助濕熱之所化也。

水果部

西瓜 甘寒無毒。發明 西瓜瓤色赤，味甘，能引心包之熱。從小腸膀胱下泄，以其得西方金氣於三伏中，故能解太陽陽明中暯。及熱病大渴，故有天生白虎湯之稱。而春夏伏氣發溫熱病，覓得隔年藏者，噉之如湯沃雪，燥是世醫常以治冬時傷寒壅病煩渴，從未見其得愈者。良由不達天時，不明營發之故耳。近有舶上來者，五月便熟，不必覓隔年藏者，方宜時世之不同若此。

瓜子仁 甘淡微溫無毒。發明 西瓜甘寒降泄，子仁甘溫性升，以中藏烈日之氣不無助火之責。其開豁痰涎，是其本性。世人咸謂瓜子生痰，安有甫入口而便變痰涎之理？按相感志云：食西瓜後食其子，即不噉瓜氣，其溫散之力可知。細目言其主治與甜瓜仁同。豈甜瓜仁亦爲生痰之物耶？

甜瓜蒂俗名苦丁香

苦寒有毒，熬黃用。本經主大水身面浮腫，下水殺蟲，逐逆上氣，及食諸果病，在胸腹中，皆吐

下之。發明 酸苦涌泄爲陰，仲景瓜蒂散用瓜蒂之苦寒，合赤小豆之酸甘，以吐胸中寒邪。

金匱瓜蒂湯治中暯無汗。今人罕能用之。又搐鼻取頭中寒濕黃瘻，得麝香細辛治鼻，不聞香臭，瓜蒂乃陽明除濕熱之藥，能引去胸膈痰涎，故治面目浮腫，逆上氣，皮膚水氣，黃瘻濕熱諸證。卽本經主治也。凡尺脈虛，胃氣弱，病後產後，吐樂皆宜戒慎。何獨瓜蒂爲然哉？改膈上熱，痰厥邪熱者，切禁。

甜瓜子即甜瓜蒂

甘寒無毒。發明 甜瓜仁專於開痰利氣，別錄治腹內結聚，破滯胞血，爲腸胃內癆要藥。十全治

肺癆，有葦莖湯，腸癆有牡丹大黃湯。予嘗用之，然必黃熟，味甜者，方不傷胃氣。若生青味苦者，力劣不堪入藥。其勦

亦能去暑熱，脾胃虛人食之，毋致漏泄，不可不知。

蒲桃俗名

甘寒無毒。本經治筋骨濕痹，益氣力，強志，令人肥健，耐饑，忍風寒，可作酒。發明 葡萄之性寒滑

食多令人泄瀉。丹溪言東南人食之多病熱。西北人食之無恙。蓋能下走滯道。西北人稟氣厚。故有本經所主之功。無足異也。

甘麻 甘平無毒。發明 麻脚之果也。其漿甘寒。能瀉火熱。煎煉成糖則甘溫而助濕也。煎漿消渴解酒。自古稱之。而益說乃爲其酒食發疾者。豈不知其有解酒除熱之功耶。日華子又爲砂糖。能解酒毒。則不知既經煎煉。便能助酒爲熱。與麻之性異矣。即如甘草遇火則熱。麻油遇火則冷。此物性之異。醫者當知。近世用以搗汁治痢服之。有效。以其甘寒養胃而清濕熱也。

沙糖色黑如漆。有是。甘溫無毒。發明 沙糖性溫。能和脾緩肝。故治脾胃及瀉肝藥用爲先導。今人好吸烟。草受其毒者。用此點湯解之。但性助濕熱。不可多食。熬焦治產婦敗血衝心及虛羸尤弱。病不可攻者最效。

石蜜 即冰糖也。霜白如霜者曰糖。與山蜂蜜結石上者不同。甘平無毒。發明 凝結成塊。如石者爲石蜜。輕白如霜者爲糖霜。比紫沙糖稍平。功用雖同。但白入氣分。紫入血分。爲異。白糖霜亦能解烟草之毒。惟色黃者性熱。有濕熱者遠之。世言糖性濕熱。多食令人齒蟲生。近見患口瘡者。細嚼冰糖飄愈。取其渣末以磨濕熱凝滯也。又暴得咳嗽吐血。乍止以冰糖與燕窩茶同煮連服。取其平補肺胃而無止截之患也。惟胃中有痰濕者。令人欲嘔。以其甜膩戀膈故也。

蓮藕

甘平澀無毒。發明 蓮出淤泥而無濁氣沾染。其根通達諸竅。聯絡尤爲交媾。黃宮通調津液之上

品。入心脾血分。冷而不泄。澀而不滯。產後血闊。及血淋尿血。宜之。新產生冷。皆忌獨生。藕不禁爲其能止熱渴破留

血也。生食止霍亂虛渴。蒸食開胃。實下焦。擣浸澄粉服。食治虛損失血。吐利下血。又血崩口噤。不能食。願服則結真

自下。胃氣自開。便能進食。但市者皆豆麥麴粉。僞充不可混用。藕節之味大澗。能止驟脫諸血。產後血闊。隔水煑

熱。和童子小便飲之一。人患血淋脹痛。百藥不應。以生藕汁調髮灰服之。三日血止。痛除。以其性專散血而無傷耗。

真元之患也。

蓮實 甘平澀無毒。去心中苦澀。則不傷胃。發明 蓮子得水土之精英。補中養神。益氣清心。固精止瀉。除崩帶

赤白濁。能使心腎交而成既濟之妙。昔人治心腎不交。勞傷白濁。清心蓮子飲。補心腎。益精血。有瑞蓮丸。皆取其補

益黃庭寶堤禦水之義。

石蓮子

甘寒無毒。發明。

石蓮子本蓮實也。於蓮房墮入淤泥經久堅黑如石故以得名爲執事際口利之專藥。取水土之餘氣補助脾陰而滌除熱毒。然必兼人參之大力。開提胃氣方始克應。若痢久胃氣虛寒口噤不食則爲戈戟也。况乎世鮮真者。今樂肆中乃以一種水腎偽充其子出自粵東大苦大寒大傷胃氣醫者不察誤投傷殘之藥。往往輕者爲重。重者致斃。至於腎虛精滑之人。誤認髓藏有熱而峻用苦寒。鍛伐虛陽精愈不能收攝得無虛虛之患乎。

蓮蕊鬚

甘溫溫無毒忌地黃勿共

發明。蓮鬚清心通腎以其味溫故爲祕旨精氣之要藥。三因固真丸巨勝

子丸用之。然惟慾勤精薄者爲宜。亢陽不製者勿用。恐其兜濁爲患也。

蓮花性味與鬚相類惟取白花將開者陰乾入藥久服延年不饑故經進草仙丸用之。

蓮房 苦溫無毒 發明 蓮房入厥陰功專止血故血崩下血漏血皆燒灰用之雖能止截不似櫻灰之兜塞也

荷葉 苦溫平無毒 發明 荷葉得清震之氣故潔古枳朮丸方用荷葉燒飯爲丸東垣治雷頭風證頭面腫痛

疔瘡憎寒發熱狀如傷寒證在三陽不可過用。寒藥消脹湯治之用荷葉升麻蒼朮煎服又痘瘡爲風寒外襲而變黑倒醫。聞人現用荷葉合靈靈脂解結滯之氣而痘自起又燒灰單服可消陽水浮腫入健脾藥但用其蒂謂之荷鼻。取其味厚勝於他處也。戴元禮云服荷葉令人瘦劣非可常服觀丹士編銀法用荷葉同鍛則銀質頓輕其性之消

燬無有甚於此者。

艾實俗名雞頭實俗名角 甘平無毒六經主濕疥腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志。發明 艾生水中而能益脾利濕觀本經所主皆脚腎之病遺精濁帶小便不禁者宜之。

艾實俗名黑三棱又 甘平無毒 發明 艾實多種滯氣則一紅渴白補生降熟升僅供食品略無取於治療患瘧病人勿

食過食令人腹滿腹脹古法用麝香點湯解之近人以沉香磨汁導之總取芳香散滯之力耳。

烏芋俗名黑三棱又 甘寒無毒 發明 烏芋善毀銅爲消堅削積之物服丹石人宜之痘瘡就紫不能起發同地

龍搘爛入白酒釀成服即起又治酒客肺胃熱熱聲音不清及腹中熱積鹽毒丹方治病積三伏時以火酒浸曬每

日空腹細嚼七枚瘡積漸消故有黑三棱之名。凡有冷氣人勿食多食令人患脚氣虛勞咳嗽切禁以其峻削肺氣

兼耗營血。故孕婦血渴忌之。

慈姑 苦甘微寒無毒。發明 主治百毒產後血悶攻心欲死產難胞衣不出。並生搗汁服之有脚氣癲緩風人勿食以熟食壅氣也。葉治小兒遊風丹毒搗爛塗之即消。

味部

蜀椒 辛溫小毒。去目勿炒用。蜀產者微辛不辣。色黃者氣味微辛。散心包之火最勝。色紅者氣味辛辣壯命門之大最强形如鵝鴨者真以子種出。其葉十三瓣者蜀椒也。閉口者有毒傷入誤中其毒吐沫者地漿水解之。本經主邪氣欬逆溫中。逐骨節皮膚死肌寒熱癆瘍下氣久服頭不白。發明 椒乃手足太陰少陰厥陰氣分之藥。稟五行之氣而生。葉青皮紅花黃膜白子黑其氣馨香能使大氣下達命門。故本經謂之下氣。其主邪氣欬逆等證皆是肺脾二經受病。肺虛則不能固密腠理。外邪客之為咳。逆脾虛則不能溫暖肌肉而為痛。脾等證其治嘔吐服藥不納者必有蛇在隔間。但於嘔吐藥中加川椒數十粒。蓋蛇聞藥則動。遇椒則頭伏也。故仲景治蛇厥烏梅丸用之又能開脾濕溫中氣助心包命門之火。本經言久服頭不白者。辛溫上通腎氣之力可知。今烏鬚髮方用之。一人腰痛痰喘足冷如冰。六脈洪大。按之却軟。服八味丸無功用。椒紅茯苓蜜丸鹽湯下。甫二十日而安。但其性辛溫氣竄陰虛大旺人禁之。

秦椒 辛溫有毒。去目炒去汗取紅用。其葉九瓣者秦椒也。閉口者有毒誤食之或人咽喉氣欲絕或吐下白沫。身體辨冷。肉桂煎汁飲之多飲冷水一二升。或食蒜或飲地漿或濃煎豆豉飲之並解。本經除風邪氣溫中去寒辨堅齒髮明日。發明 秦椒味辛氣烈過於蜀椒。其溫中去辨除風邪氣治吐逆疝瘕下腫濕乳皆取半烈以散鬱熱。乃從治之法也不宜多服。令鬚髮易白以其氣辛非蜀椒之比。臭毒瘡毒腹痛冷水下一握效。其能通三焦引正氣下惡氣可知也。

椒目 苦平無毒。發明 椒赤目黑水能制火。故專瀉水降火治腎氣逆上喘急。又妊娠水腫喘逆用椒仁丸能引諸藥下行。滲道所以定喘下水治腎虛耳。鳴同巴豆菖蒲研細以松脂黃蠟溶和為挺。納耳中搗之一日一易效。豬椒根即蔓 苦溫無毒。其葉七瓣者豬椒也。本經主風寒濕辨。歷節疼。除四肢厥氣膝痛煎湯蒸浴取汗。發

明 猪椒根蔓生氣臭。故能通經脈去風毒濕痹。千金治肝虛勞損。關節骨疼痛。筋攀煩悶虎骨酒用之。又取枝葉煎熬如餡治通身水腫。每日空腹食之。

胡椒 辛大溫小毒。發明 胡椒大辛大熱。純陽之物。走氣助火。盲目發瘡。多食損肺。令人吐血。心腹冷痛。反胃吐利。霍亂氣逆。及魚龍蕈毒宜之。嚴冬泡水磨墨。則硯不冰。勝於兒水火酒。傷筆易秃也。

畢澄茄 辛溫無毒。發明 時珍曰。畢澄茄海南諸番皆有之。與胡椒一類兩種。正如大腹之與橘柳耳。珣曰。向陰生者為澄茄。向陽生者為胡椒。主治與胡椒相類。而熱性稍遜。治反胃吐出黑汁。諸藥不効。用此一味為丸。薑湯服之。痘瘡入目。為末以少許吹鼻中。三五次動。鼻塞不通。用此半兩同薄荷葉三錢。荆芥穗二錢半。蜜丸芡實大時含嚥之。但陰虛血分有熱。發熱欬嗽禁用。

吳茱萸 辛苦溫小毒。揀去閉口者。否則令人躁悶。揀淨以滾湯泡七次。去其濁氣。則清香扶胃。而無辛燥之患也。

本經溫中下氣止痛。除濕血癖。逐風邪。開腠理。欬逆寒熱。發明 吳茱萸氣味俱厚。陽中之陰。其性好上者。以其辛也。又善降逆氣者。以味厚也。辛散燥熱而脾入肝行。脾本經主溫。中下氣止痛。欬逆寒熱。取辛溫散邪之力。又言除濕血癖。逐風邪。開腠理者。以風寒濕癖靡不由脾胃而入。辛溫開合表裏宣通而無拒閉之患矣。至於定吐止渴。理闢格中滿脚氣。山瘕制肝燥脾風。厥氣上逆。陰寒膈塞。氣不得上下。腹脹下痢。及衝脈為病。欬氣裏急。並宜苦熱以泄之。東垣云。濁陰不降。厥氣上逆甚而脹滿者。非吳茱萸不可治。仲景吳茱萸湯。當歸四逆加吳茱萸生薑湯。治厥陰病。及溫脾皆用之。寇氏言其下氣最速。陽虛人服之愈甚。凡病非寒滯者勿服。按椒性善下。茱萸善上。故服茱萸者。有衝膈衝眼。脫髮。咽痛。動火發瘡之害。其治暴注下重。嘔逆吐酸。肝脾火逆之證。必兼苦寒以降之。如佐金丸治肝火痰。運嘈雜。最效。小兒痘瘡口一嚼。吳茱萸抹之即開。亦取辛散之意。

食茱萸 辛苦大溫有毒。本經主心下邪氣。寒熱溫中。逐寒濕癖。去三蟲。久服輕身。發明 食茱萸與吳茱萸。性味相類。功用彷彿。而本經之文。向來錯簡在山茱萸條內。詳其主心下寒熱。即益說治心腹冷痛之謂。溫中逐寒濕脾。即中惡去藏府冷之謂。去三蟲。即藏氣療鹽毒飛屍之謂。雖常食之品。平者助陽。能辟濁陰之滯。故有輕身之喻。已上主治。豈山茱萸能之乎。其治帶下冷痢。暖胃。燉濕水。氣浮腫用之。功同吳茱萸而力少遜。多食動目火。目痛。

者忌之。

茗 苦甘微寒無毒。服尊解藥靈仙土伏苓忌之。本經主瘧瘈利小便去疾熱止渴令人少睡有力悅志。發明茗乃茶之粗者。味苦而寒。最能降大消痰。開鬱利氣下行之功最速。故本經主瘧瘈利小便去疾熱之患。然過飲即令人少寐。以其氣清也。消食止渴無出其右。合醣治傷暑泄利同薑治渴下赤白。兼香豉葱白生薑治時疫氣發熱頭痛。一味濃煎治風瘡茶之產處最多。惟陽羨者謂之真茶。凡芥皆能降火清頭目。其陳年者曰臘茶。以其經冬過臘故以命名。佐劉寄奴治便血最效。產徽者曰松蘿。專於化食。產浙紹者曰日鑄。專於清火。產閩者曰建茶。專於辟瘧。產六合者曰苦丁。專於止痢。產滇南者曰普洱茶。則兼消食辟瘧止痢之功。蒙山者世所罕有。近世每採石苔代充誤人殊甚。其餘雅茶皆苦寒代胃。胃虛血弱之人有嗜茶成癖者。久而傷精血不華。色黃暗。倦弱嘔逆。洞泄種種皆傷茶之害。而早晨啜茗。每傷腎氣。酒後嗜茶。多成茶癖。又新茶飲之。令人聲音不清。以其能鬱遏火邪也。至於精氣寒消觸之易泄者勿食。宜以沙苑蒺藜點湯代之。茶子味苦氣肅。善於降火。專治頭中鳴響天白蝶之病。江右人每以打油味最清香。浸油沐髮最佳。取茶子餅煮汁澆花。以辟盆中之蚯蚓。煎湯滌衣垢。則不退顏色。總取其質之輕清而不沾滯也。

香木部

柏子仁 甘平無毒。蒸熟曝乾自裂。入藥炒研用。色黃油透者勿用。本經主驚悸。益氣除風濕安五臟。久服令人潤澤美色。耳目聰明。不饑不老。輕身延年。發明 柏子仁性平而補味甘而辛。其氣清香。能通心腎益脾胃。宜乎滋養之劑用之。本經言除風濕者以其性燥也。別錄言恍惚及歷節腰中重痛。即本經主驚悸除風濕也。經疏以為除風濕辟之功。非潤樂所能當。是葉之能事。豈知其實雖潤而性却燥。未有香藥之性不燥者也。古以為肝經氣分藥。時珍言養心氣潤腎燥安魂定魄。益智益神。即本經之安五臟也。昔人以其多油而滑。痰多作瀉。忌服。蓋不知其性燥而無傷中況疾之患。久服每致大便燥結。以芳香走氣而無益血之功也。

柏葉 部油 苦微寒無毒。酒浸焙熟用。發明 柏葉性寒而燥。大能伐胃。雖有止衄之功。而無陽生之力。故亡血虛家不宜擅服。然配合之力。功過懸殊。如金匱柏葉湯同黃芩治吐血不止。當無止慮矣。若濟急方。同黃連治小便

血聖濟總錄同。芍藥治月水不斷，微酒之辛溫以行苦寒之勢。但酒力易過，苦寒長留，每致減食作渴，發不散。是宜柏葉之過歟。○柏節堅勁，用以煮汁釀酒，去風痹，歷節風燒，取其油，療瘡疥，頑柏脂治身面疣，同松脂研勻塗之，數日自落。根白皮以臘豬脂調塗，大灼熱油燙瘡，能涼血生毛髮。

松脂本綱名松膏，俗名松香。 苦甘溫無毒。本經主癰疽惡瘡，頭瘡白壳疥，屬風氣，安五藏除熱，久服輕身，不老延年。發

明。松脂得風木堅勁之氣，其津液流行皮幹之中，積成結成，芳香燥烈，尤為方士辟穀延齡之上藥，然必蒸煉始堪服食。本經所主諸病，皆取風燥以祛濕熱之患耳。今生肌藥中用之者，取其清以飲之也。

松節 苦溫無毒。發明。松節質堅氣勁，久亦不朽，故筋骨間風濕諸病宜之。但血燥人忌服。○松花潤心肺，益氣除風濕，今醫治癰瘍濕爛，取其涼燥也。

杉 卒微溫無毒。發明。杉氣芬芳，取其薄片煮湯，薰洗臚瘡，無不獲效。其性直上，其節堅勁，有杉木湯治腳氣，瘡痏，腸下有塊如石，方用杉節補葉各一升，大腹橫柳七枝，連皮碎搗，童便三升，共煮減半服之，大下三行氣塊消散。此鄭間美治柳州法也。杉葉治風蟲牙痛，同芍藥細辛煎酒含漱。杉子治疝氣痛，一歲一粒研酒服。

肉桂 辛甘大溫無毒，去蟲皮用。凡桂皆忌，勿見火，以辛香得火轉烈，恐動陰血也。色深紫而甘勝於辛，其形狹長，半卷而鬆厚者良。若堅厚味淡者曰板桂，今名西桂，不入湯藥。近世舶上人每以丁皮混充，不可不辨。發明

肉桂辛熱下行，入足太陰少陰，通陰蹻督脈，氣味俱厚，益大消陰，大補陽氣，下焦火不足者宜之。其性下行導火之源，所謂腎苦寒，急食辛以潤之。利肝腎止腰腹寒痛，冷痰霍亂轉筋，堅筋骨，通血脉。元素言：補下焦不足，沉寒痼冷之病，下部腹痛，非此不能止。時珍治寒痹風濕，陰盛失血，漏痢驚癇，皆取辛溫散結之力也。古方治小兒驚癇及泄瀉，宜五苓散以瀉內火，滲土濕內，有桂抑肝風而扶脾土，引利水藥入膀胱也。赤眼腫痛，脚虛不能飲食，肝脉盛脾脈弱，用涼藥治肝，則脾食虛，用燥藥助脾，則肝愈盛，但於溫脾藥中，倍加肉桂，殺肝益脾。一治而兩得之。同丁香治痘瘡灰竭，以其能溫托化膿也。又桂辛散，能通子宮，而破血調經，消癰瘕，破瘀墮胎，內托陰疽瘡癰，久不斂及虛陽上乘，面赤戴陽，吐血衄血，而脈腎腎虛大無力者，皆不可缺。有胎息虛寒，下墮腹黃，岑白承輩安之不應，小腹愈痛，愈墮腹來，弦細或浮革者，非參者桂附十全大補溫之不效。昔人又以亡血虛家，不可用桂，時珍以之治陰盛失血。

非妙達陰陽之理不能知此。惟陰虛失血而脈弦細數者切忌。今人以之間石灰等分爲末，擦黑膏上貼麝塊敷亦取辛溫散結之力。然惟藜藿之人皮膚粗厚者宜之。

桂心 辛甘大溫無毒。卽內桂之去外色淡，但存中心深紫，切之油潤者是。發明 桂心既去外層，若燥之性獨取中心甘潤之味。專溫營分之裏藥。故治九種心痛，腹內冷痛，破瘻癬等病。與經絡軀殼之病無預。若肉桂之兼通經脈，和營衛，堅筋骨，有寒濕風癰等治也。

牡桂 一名大桂 辛甘微苦溫無毒。甜厚而潤者是。

本經主上氣欬逆，結氣喉痹，吐吸利關節。補中益氣，久服通神，輕身不老。發明 牡桂辛勝於甘，而微帶苦性，偏溫散而能上行。故本經治上氣欬逆成無已利肺氣，皆取辛散上行之力。時珍不察，乃與桂枝同列，非智者一失歟。蓋桂枝是最上枝條，亦名柳桂，言如柳條之嫩小也。蓋牡者陽也。牡桂是稟離火純陽之氣，故味帶苦且大且厚。與桂枝絕不相類，何可混言。本經言治上氣欬逆，導下焦之陰火逆上也。治結氣，辛溫開結也。喉痹吐吸同氣相招，以引浮游之火下泄也。然必兼苦寒降泄之味用之。利關節從內而達於表也。補中益氣，久服通神，輕身不老，補助真元，陽生陰長也。然須詳素稟豐腴，濕勝大衰者爲宜。若瘦人精血不充，大氣用事，非可例以爲然也。其治心腹冷痛，瘕瘕，血痹，筋脈拘攣，冷痰霍亂，其功不減肉桂。但治相火不歸下元，虛冷力不能直達下焦爲稍遜耳。

筒桂 俗名官桂

辛甘溫無毒。本經主百病，養精神，和顏色爲諸藥先聘通使。久服面生光華，媚好常如童子。發明

筒桂辛而不熱，薄而能宣，爲諸藥通使，故百病宜之。本經言其養精神，和顏色，有辛溫之功，無壯火之患也。爲諸藥先聘通使，凡開提之藥，補益之藥，無不宜之。久服面生光華，媚好常如童子。以其質薄性輕，無桂心肉桂，桂枝等雄烈之氣力，勝真陰之比。別錄治心痛，脇痛，風溫，經通血脉，止煩出汗，皆薄則宣通之義。綱目乃以別錄元素二家之言，皆混列牡桂之下。蓋牡桂是桂之大者，功用與肉桂相類，專行氣中血滯。筒桂則專行胸膈，爲脹滿之要藥。凡中焦寒邪，拒閉，胃氣不通，嘔吐酸水，寒痰水癖，奔豚死血，風寒痛麻，三焦結滯，並宜薄桂。蓋味厚則泄，薄則通也。桂枝 辛甘微溫無毒。發明 麻黃外發而祛寒，適徹皮毛，故專於發汗。桂枝上行而散表，透達營衛，故能解肌元素云。傷風頭痛，開腠理，解肌發汗，去皮膚風濕，此皆桂枝所治。時珍乃以列之牡桂之下，誤矣。按仲景治中風解

表皆用桂枝湯。又云無汗不得用桂枝。其義云何。夫太陽中風。陽浮陰弱。陽浮者汗自出。衛實營虛。故發熱汗出。桂枝湯為專藥。又太陽病。發熱汗出者。此為營弱衛強。虛陽必湊之。皆用桂枝發汗。此調其營則衛氣自和。風邪無所容。遂從汗解。非桂枝能發汗也。汗多用桂枝湯者。以之與芍藥調和營衛。則邪從汗去而汗自止。非桂枝能止汗也。世俗以傷寒無汗不得用桂枝者。非也。桂枝辛甘發散為陽。寒傷營血。亦不可少之藥。麻黃湯葛根湯未嘗缺此。但不可用桂枝湯。以中有芍藥酸寒。收斂表腠為禁耳。若夫傷寒尺脈不至。是中焦營氣之虛不能下通於衛。故需陽飼。加入桂枝湯方。取稼穡之甘。引入胃中。遂名之曰建中。更加黃耆。則為黃耆建中。借表藥為裏藥。以治男子虛勞不足。千金又以黃耆建中。換入當歸為內補建中。以治婦人產後虛羸不足。不特無餘邪內伏之虛。并可杜陽邪內陷之患。非洞達長沙妙用。難以體此。詳桂枝本手少陰血分藥。以其兼走陽維。凡傷之邪。無不由陽。雖傳次。故此方為太陽首劑。昔人以桂枝湯為太陽經風傷衛之耑藥。他經皆非所宜。而仲景三陰例中。陰盡復陽。靡不用之。即厥陰當歸四逆。未嘗不本桂枝湯也。○桂附各具五體。各有攸宜。肉桂雖主下元。而總理中外血氣。桂心專溫臟府營血。不行經絡氣分。牡桂性兼上行。統治表裏虛寒。薄桂善走胸膈。不能直達下焦。桂枝調和營衛。解散風邪。而無過汗傷表之危。真藥中之良品。允為湯液之祖也。本經之言牡桂兼肉桂。桂心而言。言獨桂兼桂枝而言也。其他如桂木桂。僅供香料食料。不入湯藥。

辛夷卽木華 平溫無毒。剝去毛瓣。取仁用。忌火焙。本經主五藏身體寒熱頭風。腦痛面黑。發明鼻氣通於天。肺開竅於鼻。辛夷之辛溫走氣而入肺利竅。其體輕薄。能開胃中清陽。上行通於天。故本經治陽氣鬱遏。身體寒熱。頭風。腦痛。面黑。辛溫能解肌表。芳香上竅頭目。逐陽分之風邪。則諸證自愈。軒岐之後。能達此理者。東垣一人而已。凡鼻鼽。鼻渊。鼻塞。及痘後鼻瘻。並研末入麝香少許。以葱白蘸入。甚良。腦鼻中有濕氣。入室不通者。宜之。但辛香走竅。虛人血虛火盛。而鼻塞及偶感風寒。鼻塞不聞香臭者。禁用。

沈香 半甘苦微溫。無毒。咀嚼香甜者性平。辛辣者性熱。修製忌火。香藥皆然。不獨沉香也。產海南者色黃。鋸處色黑。俗謂銅筋鐵骨者良。產大宜白棕紋者次之。近有新山產者。色黑而堅質不鬆。味不甘苦。入藥無效。舊舶來者。氣味帶酸。此為下品。其浮水者。曰速香。不入藥。發明 沈香水性溫。秉兩方純陽之性。專於化氣。諸氣鬱結不伸者。

宜之溫而不燥行而不泄。扶脾達腎。攝大歸源。主大腸虛祕。小便氣淋及痰涎血出於肺者為之要藥。凡心腹平痛。霍亂中惡。氣逆喘急者。並宜酒磨服之。補命門三焦。男子精冷。宜入丸劑。同廣藿香。香附治諸虛寒熱。同丁香。肉桂。治胃虛呃逆。同紫蘇。白豆蔻。治胃冷。嘔吐。同淡芩。人參。治心神不足。同川椒。肉桂。治命門火衰。同廣木香。附治婦人強忍入房。或過忍尿。以致膀胱不通。同肉蓯。荳麻仁。治大腸虛祕。昔人四磨飲。沈香化氣丸。滾痰丸。用之。取其降泄也。沈香降氣散用之。取其散結導氣也。黑錫丹用之。取其納氣歸元也。但多降少升。氣虛下陷人。不可多服。久服每致失氣無度。面黃少食。虛證百出矣。○一種曰蜜香。與沈香大抵相類。故綱目釋名沈水香蜜香。二者並稱。但其性直者。毋論大小。皆是沉水。若形如木耳者。俗名將軍帽。即是蜜香。其力稍遜。僅能辟惡去邪氣。戶庭一切不正之氣。而溫脾暖胃。納氣歸元之力。不如沈香也。

丁香一名雞舌香 平溫無毒。有子而大者曰母丁香。去蒂及子。用忌見大。發明 丁香平溫。入手太陰足少陰。陽明經。溫胃進食。止嘔逆。定瀉。虛冷下利。白沫之要藥。乾霍亂不吐不下。及嘔逆不止。厥冷脈沈者。並宜服之。胃寒肝虛呃逆。嘔噦。在所必用。但渴欲飲水。熱嗽呃逆。不可誤投。小兒痘疹。不光澤。不起發。氣虛灰白。或脹或渴或渴或氣促表裏俱虛之證。並宜加用。凡胃逆嘔吐者。健胃消炎藥中。加三五粒。甚效。不宜多用。但其性易於僭上。過用則損肺傷目。非屬虛寒者。堅不可施。○丁皮即丁香樹皮。似筒桂皮而堅厚。色深紫。較之肉桂味稍枯。氣稍滯。專治一切心腹冷氣。腹脹惡心。泄瀉虛滑。水穀不消。及齒痛諸證。方家用代丁香。今舶上人。每以偽克肉桂。不可不辨。

旃檀 辛溫無毒。禁用火培。發明 白檀平溫。氣分藥也。故能理衝氣而調脾胃。利胸膈。紫檀鹹平。氣分藥也。力能和營氣舒。嘔逆吐食者宜之。難疽潰後。服多禁用。

紫檀 鹹平無毒。發明 白檀平溫。氣分藥也。故能理衝氣而調脾胃。利胸膈。紫檀鹹平。血分藥也。力能和營氣而消腫毒。療金瘡。各有攸宜。

降真香 辛溫無毒。禁用火培。發明 降真香色亦入血分而下降。故內服能行血破滯。外塗可止血定痛。刀傷用紫金散。即降真香用磁瓦刮下。和血竭研末。是也。又虛損吐紅色。瘀血不鮮者。宜加用之。其功與花藥石散不殊。血熱妄行。色紫濃厚。脉實便祕者禁用。

烏藥 辛溫無毒。酒浸眼乾用不可見大。發明 烏藥香竈能散諸氣。故治中風中氣諸證。用烏藥順氣散者先疏其氣。氣順則風散也。性溫能理七情鬱結。上氣喘急用四磨六磨。婦人血氣諸痛。男子腰膝麻痺。用烏沈湯。並借參之力。寓補於瀉也。大抵能治氣血凝滯。霍亂吐瀉。痰食稽留。但專泄之品。施之藜藿相宜。若高梁之輩。血虛內熱者服之。鮮不蒙其害也。

茴香 辛溫小毒。去子用小而味淡者曰木蟹。不入藥。發明 胆上茴香。性熱味厚。性入肝經。散一切寒結。故黑錫丹用之。若陰虛肝火從左上衝頭面者。用之最捷。蓋茴香與肉桂吳茱萸皆厥陰之藥。吳則走腸胃。桂則走肝臟。茴則走經絡也。得鹽引入腎經。發出邪氣。故治疝氣有效。但耗血發熱。目病瘡瘍忌之。

楓香脂一名白膠香 辛苦平無毒。發明 楓性疎通。故木易蛀。爲外科透毒要藥。金瘡筋斷一味爲木傅之。千金治咳唾膿血。取其開發肺氣也。血熱生風。齒頬腫痛。爲末擦之。燒過揩牙。永無牙疾。

薰陸香即乳香 苦辛微溫無毒。以酒研如泥水飛曬乾或若上焙去油。同燈心研易碎。發明 乳香香竈能入心經。活血定痛。故爲癰疽瘡瘍要藥。諸痛脣瘡皆屬心火也。產科諸方多用之。亦取其活血調血之功耳。凡人筋不伸者。薰洗敷藥。宜加乳香。其性能伸筋也。瘡疽潰後勿服。膿多勿敷。胃弱勿用。

沒藥 苦平無毒。修治與乳香同。發明 乳香活血。沒藥散血。皆能止痛消腫。生肌。故二藥每每相兼爲用。凡刀傷打損。墜馬。並宜熱酒調服。若妊娠胎氣不安。勿用。產後惡露去多。腹中虛痛。癰疽已潰而痛。及筋骨胸腹諸痛。若不因瘀血者。皆不可服。

麒麟竭即血竭 甘鹹平無毒。試之透指甲爲真。嚼之不爛如蠟者爲上。草血竭色紫亞於瓜竭。發明 血竭木之脂液。如人之膏血。爲止痛和血。收斂瘡口。散癰生新之要藥。治傷折打損。一切疼痛。血氣攢刺。內傷血敗。並宜酒服。乳香沒藥。雖主血病。而兼入氣分。此則專於肝經血分也。但性最急。却能引藥。不宜多服。其助陽藥中。同乳香沒藥用之者。取以調和血氣而無留滯壅毒之患。

安息香 辛苦微甘平無毒。出西戎及南海波斯國。樹中脂也。如膠如餠。今安南三佛齊諸番皆有之。如餠者曰安息香。紫黑黃相和。如馬糞研之。色白者爲上。粗黑中夾砂石樹皮者爲次。乃渣滓結成也。有屑末不成塊者爲下。恐

有他香火雜燒之集鼠者爲真修製最忌經火。發明。安息香乃外番入貢之物。香而不燥竈而不烈燒之去鬼來神。令人神清服之辟邪除惡。令人條暢能通心腹諸邪氣辟惡蟲毒理霍亂止卒然心痛嘔逆治婦人爲邪祟所憑復與鬼交燒烟熏鼻田穴永斷故傳尸房療厥用之。其蘇合香丸紫雪丹用之各有轉日回天之功。洵非尋常方藥可比也。凡氣虛少食陰虛多火者禁用爲其能耗氣也。

蘇合香。甘溫無毒出天竺崑崙諸國。安南三佛齊亦皆有之。其質如鴉膠者爲蘇合油。色微綠如雉斑者良。微黃者次之。紫赤者又次之。以簪挑起徑尺不斷如絲漸屈起如鉤者爲上。以少許擦手心。香透手背者真。忌經火。發明。蘇合香取諸香之氣而成能辟惡殺鬼精物治溫瘧蠭毒癰痘去三蟲除邪能透諸竅藏辟一切不正之氣。凡痰積氣厥必先以此開導治痰以理氣爲本也。凡山嵐瘴濕之氣襲於經絡拘急弛緩不均者非此不能除但性燥氣竊陰虛多火人禁用。

龍腦香片即冰。辛苦溫有毒。忌見火。發明。龍腦香竄入骨風病在骨髓者宜之。若風在血脉肌肉用之反引風入骨髓也。其味大辛善走故能散熱通利關格結氣。張雲歧人參散柏子仁湯等方多用之。其治目痛喉痹下疳取其辛溫而散大鬱也。時珍曰。古方皆言龍腦辛涼入心。故目疾驚風及痘瘡心熱血瘀倒竇者用猪心血爲引。使毒散於外則瘡發此似是而非也。目痛驚風及痘皆大病大鬱則發之從治之法。辛溫發散故也。使壅塞通利。經絡條達而驚熱自平。瘡毒能出然不可多用。多用則真氣立耗矣。人有急難欲自盡者頓吞兩許立斃爲其性烈立能散盡真氣也。世人誤以爲寒不知辛散之性似乎涼耳治大證舌出寸許用冰片末捲上即縮引火歸元也。目病屬陰虛者不宜入點。

樟腦一名腦麝。辛熱有毒忌見火。發明。樟大性稟龍火。辛溫香竄能去濕辟惡氣故治乾霍亂以樟木屑煎濃汁吐之中惡卒死者以樟木燒烟熏之。待蘇用藥。韶郡諸山樟木最多土人以之蒸汁煎煉成樟腦與焰硝無異水中然火其焰益熾今丹爐家及烟火方皆用之去濕殺蟲此物所長燒烟熏於能辟蟲蟲治脚氣腫痛或以樟腦置兩股用杉木作桶盛湯灌之或樟腦烏頭等分醋丸彈子大每置一丸於足心踏之下以微火烘之衣被圍覆汗出如涎爲效。

阿魏

辛溫有毒。驗真偽法。置熱銅器中一宿。沾處白如銀色者為真。

發明 阿魏消肉積殺蟲。治癖積為主藥。

故能解毒辟邪。治瘧痢疳勞諸病。久瘻用阿魏硃砂等分爲末。米糊丸。兒子大空心入參湯服一丸。即愈。如利用黃連木香湯下。蓋瘻亦多起於積滯耳。同麝香硫黃蘇合貼。一切塊有効。然人脾胃喜芳香而惡臭烈。凡脾胃虛人。雖有積滯。不可輕投。

蘆薈

苦寒小毒。發明

蘆薈入砂陰肝經及衝脈。其功專於殺蟲清熱。衝脈爲病。逆氣棗急。及盤事不調。腹中

結塊上衝。與小兒疳積滯。非此不除。同甘草爲末。治頭項頑癬。甚效。但大苦大寒。且氣甚穢惡。僅可施之藜藿。若胃虛少食人得之。入口便大吐逆。每致奪食泄瀉。而成羸瘦怯弱者多矣。有人背瘞愈後。餘熱不除。或令服蘆薈藥三服。不數日而覺傷胃之性。於此可徵。

喬木部

黃檗

根名櫟柏

苦寒無毒。生用降竇火酒製治陰火上炎。鹽製治下焦之火。蠶汁炒黑治濕熱。鹽酒

炒黑治虛火。陰虛火盛。面赤戴陽附子汁製

本經主五臟腸胃中結熱。黃檗腸痔止泄痢。女子漏下赤白。陰傷蝕瘡。

○檀桓主心腹百病。安魂魄。不饑渴。久服輕身延年通神。

發明 黃檗苦燥。為治三陰濕熱之專藥。詳本經主治。皆濕熱傷陰之候。即漏下赤白。亦必因熱邪傷陰。火氣有餘之患。非崩中久漏之比。其根治心腹百病。魂魄不安。

皆火氣內亢之候。仲景梔子檗皮湯治身黃發熱。得其旨矣。按黃檗味厚而降。入腎經血分。凡腎水膀胱不足。諸痿

厥無力。於黃耆湯中加用。使兩足膝中氣力湧出。痿弱即愈。黃檗倉朮乃治療要藥。凡下焦濕熱腫痛。并膀胱火邪。

小便不利及黃濁者。並宜黃檗知母爲君。伏苓澤瀉爲佐。凡小便不通而竭者。邪熱在氣分。主治在肺。不能生水不

渴者。邪熱在血分。主治在膀胱。不能化氣。亦宜黃檗知母。昔人病小便不通。腹堅如石。脚腿裂水雙睛凸出。遍服治

滿利小便藥不效。此高溝積熱。損傷腎水。致膀胱不化火氣上逆。而爲嘔噦。遂以滋腎丸主之。方用黃檗知母。入桂

爲引導。服少時。前陰如火燒。溺即涌出。顧盼腫消。金匱治誤。食日久六畜肉中毒。用黃檗屑搗服方寸匕解之。不特

治高溝積熱。益苦以解毒寒。以泄熱也。大抵苦寒之性。利於實熱。不利於虛熱。凡脚虛少食。或嘔或渴。或好熱惡寒。

或腎虛五更泄。小便不禁。少腹冷痛。陽虛發熱。瘀腫後發熱。陰虛小便不利。症後脾

虛小便不利血虛煩躁不眠等證。法皆忌之一種小而實如酸石榴者。名曰小藥。性亦不甚相遠。十全翼阿伽陀丸用之。

厚朴 苦辛溫小毒。厚者佳。薑汁炒用。忌黑豆。宜用滾水泡數次切之。不可久浸。氣涌有傷脾氣。本經主中風。傷寒頭痛寒熱。搏逆氣血。脾死肌去三蟲。發明 厚朴苦溫。先升後降。為陰中之陽藥。故能破血中氣滯。本經中風傷寒。頭痛寒熱者。風寒外傷於陽分也。其治驚悸逆氣。血痹死肌者。寒濕入傷於腰理也。濕熱內著於腸胃而生三蟲。此藥互能散結。若能燥濕溫能祛蟲。故悉主之。消風散用之。深得本經之義。今世但知厚朴為溫中散滯之藥。而治腸胃濕滿寒服。溫中下氣。消痰止吐。平胃散用以治腹脹者。味平能散滯氣也。若氣實人誤服參耆服悶作喘。宜此湧之。與枳實大黃同用。能渴實滿所謂消痰下氣也。與芩木橘皮同用。能渴濕滿所謂溫中益氣也。然行氣峻猛。虛者勿服。氣溫即止。不可久服。

杜仲 年甘溫無毒。鹽酒炒斷絲用。本經主腰脊痛。補中益精氣。堅筋骨。強志。除陰下瘡濕。小有餘滯。發明 杜仲古方但知補腎。而本經主腰脊痛。補中益精氣等病。是補火以生土也。王好古言。是肝經氣分藥。蓋肝主筋。腎主骨。腎充則骨強。肝充則筋健。屈伸利用。皆屬於筋。故入肝而補腎。子能令母實也。但腎虛大瘻。夢泄遺精而痛者勿用。以其平溫引領虛陽下走也。

椿樗根皮 鳳眼草 者名椿。甘平無毒。臭者名樗。苦溫有毒。樗樹有蟲。謂之樗雞。樗雞有莢。莢中有實。狀如明珠。名鳳眼草。子嗣門中練真丸用之。專治髓藏中濕熱。高年素享豐厚者宜之。發明 椿根白皮性寒而能濁血。治濕熱為病。濕利濁滯。滑要遺精諸證。有燥痰之功。但利痰滯氣未盡者。不可遽用。崩帶屬陰虛者。亦不可服。蓋椿皮色赤而入血分。久刷血傷者宜之。樗皮色白而入氣分。暴利氣滯者宜之。不可不辨而混用也。

乾漆 漆子 辛苦鹹溫有毒。炒令烟盡。否則損人腸胃。今人多用漆渣為丸。必凝結如磚者佳。本經主絕傷補中。續筋骨。填髓腦。安五臟。五緩六急。風寒濕痹。生漆去長蟲。久服輕身耐老。發明 乾漆灰辛溫性善下降而破血。故消腫殺蟲通月閉。皆取去惡血之用。而本經治絕傷補中。是取其破宿生新之力也。蓋胃中有瘀積。留滯則陽氣竭。絕不能敷布中外。故藏府筋骨髓腦皆失營養。乃致健運失常。肢體緩懈。用此以鍛除瘀積。中氣得復。絕傷皆續。

而緩急和矣。生漆去長蟲。故千金去三蟲方以之爲君。三蟲去。輕身長年。所不待言。但恆人難於久服耳。元素云。削年深堅結之積滯。破日久凝結之瘀血。斯言盡乾漆之用矣。無積血者切忌。以大傷營血損胃氣。故胃虛人服之。往往作嘔。此與本經之義似乎相背。而實不相違。產後血暈。以舊漆器燒烟熏之。即醒。蓋亦取下血之義。而破經絡中血滯。用真漆塗鱠鯉甲。收入藥。破血最捷。婦人血虛經閉。爲之切禁。凡畏漆者。嚼椒塗口鼻。先生漆瘡。誤中其毒。以生蟹搗汁。或紫蘇解之。○漆葉塗紫雲癰。面生紫腫。取其散瘀之功也。○漆子專主下血。千金方用之。審無瘀滯。慎勿漫投。

梓白皮 苦寒無毒。取根去外黑皮用。本經治熱毒去三蟲。發明 梓皮苦寒。能利太陽陽明經濕熱。仲景麻黃連葛根小豆湯用之。其治溫病復傷寒飲。變爲胃喫者。煮汁飲之。取其引寒飲濕邪下泄也。

梧葉皮 苦寒無毒。本經主惡瘍陰瘡五痔。殺三蟲。發明 梧之與桐。本是二種。梧子狀如胡桃。性熱助火。欲噉多疾者勿食。梧葉消腫毒生毛髮。本經治惡瘍陰瘡。附後治髮落不生。醫林正宗治難症。發背大如盤。是腐不可近。用梧葉醋蒸貼上。熱退痛止。漸漸生肉收口。梧皮煎汁。療小兒丹毒惡瘡。本經治五痔。殺三蟲。今人煎湯薰洗腸痔脫肛。即本經治五痔之應。浸水塗鬚髮黑潤。遇用則髮黃。亦助火之驗也。

桐實 卒寒有蟲。發明 桐子不入食品。專供作油。其狀如栗。摩塗疥癬毒腫。吐風痰喉痺。以桐油和水掃入喉中。則吐。誤食吐者。得酒即解。

海桐皮一名利桐 苦平無毒。發明 海桐皮能行經絡達病所。治風濕腰脚不遂。血脉頑痹。腰膝疼痛。赤白漏痢。及去殺蟲。蟲牙風痛。煎湯漱之。疳蝕疥癬。磨汁塗之。目赤膿腫。浸水洗之。此藥專去風濕。隨證入藥服之。無風濕者勿用。

川棟實即金鈴子 苦寒小毒。酒浸蒸熟。去皮核。取淨肉。捻作餅。焙乾用。本經主溫病傷寒。大熱煩狂。殺三蟲。疥瘡。利小便水道。發明 川棟苦寒性降。能導濕熱下走滲道。人但知其有治疝之功。而不知其湯熱止痛之用。本經主溫病煩狂。取以引火毒下泄。而煩亂自除。其溫病之下。又繪出傷寒二字。以溫病原從冬時伏邪。至春隨陽氣而發。故宜苦寒以降泄之。其殺三蟲利水道。總取以苦化熱之義。古方金鈴子散治心包火鬱作痛。即婦人產後血

結心疼亦宜用之。以金鈴子能降火逆。延胡索能散結血。功勝失笑散而無腥穢傷中之患。昔人以川棟爲疝氣腹痛殺蟲利水專藥。然多有用之不效者。不知川棟所主乃囊腫。並強木痛濕熱之疝。非痛引入腹厥逆嘔涎之寒疝所宜。此言雖過出前輩。然猶未達至治之奧。夫疝瘕皆由寒、東熱邪。每多掣引作痛。必需川棟之苦寒。兼茴香之辛熱。以解錯綜之邪。更須察其痛之從下而上引者。隨手輒應。設痛之從上而下注者。法當辛溫散結。苦寒良非所宜。諸痛皆爾。不獨疝瘕爲然。近有一人。牙宣出血不止。諸治罔效。或令以棟實研細綿裹塞齒齦卽止。詳血從內外出。治何能卽應。因以少許置舌上。其苦直透諸竅。况有蟠漏。安得不滲入於經也。○苦棟根治蠭毒。煎湯服之。卽時吐出。又能殺蟲治瘡。○其花燒烟辟蚊蟲。亦本經殺蟲之驗。

槐實俗名 槐角 苦酸鹹。寒無毒。取子入牛膽中陰乾日服七枚。久服有明目通神。白髮還黑之功。有痔及便血者尤宜。服之本經主五內邪氣。熱止泄唾。補絕傷。五痔火瘡。婦人乳癰子癓急痛。發明 槐者虛星之精。益腎清火與黃藥同類異治。蓋黃藥專滋腎經血燥。此則專滋腎家津枯。觀本經主治。皆脾胃有熱陰津不足之病。止泄唾。腎可閉。藏之職也。下焦痔瘡。風熱便血。年久不止者。用此一味熬膏。煉蜜收服。婦人乳癰子癓急痛。皆肝家火熱之患。用以清熱滋燥。諸證自安。上皆指槐角而言。其角中核子。專主明目。久服鬚髮不白。益腎之功可知。惟胃虛食少。及孕婦勿服。槐枝燒灰塗瘡。有清火潤燥之功。十全方也。

槐花 苦寒無毒。溫水滌去灰培。香用 發明 槐花苦涼。陽明厥陰血分藥也。故大小便血。及目赤腫痛皆用之。目得血而能視。赤腫乃血熱之病也。腸血痔血同柏葉微炒爲末。烏梅湯服。腸風荆芥湯服。藏毒龍猪藏日日服之。但性純陰。虛寒無實。大禁用。

秦皮 苦微寒無毒。本經治風寒濕痹。洗洗寒氣除熱。目中青翳白膜。久服頭不白。輕身。發明 秦皮浸水色青。氣寒性清。肝膽藥也。本經治風寒濕痹。取其苦燥也。又主青白翳障。取其苦降也。小兒驚癇。取其平木也。崩中帶下。熱痢下重。取其清收也。老子云。天道貴嗇。此服食之品。故本經有久服頭不白。輕身之說。而仲景白頭翁湯治熱痢下重。以黃連秦皮同用。皆苦以堅之也。秦皮黃連等分治赤眼腫痛。又一味煎湯洗亦目甚效。其味最苦。胃虛少食者禁用。

合歡皮一名合昏千金名黃角俗名烏城樹 甘平無毒。本經安五臟和心志。令人歡樂無憂。久服輕身明目。發明 合歡屬土

與水補陰之功最捷。單用煎湯治肺癰喉濁。合阿膠煎膏治肺痿吐血。皆驗。與白蠟同熬膏爲長肌肉續筋骨之要藥。而外科家未嘗錄用。何也。按合歡所主諸病。不過長肌肉續筋骨。故用以填補肺之漬缺。而本經安五臟和心志等語。豈持諸疾而已。嵇康養生論云。合歡蠲忿。萱草忘憂。蓋無顧名思義之寶乎。

皂莢一名皂角 辛鹹溫小毒。入藥去皮子。酥炙用。本經主風痹死肌邪氣。頭風淡出。利九竅。殺精物。發明 皂

莢辛散屬金。治厥陰風木之病。觀本經主治風痹死肌。頭風淡出。皆取其去風拔毒。通關利竅。有破堅積。逐風痰辟邪氣殺蟲毒之功。吹之導之。則通上下之竅。煎之服之。則治風痰喘滿。塗之擦之。則散腫消毒。去面上風氣。熏之蒸之。則通大便祕結。燒烟熏之。則治臘瘡濕毒。卽本經治風痹死肌之意。用之無不效驗。凡人卒中風。昏如醉。形體不收。口角流涎者。急用稀涎散。吐之。若南方類中。由於陰虛火炎者。誤用涌劑。愈竭其津液矣。得不在所切禁乎。然治濕熱痰積肺。難治脣。及痰迷頭面。干渴湯。皂莢丸。興膏等。誠爲聖藥。惟孕婦禁服。按大小二皂。所治稍有不同。用治風痰。牙癩。最盛。若治濕痰。太皂力優。古方取用甚多。然入湯藥最少。有瘡醫以牙皂煎湯。涌吐風痰。服後遍體赤肿。數日後皮脫大傷元氣。不可不慎。至於鎖喉風證。尤爲切禁。常見有激動其痰。鎖住不能吐出。項刻立斃者。其子燒灰存性能治大腸風祕燥結。祛風逐穢之性可知。

皂角刺辛溫無毒。去尖用。否則脫人鬚髮。 發明 皂角刺治風殺蟲。與莢略同。但其銳利。直達病所。爲異。其治痘疹氣滯。不能起頭瘡。膿者。功效最捷。而氣虛者。慎勿誤用。恐透表過鏡。反生虛泡也。若血滯不能起頭瘡。又需陵鯉。當非角刺所宜。丹方治大風惡疾。眉谷鼻崩。用皂角刺三觔。燒灰爲末。食後煎大黃湯。調一匕服之。不終劑而愈。腫瘍服之即消。潰瘍服之難痏。以其性善閉泄也。

肥皂莢辛溫有毒。去皮子。取淨肉用之。 發明 肥皂條除頑痰。垢膿。不減二皂。病勝全弃用之。亦取涌發。不使硯性留於腸胃之意。其子亦治大腸風祕。頭去硯殼及黃膜。但取其仁炒研用之。庶不致有傷腎氣耳。

無患子俗名鬼見愁 苦平無毒。發明 無患子言其辟邪之功也。幹培去面野。喉瘻研納喉中。立開。又主飛尸子中仁燒之。辟除惡邪。壞食停惡氣去口臭。

沒石子一名無 苦溫無毒。發明 沒石子合他藥燙燒伸景用治陰汗。燒灰先以湯浴之。以灰撲之甚良。又血
刺及產後下痢俱用之。綿裏塞牙痛效。取溫散腎經濕熱也。

訶黎勒即詞子 苦溫溫藥六棱者佳去核用。發明 訶子苦溫降火。生用清金止嗽。煨熟固脾止瀉。古方取苦以化痰。泄濁以固滑泄也。殊不知降火之性。雖云濁能固脫。終非甘溫益脾之比。昔人言同烏梅五倍則收斂同橘皮厚朴則下氣。同人參則補肺。治嗽東垣言嗽藥不用者非也。然此僅可施之於久嗽喘乏。真氣未艾者。庶有切截之能。又久嗽陰火上炎。久痢虛熱下迫。愈剝愈滯。豈特風寒暴雨濕熱下痢爲禁藥乎。曷觀世醫用潤肺丸益黃散之功過可知。

柳華柳葉 苦寒無毒。本經主風水黃痺。面熱黑。發明 柳華性寒。故能疊風水黃痺。本經雖云柳繁實柳華也。絮則隨風飛揚。何從覓之。十全治女人積年不孕。吉祥丸中與丹皮桃仁共爲散血之用。亦屬柳華無疑。柳葉治惡瘡加瘡。煎湯洗之立愈。以其力能殺蟲也。痘瘡生蛆。以兒臥柳葉上。其蛆立化無葉時。根皮亦可用之。

檉柳俗名西河柳 甘鹹平無毒。發明 檉柳獨入陽明。故其功專發麻疹。兼解酒毒去風。煎湯浴風疹身癩效。其治剥牛馬血入肉者。取以火炙熨之。亦可煮汁浸之。其益即解。

水楊 苦平無毒。枝硬葉潤條不下垂。其材可造矢者爲水楊。其枝葉細條葉下垂者謂之柳。發明 柳葉殺蟲痘瘡生蟲。用鋪臥下。其蟲即出。煎湯洗漆瘡惡疥。楊枝解毒浴之消癰。腫瘍瘡瘍。根治痘瘡頭陷漿滌。搘愛心鑑。有逐濕利竅之功。故五淋腫滿及胎產宜之。本草十劑云。滑以去著。冬葵子榆白皮之屬。蓋亦取其通利滲濕消留著。有形之物耳。榔榆甘寒。其下熱淋利水道之功。則一但服之令人睡。較零榆之除邪氣。稍有不同。二者性皆疏利。若胃寒而虛者服之。恐泄真氣。良非所宜。

榆根白皮本經名零榆 甘平滑無毒。本經治大小便不通。利水道除邪氣。發明 榆有二種。一種二月生莢。其莢飄零。故謂零榆。一種八月生莢。皮有滑汁。謂之榔榆。性皆滑利。然入手足太陽手陽明經。本經治大小便不通。取其有逐濕利竅之功。故五淋腫滿及胎產宜之。本草十劑云。滑以去著。冬葵子榆白皮之屬。蓋亦取其通利滲濕消留著。有形之物耳。榔榆甘寒。其下熱淋利水道之功。則一但服之令人睡。較零榆之除邪氣。稍有不同。二者性皆疏利。若胃寒而虛者服之。恐泄真氣。良非所宜。

蕪荑 辛平無毒。去殼取仁微炒用。本經主五內邪氣。散皮膚骨節中淫淫濕行毒去三蟲化食。發明 蕪荑半散能祛五內皮膚骨節濕熱之病。近世但知其有去疳殺蟲及腸風痔瘻惡瘡疥癬之用。殊失本經之旨。全治婦人經帶崩淋之病。每同澤蘭厚朴蔓本白芷細辛防風柏仁石斛輩用之。取其去子藏中風熱垢膩也。和猪脂搗塗瘡。和蜜治濕癬。及治腹中氣血痰酒諸癥。以蕪荑仁炒香。兼暖胃活血理氣藥爲散服之。

蘇方木 甘鹹平無毒。發明 蘇木陽中之陰。降多升少。肝經血分藥也。性能破血。產後血腫脈悶欲死者。苦酒煮濃汁服之。本虛不可攻者。用二味參蘇飲補中寓潤之法。凜然可宗。但能開泄大便。臨證宜審。若因惱怒氣阻經閉者。宜加用之。少用則和血。多用則破血。如產後惡露已淨。而血虛腹痛。大便不實者。禁用。

樟木皮 苦平無毒。發明 樟皮能收肥膩故用以治濕熱屬風癰毒。取其能辟惡氣殺蟲也。開寶治諸黃覃。濃煮汁飲之。以其能利小便也。和劑治遍身瘡疥如癩。及癰瘍搔癢。面上風刺。婦人粉刺靈苑方治乳癰腫痛結硬。欲破燒存性。無灰酒服之。

棲櫬 苦溫平無毒。陳久者良。發明 棲灰性溫。失血去多。瘀滯已盡者。用之切當。取濁以固脫也。如積瘀未盡。誤服則氣滯血瘀。益增痛結之患矣。

烏柏根 苦溫有毒。發明 烏柏味苦而辛。性沉而降。故能主暴水穀。燒積聚。功勝大戟。氣虛人不可用之。

葉治食牛馬六畜肉。腹中朽腐欲死者。搗自然汁一二盞。頓服。大利毒去則愈。冬用根皮搗爛和酒緩服。○柏油塗頭髮白爲黑。塗一切腫毒瘡瘍。○柏油燭抽去心。導大便祕結效。

巴豆 辛熱大毒。去殼及心炒紫黑。或燒存性或研爛。紙包壓去油取霜。各隨方製。本經主傷寒濕瘻。寒熱破癰。瘕結聚。堅積留飲。癰癧大腹。湯練五藏六府。開通閉塞。利水穀道。去惡肉。除鬼毒。鹽疽邪物。殺蟲魚。發明 巴豆辛熱能湯練五藏六府。不持破爛。瘕結聚之堅積。並可治傷寒濕瘻之寒熱。如仲景。○寒實結胸用白散深得本經之旨。世本作溫瘻。當是濕瘻亥豕之謬也。其性峻利。有破血排膿。攻逐水之力。宜隨證輕重而施。生用則峻攻。熟用則溫利去油用霜。小推陳致新。隨證之後。急而施反正之治。峻用則有戡亂劫病之功。少用亦有撫安調中之妙。可以通腸。可以止瀉。此發千古之秘也。一老婦久病溏泄。遍服調脾升提止瀉諸藥。則瀉反甚。脈沉而滑。此脾胃久

傷冷積凝滯所致。法當以熱下之，則寒去利止。自後每用以治泄痢，積聚諸病，多有不濁而病痊者，妙在得宜耳。苟用不當，則犯損陰之戒矣。按巴豆大黃同爲攻下之劑，但大黃性寒，府病多熱者宜之。巴豆性熱，藏病多寒者宜之。其殼燒灰存性能止瀉利亦切病之效也。孕婦禁用。以力能墮胎也。元素曰：巴豆乃斬關奪門之將，不可輕用。世以治酒病，膈氣以其辛熱，能開通腸胃鬱熱耳。第鬱結雖通，血液隨亡，其陰虧損，傷寒結胸，小兒疳積用之，不死亦危。奈何庸人畏大黃而不畏巴豆？以其性熱，劑小耳。試以少許，輕擦完膚，須臾發泡，况下腸胃，能無熏灼潰爛之患乎？即有急證，不得已而用之，壓去其油，取霜少許入藥可也。

大風子 辛熱有毒。去殼取仁用。發明 丹溪曰：粗工治大風病，依以大風油，殊不知此物性熱，有燥及之功，而傷血特甚。至有病將愈而失明者，時珍曰：大風油有殺蟲切病之功，然不可多服用之外，塗其功不可沒也。相思子 苦平小毒。發明 相思子味苦有毒，立能吐人，其粒半黑半紅，故以命名。能通九竅，去心腹邪氣，止熱悶頭痛，風痰癆瘍。殺一切蟲，毒蟲，取三七枚研水服之。即當吐出。今人皆認此爲亦小豆，以之配入六神丸中，鋪家以誤認而因名。醫家亦不辨而混用。噫！醫之過可勝道哉。

灌木部

桑根白皮 甘寒無毒。須蜜酒相和，拌令濕透，炙熟用，否則傷肺泄氣，大不利人。根見上面者有毒，傷人。發明

桑根白皮 滴肺氣之有餘，止嗽而能利水。肺中有水氣及肺大有餘者宜之。肺虛無火，因風寒而欬者，服之。風邪反閉，固不散而成久嗽者，有之。甄權治肺中水氣，唾血，熱渴，水腫，腹滿，臍脹，利水道，去寸白蟲，可以鍛金瘡，然後以熱難血塗之。桑皮之功用盡矣。

桑椹 甘溫無毒。本經主傷中，五勞六極，羸瘦，崩中絕脈，補虛益氣。發明 桑椹手足少陰太陰血分藥。本經所主，皆言桑椹之功。而宋邈云：本經言桑甚詳，獨遺其椹，即瀕湖之博識，尚不加察，但以其功，誤列根皮之下。所以世鮮採用，惟萬壽酒用之。

桑葉 味甘微寒，小毒。蜜水拌蒸用。本經除寒熱出汗。發明 桑葉清肺胃，去風明目，取經霜者，煎湯洗風眼，下淚同黑芝麻蜜久服，翳髮不白，不老延年。本經言除寒熱出汗，即大明蒸熟，擣置風扇，出汗之謂。煎飲利五臟。

通關節下氣煎酒服治一切風。桑根燒灰淋汁。與石灰點面上風。滅瘡去惡肉。

桑枝 苦平無毒。發明 桑枝清熱去風。故遍體風癢乾燥。水氣脚氣風氣四肢拘攣。無不宜之。時珍云。前藥用桑者。取其能利關節。除風寒濕痹諸痛也。觀靈樞治寒痹。用桂酒法。以桑炭炙布巾熨。脾處治口僻。用馬膏法。以桑鉤鉤其口。坐桑灰上。又難疽發背。流注頑瘡。久不愈者。用桑木灸法。未潰則拔毒止痛。已潰則補接陽氣。其法以桑柴劈作小片。承作小把。然火吹息。炙患處。每吹炙片時。瘡肉漸腐。用此以助內服之藥。又治久嗽不止。用桑枝煎湯渴即飲之。桑柴灰熬膏。點大風惡疾。或淋取汁洗頭面。不過十度。即瘥。此聖惠法也。

柘根白皮 甘溫無毒。發明 時珍曰。柘能通腎氣。故聖惠方治耳鳴耳聾。藏器煮汁釀酒服。止風虛耳聾。勞損虛羸腰冷。千金治耳鳴汗出。皆由腎虛。或一二十年不瘥者。方用柘根三十斤。菖蒲五斗。古錢二十斤。燒亦浸三宿。用米二石。麵二斗。用土三味汁。釀如常法制服。必效。方具于全二十卷中。

楮實俗名穀樹子根 甘平無毒。發明 楮實走肝腎血分。別錄治陰痿水腫。益氣充肌明目。大明言壯筋骨助陽氣。補虛勞。健腰膝。益顏色。而修真祕旨言。久服令人骨軟。濟生秘旨言。治骨鯁。用楮實煎湯服之。豈非軟骨之微乎。脾胃虛人禁用。○楮根白皮。別錄主逐水利小便。甄權治水腫氣滿。吳普治喉痹。總取散風祛毒之議。

枳殼 辛苦平無毒。陳氏民生熟各隨本方。本經主大風在皮膚中。如麻豆苦癩。除寒熱結。發明 枳殼破氣化痰。泄肺走大腸。多用搗胸中至高之氣。枳殼主高。枳實主下。高者主氣下者主血。故殼主胸膈皮毛之病。本經所治大風在皮膚中。如麻豆苦癩。除寒熱結。是指表病而言。寶玉胸胃心腹之病。本經所謂止刺。長肌肉利五臟。益氣輕身。是指裏病而言。凡人藏府清利則氣自益。身自輕矣。詳枳殼枳實皆能利氣。氣下則痰喘。山氣行則痞脹消。氣通則利。痛已氣利則後重除也。仲景治胸膈痞滿。以枳實爲要藥。諸方治下血痔。刺大腸祕塞。裏急後重。又以枳殼枳殼性浮。兼通肺胃氣分。而治喘嗽霍亂水腫。有乘風破浪之勢。與桔梗同爲丹樨之劑。故柴胡枳殼除寒熱痞滿之專藥。凡久食湯寒感冒。與表藥同用。皆無妨礙。妊娠胞胎有瘕胎飲。乃因氣壅阻滯而設。設素羸怯弱者。設服令母氣耗難育。是取虛虛之禍也。

枳實 辛苦平無毒。本經止痢長肌肉利五臟益氣輕身。發明 枳實入肝脾血分消食渴痰滑痰破氣心下痞及宿食不消並宜枳氣故潔古枳氣丸以調脾胃實祖金匱治心下堅大如盤用枳實白朮湯之法腹即軟消潔古曰心下痞及宿食不消枳氣並宜枳實黃連好古曰益氣佐則之以參术乾薑破氣則佐之以大黃芒硝此本經所以言益氣而潔古復言消瘀也李士材云自東垣分枳殼治高枳實治下好古分枳殼治氣枳實治血然究其功用皆利氣也凡氣弱脾虛致停食痞滿治當補中益氣則食自化痞自散若用枳殼枳實是犯新救火矣。

枸橘 平溫無毒。發明 枸橘與枳同類其幹多刺故破氣散熱之力過之時珍治下痢腹脹後重今人解酒毒用之總取其破氣之力也丹方以枸橘殼末存性酒服方寸匕治胃脘結痛又以醋浸熬膏攤貼內傷諸痛貼即痛止但須久貼方不復發。

施子 苦寒無毒入吐劑取肥施生用入降火藥以建施蠶汁炒黑用。本經主五內邪氣胃中熱氣而赤酒炮破鼻白頭赤頭瘡瘍。發明 施子仁體性輕浮專除心肺客熱本經治五內邪氣胃中熱氣等病不獨除心肺客熱也其去赤頭白頭瘡瘍者諸瘡瘍瘍皆屬心火也炮黑則專瀉三焦之火及瘡塊中最清胃脘之血屈曲下行能降火從小便中泄去仲景治傷寒發汗吐下後虛煩不得眠心中懊憹施子豉湯主之因其虛故不用大黃既亡血亡津內生虛熱非此不去也治身黃發熱用施子柏皮湯身黃腹滿小便不利用茵陳施子大黃湯取其利大小便而蠲濕熱也古方治心痛恆用施子此爲大氣上逆氣不得下者設也今人泥丹溪之說不分寒熱通用虛寒何以堪之大苦大寒能損伐胃氣不無減食泄濁之虞故仲景云病人舊有微瘧者不可與之世人每用治血不知血寒則凝反爲敗證治實火之吐血順氣爲先氣行則血自歸經治虛火之吐血養正爲主氣壯則自能攝血此治療之大法不可少違者也。

酸棗仁 實酸平仁甘平無毒。本經主心腹寒熱邪結氣脹四肢酸痛濕痹人服安五臟。發明 酸棗仁味甘而潤熟則收飲津液故脣脹虛不得眠煩渴虛汗之證生則導虛熱故療膽熱好眠神昏倦怠之證足厥陰少陽本經兼入足太陰脾經按酸棗本酸而性收其仁則甘潤而性溫能散肝膽二經之滯故本經治心腹寒熱邪氣結脹腹痛血崩等證皆生用以疏利肝脾之血脉也蓋肝虛則陰傷而煩心不能藏魄故不得眠也傷寒虛煩多汗及虛

人盜汗。皆炒熟用之。總取收斂肝脾之津液也。歸脾湯用以滋養榮血。則脾熱自除。單用煮粥。降煩益陰。氣膽氣虛而魂夢安矣。今人專以爲心家藥。殊昧此理。

白朮 辛寒無毒。本經主心腹痛。難脣脢脰。止痛決刺結。發明 白朮乃小朮樹上針。故能決刺破結。本經主癰腫滑膿。與兒利不甚相遠。別錄治丈夫虛損陰痿精自出。補腎氣益精髓。療喉痺不通。又治腹脇刺痛。尿血痔漏。皆取其透達肝腎二經也。

蕤仁 甘溫無毒。去殼易浸。去皮尖水煮過研細。紙色壁去油用。本經主心悶邪熱結。氣明日日亦痛傷。汎出自目腎督脈。發明 蔓仁甘溫而潤。能治諸經風熱之邪。心腹邪熱結氣。不獨治目疾也。眼風癢或生翳。或赤背黃連。蕤仁去皮研膏等分。以乾棗去核填入。煎水點眼甚驗。但不因風熱而因於虛者勿用。

山茱萸 酸溫無毒。去核微焙用。核能泄精。發明 滑則氣脫。濁以收之。山茱萸止小便利。祕精氣取其酸濁以收滑也。甄權治腦骨瘡耳鳴。補腎氣興陽道。堅陰莖。添精髓。止老人尿不節。治面上瘡能發汗。止月水不定。詳能發汗。當是能發汗之誤。以其酸收。無發越之理。仲景八味丸用之。蓋腎氣受益。則封藏有度。肝陰得養。則疏泄無虞。乙癸同源也。命門火旺。亦濁淋痛。及小便不利者禁服。○本經食茱萸主治。從古誤列山茱萸條內。今移入彼。庶不失先聖立言本旨。具眼者辨諸。

金櫻子 甘酸溫無毒。剖開去核及毛用。發明 金櫻子止小便遺泄。濁精氣取其甘溫而濁也。夫經絡隧道。以通暢爲和平。而昧者無過服之。以取快然。則不可。若精氣不固者。服之何咎。又有但陰虛多火人。誤服。每致溺濁。並痛不可不慎。

郁李仁 即棠棣一 仁辛苦平無毒。湯浸去皮。及雙仁者研如膏。勿去油。忌牛馬肉及諸酪。本經主大腹水氣。面目四肢浮腫。利小便水道。發明 郁李仁性潤而降。爲大便風祕專藥。本經治大腹水氣。面目四肢浮腫。取其潤下之意。利小便水道者。水氣從之下越也。搜風順氣丸用之。雖有潤燥之功。而下後令人津液虧損。虛急。老人津液不足。而燥結者。戒之。根治風蟲牙痛。濕瘻。煎含漱冷。卽吐去更含勿漱。以其能降泄也。

鼠李 當作柏子。一名牛李子。熟汁可以染緑。或又名綠子。 苦涼微毒。本經主寒熱。摩麿瘡。發明 牛李生青熟黑。而帶

紅紫入肝腎血分其味苦涼善解諸經伏匿之毒本經治寒熱癱瘓大明治水腫腹滿蘇恭治下血及疝瘕積冷搗敷牛馬瘡中生蟲時珍治疥癬有蟲者取其去濕熱之功惜乎世鮮知用惟錢氏必勝膏治痘瘡黑陷皮出不快或觸穢氣裏陷方用牛李熬膏桃膠湯化見子大一丸如人行十里再進一丸其瘡自然紅活蓋牛李解毒去濕熱桃膠辟惡氣活血耳。

女貞實 苦甘微寒無毒其子黑者爲女貞實若紅色者即爲女青非女貞也。發明 女貞少陰之精但性稟純陰味偏寒滑膩胃虛人服之往往減食作瀉以本經拘骨主治誤列此味之下後世繆認女貞有補中安五臟之功多致誤用滋患甚因表而出之。

拘骨一名猶兒刺俗名十大小功勞 微苦甘平無毒 本經補中安五臟養精神除百病久服肥健輕身不老。發明 拘骨本經諸家本草皆誤列女貞條下味苦甘平有補中安五臟養精神除百病久服肥健輕身不老之功皆指拘骨而言女貞至陰之物安有如上等治乎其木屬冬不凋葉生五利其子正亦尤爲活血散瘀堅強筋骨之專藥又爲填補髓藏固斂精血之要品僅見丹方不入湯丸古方惟浸酒補腰脚令健枝葉燒灰淋汁或煎膏塗白癩風今方士每用數斤去刺入紅棗二三斤熬膏蜜收治勞傷失血痿軟往往獲效以其能調養血氣而無傷中之患也其脂爲鴉以枯禽鳥其能滋培精血可知。

銜矛箭羽 苦寒無毒生山石間小株成叢葉似野茶三四月生小黃綠花實如冬青子條上有羽如箭視之若三羽故名之若三 本經主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠶疰即 發明 鬼箭專散惡血故本經有崩中下血之治別錄治中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫即 腹滿汗出除邪殺鬼毒蠶疰之治今人治賊風即 諸癰婦人產後血暈血結聚於胸中或偏於脇肋少腹者四物倍歸加鬼箭羽紅花玄胡牽煎服以其性專破血力能墮胎妊娠禁服。

南燭牛筋樹也俗名烏柏 苦平無毒 發明 凡滋腎藥皆能傷脾此獨止泄除睡者氣與神通藏器言久服輕身不饑變白不老者強精益氣之驗千金月令方用之今四月八日煮汁送青精飯是也。

五加根皮 辛溫無毒 本經主心腹疝氣腹痛益氣療癰小兒三歲不能行痘瘡陰蝕 發明 五加者五車星

之精也爲風濕瘡癩。壯筋骨助陽氣之要藥。本經治心腹疝氣腹痛。益氣療癓。小兒三歲不能行。其溫補下元。壯筋除濕可知。別錄治男子陰瘻。囊下濕。小便餘沥。女人陰瘻。腰脊痛。肺脾風弱。大明治骨節拘攣。蘇恭主四肢攀急。種種皆須釀酒。則力勢易行。非湯藥中所宜。

枸杞 甘平無毒。河西及甘州者良。本經主熱中消渴。久服堅筋骨。耐寒暑。發明 枸杞子味甘色赤性溫無疑。根味微苦性必微寒。緣本經根子合論無分。以致後人或言子性微寒。根性大寒。或言子性太溫。根性苦寒。蓋有惑於一本無寒熱兩殊之理。夫天之生物不齊。都有豐於此而濶於彼者。如山茱萸之肉濡精。核滑精當歸之頭。止血尾破血橘實之皮滑瘦。膜敗殘不一而足。即史帝之嘗藥。不過詳氣味形色。安有味甘色赤形質滋腴之物性寒之理。本經所言主熱中消渴。堅筋骨。耐寒暑。是是指其子而言。質潤味厚。峻補肝腎。衝督之精血。精得補益。水旺骨強。而腎虛火炎。熱中消渴。血虛目昏。腰膝疼痛。悉愈而無寒暑之患矣。所謂精不足者。補之以味也。古諺有云。家千里勿食枸杞。甚言補益精氣之速耳。然元陽氣衰。陰虛精滑。及婦人失合。勞嗽之人。慎用以能益精血。精旺則恩偶。理固然也。

地骨皮 甘淡微寒無毒。泉州者良。本經主五內邪氣。周痹風濕。久服堅筋骨。輕身不老。發明 地骨皮。枸杞根也。三焦氣分之藥。下焦肝腎虛熱。骨蒸目汗者宜之。熱溼於內。渴以甘寒也。人但知今連治上焦之火。不知柏治下焦之火。謂之補陰降火。不知地骨之甘寒平補。有益精氣退邪火之妙。時珍嘗以青蒿佐地骨退熱。屢有殊功。又主骨槽風證。亦取入足少陰味薄即通也。本經主五內邪氣。周痹風濕。輕身不老。取其甘淡化熱。苦寒散濕。濕散則痹著通。熱化則五內安。其氣清。其味薄。其質輕。誠爲修真服食之仙藥。按續仙傳云。宋孺子見溪側二花大逐入枸杞叢下。掘之得根形如二犬。烹而食之。忽覺身輕。本經之輕身不老可確徵矣。則枸杞之滋益。不獨在于葉。而根亦不止於退熱也。齒葉微苦。亦能降火及清頭目。

溲疏 巨骨 苦平。一云平寒無毒。本經主皮膚中熱。除邪氣。止遺溺。利水道。發明 溲疏與枸杞相類。先哲雖以有利無刺。樹高樹小分辨然。枸杞未嘗無刺。但樹小則刺多。樹大則刺少。與酸棗白棗無異。本經枸杞條下主五內邪氣。熱中消渴。即溲疏之除邪氣也。枸杞條下主周痹風濕。即溲疏之止遺溺。利水道也。除去五內之邪。則熱中

消渴愈矣。疏利水道之熱則周，解風濕痊矣。瀉利疏利則氣化無滯。子葛上亭長同清子賦三十六疾。其清利風熱之性可知。或云巨骨即地骨之大者。按種樹書云。收子及掘根種肥壤中待苗生。剪為蔬食甚佳。瀉疏之名未必非此。

石南 辛苦平。本經養腎氣內傷陰衰。利筋骨皮毛。發明 石南嚴冬不凋凌霜正赤。性溫益腎可知。本經養腎氣內傷陰衰。利筋骨皮毛。皆取益腎之功。古方為風痹腎弱要藥。今人絕不知用。蓋由甄氏藥性論有令人陰痿之說。殊不知服此藥者能令腎強。嗜慾之人藉此放恣以致痿弱而歸咎於藥。良可慨也。

壯荆即黃 寶苦溫。根葉甘苦平。莖瀉甘平無毒。發明 荆為治風逐濕祛痰解熱之藥。寶除骨間寒熱下氣治心痛。及婦人白帶。炒熟酒煎服治小腸疝氣。浸酒治耳聾。葉治霍亂轉筋。下部濕蠱脚氣腫滿以荆莖入蟬中燒烟薰湧泉穴及痛處。汗出則愈。搗爛盦蛇傷。根主頭心肢體諸風。解肌發汗。莖治火灼瘡爛。煎水漱風牙痛。荆瀉除風熱開經絡。導痰泄行血氣。解熱利十金翼云。凡患風人多熱。嘗宜以竹瀉荆瀉薑汁和勻熱服。以發為度。熱多用竹瀉。寒多用荆瀉。二汁同用。並以薑汁助逆。則不凝滯。但氣虛不能食者。則用竹瀉。氣寶能食者。則用荆瀉。

蔓荆子 苦辛溫無毒。本經主筋骨間寒熱濕痹拘攣。明目堅齒利九竅去白蟲。發明 蔓荆子入足太陽體輕而浮。故治筋骨間寒熱濕痹拘急。上行而散。故能明目堅齒。利九竅去白蟲。及風寒目痛。頭面風虛之證。然胃虛人不可服。恐助痰濕為患也。凡頭痛目痛。因風邪而血虛有大者。禁用。瞳神散尤忌。

紫金皮 苦平無毒。苦如膽而紫厚者良。發明 紫荆木之精也。入手足厥陰血分。能破宿血。下五淋通小腸。解諸毒。治傷寒亦勝。黃耳活血消腫為枝。詹必用之藥。治癰疽流注諸毒。冷熱不明者。用紫荆皮獨活赤芍白芷白蠟炒為末。葱湯調敷。痛甚筋不舒者。加乳香甚驗。

木槿根皮 甘苦微寒無毒。發明 槿為棘科。要藥潤燥活血。川中所產質厚色紅。稱勝而世不易得。木槿皮亦可用之。但力薄耳。其治風風下血。取其清熱滑利也。其治刺後作渴。餘熱在經津液不足也。○其花以千瓣白者為勝。陰乾為末。治反胃吐食。陳橘未湯下二錢。日再服。紅者治腸風血。刺白者治白帶白痢。並培入藥。子治偏正頭風。燒煙薰患處。并用為末。酒服一錢。乙效。

美容 半平無毒。發明 美容葉散瓣，殊有神效。爲醫祕其名。爲清涼膏、鐵箍散皆此藥也。加生大黃、赤小豆、朱雀杏，其功甚捷。

山茶花 苦溫無毒。發明 山茶色紅味苦，開於青陽初動之時，得肝木之氣而生心火。肝藏血，心主血，故吐血衄血下血，爲要藥。生用則能破宿生新，入童便炒黑，則能止血。其功不減鬱金。真血家之良藥也。

密蒙花 甘平微寒無毒。觀之卽曉者，真。擣淨酒浸一宿，濾出眼乾。發明 密蒙入肝經，血分潤肝燥，爲搜風散結目疾之專藥。治青盲昏瞽，赤腫多眵，淚溢目中赤脈，及小兒痘瘡餘毒，角氣攻眼，宜之。

木棉子 半溫無毒。發明 木棉葉青花黃，並赤棉白子黑，尤爲溫走命門之品。取子燒存性，不獨解微瘡毒，而痔漏脫肛下血，每服半兩，黑豆淋酒服之，其油然燭能令人目，以其助溼火也。

柞木皮 苦平無毒。發明 作專利袋，故治黃疸、鼠癰、堆生，並燒末用之。

黃楊 苦平無毒。發明 黃楊性歛而降，婦人難產，入達生散中服之，則崩障便繫。又搗葉塗瘡癩，以其性歛也。放枝木 甘溫無毒。發明 放枝專治一切風氣血氣，理腰脚。老人浸酒服之一月，放枝，故名。

接骨木 一名續骨木，又名木通 甘苦平無毒。發明 此本專主折傷，續筋骨，除風癆，鷗處可作浴湯。根皮主癰飲水，氣痰癥，打傷瘀血，一切血不行，並煮汁服之，不可多服，以氣腥傷胃氣也。

寓木部

伏苓 甘淡平無毒。入補氣藥，人乳潤蒸，入利水藥，桂酒拌晒，入補陰藥，童便浸切一種裁時而成者，曰時苓。出浙中，但白不堅，入藥少力。凡用須去盡皮膜，則不傷真氣。以皮能泄利津液，膜能阻滯經絡也。本經主胸膈逆氣，憂恚驚恐，心下結痛。寒熱煩滿，欲泄口焦舌乾，利小便。久服安魂養神，不饑延年。發明 伏苓得松之餘氣而成，甘淡性平，能守五臟真氣。其性先升後降，入手足太陰少陰，足太陽陽明，開胃化痰，利水定悸，止嘔逆泄渴，除濕氣，散虛熱。本經治胸膈逆氣，以其降泄也。憂恚驚恐，心下結痛，以其上通心氣也。寒熱煩滿，欲泄口焦舌乾，利小便，以其導熱滋乾，流通津液也。本草言其利小便，伐胃邪。東垣云：小便多者能止渴，渴者能通，又大便濡者可止。大便約者，可避丹溪言：陰虛者不宜用。義似相反者，何哉？蓋伏苓淡滲上行，生津液，開腠理，滋水之源，而下降利小便，潔古

謂其屬陽浮而升言其性也東垣言其陽中之陰降而下言其功也經言飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱則知淡滲之性必先上升而後下降膀胱氣化而小便利矣若肺氣盛則上盛下虛不能分利水穀偏滲大腸而泄注也伏苓分利陰陽則濁自止矣大便約者以膀胱之水不行膀胱硬滿上擗大腸故大便不能下通也宜伏苓先利小便則大便隨出也至若肺虛則遺溺心虛則少氣遺溺下焦虛則遺溺脫過熱於膀胱則遺溺膀胱不約爲遺溺厥陰病則遺溺皆虛熱也必上熱下寒當用升陽之藥非伏苓輩淡滲所宜故陰虛不宜用也此物有行水之功久服損人八味丸用之不過援引他藥歸就腎經去胞中久陳積垢爲搬運之功耳是以陰虛精滑而不覺及小便不禁者皆不可服以其走津也其赤者入丙丁但主導赤而已其皮治水腫膚腫通水道開腠理勝於大腹皮之耗氣也

伏神 甘淡平無毒即伏苓中之抱根而生者發明 神農本經只言伏苓明醫別錄始添伏神而主治皆同後人治心病必用伏神故潔古云風眩心虛非伏神不能除然伏苓未嘗不治心病也陶弘景始言伏苓亦瀉白補此發前人之祕時珍謂伏苓伏神只當云亦入血分白入氣分如牡丹芍藥之義伏神中所抱之木治風濕筋骨等病與松節同功

琥珀 甘平無毒出番禺楓木脂膏所化俗云伏苓千年化琥珀此誤傳也 發明 古方用琥珀利小便以燥脾土有功脾能運化肺氣下降故小便可通若陰虛內熱大便水涸血少不利者反致燥結之苦其消癰逐利之性非血結膀胱者不可誤投和大黃龍甲作散酒下方尤治婦人腹內惡血血盡則止血結腫脹腹大如鼓而小便不通者須兼沉香輩破氣藥用之又研細傅金瘡則無瘢痕亦散血消癰之驗凡陰虛內熱大便水涸小便不利者勿服服之愈損其陰滋害彌甚

豬苓 甘淡微苦平無毒本經主癰瘍解毒蠱症不詳利水道久服輕身耐老 發明 猪苓入腎與膀胱血分性善疏利經府世人但知爲利水專藥不知其有治癰瘍蠱症之功仲景治消渴脈浮小便不利微熱者猪苓散汗之病欲飲水而復吐名曰水逆五苓散主之猪苓專司引水之功久服必損腎氣昏人目利小便之劑無如此驗故

本
不入補劑。非澤渴之比也。而本經又云久服輕身耐老。是指素多濕熱者而言。不可一律而推。

雷九 苦鹹寒小毒。竹之餘氣所結。皮黑肉白者良。入藥炮用。赤黑色者殺人。本經殺三蟲。逐毒氣。胃中熱利丈夫。不利女子。發明 雷九功專殺蟲。楊勑得異症。每發語則腹中有小聲。漸漸聲大。有道士曰。此應聲蟲也。但讀本草取不應者治之。讀至雷九不應。逐頓服數粒而愈。此追蟲下積之驗也。本經稱其利丈夫。別錄云。久服陰痿。似乎相反。不知利者疎利之也。疎利太過。則閉藏失職。故陰痿也。千金治小兒傷寒。不能服藥。治方中伍用之。取其逐毒氣之功也。

桑寄生 苦甘平無毒。本經主腰痛。小兒背強壅腫。充肌膚。堅髮齒。長鬚眉。安胎。發明 寄生得桑之餘乳而生性。專怯風。逐濕。通調血脉。故本經取治婦人腰痛。小兒背強等病。血脉通調。而肌膚眉鬚皆受其陰。即有臃腫。亦得消散矣。古聖禱物取象。其以寓形榕木。與子受母氣無異。故為安胎聖藥。別錄言去女子崩中。產後餘疾。亦是去風除濕。益血補陰之驗。惟西蜀南粵。不經飼蠶之地。始有。故真者絕少。今世皆榕樹枝質充。慎勿誤用。其真者絕不易得。故古方此味之下有云。如無以續斷代之。於此可以想象其功用也。

松蘿 苦甘平無毒。本經主頭怒邪氣。止虛汗。頭風。女子陰寒腫痛。發明 松蘿是松上女蘿。又名鬼絲。能平肝怒。去寒熱。邪氣。其去頭風。止虛汗者。本乎天者。清上也。別錄。療痰熱。熱溫瘡可為吐湯。利水道。故附後方同瓜蒂杜衡酒漬再宿。旦飲一合。取吐胸中痰熱。頭痛。十全方同瓜蒂恆山甘草。水酒和煎。取吐胸膈痰癰。以其輕清上涌。故吐藥用之。

芑木部

竹葉 甘微寒小毒。本經主欬逆上氣。療筋急惡瘍。殺小蟲。發明 諸竹與筍皆甘寒無毒。惟竹葉受陰風烈日氣多。故不無小毒。本經主欬逆上氣者。以其能清肺胃之熱也。療筋急惡瘍者。以其能化身中之氣也。氣化則百骸條暢。何有小蟲之患乎。仲景治傷寒解後。虛羸少氣。氣逆。有竹葉石膏湯。金匱治中風發熱。面赤頭痛。有竹葉湯。總取清肺胃虛熱之義。

竹茹 甘寒無毒。取竹如法。選大青竹破片刮去外膜。取第二層。如麻縷者。除去屑。末用之。發明 竹茹專清

胃府之熱為虛煩煩渴。胃虛嘔逆之要藥。欬泄唾血。產後虛煩無不宜之。金匱治產後虛煩嘔逆有竹皮大丸千金。治產後內虛煩熱短氣。有甘竹茹湯。產後虛煩頭痛狂氣悶亂不解。有淡竹茹湯。內虛用甘以安中。悶亂用淡以清胃。各有至理存焉。其性難寒而滑。能利竅。可無鬱遏客邪之慮。

竹瀝 甘寒無毒。取竹瀝法。以青竹斷二尺許。劈開大矣。兩頭盛取用之。如欲多取。以罐埋土中。蒸泥糊好。量罐口大小。用箇極二道。鑿入罐口。著炭火於竹頭上炙之。發明 竹葉兼行肌表。故能療瘡。瘻殺蟲。竹如專清胃府。故能止嘔除煩。竹葉善透經絡。能治筋脈拘攣。痰在皮裏膜外。筋絡四肢。非竹瀝不能化之。純陰之性。雖似大過然。須薑汁鼓動其勢。方得應手取效。千金治風症身無痛四肢不收。志亂甚。有竹瀝飲子。詳本經。療筋脉急專取竹瀝。之潤以濡之也。千金治四肢不收。則兼附桂羚羊之雄以振之也。一以舒急。一以收緩。妙用不可思議。或言竹瀝性寒。僅可使之熱症。不知入於附桂劑中。未嘗不開發濕痰。寒飲也。惟胃虛陽滑。及氣阻便闊者。誤投無致晚逆不食。脫潰不止。而覺陰柔之性。不發則已。發則必暴。卒難挽回也。

筍 甘微寒小毒。發明 諸筍多食皆動氣。發冷癥。令人心痛。與羊肝食之。損目。脾胃虛弱。大腸滑渴。皆不宜食。俗醫治痘。往往勸啜筍湯。及加入湯藥。不知痘瘡不宜大腸滑利。而筍有刮腸洗之名。若脾胃不實尤忌。惟血熱毒盛者為宜。其乾筍淡片。利水豁痰。水腫草巒丸用之。

竹黃 甘寒無毒。發明 竹黃出大竹之中。津氣結成其味功用與竹瀝同。而無寒滑之毒涼心經去風熱為小兒驚癇。風熱痰濁失音。治痰消熱之要藥。以其生天竺國。故名天竺黃。今藥肆多燒諸骨及烏粉雜入。不可不慎。震燒木 發明 雷氣通於心。故可治失心驚悸之病。又掛門戶。大壓火災。

藏器部

錦 新絳 黃絳 細發明 錦灰主失血血崩。金瘡出血。新絳治婦人血崩。絳本主血。加以色絳。又用嫩灰所。以取治失血有效。自然黃絳。絳者汁服。止消渴及產婦胞損。為補膀胱要藥。綿灰能止吐衄崩中。及大小便諸血。褲襦 發明 仲景治陰陽易病。身重少氣。腹急引陰。膝脰拘急者。燒褪散主之。取褪中近陰處。剪灰水調方寸。是日三服。小便即利。陰頭微腫則愈。男用女根。女用男根。

裹脚布 發明 男子裹脚布取煙軟者。送其腹則腹痛漏利便。山婦人欲回乳以男子裹脚布勒住一宿即山功效勝於服藥也。

鑿柄 發明 鑿柄治妊娠難產。燒灰酒服取其開鑿孔竅也。統楔燒服取其迅發之疾也。

弓弩弦 發明 難產取弓弩弦縛腰及燒弩牙納酒中飲之。皆取發機快疾之義。時珍曰：弓弩弦催生取其速疾也。折弓弦止血。取其斷絕也。

敗蒲扇蒲席 發明 蒲性本寒。加以爲扇至敗。汗漬日久。鹹寒相濟。故用以燒灰和粉撲身。取扇動招風止汗之義。敗蒲席取久臥脊燒灰酒服二錢。治隆仆惡血。同蒲黃當歸赤芍林硝煎湯調服。汗乃血液沾濡日久。用以燒灰同氣相感之應也。

漆器 發明 漆本散血。故用燒煙治產後血暈。熏之即甦。又殺諸蟲。

燈蓋油 苦辛寒小毒 發明 油性熱之愈寒。燈油得火氣最深。故取以治卒中風不省。唯取灰用鵝翎蘸掃喉中。涌吐頑痰通其上述。然後用藥。

坎單布 發明 坎單布受熱氣最多。故用以治湯火薰蒸面目浮腫燒未數之即消。以類相感也。金匱治勞馬一切筋骨傷損亦用之。青布燒灰蜜調敷熱毒瘡效。

敗皺皮 平無毒 發明 敗皺皮專主蠱毒。取其形空而聲響遠振也。燒作屑水和服之。病人即喚蠱王姓名。呼本王取蠱即瘥。梅師云：凡中蠱毒或下血如鵝肝或吐血或心腹切痛。如有物啖不即治之。食人五藏即死。欲知是蠱與否。但令病人以唾吐水沉者爲是。浮者爲非。用敗皺皮燒灰酒服方寸匕。須臾自呼蠱王姓名。外臺祕要云：治蠱取敗皺皮。廣五寸長一尺。薑微根五寸。如拇指大水一升。酒三升。煮二升服之。當下蠱毒即愈。