

薛立齋醫案全集

辛酉孟夏中游
立齋署

女科撮要前序

余聞軒岐事業邈哉邈矣其言說流布至今未盡泯也然傳者或效或否豈其書不可盡信耶是信乎人焉耳語曰醫不通儒不可以言醫其以是歟太醫院使薛君立齋雅近於儒其以醫名世也固宜君嘗以日所施活者述其病原詳其脉候著其方驗有所得輒錄之積彙成帙標曰家皆醫錄他日呈予大司馬中丞約菴翁翁覽而善之授余以鋟諸梓且命申其說余曰嘻是仁者之心哉或曰何謂也夫醫術也而心術觀焉世之醫者得一方輒以自祕取一效即以自多人病在身而渠病在心且弗之藥是尚可以言醫薛君以名醫致身不自祕而以示人將欲致人人於名醫中丞翁撫綏畿輔振衰別弊既登斯民仁壽之域復布其醫書欲壽斯民於無窮茲非仁者之事哉是宜梓之以訓于世觀者毋徒執其方而求得其心焉則是錄也其可傳矣

嘉靖戊申春正月吉劍江存所范慶書

上海大成書局印行

女科撮要目錄

上卷

經候不調

經漏不止

經閉不行

帶下

血分水分

小便出血

熱入血室

師尼寡婦寒熱

歷節痛風

流注

癆癧

乳癰乳巖

血風瘡

膿瘡

陰瘡

各症方藥

下卷

保胎

小產

保產

子死腹中

胎衣不出

父骨不開陰門不閉子宮不收

產後腹痛

產後血暈并失血

產後發癆

產後便血

產後大便不通

產後寒熱

產後咳嗽

產後瘧疾

產後泄痢

各症方藥

經候不調

經曰飲食入胃遊溢精氣上輸於脾。脾散精上歸於肺。通調水道下輸膀胱。水經四布五經並行。故心脾平和則經候如常。苟或七情內傷。六淫外侵。飲食失節。起居失宜。脾胃虛損。則月經不調矣。若先期而至者。有因脾經血燥。有因脾經鬱滯。有因肝經怒火。有因血分有熱。有因勞役火動。其過期而至者。有因脾經血虛。有因肝經血少。有因氣虛血弱。主治之法。脾經血燥者。加味逍遙散。脾經鬱滯者。歸脾湯。肝經怒火者。加味小柴胡湯。血分有熱者。加味四物湯。勞役火動者。補中益氣湯。脾經血虛者。人參養榮湯。肝經血少者。六味地黃丸。氣虛血弱者。八珍湯。蓋血生於脾土。故云脾統血。凡血病當用苦甘之劑。以助其陽氣。而生陰血。則屬不足。大凡肝脾血燥。四物為主。肝脾血弱。補中益氣為主。肝脾鬱結。歸脾湯為主。肝經怒火。加味道逍遙為主。

治驗肝經怒火風熱等症附

一婦人內熱作渴。飲食少思。腹內近左初如雞卵漸大四十許。經水三月一至。肢體消瘦。齒頰似瘡。脈洪數而虛。左關尤甚。此肝脾鬱結之症。外貼阿魏膏。午前用補中益氣湯。午後以加味歸脾湯。兩月許。肝火少退。脾土少健。仍與前湯。送六味地黃丸。午後又用逍遙散。送歸脾丸。又月餘。日用蘆薈丸二服。空心以逍遙散下。日晡以歸脾湯下。喜其謹疾。調理年餘而愈。

一婦人腹內一塊。不時上攻。或痛作聲。吞酸宿悶。月經不調。小便不利。二年餘矣。面色青黃。相兼。余作肝脾氣滯。以六君子加芎歸柴胡炒連木香吳茱各少許。二劑却與歸脾湯下。蘆薈丸三月餘。肝脾和而諸症退。又與調中益氣加茯苓丹皮中氣健而經自調。

一婦人發熱口乾。月經不調。兩腿無力。服祛風滲濕之劑。腿痛體倦。二膝浮腫。經事不通。余作肝脾腎三

經血虛火燥極名鶴膝風。用六味八味二丸兼服兩月形體漸健飲食漸進膝腫漸消不半載而痊前症若脾腎虛寒腿足軟痛或足膝枯細用八味丸若飲食過多腿足或腎內發脹或浮腫作痛用補中益氣加茯苓半夏主之。

一婦人性沉靜勤於女工善怒小腹內結一塊或作痛或痞悶月經不調恰服伐肝之劑內熱寒熱胸膈不利飲食不甘形體日瘦牙齦齲爛此脾土不能生肺金肺金不能生腎水腎水不能生肝木當滋化源用補中益氣六味地黃至仲春而愈。

松江太守何恭人性善怒腹聚一塊年餘形體骨立條熱往來脣齦透腮或泥春旺木耗土乃行伐肝時季冬肝脉洪數按之弦緊餘脉微弱余曰洪數弦緊肝經真氣虛而邪氣實也自保不及何能耗土况面色青中隱白乃腎水不足肝木虧損肺金耗制惟慮至春木不能發生耳。勉用壯脾胃滋腎水之劑肝脉悉退後大怒耳內出血肝脉仍大按之如無煩燥作渴此無根之火以前藥加肉桂二劑肝脉仍熱渴頓退復因大怒以致飲食不進果卒於季冬辛巳日此木衰弱而金刑耗信夫。

一婦人經候過期發熱倦怠或用四物黃連之類反兩月一度且少而成塊又用峻藥通之兩目如帛所蔽余曰脾為諸陰之首目為血脉之宗此脾傷五臟皆為失所不能歸於目矣遂用補中益氣濟生歸脾二湯專主脾胃年餘尋愈。

一婦人兩鬢後頭及太陽面青善怒余作胆經風熱用選奇湯合逍遙散加山梔天麻黃芪半夏黃芩而愈此症失治多致傷目或兩耳出膜則危矣。

一婦人耳鳴內熱經行不調肢體倦怠飲食無味余以為肝脾虛熱用四君加柴胡山梔丹皮甘草而愈一婦人素勤苦冬初患咳嗽發熱久而吐血盜汗經水兩三月一至遍身作痛或用化痰降火口噤筋掣謂余曰何也余曰此血虛而藥益損耳遂用加減八味丸及補中益氣加麥門五味山藥治之年餘而痊一婦人耳內或耳後項側作痛寒熱口苦月經不調余以為肝火氣滯而血凝用小柴胡加山梔川芎丹

皮治之諸症悉退

一婦人年四十。素性急。先因飲食難化。月經不調。服理氣化痰藥。反壯腹膨脹。大便泄瀉。又加烏藥。蓬术。壯腹。腫脹小便不利。加猪苓。澤瀉。淡喘急。平足厥冷。頭面肢體腫脹。指按成窟。脉沉細。右寸為甚。余曰。此肺脾之氣虛寒。不能通調水道。下輸膀胱。滲泄之令不行。生化之氣不運。即東垣所云。水飲留積。若土之在雨中。則為泥矣。得和風暖日。水濕去而陽化自然。萬物生長喜其脈相應。遂與金匱加減腎氣丸。服之。小便即通。數劑腫脹消半。四肢漸溫。自能轉側。又與六君子加木香肉桂炮薑。治之全愈。後不戒七情飲食。即為泄瀉。仍用前藥加附子五分而安。

一婦人飲食每用碗許相加。非大便不費。必吞酸噯腐。或以為胃火。用二陳黃連枳實。加內熱作嘔。余曰。此未傳寒中。故噯氣吞酸。脹滿痞悶。不信。仍作火治虛症。並至月經不止。始信。余以六君子加炮薑木香數劑。元氣漸復。飲食漸進。又以補中益氣加炮薑木香茯苓半夏數劑全愈。後因飲食勞倦。兼之怒氣飲食頓少。元氣頓怯。用前藥更加發熱。誠似實火。脉洪大。按之而虛。兩尺如無。此命門火衰。用補中益氣加薑桂。又八味丸兼服。兩月餘。諸症悉愈。此症若因中氣虛弱者。用參理中湯。或六君子加木香炮薑。不應。用左金丸。或越鞠丸。虛寒者加附子。或附子理中湯。無有不愈。

一婦人素有頭暈。不時而作。月經遲而少。余以為中氣虛不能上升。而頭暈不能下化。而經少。用補中益氣湯。而愈後。因勞而仆。月經如涌。此勞傷火動。用前湯加五味子一劑。服之即愈。前症雖云亡血過多。氣滯各五分。乾山藥。山茱萸。各一錢。熟地四錢。酒炒黑黃柏七分。知母五分。不數劑。而諸症悉愈。皆用分無所附。實因脾氣虧損耳。

一婦人年四十。勞則足跟熱痛。余以為陰血虛極。急用聖愈湯。而痊後。遍身搔痒。誤服風藥。發熱抽搐。肝脉洪數。此乃肝家血虛火盛而生風。以天竺胆星為丸。用四物。麥門五味。芩連炙草。山梔柴胡煎送而愈。一婦人兩足發熱。日晡益甚。小便自遺。或時不利。余以為肝熱陰虛。不能約制。平前用白朮茯苓。丹皮澤瀉。各五分。乾山藥。山茱萸。各一錢。熟地四錢。酒炒黑黃柏七分。知母五分。不數劑。而諸症悉愈。皆用分無所附。實因脾氣虧損耳。

利之劑愈損真陰心致不起。

一婦人月事未期而至。發熱自汗。服清熱止汗之劑。反作渴頭痛。手掉身麻。此因肝經風熱。用柴胡炒芩連炒山梔歸芍。生地丹皮各一錢。參芪苓术各一錢五分。川芎七分。甘草五分。二劑其汗全止。更以補中益氣而愈。凡發熱久者。陽氣亦自病。須調補之。

一婦人經行後勞役失調。忽然昏懵。面赤吐痰。此元氣虛火妄動。急飲童便。神恩漸爽。更用參芪各五錢。芎歸各三錢。玄參。柴胡。山梔。羌草各一錢一劑。又用逍遙散加五味。麥門硝定。但體倦面黃。此脾土真虛之色也。又以十全大補加五味。麥門治之而愈。若投以發散之劑。禍在反掌。慎之。

西賓錢思習子至年三十。尚無嗣。月經淋瀝無期。夫婦異處者幾年矣。思習欲為娶妾。以謀諸余。余曰。此鬱怒傷肝。脾虛火動。而血不歸經。乃肝不能藏脾不能攝也。當清肝火。補脾氣。遂與加味歸脾逍遙二藥。四劑送至其家。仍告其姑曰。服此病自愈。而當受胎。妾可無娶也。果病愈。次年生子。

一婦人多怒。經行或數日。或半月即止。三年後淋瀝無期。肌體倦瘦。口乾內熱。盜汗如洗。日晡熱甚。余用參芪歸木。茯神。遠志。棗仁。麥門五味。丹皮。龍眼肉。羌草。柴胡升麻。治之獲痊。此症先因怒動肝火。血熱妄行。後乃脾氣下陷。不能攝血歸源。故用前約。若胃熱亡津液。而經不行。宜清胃。若心火亢甚者。宜清心。若服燥藥過多者。宜養血。若病久氣血衰。宜健脾胃。

一婦人年五十。內熱。晡熱。經水兩三月一來。此血虛而有熱。用逍遙散加山茱萸治之而愈。若兼有痰作渴。或小便不調。或頭暈白帶。宜用腎氣丸。

一婦人氣血素虛。經行不調。飲食少思。日晡熱甚。用十全大補加山茱萸。丹皮。麥門五味而愈。次年秋患寒熱。或用清脾飲。而元氣愈弱。余仍以前藥而愈。形體瘦倦。飲食無味。月水不通。宮下腫如黑棗。或用通經丸等藥而死。

一婦人善怒經不調唇脣裂服消毒藥唇脣出血年餘矣余曰當培養脾胃以滋化源不信仍服前藥及追蝕狀如翻花爛而死

一膏梁之婦產後月經不調唇脣裂服消毒藥唇脣出血年餘矣余曰當培養脾胃以滋化源不信仍服前藥及追蝕狀如翻花爛而死

一婦人性善怒產後唇脣內熱用清熱敗毒唇口腫脹日晡熱甚月水不調用降火化痰食少作嘔大便不實唇出血水用理氣消導胸膈痞滿頭目不清唇脣經閉用清胃行血肢體倦急發熱煩躁涎水湧出欲用通經之劑余曰病本七情肝脾虧損數行攻伐元氣益虛故耳法當補陰益陽遂以加味歸脾湯加味道遙散補中益氣湯如法調治元氣漸復唇瘡亦愈後因怒寒熱耳痛胸膈張悶唇城腫甚此是怒動肝火而血傷遂用四物合小柴胡加山梔頓愈後又怒脇乳作脹肚腹作痛嘔吐酸涎飲食不入小水不利此是怒動肝木犯脾土乃用補脾氣養脾血而愈又因勞役怒氣飲食失時發熱喘渴體倦不食去血如崩唇腫甚此是肝經有火脾經氣虛遂用補中益氣加炒黑山梔芍藥丹皮而愈此症每見但治其本而不固其本而死者多矣

經漏不止

經云陰虛陽搏謂之崩又云陽絡傷血外溢陰絡傷血內溢又云脾統血肝藏血其為患因脾胃虛損不能攝血歸源或因肝經有火血得熱而下行或因肝經有風血得風而妄行或因怒動肝火血熱而沸騰或因脾經鬱結血傷而不歸經或因悲哀太過胞絡傷而下崩治療之法脾胃虛弱者六君子湯加當歸川芎柴胡脾胃虛弱者補中益氣湯加酒炒芍藥丹梔肝經血熱者四物湯加柴胡山梔苓木肝經怒動者小柴胡湯加山梔芍藥丹皮脾經鬱火者歸脾湯加山梔柴胡丹皮尺傷胞絡者四君子湯加柴胡升麻山梔故東垣丹溪諸先生云凡下血症須用四君子以收功斯言厥有旨哉若大吐血後毋以脉診當

急用獨參湯救之。其發熱潮熱咳嗽脉數乃是元氣虛弱。假熱之脉也。尤當用參之類。此等症候無不由脾胃先損而患故脉洪大。察其中有胃氣受補可救。設用寒涼之藥。復傷脾胃生氣使血反不歸原也。

治驗吐血等症附

一婦人年將七十。素有肝脾之症。每作則飲食不進。或胸膈不利。或中脘作痛。或大便作瀉。或小便不利。余用逍遙散。加山梔。茯神。遠志。木香。而愈。後憂女婿居不時。吐紫血。每作先倦急煩熱。以前藥加炒黑黃連三分。吳茱二分。頓愈。復因怒吐赤血甚多。躁渴垂死。此血脫也。法當補氣。乃用人參一兩。苓术當歸各三錢。陳皮。炮黑乾薑各二錢。炙草木香各一錢。一劑頓止。信藥有回生之功。不可委於天命也。

一婦人年六十有四。久鬱怒頭痛寒熱。春間乳內時痛。服流氣飲之類益甚。不時有血如經行。又大驚恐。飲食不進。夜寐不寧。乳腫及兩脇腋痛如火。午後色赤。余以為肝脾鬱火血燥。先以逍遙散。加酒炒黑龍膽一錢。山梔一錢五分。二劑。腫痛頓退。又二劑而全消。再用歸脾。加炒梔目母。諸症悉愈。

一婦人久患血崩。肢體消瘦。飲食到口。但聞腥臊。口出津液。強食少許。腹中作脹。此血枯之症。肺肝脾胃虧損之患。用八珍湯。烏賊魚骨圓。兼服兩月。而經行百餘劑。而康寧如舊矣。

一婦人性急躁。凜歷後吐血發熱。兩脇張痛。日晡為甚。余以為怒氣傷肝。氣血俱虛。遂朝用逍遙散。倍加炒黑山梔。首柏目母。桔梗。麥門五味。夕以歸脾湯送地黃丸而愈。

一婦人素勤苦。因喪子飲食少。忽吐血甚多而自止。此後每勞則吐。數口。察症已具。形體甚倦。午前以補中益氣。午後以歸脾湯送地黃丸而愈。

一女子素鬱結。胸滿食少。吐血面赤。用地黃丸及歸脾。加山梔。貝母。芍藥而愈。

一婦人面白。或赤。時覺腰間或臍下作痛。四肢困倦。煩熱不安。其經若行。先發寒熱。兩肋如束。其血如崩。此脾胃虧損。元氣下陷。與相火濕熱所致。用補中益氣加防風。芍藥炒黑黃柏。間以歸脾湯調補化源血。自歸經矣。

一婦人因怒崩血。久不已。面青黃。而或赤。此肝木制脾土。而血虛也。用小柴胡合四物。以清肝火。生肝血。又用歸脾補中二湯。以益脾氣。生肝血。而緩。此症若因肝經有風熱。而血不虛者。用防風一味為丸。以兼症之藥煎送。或肝經火動。而血不虛者。用條芩炒為丸。以兼症之藥煎送。無有不効。

一婦人性急。每怒非太陽耳項喉齒胸乳作痛。則胸滿吞酸。吐瀉少食。經行不止。此皆肝火之症。肝自病。則外症見。上受冠則內症作。苦目病見。用四物加白朮。茯苓。柴胡炒梔。炒龍胆苦。內症作用。四君加柴胡。芍藥神麯。吳茱萸炒過。黃連。諸症漸愈。惟月經不止。是血分有熱。脾氣尚虛。以逍遙散倍用。白朮。茯苓。陳皮。又以補中益氣。加酒炒芍藥。兼服而調。

乾內錢氏。年五十歲。辛丑患崩。諸藥罔效。壬寅八月。身熱肢痛。頭暈。涕出。吐痰少食。衆作火治。轉熾絕粒數日。淹淹伏枕。僅存呼吸。兄方浙歸診之。謂脾胃虛寒。用八味丸。料一劑。便急煎服。然胃虛久。始下咽。翌早遂索粥數匙。再剷食。倍熱。減痛止。兼服八味丸。良愈矣。卯秋。因勞役。憂怒。甲辰春夏崩復作。六月二十日。胸飽發熱。脊痛。腰不可轉。神氣怫鬱。或作內傷。或作中暑。崩水沸騰。兼以便血煩渴。引飲粒米不進。至七月十三日。晝夜量憊。時作時止。計無所出。仍屈兄診之。脉洪無倫。按之微弱。此無根之火。內真寒而外假熱也。以十全大補加附子一劑。量止。食粥三四匙。崩血漸減。日服八味丸。始得全愈。乾山妻而構危疾。命懸須臾。荷兄遠救。誠解倒懸之急處。方神良知。無出此野人懷恩。姑俟後日王環之報云爾。嘉靖甲辰。

李秋表弟方乾頓首拜書。

大化內患月事不期。崩血昏憊。發熱不寐。或謂血熱妄行。投以寒剷。益甚。或謂胎成受傷。投以止血亦不効。乃敬延先生診之曰。此脾氣虛弱。無以統攝故耳。法當補脾。而血自止矣。用補中益氣加炮薑。不數劑而驗。惟終夜少睡驚悸。另服八物湯。更不効。叩諸先生曰。雜矣。乃與歸脾湯。加炮薑以補心脾。遂如初。謹叙其梗槩。以附醫按。俾後之患者。得有所取法云。嘉靖甲辰孟冬。晚生歸大化頓首拜書。

經間不行

大經水陰血也。屬衝任二脉。主上為乳。治下為月水。其為患有因脾虛而不能生血者。有因脾鬱傷而血耗損者。有因胃火而血消爍者。有因脾胃損而血少者。有因勞傷心而血少者。有因怒傷肝而血少者。有因腎水不能生肝而血少者。有因肺氣虛不能行血而閉者。治療之法。若脾虛而不行者。調而補之。脾鬱而不行者。解而補之。胃火不行者。清而補之。脾胃損而不行者。調而補之。勞傷心血而不行者。靜而補之。怒傷肝而不行者。和而補之。肺氣虛而不行者。補脾胃。腎虛而不行者。補脾肺。經云。損其肺者益其氣。損其心者調其榮衛。損其脾者調其飲食。適其寒溫。損其肝者緩其中。損其腎者益其精。審而治之。庶無誤矣。

治驗

一婦人停食。飽悶發熱。或用人參養胃湯益甚。再用木香檳榔丸。泄瀉吐痰。腹中成塊。飲食少懶。又用二陳黃連厚朴之類。前症益甚。腹脹不食。月經不至。余以為中氣虧損。用補中益氣加伏苓半夏三十餘劑。脾胃健而諸症愈。又二十餘劑而經自行。前症若脾虛不能消化飲食者。宜用六君子湯。補而消之。虛寒者。加砂仁木香炮薑溫而補之。其食積成形者。以前藥煎送保和丸。大抵食積宿塊。症為有形。所謂邪氣勝則實。真氣奪則虛。惟當養正開邪。而積自除矣。雖然堅者削之。客者除之。胃氣未虛。或可少用。若病久虛乏者。則不宜用。

一婦人飲食後。或腹脹。或吞酸。服枳术丸。吞酸益甚。飲食日少。胞膈痞滿。腿內酸痛。畏見風寒。又服養胃湯。一劑。腿內作痛。又二劑。腿浮腫。月經不行。余以為鬱結所傷。脾虛濕熱下注。晨用四君子歸二陳。午後以前湯送越鞠丸。飲食漸進。諸症漸愈。又用歸脾八珍二湯。兼服兩月餘而經行。

一婦人性沉多慮。月經不行。胸滿少食。或作脹。或吞酸。余以為中氣虛寒。用補中益氣加砂仁香附煨薑。二劑。胸膈和而飲食進。更以六君子加芍歸母桔梗生薑大棗。數劑。脾胃健而經自調矣。

一婦人素有胃火。服清胃散而安。後因勞役躁渴。內熱肌肉消瘦。月經不行。此胃火消爍陰血。用逍遙散。

加丹皮炒梔以清胃熱用八珍湯加伏苓遠志以養脾血而經自行矣。

一婦人久患瘧形體怯弱內熱晡熱目汗盜汗飲食少思月事不行服通經丸虛症悉具此因虛而致瘧疾因瘧而致經閉用補中益氣及六味地黃丸各百餘劑瘧愈經自行。

一婦人久患瘧瘧作則經不行形虛脉大頭癱懶食大便泄濁小便淋漓口乾脣裂內熱腹膨皆元氣下陷相火合病用補中益氣湯治之尋愈惟不時頭痛仍加蔓荆子而痛止又兼用六味地黃丸而經行一婦人因勞耳鳴頭痛體倦此元氣不足用補中益氣加麥門五味而痊三年後得子因飲食勞倦前症益甚月經不行晡熱內熱目汗盜汗用六味地黃丸補中益氣湯頓愈前症若因血虛有火用四物加山梔柴胡不應八珍加前藥若氣虛弱用四君子若怒耳便聾或鳴者實也小柴胡加芎歸山梔虛用補中益氣加山梔若干前甚作火治用小柴胡加炒連炒梔氣虛用補中益氣丸後甚作血虛用四物加白朮茯苓若陰虛火動或兼痰甚作渴必用地黃丸以壯水之主經云頭痛耳鳴丸竅不利腸胃之所生也脾胃一虛耳目九竅皆為之病

一婦人胃氣素弱為哭母吐血咳嗽發熱盜汗經水三月不行余以為悲則傷肺思則傷脾遂朝服補中益氣加桔梗貝母知母夕用歸脾湯送地黃丸而愈

帶下

或因六淫七情或因醉飽房勞或因膏粱厚味或服燥劑所致脾胃虧損陽氣下陷或濕痰下注蘊積而成故言帶也凡此皆當壯脾胃升陽氣為主佐以各經見症之証若屬肝則青小柴胡加山梔或濕熱壅滯小便赤瀉龍膽瀉肝湯屬心則赤小柴胡加黃連山梔當歸屬肺則白補中益氣加山梔屬脾則黃君子加山梔柴胡不應歸脾湯屬腎則黑六味地黃丸若氣血俱虛八珍湯陽氣下陷補中益氣湯濕痰下注前湯加茯苓半夏蒼朮黃柏氣虛痰飲下注四七湯送腎氣丸

治驗

一婦人年踰六十。內熱口乾勞則頭暈。吐痰帶下。或用化痰行氣前症益甚。飲食愈少。肢體或麻。恪服祛風化痰。肢體常麻。手足或冷。或熱日漸消瘦。余曰。症屬脾氣虛弱。而不能生肺。祛風之劑復損諸經也。當滋化源。遂用補中益氣加茯苓半夏炮薑二十餘劑。脾氣漸復。飲食漸加。諸症頓愈。

一婦婦腹脹。協痛。內熱。脯熱。月經不調。肢體時麻。此鬱怒傷損肝脾。前藥益甚也。朝用歸脾湯。以解脾鬱。生脾氣。夕用加味逍遙散。以生肝血。清肝火。兼服百餘劑。而諸症愈。

一婦人瘧久。兼之帶下。發後口乾倦甚。余用七味白朮散。加麥門五味作大劑煎。與恣飲。再發稍可。乃用補中益氣加茯苓半夏十餘劑而愈。凡載瘧。余常以參朮各一兩。生薑四兩。煨熟煎服即止。或以大劑補中益氣。加煨薑。其功尤捷。

一婦人頭暈壅悶。胸滿。氣喘。得食稍緩。苦於白帶二十餘年矣。諸藥不應。余曰。此氣虛而痰飲也。飲愈而帶始愈。遂用六味地黃丸。不月而驗。

一婦人耳鳴。胸痞內熱。口乾咳。中若有核。吞吐不利。月經不調。兼之帶下。余以為肝脾鬱結。用歸脾湯加半夏山楂升麻柴胡。間以四七湯。下白丸子而愈。

一婦人吞酸。胸滿。食少。便泄。月經不調。法服製清氣化痰丸。兩膝漸腫。寒熱往來。帶下黃白。面黃體倦。余以為脾胃虛濕熱下注。用補中益氣。倍用參朮。加茯苓半夏炮薑而愈。若因怒發熱。少食。或兩腿赤腫。或指縫常濕。用六君加柴胡升麻。又補中益氣。

一婦人帶下。四肢無力。勞則倦怠。余曰。四肢者土也。此屬脾胃虛弱。濕痰下注。遂以補中益氣濟生歸脾二藥治之而愈。

一婦人年踰六十。帶下黃白。因怒胸膈不利。飲食少。思服消導利氣之藥。反痰喘胸滿。大便下血。余曰。此脾氣虧損。不能攝血歸源也。用補中益氣加茯苓半夏炮薑四劑。諸症頓愈。又用八珍。加柴胡炒梔而安。

血分水分

二症或因飲食起居失養。或因六淫七情失宜以致脾胃虧損不能生發統攝氣血乘違行失常道。若先因經水斷絕後至四肢浮腫小便不通血化為水名曰血分。宜用椒仁丸治之。若先小便不利後至身面浮腫經水不通水化為血名曰水分。宜用葶藶丸治之。此屬形氣不足邪淫隧道必用此藥以宣導其邪而佐以輔補元氣庶使藥力有所仗而行。則邪自不能容而真氣亦不至於復陽矣。

治驗

一婦人月經不調肺熱內熱飲食少思肌體消瘦小便頻數服濟陰丸月經不行四肢浮腫小便不通余曰此血分也朝用椒仁丸夕用歸脾湯漸愈乃以人參丸代椒仁丸兩月餘將愈專用歸脾湯五十餘劑而痊

一婦月經不調小便短少或用清熱分利之劑小便不利三月餘身面浮腫月經不通余曰此水分也遂朝用葶藶丸夕用歸脾湯漸愈乃用人參丸間服而愈已上二症作脾虛水氣用分利等藥而致者多矣惜哉

小便出血

婦人小便尿血或因膏粱炙燭或因醉飽入房或因飲食勞役或因六淫七情以致元氣虧損不能統攝歸源若因怒動肝火者用加味逍遙散調送髮灰肝經風熱者送子芩丸久而血虛者用八珍送髮灰若膏粱積熱者用清胃散加槐花甘草房勞所傷者用六君加柴胡升麻風熱所傷者用四君加防風枳殼凡久而虧損元氣者用補中益氣為主鬱結傷脾者用濟生歸脾為主

治驗

一婦人尿血因怒氣寒熱或頭痛或脇脹用加味逍遙諸症稍愈惟頭痛此陽氣虛用補中益氣加蔓荆子而痊後鬱怒小腹內疼痛次日尿血甚仍用前散加龍胆草并歸脾湯將愈因飲食所傷血仍作微

便不寐心忡不寧此脾血尚虛用前湯而痊
一婦人尿血久用寒涼止血藥面色痿黃肢體倦怠飲食不甘晡熱作渴三年矣此前藥復傷脾胃元氣
下陷而不能攝血也益病久鬱結傷脾用補中益氣以補元氣用歸脾湯以解脾鬱使血歸經更用加味
逍遙以調養肝血不月諸症漸愈三月而痊

熱入血室

婦人傷寒或勞役或怒氣發熱適遇經行以致熱入血室或血不行或血不止令人晝則明了安靜夜則
譴語如見鬼狀用小柴胡加生地黃血虛者用四物加生地柴胡切不可犯胃氣若病既愈而血未止或
熱未已元氣素弱用補中益氣脾氣素鬱用濟生歸脾血氣素弱用十全大補庶無誤矣

治驗

一婦人經行感冒風寒日間安靜至夜譴語用小柴胡加生地治之頓安但內熱頭暈用補中益氣加蔓
荆子而愈後因怒惱寒熱譴語胸脇脹痛小便頻數月經先期此是肝火血熱妄行用加味逍遙加生地
而愈

一婦人因怒寒熱頭痛譴言妄語日晡至夜益甚而經暴至益肝藏血此怒動火而血妄行用加味逍遙
散加生地治之神思頓清但食少體倦月經未已益脾統血此脾氣虛不能攝用補中益氣治之月經漸止
一婦人懷抱素鬱感冒經行譴語服發散之劑不應用寒涼降火前症益甚更加月經不止肚腹作痛嘔
吐不食痰涎自出此脾胃虛寒用香砂六君脾胃漸健諸症漸退又用歸脾湯而全愈

師尼寡婦寒熱

宋諸氏療師尼寡婦別製方藥謂獨陰無陽致血氣交爭乍寒乍熱如瘧或腰背作痛而寒熱其肝脉弦
出寸口是其症也若室女出嫁愆期而寒熱亦然蓋男子精盛則思室女子血盛以懷胎此天地自然之
理也治以小柴胡加生地久而血虛佐以四物若兼怒動肝火而寒熱者佐以加味逍遙若兼虧損肝

經而寒熱者。佐以八珍湯。若兼虧損元氣而寒熱者。佐以補中益氣湯。若兼鬱陽脾氣而寒熱者。佐以濟生歸脾湯。此症多兼經候不調。當詳孰為緩急而治之。

治驗

一寡婦因怒致不時寒熱。久而不已。肝脉弦緊。用小柴胡加生地治之而愈。但見風寒熱仍作。此是脾胃氣虛。用加味歸脾補中益氣二湯兼服而止。

一婦人因夫經商久不歸。發寒熱。月經旬日方止。服降火涼血反潮熱內熱。自汗盜汗。月經煩數。余曰。熱活氣血虛也。經頻肝脾虛也。用歸脾湯六味丸而愈。當治兼症既愈。而寒熱當仍用本症藥。

一室女久患寒熱。月經不調。先以小柴胡加生地烏梅治之而愈。既嫁而諸症悉痊。

一室女久患寒熱。月經不調。先以小柴胡加生地治之少愈。更以生地黃丸而痊。

一放出行宮女。年踰三十。兩脇作痛。肉色不變。大小便中作痛如淋。登廁尤痛。此瘀血漬入隧道為患。乃男女失合之症也。難治。後潰不散。又患癧癰而歿。此婦為吾鄉湯氏妄湯為商常在外。可見此婦在內久懷憂鬱。及外出外。又不能如意。是以致生此疾。愈見瘰疬流注。乃七情氣血損傷。不可用攻伐咬然矣。按精血篇云。女人天癸既至。踰十年無男子合。則不調。未踰十年。思男子合。亦不調。不調則舊血不出。新血誤停。或清而入骨。或變而為腫。或雖合而難子。合多則溼枯虛。人產乳衆。則血枯殺人。觀其精血。思過半矣。一室女年十七。歷久不愈。天癸未通。發熱咳嗽。飲食少思。或欲用通經丸。余曰。此症潮熱經候。不調者不治。所喜脉不澀。且不潮熱。尚可治。但養氣血。益津液。其經自行。感於速効。仍用之。余曰。非其治也。此乃慄悍之劑。大助陽火。陰血得之則妄行。脾胃得之則愈虛。經果通而不止。飲食愈少。更加潮熱。遂致不終。

歷節痛風即白虎歷節風

歷節痛。或因飲食起居失節。或因七情六淫失宜。以致脾胃虧損。腠理不密。外邪所侵。或為肝火內動。肝血耗損。或為肢體疼痛。或為肢節難伸。或為卒然掣痛。或為走痛無常。或內熱。膚熱。自汗。盜汗。或經候不

調飲食不甘。其治法屬風邪者。小續命湯走注疼痛者。漏蘆散骨節疼痛者。四生丸濕熱痛者。清燥湯。兼痰佐以二陳。肝火者加味道遙散。加羌活川芎。脾鬱者。加味歸脾。加羌活川芎。血虛者。四物加羌活川芎。氣虛者。四君加羌活川芎。氣血俱虛者。八珍加羌活川芎。月經先期而痛者。加味道遙散為主。月經過期而痛者。補中益氣為主。大抵痛而不敢按者。屬病氣元氣俱實也。手按而痛緩者。病氣元氣俱虛也。若勞役而作痛者。元氣虛也。飲食失宜而作痛者。脾胃虛也。怒惱而作痛者。肝火也。經行而作痛。血虛也。凡此皆固元氣為主。而佐以治病之藥。

治驗

一婦人自汗盜汗。發熱。晡熱。體倦少食。月經不調。吐痰甚多。二年矣。遍身作痛。天陰風雨益甚。用小續命湯而痛止。用補中益氣加味歸脾二湯。三十餘劑而愈。自汗等症。皆鬱結傷損脾氣。不能輸養諸臟所致。故用前二湯。專主脾胃。若用寒涼降火。理氣化痰。復陽生氣。多致不起。

一婦人因怒月經去多。發熱作渴。左目緊。小頭項動搖。四肢抽搐。遍身疼痛。此怒動肝火。肝血虛而內生風。用加味道遙加釣膝數劑。諸症漸愈。又用八珍湯調理而痊。

一婦人月經先期。素有痛症。每勞必作用。衆手重按。痛稍止。此氣血虛而有火。用十全大補加獨活治之。而痛緩。用六味丸逍遙散而經調。

一婦人歷節作痛。發熱作渴。飲食少。思月經。遇期諸藥不應。脈洪大。按之微細。用附子八物四劑。而痛止。用加味道遙而元氣復。六味丸而月經調。

一婦人體肥胖。素內熱。月經先期。患痛風。下身微腫痛甚。小便頻數。身重脉緩。症屬風濕。而血虛有熱。先用羌活勝濕湯四劑。腫痛漸愈。用清燥湯數劑。小便漸清。用加味道遙十餘劑。內熱漸愈。為飲食停滯。發熱。乃痛。旬日浮腫。用六君加柴胡升麻而愈。又因怒氣。小腹痞悶。寒熱嘔吐。此木侮脾土。用前藥加山梔木香而安。惟小腹下墜。似欲去後。此脾氣下陷。用補中益氣而愈。後因勞役。怒氣作嘔吐痰。遍身腫痛。月

經勿來寒熱用六君加柴胡山梔以扶元氣清肝火。腹痛嘔吐悉退用補中益氣以升陽氣健營氣。月經

寒熱患瘧

一婦人飲食少畏寒見風寒。患痛風嘔吐寒熱脉弦緊。用附子八物四肢痛愈。用獨活寄生腰痛亦痊。惟兩膝腫痛用大防風而消。加味歸脾逍遙而元氣復。

流注

婦人流注或因憂思鬱忿。虧損肝脾。或因產後勞役。復傷氣血。以致營氣不從。逆於肉理。或因腠理不密。外邪客之。或濕痰流注。或跌撲血滯。或產後惡露。益氣流而注血。注而凝。或生於四肢關節。或流於胸腹。腰臂。或結塊。或漫腫。皆屬虛損。急用慈慰及益氣養榮湯。則未成自消。已成自潰。若久而腫起作痛。肢體倦怠。病氣有餘。形氣不足。尚可治。若漫腫微痛。屬形氣俱不足。最難治。不作膿。或膿成不潰。氣血虛也。用八珍湯。憎寒畏寒。陽氣虛也。十全大補湯。肺熱內熱陰血虛也。四物加參。未作嘔欲。嘔胃氣虛也。六君子加炮薑。食少體倦。脾氣虛也。補中益氣加茯苓半夏。四肢逆冷。小便頻數。命門火衰也。八味丸。小便頻數。痰盛作渴。腎水虧損也。六味丸。月經過期多日不止。肝脾虛也。八珍湯加柴胡丹皮。凡潰而內有膿管。不飲者。更用十全大補湯。煎膏外補之。久潰而寒邪凝滯不飲者。用豆豉餅祛散之。其潰而內有膿管。不飲者。用針頭散腐化之。自愈。若不補氣血。不節飲食。不慎起居。不戒七情。或用寒涼耗伐。俱不治。

治驗

一婦人左臂患之。年許不清。堅硬不痛。肉色不變。脉弱少食。月經過期日。暍發熱。勞役則痛。遂與參芪歸术川芎芍藥熟地貝母遠志香附桔梗丹皮甘草百餘貼而消。

一婦人暴怒腰腫一塊。胸膈不利時。或氣走作痛。與方脉流氣飲數劑而止。更以小柴胡對四物加香附。貝母。月餘而愈。

一婦人因怒脇下腫痛。胸膈不利。脉沉滯。以方脉流氣飲數劑少愈。以小柴胡對二陳加青皮桔梗貝母。

數劑頓退更以小柴胡湯對四物二十餘劑而痊

一婦人因閃胸肩患腫遍身痛遂以黑丸子二服而痛止以方脉流氣飲二劑而腫消更以二陳對四物加香附枳殼桔梗而全愈。

一婦人腿患筋攣骨痛諸藥不應脉遲緊用大防風湯二劑頓退又二劑而安○又一婦患之亦然先用前湯二劑更服黑丸子以為虛彼不信乃服敗毒藥果發大熱竟至不救夫潰瘍雖有表證發熱宜以托裏

為主佐以表散之劑何況瘰疬流注乎若氣血充實經絡通暢決無患者此證之因皆由氣血素虧或七情所傷經絡鬱結或腠理不密六淫外侵隧道壅塞若不審其所因辨其虛實鮮不悞人。

瘰疬

婦人瘰疬或因胎產血崩虧損腎肝或因憂思鬱怒傷損肝脾或因恚怒風熱肝胆血燥或因水涸血虛筋掣則累累然如貫珠故多生於耳前後頸側胸脇間若寒熱腫痛乃肝經氣動而為病用柴胡梔子散以清肝火為主而佐以逍遙散以養肝血若寒熱既止而核不消乃肝經之血亦病用加味四物湯以養肝血為主而佐以柴胡梔子散以清肝火若初生如豆粒附着於筋肉色不變內熱口乾精神倦怠久不消瘦乃肝脾虧損用逍遙散歸脾湯六味丸健脾土培肝木切不可輕用散堅追毒之劑外台秘要云肝腎虛熱則生瘰矣病機云瘰疬不係膏梁丹毒因虛勞氣鬱所致補形氣調經脉其瘡當自消散誤下之先犯病禁經某若久潰脉浮大邪火盛也而色㿠白金匱木也皆不治若赤脉貫瞳子有幾條則幾年死。

治驗

一婦人久而不愈或以為木旺之症用散腫潰堅湯伐之腫硬益甚余以為肝經氣血虧損當滋化源用六味地黃丸補中益氣湯至春而愈此症若肝經風火暴病元氣無虧宜用前湯若風不旺而自病宜用地黃丸虛者用地黃丸若水不能生木亦用此丸若金來剋木宜補脾土生腎水大凡風木之病但壯脾

土則木自不能剋矣。若行伐肝則脾胃先傷而木反來剋土矣。

一婦患之。恐不起致少寐。年餘。夜破。瞤水淋漓。經水或五十日。或兩月餘一至。誤服通經丸。展轉無寐。午前惡寒。午後發熱。余以為思慮虧損。脾血用歸脾湯作丸。午前以六君子送下。午後以逍遙散送下。兩月餘得寐。半載後經行如期。年餘而瘧愈。

一婦。婦瀉後。發熱煩躁。作渴。脉大而虛。以當歸補血湯。六劑而寒熱退。又以聖愈湯數劑而全愈。更以八珍加貝母遠志三十餘劑而愈。

一婦人項結核。寒熱頭痛。脇乳脹痛。內熱口苦。小便頻數。症屬肝火。血虛用四物加柴胡山梔胆草而愈。又用加味逍遙散而安。

一婦人癰癧。後遍身作痒。脉大按而虛。以十全大補加耆附治之而愈。大凡瀉後。午前痒作氣虛。午後癧作血虛。若作風症治之必死。

一婦人項核腫痛。察其氣血俱實。先以心効散一服下之。更以益氣養榮湯補之三十餘劑而消。常治此症。若必欲出膿。但虛弱者先用前湯。待其氣血稍充。乃用心効散去其毒。乃用補藥。無不効。未成膿者。灸肘尖。調經解鬱。及隔蒜灸。多自消。有膿即針之。若氣血復而核不消。却服散堅之劑。片許。不應。氣血不損。須用心効散其毒一下。即多服益氣養榮湯。如不應。亦灸肘尖。如瘡口不斂者。更用豆豉餅。琥珀膏。若氣血俱虛。或不慎飲食。七情者。不治。然此症以氣血為主。氣血壯實。不用追蝕之劑。亦能自腐。但取去使易於收斂耳。血虛而用追蝕。不惟徒治。過足以敗矣。

乳癰乳巖

婦人乳癰。屬胆胃二腑熱毒。氣血壅滯。故初起腫痛。發於肌表。肉色赤。其人表熱發熱。或發寒熱。或憎寒頭痛。煩渴引冷。用人參敗毒散。神効。爪葉散。加味逍遙散。治之其自消散。若至數日之間。膿成。潰竅。稠膿涌出。瞤盡自愈。若氣血虛弱。或誤用敗毒。久不收斂。瞤清脉大。則難治。乳岩屬肝脾二臟。鬱怒氣血虧。

損故初起小核結於乳內肉色如故其人內熱夜熱五心發熱肢體倦瘦月經不調用加味歸脾湯加味逍遙散神効爪龜散多日消散若後再日月漸大紫黑色赤出水腐潰深洞用前歸脾湯等藥可延歲月。若誤用攻伐危殆迫矣。大凡乳症若因恚怒宜躁肝清熱放涌寒熱宜發表散邪腫氣痛甚宜清肝消毒並隔蒜灸不作膿或膿不潰補氣血為主不收斂或膿稀補脾胃為主膿出反痛或發寒熱補氣血為主怒氣腫痛養肝血為主兒口所吹須吮通揉散成癰治以前法潮熱暮熱亦主前藥大抵男子多由房勞耗傷肝腎婦人鬱怒虧損肝脾治者審之世以孕婦患此名曰內吹然其所致

治驗

一婦人內熱脇脹兩乳不時作痛口內不時辛辣若卧而起急則脇下牽痛此帶脉為患用小柴胡加黃連二劑而瘥。

一婦人因怒兩乳腫兼頭痛寒熱用人參敗毒散二劑表症已退用小柴胡加芍歸枳殼桔梗四劑而消。一婦人久鬱右乳內腫硬用八珍湯加遠志貝母柴胡青皮又隔蒜灸兼服神効爪龜散兩月餘而消。一婦人左乳內腫如桃不痛不赤發熱漸腫用八珍加香附遠志青皮柴胡百餘劑又兼服神効爪龜散三十餘劑而消。

一婦人鬱久左乳內結核如杏許三月不消心脉濇而脾脉大按之無力以八珍加貝母遠志香附柴胡青皮桔梗五十餘劑而消又三十餘劑而愈。

一婦人稟實性躁懷抱久鬱左乳內結一核按之微痛以連翹飲子二十餘劑少退更以八珍加青皮香附桔梗白芷二十餘劑而消。

一婦人發熱作渴至夜尤甚兩乳忽腫肝脉洪數乃熱入血室也用加味小柴胡湯熱止腫消。

一婦人因怒左乳作痛發熱表散太過腫熱益甚用益氣養榮湯數劑熱止膿成不從用針腫脹熱渴針

膿大泄仍以前湯用餘始愈。此症若膿成未破有薄皮剥起者用代針之劑其膿自出不若及時用針不致大潰若膿血未盡輒用生肌反肋其利慎之。

一婦人因怒左乳作痛胸膈不利以方脉流氣飲加木香青皮四劑而安。

一婦人膿清腫硬面黃食少內熱脯熟自汗盜汗月經不行此肝脾氣血俱虛用十全大補加速志貝母又補中益氣各三十餘劑外用旋膏患處諸症尋愈。

一婦人膿成脹痛余欲針之不從數日始針出敗膿三四碗許虛症峰起幾至危殆用大補兩月餘而安若元氣虛弱不作膿者用益氣養榮湯補之膿成即針若腫痛寒熱怠惰食少或至夜熱甚用補中益氣湯兼逍遙散補之為善。

一座婦因乳少服藥通之致乳房腫脹發熱作渴以玉露散補之而愈失乳汁乃氣血所化在上為乳在下為經若衝任之脉盛脾胃之氣壯則乳汁多而濃衰則淡而少所乳之子亦弱而多病又有屬產無乳或大便濁滯乃亡津液也當滋化源。

一婦人右乳內結三梭年餘不消朝寒暮熱飲食不甘此乳癰以益氣養榮湯百餘劑血氣漸復更以木香餅熨之喜其謹疾年餘而消。

至英內年二十有五素虛弱多鬱怒時疫後脾胃愈虛飲食愈少又值氣忿右乳脇下紅腫應內作痛用炒慈皮熨之腫雖少散內痛甚轉側胸中如物懸墜遂與加減四物湯內腫如鴉卵外大如盤胸脇背心相引而痛夜熱勢甚時治者皆以攻毒為言叩諸先生乃云此病後脾胃而復怒傷肝治法惟主於健脾氣平肝火則腫自消而病自愈矣承惠方以八物加陳皮黃芪柴胡山梔白芷服八劑病減六七去白芷加青皮木香桔梗又六劑而全愈奏功之奇獲効之速蓋出於尋常萬萬也感激厚恩所々不忘錄此乞附醫案以詔後之患者母為攻毒者之所惑也晚生尤至英頤首再拜書。

一婦人乳內結核年餘脯熱少食余欲用益氣養榮湯治之彼以為緩乃服行氣之劑其勢愈甚清而口

出清膿而死

血風瘡

婦人血風瘡。因肝脾二經風熱鬱火血燥所致。其外症身發疙瘩。或如丹毒痒痛。不常搔破成瘡。膿水淋漓。其內症月經無定。小便不調。夜熱內熱。自汗盜汗。惡寒憎寒。肢體倦怠。飲食不甘。寒熱往來。若發熱作痛。乃肝經風熱血燥。用當歸飲加柴胡山梔。若體倦食少。口乾潮熱。乃肝脾鬱火傷血。用加味逍遙散。若疙瘩痛痒。寒熱往來。乃肝經風熱傷血。用小柴胡加山梔黃連。若夜間發熱。作渴譖語。乃熱入血室。用小柴胡加生地黃。血虛四物合小柴胡湯。若無寐。盜汗。內熱。肺熱乃脾經血虛。用歸脾湯。兼寒熱加山梔。熟地。若用風藥。復傷陰血。反致他症。

治驗

一婦人素清苦。四肢患此。誤用敗毒寒涼。肺熱內熱。自汗盜汗。月經不行。口乾咽燥。此鬱結傷脾。四肢者。脾主之。用歸脾湯數劑。後兼逍遙散。五十餘劑而愈。

一婦人性躁。寒熱口苦。脇痛耳鳴。腹脹。漏瀦年餘矣。症屬肝火。用四君加柴胡炒山梔炒龍膽數劑。乃與逍遙散兼服。而瘡愈。又與六味丸。及逍遙散七十餘劑。諸症悉退。若有愈後。身起白屑。搔則肌膚如帛所隔。此氣血虛不能營於腠理。用大補之劑。若有愈後。發熱。身起疙瘩。痒痛。搔破。膿水淋漓。經候不調。此肝火血熱。用四物加柴胡山梔白朮茯苓丹皮甘草。

一婦人日晡身痒。月餘口乾。又月餘成瘡。服法風之劑。膿水淋漓。午前畏寒。午後發熱。殊類風症。余謂此肝經鬱火。外邪所搏。用補中益氣加山梔鈞膝。又以逍遙散加川芎貝母而愈。

一婦人搔痒。發熱。日晡益甚。膚見赤痕。月經過期。此血虛有熱。以逍遙散倍加熟地。熟地比痒退。更以四物

一女子十二歲善怒遍身作癢用柴胡川芎山梔芍藥以清肝火。以生地當歸黃芩涼肝血。以白朮茯苓甘草健脾土而愈半載後遍身起赤痕或時眩暈此肝火熾甚血得熱而妄行是夜果經至。

謙瘡

婦人兩謙生瘡或因胎座飲食失宜傷損脾胃或因憂思鬱怒虧損肝脾以致濕熱下注或外邪所侵。外謙屬足三陽可治內謙屬足三陰難治若初起發腫赤痛屬濕毒所乘用人參敗毒或橘蘇敗毒散若漫腫作痛或不腫不痛屬脾虛濕熱下注用補中益氣或八珍湯。右膿水淋漓體倦少食內熱口乾屬脾氣虛弱用補中益氣加茯苓酒炒芍藥若干後頭目不清屬陰火用前湯加酒炒黑黃柏若干後發熱體倦屬血虛用前湯加川芎熟地若懷抱不樂而甚用歸脾湯加山梔柴胡若恚怒氣逆而甚用補中益氣加川芎山梔若干內熱體倦痰涎口瘡屬脾胃虛寒難治設誤用攻伐復傷胃氣難保其生。

治驗

一婦人患之四畔微赤作痛重墜膿水淋漓胸膈不利飲食少思內熱口苦夜間少寐此屬脾胃傷用歸脾湯解鬱結而生脾血用補中益氣加茯苓半夏補脾氣而除濕熱尋愈。

一婦人久不愈色赤微熱日晡煖脹形體虛弱飲食少思勞則喘渴惡寒發熱此脾虛下陷用補中益氣湯而愈。

一婦人三年矣色黯腫硬惡寒發熱飲食少思形體消瘦作渴飲湯飲食稍多或腹脹或泄瀉或作嘔或吞酸此脾氣虛寒用補中益氣加乾薑肉桂五十餘劑而愈。

一婦人因怒寒熱頭眩或耳項胸脇脹痛或小腹陰道悶脹或小便頻數下血此屬肝火血熱先用小柴胡湯加炒黑山梔川芎當歸車前二劑諸症頓退又用加味逍遙散補其陰血而愈後因飲食勞倦前症

復作瘡口出血用補中益氣湯治之而愈。

一婦人患癰兩月。焮赤腫痛。小便頻數。飲食如常。用活命飲二劑。諸症悉愈。又用八珍湯而痊。

一婦人患此焮痛。惡寒發熱。用檳榔敗毒散而寒熱退。用仙方活命飲而焮痛止。再用補中益氣湯。而形氣健。

陰瘡交搘出血陰挺陰痒陰蟲附

婦人陰瘡。乃七情鬱火傷損肝脾。濕熱下注其外症有陰中舒出如蛇俗呼陰挺有翻突如餅俗呼陰菌亦有如雞冠花亦有生諸蟲亦有腫痛濕痒。潰爛出水脹悶脫墜者。其內症口乾內熱體倦經候不調飲食無味。脯熱發熱。胸膈不利。脇肋不調。小腹痞脹。赤白帶下。小水淋濁。其治法。腫痛者宜用四物加柴胡。山梔丹皮。胆草。濕痒者宜用歸脾加山梔丹皮柴胡。淋濁者宜用龍膽瀉肝加白朮丹皮。清腐者宜用加味道遙散。腫悶脫墜者宜用補中益氣加山梔丹皮。佐以外治之法。備見治驗。

治驗

一婦人胸膈不利。內熱作渴。飲食不甘。肢體倦怠。陰中悶痒。小便赤濁。此鬱怒所致。用歸脾加山梔而愈。後因怒患處并小腹脹痛。用小柴胡加山梔芩歸芍藥而愈。但內熱脯熱用逍遙散加山梔而愈。後因勞役發熱。患處腫脹。小便仍濁。用補中益氣加山梔茯苓丹皮而愈。

一婦人陰中突出如菌。四圍腫痛。小便頻數。內熱脯熱似痒似痛。小腹重墜。此肝脾鬱結之症。益肝火。濕熱而腫痛。脾虛下陷而重墜也。先以補中益氣加山梔茯苓車前青皮。以清肝火升脾氣。漸愈。更以歸脾湯加山梔茯苓芩調理。更以生豬脂和藜蘆末塗之而收人。

一婦人陰中挺出一條五十許。悶痛重墜。水出淋漓。小便濁滯。夕與龍膽瀉肝湯分利濕熱。朝與補中益氣湯升補脾氣。諸症漸愈。再與歸脾加山梔茯苓芩黃柏同服調理而愈。後因勞役或怒氣下部濕溼。小水不利。仍用前藥即愈。亦有尺許者。亦有生諸蟲物者。皆用此治。

一婦人腐潰膿水淋漓腫痛寒熱小便赤澀內熱作渴肢體倦急胸脅不利飲食少思三月餘矣。用補中益氣內柴胡升麻各用一錢加茯苓一錢炒山梔二錢數劑少愈又與歸脾加山梔川芎茯苓三十餘劑諸症悉退惟內熱尚在再與逍遙散倍用山梔而愈。

一婦人素性急陰中或痛小便赤澀起則益甚或發熱或寒熱治以芎歸炒梔柴胡芩木丹皮澤瀉炒芍炒車前炒連生草數劑漸愈乃去黃連澤瀉又數劑而全愈。

一婦人素鬱悶陰內痛痒不時出水飲食少思肢體倦怠用歸脾加丹皮山梔芍藥柴胡生草主之而安。一婦人陰內痒痛內熱倦怠飲食少思用參芪歸木陳皮柴胡炒梔炒車前升麻芍藥丹皮茯苓治之而瘥。若陰中有蟲痒痛亦屬肝木以桃仁研膏和雄黃末納陰中以殺之仍用清肝解鬱有以雞肝納之者乃取蟲之法也。

一婦人交接違理出血作痛發熱口乾誤服寒涼之劑前症益甚不時欲嘔飲食少思此症屬肝經而藥復傷脾也先用六君子加柴胡而脾胃漸愈乃用加味逍遙散而患處亦痊。

一婦人每交接輒出血作痛數服皆涼血止痛之劑不時出血甚多此肝傷而不能藏血脾傷而不能攝血也用補中益氣濟生歸脾二湯而愈若交接出血用熟艾熱裏入陰中若交接違理而出血用亂髮青布燒為末敷之血自止若出血過多而見他症但用前藥調補肝脾諸症自愈矣。

一婦人陰腫下墜悶痛出水胸腹不利小便頻數內熱晡熱口苦耳鳴先用小柴胡加車前胆草芩木升麻二劑稍緩又用加味逍遙加升麻數劑稍愈乃以加味歸脾加升麻柴胡并補中益氣加山梔數劑漸愈仍用加味逍遙加味歸脾二藥調理而瘥。

一婦人熱痛用寒涼敗毒飲食不入時欲嘔吐小腹重墜似欲去後此脾胃虧損元氣下陷症屬虛寒先用補中益氣加炮薑二劑重墜如失再用前湯加茯苓半夏二十餘劑而愈乃以歸脾少加柴胡升麻六味地黃丸調理兩月餘而康。

附方并註

保和丸 治飲食停滯胸膈痞滿或作吞酸等症

山查取肉二兩蒸熟 神曲炒

半夏

茯苓各一兩

蘿蔔子炒

陳皮

連翹錢五分

右為

末粥丸加白术二兩名人安丸

越鞠丸 治六鬱胸膈痞滿嘔吐吞酸或濕熱腹脹腿腳酸疼等症

蒼朮炒

神曲炒

香附

山查

山梔炒

撫芎

麥芽炒各等分

右各

另為末水調炒麵糊為丸桐子大每服五七十丸白滾湯下。

左金丸四治肝火胸膈刺痛或發寒熱或頭目作痛小便淋秘或小腹疼痛一切肝火之症

黃連六兩

吳茱萸十一兩湯煎時用

右為末粥丸白术陳皮湯下。

椒仁丸 治先因經水斷絕後至四肢浮腫小便不通血化為水

椒仁

續隨子去皮研

甘遂

附子炮

郁李仁

黑牽牛

五靈脂碎

當歸

吳茱萸

延胡索各五錢

芫花一錢

石膏

蛇青十枚去頭翅足同橘皮

班鴆箇糯米炒去米不用

膽礬

人言各一錢

右為末

麵糊為丸如豌豆大每服一丸橘皮

湯下此方藥雖峻利所用不多若畏而不服有養病害身之患常治虛弱之人亦未見其有誤也

血分草薢丸 治先因小便不利後至身面浮腫經水不通水化為血

草薢研炒

續隨子去梗研半兩研

乾薑末一兩

右為末棗肉丸如桐子大每服七丸煎匾竹

湯下如大便利者減續隨子草薢各一錢加白术五錢

人參丸 治經脉不利化為水流走四肢悉皆腫滿名曰血分其候與水相類若作水治之非也宜用此

人參

大黃

濕紙裹飯上蒸熟去紙研細炒

當歸

桂心

瞿麥穗

赤芍藥

白茯苓略半

草薢炒另研

右為末

煉蜜丸桐子大每服十五丸至三十丸空心飲湯下

柏子仁丸 治血虛有火。月經耗損。漸至不通。日漸羸瘦。而生潮熱。慎毋以毒藥通之。宜柏子仁丸澤蘭湯主之。

柏子仁

炒酒拌

牛膝

酒拌

卷柏

錢半兩

澤蘭葉

續斷各二兩

熟地黃

用生者三兩。酒拌蒸

為末。入地黃膏加煉蜜。梔子大。每服三十丸。空心米飲下。

澤蘭湯

治症同前

澤蘭葉

三兩

當歸

一兩

芍藥

炒各一兩

甘草

五錢

右為粗末。每服五錢。水二鍾煎至一鍾。去渣溫服。

獨參湯 治一切失血惡寒發熱。作渴煩躁。並宜此藥補氣。蓋血生於氣。陽生陰長之理也。用人參二兩。

棗十枚。水煎服。

王露散 治乳脈不行。身體壯熱。頭目昏痛。大便澀滯等症。

人參

白茯苓

桔梗

炒

川芎

白芷

當歸

芍藥

甘草

五分

右水煎服。若熱甚。大便秘。量加炒大黃。

聖愈湯 治血虛心煩。睡卧不寧。或五心煩熱。

地黃

酒拌蒸。生地黃

川芎

人參

錢五錢

當歸

酒拌

黃芪

炒各一錢

當歸飲 治血熱。癰癧。溼痒。痛。膿水淋漓。發熱等症。

當歸

白芍藥

川芎

生地黃

白蒺藜

防風

荆芥

各五錢

黃芪

錢一兩

阿首烏

甘草

五分

右水煎服。

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱。下部腫脹。作痛。小便澀滯。陰挺如菌。或出物如蟲等症。

龍膽草

酒拌蒸。澤瀉錢一兩

車前子

炒

木通

生地黃

酒拌

當歸尾

酒拌

山梔

炒

烏賊魚骨丸 治婦人血枯。胸膈四肢滿妨於食飲。病至聞腥臊臭氣。先唾血。出清液。或前後泄血。目眩。

黃芩

生甘草

各五錢

右水煎服。

轉月事發少不來

烏賊魚骨去甲四兩

魚煎湯下。以飯壓之。

青州白丸子 治風寒咳嗽或牙關緊急不知人事。或痰滯作麻。

南星三

半夏

附子

川烏

生用半兩各

右為末。絹袋盛井水擺浸。仍換水浸三五日。

晒乾糯米粉。凡急用。以薑汁糊丸亦可。

四七湯 治七情鬱結咽間如有一核。吞吐不利。或中脘痞滿。痰涎壅喘。或惡心少食。

紫蘇葉錢

厚朴一錢

茯苓錢

半夏

姜製七分

右薑棗水煎服。若白帶以此湯送前丸。其効如

神。

當歸龍會丸 治肝經症。肠下作痛。或有積塊。或下疳便癰。小便淋漓。或瘀血凝滯。小腹作痛。

當歸

酒炒

龍膽草

沙梔子仁

炒黃連

青皮

黃芩

各一

大黃

酒拌半兩

蘆薈

青黛

柴胡

錢五分

木香

二錢五分

麝香

另研五分

右為末。炒神曲糊丸。每服二三十丸。姜湯下。

阿魏膏 治一切痞塊

羌活

獨活

玄參

官桂

赤芍藥

川山甲

生地黃

兩頭尖

大黃

白芷

天麻

各五分

紅花

四分

槐柳桃枝

三分

木鱉子

三十枚去殼

亂髮

如雞子大一塊

右用香油

二斤四兩

煎黑去粗入髮再煎化

乃去粗徐下

苗丹。煎軟硬得中方入芒硝阿魏蘇合油乳香沒藥五錢麝香三錢調勻成膏矣。攤貼患處內服蘆薈丸等。黃丹須真正者効。凡貼膏藥先用朴硝隨患處鋪半指厚。以紙蓋。用熱熨斗熨良久。如硝耗再加熨之。熨二時許方貼膏藥。若是肝積加蘆薈末同熨。

蘆薈丸 治肝癰。口舌生瘡。牙齦腐爛。或遍身生瘡等症。

大皂角

青黛

蘆薈研
硃砂研

麝香一分

乾蝦蟆

用各等分
入前加蜜

右為末蒸餅糊丸麻子丸每服五七十丸米飲下
局方小續命湯 治歷節痛風寒盛口噤腰背反張等症

防己 肉桂去粗皮杏仁炒去皮尖黃芩 白芍 甘草 川芎

麻黃附 人參去蘆各附子一兩半兩去皮防風一兩半兩右為粗末每服三錢薑棗水煎服

調中益氣湯 治體怠嗜卧不思飲食或痰嗽泄瀉等症

當歸分 人參去蘆 甘草 蒼朮各五分 柴胡 番皮 升麻

木香分 二右薑棗水煎空心服

佛手散 治妊娠傷胎下血

當歸分 川芎分 右水煎食前服

木香餅 治一切氣滯結腫或漏或閉胸及風寒所傷作痛並効

木香分

生地黃研 右木香為末地黃杵膏和匀量患處大小作餅置患處以熱熨斗熨之

隔蒜灸法 治一切瘡毒大痛或不痛或麻木如痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而散益火以
暢達拔引鬱毒此從治之法也。有回生之功用大蒜頭去皮切三文錢厚安瘡頭上用艾裝於蒜上灸
之三壯換蒜復灸未成者即消已成者亦殺其大勢不能為害如瘡大用蒜搗爛摊患處將艾鋪上燒
之蒜敗再換如不痛或不作膿及不起發或陰瘡尤宜多灸灸而仍不痛不作膿不起發者不治此氣
血虛極也。

神効忽効法 治虛怯人肢體患腫塊或作痛或不痛或風襲於經絡肢體疼痛或四肢筋掣骨痛又治
流注跌撲傷損腫痛用蒜頭細切杵爛炒熟敷患處冷易之再効腫痛即止其効如神
豆豉餅 治瘡瘍腫硬不消及潰而不飲并一切癧瘍惡瘍用江西豆豉為末唾津和作餅子如錢大厚

如三文置患處以父裝於餅上灸之乾則易之如背瘡用漱口水調作餅覆患處以父鋪餅上灸之如未成者即消已成者能消其毒如有不効氣血虛敗也

益氣養榮湯 治抑鬱屢發或四肢患腫肉色不變或日晡發熱或渴而不欲

人參

茯苓

陳皮

目母

香附

當歸

川芎

黃芪
鹽水
炒

熟地黃
酒
拌

芍藥
炒各一錢

甘草
炙

桔梗
炒各五分

白朮
炒二錢

右薑水煎服

人參養榮湯

治潰瘍發熱惡寒四肢倦怠體瘦少食面黃短氣不能收斂若大瘡愈後多服之不變他病

白芍藥
五錢

人參

陳皮

黃芪
炙

桂心
去心炒

當歸
酒拌

白朮

甘草
一錢

熟地黃
酒
拌

五味子
炒

茯苓
各半

遠志
去心炒五分

右薑水煎服

方脉流氣飲子

治惱怒胸膈脹滿或肢體作痛或結壅腫血氣無虧者

紫蘇葉

青皮

苦梗

半夏
炮

當歸

芍藥

烏藥

茯苓

川芎

黃芪

枳殼
炒

防風
酒半

甘草

橘皮
各五分

大腹皮

木香
各三

右薑水煎服

瀉青丸

治肝經鬱火實熱腸乳作痛大便秘結及肝經一切實火症

當歸

龍胆草

川芎

山梔

大黃

羌活

防風
各等

蜜丸雞子大每服一二丸

人參敗毒散

治瘡瘍癰疽發寒熱或拘急頭痛等症

人參

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

枳殼

生地黃丸

治師尼寡婦下寒乍熱肝脉弦長而出魚際

茯苓

川芎

甘草
各一

右水煎服

生地黃
酒一兩

秦艽

首芩

硬柴胡
各五兩

赤芍藥
兩

右為細末入地黃膏

加煉蜜少許丸桐子大每服三十九烏梅煎湯下日進二服亦治室女患此

連翹飲子 治乳內結核

連翹

川芎

爪葉仁研

皂角刺炒

橘葉

青皮白

甘草節

桃仁

潞仁

右水煎服

必効散

治瘰疬未成膿者自消已潰者自飲

南鵬砂五錢輕粉錢一

班貓糞熟去頭翅同

麝香五分

巴豆殼心研去白櫟榔一

右為細

末每服一錢五更用滾湯調下如小水滯滯或微痛此癰毒欲下也進益元散一服即下此方班貓巴

豆似為峻厲然用巴豆乃解班貓之毒用者勿思。

琥珀膏 治頸項瘰疬及腋下初如梅子腫結硬強漸如連珠不消不潰或潰而膿水不絕經久不瘥漸成漏症

琥珀一兩

木通

桂心

當歸

白芷

防風

松脂

硃砂研

木薰子

內各五錢麻油一斤

丁香

木香

洛三

右先用琥珀丁香桂心硃砂木香

為細末其餘藥入油內煎黑濾去粗徐徐入黃丹再煎軟硬得中即成膏矣。

神効瓜蒌散

治乳癰初起腫痛及一切癰疽或膿出後餘毒亦宜用之

黃瓜蒌一箇

當歸

生甘草

半兩

沒藥

一錢另研

乳香

錢一

右酒水煎服

餘方見下卷

吳郡薛 已著

新都閔道政校

保胎

妊娠若元氣不實發熱冷急或胎動不安用當歸散。因氣惱加枳殼胸膈痞悶再加蘇梗或作痛加柴胡。若飲食不甘或欲嘔吐用六君子加紫蘇枳殼若惡阻嘔逆頭暈體倦用參橘散未應用六君子湯。若惡阻嘔吐不食煩悶亦用參橘散之類。若頭小胎動腹痛下血用膠艾湯未應用八珍加膠艾。若頭小胎動腰痛短氣用阿膠散未應前送知母丸若頭小胎陽下血腹痛用佛手散未應用八珍送知母丸若心驚胆怯煩悶不安名子煩用竹葉湯未應血虛佐以四物氣虛佐以四君若下血不止名胎漏血虛用二黃散。血去多用八珍湯未應用補中益氣湯若因事而動下血用枳殼湯加生熟地黃未應或作痛更加當歸血不止八珍加膠艾若不時作痛若小腹重墜名胎漏用地黃當歸湯未應加參木陳皮或因脾氣虛用四君加歸地中氣虛用補中益氣湯若面目虛浮肢體如水氣名子腫用全生白朮散未應用六君子湯下部脹甚用補中益氣倍加淡芩或因飲食失宜嘔吐泄瀉此是脾胃虧損用六君子湯若足指發脹漸至腿膝喘悶不安或足指縫出水名水氣用天仙藤散脾胃虛弱兼以四君子未應用補中益氣兼以逍遙散若胎氣上攻心腹脹滿作痛名子懸用柴蘇飲飲食不甘兼四君子內熱晡熱兼逍遙散若小便澀少或成淋瀝名子淋用安榮散不應兼八珍湯腿足轉筋而小便不利急用八味丸緩則不救若項強筋攣語濇瘀盛名子癥用羚羊角散或飲食停滯腹脹嘔吐此是脾胃虛弱而不能消化用六君子湯不應益氣湯或輕腹作脹或小便淋閉此是脾胃氣虛胎壓尿泡四物加二陳參木空心服後探吐藥出氣不足又服又吐數次必安或因勞役所傷或食煎炒小便帶血此是血得熱而流于脬中宜清膀胱用逍遙散或遺尿不禁或為頻數此是肝火熱用加味逍遙散若胸滿腹脹小便不通遍身浮腫名胎水不利。

用鯉魚湯脾胃虛佐以四君子。病名同而形症異。形症異而病名同。聊見本方。凡用見症之藥不應當分月經治之。

治驗

一妊娠三月。其經若來三五次。但不多飲食。精神如故。此血盛有餘。兒大能飲。自不來矣。果然。一妊娠六月。每怒氣便見血。甚至寒熱頭痛。脹腹痛。作嘔少食。余謂寒熱頭痛。肝火上衝也。脹腹痛。肝氣不行也。作嘔少食。肝侮脾胃也。小便見血。肝火血熱也。用小柴胡加芍藥炒黑山梔茯苓白朮而愈。

一妊娠六月。體倦食少。勞役見血。用六君子加當歸熟地升麻柴胡而愈。

一妊娠每三四月胎便作痛。余用當歸地黃湯治之。不日而愈。

一妊娠三月飲食後。因怒患癰。連吐三次。用藿香正氣散二劑。隨用安胎飲一劑而愈。後因怒。縱甚狂言。發熱胸脹。手按少得。此肝脾氣滯。用加味道逍散。加川芎。二劑頓退。四劑而安。

一婦人每怒。發熱脹脹。小便淋濁。每月經行旬餘未已。受胎三月。因怒前症復作。朝用加味道逍散。夕用安胎飲。各二劑而安。五月又怒。復作下血。如經行。四日未止。仍用前藥而愈。

一妊娠將三月。嘔吐惡食。體倦嗜卧。此惡阻之症。用參橘皮湯。二劑漸愈。又用六君子加紫蘇。二劑而安。一妊娠吞酸惡心。欲作嘔吐。此飲食停滯。用六君子加糙蘖炒黑子芩枳殼香附治之而愈。

一妊娠飲食後。憎惡寒熱。嘔吐頭痛。惡寒。胸腹脹痛。大便不實而色青。小便頻數而有血。余曰。當清肝健脾為主。不信。乃主安胎止血。蓋甚問余曰。何也。余曰。大便不實而或青。此是飲食既傷脾土。而兼木侮。小便頻數而有血。此是肝火血流於胞。而兼挺瘻也。用六君子加枳殼紫蘇山梔二劑。脾胃頓醒。又用加味逍遙加紫蘇枳殼二劑。小便頓清。更節飲食。調理而安。

一妊娠每至五月。肢體倦急。飲食無味。先兩足腫。漸至遍身。後及頭面。此是脾肺氣虛。朝用補中益氣。夕用六君子。加蘇梗而愈。凡治妊娠。毋泥其月數。但見某經症。便用某藥。為善。

一妊娠因怒吐血塊四日不止。兩脇脹痛。小便淋濁。此怒而血蓄於上部火炎而隨出也。脇脹腹痛。小便淋濬。肝經本病也。用小柴胡合四物四劑而止。却用六君子安胎飲調理而安。也用六味丸料數劑而愈。

凡婦人氣血方盛。乳房作脹或無兒飲。痛脹寒熱。用麥芽二三兩炒熟水煎服。立消其耗散血氣如此。脾胃虛弱。飲食不消。方中多用之一。云麥芽最消腎。若氣血虛而乳汁自出者。宜十全大補湯。其子多育。

小產

小產重於大產。蓋大產如栗熟自脫。小產如生採破其皮殼斷自根蒂。豈不重於大產。但人輕忽致死者多矣。治法宜補形氣生新血去瘀血。若未足月漏而欲產。可歸補中湯倍加知母止之。若產而血不止。人參黃芪湯補之。若產而心腹痛。當歸川芎湯主之。胎氣弱而小產者。八珍湯固之。若出血過多而發熱。聖愈湯汗不止。急用獨參湯。發熱煩躁。肉瞤筋惕。八珍湯大渴面赤。脉洪而虛。當歸補血湯。身熱面赤。脉沉而微。四君薑附東垣云。晝發熱而夜安靜。是陽氣自旺於陽分也。晝安靜而夜發熱躁。是陽氣下陷於陰中也。如晝夜俱發熱者。是重陽無陰也。當峻補其陰。王大僕云。如大寒而甚熱之不熱。是無火也。熱來復去。晝見夜伏。夜發晝止。時節而動。是無火也。如大熱而甚寒之不寒。是無水也。熱動復止。倏忽往來。時動時止。是無水也。若陽氣自旺者。補中益氣湯。陽氣陷於陰者。四物二連湯。重陽無陰者。四物湯。無火者八味丸。無水者六味丸。

治驗

一妊娠五月。服剪紅丸而隨腹中脹痛。服破血之劑。益甚。以手按之。益痛。余曰。此峻藥重傷脾胃。受患用八珍。倍人參。黃芪半夏乳膏。沒藥。二劑而痛止。數劑而全愈。吳江庠文史萬湖仲子室。年二十餘。疫疾墮胎時。咳嗽清肺解表。喘急不寐。請治。余以為脾土虛不能生

肺金藥損益甚。先與補中益氣加茯苓半夏五味炮薑四劑漸愈。注視之又與八珍加五味及十全大補湯全愈。

大兜婦張氏素怯弱。嘉靖癸卯四月生女。自乳中患疥瘡。年餘不愈。遂致羸困。甲辰五月。遭先母大故。以姑病勉強代執喪禮。旬月。每欲眩仆。一日感氣忽患心脾高腫作疼。手不可按。而嘔吐不止。六脉微細之極。余以為脉雖虛而病形則實。誤認諸漏不可補氣。乃用青皮香附吳茱等藥而愈。繼復患瘧且墮胎。又投理氣行血之藥。病去。元氣轉脫。再投參芪補劑。不應矣。六脉如絲欲絕。思非附子不能救。非立翁莫能投。迎翁至診云。皆理氣之劑。損真之誤也。連投參芪歸朮附子薑桂六劑間用八味丸。五日眠食漸甘。六脉全復。翁云。心脾疼痛時。即當服此等藥。瘧亦不作矣。姑婦皆翁再造。敢述奇功。附於此門之尾。以為初知藥性者之戒。制生陳遜醫謹識。

保產

妊娠欲產之時。但覺腹內轉動。即當正身仰卧。待兒轉身。向下時作痛。試捏產母手中指中節。或本節跳動。方與臨盆即產矣。若初覺不仰卧。以待轉胞。或未產而水頻下。此胞衣已破。血水先乾。必有逆生難產之患。若橫生者。兒先露手臂。令母正卧。以手徐推兒臂下體。令其正直。復以中指摩其肩。勿令臍帶攀係。即生。逆生者。兒先露足。令母正卧。以手按推其足。仍推兒轉正即生。偏生者。兒頭偏在一邊。亦照前法。徐正其頭。即生。或見頭後骨偏在谷道。傍陰處。推近上。即生。礙產者。兒頭雖正。但不能下。蓋因胎轉臍帶攀肩所致。用中指按兒兩肩。理脫臍帶即生。坐產者。兒將欲生。其母疲倦。久坐椅櫈。於其生路急用巾帶高懸。令母以手攀之。輕輕屈足良久。兒順即生。盤腸生者。臨產母腸先出。此難於收上。以草薢子四十九粒研爛。塗產母頭頂。待腸收上。急洗去。設或為風吹乾不能收者。以簪刀水少許溫熱拭潤其腸。再用磁石煎湯服之。即收上磁石。須陰陽家用有驗者。俗以水噀母面。皆驚而腸亦收之。蓋驚則氣散。恐反致他症。戒之。皆胎衣破而不得分娩者。用保生無憂。散以固其自然生息。如血已耗。獨用八珍湯料一斤。益母草。

半斤水數碗煎熟不時飲之亦有得生者。凡孕婦口腹痛未產也。若連接痛甚者。將產也。蓋腎候於腰胞。係於腎故也。華陀治橫逆產難用蛇脫二條蟬殼二十八箇。胎髮二丸各燒灰。每服二錢。酒調。連進二服。即卧片時。兒即順生。如無此藥。令產母仰面正卧。以小針刺兒平脚心。三五次。用鹽塗之。手脚即縮。且待身轉順。即生。○若以蜀葵子四十九粒。白滑石三錢。順流水煎服。即順生。或用好京墨濃磨服之。墨水裏兜即下。○或敗筆頭一箇。煅過以鴉箭自然汁。溫酒和下。○或紫蘇葉當歸各三錢。長流水煎服。即下。○凡孕家宜預請穩婆。有仁心識見者。當施恩惠以結其心。先與說知。倘有生息不順。只說未產。或遇双胎。只說胎衣未下。恐驚則氣散。愈難生。愚余家親驗之。大抵難產多患於鬱悶。安佚富貴之家。治法雖云胎前消氣。產後補血。不可專執。若脾胃不實。氣血不充。宜預調補。不然。臨產必有患難。○如因難產。或大寒時。急以大油紙燃。徐徐燒斷其臍帶。雖兒已死。令緩氣入腹。多得復生。切不用刀斷之。

治驗

荆婦孟冬分娩艱難。產子已死。元氣勞傷。用油紙燃燒斷臍帶。取其陽氣以補之。俄間兒啼作聲。即鴟兒也。若以刀物如常斷之。其母亦難保生。此兒嗣後一二歲間。並無傷食作瀉之症。可見前法之功。其穩婆又喜平日常施少惠。得其用心能安慰母懷。故無虞耳。○此穩婆云。止有一女。分娩時。適當巡街侍御行牌。取我視其室分娩。女為此驚嚇。未產而死。後見侍御更以威顏分付。迨視產母胎雖順。而頭偏在一邊。若以手入推正。可保順生。因畏其威。不敢施手。但回稟云。此是天生天化。非人力所能立。俟其母子俱死。于死腹中。

夫子死腹中者。多因驚動太早。或觸犯禁。或抱腰太重。或頻探試水胞。衣先破。血水先盡。而胎乾涸故耳。其候產母唇舌皆黑者。子母俱死。若舌黑或脹悶甚者。然其子已死矣。先以平胃散一兩。酒水各半煎。却投朴硝半兩。即熱皮硝服。或用硝一兩。以童便調下。亦妙。

治驗

一穩婆之女勤苦負重妊娠腹中陰冷重墜。口中甚穢。余意其胎必死。令視其舌果青黑。與朴硝半兩許服之。隨下穢水而安。

一婦人胎死服朴硝而下穢水。肢體倦怠。氣息淹淹。用四君為主。佐以四物薑桂調補而愈。

胎衣不出

有因惡露入衣。脹而不能出。有因元氣虧損而不能送出。其惡露流衣中者。腹中脹痛。用奪命丹。或失笑散。以消瘀血緩則不救。其元氣不能送者。腹中不脹痛。用保生無憂散。以補固元氣。或用萆薢子肉一兩。細研成膏。塗母右脚心。衣下即洗去。緩則腸亦出。如腸不上。仍用此膏塗腦頂。則腸自入。益母丸亦効。寶慶方。胎衣未下。若欲斷臍帶。先以少物擊墜。然後斷之。否則。胞上掩心而死。

治驗

家人婦胞衣不出。胸腹脹痛。平不敢近。此瘀血為患。用熱酒下失笑散一劑。惡露胎衣即並下。一產婦胎衣不出。腹不脹痛。手按之痛稍緩。此是氣虛而不能送出。用無憂散而下。前症余詢諸穩婆云。宜服益母草丸。或就以產婦頭髮入口作嘔。胎衣自出。其不出者必死。投與前法甚効。

爻骨不開陰門。不閉子宮不收

三者皆元氣不足。觀諸治驗可見其爻骨不開者。用芎歸湯加髮灰。龜板補而開之。陰門不閉者。用十全大補加五味子。補而飲之。子宮不收者。補中益氣加醋炒芍藥半夏。補而舉之。或助以外治之法。

治驗

地官李孟卿娶。三十五歲。惟女為繼室。妊娠慮其難產。與加味芎歸湯。四劑備用。果產門不開。服之頓然分婉。

西賓費懷德之室。下血甚多。產門不開。兩日未生。服前藥一劑。即時而產。已後育胎。並無此症。懷德傳與服者。無有不効。

一婦人分娩最易。至四十妊娠，下血甚多。產門不閉，亦與前湯一劑。又用無憂散斤許。一劑煎熟時時飲之，以助其血而產。

一座婦陰門不閉，發熱惡寒。用十全大補加五味子數劑。而寒熱悉退。又用補中益氣加五味子數劑。而飲若初產腫脹，或腹痛而不閉者。當用加味道逍散。若腫既消而不閉者。當用補中益氣湯。切忌寒涼之劑。一婦人脾胃素弱，兼有肝火。產後陰門腫痛，與熱作渴。嘔吐不食。數大黃等藥服驅利之劑。腫反於臂。虛症蜂起。此真氣虛而作。先用六君子以固脾胃。乃以補中益氣湯升舉。不數劑而消。

一座婦失治，腫滑不已。形體消瘦，飲食不思。朝寒暮熱。自汗盜汗半年矣。用補中益氣加伏苓半夏以健脾胃。膿水漸少。飲食漸進。用歸脾湯以解脾鬱。共五十餘劑。元氣復而瘡亦愈矣。

一座婦陰門不閉。小便淋瀝，腹內一物。攻動腸下。或脹或痛。用加味道逍散。加車前子而愈。

一婦人子宮腫大。二日方入損落。一片殊類猪肝。已而面黃體倦。飲食無味。內熱肺熱。自汗盜汗。用十全大補湯。二十餘劑。諸症悉愈。乃復生育。血滯成癰。方見後。

產後腹痛

產後小腹作痛，俗名兜枕塊。用失笑散行散之。若惡露既去，而仍痛，用四神散調補之。若不應用八珍湯。若痛而惡心，或欲作嘔，用六君子湯。若痛而泄瀉，用六君子湯送四神丸。若泄瀉痛而或後重，用補中益氣湯送四神丸。若胸膈飽脹，或惡食吞酸，或腹痛手不可按，此是飲食所致。當用二陳加山楂白朮以消導。若食既消而仍痛，或按之不痛，或更加頭痛煩熱，作渴惡寒，欲嘔等症。此是中氣被傷，宜補脾胃為主。若發熱腹痛，按之痛甚，不惡食，不吞酸。此是瘀血停滯，用失笑散以消之。若止是發熱頭痛，或兼腹痛，按之却不能止。此是血虛，用四物加炮薑參术以補之。病機要云：胎產之病，從厥陰經論之。無犯胃氣及上二焦為之三禁。不可汙，不可下，不可利。小便發汗者同陽寒下早之症。利大便則脈數而已，動於脾利小便，則內亡津液，胃中枯燥。製藥之法，能不犯三禁，則榮衛自和，而寒熱止矣。如發渴用白虎氣弱用黃芩。

刺痛則用當歸腹中痛則加芍藥宜詳察脉症而用之。丹溪先生云產後當大補氣血為先雖有雜症從末治之一切病多是血虛皆不可發表。

治驗

一產婦腹痛發熱。口渴大余以為飲食停滯不信乃破血補虛反寒熱頭痛嘔吐涎沫又用降火化瘀理氣四肢逆冷泄瀉下墜始信謂余曰何也余曰此脾胃虛之變症也法當溫補遂用六君加炮薑二錢肉桂木香一錢四劑諸症悉退再用補中益氣之劑元氣悉復。

一婦人產後腹痛後重去利無度形體倦怠飲食不甘懷抱久鬱患崩漏而盜汗如雨竟夜不敢寐神思消爍余曰氣血虛而有熱用當歸大黃湯內黃芩連柏炒黑一劑汗頓止再劑全止乃用歸脾湯八珍散兼服元氣漸服而愈。

一產婦小腹作痛服行氣破血之藥不效其脈洪數此瘀血內滯為癟也以瓜子仁湯二劑痛止更以太乙膏下癟而愈產後多有此病縱非癟患用之更効。

一產婦小腹疼痛小便不利用薏苡仁湯二劑痛止更以四物加桃仁紅花下瘀血而愈大抵此症皆因榮衛不調或瘀血停滯所致若脉洪數已有洪脉但數微有癟脉遲緊乃瘀血下之即愈若腹脹大轉側作水聲或癟從臍出或從大使出宜用蠟簪丸太乙膏及托裡藥。

一產婦小腹作痛有塊脉芤而濶以四物加玄胡索紅花桃仁牛膝木香治之而愈。

一婦人產後小腹患痛服瓜子仁湯下瘀血而痊凡瘀血停滯宜急治之緩則腐化為癟最難治療若流注關節則患骨疽失治多為敗症。

一婦人因經水多加瀡樂止之致腹作痛以失笑散二服而瘳。

產後血量并失血

產後元氣虧損惡露來虛上攻眼花頭暈或心下滿悶神昏口噤或痰壅盛者急用失笑散主之若血下

多而暈或神昏煩亂者大劑弓歸湯補之或芸薹子散或童子小便有波加二陳湯若因勞心力而致者宜補中益氣加香附若因氣血虛極不省人事用清魂散繼以弓歸湯及大補氣血之劑凡產可預燒鐵鉗令赤以器盛之急至床前以醋沃之或以醋塗口鼻聞之即醒或用破舊漆器或乾漆燒烟薰之或用半夏末冷水和丸入鼻孔中並無前患丹溪先生云血暈因氣血俱虛痰火泛上宜以二陳導痰或加減砂砂安神丸以麥門冬湯下亦可大凡產後口眼喎斜等症當大補氣血為主而兼以治瘀若脾胃虛而不能固者用六君子湯至五七箇月宜服安胎飲至八九箇月再加大腹皮黃楊腦如臨產時更宜服保生無憂散庶無前患

治驗

一產婦月餘矣因怒兩脇脹痛忽吐血甚多發熱惡寒胸腹脹滿用八珍加柴胡丹皮炮薑而安却用十全大補仍加炮薑而愈前症因脾肺氣血虧損而胸腹虛痞雖投大補若非薑桂辛溫助其脾肺以行藥勢亦無以施其功而反助其脹耳

家人婦產後小腹作痛忍牙關緊急遂以失笑散良久而甦又用四物加炮薑白朮陳皮而愈

一產婦筋掣臂軟肌肉掣動此氣血俱虛用十全大補湯而愈

一產婦兩手麻木服愈風丹天麻丸遍身皆麻神思倦怠頭熱作渴自汗盜汗此氣血俱虛也用十全大補加炮薑數劑諸症悉退却去炮薑又數劑而愈但內熱此血虛也用逍遙散而痊

產後發瘡瘍當作瘻

產後發瘡因去血過多元氣虧極或外邪相搏其形牙關緊急四肢勁強或腰背反張肢體抽搐若有汗而不惡寒者曰柔症若無汗而惡寒者曰剛症然產後患之實由亡血過多筋無所養而致故傷寒汗下遇冷清瘡膿血大泄多患之乃敗症也若大補血氣多保無虞若攻風邪冗無疑矣

治驗

一產婦牙關緊急腰背反張四肢抽搐兩目連劄余以為去血過多元氣虧損陰火熾盛用十全大補加炮薑一劑而甦又數劑而安

余在吳江史萬湖第將入更時聞喧嚷云某家人婦忽仆牙關緊急已死矣詢云是新產婦出直厨余意其勞傷血氣而發瘓也急用十全大補加附子煎滾令人推正其身一人以手夾正其面却空開其口將藥灌之不喫藥已冷令側其面出之仍正其面復灌以熱藥又冷又嘔如此五次方嚥下隨灌以熱藥遂甦

產後便血

產後便血或飲食起居或六淫七情以致元氣虧損陽絡外傷治法若因膏粱積熱用加味清胃散若因醇酒濕毒葛花解醒湯若因怒動肝火六君加柴芍引歸若因鬱結陽脾加味歸脾湯若因思慮傷心炒香散若因大腸風熱四物加側柏荆防枳殼槐花若因大腸血熱四物加苓連若因腸胃虛弱六君加升麻柴胡若因腸胃虛寒六君加肉蔻木香若因元氣下陷補中益氣加茯苓半夏若因氣虛用六君升麻若因血虛用四物氣血俱虛用八珍俱加柴胡升麻大凡病久或元氣虛弱見病百端皆因脾胃虧損內真寒而外假熱但用六君子或補中益氣加炮薑溫補脾氣諸症悉退若四肢畏冷屬陽氣虛寒急加附子病固少端當臨症制宜庶無誤矣

治驗

一產婦產後下血諸藥不應飲食少思肢體倦怠此中氣虛弱用補中益氣加茱炒黃連五分四劑頓止但怔忡少寐盜汗未止用歸脾湯治之而痊一婦人但怒便血寒熱口苦或胸脇脹痛或小腹痞悶此本乘土用六君加山梔柴胡而愈用補中益氣加味逍遙二藥而不復作

一婦人久下血在糞前屬脾胃虛寒元氣下陷用補中益氣加連炒吳茱一錢數劑稍緩乃加生吳茱五分數劑而愈

一婦人產後便血口乾飲湯胸脇膨滿小腹悶墜內熱晡熱飲食不甘體倦面白日晡則赤酒浙惡寒此脾肺氣虛先用六君加炮薑木香諸症漸愈用補中益氣將愈用歸脾湯全愈後飲食失節勞役兼怒氣發熱血崩夜間熱甚譖語不絕此熱入血室用加味小柴胡二劑而熱退用補中益氣而血止用逍遙散歸脾湯調理而康

產後大便不通

產後大便不通因去血過多大腸乾涸或血虛火燥乾涸不可計其日期飲食數多用藥通之潤之必待腹滿覺脹目欲去而不能者乃結在直腸宜用猪膽汁潤之若服苦參藥潤通反傷中焦元氣或愈加難通或通而瀉不能止必成敗症若屬血虛火燥用加味道遇散氣血俱虛八珍湯慎不可用麻子杏仁枳殼之類

治驗

一產婦大便不通七日矣飲食如常腹中如故余曰飲食所入雖倍常數腹不滿脹用八珍加桃杏二仁至二十一日腹滿欲去用猪膽汁潤之先去乾糞五七塊後皆常糞而安

一產婦大便八日不通用通利之藥中脘作痛飲食甚少或云通則不痛痛則不通乃用蜜導之大便不禁吃逆不食余曰此脾胃復傷用六君加吳茱萸果骨脂五味數劑喜其年壯不然多致不起

產後寒熱

產後寒熱因氣血虛弱或脾胃虧損乃不足之症經云陰虛則發熱陽虛則惡寒苦兼大便不通尤屬氣血虛弱切不可用發表降火若寸口脉微名陽氣不足陰氣上入於陽中則惡寒用補中益氣湯尺部脉弱名陰氣不足陽氣下陷於陰中則發熱用六味地黃丸大抵陰不足陽往從之則陽內陷而發熱陽不足陰往從之則陰上入而惡寒此陰陽不歸其分以致寒熱交爭故惡寒而發熱也當用八珍湯若病後四肢發熱或形氣倦怠此元氣未復濕熱乘之故耳宜補中益氣湯若肌熱大渴引飲目赤面紅此血虛

發熱用當歸補血湯若認為寒則誤矣

治驗

一產婦惡寒發熱用十全大補加炮薑治之而愈但飲食不甘肢體倦怠用補中益氣而安又飲食後犯怒惡寒發熱抽搐咬牙難候其脉視其面色青中隱黃欲按其腹以手護之此肝木侮脾土飲食停滯而作用六君加木香一劑而安

一產婦惡寒發熱余欲用八珍加炮薑治之其家知醫以為風寒用小柴胡湯余曰寒熱不時乃氣血虛不信仍服一劑汗出不止譁語不絕煩熱作渴肢體抽搐余用十全大補二劑益甚脉洪大重按如無以前湯加附子四劑稍緩數劑而安

產後咳嗽

產後咳嗽或因陰血耗損或因肺氣虧傷或陰火上炎或風寒所感主治之法若陰血虛者用芎歸熟地參木肺氣傷者用四君芎歸桔梗陰火上炎者六味地黃加參木風寒所感者補中益氣加桔梗紫蘇若瘀血入肺發喘急用二味參蘇飲多有得生者若兼口鼻起黑或鼻出血急用前散亦有得生者然而所患非因胃氣不足蓋胃為五臟之根本人身之根蒂胃氣一虛五臟失所百病生焉但患者多謂腠理不密所致殊不知肺屬辛金生於己土亦因土虛不能生金而腠理不密外邪所感口陰火上炎亦壯土金生腎水以制火為善若逕治其病則誤矣

治驗

一產婦咳嗽聲重鼻塞流涕此風寒所感用參蘇飲一錘頓愈六七乃與補中益氣加桔梗茯苓半夏一劑而痊又與六君加黃芩以資其腠理而安

一產婦朝吐痰夜發熱兼之無寐汙用清瘡降火肌體日瘦飲食日少前症愈甚余曰早間吐痰脾氣虛也夜間發熱肝血虛也晝夜無寐脾血耗也遂用六君子湯加味道適能加味歸脾湯以次調補不月而痊

一產婦咳嗽痰盛面赤口乾內熱。肺熱作無時。此陰火上炎。當補脾腎。遂用補中益氣湯。六味地黃丸而愈。

一產婦咳而腹滿不食。涕唾面腫。氣逆此病在胃。關於肺。用異功散而愈。
時疫墮胎咳嗽見小產

產後瘧疾

產後瘧疾。因脾胃虛弱。飲食停滯。或因外邪所感。或鬱怒傷脾。或暑邪所伏。審係飲食。用六君加桔梗蒼术藿香。如外邪多而飲食少。用藿香正氣散。如外邪少而飲食多。用人參養胃湯。飲食勞役。用補中益氣湯。氣血虛弱。用十全大補加炮薑。虛寒用六君子。加姜桂。元氣脫陷。急加附子。大凡久瘧。多屬元氣虛寒。益氣虛則寒。血虛則熱。胃虛則惡寒。陰火下流。則寒熱交作。或吐瀉不食。腹痛煩渴。發熱譁語。或手足逆冷。寒戰如慄。雖見百症。當峻溫補。其病自退。若誤用清脾截瘧之類。多致不起。

治驗

一座婦患瘧發熱作渴。腳脹滿遍身作痛。三日不食。嘸酸噯氣。此是飲食所傷。脾胃不能消化。用六君加神曲山楂四劑而不作酸。乃去神曲山楂。又數劑而飲食進。其大便不通。至三十五日。計進飲食七十餘碗。腹始悶。令用猪胆汁導而通之。其糞且不甚燥。

一座婦患瘧久不愈。百病蜂起。其脉或洪大。或微細。或弦緊。或沉伏。難以名狀。用六君子。加炮薑二十餘劑。脉症稍得。又用參术煎膏。佐以歸脾湯。百餘劑而瘥。

一座婦朝寒暮熱。或不時寒熱。久不愈。用六君子。補中益氣。兼服百餘劑而尋愈。
產後瘧疾心脾痛見小產

產後漏利二症治同兼嘔吐

產後漏利。或因飲食傷損脾土。或脾土虛不能消食。當審而治之。若米食所傷。用六君子加穀蘖。若麵食所

傷用六君加麥蘖若肉食所傷用六君加山楂神曲凡兼嘔吐皆加藿香若兼喫酸或嘔吐用前藥送越鞠丸若肝木來侮脾土用六君加柴胡炮薑若寒水反來侮土用錢氏益黃散若久瀉或元氣下陷兼補中益氣湯以升發陽氣若瀉痢色黃乃脾土真氣宜加木香肉果若屬脾土虛寒當用六君加木香姜桂若脾腎虛寒用補中益氣及四神丸若屬命門火衰而脾土虛寒用八味丸以補土母若小便濁滯肢體漸腫或兼喘咳用金匱腎氣丸以補脾腎利水道若胃氣虛弱而四肢浮腫治須補胃為主若久而不愈或非飲食所傷而致乃屬腎氣虧損蓋胞胎主於任而係於腎况九月十月乃腎與膀胱所養必用四神六味八味三藥以補腎若用分利導水之劑是虛其虛也

治驗

一產婦瀉痢發熱作渴吐痰甚多肌體消瘦飲食少思或胸膈痞滿或小腹脹墜年餘矣余以為脾胃濕朝用二神丸夕用六君子湯二月餘而痊

一婦人產後泄瀉兼嘔吐嘔酸面目浮腫此脾氣虛寒先用六君加炮薑為主佐以越鞠丸而喫酸愈又用補中益氣加茯苓半夏而脾胃康

一產婦瀉痢年餘形體骨立內熱晡熱自汗盜汗口舌糜爛日吐痰三碗許脉洪大重按全無此命門火衰脾土虛寒而假熱然煩者乃脾虛不能統攝歸源也用八味丸補火以生土用補中益氣湯兼補肺金而脾胃健

一產婦腹痛後重去瀉無度形體倦怠飲食不進與死為鄰此脾胃俱虛用四神丸十全大補湯而愈但飲食難化肢體倦怠用補益湯調理而康

一婦人五月患病日夜無度小腹墜痛發熱惡寒用六君子湯送香連丸二服漸愈仍以前湯送四神丸四服全愈至七月終急憎嗜睡四肢不收體重筋痛口舌乾燥飲食無味大便不實小便頻數洒淅惡寒悽慘不樂此肺之脾胃虛而陽氣寒不伸也用升陽益胃湯而痊

附方并註

加味逍遙散 治血虛有熱。遍身搔癢。或口燥咽乾。發熱盜汗。食少嗜卧。小便澀滯等症。

甘草炙

當歸炒

芍藥酒

茯苓

白朮炒

柴胡錢一

牡丹皮

山梔炒五分

右水煎服

逍遙散即前方去丹皮山梔

歸脾湯 治脾經失血。少寐發熱盜汗。或思慮傷脾。不能攝血妄行。或健忘怔忡。驚悸不寐。或心脾傷痛。急慚嗜卧。飲食不思。

人參

白朮

白茯苓

黃芪炒

當歸

龍眼肉

遠志

酸棗仁炒各一錢

木香五分

甘草炙五分

右薑棗水煎服

又加味歸脾湯即前方加柴胡山梔

六君子湯即異功散加半夏。

十全大補湯 治諸臟虧損。氣血俱虛。惡寒發熱。或自汗盜汗。便血吐血。或大便不實。飲食少思。或胸腹作痛。口舌生瘡。或耳目不明。牙齒不固。

人參

白朮

白茯苓

黃芪

當歸

川芎

熟地黃

蒸燉

白芍藥炒各一錢

肉桂

甘草炙五分

右薑棗水煎服

八珍湯 治脾胃虧損。氣血俱虛。乃內傷之症。蓋人之生。以脾胃為主。脾胃一虛。諸臟失所。百病生焉。即前方大補湯去黃芪肉桂。

當歸補血湯 治肌熱躁熱。目赤面紅煩渴。引飲晝夜不息。脉洪大而虛。重按全無。此脉虛血虛也。若悞服白虎湯必死。

當歸三錢

黃芪一兩

右水煎服

清胃散 治胃經濕熱。牙齒或牙根腫痛。或牽引頭腦或面發熱。

當歸身酒拌一錢 苗連

生地黃酒拌半錢

升麻錢二分

牡丹皮五分

右水煎服

加味清胃散

治脾胃有熱口內生瘡或齒作痛或齦腐爛

即前方加犀角連翹甘草

小柴胡湯

治肝膽經症寒熱往來或胸熱潮熱不欲飲食或口苦耳聾

咳嗽發熱或脇痛肢滿轉側不便或瀉利嘔吐酸水

柴胡錢

黃芩一錢五分

半夏錢一錢

人參錢

甘草錢五分

右薑棗水煎服

加味小柴胡湯

治婦女經行感冒發熱熱入血室寒熱如瘧晝則安靜夜則發熱妄語或素血虛大勞

大怒火動熱入血室亦能致此即前方加生地黃

當歸六黃湯

治氣血虛而發熱盜汗等症

當歸錢

黃芩炒

生地黃

熟地黃錢

黃芩炒

黃柏五分

右水

煎服

黃芩清肺飲

治肺熱而小便不利

黃芩

山梔錢

一石水煎服

煎服不利加鹽豉二十粒

六味丸

一名地黃丸加肉桂減八味丸

治腎虛發熱作渴噉渴小便淋瀝頭暈眼花咽燥唇裂齒不堅固腰腿酸軟自汗盜汗便血諸血失精水泛為痰之聖藥血虛發熱之神劑

熟地黃半斤 肉桂半錢 茄肉

乾山藥

錢四

牡丹皮

白茯苓

澤瀉

錢三

右各另為末和地黃加煉蜜丸桐子大每服七八丸空心食前白滾湯下地黃須自製

八味丸

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思或腰腹疼痛或多游潤即前方加桂附各一兩加減八味丸即六味丸加肉桂一兩

加減濟生腎氣丸

治脾胃虛腰重腳腫濕飲留積小便不利或肚腹脹四肢浮腫氣喘痰甚或已成水滯其效如神

白茯苓三

附子兩

川牛膝

桂心

澤瀉

車前子

山茱萸

山藥

牡丹皮

熟地黃

四兩
生地黃一
丹皮一
柏子膏半

右為末和地黃膏。加煉密丸桐子大。每服七八十九

空心米飲下。

四物二連湯 治血虛發熱或口舌生瘡或晝安夜熱。

當歸

川芎

芍藥

熟地黃

胡黃連

宣黃連錢一

右作一劑水煎服。

白虎湯

治胃熱作渴暑熱尤効。

知母

一錢五分

石膏

錢四

粳米合

右

作一劑水煎服。

錢氏益黃散 治脾土虛寒水反來侮土而嘔吐不食或肚腹作痛或大便不實手足逆冷等症。

陳皮

青皮

阿子肉

甘草

火一錢

丁香錢

右為粗末。每服四錢水煎服。

二神丸 治脾腎虛弱。早晨五更作瀉或全不思食或食而不化大便不實。神功。

破故紙四兩 肉豆蔻二兩 生用。右為末用大紅棗四十九枚生薑四兩切碎同棗用水煮熟去薑取棗肉和藥丸桐子大。每服五十九空心鹽湯下。

人參理中湯 治脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少思肚腹膨脹。

人參

白朮

乾薑炮

甘草

火一錢

右薑棗水煎服。

附子理中湯 治脾胃虛寒。手足俱冷飲食不入或腸鳴切痛嘔吐瀉即前方加附子一錢。

四君子湯 治脾胃虛損飲食少思或大便不實肢體消瘦或胸膈虛痞痰嗽吞酸或脾胃虛弱停食而患瘧痢或瘧痢因脾胃虛而不能愈。

人參

白朮

茯苓

各二錢

甘草

一錢

右

薑棗水煎服。

若因肝木剋脾土而致宜加柴胡引藥治之。火衰而患宜兼八味丸。異功散即前湯加陳皮。治脾胃虛弱飲食少思或久患咳嗽或腹滿不食面浮氣逆等症。

人參橘皮湯 治脾胃虛弱氣滯惡阻嘔吐痰水

甘草

分三
厚朴

白茯苓

去六分各三

人參

陳皮

白术

麥門去心各一錢

右用

淡竹茹一塊

薑水煎溫服

若因中脘停滯宜用二陳枳殼若因飲食停滯宜用六君子加枳殼若因脾胃虛宜用異功散竹葉湯 治妊娠心驚胆怯煩悶不安名曰子煩

白茯苓

麥門

黃芩

去兩分三

右每服四錢竹葉五片水煎服

若因血虛煩熱宜兼用四物若因中氣虛弱宜兼四君

紫蘇飲 治妊娠失調胎氣不安上痞作痛名子懸

大腹皮

川芎

白芍

陳皮

蘇葉

當歸

一錢

人參

甘草

各半

右薑葱水煎服

若肝脾氣血虛而有火不安宜兼逍遙散若脾氣虛弱而不安宜用四君子歸

膠艾湯

治妊娠賴仆胎動不安腰腹疼痛或胎上搶或去血腹痛

膠艾

一兩

父葉

數

右二味以水服一錢取二升分三服

阿膠散

或頓仆或因毒藥胎動不安或脇痛腹痛上搶短氣

熟地黃

父葉

白芍

川芎

黃芪

阿膠

當歸

甘草

一兩

右每服四錢薑水煎

枳殼湯

治胎漏下血或因事下血

枳殼

炒半

黃芩

去兩分半

白术

一兩

右為末每服一錢白湯調下

二黃散

治胎漏下血或內熱肺熱或頭痛頭暈或煩躁作渴或脇肋脹痛等症

生地黃

熟地黃

右為末每服三錢煎白术只設湯下

前四症若因脾胃虛弱宜用補中益氣湯加五味。若因脾胃虛陷宜用前湯倍用升麻柴胡。若因肺熱內熱宜用逍遙散。

知母丸 治妊娠腹外胎動不安或欲墜產用知母一味炒為末丸梧桐子大每服二十丸白湯下或嚼嚥之。

地黃當歸湯治血虛胎動。

當歸一 熟地黃二 右每服五錢水煎。

若因脾胃虛而血虛者宜用四君子湯。氣血俱虛者宜用八珍湯。

金生白木散 治妊娠面白虛浮四肢腫如水氣名曰胎腫。

白术一 生薑皮 大腹皮 陳皮 白茯苓各半 右各為末每服二錢米飲下。

若未應佐以四君子湯。

天仙藤散 治妊娠自三月之後足指發腫漸至腿膝飲食不甘狀似水氣或脚指間出黃水名曰子氣。

天仙藤洗畧香附炒 陳皮 甘草

烏藥各等

右每服三五錢生薑木爪各三片。

紫蘇三葉水煎食前日進三服。

若因脾胃虛弱宜兼六君子中氣下陷用補中益氣湯。

安榮散 治妊娠小便澀少遂成淋澀名曰子淋。

麥門冬去通草 滑石各二 當歸 燈心 甘草各五 人參

細辛各一 右為末每服二錢煎麥門湯調下。

若因肺經蘊熱宜用黃芩清肺飲。若因膏粱厚味宜用清胃散。若因肝經濕熱宜用加味逍遙散。

羚羊角散 治妊娠虛風頸項強直筋脉攣急語言蹇塞痰涎不利或時發搐或不省人事名曰子癇。

羚羊角 錠 川獨活 酸棗仁炒 五加皮各五 桔梗以仁 防風

當歸

川芎

茯神

杏仁各四

木香

甘草各半

右每服五錢水煎

若因肝經風熱或怒火所致須用加味逍遙散。

安胎飲 治妊娠五七箇月用數服可保全產

白朮

人參

當歸

川芎

熟地黃

白芍

陳皮

甘草

紫蘇

炙黃芩一錢

右用薑水煎服

若因中氣虛弱須用四君子加陳皮紫蘇若陰虛內熱宜用四物黃芩白朮。

二陳湯 治妊娠失調脾胃不和嘔吐痰涎或飲食不思。

陳皮

茯苓各一錢半夏一錢

甘草五分

右薑水煎服脾胃虛弱用六君子氣滯用紫蘇飲。

麥門冬湯 治妊娠失於調養內熱口乾或胎動不安。

麥門冬

防風

白茯苓

人參一錢

右作一劑水煎服。

若血虛有熱用逍遙散氣虛有熱用四君加黃芩紫蘇。

鯉魚湯 治胸滿腹脹小便不通遍身浮腫。

白朮

茯苓

當歸

芍藥各三錢

右細判用鯉魚一頭煮取汁每藥四錢入汁一

盞半薑七片橘皮少許煎服。若脾胃虛佐以四君子湯。

達生散 治妊娠八九月服數劑甚効。

大腹皮

洗醃三錢

人參

甘草

紫蘇梗葉

陳皮各五分

右水煎入黃楊葉七

蟄芩五葉煎服。

春加川芎夏加黃芩冬依正方或有別症以意消息加減。

保生無憂散 臨產服之補其血順其氣使易產又治小產瘀血腹痛。

南木香

當歸

川芎

白芍藥

只投

乳香

血除脚癆

右等分

每服二三錢水煎日二服

若胞衣既破其血已涸或元氣困憊急用八珍湯斤許水數碗煎熟時飲救之飲盡再制亦有得生
芎歸補中湯 治氣血虛半產

艾葉代

阿膠炒

川芎

五味子炒

黃芪炙

當歸

白术炒

芍藥炒

人參

杜仲炒各一錢

甘草根五分

右每服五錢水煎服

若脾氣虛弱須用補中益氣湯若氣虛而有火宜用安胎飲

人參黃芪湯 治小產氣虛血下不止

人參

黃芪

當歸炒

白术炒

白芍炒

父葉各一錢

阿膠炒

右作一劑

芸薹散 治孕婦九竅出血或作量飲死

芸薹子

當歸焰各一錢

芍藥

官桂各半

右為末每服三錢以酒并童便各半盞調灌下

立瘧或一味童便溫飲尤効

前二症若脾胃氣虛不能統血宜用四君子歸中氣下陷補中益氣湯若血脫須補氣為主

當歸川芎湯 治小產後瘀血心腹疼痛或發熱惡寒

當歸

川芎

熟地黃

白芍藥炒

玄胡索

桃仁

紅花

香附

青皮炒

澤蘭

牡丹皮

右水煎入童便酒各小半盞服

若以手按腹愈痛此是瘀血為患宜用此藥或失笑散消之若按之反不痛此是血虛宜用四物參苓白朮若痛而作

嘔此是胃虛宜用六君子若痛而作嘔此是脾虛宜用六君子送二神丸

四物湯 治產後及諸症血虛發熱或口舌生瘡或齒齦腫潰或日晡發熱

當歸

熟地黃各三分

芍藥炒三

川芎一錢

右作一劑

水煎服

若因氣虛不能生血而患

前症宜補脾胃

加味四物湯即前方加白朮茯苓柴胡丹皮

四神散 治產後血虛或瘀血腹痛

當歸錢二
川芎

芍藥一錢
炮薑五分
右水煎服

當歸散 治產後氣血虛惡露內停增寒發熱宜服此去之

當歸

白芍炒

川芎

黃芩各一錢
白朮錢五

右為細末溫童便調下二錢

失笑散 治產後心腹絞痛欲死或血迷心竅不知人事又尋常腹內淤血積血作痛

五靈脂

蒲黃等分
右每服三錢酒煎服

若瘀血去多而元氣虛損所致宜用四君子歸

炮薑

解語湯 治風客心脾舌強不言。

附子炮

防風

天麻

酸棗仁各一兩炒

右每服二三錢水煎服

若因脾胃風熱用

秦艽升麻湯。

抱膽丸 治心驚不語或癲癇等症

水銀二兩

黑鉛錢五

硃砂研

乳香各一兩
另研

右將鉛入跳下水銀成砂次下硃砂乳香乘

熱用木鎚研勻丸鷄頭大每服一丸 若因心氣虛用妙香散

二母散 治產後惡露上攻留於肺經咳嗽喘促

知母

目母

白朮苓

人參

桃仁

杏仁各一兩並去皮尖

右每服五錢薑

水煎 若瘀血既去而嗽仍作宜補中氣

二味參蘇飲 治產後瘀血入肺咳嗽喘急

人參加

朱木仁

古作一匁水煎服

若既愈而當用六君子以補脾胃若口鼻黑氣起急用

清魂散 治產後元氣虛瘀血逆行作暈。
此藥加附子五錢亦有得生者。

澤蘭葉

人參

荆芥穗

川芎

甘草

右為末。熟湯溫酒各半。調下二錢。

若因瘀血去多。宜四物加參芩。曰木不應血脫也。急補其氣。

硃砂安神丸 治產後血暈。心神驚悸等症。

硃砂

飛鴟五錢

生地黃

一錢

黃連

酒先六錢

甘草

於五

當歸

五分

右為末。飯糊為丸。每服十五丸。

若因中氣虛。宜用四君子歸兼思慮傷脾須用歸脾湯。

奪命丹 治瘀血入胞胎。脹滿難下。急服此藥。血即消。衣自下。

附子

半兩

牡丹皮

一兩

乾漆

炒令烟盡一兩半之

右為細末。好醋一升。大黃末一兩。同熬成膏。和藥丸如

桐子大溫酒吞五七丸。

沱藥石散 治胎衣不下。其効如神。及打撲傷損。腹中瘀血脹痛。欲死服之。血化為水。其功不能盡述。

硫黃

四兩

冰糖

明淨者未

花藥石

一兩半

右二味相拌和匀。先用紙筋和益泥固濟。瓦罐子一箇。

候泥乾入藥。再用泥封口。候乾安在四方磚上虛畫八卦五行字。用炭三十片。周疊煅之。候冷取出。為

細末。每服一錢。童便調下。

平胃散 治腸胃寒受濕下血等症。

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

右薑棗水煎服。

益母草丸 五月採陰乾石器為末。煉蜜丸。彈子大臨產以童便和溫酒化下。

加味芎歸湯 治分娩交骨不開。或五七日不下垂死者。

生男女婦人髮

一握燒灰存性

川芎

當歸

一錢

白芍

當歸

一錢

右為末。每一兩水煎服。

煎服良矣。不問生死。胎自下。

芎歸湯 治產後去血過多。量煩不省。用川芎當歸二味等分。每劑半兩水煎服。

若腹疼加桂腹痛。自汗頭眩少氣加羊肉。若不應用八珍湯。

七味白朮散 治中氣虛口乾或吐瀉等症。

人參 白朮 " 木香 白朮苓 甘草 蕙香 乾葛各一 右作一

劑水煎服。

選奇湯 治風熱上壅。眉棱骨痛。或頭目眩暈等症。

羌活

防風錢各二

甘草二錢夏生冬炒酒芩終去之

右每服三錢水煎時時飲之。

葛花解醒湯 治酒精。上下分消其濕。

白荳蔻 砂仁

葛花錢各五

木香五

青皮錢三

陳皮

白朮苓

猪苓

人參錢半

白朮

神曲炒

澤瀉

生乾薑錢二

右為細末每服五

錢白湯調下。

藿香正氣散 治外感風寒內停飲食。頭疼寒熱。或霍亂泄瀉。或作瘧疾。

桔梗

厚朴一錢

大腹皮

紫蘇

茯苓

白芷

半夏曲

陳皮

白朮

甘草錢各一錢

藿香五

右作一劑。藿葉水煎熱服。

清燥湯 治元氣虛。濕熱乘之。遍身瘦軟。絕寒水生化之源。小便赤少。大便不調等症。

黃芪五錢

五味子九粒

甘草連

神曲炒

猪苓

柴胡

甘草錢各二分

蒼朮

麥門冬

陳皮

白朮

生地黃

澤瀉錢五

白朮苓

人參

當歸

升麻錢三

酒柏分

右作一劑。水煎服。

人參養胃湯 治外感風寒。內傷飲食。寒熱頭疼。或作瘧疾。

半夏

厚朴製

橘紅少

藿香葉

草薢

茯苓

人參五

甘草

蒼术錢 右作一劑薑七片烏梅一箇水煎服

大防風湯

治足三陰虛患鶴膝風壓筋風等症不問或腫而不痛或清未動

附子

炮去皮一錢

白术

炒

羌活

人參

川芎

五分一錢

防風

甘草

牛膝

酒臺一錢

黃芩

錢二

當歸

酒二錢

白芍藥

錢二

杜仲

姜製

獨活濟生湯

治鶴膝及歷節痛風等症

白茯苓

杜仲

當歸

酒

防風

白芍藥

人參

細辛

桂心

熟地黃

牛膝

秦艽

芎藭

桑寄生

甘草

獨活

三一錢

右每服一兩薑水煎

羌活勝濕湯

治痛風血虛腫痛身重脉緩等症

羌活

獨活

去蘿一錢

藁本

防風

川芎

甘草

蔓荆子

分五

一劑

薑水

煎服

附子八物湯

治歷節作痛發熱作渴飲食少思等症

附子

炮乾薑炮

芍藥

炒

茯苓

人參

甘草

錢一肉桂錢

白附子

錢二右作一劑

水煎食前服

四生散

治臙腿生瘡或癬疥等症

白附子

黃芪羌活

沙苑蒺藜

右各等分為末每服二錢用猪腰子批開入藥

濕紙包裹煨熟細嚼鹽湯下風癬酒下

妙香散

治心脾虧損大便下血又治心氣不足精神恍惚少睡盜汗

人參

桔梗

甘草各五

遠志

山藥

姜汁

茯苓皮

黃芩各一

辰砂引經

麝香另研

木香

錢半

茯神

右為末每服二錢溫酒調服

漏蘆散 治血風走注作痛無定處

漏蘆

當歸

牛膝

分三

桂心

地龍

土去

防風

羌活

白芷

沒藥研

甜瓜子

略半

虎胫骨

是

敗鷓鴣

足一

右為細末

每服二錢

熱酒調下

補中益氣湯

治元氣不足四肢倦怠口乾發熱飲食無味或飲食失節勞倦身熱脉洪大而無

力或頭痛發熱或惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩

黃芩

五錢

甘草

三分

人參

當歸

酒炒

白芍

一分

升麻

柴胡

各三分

陳皮

一錢

右薑枣水煎服