

包氏醫宗

第一集 第二卷

經方歌括序

前人有曰。傷寒雜病論之方。乃古聖人所作。仲聖述之。後人尊之。曰經方。又曰經方能統治百病。不獨治傷寒也。愚謂其述在傷寒雜病論中。主治各症。立個方綱而已。至若互通用。統治百病。至廣大而精微。雖曰神而明之。存乎其人。而考其論。未嘗不顯。但先師嘗舉一隅。則不復也。爲學者。則必知此識彼。乃可用其方也。按其方貳百伍拾有伍。皆變化無窮。先師祇撮其要。而論法卻有不同。如桂枝湯。層層襯出。乃盡其神。故自太陽中風論。至婦人妊娠。及產後風止。凡貳拾參條。如桂枝加葛根湯。寥寥數語。撮盡其神。故以太陽病。項背強几几。反汗出惡風。論只壹條。須知先師立言。多者非重。少者不闕也。苟學者能以餘方倣此。參透諸方之神。而互通用。統治百病之道。卽在其中矣。惜夫後世之醫。不知此理。以先師之方。祇治傷寒。不治

他病。于是知音者寡。其道遂泯傳焉。故自晉唐而起。另開分類之書。按症索方。呆規相授。學之頗易。爲醫者日多。而醫方日盛。遂有八家。劉張朱李王薛李喻之方。與夫俗撰之藥。彙訂百種。雜出其間。偶得見效。各逞其神。竟不知其呆法誤人。雷同共弊。並未聞及先師活法。如何施用也。夫舉世昏迷。皆趨前轍。每臨場默想。如對症即投。不揣症源。專依方註。或不奏效。轉念他書。索盡萬方。難瘳一疾。其呆法流弊。又如是也。至陳氏始貶其非。而獨遵傷寒雜病論之方。名曰經方。別晉唐以後之方爲時方。又其次也爲俗方。又謂俗方卽是從時方套出。而時方又從經方套來。蓋前人所謂先師之書。爲衆方之祖。誠不謬也。由此觀之。業醫道者。豈可不尙經方乎。但其藥品兩數。製煮服次等規。稍錯釐毫。卽差千里。故陳氏作經方歌括。令人易記誦也。其未切方名。讀有忘題之弊。今以方名裁作首句。原其平仄。或七言。

或五言。而歌步題韻之。其藥有多寡。而法有簡繁。長短不拘幾韻。總以撮盡方規爲要也。此歌淺白。閱者易知。列碼書頭。原其次第。若經已明。而後讀此。施用之法。則庶乎其不差矣。是爲序。

光緒戊子歲仲秋月閩杭包育華桃初氏作於劍津仁壽官舍西
牕軒

傷寒方法目錄

方歌同

「壹」桂枝湯

成氏曰此湯
名卽陽旦湯
別

「參」桂枝加附子湯

「貳」桂枝加葛根湯

「肆」桂枝去芍藥湯

「伍」桂枝去芍藥加附子湯

「陸」桂枝麻黃各半湯

「柒」桂枝二麻黃一湯

「捌」白虎加人蔘湯

「玖」桂枝二越婢一湯

「拾」桂枝去桂加芍藥甘草湯

「拾壹」甘草乾薑湯

「拾貳」葛根加半夏湯

「拾伍」葛根湯

「拾陸」葛根加半夏湯

「拾柒」葛根黃芩黃連湯

「拾柒」葛根加半夏湯

「拾玖」大青龍湯

「拾捌」小青龍湯

「貳拾壹」桂枝加厚樸杏仁湯

「貳拾貳」麻黃杏仁甘草石膏湯

「貳拾叁」新加湯

「貳拾肆」乾薑附子湯

「貳拾伍」桂枝甘草湯

「貳拾陸」茯苓桂枝甘草大棗湯

「貳拾柒」厚樸生薑
半夏人蔘湯

〔貳拾玖〕芍藥甘草附子湯

〔參拾壹〕五苓散

〔參拾叁〕梔子豉湯

〔參拾伍〕梔子生薑豉湯

〔參拾柒〕梔子乾薑湯

〔參拾玖〕小柴胡湯

〔肆拾壹〕大柴胡湯

〔肆拾叁〕桃仁承氣湯

〔肆拾伍〕救逆湯

〔肆拾柒〕桂枝甘草龍骨牡蠣湯

〔肆拾玖〕抵當丸

〔伍拾壹〕大陷胸湯

〔伍拾叁〕文蛤散

〔伍拾伍〕柴胡桂枝湯

〔伍拾柒〕半夏瀉心湯

〔參拾〕茯苓四逆湯

〔參拾貳〕茯苓甘草湯

〔參拾肆〕梔子甘草豉湯

〔參拾陸〕梔子厚樸湯

〔參拾捌〕真武湯

〔肆拾〕小建中湯

〔肆拾貳〕柴胡加芒硝湯

〔肆拾肆〕柴胡龍骨牡蠣湯

〔肆拾捌〕抵當湯

〔伍拾〕大陷胸丸

〔伍拾貳〕小陷胸湯

〔伍拾肆〕白散

〔伍拾陸〕柴胡桂枝乾薑湯

〔伍拾捌〕十棗湯

〔伍拾玖〕大黃黃連瀉心湯

〔陸拾附〕附子瀉心湯

〔陸拾壹〕生薑瀉心湯

〔陸拾貳〕甘草瀉心湯

〔陸拾叁〕赤石脂禹餘糧湯

〔陸拾肆〕旋覆代赭石湯

〔陸拾伍〕桂枝人蔴湯

〔陸拾陸〕瓜蒂散

〔陸拾柒〕黃芩湯

〔陸拾捌〕黃芩加半夏生薑湯

〔陸拾玖〕黃連湯

〔柒拾桂子〕桂枝附子湯

〔柒拾壹〕桂枝附子

〔柒拾貳〕甘草附子湯

〔柒拾叁〕白虎湯

〔柒拾肆〕炙甘草湯

〔柒拾伍〕大承氣湯

〔柒拾陸〕小承氣湯

〔柒拾柒〕猪苓湯

〔柒拾捌〕蜜煎導方

〔柒拾玖〕茵陳蒿湯

〔捌拾桂子〕桂枝蘆皮湯

〔捌拾叁〕桂枝加芍藥湯

〔捌拾伍〕麻黃附子細辛湯

〔捌拾壹〕麻黃連阿膠湯

〔捌拾柒〕黃芩湯

〔捌拾捌〕附子湯

〔捌拾壹〕黃連湯

〔捌拾貳〕附子湯

士瓜根汁及
方

- 捌拾玖 桃花湯
「玖拾壹」豬膚湯
「玖拾叁」桔梗湯
「玖拾伍」半夏散及湯
「玖拾玖」四逆散
「百零壹」當歸四逆湯
「百零叁」麻黃升麻湯
「百零伍」白頭翁湯
「百零柒」理中丸
「百零玖」燒視散
「百拾壹」牡蠣澤瀉散
附加 小青龍湯 真武湯
減權 四逆散 理中湯 枳實梔子豉湯
量歌 古大升歌 古劑歌 枚數歌
- 玖拾吳茱萸湯
玖拾貳 甘草湯
玖拾肆 苦酒湯
玖拾陸 白通湯
玖拾捌 通脈四逆湯
壹百烏梅丸
「百零貳」當歸四逆加生吳茱萸湯
「百零肆」乾薑黃連黃芩人蔫湯
「百零陸」四逆加人蔫湯
「百零捌」通脈四逆加猪膽汁湯
「百零拾」枳實梔子豉湯
「百拾貳」竹葉石膏湯
小柴胡湯 白散 通脈四逆湯
古稱歌 古方升

傷寒方法 附經方歌括上

閩杭包育華桃初氏著

同學胞兄 鑑銘育陞

德輝

授男 德逮名一虛號識生 長孫楨孚號天白

德彰號仰山

德嘉名一琪號謙谷

授姪 德崇 姪孫介孚號劍夫

德瓊

全校

包煥輝

藍佳葵

俞漢基星五

劉廷俊杏邨

劉廷翰溥川

雷樹型典如

鄒獻玖珮琚

曾在田利人

合參

仲景全書方法

傷寒論原方

計一百一
十有二方

閩杭包育華桃初氏編

男識生參校

孫天白校字

「壹」桂枝湯方

桂枝去皮三兩

芍藥三兩

甘草炙二兩

大棗一枚十二

生薑切三兩

右五味咬咀。以水柒升。微火煮取叁升。去滓適寒溫。服一升。服已。須臾。熱稀粥一升餘。以助藥力。溫覆令一時許。遍身漸漸微似有汗者益佳。不可令如水流漓。病必不除。若一服汗出病瘥。停後服。不必盡劑。若不汗。更服依前法。又不汗。後服小促役其間。半日許。令三服盡。若病重者。一日一夜服。周時觀之。服一劑盡。病症猶在者。更作服。若汗不出者。乃服至二三劑。禁生冷粘滑肉麵。五辛酒酪臭惡等物。

〔貳〕桂枝加葛根湯

卽桂枝湯原方加葛根

四兩

右六味。以水七升。內諸藥。煮取三升去滓。溫服一升。不須飲粥。
餘如桂枝湯法。將息及禁忌。

〔參〕桂枝加附子湯

卽桂枝湯原方加附子

炮一枚

〔肆〕桂枝去芍藥湯

卽桂枝湯原方去芍藥。

〔伍〕桂枝去芍藥加附子湯

卽桂枝湯原方去芍藥加附子

炮一枚

右五味㕮咀。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。惡寒止。停後服。

〔陸〕桂枝麻黃各半湯

卽桂枝湯麻黃湯各半之數取

桂枝 六兩 十
六 銖

芍藥 一兩

生薑 切一兩

甘草 一兩
灸

麻黃 一兩
去節

大棗 四枚

杏仁

二十四枚 湯漫去皮
尖及雙仁者後倣此

右七味。以水五升。先煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取一升。
八合去滓。溫服六合。

〔柒〕桂枝二麻黃一湯

此方分兩依成氏本照數推之即是桂枝湯。多一錢桂草俱多一錢。麻黃亦多一錢。或

桂枝 一兩
七 銖去皮

芍藥 一兩

六 銖

生薑 六 銖

甘草 一兩
二 銖炙

大棗 五枚

五 銖擘

杏仁 十六枚
去皮尖

右七味。以水五升。先煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。
去滓。溫服一升。日再服。

〔捌〕白虎加人蔘湯

知母 六兩

石膏 一兩
一 劍裹碎

甘草 二兩
炙

粳米 六合

人蔘 三兩

右五味。以水一斗。煮米熟湯成。去滓。溫服一升。日三服。

「玖」桂枝二越婢一湯

此方一分兩依成氏本卽是桂枝湯肆分壹銖大棗少半枚湯

桂枝

十八銖去皮

芍藥

十八銖

麻黃

十八銖去節碎棉裹

甘草

十八銖炙

大棗

四枚擘

生姜

二兩

石膏

二十四銖碎棉裹

右七味㕮咀。以水五升。煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升去滓。溫服一升。本方當裁爲越婢湯。桂枝湯合飲一升。今合爲一方。桂枝二。越婢一。

「拾」桂枝去桂加茯苓白朮湯

芍藥

三兩

甘草

二兩

生姜

三兩

茯苓

三兩切

白朮

三兩切

大棗

十二枚

右六味㕮咀。以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。小便利則愈。

「拾壹」甘草乾薑湯

甘草

四兩炙

乾薑

二兩炮

右咬咀。以水三升。煮取一升五合。去滓分溫再服。

〔拾貳〕芍藥甘草湯

大黃

甘草

芍藥

四兩

甘草

四兩

〔拾叁〕調胃承氣湯
右二味咬咀。以水三升。煮取一升五合。去滓分溫再服之。

大黃

清酒浸皮

甘草

炙二兩

芒硝

半升

〔拾肆〕四逆湯
右三味咬咀。以水三升。煮取一升。去滓。內芒硝。更上火微煮令沸。少少溫服之。

〔拾肆〕四逆湯

甘草

二兩

乾薑

半兩

附子

一枚生用去皮切八片

右三味咬咀。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。強人可大附子一枚。乾薑三兩。

傷寒力治

〔拾伍〕葛根湯

葛根 四兩

麻黃

去節三兩

甘草

二兩

芍藥

切二兩

桂枝 去皮二兩

生薑

切三兩

大棗

枚十二

右七味咬咀。以水一斗。先煮葛根麻黃減二升。去上沫。內諸藥煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。不須歎粥。餘如桂枝湯將息及禁忌。

〔拾陸〕葛根加半夏湯

卽葛根湯原方加半夏

洗半升

〔拾柒〕葛根黃芩黃連湯

葛根半兩

甘草

炙二兩

黃芩

三兩

黃連

三兩

右四味。以水八升。先煮葛根減二升。內諸藥煮取二升。去滓。分溫再服。

〔拾捌〕麻黃湯

麻黃去節三兩

桂枝去皮二兩

甘草炙一兩

杏仁去皮七十枚

右四味。以水九升。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取二升半。去滓。溫服八合。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝湯法。將息及禁忌。

〔拾玖〕大青龍湯

麻黃六兩

桂枝去皮二兩

甘草炙一兩

杏仁去皮尖一枚

生薑切三兩

大棗一枚十二

石膏如鵝子大碎

右七味。以水九升。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。取微似汗。汗出多者。溫粉撲之。一服汗者。停後服。汗多亡陽。遂虛。惡風煩躁。不得眠也。

〔貳拾〕小青龍湯

麻黃

去節三兩

芍藥

三兩

五味子

升

乾薑

三兩

甘草

炙三兩

桂枝

三兩

半夏

湯半升洗

細辛

三兩

右八味。以水一斗。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。若微利者。去麻黃。加蕷花。如鷄子大。熬令赤色。若渴者。去半夏。加括樓根三兩。若噎者。去麻黃。加附子一枚炮。若小便不利。少腹滿。去麻黃。加茯苓四兩。若喘者。去麻黃。加杏仁半升。

貳拾貳桂枝加厚樸杏仁湯

卽桂枝湯原方加厚樸

去皮二兩炙

杏仁

一枚五十

貳拾貳乾薑附子湯

右七味。以水七升。微火煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。

乾薑

一兩

附子

一枚生用皮切八片去

右二味。以水三升。煮取一升。去滓頓服。

〔貳拾叁〕桂枝加芍藥生薑人蔞新加湯

桂枝三兩去皮

芍藥四兩

甘草二兩炙

人蔞三兩

生薑切四兩

大棗枚十二擘

右六味。以水一斗二升。微火煮取三升。去滓。分溫服。餘依桂枝湯法。

〔貳拾肆〕麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃四兩去節

杏仁五十枚去皮尖

甘草二兩炙

石膏半觔碎

右四味。以水七升。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。一本云黃耳杯。

〔貳拾伍〕桂枝甘草湯

桂枝四兩去皮

甘草二兩炙

右二味。以水三升。煮取一升。去滓頓服。

〔貳拾陸〕茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓 半觔

桂枝 四兩
去皮

甘草 四兩
炙

大棗 十五枚
擘

右四味。以甘瀉水勞水名一斗先煮茯苓減二升。內諸藥。煮取三升去滓。溫服一升。日三服。草程知本甘取長流水揚之萬遍。名甘瀉水。

〔貳拾柒〕厚樸生薑半夏甘草人薦湯

厚樸 半觔
去皮 炙

生薑 半觔
切

半夏 半升
洗

甘草 二兩
炙

人薦 一兩

右五味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

〔貳拾捌〕茯苓桂枝白朮甘草湯

茯苓 四兩
去皮

桂枝 三兩
去皮

白朮 二兩
去皮

甘草 二兩
炙

右四味。以水六升。煮取三升。去滓。分溫三服。

〔貳拾玖〕芍藥甘草附子湯

芍藥

三兩

甘草

三兩

附子

一枚皮切八片去

右三味。以水五升。煮取一升五合。去滓。分溫服。

〔參拾〕茯苓四逆湯

茯苓

六兩

人蔘

一兩

附子

一枚生用

甘草

二兩

乾薑

半兩

右五味。以水五升。煮取三升。去滓。溫服七合。日三服。

〔參拾壹〕五苓散

猪苓

十八銖去皮

澤瀉

一兩六銖去皮

白朮

十八銖

茯苓

十八銖

桂枝

去皮半兩

右五味爲末。以白飲和服方寸匕。日三服。多飲煖水。汗出愈。

〔參拾貳〕茯苓甘草湯

茯苓

三兩

桂枝

二兩去皮

甘草

一兩炙

生薑

三兩切

右四味。以水四升。煮取三升。去滓。分溫三服。

傷寒大法

〔參拾叁〕梔子豉湯

梔子

枚十四

香豉

綿四合

右二味。以水四升。先煮梔子。得二升半。內豉煮取一升半。去滓。
分爲二服。溫進一服。得吐者。止後服。

〔參拾肆〕梔子甘草豉湯

卽前方加甘草

二兩

煎法同上。

〔參拾伍〕梔子生薑豉湯

五兩

卽前方加生薑

煎法同上。

〔參拾陸〕梔子厚樸湯

梔子一枚

擘

厚樸

炙四兩

枳實

一枚。去穰炒
浸

已上三味。以水三升半。煮取一升半。去滓。分爲二服。溫進一服。
得吐者。止後服。

〔卷拾柒〕梔子乾薑湯

梔子一枚擘 乾薑二兩

右二味。以水三升半。煮取一升半。去滓。分二服。溫進一服。得吐
者。止後服。

〔卷拾捌〕眞武湯

茯苓三兩

芍藥三兩

生薑三兩

白朮二兩

附子炮一枚

右五味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服七合。日三服。若欬者加
五味子半升。細辛乾薑各一兩。若小便利者。去茯苓。若下利者。
去芍藥。加乾薑二兩。若嘔者。去附子。加生薑足前成半觔。

〔卷拾玖〕小柴胡湯

柴胡

黃芩

人蔫

甘草

生薑

半夏

大棗

炙甘草

三兩

半升

十二枚

三兩

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。
日三服。若胸中煩而不嘔。去半夏。人蔫。加括樓實一枚。若渴者。
去半夏。加人薑。合前成四兩半。括樓根四兩。若腹中痛者。去黃
芩。加芍藥三兩。若脇下痞鞕。去大棗。加牡蠣四兩。若心下悸小
便不利者。去黃芩。加茯苓四兩。若不渴。外有微熱者。去人蔫。加
桂枝三兩。溫服取微汗愈。若欬者。去人蔫。大棗。生薑。加五味子
半升。乾薑二兩。

〔肆 拈〕小建中湯

芍藥

六兩

桂枝

去皮三兩

甘草

炙二兩

生薑

三兩

膠飴

一升

大棗

一枚十二擘

右六味。以水七升。煮取三升。去滓。內膠飴。更上微火消解。溫服一升。日三服。嘔家不可用建中。以甜故也。

[肆拾壹]大柴胡湯

柴胡半觔

半夏半升
沸

芍藥三兩

黃芩三兩

生薑五兩

枳實四兩
炙

大棗枚十二

[肆拾貳]柴胡加芒硝湯

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓再煎。溫服一升。日三服。一方用大黃二兩。若不加大黃。恐不爲大柴胡湯也。

柴胡二兩
六銖

半夏二十
銖

黃芩一兩

甘草一兩

生薑一兩

人蔘一兩

大棗四枚

芒硝二兩

[肆拾叁]桃核承氣湯
右八味。以水四升。煮取二升。去滓。內芒硝。更煮微沸。分溫再服。

傷寒之法

桃仁 五十枚
去皮尖

大黃 四兩

甘草 二兩
炙

桂枝 二兩

芒硝 二兩

右五味。以水七升。煮取二升半。去滓。內芒硝。更上火。微沸下火。
先食。溫服五合。日三服。當微利。

〔肆拾肆〕柴胡龍骨牡蠣湯

柴胡 四兩

龍骨 半一兩

生薑 半一兩

人蔘 半一兩

茯苓 半一兩

鉛丹 半一兩

牡蠣 半一兩

桂枝 一兩半
去皮尖

半夏 二合
洗

大棗 六枚

大黃 二兩
後煮

黃芩 半一兩

右十一味。以水八升。煮取四升。內大黃切如碁子。更煮一二沸。
去滓。溫服一升。半夏一兩半
生薑一兩半
黃芩半一兩
桂枝一兩半
桂枝一兩半
生薑半一兩半

〔肆拾伍〕桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

桂枝 三兩
去皮

甘草 二兩
炙

大棗 十二枚
擘

生薑 三兩
切

牡蠣 五兩

龍骨 四兩

蜀漆 四兩
去腥 洗

右爲末。以水一斗二升。先煮蜀漆減二升。內諸藥煮取三升。去滓溫服一升。

〔肆拾陸〕桂枝加桂湯

桂枝

三兩

芍藥

三兩

生姜

三兩

甘草

二兩

大棗

十二枚

牡桂

二兩

右六味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。

〔肆拾柒〕桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝

一兩

甘草

二兩

龍骨

二兩

牡蠣

二兩

右爲末。以水五升。煮取二升半。去滓。溫服八合。日三服。

〔肆拾捌〕抵當湯

蟲蟲

三十個。去足熬去

水蛭

三十個。熬去

大黃

三兩。酒浸

桃仁

三十個。去皮尖

右四味。剉如麻豆。以水五升。煮取三升。溫服一升。不下再服。

傷寒大法

〔肆拾玖〕抵當丸

蟲蟲

二十五個
去翅足熬個

水蛭

二十個
個

桃仁

二十個
個

大黃

三兩
酒浸兩

右四味杵分爲四丸。以水一升煮一丸。取七合服之。時當下血。若不下者更服。

〔伍拾壹〕大陷胸丸

大黃

半觔

葶苈子

熬半升

芒硝

半升

杏仁

尖炒黑去皮半升

右四味搗篩二味。內杏仁芒硝合研如脂。和散取如彈丸一枚。別搗甘遂末一錢匕。白蜜二合。水二升。煮取一升。溫頓服之。一宿乃下。如不下更服。取下爲効。禁如藥法。

〔伍拾壹〕大陷胸湯

大黃

六兩
去皮

芒硝

一升

甘遂

七錢

右三味。以水六升。先煮大黃。取二升。去滓。內芒硝。煮一兩沸。內

甘遂末。溫服一升。得快利。止後服。

[伍拾貳] 小陷胸湯

黃連一兩

半夏洗半升

括樓實一大枚者

右三味。以水六升。先煮括樓。取三升。去滓。內諸藥。煎取二升。去滓。分溫三服。

[伍拾肆] 文蛤散

文蛤五兩

右一味爲散。以沸湯和一錢匕服。湯用五合。

[伍拾肆] 白散

桔梗

三分

貝母

三分

巴豆

熬黑研如脂心一分去皮心

右二味爲散。內巴豆更於白中杵之。以白飲和服。強人半錢匕。羸者減之。病在膈上必吐。在膈下必利。不利進熱粥一杯。利過

不。止。進。冷。粥。一。杯。身。冷。皮。粟。不。解。欲。引。衣。自。覆。者。若。水。以。嚦。之。
洗。之。令。熱。却。不。得。出。當。汗。而。不。汗。則。煩。假。令。汗。出。已。腹。中。痛。與。
芍。藥。三。兩。如。上。法。

〔伍拾伍〕柴胡桂枝湯

柴胡

四兩

黃芩

一兩

人蔘

半兩

半夏

二合半

甘草

一兩

桂枝

一兩

芍藥

一兩

生薑

一兩

大棗

擘六枚

〔伍拾陸〕柴胡桂枝乾薑湯

柴胡

半觔

桂枝

三兩

乾薑

二兩

括樓根

四兩

黃芩

三兩

牡蠣

二兩

甘草

二兩

右九味

以水七升。煮取三升。去滓溫服。

桂枝詳服幾升可照
桂枝法分三服

大棗

擘六枚

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。
日三服。初服微煩。復服汗出便愈。

〔伍拾柒〕半夏瀉心湯

半夏

半升
洗

黃芩

三兩

乾薑

三兩

甘草

三兩
炙

人蔘

三兩

黃連

一兩

大棗

十二枚擘

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。

〔伍拾捌〕十棗湯

芫花

熬

甘遂

大戟

右三味等分。各別搗爲散。以水一升半。先煮大棗肥者十枚。擘。取八合。去滓。內藥末。強人服一錢匕。羸者服半錢匕。溫服之。平旦服。若下少。病不除者。明日更服加半錢匕。得快下利後。糜粥自養。

〔伍拾玖〕大黃黃連瀉心湯

大黃二兩 黃連一兩

右二味。以麻沸湯二升漬之。須臾絞去滓。分溫再服。

〔陸拾貳〕附子瀉心湯

大黃二兩 黃芩一兩 黃連一兩

右四味。切三味。以麻沸湯二升漬之。須臾絞去滓。內附子汁。分溫再服。

〔陸拾壹〕生薑瀉心湯

生薑四兩

甘草三兩

人蔘三兩

乾薑一兩

黃芩三兩

半夏洗半升

大棗一枚擘

黃連一兩

右八味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服。一升。日三服。

〔陸拾貳〕甘草瀉心湯

甘草 四兩

黃芩 三兩

乾薑 三兩

半夏 半升
洗

黃連 一兩

大棗 故擘十二枚

右六味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。

〔陸拾叁〕赤石脂禹餘糧湯

赤石脂 一觔
碎

太乙禹餘糧 一觔
碎

以上二味。以水六升。煮取二升。去滓。分三服。

〔陸拾肆〕旋覆代赭石湯

旋覆花 三兩
人蔴 二兩

甘草 炙 三兩

半夏 半升
洗

代赭石 一兩

生薑 五兩
切

大棗 故擘十二枚

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。

〔陸拾伍〕桂枝人蔴湯

桂枝

四兩

人蔴

三兩

白朮

三兩

乾薑

三兩

甘草

四兩

右五味。以水九升。先煮四味。取五升。內桂枝。更煮取三升。去滓。
溫服一升。日再服。夜一服。

〔陸拾陸〕瓜蒂散

瓜蒂

熬黃一分

赤小豆

一分

右二味。各別搗篩爲散。已合治之。取一錢匕。以香豉一合。用熱
湯七合。煮作稀糜。去滓。取汁和散。溫頓服之。不吐者。少少加。得
快吐乃止。諸亡血虛家。不可與瓜蒂散。

〔陸拾柒〕黃芩湯

黃芩

三兩

甘草

二兩

芍藥

二兩

大棗

十個

右四味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日再服。夜一服。

〔陸拾捌〕黃芩加半夏生薑湯

卽黃芩湯原方加半夏

半升

生薑

三兩

〔陸拾玖〕黃連湯

黃連

三兩

甘草

三兩

乾薑

三兩

人蔞

二兩

桂枝

三兩

半夏

半升

大棗

十二枚

〔柒拾壹〕桂枝附子湯

桂枝

四兩

附子

三枚炮去皮破八片

大棗

十二枚擘

生薑

三兩切

甘草

二兩炙

右五味以水六升煮取三升去滓分溫三服。

〔柒拾壹〕桂枝附子去桂加白朮湯

白朮

四兩

甘草

二兩炙

附子

一枚炮

大棗

十二枚擘

生薑

三兩

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。分溫三服。初服其人身如痺。
半日許復服之。三服盡。其人如冒狀。勿怪。此以附子朮併走皮
肉。逐水氣。未得除。故使之爾。當加桂枝四兩。此本一方二法也。

〔柒拾貳〕甘草附子湯

甘草

炙二兩

白朮

二兩

桂枝

四兩

附子

炮二枚

右四味。以水六升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。初服得微
汗。則解。能食。汗止。復煩者。服五合。恐一升多者。宜服六七合。爲
始。

〔柒拾叁〕白虎湯

知母

六兩

石膏

綿一觔碎

甘草

炙二兩

粳米

六合

右四味。以水一斗。煮米熟湯成。去滓。溫服一升。日三服。

〔柒拾肆〕炙甘草湯

甘草

炙四兩

桂枝

三兩

大人薑

二兩

阿膠

二兩

大棗

枚三十擘

麻仁

半升

麥冬

半升

生地

一觔

右九味。以清酒七升。水八升。先煮八味。取三升。去滓。內膠、煬消盡。溫服一升。日三服。又名復脈湯。

陽明篇

〔柒拾伍〕大承氣湯

芒硝

三四合

大黃

酒四兩浸

枳實

五枚

厚樸

半觔皮炙去

右四味。以水一斗。先煮枳實厚樸。取五升。去滓。內大黃。煮取二升。去滓。內芒硝。更上微火一二沸。分溫再服。得下。餘勿服。

〔柒拾陸〕小承氣湯

大黃

四兩

厚樸

去皮兩炙

枳實

三枚大者炙

右三味。以水四升。煮取一升二合。去滓。分溫二服。初服湯當更

衣不爾者。盡飲之。若更衣者。勿服之。

[柒拾柒] 猪苓湯

猪苓

去皮一兩

茯苓

一兩

澤瀉

一兩

滑石

一兩

阿膠

一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠煬消溫服七合日三服。

[柒拾捌] 蜜煎導方

蜜

七合

右一味於銅器內微火煎之稍凝如飴狀攪之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則鞭以內穀道中以手急抱欲大便時乃去之。

附土瓜根方

土瓜根穀道中大便當出搗汁灌

猪膽汁方大猪膽一枚瀉汁和

醋少許以灌穀道中如一食頃當大便出。

〔拾玖〕茵陳蒿湯

茵陳蒿

六兩

梔子

十四枚

大黃

二兩去皮

右三味。以水一斗。先煮茵陳減六升。內二味煎取三升。去滓。分溫三服。小便當利。尿如阜角汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便去也。

〔捌拾壹〕麻仁丸

麻仁

二升

芍藥

半觔

枳實

半觔

大黃

一兩去皮

厚樸

一尺皮炙去法

杏仁

一升尖研作脂去皮

右六味爲末。煉蜜爲丸。如桐子大。飲服十丸。日三服。漸加以知爲度。

〔捌拾壹〕梔子蘗皮湯

梔子

十五枚擘

甘草

一兩炙

黃蘗

二兩

右三味。以水四升。煮取一升半。去滓。分溫再服。

〔捌拾貳〕麻黃連軻赤小豆湯

麻黃二兩

連軻二兩

生薑二兩

赤小豆一升

甘草二兩

杏仁四十枚去皮尖

生梓白皮一升

茵陳代之無以

大棗十二枚擘

右八味。以潦水一斗。先煮麻黃再沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。分溫三服。半日服盡。降注雨水謂之潦。

少陽篇方見太陽篇內

裏牛表例

太陰篇

〔捌拾叁〕桂枝加芍藥湯

桂枝三兩

芍藥六兩

甘草二兩

生薑三兩

大棗十二枚擘

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。分溫三服。

〔捌拾肆〕桂枝加大黃湯

卽前方加大黃二兩

少陰篇

〔捌拾伍〕麻黃附子細辛湯

麻黃二兩去節

細辛二兩

附子一枚皮切八片炮去

右三味。以水一斗。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。

去滓。溫服一升。日三服。

〔捌拾陸〕麻黃附子甘草湯

麻黃二兩去節

附子一枚皮炮去

甘草炙二兩

右三味。以水七升。先煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。

去滓。溫服一升。日三服。

〔捌拾柒〕黃連阿膠湯

黃連四兩

黃芩一兩

芍藥二兩

阿膠三兩

鷄子黃二枚

右五味。以水五升。先煮三物。取二升。去滓。內膠煬盡。小冷。內鷄子黃。攪令相得。溫服七合。日三服。

〔捌拾捌〕附子湯

附子

生用
二枚

茯苓

三兩

人蔞

二兩

白朮

四兩

芍藥

三兩

右五味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

〔捌拾玖〕桃花湯

赤石脂

用一筋一牛飾末全
半升

乾薑

一兩

粳米

一升

右三味。以水七升。煮米令熟。去滓。內石脂末方寸匕。溫服七合。日三服。若一服愈。餘勿服。

〔玖拾〕吳茱萸湯

吳茱萸

洗一升

人蔞

三兩

生薑

六兩

大棗

一枚十二

右四味。以水七升。煮取二升。去滓。溫服七合。日三服。

〔玖拾壹〕猪膚湯

猪膚一觔

右一味。以水一斗。煮取五升。去滓。加白蜜一升。白粉五合。熬香。
和令相得。溫服分六服。

〔玖拾貳〕甘草湯

甘草二兩
生用

右一味。以水三升。煮取升半。去滓。溫服七合。日二服。

〔玖拾叁〕桔梗湯

桔梗一兩

甘草二兩

右二味。以水三升。煮取一升。去滓。分溫再服。

〔玖拾肆〕苦酒湯

半夏大十四枚

洗如棗核

鷄子一枚

酒著鷄子殼中苦

右三味。內半夏著苦酒中。以雞子殼置刀環中。安火上。令三沸。
去滓。少少含嚥之。不差。更作三劑。

〔玖拾伍〕半夏散及湯

半夏

洗

桂枝

去皮

甘草

炙以上各等分

右三味。各別擣、篩已合治之。白飲和服方寸匕。日三服。若不能
散服者。以水一升。空煎七沸。內散二方寸匕。更煎三沸。下火令
少冷。少少嚥之。

〔玖拾陸〕白通湯

葱白

四莖

乾薑

一兩

附子

一枚生用皮破八片去

右三味。以水三升。煮取一升。去滓。分溫再服。

〔玖拾柒〕白通加猪膽汁湯

卽白通湯原方加猪膽汁

一合

人尿

五合

已上三味。以水三升。煮取一升。去滓。內膽汁人尿。和令相得。分溫再服。若無膽汁亦可用。

〔玖拾捌〕通脈四逆湯

甘草

二兩
炙

乾薑

三兩

附子

一枚
生用大者

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。其脈卽出者。愈。面色赤者。加葱九莖。腹中痛者。去葱。加芍藥二兩。嘔者。加生薑二兩。咽痛者。去芍藥。加桔梗一兩。利止脈不出者。去桔梗。加人蔞二兩。

〔玖拾玖〕四逆散

甘草

炙

枳實

破水
炙

柴胡

芍藥

右四味。各十分。擣篩。白飲和服。方寸匕。日三服。欬者。加五味子。乾薑各五分。并主下利。悸者。加桂枝五分。小便不利者。加茯苓。

五分。腹中痛者。加附子一枚。炮令坼。泄利下重者。先以水五升。
薤白参升。煮取三升。去滓。以散三方寸匕内湯中。煮取一升半。
分溫再服。

厥陰篇

壹 百烏梅丸

烏梅 三百枚

細辛 六兩

乾薑 十兩

黃連 一觔

當歸 四兩

桂枝 六兩

附子 六兩炮

人蔘 六兩

黃蘖 六兩

蜀椒 四兩去汗炒

右十味。異擣篩合治之。以苦酒浸烏梅一宿。去核。蒸之五升米
下。飯熟。搗成泥。和藥令相得。內白中。與蜜杵二千下。圓如梧桐
子大。先食飲服十圓。日三服。稍加至二十圓。禁生冷滑物臭食
等。

[百零壹]當歸四逆湯

當歸

三兩

桂枝

三兩

芍藥

三兩

細辛

三兩

大棗

二十
枚

甘草

二兩
炙

通草

二兩
之木通也

〔百零貳〕

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

卽當歸四逆原方加生薑

半觔

吳茱萸

二升

〔百零叁〕

麻黃升麻湯

麻黃

去節半
兩半

升麻

一分

當歸

一分

知母

十八
銖

石膏

綿裹
六銖碎

黃芩

十八
銖

萎蕤

十八
銖

白朮

六銖

乾薑

六銖

芍藥

六銖

桂枝

六銖

茯苓

六銖

甘草

六銖

天冬

去六銖

右十四味。以水一斗。先煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。分溫三服。相去如炊三斗米頃。令盡汗出愈。

長沙歌括麻黃一
兩半升麻黃一

一兩半當歸
一兩餘同歸

〔百零肆〕乾薑黃連黃芩人蔞湯

乾薑

三兩

黃連

三兩

黃芩

三兩

人蔞

三兩

〔百零伍〕白頭翁湯

白頭翁

三兩

黃連

三兩

黃蘖

三兩

秦皮

三兩

右四味。以水六升。煮取二升。去滓。分溫再服。

霍亂篇

〔百零陸〕四逆加人蔞湯

卽四逆湯原方加人蔞

一兩

右四味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。強人可大附子一枚。乾薑三兩。

〔百零柒〕理中丸

人蔞

三兩

甘草

炙三兩

白朮

三兩

乾薑

三兩

右四味。搗篩爲末。蜜和爲丸。如鷄子黃大。以沸湯數合和一丸。
研碎溫服之。日三服。夜二服。腹中未熱。益至三四丸。然不及湯。
湯法。以四物依兩數切用。水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。日
三服。若臍上築者。腎氣動也。去朮加桂四兩。吐多者。去朮加生
薑三兩。下多者。還用朮。悸者加茯苓二兩。渴欲得水者。加朮足
前成四兩半。腹中痛者。加人蔞足前成四兩半。寒者加乾薑。足
前成四兩半。腹滿者。去朮加附子一枚。生用炮用未詳效四逆散內腹痛用炮可也 服湯後
如食頃。飲熱粥一升許。微自溫。勿發揭衣被。

〔百零捌〕通脈四逆加猪膽汁湯

卽通脈四逆湯原方加猪膽汁

半合

右三味㕮咀。以水三升。煮取一升二合。去滓。內猪膽汁。分溫再

服。其脈卽出者愈。

張隱菴人尿五合加

陰陽易篇

〔百零玖〕燒棍散

右取婦人中棍近隱處。剪燒灰。以水和服方寸匕。日三服。小便卽利。陰頭微腫則愈。婦人病。取男子中棍搘燒服。

〔壹百拾〕枳實梔子豉湯

枳實

炙三枚

梔子

一枚擘四瓣

香豉

一升

綿裹

右三味。以清漿水七升。空煮取四升。內枳實梔子。煮取二升。下豉。更煎五六沸。去滓。溫分再服。覆令微似汗。若有宿食者。加大黃。如博碁子大五枚。

〔百拾壹〕牡蠣澤瀉散

牡蠣

澤瀉

蜀漆洗去
鹽

海藻洗去
鹽

括樓根

商陸根
熬

葶藶子
熬以上各等分

右七味異擣下篩爲散更入白中治之白飲和服方寸匕小便利止後服日三服。

〔百拾貳〕竹葉石膏湯

竹葉二把

石膏一斤

半夏半升
洗去

人薑三兩

甘草二兩
炙

粳米半升

麥門冬一升
洗去

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟湯成去米溫服一升日三服。

傷寒方法

燒酒自五服。此去宜大補也。酒與茶共灌未病者。酒半茶半。若病者。酒子半茶子半。燒酒自五服。此去宜大補也。酒與茶共灌未病者。酒半茶半。若病者。酒子半茶子半。人參三服。

燒酒自五服。此去宜大補也。酒與茶共灌未病者。酒半茶半。若病者。酒子半茶子半。燒酒自五服。此去宜大補也。酒與茶共灌未病者。酒半茶半。若病者。酒子半茶子半。人參三服。

傷寒方法終

經方歌括

閩杭包育華桃初氏著

長男識生參校

傷寒方

長孫天白校字

「壹」桂枝陽旦兩名宜。

參兩生薑芍桂枝。

棗拾貳枚甘貳兩。

桂需幹上肉刨皮。

柒升水煮參升度。

湯適寒溫順意施。

服藥壹升頃刻粥。

覆溫取汗莫流漓。

病痊餘藥宜停服。

若汗未來再服之。

又不汗時須促役。

參時參服勿狐疑。

邪強日夜服而診。

壹劑不痊再劑治。

服法七條禁忌拾。

先行咬咀後諸規。

陽旦葛加四兩宜。

煮服皆遵陽旦法。

「貳」桂枝加葛根湯規。

陽旦葛加四兩宜。

煮服皆遵陽旦法。

不須獸粥自神奇。

「叁」桂枝加附子湯方。

陽旦附加壹個商。

漏汗惡風難小便。

四肢微急此方良。

陽旦原方去芍良。陽病下之後脈促。

桂枝去芍藥湯方。症兼胸滿服之康。

桂枝去芍加附湯。

加附壹枚火炮良。餘照桂枝湯去芍。

治前症且惡寒方。

桂枝麻黃各半湯。

壹兩麻甘芍老薑。廿肆杏仁肆個棗。

桂枝肆拾銖爲強。

桂枝貳分麻黃壹。

肆拾壹銖秤桂吉。參拾芍薑廿陸甘。

杏麻拾陸枚銖匹。

伍枚大棗共煎嘗。

銖數仍從宋本述。拾升水煮如粳熟。

白虎加人蔴湯箴。

原方白虎加參蔴。

去滓先量拾合斟。拾捌麻甘桂芍匹。

廿陸生薑肆棗匡。

石膏貳拾肆銖畢。

加入朮芩參兩匹。以水捌升煮取參。

〔拾〕桂枝去桂加芩朮。
先嘗拾合瀉來吉。

〔拾壹〕甘草乾薑補肺陽。

肆兩炙甘貳炮薑。

甘須火炙不須糖。

乾薑炮紫母成炭。

〔拾貳〕芍藥甘草補肝陰。

脚攀用此是金鍼。

芍甘肆兩味甘苦。

合化成陰理最深。

調和胃氣使無傷。

大黃肆兩炙甘貳。

伍合芒硝微火煬。

壹枚生附貳甘匡。

參升水煮成升貳。

〔拾肆〕四逆湯兩半乾薑。

去滓分溫再服良。

葛根湯內參麻薑。

〔拾伍〕葛根湯內參麻強。

貳枚桂甘肆葛強。棗拾貳枚水壹斗。

先煎麻葛捌成量。

「拾陸」葛根湯加半夏湯。

前劑半升半夏鑊。

解外升陽兼降逆。

太陽病合陽明方。

「拾柒」葛根黃芩黃連湯。

妙在炙甘貳兩良。

參兩芩連捌兩葛。

太陽邪陷少陽方。

「拾捌」麻黃湯內參麻黃。

水玖煎麻減貳良。

貳桂壹甘柒拾杏。

同煎廿伍合分嘗。

「拾玖」大青龍用陸麻堪。

水煮麻黃照上談。

棗拾貳枚杏伍拾。

膏如鷄子壹枚參。

生薑叁兩桂甘貳。

共煮叁升取壹餸。

若汗出多溫粉撲。

汗來停服恐陽趨。

汗多陽遂虛之後。

反惡風煩躁不寐。

表後無陽常有症。

論云按法治當諳。

「貳拾」小青龍湯水氣方。

五味半升夏共量。

桂芍乾薑麻細草。

平衡參兩各相當。

〔貳拾壹〕桂枝加樸杏仁湯。

陽旦原方樸杏鑲。

貳兩樸和伍拾杏。

須知微火煮來嘗。

〔貳拾貳〕乾薑附子似白通。

諸藥俱同只少葱。

生附壹枚薑壹兩。

水參升煮壹升充。

〔貳拾叁〕新加湯卽桂枝湯。

加重芍薑各壹匁。

新入人蔘參兩煮。

其餘兩數本原方。

〔貳拾肆〕麻杏甘膏湯。杏仁伍拾良。

生膏宜捌兩。

貳草肆麻黃。

〔貳拾伍〕桂枝甘草湯。肆桂貳甘匡。

此補心陽弱。

治心下悸方。

〔貳拾陸〕荅桂草棗湯。治臍下悸方。

捌荅肆桂草。

棗拾伍枚匡。

壹斗甘瀾水。煎荅捌折量。

藥同煎卅合。

分作日參嘗。

法取長流水。

揚之萬遍良。

名同勞水共。

氣味未曾詳。

〔貳拾柒〕樸薑夏草人薑湯。

汗後腹中脹滿方。

半夏半升甘貳兩。

壹 薑捌 樸與生薑。

〔貳拾捌〕荅桂朮甘肆種詳。

貳甘白朮肆荅強。

桂枝參兩和同煮。

水陸升煎減半良。

〔貳拾玖〕芍藥甘草附子湯。

芍甘參兩附枚商。

汗而病在反寒者。

用此強陰壯水陽。

〔參拾〕茯苓四逆治陰陽。

四逆加薑陸茯鑊。

汗下病存煩躁者。

陽虛陰盛此方良。

〔參拾壹〕五苓利水以驅邪。

全藉飲多緩水嘉。

伍分澤和貳分桂。

朮猪參分茯平加。

共研末已量方匕。

飲送參餐不敢差。

〔參拾貳〕茯苓甘草傷寒嘉。

汗有渴無及厥家。

茯與生薑參兩共。

壹甘貳桂也當加。

〔參拾叁〕梔子豉湯先煮梔。

生梔拾肆擘開皮。豉量肆合用棉裹。

香梔無鹽乃可施。

〔參拾肆〕梔子甘草淡豉湯。

水煎分兩照前方。虛煩諸病仍前症。

少氣須加貳草鑲。

〔參拾伍〕梔子生薑淡豉湯。

原方梔子豉加薑。虛煩諸病仍前症。

嘔納生薑伍兩鑲。

〔參拾陸〕梔子厚樸湯。樸根肆兩匡。

生梔拾肆個。枳實肆枚良。

〔參拾柒〕梔子乾薑大不同。

乾薑貳兩是溫中。生梔拾肆除煩藥。

溫胃解煩兩建功。

人薑除去換生薑。

生薑茯芍皆參兩。

炮附壹枚朮貳匡。

〔參拾玖〕小柴胡用捌柴強。

參兩薑芩草老薑。

棗拾貳枚夏伍合。

此方再煮法尤良。

〔肆拾小建中湯法桂枝。〕

桂枝倍芍入升飴。染升水煮參升度。

分作參回壹日宜。

〔肆拾壹〕大柴胡下陽樞方。

參兩芍芩瀉火良。棗拾貳枚夏伍合。

捌柴肆枳伍生薑。

〔肆拾貳〕柴胡加芒硝湯方。

加入芒硝貳兩鑲。配用小柴參分壹。

肆升水煮貳升良。

〔肆拾叁〕桃仁承氣血邪方。

伍拾枚桃肆兩黃。桂草芒硝俱貳兩。

能攻熱結在膀胱。

〔肆拾肆〕柴胡龍骨牡蠣湯。

陸個棗和貳兩黃。兩半鉛丹龍蠣桂。

柴芩葛夏茯生薑。

捌升水煮肆升度。後納大黃貳沸良。

〔肆拾伍〕救逆湯方救表陽。

火邪逆症此方良。桂枝去芍加參種。

伍蠣肆龍蜀漆鑲。

斗貳水煎蜀減貳。

另研陸種共煎湯。

煎成約取參升度。

去滓溫分拾合嘗。

〔肆拾陸〕桂枝加桂貳兩煎。

中部奔竄以此妍。

其方已載奔竄篇。

奔竄外有吐膿病。

金匱書中詳且備。

註家猶謂此方愆。

〔肆拾柒〕桂枝甘草龍蠣湯。

貳蠣龍甘壹桂匡。

煎成廿伍合分嘗。

爲末伍升流水煮。

〔肆拾捌〕抵當湯攻瘀血方。

桃仁卅個蛭蟲鑲。

大黃參兩酒來浸。

蟲蛭火熬切莫忘。

肆味剉如麻豆大。

伍升水煮參升良。

去渣溫服壹升度。

若不下時可再嘗。

〔肆拾玖〕抵當丸方製照湯。

作丸不用蜜和糖。

大黃參兩酒來浸。

廿個蛭桃廿伍蟲。

共杵爲丸分肆個。

壹升水煮壹丸良。

煎成柒合壹回服。約壹時血下康。

伍拾大陷胸丸捌兩黃。

芒硝葶杏半升量。

葶熬杏炒葶黃搗。

硝杏研脂四味商。取彈大丸錢匕遂。

仍須貳合蜜來鑊。

共成陸種貳升水。

煮取壹升頓服良。

壹宿當通如不下。

法當服至下而康。

伍拾壹大陷胸湯不似圓。

名符藥異更攻堅。

芒硝拾合遂錢匕。

陸兩大黃陸水煎。

伍拾貳小陷胸治熱結涎。

壹枚樓實要先煎。

陸升水煮叁升淨。

納夏半升壹兩連。

煎取貳升再去滓。

溫分參服病當痊。

伍拾叁文蛤名最雜。

閩中謂花蛤。

蛤需伍兩椿。候用沸湯納。

每取壹錢匙。和湯宜伍合。

蛤歸介部真。

五棓僞文蛤。

伍拾肆白散巴需壹分宜。

皮心刮去熬研脂。

火熬至黑研脂後。

桔貝皆參分杵之。

參物更於白內杵。

半錢匕散飲調施。

強人壹服羸人半。

上吐下通妙在斯。

不利壹杯溫粥進。

利多冷粥壹杯治。

內除寒實結胸病。

外去溼邪毒侵肌。

〔伍拾伍〕柴胡桂枝各半湯。

兩半棗芩桂芍薑。

貳合半量生半夏。

肆柴陸棗壹甘匡。

〔伍拾陸〕柴胡桂枝乾薑模。

貳蠟薑甘肆括需。

芩桂皆參柴捌兩。

水煎服法照柴胡。

〔伍拾柒〕半夏瀉心痞嘔良。

參芩葛草與乾薑。

棗需拾貳半升夏。

壹兩黃連共煮湯。

斗水煎成陸拾合。

去渣再煮參升量。

溫嘗拾合日參服。

方本小柴變化方。

〔伍拾捌〕十棗湯中棗拾枚。

芫花熬赤莫成灰。

秤勻遂戟芫花等。

別搗散成聽候裁。

升半水先煎大棗。

煎成捌合散和來。

強人錢匕羸人半。平旦服之日壹回。

若下少兮病不去。

明天加服半錢該。

大通之後糜調養。

愚按棗湯亦可陪。

〔伍拾玖〕大黃黃連瀉心湯。

壹兩黃連貳大黃。

麻沸貳升來瀉藥。

須臾去滓貳回嘗。

〔陸拾〕附子瀉心貳大黃。

芩連壹兩勿煎湯。

用湯瀆法依前樣。

炮附壹枚煮汁鑊。

〔陸拾壹〕生薑瀉心肆老薑。

連與乾薑壹兩鑊。

棗拾貳枚夏伍合。

參芩菝草秤勻良。

〔陸拾貳〕甘草瀉心肆草妍。

黃芩參兩北薑聯。

也需拾貳枚烏棗。

伍合夏和壹兩連。

〔陸拾叁〕赤石脂禹餘糧方。

壹劬脂禹碎煎湯。

陸升水煮貳升度。

去滓分參服最良。

〔陸拾肆〕旋覆赭石湯。

貳薑伍老薑。覆甘參兩共。

半夏半升量。

拾貳枚烏棗。赭需壹兩匡。

〔陸拾伍〕桂枝人薑象理中。

加桂後煎氣益雄。

炙草桂枝宜肆兩。

乾薑參兩朮薑同。

玖升水煮理中藥。

煮取伍升納桂工。

再煮取參溫服壹。

日雙夜壹且寬攻。

〔陸拾陸〕瓜蒂散中蒂豆良。

秤勻壹分蒂熬黃。

異椿篩合取錢匕。

壹合豉和柒合湯。

煮爛去渣調散服。

頓吞不吐漸加商。

必須快吐乃停藥。

亡血虛家不可嘗。

〔陸拾柒〕黃芩湯主熱利堪。

參兩黃芩貳芍甘。

棗拾貳枚水壹斗。

煎參升度服分參。

〔陸拾捌〕黃芩加半夏生薑。

前劑增加貳種鑲。

參兩生薑伍合夏。

水煎服法照前方。

〔陸拾玖〕黃連湯以貳葛丞。

棗拾貳枚夏半升。

參兩乾薑連桂草。

治寒在胃熱居膺。

〔柒拾桂枝附子溼寒良。陽旦芍除附子鑲。炮附參枚桂肆兩。

生薑草棗照原方。

〔柒拾壹〕桂枝附子湯。去桂加朮方。

拾貳枚烏棗。參枚炮附強。

貳甘和肆朮。參兩老生薑。

初服身如痺。仍監半日嘗。

服完如冒狀。勿怪藥荒唐。

朮附同驅水。頃時未得攘。

先師開毒藥。不得已而將。

肆桂仍加入。壹方貳法張。

〔柒拾貳〕甘草附子命名奇。

桂多不以桂名之。朮甘貳兩桂枝肆。

附子貳枚炮去皮。水陸升煎參拾合。

先嘗拾合日參宜。

初嘗微汗病當解。

能食汗停煩復爲。

煩復之人服伍合。

恐升多者陸成施。

〔柒拾叁〕白虎清金氣最豪。

陸知貳草壹觔膏。

同杭陸合煎嘗法。

在第捌歌示爾曹。

〔柒拾肆〕炙甘草湯卅棗珍。

貳兩薑膠肆草因。

參兩桂薑觔地妙。

麥冬伍合與麻仁。

柒升清酒捌升水。

九味先煎卅合勻。

去滓納膠煬化盡。

溫嘗拾合日參輪。

〔柒拾伍〕大承氣湯叁合芒。

伍枳肆黃捌樸匡。

壹斗水先煎枳樸。

煎成減半去渣良。

納黃再煮貳升度。

去滓內芒細火煬。

分貳次嘗初服泄。

餘湯勿服切母忘。

〔柒拾陸〕小承氣湯肆兩黃。

樸貳枳叁不用芒。

水肆升煎升貳度。

分溫貳服且寬商。

初嘗當泄如無泄。

不泄再嘗泄勿嘗。

〔柒拾柒〕猪苓湯主陽明方。

滑澤膠猪茯壹匡。

水肆升先煎肆味。

煎成減半內膠煬。

〔柒拾捌〕蜜煎導法最神奇。

銅器熬糖柒合宜。

微火煎如飴狀攪。

勿令焦著可丸規。

捻成蜜梃頭尖銳。

長大作如指壹枝。

乘熱爲之冷則軟。

納肛門首尾扶之。

便將通矣挺丟去。

及後兩方更易爲。

或取土瓜根搗汁。

吹肛門內亦能治。

壹枚猪膽和些醋。

灌穀道中法要知。

〔柒拾玖〕茵陳蒿湯陸茵強。

拾肆生梔貳大黃。

斗水煎茵成陸分。

梔黃共煮參升良。

溫分參服溺紅黑。

腹減黃從小便亡。

〔捌拾〕麻仁丸用蜜丸方。

升杏倍麻尺樸商。

枳芍半觔黃倍用。

丸如桐子飲和嘗。

初吞拾個日參服。

漸益以知法要詳。

再考外台方兩數。

肆麻陸杏半觔黃。

枳同芍貳樸參兩。

改古從時法亦良。

〔捌拾壹〕梔子蘖皮湯。

傷寒發熱黃。

生梔宜拾伍。

貳蘖壹甘良。

水肆煎升半。去渣再服嘗。

〔捌拾貳〕麻黃連翹赤豆湯。貳兩麻翹草老薑。

肆拾杏仁拾貳棗。

梓皮赤豆壹升量。拾升潦水麻先煮。

再沸沫除內藥良。

煮取參升宜去滓。分溫半日盡參嘗。

〔捌拾叁〕桂枝方加芍藥湯。卽用原方倍芍鑊。

煮服仍從陽旦法。

太陰腹滿時疼方。前劑再加貳兩黃。

大實痛爲脾腐穢。

審其可下此方良。愚按此方煮服法。

〔捌拾肆〕桂枝湯加大黃方。前劑再加貳兩黃。

其文同小青龍方。

〔捌拾伍〕麻黃附子細辛湯。貳兩麻辛壹附良。

愚按此方煮服法。

〔捌拾陸〕麻黃附子甘草湯。貳兩麻甘壹附匡。

水柒升煎麻兩沸。

煎參升度日參嘗。

〔捌拾柒〕黃連阿膠肆兩連。

壹兩黃芩貳芍妍。

參兩阿膠宜後煮。

鷄黃貳個不須煎。

〔捌拾捌〕附子湯如真武湯。

人蔘增入去生薑。

貳蔘肆朮參芩芍。

生附貳枚力倍強。

〔捌拾玖〕桃花湯用壹觔脂。

半煮半篩取寸匙。

壹兩乾薑拾合米。

湯成脂末攪勻施。

〔玖拾〕吳茱萸湯緩胃方。

參兩人蔘陸老薑。

棗拾貳枚吳拾合。

柒升水煮貳升良。

〔玖拾壹〕猪膚湯壹觔猪皮。

斗水煎成減半宜。

加蜜壹升粉伍合。

粉熬香攪服母脯。

〔玖拾貳〕甘草湯中貳生甘。

少陰咽痛此方堪。

參升水煮成升半。

去滓溫分日再燄。

〔玖拾叁〕桔梗湯中貳種談。

方中壹桔貳生甘。咽癰前劑不能愈。

改用此方日再餸。

〔玖拾肆〕苦酒湯治咽內瘡。

修園歌括夏枚商。

原方本拾肆枚夏。

如棗核兮水洗詳。

鷄子壹枚黃剜去。

夏和醋納蛋中央。

置刀環內熬參沸。

去滓少含嚥下良。

〔玖拾伍〕半夏散及湯治咽。

桂甘半夏秤勻研。

各研篩合取方匕。

日服參餐飲送妍。

散不能吞升水煮。

空煎柒沸散和煎。

散宜重用貳方匕。

再共煎參沸味鮮。

少冷微微而嚥下。

此方妙法巧參天。

時人不識此方理。

煮法參差治不瘡。

〔玖拾陸〕白通湯內壹乾薑。

生附去皮壹個良。

葱白肆莖水卅合。

煎成拾合貳回嘗。

〔玖拾柒〕白通加猪膽汁湯。

壹合膽和伍湯鑊。

葱白乾薑生附子。

水煎服法照前方。

〔玖拾捌〕通脈四逆脈微良。

原來四逆倍乾薑。

水煎服法皆同樣。

服後脈旋出者康。

枳甘拾分芍柴鑲。

擣篩寸匕飲調送。

日服參餐病自康。

〔壹百〕烏梅丸壹觔連強。

肆兩歸椒拾北薑。

陸兩桂辛蘆藥附。

異椿篩合治之良。

烏梅參百醋和浸。

經壹宿時去核將。

蒸在伍升生米下。

飯成搗爛似泥漿。

藥和相得臼中內。

蜜杵貳千法本當。

圓作如梧桐子大。

飯前飲服拾圓嘗。

日參次服稍加益。

至貳拾丸不可忘。

禁食諸生冷滑物。

并防臭食等規詳。

〔百零壹〕當歸四逆厥陰方。

參兩歸辛桂芍匡。

貳兩甘通廿伍棗。

厥寒不用附乾薑。

〔百零貳〕當歸四逆加吳薑。

內有久寒用此方。

前劑再加吳甘合。

生薑捌兩切來鑊。

陸升清酒陸升水。

煮取伍升伍服良。

〔百零叁〕麻黃升麻症頗奇。

歸與升麻五分施。

去節麻黃貳兩半。

知芩萎拾捌銖宜。

陸銖桂芍天冬草。

膏朮乾薑茯共之。

斗水煎麻壹貳沸。

納諸藥煮叁升規。

去渣分作叁回服。

相去炊叁斗米時。

藥盡汗來其病愈。

方中妙處現於斯。

〔百零肆〕乾薑連芩人蔘湯。

肆味各叁兩勿忘。

水陸升煎貳拾合。

去渣分作貳回嘗。

〔百零伍〕白頭翁湯坤載編。

參兩秦皮翁蘖連。

水柒升煎貳拾合。

去渣溫服壹升先。

〔百零陸〕四逆加棗霍亂良。

此方本是救陰陽。

全枚生附和蔘壹。

兩半乾薑貳草匡。

腎臟液亡蘶附救。

肺陽氣損用甘薑。

合成上下雙調劑。

師出理中法外方。

〔百零柒〕理中丸緩土中陽。

參兩人蘶朮草薑。

丸似鷄黃大壹個。

沸湯數合碎丸嘗。

日參夜貳腹仍冷。

參肆丸增不及湯。

湯法同當歸四逆。

此歌所以未曾詳。

〔百零捌〕通脉四逆加膽方。

膽加半合救陰亡。

隱菴註有半升溺。

意倣白通法也良。

大熱方增鹹與苦。

陰生陽長脈來康。

〔百零玖〕燒棍散用女棍方。

剪取中棍隱處良。

火化成灰方寸匕。

白湯調服日參嘗。

溺通陰腫病當愈。

女病取男子袴襠。

〔壹百拾〕枳實梔子淡豉湯。

生梔拾肆個清涼。

參枚枳實壹升豉。

妙用清漿空煮良。

納梔枳煮貳升湯。

湯和淡豉更煎沸。

伍陸沸時去滓嘗。

藥汁溫分貳次食。

經方歌話

覆令微汗法宜詳。

〔百拾壹〕牡蠣澤瀉病瘥方。

從腰以下水潛藏。

澤樓漆藻商葶蠣。

漆藻鹽腥要洗良。

熬罷商葶俱等分。

別椿節散白中商。

飲和方寸匕來服。

小便利時勿再嘗。

〔百拾貳〕竹葉石膏胃熱方。

參蘆貳草勑膏良。

夏杭伍合麥冬倍。

生竹葉須貳把商。

斗水煎成陸拾合。

去渣納米煮成湯。

湯成米去壹升服。

日服參回病自康。

經方歌括終

傷寒方加減歌

○小青龍有減和加。微利除麻切莫差。加入蕘花鷄子大。火熬令赤
製蕘花。渴除半夏加參括。噎去麻加壹附誇。溺閉更兼少腹滿。除
麻加入肆苓嘉。喘加杏子半升效。心下水邪喘去麻。

○真武減加肆法詳。欬加辛味與乾薑。細辛壹兩乾薑等。五味半升
捌種嘗。小便利兮苓要去。若然再利須除芍。加
入乾薑貳兩匡。嘔者更當除附子。生薑加至半觔良。嘔家本有陰
陽症。嘔在陽經附勿鑲。

○小柴胡轉陽樞方。柒減加中法要詳。胸內若煩而不嘔。去棗夏換
壹樓鑲渴須去夏加棗湊。參兩再加兩半商。止渴樓根加肆兩。少
陽症渴最相當。腹疼邪轉脾經矣。芩去芍加參兩良。脇痞輒分肝
部結。蠣加肆兩棗除將。若心下悸溺兼閉。芩去苓加肆兩嘗。不渴

外兼微熱者。去薑加入桂參匡。此當溫覆取微汗。樞病邪將出太陽。欬去生薑薑與棗。半升味配貳乾薑。

○白散服而體冷耶。仍然皮粟想衣遮。形如噀洗皮堅冷。不發汗煩冷實邪。假使曾經汗出已。腹疼參兩芍真嘉。

○通脈四逆減加方。戴陽面赤玖葱匡。腹疼屬裏除葱白。芍藥須加貳兩鑲。嘔者生薑加貳兩。咽疼除芍忌寒涼。桔加壹兩和薑附。寒極咽疼此法當。利止脈停仍不出。須除桔梗換薑良。薑資薑附來通脈。貳兩棗加脈自彰。

○四逆散加伍法方。欬加五味子乾薑。味薑並主水寒泄。症異邪同亦可嘗。悸者水凌加桂效。溺如不利茯苓鑲。各加伍分古時稱。壹分貳錢半要詳。腹內疼加炮附壹。治寒水病腎無陽。泄如下重參升薤。用水先煎薤白良。水伍升煎參拾合。參方寸匕散和湯。散和

湯煮壹升半。分作貳回。痢病康。

○理中加減捌條宣。此藥爲湯本是圓。臍上築兮腎氣動。朮除換肆桂來聯。吐多白朮須除去。加入生薑參兩妍。下利多兮還用朮。悸加貳兩茯苓煎。渴思飲水宜增朮。參兩再加兩半連。腹痛人蔘加兩伍。共成肆兩半來填。其人寒者薑加重。肆兩半兮力倍前。腹滿水寒除白朮。須加炮附壹枚全。服湯後飲熱稀粥。身緩被衣勿揭擅。

○枳實梔子豉湯加。若然宿食大黃嘉。黃如碁子伍枚用。此主病痊食復邪。

古稱歌

揆算經方古稱異。一銖百黍今分四。六銖爲一份推之

今稱八分五釐記。四份古之爲一兩。較今之稱三錢四。此從坤載本推之。古稱裁成今稱易。

古方升歌

經方量藥用方升。下徑陸分上寸應。升內八分深古

式。方升量藥隱居繩。

古大升歌

紅藍花酒大升繩。諒想當年量水升。揆算今之二合半。時珍之論法相應。

古劑歌

古之一劑分三劑。較比時方無大細。若再裁成半劑煎。用之乃合今時例。

枚數歌

權衡制度屢朝更。惟有言枚今古平。雖是枚之有大小。古今方註自無爭。

▲內科傳染病學

中華民國十九年一月出版

包氏醫宗第一集 目錄

(第一集售銀陸圓)

傷寒論章節

卷之二

傷寒方法 附歌括

卷之三

傷寒表 附表式

卷之四

傷寒論講義

卷之五

傷寒方講義

一冊

二冊

一冊

一冊

一冊

包氏醫宗第一集第二卷

傷寒方法 一冊

著作者 閩杭包桃初

出版者 包氏醫宗出版部

總發行

包氏醫宗出版部

上海北泥城橋新開路
口鴻祥里二二四五號

代售處 各大書局

▲內科學 瘟科婦人科學附

包氏醫宗第三集

診斷學

四册

印刷中

卷之一

雜病論章節

一册

卷之二

雜病方法

附歌括

一册

卷之三

雜病表

附表式

一册

雜病論講義

二册

卷之四

雜病方講義

一册

(第二集售銀伍圓)

解剖學

二册

附圖

編輯中

生理學

二册

包氏醫宗第六集

病理學

二册

包氏醫宗第七集

治療學

一册

包氏醫宗第八集

藥物學

一册

編輯中

▲函索樣本附郵票二十分