

亥 21

93-7

周氏醫學叢書

第二十六冊



中藏經卷下

漢華佗元化著

療諸病藥方六十道

萬應圓

甘遂

兩三

芫花

兩三

大戟

兩三

大黃

兩三

三稜

兩三

巴豆

兩三  
和皮

乾漆

兩二  
炒

蓬朮

兩二

當歸

兩五

桑皮

兩二

礪砂

兩三

澤瀉

兩八

山梔仁

兩二

檳榔

兩一

木通

兩一

雷丸

兩一

訶子

兩一

黑牽牛

兩五

五靈脂

兩五

皂角

七挺  
皮弦去

右件二十味剉碎洗淨入米醋二斗浸三日入銀器

或石器內慢火熬令醋盡焙乾焦再炒為黃色存性

入后藥

木香一兩

丁香一兩

肉桂去皮一兩

肉豆蔻一兩

白朮一兩

黃芪一兩

沒藥一兩

附子去皮一兩炮臍

茯苓一兩

赤芍藥一兩

川芎二兩

牡丹皮二兩

白牽牛二兩

乾姜二兩

陳皮二兩

芸臺炒二兩

地黃三兩

鼈甲三兩醋炙

青皮三兩

南星二兩漿水煮軟切焙

右二十味通前共四十味同杵羅為末醋煮麩糊為丸如棗豆大用度謹具如左合時須在一淨室中先

嚴潔齋心滌慮焚香精誠懇諸方聖者以助藥力尤

効速也

結胸傷寒用油漿水下七圓當逐下惡物如人行二



十里未動再服

多年積結 飧食癥塊 臨卧水下三圓至五圓 每夜服

之病即止 如記得因傷物作積 即隨所傷物下七圓

小兒姪婦  
老人勿服

水氣通身腫黃者 茯苓湯下五丸 日二服 水消爲度

如要消酒進食 生姜湯下一丸

食後腹中一切痛 醋湯下七丸

膈氣噎病 丁香湯下三丸 夜一服

因傷成勞 鼈甲湯下七丸 日三服 漸安減服

小腸疝癖 氣茴香湯下三丸

大小便不通 蜜湯下五丸 未通加至七丸

九種心痛茱萸湯下五丸立止

尸注走痛木瓜湯下三丸

腳氣石楠湯下五丸每日食前服

卒死氣未絕小便化七丸灌之立活

產後血不行當歸酒下三丸

血暈血迷血蠱血痢血脹血刺血塊血積血癥血瘕

並用當歸酒下二丸逐日服

難產橫倒榆白皮湯下二丸

胎衣不下燒稱鎚通紅以酒淬之帶熱下二丸惟孕

婦患不可服產急難方可服之

脾瀉血痢乾姜湯下一丸

赤白痢甘草乾姜湯下一丸

赤痢甘草湯下一丸

白痢乾姜湯下一丸

胃冷吐逆並反胃吐食丁香湯下二丸

卒心腹痛不可忍者熱醋鹽湯下三丸如常服一丸

臨卧茶清下

五爛疾牛乳下一丸每日二服

如發瘡時童子小便酒下十丸化開灌之吐利即愈

其効如神

療萬病六神丹

雄黃一兩研

礬石一兩燒

巴豆一兩去皮



附子一兩炮

藜蘆三兩

朱砂二兩

一兩別研一兩

為衣

右為末煉蜜為圓如小豆大一等作黍米大男子百

疾以飲服二丸小兒量度與小者服得利即差

安息香丸治傳屍肺痿骨蒸鬼疰卒心腹疼霍亂吐瀉

時氣瘴癘五利血閉疔癬丁腫驚邪諸疾

安息香

木香

射香

犀角

沈香

丁香

檀香

香附子

訶子

朱砂

白朮

華撥

已上各一兩

乳香

龍腦

蘇合香

已上各半兩

右為末煉蜜成劑杵一千下圓如桐子大新汲水化



下四圓老幼皆一圓以絳囊子盛一圓彈子大懸衣  
辟邪毒魍魎甚妙合時忌雞犬婦人見之

明月丹治傳尸勞

雄黃半兩

兔糞二兩

輕粉一兩

木香半兩

天靈蓋

一兩 炙

鼈甲一個

大者去裙襴醋

炙焦 黃

右為末醕酒一大升大黃一兩熬膏人前藥末為圓  
如彈子大朱砂為衣如是傳尸勞肌瘦面黃嘔吐血  
咳嗽不定者是也先燒安息香令烟起吸之不嗽者  
非傳尸也不可用此藥若吸烟入口咳嗽不能禁止  
者乃傳尸也宜用此藥五更初勿令人知以童子小





便與醕酒共一盞化一圓服之如人行二十里上吐  
出蟲其狀若燈心而細長及寸或如爛李又如蝦蟇  
狀各不同如未効次日再服以應爲度仍須初得血  
氣未盡精神未亂者可用之

地黃煎解勞生肌肉進食活血養氣

生地黄汁五升 生杏仁汁一升 薄荷汁一升

生藕汁一升 鵝梨汁一升 法酒二升

白蜜四兩 生姜汁一升

已上同于銀石器中慢火熬成膏卻入後藥

柴胡四兩 去蘆 木香四兩 人參二兩

白茯苓二兩 山藥二兩 柏子仁二兩

遠志二兩

去心

白朮二兩

桔梗二兩

枳實二兩

炒

秦艽二兩

去蘆

麝香二錢

另研

熟地黃四兩

右末入前藥膏中和再入日中杵二三千下圓如桐

子大每服此藥用甘草湯下二十圓食後日三服安

卽住服

起蒸中央湯

黃連五兩

右咬咀以醋酒二斗同熬成膏每夜以好酒化下彈

子大一圓汗出爲度仍服補藥射臍圓

補藥射臍圓



射一枚燒灰

地黃洗

地骨皮

山藥

柴胡各一兩

白朮

活鱉一箇重二斤者佳

右將鱉入醕酒一方煮令爛熟研細入汁再熬膏人末圓如桐子大酒服二十圓日二夜一蒸謂骨蒸也氣血相搏久而瘦弱遂成勞傷肉消毛落妄血喘咳者是也宜以前法治之

太上延年萬勝追魂散

人參去蘆

柴胡去苗

杏仁去皮尖

天靈蓋炙各一兩

蜀椒一分

桃柳心握一小

右為末童子小便一升末一兩埴瓶中煎令熟空心



日午各進一服經五日効

醉僊丹主偏枯不遂皮膚不仁

麻黃一升

去節水煮去沫焙乾作末

南星七箇

大者

大附子三箇

黑者

地龍七條

去土

右除麻黃外先末之次將麻黃末用醕酒一方熬成膏入末圓如彈子大每服食後臨睡酒化一圓汗出為度偏枯不遂皮膚不仁皆由五藏氣虛風寒暑溼之邪蓄積于中久而不散乃成疾焉以前法主之

靈烏丹治一切冷疾疼痛麻痺風氣

川烏一斤

河水浸七日換水浸去皮尖切片乾之

牛膝二兩

酒浸焙

何首烏四兩

制如川烏法



右爲末煉蜜圓如桐子大朱砂爲衣空心酒下七圓

漸加至十圓病已即止

扁鵲玉壺丹駐顏補煖祛萬病

硫黃一斤

以桑灰淋濃汁五斗煮硫黃令伏以火煨之研如粉掘一地坑子深二寸許投

水在裏候水清取調硫黃末稀稠得所磁器中煎乾用鐵一箇上傳以砂砂上鋪紙鐵下以火煨熱

即取硫黃滴其上自然色如玉矣

右以新炊飲爲丸如麻子大空心食前酒下十圓

葛玄真人百補構精圓

熟地黄

四兩

山藥二兩

五味子

六兩

茯苓三兩

酒浸一宿

牛膝二兩

酒浸

山茱萸

一兩

澤瀉一兩

茯苓一兩

皮去

遠志一兩

心去



巴戟天去心一兩

赤石脂一兩

石膏一兩

柏子仁炒一兩

杜仲三兩去皮剉碎慢火炒令絲斷

右為末煉蜜圓如桐子大空心温酒下二十圓男子

婦人皆可服

澀精金鎖丹

韭子一升酒浸三宿濾出焙乾杵為末

右用酒糊為圓如桐子大硃砂為衣空心酒下二十

圓

療百疾延壽酒

黃精四斤 天門冬三斤 松葉六斤

蒼朮四斤 枸杞子五升



右以水三碩煮一日取汁如法釀成空心任意飲之

交藤圓駐顏長算祛百疾

交藤根一斤

紫色者河水浸七日  
竹刀刮去皮晒乾

茯苓五兩

牛膝二兩

右為末煉蜜搜成劑杵一萬下圓如桐子大紙袋盛

之酒下三十圓空心服久服延壽忌猪羊肉

天仙圓補男子婦人虛乏

天仙子

五靈脂

各五兩

右炒令焦黑色杵末以酒糊為圓如菉豆大食前酒

服十五圓

左慈真人

陸本無此上四字作善養

千金地黃煎



生地黃一秤

取汁于石器中熬成膏入熟乾地黃末看硬軟劑杵干下

右圓如桐子大每服二十圓空心服久服斷慾神仙

不死

取積聚方

輕粉

粉霜

朱砂

各半兩

巴豆霜

二錢半

右同研勻煉蜜作劑旋圓如麻子大生姜湯下三圓

量虛實加減

治癥瘕方

大黃

溼紙裹煨

三稜

濕紙裹煨熱剉

礪砂

研

乾漆

炒令烟盡

巴豆

去皮出油

已上各一兩為末醋一方熬成膏入後藥





木香

丁香

枳實

麩炒去穰

桂心

各一兩

右為末入前項膏子和成劑杵干下為圓如菉豆大飲服三五圓食後服

通氣阿魏圓治諸氣不通胷背痛結塞悶亂者悉佳之

阿魏

二兩

沈香

一兩

桂心

半兩

牽牛末

二兩

右先用醑酒一升熬阿魏成膏入藥末為圓櫻桃大朱砂為衣酒化一圓

治尸厥卒痛方尸厥者謂忽如醉狀肢厥而不省人事也卒痛者謂心腹之間或左右脇下痛不可忍俗謂鬼箭者是



雄黃二兩研

朱砂二兩研

右二味再同研勻用大蒜一頭溼紙裹煨去紙杵為

圓櫻桃大每服一圓熱酒化下

鬼哭丹主腹中諸痛氣血凝滯飲食未消陰陽痞隔寒

熱相乘搏而為痛宜以此方主之

川烏十四箇生

朱砂一兩

乳香一分

右為末以醋一盞五靈脂末一兩煮糊和圓如桐子

大朱砂為衣酒下七圓男子溫酒下女人醋湯下

治心痛不可忍者

木香各一兩

蓬朮各一分炒

右為末每服一錢熱醋湯調下入口立止



取長蟲兼治心痛方

大棗

廿一箇  
去核

綠礬

一兩作二十一塊子填  
棗中麩裏燒紅去麩

雷丸

七箇

輕粉

錢一

木香

錢一

丁香

錢一

水銀

半兩入鉢半  
兩溶成砂子

右為末取牛肉二兩牛脂一兩與肉同剉令爛米醋

一升煮肉令成膏入藥同熬硬軟得所入臼中杵三

二千下圓如酸棗大圓時先以緋線一條圓在藥中

留二尺許作系如有長蟲者五更初油漿水吞下一

圓存線頭勿令吞盡候少頃心中痛線動即急拽線

令藥出則和蟲出若心氣痛不可忍者熱醋湯化下

一圓立止



治蟲毒方

水銀

蜜陀僧

黃丹

輕粉

大黃

丁香

訶子

雄雀糞

各兩

右為末每服二錢用麵半兩共水和成油餅食之又法作碁子大漿水煮熟食之

破棺丹治陰厥面目俱青心下硬四肢冷脉細欲絕者

流黃

一兩無灰酒煮三日三夜如耗旋添緩酒日足取出研為末

丹砂

一兩研勻細

右以酒煮糊為圓如鷄頭大有此病者先于淨室中

勿令人知度病人長短掘一地坑子深一尺以來用

苜蓿火燒令坑子極熱以醋五升沃令氣出內鋪衣

被蓋坑以酒化下一丸與病人服之後令病人卧坑

內蓋覆少時汗出即扶病者令出無風處蓋覆令病人四肢温心下軟即漸去衣被令通風然後看虛實

調補

按雞頭芡實也

再生圓起厥死猶暖者

巴豆

一兩去皮研

朱砂

一兩細研

麝香

半兩研

川烏尖

十四箇為末

大黃

一兩炒取末

右件再同研勻煉蜜和圓如桐子大每服三圓水化下折齒灌之立活亦療關膈結胸極効

救生圓治卒死

大黃

四兩

輕粉

半兩

朱砂

一兩

雄黃

一分

巴豆

七箇去皮細研取霜



右爲末以鯁膽汁和圓如鷄頭大童子小便化開一  
圓幹開口灌之內大葱一寸許入鼻中如人行五七  
里當吐出涎卽活

治脾厥吐瀉霍亂

黑附子

炮去皮  
臍八破

乾姜

炮

甘草

炙

肉苳

各一兩印本無此  
一味有豉等分

右爲末水半升末四錢

印本作  
二錢

棗七箇姜一分

印本  
作一

錢同煎去半溫服連進三服

按去半當  
是去滓

三生散起卒死兼治陰盛四逆吐瀉不止

草烏

七箇

厚朴

一尺

甘草

三寸並  
生用

右爲末水一中盞末一錢棗七箇煎七分服重者灌



之

起卒死

蔥葱根

二兩

瓜蒂

一分

丁香

十四粒

右爲末吹一字入鼻中男左女右須臾自活身冷強

厥者勿活

浴腸湯治陽厥發狂將成疽

大黃

四兩溼紙裹煨

大青葉

梔子仁

甘草

各一兩炙

右爲末水五升末四兩煎減二升內朴硝五合再熬去一升取汁二升分四服量虛實與之大瀉爲度如

喜水卽以水澆之畏水者勿與喫大忌

破黃七神丹



朴硝

斤二

朱砂

兩五

大黃

兩七

甘遂

兩二

山梔

兩二

輕粉

兩一

鼓

半斤以絹袋盛之

右七味以水二斗熬令水盡除去甘遂鼓梔子大黃

只取朴硝朱砂輕粉為末以水浸鼓汁研勻後入末

三味同和煮糯米糊為圓如彈子大新汲水化一圓

吐瀉為度

三黃圓治三瘡吐血諸黃症

黃連

兩三

黃芩

兩二

大黃

兩一

右為末煉蜜為圓如桐子大食後溫水下十五圓量

虛實加減服

通中延命玄冥煮硃砂法活尿血開擁塞解毒治一切





熱病風氣脚氣蠱毒

硃砂五兩

朴硝

半秤水煮七遍每遍用水三升水盡為度取霜再入水二升

蘇木二兩

大黃

五兩

鬱金

三兩

山梔

二兩

人參二兩

桑皮

二兩

甘草

五兩

右件同熬水盡為度只用硃砂去餘藥杵末煉蜜圓  
如桐子大每服二十圓飲下可疎諸毒尤妙

治暴熱毒心肺煩而嘔血方

大黃

二兩為末以地黃汁拌勻溼即焙乾

右為末每服二錢地黃汁調下以利為度甘草湯亦

得

治吐血方



蛤粉四兩

朱砂一兩

右爲末新汲水調下五錢未止再服止卽已

治中暈死心下猶暖起死方

右令病者仰面卧取溫水不住手澆淋臍中次以童

子小便合生地黃汁灌之自活禁與冷水只與溫熟

水飲之

玉霜膏治一切熱毒喉閉

朴硝

一斤

牙硝

半斤

礪砂

四兩

礬石

三兩

右爲末火鎔成汁築一地坑子令實傾入盆覆一夕  
取杵爲末入龍腦二兩研勻新汲水半盞合生蜜調

一錢小兒量與服



百生方救百物入咽喉鯁欲死者

茯苓去皮

貫眾

甘草

右件各等分爲末每服一錢米飲調下立効

治喉閉悶氣欲死者

右取乾漆燒令烟出竹筒子吸烟吞之立効

治漏胎胎損方

川芎

艾葉

各一兩炒

阿膠

炒

白茯苓

〇〇

右末之糯米飲調下二錢七日七服仍食糯米粥養之

治婦人血崩方

枳殼

一錢炒

地黃

二錢燒醋滓十四次



右爲末醋湯調下一錢匕連三服効

治婦人血閉方

乾漆二兩 燒

生地黄汁五升

右熬成膏酒化棗大許空心服

三不鳴散治小便不通及五淋

取水邊燈下道邊螻蛄各一箇

三處取三箇令相咬取活者一箇如

後法射香酒食空下

右內于瓶中封之令相噬取活者焙乾餘皆爲末每

服一錢匕温酒調服立通餘皆二字恐誤

甘草湯解百藥毒

甘草 一十二兩



右件剉碎水二斗煎至一斗取清溫冷得所服仍盡  
量服

治溺死方

取石灰三石露首培之令厚一尺五寸候氣出後  
以苦葫蘆穰作末如無用瓜蒂

右用熱茶調一錢吐爲度省事後以糜粥自調之

治縊死方

先令人抱起解繩不得用刀斷扶于通風處高首臥  
取蔥根末吹入兩鼻中更令親人吹氣入口候噴  
出涎卽以礬石末取丁香煎湯調一錢匕灌之

槐子散治久下血亦治尿血

槐角中黑子一升合槐花二升同炒焦

右件爲末每服二錢用水調下空心食前各一服病

已止

治腸風下血

荆芥穗

地黃各二兩

甘草半兩

右爲末每服一錢温酒調下食後日三夜一

治暴喘欲死方

大黃一兩

牽牛二兩炒

右件爲細末每服二錢蜜水調下立愈治上熱痰喘

極効若虛人肺虛冷者不可用

大聖通神乳香膏貼諸毒瘡腫發背癰疽



乳香 兩一

沒藥 兩一

血竭 兩一

黃臘 兩一

黃丹 兩二

木鼈 兩二  
去殼

烏魚骨 兩二

海桐皮 兩二

不灰木 兩四

歷青 兩四

五靈脂 兩二

麝香 錢二

膩粉 五十箇子  
此必有誤

右並為末用好油四兩熬令熱下藥末熬不住手攪

之令黑色滴水成珠即止

水澄膏治病同前

井泉石

白及 各一兩

龍骨

黃蘗

鬱金 各半兩

黃蜀葵花 一分

右六味並為末每服二錢新汲水一盞調藥打令勻



同清澄去浮水攤在紙花上貼之腫毒發背皆治

更甦膏治一切不測惡瘡欲垂

垂字恐誤

南星

一箇

巴豆

五箇去殼

麝香

半錢

半夏

七箇

右爲細末取臘月猪脂就膏令如不痛瘡先以鍼刺破候忍痛處使以兒乳汁同調貼之

千金膏貼一切惡瘡癰癤

定粉

南粉

膩粉

黃丹

各一分

右爲末入麝香一錢研勻油調得所成膏貼

定命圓治遠年近日一切惡候漏瘡

此藥爲未熔開蠟就湯內爲條如布

鍼大內入雲母膏貼之





雄黃

乳香各一分

巴豆

二十一粒去皮不去油

右研如粉入白麵三錢水和圓如小豆或小麥粒大

兩頭尖量病深淺內瘡中上用乳香膏貼之効服雲

母膏尤佳

麝香圓治一切氣漏瘡

射香

一分

乳香

一分

巴豆

十四粒去皮

右為末入棗肉和成劑圓作錠子看瘡遠近任藥以

乳香膏貼之以効為度

香鼠散治漏瘡

香鼠皮

四十九箇河中花背者是

龍骨

半兩

蝙蝠心

二箇用肝

黃丹

一分



射香錢一

乳香錢一

沒心草一兩  
燒灰

右入坩合中泥固濟炭三斤煨火終放冷爲末用葱漿水淨以藥貼之立効

定痛生肌肉方

胭脂分一

血竭兩一

乳香分一

寒水石三兩  
燒

右爲末先以溫漿水洗過拭乾傳瘡甚妙

又定痛生肌肉方

南星箇一

乳香錢二

定粉兩半

龍骨兩半

不灰木一兩  
燒過

右爲末先以溫漿水洗瘡口以軟帛拭乾傳之



治白丁憎寒喘急昏冒方

葶藶

大黃各一兩

桑白皮

茯苓各一兩

檳榔七箇

郁李仁

漢防已

各三分

右件爲末每服三錢蜜水調下以疎下惡物爲度

又取白丁方

鉛霜一分

膽礬

粉霜各一錢

蜈蚣一條

右件爲末先刺令血出入藥米心大以醋麪餅封口

立愈

治赤丁方

黃連

大黃各一兩

右件爲末以生蜜和丸如桐子大每服三十九溫水



下以利爲度

又取赤丁方

杏仁

七箇  
生用

右件嚼爛漱之令津滿口吐出綿濾汁入輕粉少許  
調勻以雞羽掃之

治黃丁方

巴豆

七箇  
去心膜

青州棗

七箇去核安巴豆在棗內以麴裏煨通赤

右件爲末以礪砂醋作麵糊爲圓如棗豆大每服五  
圓至十圓米飲下以利爲度

又取黃丁方

陸本元  
控一行

黃蘗

一兩

鬱金

半兩



右件爲細末以雞子清調雞羽掃上

治黑丁方

兔絲子

菖蒲

右二味等分爲末酒浸取汁掃丁上更服腎氣圓補之

治青丁方

穀精草

蟬殼

各一兩

蒼朮

五兩

右爲末每服一錢水調服食前仍以鍼刺丁出用桑柴灰汁洗之立効

已上捌方陸本在中卷四十論後印本無此方今

附下卷之末



中藏經附方

漢華佗元化著

治惡瘡發背

燒車螯

蘆殼

無有竹根代

黃蘗

甘草

右等分爲末先以青鹽薄荷園荈樓蔥煮漿水湯洗

瘡男子以婦人婦人以男子唾調前藥塗之以赤

水出爲度

神效乳香膏治一切瘡腫生肌止痛一名金露

芝麻油

四兩

黃丹

半一兩

乳香

一分

羊同骨髓

四兩

麝香

少許



一方用沒藥一分代乳香

右件藥一處入磁器內用文武火熬之成膏用綿濾

過入磁合收之入黃蠟半兩

金屑圓亦名黃圓子治傷風寒頭痛肌熱大效

大天南星 五箇

半夏 二兩洗七遍

石膏 二兩

甘草

鬱金 一兩

右為末以生薑自然汁為圓如雞頭大每服二圓傷

寒頭痛荆芥茶下四肢厥冷燈焰上燒存四分性

服大便不通大戟湯下小便不通大黃湯下破傷

風豆淋酒下常服茶清下並嚼嚥

白散子治發背候取下毒炆次用清涼膏貼之



白附子

大香附子 各半

半夏 一分  
薑製

黑牽牛

二兩半生  
半炒令熟

大甘遂 一分

以大麥炒候黃赤色去  
麥不用須極慢火炒之

右為末量患人虛實加減每服二錢以蜜酒調下續

飲溫酒一兩盞候所苦處刺痛為度微利三五行

瀉出惡物即差次用膏藥貼之氣盛者一服二錢

餘更裁度

清涼膏治發背等先用白散子取之次用此藥貼之

川當歸 二兩

香白芷

木鱉子肉

白芨

芍藥

黃蘗

白歛 各一兩

乳香 別研

膩粉 各少許





白膠 少許

黃丹 五兩

按白膠當是白膠香

右用清麻油十兩煎前七味候紫色去之入槐柳枝各七寸再煎少頃又去之入黃丹五兩熬成人乳香等重綿濾入罐子內貯之用如常貼使妙應膏治疥癬

藺茹

藜蘆

右等分爲麤末油煎黑去滓入黃蠟就成膏塗擦之治惡瘡金瘡刀斧傷見血方

右降真香爲末貼之入水並無妨絕妙

治嵌甲累效

硃砂 一錢

乳香 一錢

膩粉 半錢



橄欖核

三箇燒  
灰存性

黃丹

一字

右為末入生油調先以鹽湯洗淨指乾傅之兩上効

治惡瘡疥癬

巴豆

一十一粒油煎令  
沸去巴豆不用

蛇床

藺茹

右後二味等分細末入輕粉少許用巴豆油調傅之

及指痒處

佛手膏治膿窠瘡神効

大戟

細辛

蛇床子

各一兩

雄黃

白膠香

青州蝎

黃蘗

黃丹

各半兩

白礬

錢一

右為末以清油八兩熬煙出次下去皮巴豆四七粒



槐枝二七截候焦取去不用次下黃蠟一兩松  
脂二兩次下前九味末以槐枝不住攪成膏磁  
合內貯又名紫霜膏

治發背一切癰疽金石藥毒發

右以紫背車螯大者鹽泥固濟火煨通紅放冷取出  
研爲極細末地上出火毒一宿以甘草膏子圓如  
梧桐子每服三五十圓甘草湯下日進三服第三  
日取下惡物用後藥貼之

貼瘡白膏藥

右以寒水石不拘多少火煨通紅入磁器中封口令  
密沉井中一宿取出研極細以臘月豬脂和如膏

稀稠得所白瘡赤盡處塗之闊一指許上以薄紙  
爲花子中心留一孔貼定漸次赤退卽迤邐移近  
裏至愈紙花孔子外所留紙令與所塗藥闊狹等

### 接骨散治折傷

黃狗頭骨

一箇以湯去毛便以湯連皮煮去皮  
取骨泥固炭火煨過去泥爲細末

官桂末

牡蠣亦泥固煨

右三味各爲細末每用狗骨末五錢入牡蠣末三錢  
官桂末二錢並炒以糯米粥鋪絹帛上方摻藥在  
粥上裏損傷處大段折傷者上更以竹片夾之少  
時卽痒不可抓之輕以手拍三兩日效

### 治金瘡妙方

右以石灰不拘多少和入血作餅厚兩指許風乾旋

切傳之

治內損吐血

右以飛羅麩微炒以濃墨一茶匙調二錢許服立効

越桃散治下血及血利

越桃 梔子也

槐花

青州棗

乾薑

右等分燒存性為末陳米飲調下二錢

炙肝散逐胃中風邪益脾進食凡人虛弱用補藥日久

漸至瘦損食少倦怠大便頻數泄漏服此無不取效

妙

白朮

白芍藥

山白芷

桔梗

各四兩

右各生爲細末用不入水獐猪肝五兩作小片子或塊子拌藥十五錢細切葱白二寸鹽一錢同拌肝令勻以竹簽子作串慢火炙香熟啖之米飲送下空心食前各一服渴勿喫冷水半月必安

地黃散牢牙去齒病

出僧文瑩  
湘江野錄

歌曰

猪牙皂角及生薑西國升麻熟地黃木律旱連槐

角子細辛荷葉要相當

荷葉取  
心用

青鹽等分同燒煨

研殺將來使最良擦齒牢牙髭鬢黑誰知人世有

仙方

治牙痛神驗

草蓼撥

木驚子 去壳

右先研木驚子令細入蓼撥同研令勻隨左右鼻內

搯之每用一豆許

治牙痛及走馬疳

右用頭髮飢餓用剃面刀子細切銚內慢火燒存性

為細末摻患處

治風氣攻注牙齒腫痛

藁本

剪草

細辛

右等分為籠末每服三錢水二大盞煎至一盞半以

下乘熱嗽之過微覺痛少頃自止

治喉閉及腫痛

白梅二十五箇取肉

白礬一錢

甘草一錢

生草麻四十九粒去皮

右同研勻和圓如雞頭大以綿裏含化

絳雪治喉閉

礪砂皂大一塊

白礬同上

馬牙硝一分

消石四兩

黃丹半兩

新巴豆六枚

右用簾磁小碗兒一箇先煨令熱下前四味次下丹

次下巴豆仍將巴豆先打破逐箇旋下候焰盡又

下一箇入蛇退皮一條自然燒化以砂礬成汁候

結硬末成每用少許以筆管吹在患處





碧雪治口瘡如咽喉痛腫卽含化

焰硝 二兩

甘草 二兩不  
炙生用

青黛 半兩

殭蠶 半兩

右爲細末取黃牛膽汁和之令勻卻入膽內當風吊

臘月合過百日中用

烏龍散治骨槽風牙齦腫有奇功

右用不蛀皂角不得搥破只剉取去皂子卻入和皮

尖杏仁一箇在皂子處燒存性研細每一兩入青

鹽一分令勻不計時揩牙用

治口瘡

用五倍子爲末摻瘡上

治喉閉牙關不開者

右以白僵蠶微炒為末生薑自然汁調下一錢如神

效

白龍散治風毒赤爛眼眶倒睫冷熱淚不止滴水和為

雞頭大圓子亦得

白鱧粉一兩

銅碌

一錢別研入

按白鱧粉一名白堊

右同再研勻每用半錢百沸湯化開以手指洗眼

清中湯治暑氣中暈

陳皮一二兩

甘草

一兩蜜炙焦黃脆可折

乾薑

半兩濕紙裹煨

按當是生薑

右為末每服二錢水一盞煎至八分溫冷喫湯點水



調皆可

皂角散治五種腸風瀉血下痢糞前有血號外痔糞後有血號內痔大腸不收號脫肛穀道四面有弩肉如疔號舉痔頭上有孔號漏並皆治之

黃牛角觶

一箇  
剉

蛇蛻

一條

豬牙皂角

五箇  
剉

穿山甲

右四味同入瓷瓶內黃泥封固候乾先以小火燒令烟出方用大火煨令通紅爲度取出攤冷杵羅爲末患者先用胡桃肉一箇分作四分取一分臨困時研細如餵溫酒調下便睡先引蟲出至五更時溫酒調下藥末二錢至辰時更進一服取下惡物



永除根本

白龍散治消渴

寒水石 生

甘草 半生 半炙

葛粉 各等分

右件爲細末每服二錢濃煎麥門冬苗湯調下服立止

神驗柴胡散治大人小兒骨熱夜間如蒸甚者不過十

數日見效

土柴胡 不以多少去蘆洗淨炙黃色 不令太焦亦不須銀州者

右爲末每服二錢水一盞入地骨皮指面大二片子

同煎至七分食後溫服如虛瘦但空心服補藥食

後煎下數服時時如水飲之



聖餅子治咯血

青黛 一錢

杏仁四十粒

去皮尖以黃明蠟煎黃色取出研細

右二件再同研勻卻以所煎蠟少許鎔開和之捏作

錢大餅子每服用乾柿一個中破開入藥一餅合

定以濕紙裹慢火煨熟取出以糯米粥嚼下

治產後惡心

白朮 一分

生薑

減半

右並咬咀水一盞煎至七分溫服如神

艾煎圓治婦人經水不止

金毛狗脊

一兩去黃毛

威靈仙

一兩

良薑

一兩

熟艾二兩

糯米餺和日乾為末一法用醋熬焙乾亦可為末



赤芍藥 一兩

附子 半兩

右爲末以藥一半同醋煮麩餲和餘一半藥末爲圓  
每服十圓溫酒下食前空心服

治血山崩甚者

右以凌霄花焙乾爲末酒下三錢立止晝夜不定者  
一服效

治產後發熱無憂散

虎臆 一兩

生地黄 半斤

右將地黃於銀器中炒煙盡合地上出火毒乳鉢內

研爲末每一兩虎魄末二錢勻合用童子小便與

酒中半調下一錢日三服

治腫毒

天南星 生為末

白礬 研細

右等分新汲水調塗乾再掃之

治大人小兒偏墜服訖以食壓之

防風

官桂 研細 辛辣者

右等分為末酒調二錢

神應烏玉丹治丈夫婦人久新腸風痔瘻着床頭痛不可忍者服此藥不過三四次便見功效初得此疾發痒或疼穀道周圍多生硬梗此是痔如破是瘻只下血是風皆因酒色氣風食五事過度即成此疾人多以外醫塗治病在腸內有蟲若不去根本其病不除



此藥的有神效不可細述

椶櫚

亂髮 各二兩

猬皮 四兩

猪蹄甲

須後腳者 一十四箇

牛角腮

二兩

槐角

半一兩

苦棟樹根

洗淨 二兩半

雷丸

脂麻

各一兩 陳淨

真麝香

二錢

滴乳香

半兩

右除乳麝二香別研細外並細剉入藏瓶或沙合子

不固濟周圍用熟炭火煨烟才盡便去火

全在體度煨未

成則殺納不細煨過則藥無力

入二香同研勻無灰醇酒打麩糊

為圓如梧子大每服八粒先細嚼胡桃一枚以溫

酒吞下空心晚食前日二服如病甚日三服切忌

服別藥不過三兩日永除根本



治小兒疳疔

右以芥子不拘多少研成膏攤紙花子上貼痛硬處

坐中效

常山湯治妊娠患瘧

常山 三兩

甘草 一兩

黃芩 三兩

烏梅 十四箇

石膏 八兩

右以酒一升二合漬藥一宿煮三四沸去滓初服六

合次服四合又次服二合發前次第服之今但抄

伍大錢漬酒一盞

常山湯治同前

常山 三兩

竹葉 三兩

石膏 八兩



杭米

粒一百

右以水六升煮取二升半分三服第一服未發前待  
食久服之次臨發時服餘一服以塗頭額及胸前  
伍心藥滓置頭邊當日勿近水及進飲食過發時  
乃飲粥此二方皆大湯劑今但抄五大錢水一盞  
半煎至七分服

鐵單散安胎如神

右以香附子炒去毛令淨爲細末濃煎紫蘇湯調下

一錢

失笑膏治婦人產後血不快刺痛等症

五靈脂

蒲黃

右等分爲細末每服一二錢米醋半盞同熬成膏再入

水一盞煎至七分熱服痛如失

催生治危急神妙

朱砂 半兩

乳香 一兩

右爲末端午日猪心血圓梧子大乳香湯下一粒并

治小兒斑豆不出

白朮圓治小兒白瀉

白朮

當歸

芍藥

木香

減半

右等分爲末煉蜜圓如菉豆大每服十圓十五圓不

拘時候米飲下

木香圓治小兒喫食太早遂成疳疾腹脹疳瀉及釀肚



等病

木香

沉香

青皮

去白各一錢

肉豆蔻

筒麵裹煨

牽牛

炒二錢

右為細末醋麵餬圓如麻子大二三歲兒服三粒五

六歲服五七粒濃煎蘿蔔湯下

玉柱杖散治小兒疳瘦

黃耆

人參

白茯苓

右等分為末每服一錢水一盞煎至六分呷之不拘

時

沉香養脾圓

人參

白朮

川麩薑

炮

甘草 炙

木香

丁香

肉豆蔻

麩裏

縮砂

入味各半兩

沈香

一分

右為細末煉蜜圓一兩作十粒每服一粒嚼下食前

服化下亦得

佛手膏治眼生翳膜并努肉赤脈攀睛翳暈冷熱淚下

及眼眶赤爛等方

乳香

真者研半字

硃砂

半字

麝香

一字

當歸

半錢

黃連

一錢去鬚稱剉細

白礬

半字飛過研細

白砂蜜

四兩須白砂者佳

青鹽

一字光明者研

右除蜜先將上七件於乳鉢內研爛同蜜一處拌勻



入新竹筒內用油紙兩三重以線繫扎定口勿致  
水入放淨鍋內添水煮竹筒自早至午時破竹筒  
傾藥以新綿或重絹濾過入藥於瓷瓶子內牢封  
埋地坑內經宿取出點之用銅柱點每點了合眼  
少頃復以溫淨水洗之翳膜嫩者是近年生者當  
五七次隨藥退下翳老者頻點旬日退下卽効努  
肉瘀肉不過兩三日隨藥以銅柱刮落努肉自然  
綻斷此方不謬累驗

治小兒乳癖胸腹高喘急吐乳方

右以不入倉黑豆七粒去皮研極細滴水七徧和成  
作七丸以青黛末裹之令徧更用白麵和作皮裹

藥慢火煨熟去麩再研細別人膩粉生腦子麝香  
各少許再滴水丸作七丸每服一丸臨卧溫水送  
下兒子小嚼破無妨極効

神木散治傷風頭痛聲重

蒼朮 四兩 川芎 一兩 藁本 二兩 炙甘草 兩

右咬咀每服二錢水一盞生薑二片同煎至七分通

口服不拘時候

理大腸一切下血

取雄黑豈 緊小長者是 不拘多少微以皂角湯浸發動炒

熟去皮為細末煉猪脂為丸如梧桐子大每服三

十九陳米飲熱水皆得服甚妙



治婦人懷妊多墮方

熟艾

五斤米醋三斤  
煮乾焙為末

木鱉子

五箇  
研細

大赭石

二兩米醋  
淬七遍

右同為末煮棗肉為丸梧子大每服三十九丸米飲下

花紅散治惡瘡大効方

龍骨雪白真者

一兩

乳香

半皂  
子大

粉霜

半錢

光粉

二錢

輕粉

用小平錢  
抄半錢

麝香

少許

腦子

少許

黃丹

逐旋入看顏  
色粉紅即止

右合和了如患瘡先用温漿水洗淨次用好油塗瘡

口上了方可將藥摻在瘡上用膏藥貼日三四次

易之趙允蹈赴温倅過諸暨傳此方云親自得効





渠患一漏瘡以藥用紙撚填瘡中上以膏藥貼之  
日生肉舊不痛遂漸覺痛有血是好肉生也

治喉閉

白殭蠶 天南星 並生用

右等分爲末以生薑自然汁調一字許用筆管灌在

喉中立効仍咬乾薑皂子大引涎出

治腸風下血

槿藤子 二箇如當三錢大者如更大  
只用一箇取穰別研極細

不艸皂角子 四十九粒燒  
存性別研細

右拌勻每服二錢温酒調下如人行五里再以温酒

一盞趁之日一服極効



治一切癰疽地黃膏兼治毒蟲所傷

石膏 火煨

藿香葉

蚌粉

香白芷

雄黃 研

右等分同為細末以生地黃自然汁調稀稠得所塗  
瘡上四圍留瘡頭已破者亦留瘡口勿塗乾即再  
傳之藥厚以新水潤之其効如神極妙

萬全金花散理發背疽瘡疼痛不可忍者凡腫在脊骨  
邊根株如碗蓋大上面有細頭子如粟米粒白色其  
間亦有如石榴子者即疽瘡也

車螯

紫色者出海際用火煨  
地上出火毒氣了研細

生黃蘗 為末

生甘草 為末



乾蘆皮

自東邊面西蘆籬障上取皮為末

右各為末了旋抄車螯末黃蘗末各一錢甘草末半錢已上蘆皮末一錢半已上拌勻用津唾調以竹篋子傅腫上須蓋遍瘡根未穴者自穴已穴者惡物自出凡十上取効每傅瘡時須先用赤根葱三兩莖薄荷少許鹽少許一處煎湯放冷淋洗旋旋用帛子拭乾方可上藥應係惡瘡癩並傅之無頭者即消有頭者即膿出神効

治陰瘡

臘茶

五倍子

等分

膩粉

少許

右研細津唾調傅

治吹疔



水茸角 不拘多少新瓦上焙乾

右爲細末臨卧酒調服二錢七次日卽愈已破者略出黃水亦効水茸角狀如鬼腰帶作小窠子生三四月開小黃花葉如夜合葉六七月採兩浙呼合

萌

治風痰眩運二烏圓

川烏頭

草烏頭

各四兩

青鹽 四兩

黑豆

半斤

右用水二升同煮四味水耗卽用溫水添之候川烏頭半軟四破之更煮以透爛爲度去皮同煎烏頭並黑豆於石臼或木臼內搗令極爛不見白星卽

就圓乾卽以煮藥水添濕同搗煮時留一盞以下  
水以備添勿令煮乾也圓如梧子大每服三二十  
圓鹽酒鹽湯任下食前

治風癩

右九蒸九爆天南星爲末薑汁餽圓梧子大煎人參  
菖蒲湯或麥門冬湯下二十圓

治風蚰牙

右用大北棗一枚劈開去核入和皮巴豆一粒卻捏  
合於慢火上炙令焦黑如乾浮炭樣取放地上良  
久碾爲細末以紙撚尖搨少許入蚰牙竅內不過  
五七次永絕根本

木香餅子

木香

半兩

丁香皮

二兩

益智仁

一兩

香附子

四兩去麤皮炒

甘草

二兩炒

縮砂仁

一兩麤裏煨麪熟爲

度

蓬莪茂

二兩炮

右件七味爲細末水餽爲圓梧子大捏作餅子每服

一二十餅温熟水嚼下食後

治瘰癧

瞿麥

海藻

凌霄花

北邊背陰土

別研

皂角刺

新者

右並等分每服三錢米飲調下食後日二服

貼已破者

右用鉛炒取灰滓研細以溫鹽漿水洗淨貼之

二虎丹治瘡

辰砂 硫黃

右熱多加辰砂寒多加硫黃並研細棗肉為圓如龍  
眼大當發日新水七分一盞化下

金瘡藥

右用上等風化石灰羅過以紫刺芥心韭一般多少  
搗灰成塊陰乾旋為末用傅之五月五日合

神仙眼藥并種空青法

秦皮 三錢去麤皮剉細

乳香 一塊如棗大

胡黃連 三錢

燈心 一握長七寸



棗子 三個

班貓一箇 去翅頭足

古老錢 七文不到

右都爲麤末入無油 去聲 器中砂器尤佳用井華水一

大碗熬去半碗用綿絹擠過再將滓以水半磁梳

煎取一盞入擠過汁同煎汁入新碗中熬似稠粥

樣入小甕合中或角合中盛將空青併鵬砂一塊

如兩豆大飛過熬乾空青不熬再研入腦子多不

妨麝香少許四味同入藥膏內攪勻每點一粟米

許在眼背頭將手挪勻抑回候藥微澁過將沸鹽

湯用軟帛片蘸洗快則已之

種空青法



朴消 半錢

白茯苓 一分

龍膽草 一分

仙靈毗葉 一錢

旋覆花 一錢

右爲末用黃泥一塊拳大同藥和勻水調如軟飯相  
似作土餅一箇用大平錢伍文按五方排定於光  
面墨書金木水火土五字所寫字向下錢字向上  
隨五方安用硃砂如豆大每錢安四塊在四字孔  
罅中須要乾黃土上頓着土餅將新砂盆一箇蓋  
之又將燥黃土蓋盆冬月十日夏月五日取出於  
錢上摘取下細研入藥此爲種空青法不可嫩亦  
不可老須得中也

治胞損小便不禁

牡丹須細花  
者不然無効



白牡丹

根皮爲末一錢

白芨

爲末一錢

生絹

一尺

右同以水煎如飴每服半盞

治喘嗽上氣

蒲頰葉治一切肺喘劇甚者効如神焙碾爲細末

飲調服二錢匕併服取差氣味清香其實酸澁夏

紅可食形如棗核類山茱萸揀葉背白者用江西

謂之盧都子

治蛇傷

香白芷

右爲末濃煎麥門冬湯調下一二錢神効

換骨丹治一切卒中手足頑麻腰膝沉重左癱右瘓截



四時傷寒婦人血刺產前產後每一粒酒一盞碎搗  
浸至夜温動化散臨睡和滓服小兒驚搐米飲化半

圓

桑白皮 川芎 吳白朮 紫河車

威靈仙 蔓菁子各二兩 人參 防風

何首烏各二兩 地骨皮 五味子 木香

苦參各一兩 犀角半兩 麝香 龍腦各半錢

右為細末用膏和圓

作膏法

麻黃三斤去根不去節剉細 蒼朮半斤 槐角半斤

右用河水一斗八升井水亦得同熬至三四升去滓



留清者再熬成膏和前藥每兩作八圓硃砂爲衣

治痢疾神効香粟飲子

丁香 五枚

鷲粟殼 五箇

甘草 炙一寸

白豆蔻仁 一枚

乳香 一皂子大

右以水一椀煎至半椀溫服

治爛眶風眼

宣黃連 半兩去鬚

大肉棗 三七箇去核

杏仁 五十粒不去皮尖

腦子 一字

右件用雪水一升砂鍋內文武火煮留一盞許膏三

七日以銅筋點食後臨卧日可三四次點之杏仁

去尖 按末四字疑

三茱圓治小腸氣痛

山食吳茱萸各一兩

金鈴子取肉并皮一兩

青皮去穢

船上茴香

馬蘭三味各一兩

右七味逐味於銀銚內炒令香為末酒餽圓梧桐子大每疾作鹽酒下三五十圓久年不差五七服可

除根本

金鈴圓治小腸氣一服立愈

牽牛子炒

青皮去白

良薑各等分

川棟子

船上茴香各半兩

玄胡索一兩

右為細末生薑自然汁煮麵餽圓如梧桐子大硃砂



爲衣每服三十圓燒綿爲灰浸酒下不計時候

燒肝散治久年不差心勞口瘡

銀州柴胡

去蘆

白朮

紅芍藥

牡丹皮

蒼朮

已上五味各一兩

人參

黑附子

炮去臍皮

石斛

去浮膜三味各半兩

按石斛浮膜未考

右同爲細末用獾猪肝薄批去血水摻藥在上勻徧

以荷葉裹定濕紙包之慢火煨令透熟空心食前

米飲下此藥有奇功

補心丹治因驚失心或因思慮過當心氣不甯狂言妄

語叫呼奔走

硃砂一分

雄黃

一分并研

白附子

一分爲末



右拌勻以猪心血圓如梧桐子大更別以硃砂爲衣  
每服二圓臨臥用人參菖蒲湯下常服一粒能安

魂魄補心氣鎮神靈

椒紅圓治嗽不止及補中益氣進食

川椒

揀淨二兩去目炒過出汗用

乾山藥

一兩

川附子

一兩炮去皮臍

右同爲細末以好酒煮淡木苽和之再入臼中杵三

五百下圓如桐子大每服十五二十圓空心食前

鹽湯溫酒任下泄瀉米飲下如喉中痰涎如水雞

聲曉夕不止者一兩服見効

縮砂圓消積溫中順氣治風痰利胸膈尤治傷生冷嘔

逆泄瀉

天南星 四兩湯浸洗七遍切焙乾秤

良薑 四兩

縮砂仁 一兩

右為細末生薑自然汁煮麩圓如梧桐子大每服

十五圓或二十圓擦生薑浸湯下不計時服

強中圓治氣消食益脾胃進飲食

白朮或蒼朮

陳皮 去穢

乾薑 炮

良薑 油炒

青皮 去穢

右等分同為細末湯浸蒸餅搗去水和圓如梧子大

每服三五十圓

養胃丹治脾胃不和全不思食中脘停寒嘔逆惡心臍

寒泄痢腹痛腸鳴常服溫中養胃散飲思食



丁香一兩半

白豆蔻仁兩半

人參三分

甘草半兩

乾薑三兩炮用生薑尤佳

半夏麴半兩

右同為細末煉蜜為圓每兩作十圓每服一圓溫湯

化下空心食前服之或細嚼湯下亦可造麴法半

夏不以多少湯浸洗七遍焙乾搗羅為末用生薑

汁和作餅子焙乾用之

五皮散大治男子婦人脾胃停滯頭面四肢悉腫心腹

脹滿上氣促急胸膈煩悶痰涎上壅飲食不下行步

氣奔狀如水病先服此藥能疎理脾氣消退虛腫切

不可亂服瀉水等藥以致脾元虛損所患愈甚此藥

平良無毒多服不妨

生薑皮 桑白皮 陳橘皮 大腹皮

茯苓皮 各等分

右爲麤末每服叁錢水一盞半煎至八分去滓不計

時候溫服忌生冷油膩硬物

立効散治腰痛

玄胡索 當歸 官桂

右等分酒調細末二錢匕服

香芎散治一切頭風

香附子 半斤炒 去毛

川芎 二兩

甘草 一兩 炙

石膏 一兩 研

右爲細末每服一錢臘茶荆芥湯點服食後



古卿古敗散治頭風血風又名荆芥散

荆芥穗 一斤

乾菊花 半斤

川芎 四兩

白朮 三兩

右同爲細末食後茶調二錢此藥明目去風

再甦丹治骨節疼痛語言不正行步艱難手足戰掉搗

搗

川烏頭 二兩

草烏頭 一兩

五靈脂 四兩

右爲末滴水爲圓如鷄頭大每服一圓研碎入酒一

盞生薑三片地黃三條乳香少許同煎至七分臨

臥通口服喫了須摩擦患處令熱徹以助藥力如

合時入乳香末一二錢卽煎時更不須入

沉香飲子治痞氣升降陰陽

沉香 木香 羌活 獨活 人參

桑白皮

微炙黃

白茯苓

紫蘇葉

已上各等分

右以咀為釐末每服三大錢水一盞半大棗二箇薑五片煎至七分去滓食前溫服二滓又作一服

礞石圓治脾積滯氣酒食所傷飲食不化惡心嘔逆胸膈不快不思飲食胸腹脹滿臍脇有塊心脾冷痛口吐酸水停飲冷痰疰癍瘕發痛無度翻胃轉食面黃瘦乏四肢頭面浮腫臟腑不調裏急後重及五種鬲氣虛中有積婦人血氣塊硬悉皆主之

礞砂

一兩用米醋叁升化開

巴豆霜

二兩半

二味同入醋煮兩食久

青礞石半兩研 京三稜一兩醋浸一宿煨

二味次入前醋中煮半食久

白麩二兩酒半升化

右一味次入煮半食久

大黃一兩半分三分一生一炒一煨

右次入煮半食久

木香以下並為細末 檳榔

肉豆蔻 肉桂 猪牙皂角去皮炙

乾薑炮 丁香 蓬莪朮

芫花醋浸一宿炒微令有煙 右九味各一兩



青皮

白豆蔻

好墨

燒冷入分過

右三味各半兩

胡椒

一分

粉霜

一分研

右次第煮了次入木香等一十四味熬成膏圓如棗

豆大每服三圓酒飲薑湯雜下

紫沉消積圓

沉香

一兩為末

阿魏

一分研

沒藥

一兩研

巴豆霜

四錢

礞砂

一兩

已上藥用酒蜜約度多少一處熬成膏子然後

搜藥

硃砂

丁香

乾薑

已上各半兩

硫黃

青皮

高良薑

檳榔

木香



人參 胡椒 官桂 已上各一兩

右為末將熬下膏子搜藥勻和為圓如梧桐子大每

服五圓至七圓橘皮湯下食後臨臥常用一兩圓

更看虛實加減

五勝散治四時傷寒冒風身熱頭痛昏倦寒痰咳嗽及

中滿傷寒三日以前服無不効

甘草 炙 石膏 白朮 五味子 各一兩

乾薑 三分炮

右五味同為細末每服二大錢水一盞入生薑二片

棗子一箇同煎至七分去滓溫服中滿以鹽煎傷

風頭痛加荆芥煎不計時候服



治傷寒咳逆噎汗等常亦可服

丁香

柿蒂

各一錢

甘草

良薑

各半錢

右為末用熱湯猛點乘熱一服効

如聖散治一切無名異色瘡腫消毒併閃胸折傷接骨

定痛活養血脈已破者不可用

赤小豆

升一

川烏頭

兩一

草烏頭

炮一兩

乳香

兩半

芸臺子

兩一

右件同為細末每用一錢入白麴一錢瘡腫用水調

稀煮一兩沸放溫攤紙花上貼患處傷折用醋調

骨損用黃米粥調依患處大小貼之上用帛子纏

繫或以杉木篾夾五日一換六十日當差





右附方一卷本三卷今併之製方多用丸散配藥多  
合古意並與前卷諸方一律而五皮非飲失笑爲  
膏尤足見古法之真正俗傳之失但散佚於他書  
經蒐輯而成帙故地黃散一方著所自來編爲歌  
括然而催生丹尙有神方此集正多遺漏愈風散  
止傳一味諸書互有異同別待搜求廣爲甄錄庶  
幾璧合以備蘭藏未識此心償之何日耳學海又  
記

皖南建德

周氏校刊

丙照法

漢華佗元化著

四時平脈第一

春弦

長一日

夏洪

日數

秋毛

一日潛

冬石

伏日

五臟之病第一

從心起

其液汗

心風嗜忘

心風寸浮數

心風成癩癩

其聲言

心氣痛甚

心氣寸緊

心氣成伏梁

其味苦

心熱狂走

心熱寸洪數

心熱風狂走

其臭焦

心冷死矣

心冷寸沉伏

心冷成痰



真心痛手足冷

其色赤

心虛嗜驚

心虛寸濡弱

心虛成恐懼

右上五般病除虛不灸餘四種並灸心俞背第七膈

相去二寸二分量病輕重多可百壯少至三壯若

從起處灸之亦差餘並做此也不須更敘

從肝起

其液泣

肝風筋脈痠痛

肝風關浮數

肝風癩瘰頸筋急

其聲呼

肝氣左脇痛

肝氣關緊強

肝氣風痺氣左脇妨

其味酸

肝熱骨節疼

肝熱關洪盛



肝熱成睛痛目赤而骨節煩

其臭臊 肝冷不食菜吐水 肝冷關沉細

肝冷有痰飲清風

其色青 肝虛多恐懼 肝虛關乳濡

肝虛恐懼無力

右上五般病當灸肝俞從大臑下行至第九臑夾臑

相去二寸二分候本臟脈或從餘臟來當灸餘藏

還量老少病若重或輕量事而制之除虛不灸也

從肺起

其液涕 肺風皮膚生瘡 肺風寸浮數

肺風鼻塞瘡疥



其聲哭

肺氣成上氣噎

肺氣寸緊數

肺氣上喘氣膈

其味辛

肺熱成癢嗽病

肺熱寸洪瀉

肺熱頭面生疱瘡

其臭腥

肺冷成面墨悲

肺冷寸沉細

肺冷右脇生癢氣

其色白

肺虛饒涕皮痒

肺虛寸浮濡

肺虛鼻中肉結生

右五般病除虛不灸餘並灸之從大臑下行至第五

臑夾臑相去二寸二分若從餘藏來當候臑脈量

老少輕重制之

按甲乙經五藏六府俞皆俠脊各一寸五分相去三寸此云二寸二



分而脾腎俞又異當別  
有據或是三寸二分也

從脾起

其液涎

脾風旋重

脾風關浮數

其聲歌

脾氣兩脇皆妨

脾氣關緩實

其味甜

脾熱饒睡

脾熱關洪數

脾氣背痛久成瘦病

其臭香

脾冷吐水

脾冷關細澹

脾熱成黃亦為三消

脾冷風入尺胃痰飲脹滿

其色黃

脾虛來欠

脾虛關浮芤



脾虛心熱嗜飢嘔

右上諸病除虛不灸餘病須灸第十一脰兩邊相去  
四寸半季脇盡處卽是隨病輕重而灸之若從餘  
藏來當候脈而灸之不妨藥治

從腎起

其液唾

腎風旋吐酸

腎風尺浮數

其聲呻

腎風痠攣急

腎氣尺浮緊

其味鹹

腎氣背脊疼痛

腎熱骨煩痛

腎熱尺洪數

腎熱陰毒時行

其臭腐

腎冷腰腳疼

腎冷尺沉伏

腎冷腰冷痺

其色墨

腎虛頭足痠

腎虛尺脈弱

腎虛多風耳聾

右上諸病除虛不灸餘並灸腎俞大臍下行至第十

四臍兩邊相去四寸是內腎又夾此臍相去七寸

八分斜下是外腎俞亦主膀胱俞也不妨藥治之

恐不審細仍為圖記之後人背面

按圖今佚

五臟相入第三

肝病入心

肝風入心

為癘亦或癩癧項筋急頭痛舌縮肚熱





肝氣入心

為疔瘵氣痛甚難忍左脇下痛

肝熱入心

項筋急目赤舌乾少睡嗜驚恐

肝冷入心

為吐酸水飲食不下手足冷冷如鐵名真心痛

肝虛入心

嗜驚惡罵燥不欲聞人語聲甚則呼呼

右此五般病除虛不灸餘並灸之當候其脈從何臟

生灸之即不錯也兼服藥大段灸之當候人同上

心病入亦準上子不合傳母之逆也病即難差

肺病入心

肺風入心

咳嗽唾血身體戰掉颯颯不安皮膚搔痒瘡疥

肺氣入心

胸中滿痛脹氣短卧不安胸背痛悶不已

肺熱入心

嗽逆吐血皮膚生瘡喘息麤短面赤



肺冷入心 目中多淚悲思不已面目青黑色不常

肺虛入心 悲啼思慕嗜驚怕怖皮膚白色

右此五般病狀除虛不灸量病輕重觀其老少斟酌

用之不妨服餌

心病入肺

心風入肺 皮膚生瘡白屑白癩反花癩中生結子

心氣入肺 胸背熱悶胸前及背上熱結子

心熱入肺 皮膚熱蒸手足煩悶胸中及口生瘡

心冷入肺 雞皮白膚面無血色冠弱怯懼色無常

心虛入肺 啼泣悲思目中冷淚鼻塞口乾

右五般病除虛不灸其餘並灸當候其脈輕重老少

內照法

五



藥性臨時制之

腎病入心

腎風入心

腎氣入心

腎熱入心

腎冷入心

腎虛入心

爲癘拂然而死輕則眼旋目前生花

爲疔癍氣動而改變爲氣病面黃

爲狂顛之病輕則骨煩名陰毒時行

手足冷如鐵是名真心痛甚則死

四體昏昏喜汗出足無力困悶昏昏

右此五般病亦候其脈除虛不灸視老少患狀斟酌

不妨藥治

心病入腎

心風入腎

腳氣熱吸吸無力手足骨節痠疼頭痛



心氣入腎 連膺痠疼兼膀胱及腰腳痛不可忍

心冷入腎 手足冷如鐵痛甚卽死名真心痛

心熱入腎 困不知痛處心意躁煩怨不耐痛

心虛入腎 背吸吸耳聾目昏喜忘嗜旋無力

右 上諸病餘並灸之除虛不灸服藥量病老少衰弱

斟酌候本俞

脾病入心

脾風入心 嗜嘔吐頭重眼前昏昏往往見黃黃黑黑花

脾氣入心 背膊妨心中悶悶妨滿不飲食兩脇妨

脾熱入心 饒睡涕目黃疸身熱惡心變吐昏悶

脾冷入心 胃中痰飲時時吐水沫腹脹不欲飲食



脾虛入心

食了旋飢心中往往多熱來欠嗜卧

右上諸病除虛不灸餘並灸之量老少衰弱斟酌之

不妨藥治

心病入脾

心風入脾

生熱結子在肉中極則成疱瘡癩病

心氣入脾

胃中痛自臍上至心難忍則死

心熱入脾

身熱皮膚黃極風消渴消中消腎

心冷入脾

飲食不消背膊妨悶胃中結氣

右上諸病除虛不灸餘並灸之量老少衰弱臨時制

之不妨藥治

腎病入脾



腎風入脾

手足戰掉四體不安習習昏困無力

腎氣入脾

腰腳背疼及胸兩脇妨痛甚隔氣

腎熱入脾

饒睡困重不知痛處所在面腫浮也

腎冷入脾

腰背疼及痺腳氣疼白蟲蛭蟲

腎虛入脾

腰腳無力虛吸吸四體困悶頑痺

右件諸虛不灸餘並任灸但且灸腎俞脾自愈

肝病入脾

肝風入脾

肉中生結子癩癧疱疔瘡反花等瘡

肝氣入脾

左右脇下妨痛甚則爲顛塊痛矣

肝熱入脾

背脊上熱腫成熱癰極則成膿

肝冷入脾

好吐酸水不欲喫菜及水亦不欲也

肝虛入脾

喜太息來欠吞嗟嘆煩悶擾也

右件諸病除虛不灸量老少衰弱以意消息脾病入

肝無異

腎病入肺

腎風入肺

頭旋鼻塞梁疼頭重腳痠

腎氣入肺

膊胸脊欲得搥嗽逆無氣力

腎熱入肺

皮膚熱痛嗽逆戰掉久差

腎冷入肺

悲泣涕哭面無血色力微少

腎虛入肺

耳聾塞口乾痠疼腰膝無力

右五般病除虛不灸餘並灸之量其老少衰弱輕重

制之



肺病入肝

肺風入肝

嗜卧丁瘡反花結筋皮膚生惡瘡

肺氣入肝

百脈脹口鼻青色行卧不得

肺熱入肝

骨節羸肉生結子結後爲瘡

肺冷入肝

鼻目多水出淚涓涓不絕肉帶青色

肺虛入肝

常驚怕狀似怯人筋中疼痛也

右上諸病除虛不灸餘並灸仍服藥勿使不慎口當

候其脈勿使羸心量病輕重而制之肝病入肺無

異前也

脾病入肺

脾風入肺

癢嗽生瘡在腦及頭面疥癩等瘡



脾氣入肺

或噎疾膈氣上喘瘦背胛中妨

脾熱入肺

惡腫多患膿血疥癩是也

脾冷入肺

反胃嘔吐胃中疼心饒吐稀痰

脾虛入肺

皮膚白色搔痒欠嘔等是也

右件諸病候其脈量輕重灸之除虛不灸餘並灸四

支不妨藥治

臟腑相入第四

脾病入胃

脾風入胃

胃中熱惡心喫飯無味鼻中覺香氣吐甜水

脾氣入胃

胃中妨悶喫食卽脹滿妨勿食白麵食卽發脹滿

脾熱入胃

喫水多心熱面目黃色欠不瘥成三消之病



脾冷入胃

好吐酸水不欲食心中痛久而成反胃吐也

脾虛入胃

好呵噫時時心悶欲食不喜食來欠多

右上諸病除虛不灸餘並灸四支須灸脾俞差但依

病當量之胃俞當第十二椎兩邊二寸二分是也

腎病入膀胱

腎風入膀胱

小便無度頭旋惡心眼昏腳痠疼

腎氣入膀胱

膀胱夾臍及背脊兩脇妨痛極成結氣

腎熱入膀胱

小便難赤目睛痛皮膚寒頭痛

腎冷入膀胱

遺溺氣腰痛白蟲蛭蟲帶下

腎虛入膀胱

令人無力房事不興腦轉耳鳴

右上諸病當灸腎俞及膀胱俞在第十九椎兩邊二



寸二分量老少衰弱兼治之臨時而制

心病入小腸

心風入小腸

腸鳴時激痛小便秘瀝頭項痛

心氣入小腸

令人臍下疔痛赤白痢下秘澁難痛

心熱入小腸

令人渴血熱悶煩痛腸中如執湯不安

心冷入小腸

令人洩水穀不化臍中疔痛不知無計

心虛入小腸

令人神魂狂亂恍惚妄見多語陶攪

右上諸病當灸小腸俞第十七椎兩面二寸二分并

灸心俞第五椎兼治之無妨量老少衰弱臨時制

之胃中之病亦相透得病因種種不同述難盡

肺病入大腸

肺風入大腸

腸中宛轉間不欲食食即吐清冷水

肺氣入大腸

腸中痛不已成妨悶作聲脹滿不食

肺熱入大腸

令人糞色黃稀無度而不堪近

肺冷入大腸

令人腸中水穀不化名爲水痢瀉

肺虛入大腸

令人面色白胞內枯瘦雞皮有鱗

右上諸病當灸大腸俞夾第十六椎兩邊二寸二分

亦須服藥

肝病入膽

肝風入膽

常吐黃水爪甲及面並帶青色項痛

肝氣入膽

膽脹滿左脇下痛并膊脇中痛

肝熱入膽

目赤痛嗜驚叫呼面色赤惡罵無度

肝冷入膽

不欲食茶吐酸水左脇第五肋中妨

肝虛入膽

嗜怕懼不安饒淚哭泣面色青

右上諸病當灸膽俞夾第十椎兩面二寸二分老少

衰弱斟酌之病有風氣相和冷熱相和風冷相和

熱氣相和並虛而得也因虛而風熱氣展轉通入

臟腑相薰成久而不醫遂重難療輕而易差便曰

良醫有重者而難痊謂之小手此蓋爲自不識病

源養之成重非醫之過也針有一月之功灸有終

身之效藥通於六腑丹石通骨大而言之藥治六

腑之病灸治五臟之病五臟主皮筋骨血其方內

有藥重處用藥一件爲治應藥脈流行無非灸道

而實貫之達者思之

明臟腑應五臟藥名第五 古人處方立法本自不

同藥不執方旋爲加減量老少虛實斟酌服之無

不痊愈

心風宜服疎冷藥 論藥性炮炙製度各名開具在後

地骨皮 龍骨 青黛 升麻 牛黃 梔子

大黃 知母 瓜萆 黃連 人參 空青

生地 犀角 黃芩 右爲細末温水調食遠服

心氣宜服疎熱藥

黃芪 當歸 芍藥 桂心 吳茱萸

蒼朮 陳皮 前胡 柴胡 遠志

人參

茯苓

大黃

食鹽

戎鹽

右爲末生薑煎去渣不拘時溫服

心熱

原缺

心冷

原缺

心虛

原缺

肝風

原缺

肝氣

原缺

肝熱宜服次冷藥

秦皮

石決明

薯蕷

百合

黃芩

生地

黃連

天冬

萎蕤

桔梗

芍藥

芒硝

右爲末蜜丸如梧桐子大每服三十九丸溫茶食後服



肝冷宜服熱藥

大腹 檳榔 肉蔻 吳茱萸 桂心 橘皮

柴胡 前胡 鼈甲 藜蘆 姜屑

右為末蜜丸梧子大三十九米飲湯空心服

肝虛宜服溫補藥

白芍藥 枳殼 黃芪 吳茱萸 五茄皮

赤茯苓 木通 遠志 五味子 人參

為末生薑去渣不拘時溫服

右上諸藥量病輕重製之

肺風宜服踈冷藥

桔梗 欬冬花 升麻 黃芩 梔子 芍藥





萎蕤 麥門冬 百合 茯苓 括蕒 薯蕷

黃芪 加薑煎去渣食後溫服

肺氣宜服疎藥

知母 茯苓 人參 丹參 貝母 猪牙皂

紫苑 藁本 黃耆 百合 大棗 葶藶

防已 杏仁

為細末煉蜜為丸梧子大每服二十九熱水食遠服

肺熱宜服疎藥

棗根皮 薯蕷 犀角 通草 百合 黃連

欵冬花 梔子 茯苓 桔梗 杏仁 秦芫

麥門冬 右煎去渣食遠溫服



肺冷宜服平藥

黃芪 人參 茯苓 五味子 芒硝 山萸肉

防已 枳椇 柴胡 澤瀉 射干 百合

為粗末生姜煎去渣食遠温服

肺虛宜服温冷藥

欵冬花 貝母 升麻 百合 桔梗 麥門冬

五味子 菴蓉 大黃 黃連 人參 五茄皮

地骨皮 茯苓 為末蜜丸如梧子大熱水食遠服

右上諸藥臨時候脈處其方隨時消息

脾風宜服疎藥

仙靈皮 橘紅 人參 姜屑 升麻 黃芩



白朮 五粒松疑 犀角 桂心 羚羊角

為末熟水酒各半食前調服

脾氣宜服疎藥

前胡 大黃 荆三稜 鱉甲 枳壳 橘紅

桔梗 蒼朮 吳茱萸 蜀椒

為末蜜丸每服三十九薑湯食遠服

脾熱宜服疎冷藥

升麻 黃芩 桔梗 通草 百合 麥冬

桑白皮 芍藥 萎蕤 欵冬花 秦艽

右煎去渣食前溫服

脾冷宜服疎藥



姜屑 附子 桂心 吳茱萸 白朮 茯苓

大黃 澤瀉 橘紅 赤芍 防葵 干姜

為末酒糊丸梧桐子大二十九丸米湯食前服

腎風宜服熱藥

黃芪 地骨皮 茵陳 石斛 兔絲子 鹿茸

葶藶 戎鹽 姜屑 桂心 石楠 為末蜜

丸加酒糊梧桐子大每服三十丸温酒食前下

腎氣宜服鹹熱藥

吳茱萸 桂心 戎鹽 鹿茸 菴蓉 磁石

石鹽 禹餘糧 鐘乳粉 硃砂少許 夜明砂

為細末酒糊丸梧桐子大二十九丸鹽湯食前下



腎熱宜服踈冷藥

梔子 大黃 石膏 硝石 甘草 葛根

麻黃 黃連 括蕪 芍藥 滑石 麥門冬

為粗末水煎去渣微熱食遠服

腎冷宜服毒熱藥

附子 干姜 牛膝 杜仲 天雄 草薺

磁石 萼撥 吳茱萸 黃芪 骨碎補

鹿茸 為末煮糊丸如梧子大三十九空心淡酒下

腎虛宜服熱補藥

天雄 鹿茸 兔絲子 菝葐 甘草 芎藭

當歸 枳壳 芍藥 草薺 吳茱萸



爲末水酒煮糊丸梧子大三十九丸鹽湯下

右諸件藥以意應五臟六腑風冷熱氣虛損量病應藥脩合炮製精細詳審旋爲加減用之如神夫良醫處治用藥變異應時無以爲定量病與藥合得復常隨其宜製之無施不克方分等差亦時製之但稟藥性兼識病源而不錯也凡藥有州土採取皆有時節用有新陳擣煉合和服一切知名爲良醫也又識會陰陽之體行年本命旺相生氣禍害絕命福德天醫病之淺深量而制也是良醫知病與藥

臟腑成敗第六

五臟死

內照法

五



心絕一日死

何以知之肩息喘迴視遲口如魚口死矣

肝絕八日死

何以知之面青但伏視而不見泣出如水不止

肺絕三日死

何以知之但日張氣出而短鼻色黑

脾絕十二日死

何以知之臍滿泄痢不覺出足腫

腎絕四日死

何以知之齒面黑目中黃腰中欲折

自汗如流水

五體敗

骨絕五日死

何以知之脊痛腰中重不能翻覆

肉絕六日死

何以知之舌腫溺血大便赤濇也

筋絕九日死

何以知之手足爪甲青叫呼罵而死

脈絕三日死

何以知之口鼻張氣但出而短者死

腸絕六日死

何以知之髮直如麻乾曲身不得者死

五證死

肉及足卒腫一證

面腫蒼黑肝敗不治一日死

眼枯陷二證

手掌并缺盆骨滿心敗一日死

聲散鼻張三證

脣反無理肺敗不治五日死

脣騫齒露四證

臍腫滿者脾敗不治十二日死

氣喘語遲五證

陰陽腫不起腎敗三日死

五色死

面赤目青死

面青目黃死

面黃目黑死



面白目黑死

面黑目青死

五聲死

氣聲絕腹脹如鐵脾絕死

妄語錯亂神去死

語聲散魄去身無肺死

語聲高魂去身無肝死

長吟呻志去身無腎死

五體死

重嘔吐一體死

足重心腫二體死

手足甲青二體死

腳爪黑四體死

膝大如升五體死

五竭

髮直如麻是血竭

齒燥如熟小豆骨竭



足爪甲青筋竭

鼻張氣促出氣竭

耳鼻唇焦黑肉竭

五傷死

五傷脈不療

房事無度傷腎

傷腎尺脈如屋漏解索雀啄彈石

食飽醉卧傷脾

傷脾右關如鰕遊鷄足踐地魚翔

言無多寡傷心

傷心左寸如斷索雀啄屋漏

嗜食醎熱傷肺

傷肺右寸屋漏之狀亦如彈弦之狀

用力無度傷肝

傷肝左關如繫弦之狀

五不稱脈

脈大而息細死

息大而脈小死



大人脈如小兒脈死

小人如大人脈死

熱病而脈沉死

五視死

病人目上看人者死

病人下看人者死

病人目看斜者死

病人目直視者死

病人無睛光者死

凡辨生死之法但人改常者即死矣色聲心性但一改

常即死矣



南京中医药大学图书馆版权所有

夫人者稟於天地法於陰陽吐納之氣是也以陰陽之氣造化之內而運者卽手足是也興動吹變須會逆順若逆則五氣相反若順則五氣相生然以五氣之中則主五臟之內稟五氣非但人身瓦礫草木悉同於此藥性方術亦復如之然知之鮮矣以圖之於象合物會之刻心思惟察深理於皮骨之內露五臟焉

按圖今佚

按此卷原刻訛脫不可讀今檢內經諸書畧爲釐正如右而差錯仍多無書可據未敢輒改錢塘胡氏百名家書格致叢書兩書中有華佗內照圖內照經各一卷愧未得見也學海又記

一、醫書大綱... 學... 文...

二、醫書大綱... 書... 中... 內... 照... 法...

三、醫書大綱... 書... 中... 內... 照... 法...

四、醫書大綱... 書... 中... 內... 照... 法...

五、醫書大綱... 書... 中... 內... 照... 法...

六、醫書大綱... 書... 中... 內... 照... 法...

七、醫書大綱... 書... 中... 內... 照... 法...

八、醫書大綱... 書... 中... 內... 照... 法...

九、醫書大綱... 書... 中... 內... 照... 法...

十、醫書大綱... 書... 中... 內... 照... 法...

皖南建德  
周氏校刊



南京中医药大学图书馆版权所有