

脾胃部



杭州圖書館藏  
◎

醫學綱目卷之二十五

江氏藏書

脾胃部

大法

積塊癥瘕

婦人血積

胎前產後積

息積

丹不能作塊成聚塊乃有形之物痰與食積死無能聚宜醋煮海石醋三稜莪朶桃仁紅花五靈脂附子之類石城白术湯下之瓦龍子能消血塊又能消瘀

降火消食積食積即瘀也行死血血塊去後須大補之

石城痰積有塊可用洗滌垢膩又能消食積塊在皮裏膜外須用補氣香藥開之兼二陳湯加補氣藥先須斷厚味凡積病不可用下藥徒損真氣病亦不退當用消積藥融化開則自消

垣治積要法

許學士云大抵治積或以所惡者攻之所喜者誘之則易愈如礪砂水銀治肉積神麴麥蘖治酒積

水蛭蟲蟄治血積木香換榔治氣積牽牛甘遂治水積雄黃膩粉治痰積礞石巴豆治食積各從其類也若用羣隊之藥分其勢則難取効須要認得分明是何積聚兼見何證然後增加佐使之藥不爾反有所損要在臨時通變也

治積當察其所痛以知其病有餘不足可補可瀉無逆天時詳臟腑之高下如寒者熱之結者散之客者除之留者行之堅者削之強者奪之酸以更之苦以瀉之全真氣藥補之隨其所積而行之節飲食慎起居和其中外可伸必已不然遽以大毒之劑攻之積不能除反傷正氣終難以也醫者可不慎歟

諸積皆本於喜怒傷臟而陰虛陰既虛矣則風雨襲陰之

虛病起於上而生積清濕襲陰之虛病起於下而成積詳見

針灸

潔古之法補虛之

潔壯人無積虛人則有之皆由脾胃怯弱氣血兩衰四時

爲主

有感皆能成積若遽以磨堅破結之藥治之疾似去而人已衰矣乾漆硇砂三稜牽牛大黃之類得藥則暫快藥過則依然氣愈消疾愈大竟何益哉故善治者當先補虛使血氣壯積自消如滿座皆君子則小人自無容地也不問何臟先調其中使能飲食是其本也

因鬱成積丹溪之法補中帶磨積爲主  
丹有婦人三十歲因哭子至半年後胸痞有塊如杯飲食大減面淡黃慘黑若不勝衣六脈弦細虛濶至日晡後則發寒熱予察其事勢已急補瀉兼用以補中益氣湯隨天氣寒暄加減法與東垣痞氣丸相間服方見五積門食前用湯食後用丸常令湯多於丸些少如此近一月寒熱皆退食亦稍進又以丸用湯相等服之至第二月以後忽一夜大發寒熱至天明熱退胸中之塊如失至晚手足下半節皆腫遂停藥三五日後忽一夜手足之腫如失至天明

八醫星綱卷三

二

胸中之塊復有比如前覺小一量遂以二陳湯加桔梗白术枳實調理半月而安次年復生一男一婦人四十餘面白形瘦性急因大不如意三月後乳房下貼肋骨作一塊漸漸長大掩心微痛脇悶飲食減四之三每早覺口苦兩手脈微而短濶予知其月經不來矣爲之甚懼辭勿與治思至夜半其婦尚能出外見醫梳粧言語如舊料其尚有胃氣遂以麥木歸芎佐以氣藥作大服一晝夜與四次外以大琥珀膏貼塊上防其長經一月餘服補藥百餘貼食及平時之半仍用前藥又過一月脈氣漸充又與前藥吞潤下丸百餘貼月經不及兩月而至濶脈減五分之四時天氣熱意其經行時必帶紫色仍與前補藥加醋炒三稜吞潤下丸以抑青丸十五粒佐之又經一月忽報塊已消及大半月經及期尚欠平時半日飲食甘美如常但食

肉則覺不快予令止藥且待來春木旺時又與區處至次年六月忽報一夜塊大比舊反加大半指脈界弦左畧怯於右至數日平和自言食飽後則塊微悶食行却自平予意有動心事激之間之果然仍與前補藥加黃芩炒黃連以少木通生姜佐之去三稜煎湯吞潤下丸外以琥珀膏貼之半月值經行而塊散此是肺金爲內火所燦木邪勝土土不能運清濁相干舊塊輸廓尚在者因氣血之未盡復也濁氣稍留舊塊復起補其血氣使肺不受邪木氣平而土氣正濁氣行而塊散矣 方提領年五十六丁丑年冬因飲酒後受怒氣於左脇下與臍平作痛自此以後漸成小塊或起或不起則痛痛止則伏面黃口乾無力食少吃此物便嘔此味轉惡風寒脈之左大於右弦濤而長大率左甚重取則全弦此得熱散太多以致胃氣太傷

人醫學綱目卷二五

三

陰血下衰且與和胃湯以補胃氣滋養陰血并下保和丸助其化粧同胃實陰血稍充卻用消塊和胃湯方

人參  
錢三

白术  
半  
錢

陳皮錢

芍藥  
二錢

右三法補氣血藥爲主磨積出入佐之皆補多於磨乃氣血虛甚而有積塊之法也

飲食酒

王郎心痛膈有塊與

白术  
錢

青皮一錢

芍藥

1

木通

川芎  
蒼朮各一錢

川芎

蒼术各  
錢

甘草

九

馮氏女年三十歲形瘦色嫩滋味素厚幼年曾踏雪嘗以

火烘鞋履以致濕熱上襲至廿五歲時口嘗吐清水吞酸  
醫用丁香等熱藥時止時作時仍服前藥至當年心痛  
智病有塊吃飯卽吐些常出三之一遂與佐金丸廿四粒  
以姜湯下之與三十餘次全不進食予曰結已開矣且令  
止藥或口乾思飲止與半盞熟水間以青六丸與之雖困  
臥着床尤以絕藥爲害如此近四十日診其脈前後些微  
弦重取似濶輕取稍和至此弦脈漸添遂令與人參酒芍  
藥湯引金瀉木漸漸思食而苦於大便秘病家必欲行大  
黃予止之遂以生芍藥陳皮桃仁人參爲丸與之用蜜煎  
導大便行而食進調理半月而安

參芪丸卽佐金丸加人參一錢是也

盧子裕左脇下因瘡後食肉與酒而成塊

白术錢 柴胡一錢 荻苓錢 枳殼炒五分

醫學綱目卷五十五

人參五分

作湯下阿魏五保和廿抑青十與點十攻塊五

長垣朱郎因酒多年濕病脇上有塊腹滑泄小便黃

滑石兩 白术 三稜各六 陳皮五錢

黃連 猪苓各三錢

防風半錢 乾姜一錢

分七貼煎下保和丸二十

一丈夫肚左邊帶脇上有塊先吃匾食牛乳者成氣痛又  
因酒肉塊大如桃食減三分之二

滑石斛 白术四錢 陳皮 三稜三錢

蘿蔔子

連翹

黃芩一錢

甘草錢半

桃仁廿

枳殼

乾葛二錢

半

右分四貼水煎服

婦人脇下有塊大如掌脈濶時有熱此虛中有氣積先與補虛次與磨積藥

白芍

歸鬚四錢

陳皮

白术三錢

川芎

木通各一錢

甘草

甘草半錢

白水煎熱服

磨積藥

三稜醋煮一錢

枳實

青皮

桃仁各五錢

大黃各五錢

桂枝

海藻醋煮三錢

細末神麆糊丸如桐子大每服四十九

體虛有熱成積

世一孺人左脇下舊有塊漸長大脈弦而大稍數訥之近亦發熱食亦減倦怠先與補之次攻此塊

陳皮五錢

白术兩半錢

柴胡

歸頭

青皮各五錢

甘草一錢

木通三錢

醫學綱目卷五

五

右作八貼服

次與攻塊

青皮醋煮兩半錢

桃仁

三稜醋煮兩半錢

桂枝三錢

海藻醋洗三錢

醋調神麆糊丸爲九

一丈夫脇下有積塊內有痰熱汗不得泄兩脈大而散軟此體有虛

三稜五錢

白术

黃連各三錢

人參二錢

連翹

木通各三錢

川芎

桂錢

甘草五錢

水煎下保和丸

富小娘瘡後左脇下塊小便少

厚朴

柴胡各二錢

三稜

甘草五錢

木通五錢

白术六錢

青皮

甘草半錢

右食前熱服

下邳錢郎正月發沙因此脣邊有塊二枚發起則痛伏則不痛有時又隱痛自灸臍中脈甚弦右手伏重取則畧數此蘊熱因春欲汗解而氣弱不能自發爲汗復鬱又因食不節邪挾宿食所以成塊宜以保和二十溫中二十抑青十用白术木通三稜湯下

右十一法皆補藥與磨積相半兼服之前七法治飲食酒肉成積後三法治體虛有熱成積也

接之痛者消之

丹陳里長男廿七歲舊因飽食牛肉豆腐患嘔吐又不節飲食右脇下生一塊漸長今大如掌痛發則見痛止則伏其脈弦而數知此人必性急塊上不可按按則愈痛痛則必吐黃酸苦水詢之果然或作腎氣治予曰非也此足太陰有食積與濕痰

荔枝核炒去殼二山梔炒五箇枳實炒十山楂炒去殼五箇

醫學綱目卷五

六

茱萸炒枝九一方有人參

右細研急流水一盞蕩起煎沸入生姜汁令辣食前熱服與六貼吐二貼服四貼與此藥且止其痛郤與消塊藥

藥

半夏末六錢皂角六箇水煮取汁拌半夏末晒乾

黃連炒五錢

石城二錢另研

已上三件同爲細末以糖蜜膏爲丸如胡椒大

丹一婢色紫稍肥性沉多憂年近四十經不行三月矣小腹中有一氣塊初起如粟漸如炊餅子脈之兩手皆濶重取郤稍和試令按塊痛甚捫之高寸半遂與千金消石丸至四五次後忽自言乳頭黑且有汁恐是孕予曰非也濶脈無孕之理又與三五貼脈之稍覺虛豁予悟曰藥太峻矣令止前藥與四物湯倍白术佐以陳皮炙甘草至三十

貼候脈完再與消石丸數次忽自言塊消一量便令莫服  
又半月經行痛甚下黑血半升內有如椒核者數十粒而  
塊消一半又來索藥以消餘塊予曉之曰勿性急似開矣  
不可又攻若次月經行當消盡矣次月經行下少黑血塊  
又消一量又來問藥予曰且守禁忌至次月又消盡已而  
果然大凡攻擊之藥有病則病受之病邪輕而藥力重則  
胃氣受傷夫胃氣者清純冲和之氣也惟與穀肉菜果相  
宜蓋藥石皆偏勝之氣雖參芪革爲性亦偏況攻擊之藥  
乎此婦胃氣弱血亦少若待塊盡而去藥胃氣之存者幾  
希矣

溫藥成塊者去之

一婦人年五十五歲形氣俱實富而神勞味厚性急常經  
水過多醫每用瀆藥止後病氣痛脅腹共有積塊大小十  
三枚遇夜痛甚着床累月飲食雖減應接家事如故其脈

一 藥草綱目卷三

十一

兩手皆澀而弱此因屢用瀆藥致敗血積聚不行故爾時  
三月間用蜀葵根煎湯再煎人參白术陳皮青皮甘草稍  
牛膝成湯入玄明粉少許研桃仁調熱飲之服至二貼腹  
痛下塊一枚再并煎服又下一枚時以病久血耗不敢  
再取塊告技窮而歸後想此症患病雖重其形質尚可受  
藥但當去葵根玄明粉其後塊漸消而病安  
一女子年廿一歲累因食傷胃脘有塊隨氣上塞咽中問  
之又因食煨鹽配粥與

隨氣中上塞咽者吐之

白术一錢半

半

陳皮一錢

五

半夏一錢

一

桔梗一錢

二

青皮一錢

半

木通一錢

五

甘草一錢

三

生姜二錢

二

煎服一二次病遂平復再與前藥半月後加桔梗煎一  
服令其吐吐出痰積遂愈

氣結者

子和息城司侯聞父死于賊乃大悲哭罷便覺心痛日增

暴積急去之  
不已月餘成塊狀若覆杯大痛不堪藥皆無功議用燔針  
炷艾病人惡之乃求治于戴人戴人至適巫者在其傍乃  
學巫者雜以狂言以謔病者至是大笑不忍回面向壁一  
二日心中結硬皆散戴人曰內經言憂則氣結喜則百脈  
舒和又云喜勝悲內經目有此法

丹呂宗信年六十素好酒八月間因暑熱中得疾兩足令  
過膝上腕有塊如掌牽引脇痛不可眠臥飲食減半卻不  
渴已自服生料五積散三貼予脈之六脈俱沉濇而小按  
之不爲弱皆數而右爲甚大便如常小便赤色遂用大承  
氣湯減大黃之半而熟炒加黃連芍藥川芎乾葛甘草作  
湯下瓜萎仁半夏黃連貝母丸至十二貼足冷退至脛塊  
減半遂止藥至半月飲食復舊諸症悉除

唐柳宗元慕救死方元和十二年二月得腳氣夜半痞絕

脇有塊大如石且死因太寒不知人三日家人號哭榮陽  
鄭詢美傳杉木湯服半食頃大下三次氣通塊散其方用  
杉木節一大升橘葉一大升無葉以皮代之大腹枳榔七  
箇合搗碎之童便三大升共煮取一升半分二服若一服  
得快利停後服

肘治卒暴癥腹中有物堅如石刺痛牛膝一大把并葉酒煮飲  
之

外治卒暴癥腹中有物堅如石痛欲死取蒴蘚根一小束  
洗瀝去水細擘以酒二升漬三宿煖溫服五合至一升日  
三若欲速得服於熱灰中溫令藥味出服之此方無毒神  
効

右暴積急去條四方如塊除後必用補劑以救其受攻  
之傷也

久積經

海萬病紫苑丸療臍腹久患痃癖如梳大及諸黃病每地

氣起時上氣衝心繞臍絞痛一切蟲咬十種水病十種蟲

癰不知年歲晝夜不安夢與鬼交頭多白晝或哭或笑如

鬼魅所着腹中生瘡腹痛服之皆効

月露不通或腹如懷孕多血天陰卽發又治十二種風癩  
癰不知年歲晝夜不安夢與鬼交頭多白晝或哭或笑如  
鬼魅所着腹中生瘡腹痛服之皆効

紫苑

去苗土

吳茱萸

湯洗七次焙乾

菖蒲

柴胡

去鬚根

厚朴

姜制各一兩

桔梗

去皮去根

茯苓

皮去

皂莢

子灰去皮

桂枝

去目及閉口

乾姜

炮去皮膜

黃連

去鱗去皮

蜀椒

微炒出汗

巴荳

去皮膜內油炒

人參

去芦各五錢

川烏

炮去皮三錢

加羌活

獨活

防風

各二兩

右爲細末入巴豆研勻煉蜜丸如桐子大每服三丸漸  
加至五丸七丸生姜湯送下食後臨臥服有孕者不宜

服具引于後

痔漏腸風酒下 赤白痢訶子湯下 膽血痢米飲湯

下 壘傷血悶四肢不收酒下 蟑虫咬心枳榔湯下

灰甘草湯下 一切風升麻湯下 寸口虫枳榔湯下

氣噎噎荷葉湯下 打撲傷損酒下 中毒掃蕎

霍亂乾姜湯下 咳嗽杏仁湯下 腰腎痛豆淋酒

下 陰毒傷寒溫酒下 吐逆生姜湯下 飲食氣塊

麪湯下 時氣井花水下 脾風陳皮湯下 頭痛水

下 心痛溫酒下 大小便不通燈草湯下 因物所

傷以本物湯下 吐水蘋湯下 氣病乾姜湯下 小兒

兒天弔風搐防風湯下 月信不通紅花酒下 婦人腹痛川

芎酒下 懷孕半年後胎漏艾湯下 有子氣衝心酒

下產暈痛溫酒下 血氣痛當歸酒下 產後心痛

腹脹滿豆淋湯下

難產益智湯下 產後血痢當歸

湯下 赤白帶下酒煎艾湯下

解內外傷寒粥飲下

室女血氣不通酒下

子死腹中藥子湯下 又治

小兒驚癇大小顛狂一切風及無孕婦人身上頑麻狀

如虫行四肢俱腫呻吟等疾

楊駢馬患風氣衝心飲

食吐逆遍身枯瘦日服五丸至二十日瀉出肉塊如蝦

瓣五六枚白膿二升愈

趙侍郎先食後吐目無所見

耳無所聞服五十日瀉出青蛇五七條四寸許惡膿三

升愈

王氏患大風病眉髮墮落掌內生瘡服之半月

瀉出癩虫二升如馬尾長寸許後愈

李靈患肥氣病

日服五丸經一年瀉出肉鱉二枚愈

黃門卒中風病

發時服藥泄出惡膿四升赤黃水一升一肉虫如亂髮

醫學綱目卷五

十

愈

李知府妻梅氏帶下病七年血崩不止骨痿着床

日服五丸至十九十五丸取下膿血五升黃水一升肉

塊如鷄子狀治愈一切萬病如神惟有孕者不宜服

局溫白丸治心腹癆塊久癥積聚大如杯碗黃疸宿食朝

起嘔吐支滿上氣時時腹脹心下堅結上來捨心傍攻兩

脇十種水氣八種痞塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋疾九

種心痛積年食不消化或連年瘧疾不瘥及療一切諸風

身體頑麻不知痛痒或半身不遂或眉髮墮落及療七十

二種風三十六種遁尸疰忤及顛癇及婦人諸疾斷續不

生帶下淋瀝五邪失心憂愁思慮飲食減少月水不調及

腹中一切諸疾連年羸瘦困憊或歌或笑如鬼所使但服

此藥無不除愈卽前萬病紫菀方減羌活獨活防風

萬病丸療八種痞病五種癆病十種症忤七種飛尸十二

種蠅毒五種黃病十二種瘧疾十種水病八種大風十二

種渾升風入頭眼翳膜漠漠及上氣咳嗽喉中如水雞聲不得臥飲食不作肌膚五臟滯氣積聚不消壅閉不通心腹脹滿及胸背皺脹氣結四肢流入胸腹又治心膈氣滿時定時發十年二十年不瘥五種下痢疳虫疥虱白諸虫上下冷熱久積痰飲令人多眠睡消瘦無力陰入骨髓便成漏疾身體氣腫飲食嘔逆腰腿痠疼四肢沉重不能久行久立婦人因產冷入子臟臟中不淨或閉塞不通包中瘀血冷滯出流不盡時時疼痛爲惡或因此斷產并小兒赤白下痢及狐臭耳聾鼻塞等病服此藥以三丸爲一劑不過三劑其病悉除說無窮盡故稱萬病丸

牛黃

細研

黃芩

去芦

芫花

醋炒

禹餘糧

研飛

紫菀

雄黃

研飛

芎藭

去芦

人參

去芦

蒲黃

炒微

麝香

研

當歸

去芦

桔梗

去芦

黃連

瀉

大戟

剉炒

乾姜

炮

防風

去芦

巴豆

去皮心

朱砂

研飛

犀角

鏟

前胡

去芦

茯苓

去皮粗

細辛

苗去

葶苈

炒

川椒

去目及閉口者微炒

茯苓

去皮

桑白皮

炒

蜈蚣

一十二節去頭足炙

肉桂

去皮粗

茺蔚

枝入大

甘遂

各一兩同炒黃色去頭足

石蠍

去頭尾炙四寸

右爲細末入研藥勻煉蜜爲丸如豆大若一歲已下小兒有疾者令乳母服兩小豆大亦以吐利爲度近病及

卒病多服積病久疾卽少服常服微溏利爲度卒病欲死服三丸取吐利卽瘥卒中惡口噤服二丸漿水下利卽瘥五症鬼刺客忤服二丸男女邪病歌哭腹大姪娠者服二丸日三夜一間食服之蠅毒吐血

腹如刺服二丸不瘥更服

瘡病未發前服一丸未瘥

更服

諸有痰飲者服三丸

冷癬日三服每服三丸

皆間食常令微溏利

宿食不消服二丸取利

癥瘕

積聚服二丸日三服

拘急心腹脹滿心痛服三丸

上氣嘔逆胸膈滿不得卧服二丸不瘥更服

大痢服

二丸日二服

痘蠱服二丸或一丸如杏仁大和醋二

合灌下部中

水病服三丸日再服間食服之瘥止

人弱卽隔日服

頭痛惡寒服二丸覆取汗

傷寒天

行服二丸日三服間食服之

小便不通服一丸不瘥

明日更服

大便不通服三丸又內一丸下部中卽通

耳聾停急以綿裹如棗核塞之

臭鯈服一丸

瘡

腫疔腫破腫內一丸如麻子大日一傅之赤根自出

犯疔腫血出以猪脂和金有孔則內孔中瘻

癰瘡以

醋泔洗訖取藥和猪脂傅之

漏瘡有孔以一丸內孔中和猪脂傅上

痔瘡全綿筋上內孔中卽瘻

瘰癧

以醋和塗上瘻

癰瘡以布揩令汗出以醋和金上日

一易瘥

胸背腰脇腫以醋和傅腫上日一易又服二

丸

諸令瘻積年不瘥者以醋和塗之

惡利以一丸

內瘻孔中卽瘻

蝮蛇蟄以少許內螫處若毒入腹心

煩欲絕者服三丸

蜂蟄以少許傅之瘻

婦人諸疾

胞衣不下服二丸

小兒驚癇服一丸如米許以塗乳

令小兒嗍之看小兒大小加減

兒客忤服一丸如米

大和乳塗乳頭令嗍之以意量之

蝎蟄以少許傅之

瘻之卽瘥

小兒乳不消心腹脹滿服一丸如米許塗乳頭令

羅乾柿丸取虛實積下膈甚妙

朱砂

研爲末

沒藥

研爲末

猪牙皂角

去皮研爲細末

砂

研爲末

京三稜

炮爲末

輕粉

一錢

乾姜

炮爲末

乾漆

炒烟燼爲末

京三稜

炮爲末

輕粉

一錢

青礞石

煅爲末

巴荳

三十粒去皮

膜醎煮十沸

水銀

一錢鉛一錢結炒乾

熱積寒之消之

右件各研勻軟飯和爲丸如棗莖大煎柿蒂湯冷下三五丸加減用婦人有胎不可服

小腸移熱於大腸爲久癬爲沉

全文見診病傳變

千消石丸治癩瘕

硝石

六錢

大黃

八錢

人參

甘草

各三錢

右各爲末先將硝黃末以三年苦酒先煎候將乾却用

參甘二末和勻爲丸每三十九米湯下四日一服候下

如雞肝或如米泔赤黑色等効下後忌風冷

羅醋煮三稜丸治一切積聚不拘遠年近日治之神効

入醫學綱目卷五

三

京三稜

四兩醋煮透

川芎

二兩醋煮

大黃

半兩醋煮過

右三味同爲末醋糊爲丸如桐子大每三十九溫水下

不拘時病甚者一月効小者半月効

羅神功助化散車治男子婦人腹中痞塊不拘氣血食積所成此方之妙不可盡述

地扁蓄

五錢

瞿麥蕙

五分

大麥蘖

五錢

神曲

二錢半

沉香

一錢半

木香

一錢半

甘草

五分

大黃

二兩

右爲細末淨依分兩和勻男以甘草淡竹葉二味等分煎湯及無灰酒同調服酒多於湯婦人用紅花燈心當歸等分煎湯及無灰酒同調服酒多於湯忌油膩動氣之物及房事一月藥須用黃昏服大小便見惡物爲度神妙非常誓不輕傳匪人

聖散子治達年積塊及婦人乾血氣

硝砂六兩大黃八兩

炮

兩

麥蘖六兩

乾漆過燒

六

兩

一

各一

如婦人乾血

過燒

裏積熱  
消之

右爲細末每服三錢溫酒調下仰臥此藥只在心頭至天明大便如魚腸小便赤爲驗取出並無毒有神効小兒用一錢十五已上五錢空心服之更効

寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血泣不得注於大經血氣稽留不得行故宿昔而成積矣

全文  
諸痛

海紅丸子治大人脾積氣滯胸膈滿悶面黃腹滿脹四肢無力酒積不食乾嘔不止脾連心胸及兩乳痛婦人脾血積氣諸般血癥氣塊及小兒食積骨瘦面黃肚脹氣急不嗜飲食漸成脾虛不拘老少並宜服之

▲醫學綱目卷三五

四

京三稜五斤

水浸軟切作小片子分

蓬术五斤

乾姜二斤

陳皮五斤  
揀淨

青皮五斤

炮胡椒三斤

乾姜二斤

陳皮五斤  
揀淨

右研六味同爲細末醋糊爲丸桐子大礬紅爲衣每三十丸食後姜湯吞下

羅雞爪三稜丸治五臟痃癖氣塊

雞爪三稜石三稜

京三稜

木香

青皮五斤

去白各半兩

硝砂三錢

木香

肉荳蔻各一

兩

右爲細末生姜汁麪糊爲丸桐子大生姜湯送下  
硝砂煎丸消積磨塊一切凝滯

黑附子二枚各重五錢

炮裂去皮臍割作苓子

以上者

木香三錢

草薢一

兩

隔一兩隔

硝砂三錢

開納在龕內火上

熬乾

右將飛過硝砂木封在附子罐內却用剜出附子末蓋

口用和成白麪裹約半指厚慢火灰內燒勻黃色去麪  
用木香等爲細末卻用元裏附子熟黃麪爲末醋調煮  
糊爲丸如桐子大每服十五丸至三十九生姜湯送此

藥累有奇功

本治癥丸治丈夫女人小兒年深日近沉積痕塊面色青  
黃時上捨心吐水吞酸舌生白沫婦人積年月經不調漸  
成血氣或血蠱塊中焦之間覆如杯梳連年累月漸成瘦  
瘠寒熱往來一切脾胃受寒久不瘥愈之疾並皆治之

巴荳

五兩

去膜

蓬术

三兩

醋

京三稜

三兩

醋

厚朴

二兩

製

丁香皮

二兩

木香

半兩

丁香

半兩

厚朴

二兩

石菖蒲

二兩

良姜

一兩

豆蔻

一兩

川牛膝

一兩

香附子

四兩

炒

石蓮子

肉兩

薏苡仁

一兩

史君子

三兩

去壳

醫學綱目卷三

五

右爲細末稀麪糊爲丸如棗荳大積年癥瘕成塊者第一  
服用熟水下二十丸自後每日三丸五丸更量虛實  
加減與之五日去盡積塊若近脾胃有積者每服五丸  
米飲吞下一服取効婦人血氣成塊及血瘕每服二十  
丸用蘇木酒童子小便各一半煎五七沸令溫空心吞  
下自後每日用溫酒下三丸其血塊逐旋消從大小便  
去盡自知小兒耽重腹痛不能忍日夜叫喚百藥不救  
者陳皮湯下七丸立効諸虫皆宜下嘗服或白湯與酒各半  
吞十丸立効如神一切咽塞心下硬痛皆用棗湯下五  
丸不拘時候

玄胡索

當歸

青皮去白

雄黃飛

廣茂炮

木香

枳榔

京三稜炮各四兩

右爲細末入雄黃末水糊爲丸桐子大生姜湯下

荆蓬煎丸破癩癖消癥塊冷熱積聚脇膈症悶通利三焦

升降陰陽順氣消食

京三稜二兩酒浸冬日夏一日已上二味同以去皮巴荳二十箇銀器內炒令黃色不用巴荳

枳殼炒一廣茂二兩醋浸冬日

日夏一日已上二味同以去皮巴荳二十箇銀器內炒令黃色不用巴荳

木香去根

青皮去白

茴香炒微

枳榔各一

右爲細末水糊爲丸或豆大每服三十丸生姜湯下

丹潤下丸治積塊方見

世二賢散消積塊進食

橘紅一斤

甘草四兩

鹽半兩

未

右用水二四碗從早煮至夜以爛爲度水乾則添水晒

乾爲末淡姜湯調下有塊者加姜黃半兩同前藥煮氣滯加香附二兩同前藥煮氣虛者加沉香半兩另入噤口痢加蓮肉二兩去心另入

右自久積緩除條至此一十六方皆純是磨積之劑必

用補氣血藥相兼服之純用之致死乃醫殺之也謹之

驚風成塊者妙應丸加川山甲炒鱗甲燒各三錢玄胡索

蓬术各四錢每五十丸加至七十九以利爲度妙應丸即控涎丹方

門見痰

丹茶癖喜吃茶及吃乾茶者

石膏

升麻

爲末沙糖調服

酒積方累効

烏梅肉

四兩

枳實

半兩

半兩

砂仁半兩

杏仁三錢

巴霜一錢

黃連宿一

酒浸一

一兩

茶積

驚積

重積

右爲末蒸餅丸菉草大每八丸白湯送下

褚澄傳云澄善醫爲吳郡太守百姓李道念以公事到郡

澄見謂曰汝有重病答曰舊有冷病至今年久衆醫不瘥

澄爲診曰汝病非令非熱當是食白滯雞子過多所致令取蒜一升煮食吐一物如升涎累之開看是雞雛羽翅瓜

距具足能行走澄曰此未盡更服餘藥又吐得如向者有十三頭而病都瘥

衍有人病心腹憊煩彌三歲診曰腹有蠶誤食髮而然令餌雄黃一劑少選吐一蛇如拇指無目燒之有髮氣乃愈此殺毒虫之驗也

右二方吐蟲積之法也

丹治食積死血痰積成塊在兩脇動作腹鳴嘈雜眩運身熱時作時止

醫學綱目卷五

七

黃連

仁一兩半用柴葛益智同炒止用黃連

山梔

炒半兩

川芎

神曲

童便浸一兩半用黃連

桃仁

去皮一兩

三稜

各半兩並醋煮

香附

童便浸一兩半用黃連

山楂

各半兩

蘿蔔子

炒一兩半

右麵糊丸又方有青皮半兩白芥子一兩半炒

治脇痛有塊龍齒丸二錢半起料加姜黃桃仁各半

右蜜丸服

世小阿魏丸治脇下積塊

三稜

醋炙一兩

蓬术

醋製一兩

青皮

醋製二兩

胡椒

三錢

木香

兩一

麝香

分二

阿魏

半

右爲末醋煎陳倉米粉爲丸桐子大

子和菓園劉子平妻腹中有塊如瓢十八年矣經水斷絕

諸法無措戴人令一月之內涌四次下六次取去痰約一

二桶其中不化之物有如葵葉煮爛魚腸之狀涌時以木

吐下法

如意擇之覺病積如括漸漸而平及積既盡塊痕反壅如有子

塊部分

痰食氣

爲血積

潤下丸治痰積方見咳

血諸積

方

丹治塊在何部分 在中爲痰飲 在右爲食積 在左

阿魏丸去諸積

山楂

南星水角

半夏

同南星浸

麥芽

神麪

貝母各半

風化硝

連翹

阿魏

醋浸

瓜萎

白芥子各二錢半

蘿蔔子蒸一兩

石減

胡黃連

一方加香附蛤粉治嗽

右爲丸姜汁浸炊餅丸

一方加香附蛤粉治嗽

羅破積導飲丸治內有積塊堅硬飲食不消心下痞悶

木香

枳榔

陳皮去白

去白

青皮白

蜜臘綱目卷三十五

大

枳殼

炒熟

枳實

炒熟

廣茂炮

炮

京三稜炮

半夏

湯洗七次

神麪炒

麥蘖炒

炒

茯苓

乾姜

澤瀉

甘草炙各五錢

炙各五錢

牽牛頭末

錢

巴豆

三十枚去皮心膜

右爲細末入巴豆霜令勻生姜汁打麪糊爲丸如桐子大每服三十九溫姜湯送下食前

無小三棱煎治食癥酒痞血癥氣塊時發刺痛全不思食

積滯不消心腹堅脹疼逆嘔噫噫酢吞酸

京三棱

蓬木名四兩

芫花梗葉一兩去

右同入甕器中用米醋五升浸滿封器口以炭火煨令乾取出稜末將芫花以餘醋炒令微焦焙乾爲末醋糊

丸如棗豆大每十五丸生姜湯送下

羅神効五食湯丸取虛實積氣食鹽脹積塊水氣年深痞

痘並皆治之

大戟

括去皮

甘遂

半生各兩

猪牙皂角

生皮子去

胡椒

生研半兩

芫花

醋浸一宿取出炒各一兩

巴豆

去皮膜心搗煮

右件除巴豆杵羅爲末入巴豆再研勻水煮麵糊爲丸

如菜荳大每服五七丸氣實者十九夜臥水一盞入白

米白麪黑荳生菜豬肉各少許煎至半盞去渣候湯溫

下藥取下病忌油膩粘滑物婦人有胎者不可服

必効療癬取車下李仁微湯退去皮及並仁者與乾麪相拌搗爲餅如麪乾和淡水如常溲麪法作餅大小一如病人掌爲二餅微炙黃至熟空腹食一枚當大利如不利更食一枚或飲熱粥汁以利爲度若至午後利不止卽以醋飲止之利後當虛病未盡者量力一二日更進一服以病

盡爲限小兒亦以意量之不得食酪及牛馬肉等無不効

丹保和丸治食積酒積方見傷食

阿魏丸治肉積及飽食停滯胃壯者宜此脾虛者勿服

山楂

蘿蔔子

神曲

麥芽

陳皮

青皮

香附

各二兩

阿魏

一兩醋另

研

右炮餅丸

又方龍鬚丸加白鵝糞大能消食積或入保和丸

羅流氣丸治五積六聚癰瘕癖塊留飲

木香

川茴香

炒

青皮

廣茂炮

陳皮

白

蘿蔔子

炒

補骨脂

炒

草澄茄

砂仁

神曲

炒

麥蘖

炒

牽牛

一兩

檳榔

一兩

右爲細末麪糊爲丸如桐子大食後每服三十九細嚼

白菖蔻仁一枚白湯吞下

丹治血塊丸

海粉醋煮

三稜煮

蓬术

桃仁

右爲丸白木湯吞下

本主癥積滿腹諸藥不瘥者取白馬屎服之愈

世治腹中有塊猪腰子一雙切薄片木鱉子肉一兩與豬腰片相間縛定外用濕紙包火內煨熟取出去紙擂盆內搗如泥入黃連末和爲丸每服廿丸烏梅甘草湯吞下第二服廿五丸三服三十九漸加至以痛爲度大便利其塊自消有神効

難病有積有聚何以別之然積者陰氣也聚者陽氣也故處屬常聚無常處屬府

醫學綱目卷五

二

故積者五臟所生聚者六腑所成也積者陰氣也其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚者陽氣也其始發無根本上下無所留止其痛無常處故謂之聚故以是別知積聚也

五十五難○治聚法見末條

仲病有積有聚有聚氣何謂也師曰積者臟病也終不移聚者腑也發作有時展轉痛移爲可治聚氣者脇下痛按之則愈復發爲聚氣

素青脈之至也長而左右彈有積氣在心下支胠名曰肝

肝積青脈長定在左脇下

脾得之寒濕與疝同法腰痛足清頭脈緊是也

五藏生成篇

難肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不愈令人發欬逆脅瘻連歲不已以季夏戊己日得之何以言之肺病傳肝肝當傳脾脾季夏適王王者不受邪肝復欲還肺肺不肯受故留結爲積故知肥氣以季夏戊己日得之

六難

肝脈微急爲肥氣在脇下若覆杯虛實法

全文見治

心積面赤

實定在

素赤脈之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於食名曰心痺得之外疾思慮而心虛故邪從之

五藏生成篇

帝曰病

有少腹盛上下左右皆有根此爲何病可治否岐伯曰病

名曰伏梁帝曰伏梁何因而得之岐伯曰裹大膿血居腸

胃之外不可治治之每切按之致死帝曰然何以故岐伯

曰此下則因陰必下膿血上則迫胃脘生膈俠胃脘內滯

此久病也難治居臍上爲逆臍下爲從勿動亟奪

腹中論

云生當作出林註云

太素俠問作便胃

○王註

帝曰人有身體髀骨股脇皆腫環

臍而痛是爲何病岐伯曰病名伏梁此風根也其氣溢於大腸而着於肓肓之原在臍下故環臍而痛也不可動之

動之爲水溺瀆之病

同

醫學綱目卷五

主

難心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下久不愈令人病煩心以秋庚辛日得之何以言之腎病傳心心當傳肺肺秋適王者不受邪心復欲還腎腎不肯受故留結爲積故知伏梁以秋庚辛日得之

六難

心脈微緩爲伏梁在心下上下行時唾血

全文見治

素黃脈之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝

而虛定

女子同法得之疾使四肢汗出當風是也

五藏生成篇

疝當作痞字

難脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢

不收發黃疸飲食不爲肌膚以冬壬癸日得之何以言之

肝病傳脾脾當傳腎腎以冬適王者不受邪脾復欲還

肝肝不肯受故留結爲積故知痞氣以冬壬癸日得之

四

難六

脾脈微大爲痞氣腹累大膿血在腸胃之外

全文見治

肺積面  
白脈數  
而浮定  
在右脇

素白脈之至也喘而浮上虛下實驚有積氣在胸中喘而虛名曰肺痺寒熱得之醉而使內也

中華書局影印  
醫學叢書

浙寒熱喘咳發肺壅以春甲乙日得之何以言之心病傳肺肺當傳肝肝以春適王王者不受邪肺復欲還心心不肯受故留結爲積故知息奔以春甲乙日得之五十  
六難

**肺脈滑甚爲息實主氣**

i

腎積血素黑脈之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎痺口大實定在少腹得之沐浴清水而臥是也

**難腎之積**名曰**賁豚**發於少腹上至心下若豚狀或下或上無時久不已令人喘逆骨瘦少氣以夏丙丁日得之何以言之脾病傳腎腎當傳心心以夏適王王者不受邪腎復欲還脾脾不肯受故留結爲積故知**賁豚**以夏丙丁日

得之  
六難

醫學綱目卷五

卷

法 治 五 積

令人咳逆齶瘧連年不已

**厚朴**半兩 **黃連**七錢

**巴荳霜** 分五  
**川烏** 炮一

**皂角**去皮  
**一錢半**

昆布  
人參  
錢

右除茯苓皂角巴荳外

入和勻煉蜜丸如桐子大初服二丸一日加一丸二日  
加二丸漸加至大使微溏再從兩丸加服周而復始積

減大半勿服

右後積藥依此法服之春夏秋冬另有加減法在各條

下秋冬加厚朴一半通前重一兩減黃連一錢半若治風癟於一料中加入參茯苓菖蒲各三錢黃連只依春用七錢雖秋冬不減淡醋湯送下空心服

加減肥氣丸仲夏合此治同前

柴胡

厚朴各半

黃連一

川椒

甘草各五

巴霜錢三

乾姜半

肉桂二

人參半

川烏錢三

乾姜半

肉桂二

右除巴荳末外同爲細末旋入巴霜研勻煉蜜丸如桐子大初服二丸一日加一丸二日加二丸漸加至大便微溏再從二丸加服淡醋湯下空心服利大便行秋冬去生姜半錢加厚朴一倍減黃連一半  
心之積伏梁丸治起臍上大如臂上至心下久不愈令人心煩

醫學綱目卷三

三

黃連半

人參半

厚朴

去皮姜製半兩黃芩去皮三錢

肉桂錢一

乾姜

巴霜

去皮各半

川烏

去皮各五

分

紅荳

茯神

去皮各一錢

丹參

炮一錢

菖蒲五

右除巴荳霜外爲末另研荳霜旋入和勻煉蜜爲丸如桐子大初服二丸一日加一丸二日加二丸漸加至大便微溏再從二丸加服淡黃連湯下食達周而復始卽減半勿服秋冬加厚朴半兩通前共一兩減黃連半兩只用一兩黃芩不用

脾之積痞氣丸氣在胃脘腹大如盤久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不爲肌膚

厚朴

製半兩

黃連去皮錢八

各一

吳茱萸洗二錢

黃芩錢二

另研

乾姜炮一錢

白茯苓

另爲澤瀉各半兩

澤瀉錢各一

巴荳霜另研四分

乾姜炮五分

一錢

白术

錢半

川烏

臍五分

人參

錢半

茵陳

一錢半

縮砂

一錢半

桂

四分

川椒

炒五分

右除巴荳霜茯苓另研爲末旋入外餘藥同爲細末煉蜜爲丸如桐子大初服二丸一日加一丸二日加二丸漸加至大便微溏再從二丸加服淡甘草湯下食達周而復始積減大半勿服

加減痞氣丸

孟秋令此

黃芩

酒製

厚朴

錢

黃連

酒

半夏

各五分

益智

三分

吳茱萸

三分

紅花

五分

青皮

二分

歸尾

三分

澤瀉

五分

橘皮

去白三分

熟地

一分

廣茂

三分

昆布

各二分

橘皮

去白三分

神曲

葛根

三分

附子

三分

茯苓

五分

甘草

炙三分

巴荳霜

醫學綱目卷三

膏

右爲末蒸餅爲丸桐子大初服二丸一日加一丸二日加二丸漸加至大便微溏再從二丸加服淡甘草湯送下

肺之積息奔丸 治左右脇下覆大如杯久不已令人洒浙寒熱喘咳嗽發肺癰

厚朴

姜製八錢

黃連

三錢

乾姜

錢半

桂枝

去皮一錢

巴荳霜

四分

白茯

半錢

川烏

臍一錢

川椒

錢半去汗

人參

二錢

桔梗

錢

紫菀

錢半去苗一

青皮

分

陳皮

京三棱

炮

天門冬

白荳蔻

錢各一

右除茯苓巴荳霜旋入外餘藥爲末煉蜜丸如桐子大每服二丸一日加一丸二日加二丸加至大便微溏再從二丸加服煎淡生姜湯送下食遠周而復始積減大半勿服秋冬加厚朴五錢通前一兩三錢黃連減七錢

用六錢

加減息奔丸仲夏合此其積爲病寒熱喘咳氣上奔服  
濟失精亡血氣滯則短氣血凝泣則寒熱相參氣分寒血  
分熱治法宜益元氣洩陰火破氣削其堅也

川烏一錢 乾姜一錢 人參二錢 陳皮八錢

黃連三錢半一兩 紫菀半錢 桂枝二錢 巴荳霜四分

厚朴半錢 青皮七錢分 川椒炒去汗半錢 紅花少許

茯苓半錢 桔梗錢 白豆蔻錢 京三稜半錢

天門冬錢半去心一錢

右件爲末湯泡蒸餅爲丸如桐子大初服二丸一日加  
一丸二日加二丸加至大便微溏爲度再從二丸加服  
煎生姜湯送下食前忌酒濕麪辛辣生冷之物

腎之積奔豚丸發於小腹上至心下若豚狀或上下無時

醫學綱目卷五

二十五

久不已令人喘逆骨痿少氣及治男子內結七疝女子瘕  
聚帶下

苦練酒煮

三錢

黃連炒五錢

白茯錢二

澤瀉錢二

川烏炮五錢

菖蒲錢二

玄胡索一錢半

全蝎錢一

附子錢一

巴荳霜四錢分

厚朴七錢

姜製獨活錢

丁香五錢

肉桂三分

右除巴荳霜茯苓另爲末旋入外餘藥爲細末煉蜜丸  
如梧子大初服二丸一日加一丸二日加二丸漸加至  
大便微溏再從二丸加服淡鹽湯送下食遠周而復始  
病減大半勿服秋冬加厚朴半兩通前用一兩二錢  
如積勢堅大先服前藥不減於一料中加存性牡礪三  
錢瘤帶勿加如大積大聚消其大半乃止藥過劑則  
死如積滿腹或半腹先治其所起是何積當先服本

藏積藥諸疾自愈是治其本也餘積皆然 如服藥  
覺熱加黃連 如服藥人氣短加厚朴 如服藥人悶

亂減桂

潔肝之積伏梁溫白丸加柴胡川芎治之 心之積肥氣  
溫白丸加菖蒲黃連桃仁治之 脾之積痞氣溫白丸加  
吳茱萸乾姜治之 肺之積息奔溫白丸加人參紫菀治  
之 腎之積奔豚溫白丸加丁香茯苓遠志治之 溫白丸方見前

丹賈福六勇士十餘歲左脇有塊能飲食

青皮

細切  
醋炒

三棱

柴胡

桂枝

川芎

防風

各二錢

白朮

二錢半

木通

一錢半

海藻

錢

甘草

半錢

右分七貼煎取半盞下保和丸十五粒忌一切

無肥氣丸治肝之積氣在肠下如覆杯其脈弦而細

八醫學綱目卷五

青皮

炒

當歸

各

蒼朮

各二兩半

蛇含石

銀朱

蓬

木

三棱

鐵孕

粉各二兩與

三棱蓬木同入  
醋煮一伏時

右爲末醋煮米糊丸量大每服四十丸當歸酒下

海治伏梁在心下結聚不散用桃奴三兩爲末空心溫酒  
調下桃奴是桃實着樹不落者正月採樹上乾桃子是也

出惠力

本治肺喘久不愈爲息賁五靈丸

五靈脂

二兩半

木香

半兩

馬兜鈴

去壳炒一兩

葶苈

肺之積名曰息奔在右脇下大如杯令人酒浙寒熱喘嗽

日三

右爲細末棗肉和丸如桐子大每服二十丸生姜湯下

發肺癰東膏丸

草薢

陳皮

桔梗

分等

右下二味爲末入草薢研勻煮肥棗肉和丸如桐子大  
每服五七丸飲下予嘗患停飲久漬肺經食已必噦喘  
覺肺系大急服此良驗

定喘急肺積草薢丸

苦草薢一兩當歸

肉桂

白蒺藜

鱉甲

川烏頭

乾姜

吳茱萸

大杏仁

茯苓

人參

桔梗

右爲細末煮棗肉和杵丸如桐子大每服二三十丸姜  
枣湯下日四服不拘時候

師曰奔豚病從小腹起上衝咽喉發作欲死復還止皆從  
驚恐得之故越人曰驚者神上越也仲景謂奔豚從驚恐  
得之蓋奔豚病上衝

人醫學綱目卷五

毛

呻疾者隨神上越也奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱奔豚湯主之

甘草

芎藭

當歸

半夏

黃芩

生姜

芍藥

乾葛

甘李

根

白皮

升焙乾

右九味以水二斗煮取五升溫服一升日三夜一服

茯苓桂枝甘草大棗湯治臍下悸欲作奔豚 桂枝加桂  
湯治奔豚氣從小腹上至心已上二方並見傷寒

無散聚湯治有塊痛無常處展轉動移

半夏

枳榔

當歸

各一

陳皮

杏仁

桂心

各二

茯苓

甘草

炙

附子

炮去皮去

川芎

枳殼

炒

吳茱萸

洗湯

厚朴

姜製各一兩

右剉散每四錢水一盞半煎七分去渣食前服

運氣

運氣積塊皆從濕土經云土太過曰敦阜敦阜之化其動

雜方

琥珀膏貼塊方見瘡疽門下 又貼塊三聖膏用石灰十兩細

節過炒紅急用好醋燉成膏入大黃末一兩官桂末半兩  
攬勻以瓦器封貯紙攤貼患處火烘熱貼大黃須錦紋者

又貼塊

白鴟糞二兩

白芷三兩

硫黃

白欒

木鱉子肉各一兩

右爲末用麪水調和傅患處

丹貼積聚塊

大黃

朴硝各一兩

各爲末大蒜搗膏和勻貼之

外集驗熨癥吳茱萸三升碎之以酒和煮熟布裹熨燬上

醫學綱目卷五

未

冷更炒更番用之癥移走逐熨之候消乃止

靈黃帝曰人之善病腸中積聚者何以候之少俞答曰皮膚薄而不澤肉不堅而淖澤如此腸胃惡惡則邪氣留止積聚乃傷脾胃之間寒溫不次邪氣稍至稽積留止大聚乃起五變篇

冷更炒更番用之癥移走逐熨之候消乃止

脈胃中有癖食冷物者痛不能食食熱則能推而外之內而不外心腹積也

全文見諸脈雜文

難人病有沉滯久積聚可切脈而知之耶然診病在右脇

有積氣得肺脈結脈結甚則積甚結微則氣微診不得肺

脈而右脇有積氣者何也然肺脈雖不見右手脈當沉伏

其外痼疾同法耶將異也然結者脈來去時一止無常數名曰結也伏者脈行筋下也浮者脈在肉上行也左右表裏法皆如此假令脈結伏者內無積聚脈浮結者外無潤

疾有積聚脈不結伏有痼疾脈不浮綻爲脈不應病病不應脈是爲死病也

十八

仲諸積大法脈來細而附骨者乃積也寸口積在胸中微出寸口積在喉中關下積在臍傍上關上積在心下微下關積在少腹尺中積在氣衝脈出在左積在左脈出在右積在右脈出在中央各以其部處之

素太陰濶則病積心腹時滿厥陰濶則病少腹積氣少陰濶則病積淩血陽明濶則病積時善驚太陽濶則病積時善驚疾少陽濶則病積時筋急目痛四時刺逆從論寸口脈沉而橫曰脇下有積腹中有橫積平人氣象論○卽動脈之狀厥厥如豆不升降也

脈左手脈橫癥在左右手脈橫癥在右脈頭大者在上頭小者在下脈遲而滑中寒有癥結偏得洪實而滑爲積

八 醫學綱目卷五

三

弦緊亦爲積爲寒痺爲疝痛內有積不見脈難治見一脈相應爲易治諸不相應爲不治脈弦腹中急痛腰背痛相引腹中有寒疝瘕脈弦緊而微細者癥也夫寒痺瘕瘕積聚之脈皆弦緊若在心下卽寸弦緊在胃脘卽關弦緊在臍下卽尺弦緊脈弦小者寒痺

心肺有積痺其脈皆喘數經云赤脈之至也喘而堅診曰有積氣在中名曰心痺白脈之至也喘而浮上虛下實有積氣在胸中喘而虛名曰肺痺

肝有積其脈弦長而青經云青脈之至也大而虛有積氣

積氣在心下支胠名曰肝痺是也

脾腎有積痺其脈皆大經云黃脈之至也在腹中黑脈之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎痺王註云上謂寸口是也

全文見上  
藏府條上

脈診人心腹積聚其脈堅強急者生虛弱者死 脈弦而

三部之  
積生

靈黃帝問曰夫百病之始生也皆生於風雨寒暑清濕喜

怒喜怒不節則傷臟風雨則傷上清濕則傷下三部之氣

所傷異類原聞其會岐伯曰三部之氣各不同或起於陰

或起於陽請言其方喜怒不節則傷臟臟傷則病起於陰

也清濕襲虛則病起於下風雨襲虛則病起於上是謂三

部至於其淫泆不可勝數百病始生篇下同 是故虛邪之中人

也始於皮膚皮膚緩則腠理開闊則邪從毛髮入人則抵

深深則毛髮立毛髮立則浙然故皮膚留而不去則傳

舍於絡脈在絡之時痛於肌肉其痛之時息大經乃代留

而不去傳舍於經在經之時洒淅善驚留而不去傳舍於

輸在輸之時六經不通四肢則肢節痛腰脊乃強留而不

去傳舍於伏衝之脈在伏衝之時肺重身痛留而不去傳

舍於腸胃在腸胃之時音嚮腹脹多寒則腸鳴飧洩食不

化多熱則溏出糜留而不去傳舍於腸胃之外募原之間

已上數端皆邪氣襲虛留而不解去以次相傳未曾留

着無有定所若留着而有定所則不能傳矣所謂留着

者當如下文法云

去傳舍於伏衝之脈在伏衝之時肺重身痛留而不去傳舍於腸胃在腸胃之時音嚮腹脹多寒則腸鳴飧洩食不化多熱則溏出糜留而不去傳舍於腸胃之外募原之間已上數端皆邪氣襲虛留而不解去以次相傳未曾留着無有定所若留着而有定所則不能傳矣所謂留着者當如下文法云

留着於脈稽留而不去息而成積或着孫脈或着絡脈或着經脈或着輸脈或着於伏衝之脈或着於督筋或着於腸胃之募原上連於緩筋邪氣淫泆不可勝論 其着孫絡之脈而成積者其積往來上下管手孫絡之居也浮而緩不能拘積而止之故往來移行腸胃之間水湊滲注灌濯濯有音有寒則膜膜滿雷引故時切痛 其着於陽明之經則挾脅而居飽食則益大飢則益小 其着於緩筋

清濕襲  
虛之積

也似陽明之積飽食則痛飢則安也痛而外連於緩筋飽食則安飢則痛其着於伏衝之脈者揣之應手而動發手則熱氣下於兩股如湯沃之狀其着於督筋在腸後者飢則積見飽則積不見按之不得其着於輸之脈者閉塞不通津液不下孔竅乾壅此邪氣之在外入內從上下也

此謂風雨襲陰之虛病起於上而積生也

黃帝曰積之始生至其已成奈何岐伯曰積之始生得寒乃生厥乃成積也黃帝曰其成積奈何岐伯曰厥氣生足

悅足悅生脛寒脛寒則血脉凝濇血脉凝濇則寒氣上入於腸胃入於腸胃則腹脹腹脹則腸外之汁沫迫聚不得

散日以成積卒然多飲食則腸滿起居不節用力過度則絡脈傷陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡傷則血內溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血溢於腸外腸外有寒

醫學綱目卷三

三

汗沫與血相搏則并合凝聚不得散而積成矣卒然中於寒若內傷於憂怒則氣上逆氣上逆則六輪不通溫氣不行凝血蘊裏而不散津液滯滲着而不去而積皆成矣

此謂清濕襲陰之虛病起於下而成積也

黃帝曰其生於陰者奈何岐伯曰憂思傷心重寒傷肺忿怒傷肝醉以入房汗出當風傷脾用力過度若入房汗之浴則傷腎

此謂喜怒傷臟病起於陰也風雨襲陰之虛則病起於上而生積清濕襲陰之虛則病起於下而成積此內外三部而受病其積方成矣

此內外三部之所生病者也黃帝曰善治之奈何岐伯對曰察其所痛以知其應有餘不足當

補則補當瀉則瀉毋逆天時是謂至治手少陰筋病內急心承伏梁下爲肘綱治在燔針刲刺以知爲數以痛爲輸其成伏梁唾血膿者死不治手太陰筋病甚成息奔脇急吐血手心主筋病胸痛息奔

皆治在燔針刲刺以知爲數以痛爲輸經文並

經筋

柔癰瘕積塊先於塊上針之甚者又於塊首一針塊尾一針立應針訖灸之又三里灸之

玉氣塊 照海 內關 通谷 又積塊 章門 中脘

報之皆三氣海 天樞 上脘 通谷

選用

甲傷憂煩思氣積中脘主之 腹中積上下行懸樞主之  
大腸轉氣按之如覆杯熱引胃痛脾氣寒四肢煩不嗜  
食脾俞主之 腹中積聚時切痛商一作直曲主之 胞中  
有大疝瘕積與陰陽相引而痛苦涌泄上下出補尺澤太  
谿手陽明寸口皆補之

鞠伏梁氣狀如覆杯 上脘 三里

甲息奔時唾血巨缺主之 息奔脇下氣上衝胸中有熱  
期門 主之

人醫學綱目卷五

圭

最奔豚氣

水道

二十壯灸五

玉泉

三十卽中極穴

章門

五十壯

桑奔豚捨心不得息并疝 又法奔豚氣攻心脇痛滿淹淹欲絕急先用湯洗手足數  
數易之却取下穴 氣海 期門 關元

各五壯

氣海

關元

七壯

玉疝氣衝心欲死

關門

在玉堂旁二十一針入

玉泉

二十一針二十七壯

章門

二十一針入

甲臍豚腹腫章門主之

奔豚上下期門主之

少腹積

聚勞宮主之 奔豚卯上入痛引莖歸來主之 脘豚上

腹脹堅痛引陰中不得小便兩丸齧陰交主之 脍豚氣

腹脹痛舌強不能言莖腫先引腰後引小腹腰臍少腹堅  
痛下引陰中不得小便兩丸齧石門主之 脍豚寒氣入  
小腹時欲嘔傷中溺血小便數背臍痛引陰腹中窘急欲

湊後泄不止關元主之 脍豚上捨心甚則不得息忽忽  
少氣尸厥心煩痛飢不能食善寒中腹脹引臍而痛小腹

與脊相控暴痛時窘之後中極主之

血証

丹婦人有塊多是血塊

婦人血積

當歸丸治婦人月經不調血積証

當歸

赤芍

川芎

熟地

廣茂

京三稜

各半錢神曲

百草霜

各二錢半

右爲細末酒糊爲丸桐子大溫水下

本牛膝根淨洗切焙乾搗下酒煎溫服治婦人血塊立効

右輕劑

重劑

杜尚書媳婦馬氏年三十二腹中血塊作疼經五六年形已骨立衆皆曰不可爲奈其未死何家甚貧而大小愍之一日召杜至告杜曰但以濟物爲懷則可業已請召明公非所言也遂以少物帛贈杜杜不受曰但服某藥必獲安

入醫學綱目卷三十五

三

無以是爲疑遂示方用沒藥牛膝乾漆當歸各半兩硇砂木香水蛭炒紅娘子炒紅花牡丹皮硃砂各一分海馬一箇班竹去翅足炒十四箇爲末酒醋各半升熬爲膏每日天明用一皂子大酒醋化下一月病退六十日漸安果如其言

右重劑

垣加減四物湯治婦人血積

當歸

川芎

芍藥

熟地

廣茂

桂去皮

京三稜

乾漆

六兩半生半熟用各等分

右爲粗末每服二錢水二盞煎法如常食前

大黑丸

神曲

茴香

各四兩

木香

川椒

炒香出汗

各等分

丁香

各半兩

楡榔

四箇

乾漆

六兩半生半熟用  
姜湯煮半日令香

右除椒漆外五物皆半生半炒爲細末用前生熟漆和丸如弹子大又用茴香十二兩鋪陰地蔭乾候外乾并茴香收器中至乾去茴香用治腎氣膀胱痃癖及疝墜五隔血崩產後諸血漏下赤白並一丸分四服死胎一丸皆綿灰酒下若難產炒葵子四十九粒杵碎酒煎下諸疾不過三服痃氣十服膈氣癰癖五服血瘕三丸一婦有塊如杯每發痛不可忍諸藥莫愈投此丸盡三服杯氣盡消終身不復作矣

雲沒藥散治一切血氣臍腹撮痛及產後惡露不行兒枕痛

血竭

沒藥並細研

桂心

當歸

蒲黃

紅花

木香

玄胡索

乾漆炒

赤芍各等分

醫學綱目卷三十五

三

右爲極細末每服二錢熱酒調下食前若血塊衝心痛甚危者以大順散三錢酒調服立止

牡丹散治婦人久虛羸瘦血塊走疰心腹疼痛

牡丹皮

桂心

當歸

玄胡索各一兩

莪朶

牛膝

赤芍各三兩

京三稜一兩半

右爲粗末每服三錢水酒各半盞

羅木香硝砂丸治婦人痃癖積聚血塊刺痛脾胃虛寒宿食不消久不瘥者

丁香

硝砂研

木香

官桂

附子炮半

乾漆炒烟

細墨

大黃剉

乳香

廣茂

青皮

京三稜

巴荳霜

沒藥研

猪牙皂角

乾姜炮等分

右除硝砂乳香沒藥外同爲細末以好醋一升化開研

砂去查脚入銀器中熅火熬次下巴荳霜大黃末熬成膏將前藥末與膏爲丸如麻子大每服三五十丸食後溫水送下加至大便利爲度

寒劑

治血積熱之証於產後血塊求之

大桃仁煎

婦人血瘕血積經候不通

出金方

桃仁

去皮尖炒黃

大黃

重禹

朴硝

右四味末之以醉醋二升半銀石器中熅火煎取一升五合下桃仁大黃蜜等不的手攪千下次下朴硝更不住手攪良久出之丸如桐子大前一日不用吃晚飯五更初用溫酒吞下五九日午取下如黑豆汁雞肝蝦蟆衣未下再作見鮮血卽止卽以調氣血藥補之

腸覃生於腸外月事時下石瘕生於胞中月事不以時下

二病皆似蟲張

並見

醫學綱目卷五

二十五

診

針灸

胎診婦人疝癥積聚脈弦急者生虛弱小者死

甲婦人子藏中有惡血內逆滿痛石闢主之

胎前產後積

瘡

素

黃帝問曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殃亦無殃也帝曰愿聞其故何謂也岐伯曰大積大聚其可犯也衰其太半而止過者死

要論

四血塊如盤有孕難服峻劑此方七之

香附

醋煮

四兩

桃仁

去皮尖一兩

海粉

醋煮

二兩

白芍

二兩

麴糊丸服

消溼益方

南山婦人年三十八於九月廿三日月經行比前過後十日得草藥以敗血海爲下胎之謀有數滴血下因此腹痛在小腹下有塊如碗大不可按湯熨則痛稍定大小便抽痛小便澀大便畧下少赤積垢食不進口畧渴發熱此胃

氣爲草藥所敗加以受傷之血妄行而不得洩所以爲病

砂仁

分三

甘草

分三

滑石

一錢

川芎

保芍

藥湯

治產後諸積不可攻宜養陰去熱其病自安

黃芩

各三

牛膝

二錢

桃仁

箇七

水酒煎服

芍藥

斤一

黃芩

茯苓

各六

丹產後消血塊

滑石

三錢

沒藥

二錢

血竭

錢二

右爲細末醋糊丸如惡露不下以五靈脂爲細末麪糊

丸白术湯陳皮湯送下

又消血塊

香附

童便浸

桃仁

去皮留尖

爲末醋糊丸

息積

氣證

醫學綱目卷三十五

三十六

素帝曰病脇下滿氣逆二三歲不已是爲何病岐伯曰病名曰息積此不妨於食不可刺灸積爲導引服藥藥不能獨治也奇病論○王註云氣逆息難故名息積也用息奔法治之亦可

無磨積丸

胡椒

一百粒

木香

二錢半

全蝎

十枚去毒

化氣湯治息積

砂仁

桂心

木香

各二錢半

甘草

炙一錢

乾姜

茴香

丁香皮

青皮

炒一錢半

蓬术

炮各半兩

胡椒

沉香

各一錢

右爲末每服二錢姜蘇鹽湯調下婦人醋湯服陳無擇云導引法隨意行之皆可愚謂或按摩滿處或手足相屈伸或八段錦或六字氣之類以氣通爲効

面候

面 面腫頰腮痛

面熱面寒

面青

面塵 面赤 面黃

面白 面黑

頰車病

黃帝曰首面與身形也屬骨連筋同血合於氣耳天寒則裂地凌冰其卒寒或手足懈墮然而其面不裂何也岐伯答曰十二經脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其精陽氣上走於目而爲睛其別氣走於耳而爲聽其宗氣上出於鼻而爲臭其濁氣出於胃走唇舌而爲味其氣之津液皆上薰於面而皮又厚其肉堅故天熱甚寒不能勝之也邪氣臟腑

不能勝之也邪氣臟腑  
病形篇

表熱

面腫頰腮痛

朱奶奶兩腮熱腫膈壅之病也

乾葛

桔梗一錢

升麻一錢

蘇葉一錢

甘草

炙七分

薄荷一錢

姜一片

水煎服

醫學綱目卷五

三七

咽喉痛領腫脈洪大面赤者羌活勝濕湯加黃芩桔梗甘草各半錢治之如耳鳴目黃頰領腫頸肩膿肘臂外後廉痛面赤脈洪大者以羌活防風甘草藁本通其經血加黃連黃芩消其腫以人參黃芪益其元氣而瀉其火邪

丹兩腮腫細辛草烏等分爲末入蚌粉以猪脂調傳腫處口含白梅置腮邊良久腫退出涎患消矣消時腫必先向下

世治痄腮

竹葉

車前草

柏子仁

杵碎熱傳患處

腮腫用赤小豆末傳之立効

山瘡腮雞子青調赤小豆末及喉下諸般腫痛用蝸牛飛麪研勻貼腫處

風平人氣

氣論

卷之五

主卒中風頭面腫杵杏仁如膏傳之

針灸面頰腫痛有三法

其一取手陽明經云頤痛刺足陽明曲周動脈見血立已

不已按人迎手經立已又云厥胸滿面腫脣潔潔然暴言  
難甚則不能言取足陽明又云厥頭痛面若腫起而煩心  
取之足陽明太陰爲煩心也又云頤痛刺手陽明與頤之  
盛脈出血是也

其二取手太陽經云手太陽之脈是動則頷腫不可以顧  
所生病者目黃煩痛視盛虛熱寒陷下取之也

其三取手足太陽經云三焦手少陽之脈所生病者煩痛  
又云膽足少陽之脈所生病者頷腫視盛虛熱寒陷下取  
之也又云肝氣逆則頭痛耳聾頰痛取血者蓋取足少陽

之血也

醫學綱目卷五

三

果面赤煩熱惡風寒領痛

揩竹

王枕久妙

巨竇玄

集頷腫生瘡名枯曹風

合谷

列缺

地倉

頰庫不應

再取穴

人中

承漿

玉液

金津

三里

用面腫目瘡腫刺陷谷出血立止

頰腫脣瘡額竇主之

頰腫痛天窓主之

頰腫口急煩車痛不可以嚼煩車

主之

面寒面熱

丹面熱火氣因鬱熱

面寒因胃虛

靈面熱者足陽明病

形篇

垣飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而生大熱有時

而火上行獨燎其面針經云面熱者足陽明病

面熱爲

羅面熱○楊郎中之內五十一歲身體肥盛已酉春患頭目昏悶面赤熱多服清上藥不効請予治之診其脈洪大而有力內經云面熱者足陽明病脈經云陽明經氣盛有餘則身已前皆熱况其人素膏梁積熱於胃陽明經多血多氣木實則風熱上行諸陽皆會於頭目故面熱之病生矣先以調胃承氣湯七錢加黃連二錢犀角一錢疎下三兩行徹其本熱次以升麻加黃連湯去經絡中風熱上行如此則標本之邪俱退矣

升麻加黃連湯

升麻

葛根

錢各

一

白芷

分五

酒黃連

四分

生犀角

末三

川芎

三分

甘草

炙五

荆芥穗

分三

薄荷

分三

右剉如麻荳大用半盞先浸川芎荆芥薄荷外都作

入醫學綱目卷五

三克

一服水二盞煎至一盞入先浸三味同煎至七分去渣食後溫服數服愈忌酒濕麪五辛之物

咳逆停息不得臥面熱如醉此爲風熱上衝薰其面茯苓桂枝五味甘草湯加大黃以利之喘不得臥前文方見

面寒爲

篇

羅面寒○真定維摩院尼長老六十一歲身體瘦弱已酉十月間病頭面不耐寒氣弱不敢當風行諸治不效予診之其脈皆弦細而微且其人年高素食茶菓而已陽明之經本虛脈經云氣不足則身已前皆寒慄又加看誦損氣由此胃氣虛經絡之氣亦虛不能上榮頭面故惡風寒先以附子理中丸溫其中氣次以升麻湯加附子主之

升麻

葛根

白芷

黃芪

各七

甘草

炙五

黑附子

炮七分

人參

草荳蔻

各五

益智仁

分

右判如麻荳大都作一服水三盞連鬚白葱頭二莖同煎一盞去查溫服食前數服良愈

升麻湯辨 或曰升麻加黃連湯治面熱升麻加附子湯

治面寒有何依據答曰出自仲景雲岐子註傷寒論中辨

葛根湯云尺寸脈俱長者陽明受病也當三日發以其

脈夾鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得臥此陽明經受病

也始於鼻交頰中從頭至足行身之前爲表之裏陽明經

標熱本實從標脈浮而長從本脈沉而實陽明爲病蒸蒸

而熱不惡寒身熱爲標病陽明本實者胃中燥鼻乾目疼

爲本病陽明爲肌肉之本禁不可發汗在本者不禁下發

之則變黃症太陽主表榮衛是也榮衛之下肌肉屬陽明

二陽併病葛根湯主之衛者桂枝榮者麻黃榮衛之中桂

枝麻黃各半湯主之榮衛之下肌肉之分者葛根湯主之

入醫學編卷五

甲

又名解肌湯故陽明爲肌肉之本非專於發汗止汗之治  
桂枝麻黃兩方互併爲一方加葛根者便作葛根湯故榮  
衛肌肉之次也桂枝芍藥生姜甘草大棗止汗有麻黃桂  
枝甘草發汗葛根味薄獨加一味者非發汗止汗也從葛  
根以解肌故名葛根湯錢仲易制升麻湯治傷寒瘟疫風  
熱壯熱頭痛肢體痛瘡診已發未發用葛根爲君升麻爲  
佐甘草芍藥安其中氣朱奉議作活人書將升麻列作陽  
明經解藥予診楊氏婦陽明經標本俱實先攻其裏後瀉  
經絡中風熱故用升麻湯加葛連以寒治熱也尼長老陽  
明經標本俱虛先實其裏次行經絡故用升麻湯加附子  
以熱治寒也仲景乃羣方之祖信哉

面青

面塵

難肝外證面青善潔喜怒十六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

運氣面塵有二

一曰燥金制肝經云陽明司天燥淫所勝民病嗌乾面塵又云陽明在泉燥淫所勝病嗌乾面塵又云金爵之發嗌乾面塵宜治以濕劑是也

二曰火經云少陽之復厥氣上行面如浮塵目乃瞤瘻治以寒劑是也

針灸面塵皆取肝膽二經經云肝足厥陰之脈是動病甚則嗌乾面塵脫色又云膽足少陽之脈是動病甚則面微有塵皆視盛虛熱寒陷下取之也

面赤

心火

難心外證面赤口乾善笑

難十六

面赤爲邪氣怫鬱在經宜表不宜下

仲景云下利脈沉而遲其人面赤身有微熱下利清穀者

醫學綱旨卷五

里

以鬱冒汗出而解此面赤亦表而解也

運氣面赤皆屬寒經云太陽司天寒淫所勝民病面赤目

黃治以熱劑是也

針灸

面赤面亦皆取心主經云心主手厥陰之脈是動則病面

赤目黃視盛虛熱寒陷下取之也

面白

黃痘門治法見難十六

難脾外證面白黃善噫善思善味

難十六

素陽明經終者口目動作善驚妄言色黃

脉要經絡篇

全文見治

肺金虛寒血脫者色白夭然不澤其脈空虛

全文見治

虛實法

垣巴戟丸治肺病面白不悅則爲脫氣脫血脫津脫液脫精脫神

方見

遺

虛寒

肺

難肺外證面白善嚏悲愁不樂欲哭

難十六

全文見治

虛實法

也以羌活防風甘草藁本四味瀉足太陽少加附子以通其脈面色惡悲恐者更加桂附

太陽終者戴眼反折瘓癥其色白絕汗出

少陽終者耳聾百節皆縱目累絕系其色青白

已上全文見診生死

法

腎胃

面黑若身黃面黑於黑痘求之

腎外證面黑善恐欠難

十六

陰出乘陽 一婦人年幾三十憂思不已飲食失節脾胃有傷面色黧黑不澤環唇尤甚心懸如飢狀又不欲食氣短而促大抵心肺在上行榮衛而光澤於外宜顯而藏腎肝在下養筋骨而強於內當隱而不見脾胃在中主傳化精微以灌四旁冲和而不息其氣一傷則四臟失所憂思不已氣結而不行飲食失節氣耗而不足使陰氣上溢

八醫學綱目卷五

里

於陽中故黑色見於面又經云脾氣通於口其華在唇今水反來侮土故黑色見於唇此陰陽相反病之逆也上古天真論云陽明脈衰於上面始焦故知陽明之氣不足非助陽明生發之劑無以復其色故以冲和順氣湯主之

升麻

一錢

葛根

半錢

甘草

四分

芍藥

三分

人參

分

蒼朮

三分

白芷

一錢

黃芪

八分

防風

錢

內經曰上氣不足推而揚之以升麻苦平葛根甘溫自地升天通行陽明之氣爲君人之氣以天地之風名之氣留而不行者以辛散之防風辛溫白芷甘辛溫以散滯氣爲臣蒼朮苦辛蠲除陽明經之寒白芍藥之溫酸安太陽經之怯弱十劑云補可去弱人參羊肉之屬人參黃芪甘草甘溫補益正氣爲臣至真要大論云辛甘發散爲陽生姜

辛熱大枣甘溫和榮衛開腠理致津液以復其陽氣故以爲使

右件㕮咀都作一服水二盞姜三片枣三枚同煎至一盞去渣溫服早飯後午飯前取陽升之時使人之陽氣易達故也數服而愈

樊樓有店家劉三一日滿面皆黑色有相者斷云不過月餘死既過月旦安孫入店與客飲酒遂拜孫述說其病狀孫特與診之曰非病也乃爲臭氣所薰穢氣畜於面部不散故有此色問劉曰汝一月前聞甚一陣非常臭氣不能避耶劉曰一日登溷其廁臭氣不可聞隱忍良久下廁明日遂有此疾孫曰去至臭無過至香我家有南人將至售香可用沉檀二香各一兩碎擘焚於爐中安帳內以薰絹被蓋定勿令香氣散可端坐香邊瞑目靜坐候香氣散

入醫學綱目卷三

三

方可出帳明日引鑑照之劉依其言面色漸變旬日如故腎臭腐屬水脾臭香屬土今夫廁臭者腐臭也故聞之則入腎而面黑沉香者香臭也故薰之則脾土勝腎水而色還也

針灸面黑有二法

其一取胃經云周足陽明之脈是動則病酒洒振寒顏黑其二取腎經云足少陰之脈是動則病飢不欲食面如漆柴視盛虛熱寒陷下取之也

診

少陰終者面黑齒長而垢腹脹閉全文見診生死下同

太陰終者腹脹閉不得息善噫嘔逆則面赤不逆則面黑皮毛黑

煩車病謂煩車開而不合

雜方

平江陳氏因驚懼後常用手指甲掐住兩頰遂兩頰破損心中懊惱不安服數而實諸藥不愈用活幼口義牛黃

清心涼膈丸數服如失

無凡伸欠煩重蹉但開不能合以酒飲之令大醉睡中吹  
皂角末搐其鼻嚏透卽自正

### 狂癲

狂謂妄言妄走也癲謂僵仆不省也各自一症今以狂入  
脾部癲入肝部然經有言狂癲疾者有言狂互引顛者又  
言顛疾爲狂者此則又皆狂顛兼病今病有妄言妄走項  
時前後僵仆之類有僵仆後妄見鬼神半日方已之類是  
以顛狂兼病者也

診

難顛狂之病何以別之然狂之始發少臥而不飢自高賢  
也自辨智也自貴倨也妄笑好歌樂妄行不休是也顛疾  
始發意不樂直視僵仆其脈三部陰陽俱盛是也重陽者  
狂重陰者顛五十九難○王註云：狂病之後，不欲眠臥，不  
飲食，自言賢智尊貴，歌舞行走不休，今人

### 醫學綱要卷三

醫

以爲癲  
疾謬矣

下虛上

素二陰二陽皆交至病在腎罵詈妄行顛疾爲狂陰陽類  
註云：二陰腎水二陽胃土  
土刑水病在腎胃爲狂

靈邪入於陽則爲狂轉則爲顛疾篇九針

素顛疾厥狂久逆之所生也通評虛實論太陽所謂狂顛疾  
者陽盡在上而陰氣從下下虛上實故狂顛疾也脈解篇

針灸狂顛有一法

其一取胃經云足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太  
陰其病實則狂癲取之所別是也

其二取膀胱經云膀胱足太陽之脈所生病者狂顛視盛  
虛熱寒陷下取之也

甲狂癲疾吐舌太乙及滑肉期門主之 狂仆溫溜主之  
狂顛疾陽谷及築賓通谷主之 狂互引顛疾數發後

谿主之 狂顛陰谷主之

狂

欲獨閉戶牖而處陰不勝其陽則脈流蕩疾并乃狂

全文見治

血并於陽氣并於陰故爲驚狂

全文見刺虛法

上實者從商抑之素帝曰有病怒狂者此病安生岐伯曰生於陽也帝曰陽何以使人狂岐伯曰陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥帝曰何以知之岐伯曰陽明者常動巨陽少陽不動不動而動大疾此其候也帝曰治之奈何岐伯曰奪其食卽已夫食入於陰長氣於陽故奪其食卽已使之服

以生鐵落爲飲夫生鐵落者下氣疾也

病能篇

無號礬丹治狂効

方見頭痛門

鎮心丹治驚悸自汗心煩短氣喜怒悲惡悉不自知忘魂

罷

失魄狀若神靈所憑及男子遺泄女子帶下

辰砂研

白礬煅汁盡各等分

右爲末水丸如雞頭大每服一丸煎人參湯下食後服

世浙江一婦人顛狂不止醫以瓜蒂半兩爲末每一錢重井花水調滿一盞投之隨得大吐吐後熟睡勿令驚動自此無恙

竹來避膏治遠年近日風癪心病風狂中風涎沫潮閉牙關不開及破傷風並皆治之

皂角

一兩肥大無子  
蛀者去皮弦子

右將皂角切碎用漿水一大碗春秋浸三四日冬七日夏一二日採開取淨浸透皂角汁入銀器或砂鍋內以文武火熬用新柳條槐枝攬熬似膏藥取出摊於夾帛上陰乾收頓如遇病人取千掌一大片用溫漿化在蓋

內用竹管兒盛藥水將病人扶坐定頭微擡起將藥吹入左右鼻孔內良久扶起涎出爲驗欲要涎止將溫鹽湯令病人服一二口便止忌雞魚生硬濕麪等物

子和一男子落馬發狂起則目瞪狂言不識親疎棄衣而走罵言涌出氣力加倍三五人不能執縛燒符作醮問鬼跳巫殊不知顧服丹砂牛黃犀珠腦麝資財散去室中瀟然不遠二百里而求戴人一往戴人以車軸埋之地中約高二丈許上安中等車輪其轄上鑿一穴如作盆之狀縛病人在其上使之伏臥以軟裯襯之又令一人於下坐機一枚以棒攬之轉千百遭病人吐出青黃涎沫一二斗許繞車輪數匝病人曰我不能堪可解我下從其言而解之索涼水與之冰水飲數升狂乃罷矣

素帝曰陽明病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日

醫學綱目卷五

巽

踰垣上屋所上之處皆非其素所能也病反能者何也岐伯曰四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實實則能登高也帝曰其棄衣而走者何也岐伯曰熱甚於身故棄衣欲走也帝曰其妄言罵詈不避親疎而歌者何也岐伯曰陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食不欲食故妄走也

陽明脈解篇○陽明所謂病至則欲乘高而歌棄衣而走者陰陽復爭外並於陽故使之棄衣而走也

海許氏病陽厥狂怒罵詈親疎或哭或歌六脈舉按無力身表如水石發卽呴聲高潔古云奪食則已因不與之食予用大承氣湯下之得臟腑渣穢數升狂稍寧數日復發復下如此五七次行大便數斗疾瘥身溫脈生良愈此易老奪食之法也

保當歸承氣湯

當歸

大黃各一

甘草半

芒硝七

陽明實  
則脈伏  
宜下之

右判如麻荳大每二兩水一大碗姜五片枣十枚煎至一半去渣熱溫服若陽狂奔走罵詈不知親疎此陽有餘陰不足大黃芒硝去胃中實熱當歸補血益陰甘草緩中加姜棗者胃屬土此引入胃中也經所謂微者逆之甚者從之此之謂也以大利爲度微緩以瓜蒂散入防風末藜蘆末吐之其病立安後用調心散洗心散涼膈散解毒湯等調之

子和一狂人陰不勝其陽則脈流薄疾陽并乃狂難經曰陽極則狂陰極則顛陽爲腑陰爲臟非陽熱而陰寒也熱并於陽則狂狂則生寒并於陰則顛顛則死內經曰足陽明實則狂故登高而歌棄衣而走無所不爲是熱之極也以調胃承氣大作湯下數十行三五日復上涌一二升三五日又復下之凡五十日下百餘行吐亦七八度如吐

醫學綱目卷三十一

四

時暖室置火以助其汗數汗方平

醫者登

一叟年六十值徭役煩擾而暴發狂口鼻覺如虫行兩手爬搔數年不已戴人診其兩手脈皆洪大如絇斷之曰肝主謀膽主決徭役迫遽財不能支則肝屢謀而膽屢不能決屈無所伸怒無所洩心火燄礪乘陽明金然胃本屬土而肝屬木膽屬相火火隨木氣而入胃故暴發狂乃命置燠室中涌而汗出如此三次內經曰木鬱則達之火鬱則發之正謂此也又以調胃承氣湯半斤用水五升煎半沸分作三服大下二十行血水與瘀血相雜而下數升來日乃康以通聖散調其後

之  
虛者補  
孫相國寺僧充忽患頭疾經半年遍服名醫藥皆不効僧俗兄潘氏家富召孫療之孫曰今夜睡着明後日便愈也潘曰且告授藥報恩不忘孫曰有鹹物但與師吃待渴却

來道至夜僧果渴孫至遂求溫酒一角調藥一服與之有頃再索酒與之半角其僧遂睡兩晝夜乃覺人事如故潘謝孫問其治法曰衆人能安神矣而不能使神昏得睡此乃靈苑方中硃砂酸枣仁乳香散也人不能用耳

辰砂散治風痰諸癇狂言妄走精神恍惚思慮迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發乍地吐沫戴目魂魄不守醫藥無驗

辰砂

一兩湊光明  
有墻壁者

酸枣仁

半兩  
微炒

乳香

半兩光  
堂者

右量所患人飲酒幾何先令恣飲沉醉但勿令吐至靜室中以前藥都作一服溫酒調下作一盞調之令頓飲如飲酒素少人但以隨量取醉服藥訖便安置床枕令臥病淺者半日至一日病深者三兩日令家人潛伺之鼻息勻調但勿喚覺亦不可驚觸使覺待其自醒卽神魂定矣萬一驚悟不可復治正肅吳公少時心病服此

醫學綱目卷五

哭

一劑五日方竊遂瘥

一醉膏治心恙無灰酒二碗香油四兩和勻用楊柳枝二十條逐條攬一二百下候香油與酒相入成膏煎至八分灌之熟睡則醒或吐下卽安矣  
狂之爲病少臥少臥則衛獨行陽不行陰故陽盛陰虛令昏其神得睡則衛得入於陰而陰得衛填不虛陽無衛助不盛故陰陽均平而愈矣

本寧志膏

人參

酸枣仁

一兩  
辰砂  
錢五分

乳香

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸薄荷湯送下

予族弟緣兵火失心制此方與之服二十粒愈親舊多傳去服之皆驗

海狂邪顛癇不欲眠臥自賢自智妄行不休此方能安五

臟下心氣用白雄雞一隻煮熟五味調和作羹粥食之一  
經云悲哀動中則傷魂魄傷則狂妄不精不精則不正此  
悲哀傷魂而狂當用溫藥補魂之陽仲景方以地黃湯本  
事驚氣丸之類卽是也 經云喜樂無極則傷魄魄傷則  
狂狂者意不存人此喜樂傷魄而狂當用涼藥補魄之陰  
辰砂鱗金白礬之類是也

世治失心

薦金七兩須四川  
肺肚者是真

明礬三兩

右爲細末薄糊爲丸如桐子大每服五六十丸湯水任  
下昔有婦人顛狂可畏數年不愈後遇至人授此方初  
服覺心胸中有物脫去神氣灑然再服頓甦至人云此  
病用憂驚得之痰涎包絡心竅此藥能去鬱痰

風

仲防已地黃湯治病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脈

浮

防已錢

桂枝

防風各三錢

甘草二錢

右四味以酒一盃漬一宿絞取汁生地黃二斤㕮咀蒸  
之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黃汁和分再服  
本治驚瘡積氣症風邪發則牙關緊急涎潮昏塞醒則精  
神若痴驚氣丸

附子

木香

白姜茶

乾薑二分

橘紅

天麻

麻黃各半錢

天南星泥切

紫蘇葉兩

朱砂

一錢留少

許爲衣

半兩浸一夕

右爲末加腦麝少許同研極勻煉蜜杵丸如龍眼大每  
服一丸金銀薄荷湯化下溫酒亦得此予家秘方也戊  
申年軍中一人犯法褫衣將受刑而得釋精神頓失如

痴予與一丸服訖而寐及覺病已失矣提轄張載楊其  
妻因避寇失心已數年予授此方不終劑而愈又黃彥  
奇妻狂厥者踰十年諸醫不驗予授此方去附子加鐵  
粉亦不終劑而愈鐵粉非但化痰鎮心至如摧抑肝邪  
特異若多恚怒肝邪大盛鐵粉能制伏之素問云陽厥  
狂怒治以鐵落飲金制木之意也此亦前人未嘗論及  
無治中風或歌或哭或笑語無所不及小續命湯用麻黃  
三兩入參桂枝白朮各二兩無防風附子生姜有當歸二  
兩

風熱世治顛狂發作披頭大叫不避水火苦參爲末蜜丸梧子  
大每服十九薄荷湯化下妙

血熱保牛黃膏治熱入血室發狂不認人

牛黃半錢珠砂

麝金

牡丹皮各三錢

辛

甘草

腦子各一

右爲末煉蜜丸如棗子大新汲水化下

寒肝移寒於心狂膈中病傳變

全文見診

運氣狂皆屬火經云諸燥狂越皆屬於火又云火太過曰  
赫曦赫曦之紀其病笑謔狂妄又云歲火太過上臨少陰  
少陽病譖妄狂越治以諸寒是也

雜方

子和項開合之妻病飢不欲食常好吁呼怒罵欲殺左右  
惡言不輒衆醫皆處藥幾半載尚爾其夫命戴人視之戴  
人曰此難以藥治乃使二娼各塗丹粉作伶人狀其婦人  
大笑次日又作角觴又大笑其旁常以兩箇能食之婦誇  
其食美病婦亦索其食而爲一嚙之不數日怒減食增不  
藥而瘥後得一子夫醫責有才無才何足應變無窮

針灸

靈狂始生先自悲也喜忘苦怒善恐者得之憂飢治之取

手太陰陽明血變而止及取足太陰陽明 狂始發少臥

不飢自高賢也自辨智也自尊貴也善罵晝日夜不休治

之取手陽明太陽少陰舌下視之盛者皆取之不盛釋之

也 狂言驚笑好歌樂妄行不休者得之大恐治之取

手陽明太陽太陰 狂目妄見耳妄聞善呼者少氣之所

生也治之取手太陽太陰陽明足太陰頭兩頤

食善見鬼神善笑而不發於外者得之有所大喜治之取

足太陰太陽陽明後取手太陰太陽陽明 狂而新發未

應如此者先取曲泉左右動脈及盛者見血有頃已不已

以法取之灸骨髓二十壯顛狂篇 大熱偏身狂而妄見妄

聞妄言視足陽明及大絡取之虛者補之血而實者瀉之

因其偃臥居其頭前以兩手四指挾按頸動脈久持之卷

而切之下至缺盆中而復止如前熱去乃止此所謂推而

散之者也

刺節真邪篇○蹊動脈  
胃坎喉兩旁人迎脈也

皆取陽明也

秦系

刺灸法

狐魅神邪顛狂諸病并小兒驚癇兩手

大拇指用軟繩急縛之灸三壯艾炷着四處半在甲半在

肉上四處盡燒一處不看其疾不愈神効難量此法累用累効

明堂 火狂發怒欲殺人見鬼

身柱灸在三椎下間 後谿

標幽 又法 太鍾

集失志呆痴 神門 中衝 鬼服 媚尾 百會

摘心悶不已

甲 狂易魚際及合谷腕骨支正少海崑崙主之 狂言笑

見鬼取之陽谿及手足陽明太陽

狂歌妄言怒恐惡人

與火罵誓三里主之。狂妄走善少巨虛上廉主之。狂

易見鬼神與火解谿主之。狂言太淵主之。心懸如飢之狀。善悲而驚狂面赤目黃間使主之。狂疾液門主之。

又俠谿丘墟光明主之。狂互引頭痛耳鳴目裨中渚主之。身熱狂走談言見鬼瘞瘞身柱主之。狂妄言怒忍

惡大甚罵誓巨闕主之。

欲獨閉戶牖而處

閉

陽明所謂欲獨閉戶牖而處者陰陽相薄也。陽盡而陰盛故欲獨閉戶牖而居。帝曰陽明惡人者何也。岐伯曰陽明厥則喘而惋惋則惡人。陽明脈解篇

針灸獨閉戶牖而處有二法

其一取胃經云胃足陽明之脈是動則病惡人與火獨閉戶牖而處視盛虛寒熱陷下取之也。

默醫學綱目卷五

五

其二取少陰經云少陰之虛獨閉戶牖而處註云取太溪二穴

熱病汗不出。劔劔眩時什而浮腫足胫寒不得臥。振寒

惡人與木音喉痺齒惡風鼻不利多臥善驚厲兇主之

四肢手足悶者使人久持之厥熱脛痛腹脹皮痛善伸

數欠惡人與木音振寒嗌中引外腎痛熱病汗不出下齒

痛惡寒目急喘滿寒慄齒口禁懈惰不嗜食內庭主之

難病若閉目不欲見人者脈當得肝脈弦急而長而反得

肺脈短而濶者死也。

診

口苦 口瘡入赤口糜 口臭喉醒

口甘清入中唇 痰入門

唇瘦瘡入門

口候

口者脾之所主。胃大腸脈之所挾。經云中央黃色。入通於脾。開竅於口。藏精於脾。又云脾主口。在藏爲脾。在竅爲口。又云脾氣通於口。脾和則口能知五味矣。此脾之所主。於

口也

又經云、胃足陽明之脈、挾口下交承襲。又云、大腸手陽明之脈、挾口交人中。此胃大腸之脈所挾於口也。

口苦

肝氣熱則膽泄口苦

全文見瘧

內經曰、有病口苦名曰膽渾。乃肝主謀慮、膽主決斷。盛汁七合、是清淨之府。取決於膽、膽或不決、爲之恚怒、則氣上逆。膽汁上溢、故口苦。或熱甚而使然也。以龍膽瀉肝湯主之。

柴胡錢

黃芩

生甘草

人參

天門冬

黃連

草龍膽

山梔

麥門冬

知母

五味子

粒

八段蟲綱 卷三

三

忌辛熱物大效

真氣上逆故口苦舌乾

全文見水腎

針灸

帝曰、有病口苦者、病名爲何、何以得之。岐伯曰、病名曰

膽渾。夫肝者、中之將也。取決於膽、咽爲之使。此人者、數謀

膽渾。夫肝者、中之將也。取決於膽、咽爲之使。此人者、數謀

慮不決、故膽虛氣上溢、而口爲之苦。治之以胆募俞。

奇病論

脣募穴在腹部期門下五分、膽俞穴在背部第十一椎下兩旁相去各二寸半。

針灸口苦獨取於膽。此篇經文是其一法也。又經云、膽病

者善太息、口苦嘔吐。當取陽陵泉。又云、膽足少陽之脈、是動則病口苦。善太息、視盛虛熱寒陷下取之也。

口糜

膀胱移熱於小腸、膈腸不便、上爲口糜。

全文見瘧  
病傳變

垣移熱湯治口糜、內經云、膀胱移熱於小腸、膈腸不便、上爲口糜。好飲酒人多有此疾。易老用五苓散導赤散相合。

服之神效

丹治滿口白爛革撥一兩厚黃柏一兩六錢爲末用米醋煎數沸後調上藥涎出吐之再用湯漱口卽愈重者三次羅胡黃連散治口糜

羅胡黃連散治口糜

胡黃連五分

藿香一錢

細辛三分

黃連三分

右爲末每用半錢乾摻口內漱吐之

必效散治口糜

白礬

大黃等分

右爲細末臨臥乾貼瀝涎盡溫水漱之

運氣口糜皆屬熱經云少陰之復火氣內發上爲口糜治以苦寒是也

口臭喉腥

本加減甘露飲治男子婦人小兒胃客熱口臭牙宣赤眼口瘡一切瘡疥已散未散皆可服之丹溪云甘露飲心肺胃藥也

八醫學綱目卷三

善

熟地

生地

天門冬去心

黃芩

枇杷葉去毛

山茵陳

枳殼

金釵石斛

甘草兩

犀角錢三

右爲末每服二錢水一盞煎至七分去渣食後臨臥溫服小兒一服分作二服更斟酌與之

此方得自一品之家其間用犀角一味甚有道理百發百中予族中有一僕牙宣口臭牙齒漸漸頽落予與二服頓愈服之無不愈者本事方前集所未載此方緣得之不易故不敢輕泄服之自有奇效

本治口臭香薷一把以水一斗煮取三升稍稍含之丹溪云惟

香薷湯能治口臭

羅肺熱喉腥治驗 梁濟民膏梁而飲因勞心過度肺氣有傷以致氣出腥臭涕唾稠粘咽嗌不利口苦乾燥以加

減瀉白散主之

桑白皮三錢

地骨皮一錢半

甘草一錢半

知母七錢

黃芩五錢

分

五味子二十粒

麥門冬五錢

桔梗二錢

難經云心主五臭入肺爲腥臭此其一也因洪飲大熱之氣所傷從心火刑於肺金以桑白皮地骨皮苦微寒降肺中伏火而補氣爲君以黃芩知母苦寒治氣腥臭清利肺氣爲臣肺欲收急食酸以收之以五味子酸溫以收肺氣麥門冬苦寒治涕唾稠粘口苦乾燥爲君桔梗辛溫體輕浮治痰逆利咽喉爲使也

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去渣溫服食後一日二服忌酒濕麪及辛熱之物

聖治口臭仍醫齒腫痛細辛煮取濃汁熱飲令吐瘥

實

子和

尙家一男子年二十餘歲病口中氣出臭如登廁雖

入醫學綱目卷三

蓋

親戚莫肯與對語戴人曰肺金本主腥金爲火所乘火主臭應便如是也久則成腐腐者腎也此亢極則反兼水化也病在上宜涌之以茶調散涌而去其七分夜以舟車丸瀉川散下五十行比旦而臭斷

針灸

甲 口中腫臭勞宮主之

唇口瘡門

唇候六腑之華在唇經云脾胃大腸小腸三焦膀胱者倉廩之本榮之居也其華在唇四白是也 胃脈肝脈督脈皆環唇經云胃足陽明之脈挾口環唇又云肝足厥陰之脈環唇內經云督脈上頤環唇是也 衝脈任脈皆絡唇經云

衝脈任脈別而絡唇口是也

診唇反者死經云唇舌肌者肉之本也唇反者肉先死是也

四肢

四肢候

陽主四肢經云四肢者諸陽之本也又云陽受氣於四肢是也陽實則肢腫經云結陽腫四肢是也陽虛則肢滿經云冬氣病在四肢是也脾主四肢經云四肢皆稟氣於胃而不得至經必因於脾乃得稟者是也脾實則四肢不舉經云脾脈太過爲病在外則令人四肢不舉者是也脾虛則四肢不用經云脾藏肉形不足則四肢不用又云四肢懈惰此脾精之不行是也治見痿及中風五臟有邪留在支節經云肺心有邪其氣留于兩肘肝有邪其氣留于兩股脾有邪其氣留于兩髀腎有邪其氣留于兩膝是也治法見偏癆

運氣

運氣四肢不舉皆屬濕經云土太過曰敦阜敦阜之紀其病腹滿四肢不舉是也

針灸

風逆四肢腫復溜主之

醫學綱目卷五

肉

內候  
脾主肉經云脾主肉在體爲肉在藏爲脾又云邪在脾胃則病肌肉痛是也脾病在谿經云北方黑色入通於腎故病在谿谿者肉之小會也

針灸

帝曰願聞谿谷之會也岐伯曰肉之大會爲谷肉之小會爲谿肉分之間谿谷之會以行榮衛以會大氣邪溢氣壅脈熱肉敗榮衛不行必將爲膿肉消骨髓外破大臍留於節湊必將爲敗積寒留舍榮衛不居卷肉縮筋肋肘不得伸內爲骨痺外爲不仁命曰不足大寒留於谿谷也谿谷三百六十五穴會亦應一歲其小痺淫溢循脈往來微針所及與法相同氣穴

禁忌

形樂志藥病生於內治之以針石全文見治法  
濕傷肉甘傷肉經云濕傷肉風勝濕甘傷肉酸勝甘又云

甘走肉肉病無多食甘又云多食酸則肉胝脢而脣揭是也坐樂傷肉經云久坐傷肉又云形樂志樂病生於內治之以針石是也

身重 忽墮嗜臥

身重者濕也補中益氣湯去桂加五苓散主之

風濕

起臥不能謂之濕身重是也小柴胡湯黃芪芍藥湯仲風濕脈浮身重汗出惡風者防已黃芪湯主之方見傷寒身重夏月中風濕身重如山不能轉側宜除風勝濕去熱之藥治之

皆有

腎着之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出表裏冷濕久久得之腰以下冷痛腹重如帶五千錢甘姜苓术湯主之

醫學綱目卷三

卷三

甘草

白术各二

乾姜

茯苓各四兩

虛

肝虛腎虛脾虛皆令人體重煩冤

示從容論○體重屬肝腎虛肝虛則脾寡

千畏而体重腎虛則脾勝之而体重也

參木湯治脾胃虛弱元氣不能榮於心肺四肢沉重食後昏悶

黃芪

錢二

升麻

三分

甘草

錢四

柴胡

酒黃柏各三

分

陳皮

一分

青皮

五分

神麃

七分

蒼朮

錢一

當歸

分

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞半去渣帶熱服食前運氣身重有五

一曰濕乃濕制腎虛而重經云太陰所至爲身重又云太陰之復體重身滿又云歲土太過濕氣流行民病體重煩

選錄

寃又云土鬱之發民病身重是也

二曰濕熱經云少陽司天之政四之氣炎暑間化其病滿

身重是也

三曰寒濕經云太陰司天之政三之氣感於寒濕民病身重是也

四曰風乃木制脾虛而重經云歲木太過風氣流行民病體重煩寃又云歲土不及風乃大行民病體重煩寃又云

厥陰在泉風淫所勝病身體皆重是也

五曰金乃燥制肝虛而重經云歲金太過燥氣流行民病體重煩寃是也

針灸身重有二法

其一取脾經云脾病者身重肉痺取其經太陰陽明少陰血者又云脾足太陰之脈是動則病腹脹身體皆重視盛

八醫學綱目卷五

虛熱寒陷下取之也

其二取腎經云腎病者身重寢汗出憎風取其經少陰太陽血者是也

急墮嗜臥

云脈緩急墮嗜臥四肢不收或大便泄瀉此濕勝從平胃散又云急墮嗜臥有濕胃虛不能食或沉困或瀉泄加蒼朮自汗加白朮

本補虛損治勞倦一切虛極欲垂死者

肥人陰虛宜服瘦人不宜服

甘草三兩

蒼朮一斤米泔浸宿切同置過一宿

川椒四兩炒

草烏半斤水浸宿切用鹽

右共爲末用好酒糟六斤同搗三五千杵令勻爲丸如

桐子大每服三十九空心溫酒鹽湯任下婦人淡醋湯

虛

脾湿

下

垣食入則困倦精神昏冒而欲睡者脾虛弱也

人參補氣湯治四肢懶倦

黃芪一錢半

人參十分

甘草三分

生地五分

防風七分

白芍五分

五味二十粒

升麻七分

肉桂二分

熟地六分

生甘草一分

黃柏七分

知母七分

右爲粗末作一服水二盞煎至一盞濾去渣空心熱服

下

蠱毒

江南閩中山間人以蛇虺蜈蚣蜒蚰蝨等百虫同器畜之使其自相食啖勝者爲靈以祀之取其毒雜以菜菓飲食之類以害人妄意要福以圖富貴人或中之症狀萬端或年歲間人多死又有人家香火奉祀如家先者亦謂之蠱能病人世謂之蠱疰以姓類屬五音謂之五蠱此皆邊鄙邪僻之地多有此事中都則蔑聞也

詮夫中蠱毒者令人心腹絞痛如有物吐出譬如爛肉若不卽治食人五臟卽死驗令病人唾水沉者卽是

有人行蠱毒以病人若欲知其姓名者以敗鼓皮燒作末飲服方寸匕須臾自呼蠱家姓名可語之令呼喚將去則愈治之亦有方

世驗蠱之法含一大荳其荳脹皮脫者蠱也荳不脹皮不脫者非也人以鵠皮至病人臥所下勿令知覺病甚者走居則非也治療之法必須審而後行試而後可今人偶有積聚脹滿之病類乎蠱著便以爲蠱尤爲非也凡蠱毒之中有緩有急急者十數日便死緩者待以歲月氣力羸斂食盡五臟而後死死則其毒流注於傍傍人亦成蠱注矣

吐利鹽  
毒法

無亢中毒嚼生荳不腥嚼白礬味甘者皆中毒無疑

脈人爲百藥所中傷脈浮濶而疾者生微細者死洪大而遲者生千金選作速

無辰砂丸治蠱毒從酒食中着者端午日合

辰砂

細研另研水飛

雄黃

各一兩

赤脚蜈蚣

續隨子各一兩

麝香

錢一

右爲末糯米飲爲丸如雞頭大若覺中毒卽以酒下一丸蛇蝎所螫醋磨傅効

必效主蠱毒神效以胡荽根絞汁半升酒和服之立下治蠱毒土瓜根大如拇指長三寸切以酒半升浸一宿

一服當吐下

蛇蠱食飲中得之咽中如有物嚥不下吐不出悶悶心熱服馬兜苓卽吐出又服麝香一錢七卽吐蠱毒

醫學綱目卷五

李

聖五種蠱毒馬兜苓根二兩爲末分爲三貼水一盞煎五分去渣服當吐出未快再服

主蠱毒用大戟桃白皮以火烘乾班竹去翅足炒三物等分搗篩爲散以冷水服半方寸匕其毒卽出不出更不服蠱並出此李饒州法大奇效若以酒中得則以酒服以食中得則以飲服之

右吐利蠱毒法

無几諸蠱多是假毒藥以投之知時宜煮大荳甘草齊荳汁飲之通除諸毒藥

經山荳根不拘多少如中藥蠱毒密遣人和水研以禁聲服少許不止再服一方用酒調下二錢

無常用鐵精細研搗雞肝和爲丸桐子大食前或後酒下

解蠱毒法

五十九

蠱下血見血

雜方解

無解毒丸治設食毒中并百物毒救人於必死

板藍根四兩洗晒乾

貫眾去毛剉青黛

甘草生各兩

右爲末蜜丸桐子大以青黛另爲衣如稍精神恍惚即是誤中諸毒急取十五丸爛嚼用新水送下即解

青黛雄黃丸凡始覺中毒及蛇蟲咬癰瘡纔作即服此毒

氣不聚

青黛雄黃等分

右爲細末新汲水調下一錢

醫學綱目卷五

至一

山嵐瘴氣及食毒酒毒吐逆不定遊風丹毒迷惑昏因不省人事虛煩發燥赤目口瘡善解四時傷寒之疾發散瘟疫毒邪之氣及四方人不服水土一切諸毒並皆解之常服此藥補真益氣化毒除風神效不可細述

滑石

黃芩

貢仲

茯苓

山梔

乾姜

草龍膽

大荳

青黛

甘草

薄荷

寒水石各一

益智仁

砂仁

大黃

山荳根

生地

桔梗

百藥煎

紫河車即桑一

蒙荳粉

馬勃

板藍根

黃藥各半

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸新汲水化下細嚼或噙化亦得小兒半丸如婦人血量不省生姜薄荷水磨下一丸

世解諸毒用玉簪花根搗水服

治中諸藥毒

生甘草 黑荳

淡竹葉

淡竹葉各等分

右咬咀用水一碗濃煎連服

無礬灰散治中諸物毒

明礬

建茶各等分

右爲末每服三錢新汲水調下得吐卽效

解砒毒

解砒毒鼠莽毒用旋刺下羊血及雞鴨血熱服未詳

藍飲子解砒毒及巴荳毒用藍根沙糖二味相和搗水服之更入薄荷汁尤妙

解砒毒

白蘆荳

毒黛

甘草

巴荳

半粒用半邊去壳不去白

右同爲末沙糖一大塊水化開調一大盞飲之砒毒隨

八醫學綱目卷三

李

利去却服五苓散之類

解砒毒用早禾稈燒灰新汲水淋汁濾過冷服一碗毒隨利下卽安又方用井花水調荳粉或菉荳搗水汁皆可解砒毒

解砒毒

漢椒四十粒

黑荳十四粒

甘草節碎之

烏梅箇

右咬咀用水一盞煎至七分溫服

解鼠莽草毒

用枯過明礬同上等好末茶少許新汲水調

服人有用之累效解鼠莽草毒用大黑江荳煮汁服之

如欲試其驗先刈鼠莽苗葉以荳汁澆其根從此敗爛不復生矣

正治自死六畜肉中毒方用黃柏搗屑服方寸七

治鱉肉漏脯中毐

漏脯肉密器蓋之漏宿者是也

燒犬屎

酒服方寸七或服人乳汁或飲荳汁二三升亦良治黍

解諸食毒

解鼠莽草毒

漏脯茅屋漏下沾着者是也

禾中藏肝肺食之中毒方大荳濃汁飲數升卽解亦治裡  
肉漏脯等毒 治食生肉中毒方掘地深三尺取其下土

三升以水五升煮數沸澄清汁飲一升卽愈 治六畜馬

獸肉中毒方水浸荳豉絞取汁服數升卽愈

治馬肝毒中人未死方雄鼠屎二七粒末之水和服日再  
服屎尖是也 又人垢取方寸服之佳 治馬肉中毒欲死方

香豉二兩杏仁三兩相和蒸一食頃熟杵服日再服又方

煮蘆根汁飲之良 治噉蛇牛內食之欲死方辨噉蛇牛毛髮向後順者

飲乳汁一升立愈 以泔洗頭飲一升愈 牛

膝細切以水一斗煮取一升緩飲之大汗出卽愈 治食  
牛肉中毒甘草煮汁飲之卽解 治食犬肉不消心下堅  
或腹脹口乾大渴心急發熱妄語如狂或洞泄方杏仁一  
升炒皮熟研以沸湯三升和取汁分三服利下肉片出大

入醫學綱目卷三

奎

驗 烏獸有中毒箭死者其肉毒用大荳煮汁及藍汁服  
之卽解

世候吞蠅蟇用生雞血令病人吃須更以清油灌口中其  
蟇蟇滾在血中吐出繼以雄黃細研水調服愈

仲鱠食在心胃間不化吐不出速下除之久成癥病方

陳皮

一兩

大黃

二兩

朴硝

二兩

右三味以水一大升煮取半升頓服消

食鱠多不消結爲癥病治用馬鞭草搗汁飲之 或以姜  
葉汁飲一升亦消 又可服吐藥吐之 食魚後食毒物  
煩亂用陳皮濃煎汁服之卽解 食鯀鯀魚中毒用蘆根  
煮汁服之卽解

治食河豚魚中毒一時困殆倉卒無藥以清油多灌之  
使毒物盡吐出爲愈

仲食蟹中毒治用紫蘇煮汁飲三升紫蘇子搗飲之亦良  
冬瓜汁飲二升吃冬瓜亦可 食菓中毒用猪骨燒過

末之服方寸匕亦治馬肝漏脯等毒

世解一切菌毒瘧新地窟以冷水於內攏之令澄少頃取

飲之見本草陶隱居註謂之地漿 荷葉殺蕈漿

仲食諸菌中毒悶亂欲死治方 人糞汁飲一升 土漿

飲二升 大豆濃煮汁飲之 服諸吐利藥並解 取糞

汁法截淡竹去青皮浸滲其中取筒中汁是也 食楓樹

茵而笑不止亦治以前方

世蕈毒吐瀉不止者用細茶芽研細以新汲井花水服神

效 治蕈毒欲死方用石首魚頭或鯛頭亦炒白水煮汁

灌之卽愈 治中蕈毒用笆竹不入泥者數節煎湯飲之

立效

醫學綱目卷三

卷三

仲誤食芋煩毒欲死亦治以前方其芋根山東人名魁芋  
人種芋三年不收亦成野芋並殺人 蜀椒閉口者有毒  
誤食之戰人咽喉氣欲絕或吐下白沫身體痺冷急治之  
用肉桂煎汁飲之 或食薪或食地漿 或濃煮豉荳汁  
飲之並解

仲食躁或躁方用豉煮濃汁飲之 鈎吻與芹菜相似誤  
食殺人解之用蕷朶八兩水六升煮取二升分溫二服鈎

吻生池傍無他異其莖有毛以此別之 菜中有水莨朶

葉貞而光有毒誤食之令人狂亂狀如中風或吐血治之  
用甘草煮汁服之解 春秋二時龍帶精入芹菜中人偶  
食之爲病發時手青腹滿痛不可忍名較龍病治之用餳

糖二三升日兩度服之吐出如蜥蜴三五枚瘥 食苦瓠  
中毒治之用黍穠煮汁服之解 飲食中毒煩滿治之用

苦參三兩苦酒一升半煮半沸三上三下服之吐食出卽  
瘥或以水煮亦得 星角湯亦解 食食多不消心腹  
堅滿痛治之用鹽一升水三升煮令鹽消分三服當吐出  
食便瘥

奇病

雜方

項上生瘡如櫻桃大有五色瘡破則項皮斷但逐日飲牛  
乳自消 寒熱不止經日後四肢堅如石以物擊之一似  
鍾磬聲日漸瘦惡用茱萸木香等分煎湯飲卽愈 大腸  
頭出寸餘痛苦直候乾自退落又出名爲截腸病若腸盡  
乃不治但初截寸餘可治用脂麻油器盛之以麝坐之飲  
大麻子汁數升愈 口臭中腥臭水流以碗盛之有鐵色  
蝦魚如粳米大走躍不住以手捉之卽化爲水此肉壞矣  
任意饌食雞肉愈 腹上麻痺不仁多煮葱白吃之自愈

婦人小便中出大糞名交腸服五苓散效如未盡愈可  
用舊幞頭燒灰酒服之 兩足心凸如腫上面生黑色荳  
瘡硬如釘子釘了履地不得脛骨破碎眼髓流出身發寒  
顛唯思飲酒此是肝腎氣冷熱相呑用炮川烏頭末傅之  
煎韭子湯服效 凢腹脹經久忽瀉數升晝夜不止服藥  
不驗乃爲氣胎用益智子煎濃湯服立愈 四肢節脫但  
有皮連不能舉動名曰筋解用酒浸黃蘆三兩經一宿取  
出焙乾爲末每服二錢酒調下服盡安 玉莖硬不痿精  
流無歇時時如針刺捏之則脆乃爲腎漏漏疾用韭子破  
故紙各一兩爲末每服二錢水一盞煎至六分日三次飲  
之愈則住服 咽喉間生肉層層相疊漸漸腫起不痛多  
日乃有竅子臭氣自出遂退飲食用臭橘葉煎湯連服愈  
腹中如鉄石臍中水出旋變作虫行之狀繞身匝啄痒

痛難忍撥掃不盡用濃煎蒼朮湯浴之以蒼朮末入麝香少許水調服痊。眼前常見諸般禽蟲飛走以手捉之則無乃肝膽經爲疾用酸枣仁羌活玄明粉青箱子花各一兩爲末每服二錢水一大盞煎至七分和滓飲一日三服

大腸虫出不斷斷之復生行坐不得用鵝虱末水調五錢服之自愈。

眼睛垂出至鼻如黑角色痛不可忍或時

時大便血出名曰肝風用羌活煎汁服數盞自愈。

腹中

有物作聲隨人語言用板藍汁一盞分五服服之又名應

聲虫當服雷丸自愈。有飲油五升以來方始快意長得

吃則安不爾則病此是髮入胃被氣血裹了化爲虫也用

雄黃半兩爲末水調服虫自出如虫活者置於油中遂巡

間連油潑之長江治臥於床四肢不能動只進得食好

大言說喫物謂之失說。物望病治法如說食豬肉時便云

八醫學綱目卷五

癸

你喫猪肉一頓病者聞之卽喜遂置肉令病人見臨要却

不與喫此乃失他物望也當自睡中涎出便愈。

手十指節斷壞唯有筋連無節肉虫出如燈心長數尺餘遍身綠

毛卷名曰血餘以茯苓胡黃連煎湯飲之愈遍身忽皮

底混混如波浪聲痒不可忍振之血出不能解謂之氣奔

以人參苦杕青鹽細辛各一兩作一服水二碗煎十數沸

去渣飲盡便愈。

眼白渾黑見物依舊毛髮直如錶條雖

能飲食不語如醉名曰血潰用五靈脂爲末二錢酒調下

因着艾灸訖大痴便退落瘡內鮮肉片子飛如蝶形狀

騰空去了痛不可忍是血肉俱熱用大黃朴硝各半兩爲

末水調下微利卽愈。

臨臥渾身風出約至五升隨至血

肉俱壞每宿漸多痒痛不可言狀雖喫水臥床晝夜號

舌尖出血不止身齒俱黑唇動莫開但飲鹽醋湯半數碗

卽安 眼赤鼻張大喘渾身出班毛髮如銅錢乃胃中熱

毒氣結於下焦用白礬滑石各一兩爲末作一服水三碗

煎至半令不住飲候盡乃安 有虫如蟬走於皮下作聲

如小兒啼爲筋肉之化用雷丸雄黃各一兩爲末摻在猪

肉片上炙熟喫盡自安 手足甲忽然長倒生肉刺如錐

痛不可忍喫葵菜自愈 臭中毛出晝夜可長一二尺漸

漸粗圓如繩痛不可忍雖忍痛摘去一莖卽後更生此因

食猪羊血過多遂用乳香硇砂各一兩爲末以飯圓梧桐

子大空心臨臥各一服水下十粒自然退落 面上及遍

身生瘡似猫兒眼有光彩無膿血但痛痒不常飲食減少

久則透脛名曰寒瘡多喫魚雞韭葱自愈 脇破腸出臭

穢急以香油摸腸用手送入煎人參枸杞淋之皮自合矣

喫羊腎粥十日卽愈 口臭中氣出盤旋不散涎如黑墨

醫學綱目卷五

奎

色過十日漸漸至有胸與肉相連堅勝金鐵無由飲食此  
多因瘧後得之煎澤瀉湯日飲三盞連服五日愈 徒身  
忽然肉出如錐既痒且痛不能飲食此名血癰若不速治  
潰而膿出以赤皮葱燒灰淋洗喫豉湯數盞自安 眉毛  
搖動目不能視交睫喚之不應但能飲食有經日不效者  
用蒜三兩取汁酒調下卽愈 毛竅節次血出若血不出  
皮脹膨如鼓須臾眼鼻口被氣脹合此名脈溢飲生姜水  
汁各一二盞卽安 忽然氣上喘不能語言口中汁流吐  
逆齒皆搖動氣出轉大則悶絕蘇復如是名曰傷寒併熱  
霍亂用大黃人參末各半兩水三盞煎至一盞去滓熱服  
可安 口內生肉球臭惡自己惡見有根線長五寸餘如  
鉗股吐痰出飲食了卻吞其線以手輕捏痛徹於心困不  
可言用水調生麝香一錢服三日驗 濁身生燎泡如甘

棠梨每箇破出水內有石一片如指甲大泡復生抽盡肌肉不可治急用荆三稜蓬莪术各五兩爲末分三服酒調連進愈

頭面發熱有光色

他人手近之如火燒用蒜汁

半兩酒調下吐如蛇狀遂安

人自覺自形作兩人並臥

不別真假不語問亦無對乃是離魂

用辰砂人參茯苓濃

煎湯服之真者氣爽假者化也

男子自幼喜飲酒至成

丁後日飲一二升不醉片時無酒呴呼不絕全不進食日

就羸弱令其父用手巾縛住其手足不令動搖但扶少立

卻取生辣酒一壘就於其子口邊打開其酒氣衝入口中

病者必欲取飲堅不可與之須臾口中忽吐物一塊直下

壘中卽用帀封裹壘口用猛火燒滾約酒乾一半卽開視

之其一塊如猪肝樣約三兩重週回有小孔如針眼不可

數計棄之於江飲食復舊雖滴酒不能飲矣夜間飲水誤吞水蛭入腹經停月餘日必生下小蛭能食人肝血腹痛不可忍面目黃瘦全不進食若不早治能令人死用田中乾泥一小塊小死魚三四箇將豬脂溶攪勻用巴豆十粒去殼膜研爛入泥內爲丸菉豆大用田中冷水吞下十九小兒只用三丸至五丸須臾大小水蛭一時皆瀉出郤以四物湯加黃芪煎服生血補理方見婦人門通治類婦人產後

忽兩乳伸長細小如腸垂下直過小肚痛不可忍危亡須更名曰乳懸將川芎當歸各二斤半斤剉散於瓦石器內用水濃煎不拘時候多少溫服餘一斤半剉作大塊用香爐熾火逐旋燒烟安在病人面前卓子下要烟氣在上不絕令病人低頭伏卓子上將口鼻及病乳常吸烟氣直候如前法煎服及燒烟薰吸必安如用此二料已盡雖兩乳

畧縮上而不復舊用冷水磨草麻子一粒於頭項心上塗片時後洗去則全安矣 婦人臨產服催生藥驚動太早未嘗離經而用力太過以致盲膜有傷產後水道中垂出肉線一條約三四尺長牽引心腹痛不可忍以手微動之則痛欲絕先服失笑散數服仍用老姜三斤淨洗不去皮於石鉢臼內研爛用清油二斤拌勻入鍋內炒熟以油乾焦爲度先用熟絹段約五尺長摺作結方令穩重婦人輕輕盛起肉線使之屈曲作一團納在水道口郤用絹袋兜裹候油姜稍溫傅在肉線上熏覽姜漸冷又用熨斗火熨熱使之常有姜氣如姜氣已過除去又用新者如此熏熨一日一夜其肉線已縮大半再用前法越兩日其肉縮盡入腹中其病全安郤再服失笑散芎歸湯補理切不可使肉線斷作兩截則不可醫 有人患勞瘵兩年諸藥不效

一日聞肉味其腹痛不可忍又恐傳染移在空房候其自終經停三日病者腹痛氣息將絕思憶肉味之急忽有人惠雞子一枚其病人俛仰取火低頭取瓦銚煎熟吹火屢燃屢滅鼻中如有所碍將熟間忽噫噴一聲有紅線一條自鼻中出牽抽約二尺長趨下瓦銚中病人知是怪物急用碗覆煎銚中盡力燒火不住其銚欲裂方住火開銚視之乃是小虫一條頭目皆具已煅死如鐵線樣卽以示家人後棄之於江其病卽安 居民逃避石室中賊以烟火熏之欲死迷悶中摸索得一束蘿蔔嚼汁下咽而甦又炭烟熏人往往致死含蘿蔔一片著口中烟氣不能毒人或預曝乾爲末備用亦可或新水搘爛乾蘿蔔飲之亦可自行擗穿斷舌心血出不止以米醋用雞翎刷所斷處其血卽止仍用真蒲黃杏仁去皮尖硼砂少許研爲細末煉

密謂藥稀稠得所喻化而安 身上及頭面內上浮腫如  
蛇狀者用雨滴皆礮上苔痕一錢水化開塗蛇頭上立消  
治病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下痢宣  
急治下部不曉此者但攻其上不以爲意則下部生虫食  
其肛爛見五臟便死燒艾於管中熏下部令烟入更入少  
雄黃良方<sub>外敷後</sub> 有人被蜘蛛咬腹大如孕婦其家棄之乞  
食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日而平古今錄驗 療妖魅  
猶鬼病人不肯言鬼方鹿角屑搗散以水服方寸匕卽實  
言也外臺秘要 蛇龍子生在芹菜上食之入腹變成龍子須  
慎之用錫梗米杏仁乳餅煮粥食之三升曰三服吐出蛟  
龍子有兩頭 鬼擊之病得之無漸平者如刀刺狀胸腹  
腹內切痛不可抑按或卽吐血衄血下血一名鬼排斷白  
犬頭取熱血一升飲之

醫學綱目卷之三

三

丹馬希聖年五十餘性嗜酒常痛飲不醉糟粕出前竅便  
溺出後竅六脈皆沉澁與四物湯加海金沙木香枳榔木  
通桃仁服而愈此人酒多氣肆酒升而不降陽極虛酒濕  
積久生熱煎熬血乾陰亦太虛陰陽偏虛皆可補接此人  
中年後陰陽虛時暫可活者以其形實酒中穀氣尚在三  
月後其人必死後果然

杭州圖書館