

卷
三十二
三十三



浙江圖書館



浙江圖書館

浙江圖書館
藏書

醫學綱目卷之三十二 傷寒部

合病併病汗下吐後等病

喘 身重 難轉

遺尿 盜汗 面赤

壞病 戰慄振搖 筋惕肉瞤

又手冒心 驚 悸


藏結 結胸 痞氣 同異

痞 煩 煩躁

欬 小便不利 小便難

尸厥 欬 噫 噦

無汗 瘡狀 頭汗



表裏
 合病必下利
 太陽少陰合病
 宜表
 太陽少陰合病
 宜和
 少陰少陽合病
 宜下

舌白胎

動氣

鼻衄

下血

唾血

畜血

吐血

短氣

心痛

除中

下重

身熱惡寒身寒惡熱

瘧

癰

狐惑

百合

合病併病

圖

太陽與陽明合病必自下利葛根湯主之不下利但嘔者
 葛根加半夏湯主之太陽與少陰合病自下利者與黃芩
 湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之少陽與少陽合病必
 下利脈滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯論見下利
 二陽併病太陽出汗不微日轉屬少陽自汗不惡寒太陽

太陰明併病

太陰不罷宜

汗

太陰証罷宜

下

太陰少陰併病

宜刺

表裏

喘發熱脈浮

為表

多汗胸滿者

麻黃

有汗者桂加枳

杏嘔欬者青

龍

証者不罷面赤燥煩風氣者更發汗則愈論見面赤

二陰併病太陰証罷潮熱讖語者下之則愈論見讖語

太陰與少陰併病煩強眩冒心下硬如結胸者刺胸

俞肝俞論見項強

喘

太陰與少陰明合病喘而胸滿者不可下麻黃湯主之

右許學士云有人病傷寒脈浮而長喘而胸滿身熱

頭痛腰脊強鼻干不得卧予曰太陽少陰明合病仲景

法中有三証下利者葛根湯不下利嘔逆者加半夏

喘而胸滿者麻黃湯也治以麻黃得解

太陰病頭痛發熱身疼惡風無汗而喘者麻黃湯

論見

太伏病脉浮無汗而喘者麻黃湯論見不大便

喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳

桂枝加厚朴杏子湯

桂枝去皮 芍藥各二兩 甘草六分 厚朴六分

杏仁 去皮十七个

右剉如麻豆大每服五六分水一盞半生姜五片肥

棗二个劈破啞至八分温服覆取微汗

表不解乾嘔散熱欬喘者小青龍去麻黃加杏仁湯論見

伏明病潮熱汗出不惡寒短氣腹滿而喘者大承氣

湯論見不大便。註云在裏而喘者腹滿在表而喘者腹滿

小便不利大便乍難乍易微熱喘胃不能卧者大承氣湯

喘潮熱腹滿
大小秘脉沉
為裏

小便不利大便難者易散熱喘胃不能臥者大承氣湯

脈沉喘滿反散汗大便難者裏實 論見識語

散汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻

黃杏子甘草石膏湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃四兩 杏仁五十个 甘草二兩 石膏半斤

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸

藥者取二升去查溫服一升

散汗後飲水多必喘以水灌之亦喘

汗後脈沉喘便大便難譫語者裏實 論見識語

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻

黃杏子甘草石膏湯

汗後喘

汗出無大熱者

麻杏

飲水多者傳

飲

脈沉大便難

者裏實

下後喘

無大熱者麻

杏

利不止脈促者

葛苓

表未解者桂

杏

直視脈絀者

生澁者死

額汗大不利

下後利不止脈促而喘汗者葛根黃連黃芩湯論見下利

太陰病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏仁湯主之

右許學士云有武臣為寇執置舟中曠朽數日得

脫乘飢恣食良久解衣捫虱次日遂傷寒自汗而

高不利一豎作傷食而下之一豎作解衣中邪而

汗之雜治數日漸覺昏困上喘息高予診之曰太

陰下之表未解微喘者桂枝加厚朴杏仁湯此仲

景之法也指令豎者急治藥一啜喘定再啜熱熱

微汗至脫身涼而脈已和矣豎曰某平生不曾用

仲景方不知其神捷如此

傷寒吐下後不大便潮熱若劇則不識人循衣摸

傷寒吐下後不大便潮熱若劇則不識人循衣摸

診
但欲寐息高
厥灸不還反喘
死汗油髮潤
喘不休死

陰飲

床微喘直視脈弦者生澀者死 論見循衣摸床

濕家下後額汗微喘大小便利者死 論見作痛

少冰病息高者死 論見欲寐

厥冷無脈灸之不還反微喘者死 詳見厥利

直視識語喘滿死 論見識語

脈浮洪汗出如油髮潤喘不休者為命絕 論見大法

喘續法

活陰症喘促者逐冰丹主之 四支逆冷喘促入口便住逐冰丹方見冰毒

病人小渴與水劇飲之致停飲心下滿結喘死甚衆

當以五苓散或陷胸丸主之方見渴及結育

身重

身重為狀
身重汗出不惡
寒面垢遺尿
者合病多眠脈
浮者風溫也
脈浮緊者宜和
潮熱者宜下

身重汗出惡
風寒

三秋合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語
遺尿發汗則譫語下之則額上生汗手足逆冷若自
汗出者白虎湯主之

風溫 為病脈浮汗出身重多眠鼻息鼾論見
風溫。活人云葶藶湯主之

陽明病脈浮緊口苦咽燥腹滿而喘發熱汗出不
惡寒身重忌汗忌燒針忌下論見自汗。註云此

証宜和解

秋明病汗出不惡寒身重氣短腹滿而喘有潮
熱者大承氣湯論見不大便

風濕脈浮身重汗出惡風者防已黃芪湯主之

凡暑脈浮身重汗出惡風者防已黃芪湯主之

脈浮者風溫

脈虛而渴者中暑

身重無汗

脈浮緩不欲

寐者青龍

下後心悸者

自汗解

身重難轉

側身重眼

花冰狗辛

防已 一兩 甘草 半兩 白朮 七分半 黃芪 一兩一分 石膏

右剉如麻豆大每抄五升七生姜四片大棗一個水

盞半煎八分去渣溫服良久再服後當如虫行皮

中從腰下如冰後宜被上又以一被繞腰以下溫

令微汗則差

喘者加麻黃半兩 **圖** 胃中不和者加芍藥三分

氣上沖者加桂三分 **五** 下有陳寒者加細辛三分

中暑病發熱惡寒身重痛汗出足冷脈虛而渴者

忌汗下針芫蒂散白術湯論見中暑

傷寒脈浮緩身不疼但重無少陰但欲寐無吐利

証者大青龍湯

四肢重為水

執濕風

身重不能轉

側為執濕

腹滿汗者白

虎腹滿煩驚

者柴胡

身疼不能轉

則為風濕

下後身重心悸者不可發汗當自汗也乃解 論見悸

身重難轉側 二法見難轉側

水少易為病身重少氣少腹急引水中拘挛上冲

胸眼花者燒裊散論見水少易

少水病腹痛小便不利四肢沉重疼痛下利者真

武湯論見下利

難轉側

三伏合病腹滿身重難轉側汗出者白虎湯

論見身重

下後胸滿煩驚小便不利論識語身重不可轉側者

柴胡龍骨牡蛎湯論見驚

風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脈浮

月... 不能轉

風濕相搏身... 體疼煩不能自轉... 側不嘔... 不冒... 脈字

執

遺尿身重汗

出腹滿識語

者合病

多眠息野者

風濕

衛氣虛

脈微惡寒

數欠遺尿

者衛氣虛

忌

欬而遺尿忌

汗

虛而泄者桂枝附子湯論見身疼

遺尿

三伏合病腹滿身重難轉側識語遺尿汗出者白

市湯論見身重

風濕病脈浮汗出身重多眠若下之則小便不利

直視失溲論見風濕



寸口脈微而瀦微者衛氣不行瀦者榮氣不治榮衛不

能相將三焦無所仰身体痺不仁榮氣不足則煩疼口

難言衛氣虛則所惡寒數欠三焦不歸其部上焦一歸

噫而詐吞中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則遺溲

欬而小便利若大小便者不可散汗汗出則四肢厥逆冷

診

火後失溲者

欲解

直視遺尿

者腎絕

半表半裏

太陰病火熨其背大汗出後讖語十餘日振慄下

利欲小便不得反嘔而失溲者此為欲解也

論見讖語

遺溲狂言目反直視者此為腎絕論見大法

盜汗

三陰合病脈浮大上閉上但欲眠睡目合則汗

出明病脈但浮者必盜汗出論見胃實。成無已

云陰邪故也明病當作裏實而脈浮者云必盜汗是猶有表

太陰病脈浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡

寒者表未解也論見結胸

右成無已云傷寒盜汗者非若雜痛之虛是由邪

氣在半表半裏使然也何者若邪氣一切在表干

氣在半表半裏使然也何者若邪氣一切在表干

於衛則自然汗出也此則邪氣侵行於裏外連於
表邪及睡則衛氣行於裏乘表中陽氣不微津液
得澁故但睡而汗出覺則氣散於表而汗止矣其
証悉當和表而已

面赤

表
面熱赤
燥煩短氣
脈澁者汗微
身痒脈微
遲者少虛
口噤背反張
者瘥病
赤班如錦咽
痛者臥毒

二臥併病太臥初得病時發其汗汗先出不微曰轉屬
臥明續自微汗出不惡寒若太臥証不罷者不可下下
之為遲如快可小發汗設面色緣正赤色者臥氣拂
鬱在表當解之重之若發汗不微不足言臥氣拂鬱不
得越當汗不汗其人燥煩不知痛處乍在腹中乍在四
肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不微故也更發

汗則愈何以知汗出不徹以脉瀋故知也目昏不遠徹而面赤燥煩短氣者不足言陽氣怫鬱正是當汗不汗也脉浮而遲面熱赤而戰慄者六七日當汗出而解反背熱者差遲、為無汗不能作汗其身必痒也

太陰病如瘡狀若脉微惡寒面反有熱色而身痒者桂枝麻黃各半湯小汗之論見發熱

身熱是寒面赤卒口噤背反張者瘧病

陽毒面赤斑、如錦紋咽喉痛者唾膿者升麻鱗

甲湯方論見伏毒

少陰病下利清穀手足厥逆脉微欲絕身反不惡

寒面赤色者通脉四逆加荤白湯論見下利

虛寒
面赤下利肢
厥脉微者為

脈微者為

寒面赤色者通脈四逆加葱白湯論見下利

禁
面赤忌下

虛

虛

下利清穀脈沉遲面少赤手足微厥者必鬱冒

汗出解論見下利

陽明病面冷赤色者不可攻之論見便硬

壞病

太陰病三日已發其汗若吐若下若溫針仍不解者

此為壞病桂枝不中與也觀其脈証知犯何逆隨

証治之

下汗針後讖語柴胡証罷者為壞病知犯何逆以法

治之論見往來寒熱

壞病續法

山居治傷寒壞症獨參湯好人參一兩煎服

海
汗証大汗大下後亡汗于外亡血于內上而津脫下而
液脫津液兩亡宜以羊肉湯補之矧此証者豈可不
溫補哉此其傷寒太陰証振搖與真武湯一例外之
汗病至此尚溫沉內之冰候豈得不補耶

韓氏曰產脫血虛者宜用羊肉湯傷寒汗下太過亡汗失
血若只用救逆効必遲矣與羊肉湯為効神速病人
面色雖見傷是客熱上焦中下二焦冰氣已盛若調
得下焦有汗上焦汗氣下降丹田知所歸宿矣氣有
高下病有遠近証有中外治有輕重各適其至所為
病八九日汗下太過二脈沉細無力多蹇是卧惡明
與人身皮有粟時戰如瘧宜羊肉湯主之

與人声皮有粟時戰如瘡宜羊肉湯主之

羊肉湯方

雷陽

白芍藥各五

里附子

厚朴製去皮脂

生姜二斤

龍骨半斤燒酒煮

牡蠣

一斤燒赤

桂七斤半

右為粗末每一服

二斤羊肉四斤葱白

五寸去黃心同剉爛以水五升

一升今之

一大盞也熬至一半

以來慮紋去查分三服飲之

戰慄振搖

成無已云戰者身為之戰振慄者心戰是也戰之與慄戰

外而慄內也又云戰為正與邪爭、則鼓慄而戰振

但虛而不至爭故止得動而振也戰之與振振輕而

戰重也

虛

汗後振為虛

振搖者桂

苓

振地真

武陽

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上沖胸起則頭眩脈沉

緊若汗則動經身為振、搖者在苓桂枝白朮甘草湯

在苓桂枝白朮甘草方

在苓二兩 桂枝一兩半 白朮一兩 甘草一兩

別如麻薑大每服五錢水一盞半煮至八分去渣溫前

太陽病若汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤

動振、欲擗地者真武湯主之方見少陰附下利

右孫北云太乙宮道士周德真患傷寒若汗出多驚

悸目眩身戰掉欲倒地衆醫有欲若汗者有依風冷

有用冷藥解者病皆不除右孫云曰太陽經病得汗

早欲解不解者太陽經欲解後作汗腎氣不足汗不

早欲解不解者太陽經欲解復作汗腎氣不足汗不
來所以心悸目眩身戰遂作寒貞武湯服之三服微
汗自出遂解蓋真武湯附子白朮和其腎氣腎氣得
行故汗得來也若但太陽者惟能乾涸血液爾仲景
云尺脈不足榮氣不足不可以汗以此知腎氣情則
難得汗也明矣

許學士云鄉里有姓京者以鬻繩為業子年三十初
得病身微汗脈弱惡冷鑿以麻黃藥與之汗遂不止
若熱心多驚悸夜不得眠謔語不識人筋惕肉瞤振
振動搖鑿又進驚風藥予曰強汗之過也仲景云脈
微弱汗出惡冷不可服青龍湯服之則筋惕肉瞤此
為逆也惟真武湯可救進此三服伏以清心丸竹葉

湯數日遂令隨心竹葉未考

下之後復發汗必振寒脈微細所以然者以內外俱虛故也
亡血家不可發汗發汗則寒慄而振

太陽病火熨其背大汗出火熱入胃發譫語十餘

日振慄自下利者此為欲解也論見譫語

脈厚擊按之芤當戰而汗出解脈芤為虛是以發戰

脈厚為在表當汗出戰也論見大法

太陽病脈陰陽俱停等必振慄汗出而解論見發熱

凡柴胡証下之若柴胡証不罷者復與柴胡湯必蒸蒸

蒸而振發熱汗出解

脈浮而遲面熱赤而戰陽者當汗出解也反發熱者

未汗戰振為
欲解

脈遲而遲面熱赤而戰陽者當汗出解也反者熱者

脈遲不能作汗其身必痒也 論見面赤

諸乘寒者則為厥鬱胃不仁口急不能言戰而慄也

論見大法

陰中於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故邪中於

陰也

筋惕肉瞤

圖

書

虛

筋惕肉瞤

汗後者真武

建中

汗下吐後者

難治

汗後筋惕肉瞤者眩悸振、欲擗地者及大青龍湯
後厥逆者俱宜真武湯方論見戰掉及表熱者動氣
在左頸眩汗不止者活潑用防風白朮牡蠣散次服
建中湯論見動氣

汗下吐溫針後急膚瞤動胸煩面色青黃者難治論

虛

虛執

下後驚

成痿論見瘧

又手胃心

散汗過多又手自胃心下悸欲得按者桂枝甘草湯方論見悸

驚

圖

少陽耳聾目赤胸滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚論見口苦

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣主之

半夏二合 大棗六分 柴胡四升 生姜一升半

半夏二合 大棗六分 柴胡四升 生姜一分半

人參一兩半 龍骨一兩半 鈔丹一兩半 桂枝一兩半

茯苓一兩半 大黃二兩 牡礪一兩半

剉如麻豈大每服五升水一盞半者至八分去渣溫服

傷寒脈浮豎以火迫劫之亡陽必驚狂起卧不安者桂

枝去芍藥加蜀朮牡礪龍骨故違湯主之 古人云豎以

火迫卧床下或周身用火迫劫汗出或慰而成大邪者是也

桂枝三升去皮 甘草二兩炙 生姜三兩 牡礪五兩炒

龍骨四兩 大棗十二升 蜀朮三升去腥

剉碎每服五升水一盞半者至八分去渣溫服

太陽傷寒者加溫針必驚也

風濕熱浮自汗身重多眠善被火者微則發黃劇則

驚
傷寒後虛
熱

如驚癇轉瘦瘵論見風濕

陽明病脈浮緊口苦咽干腹滿者加燒針必吐暢煩
燥不眠論見自汗

驚悸續法

海藏茯苓丸治傷寒後或用口勞倦四支羸弱心忪驚悸

吸、短氣

茯神

麥門冬去心焙

熟乾地黄各二兩

牡丹皮

人參

黃耆各七兩半

桂

甘少

牛膝

澤瀉

右為末煉蜜搗和三五通肝丸如梧子

大倉前溫臣下二十九丸

犀角湯治傷寒後伏熱在心怔忡驚悸不得眠睡

犀角易傷寒後伏熱在心怔忡驚悸不得眠睡

犀角屑 半升 茵陳蒿 七升 茯苓 二升 芍藥

麥門冬 煮冬 二升 山梔仁 半升 乾生地黃 焙 二升

為末服 五升水 一盞半 姜二片 竹葉 三七片 同煎 食後服

麥門冬 茯苓 飲子 治傷寒後心神恍惚 不得卧

麥門冬 去心 煮 茯苓 去皮 知母 焙 芫花 乾

酸棗仁 微炒 陳皮 去白炒 枳殼 甘草 炙 冬 二升

為粗末 每服 五升水 一盞半 生姜 五片 同煎 日三服

少陰心悸者曰逆不可與也 心悸者大懼水也 惟腎欺

心故為心悸者是足經上手經也 若與曰逆陽變無形

中惡候生矣 故先以甘草茯苓陽導其濕 次以曰逆陽

濕之者為心悸 全無手經火全入足水也 心悸在濕未

宜禁
宜導濕
禁濕

去終至于斃故不放溫之溫之則壞矣

悸

虛實

汗後心悸

心悸者真武

心欲按者桂

瀝語者調胃

膈悸者蒼桂

汗後心下悸者頭眩身瞤動振、欲擗地者真武湯

也論見戰振者又手自冒心者後條桂枝甘草湯也

若瀝語胃不和煩悸者活人用調胃承氣湯也論見口苦

若膈下悸者後條茯苓桂枝甘草大棗湯也

若汗過多其人又手自冒心心下悸欲按者桂枝甘草

湯主之

桂枝甘草湯

桂枝 芍藥 甘草 二兩

右二味以水一盞半煮取八分去渣頓服

右二味以水一盞半煮取八分去渣頓服

若汗後其人胸中悸者欲作奔豚在苓桂枝甘草大棗湯

主之

在苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓八分 甘草炙 桂 大棗一枚半

右作二服以甘爛水二盞先煮茯苓減之乃納諸藥

煮取一盞去渣溫服日三作甘爛水法取水斗許置

大盃內以杓揚之水上有珠子五六顆相逐取用之

脈浮數者若當汗出而愈若下之身重心悸者不可發

汗當自汗出乃解所以然者尺中脈微此裏虛須表

裏津液自和便自汗出愈

少陽病耳聾胸滿不可吐下吐下則悸而驚者註云

下後心悸
身重尺微者
自愈
悸發者氣血
虛

小便不利及
飲水多而悸
者停飲

先悸後煩及
脈結而悸者
氣虛

氣血虛

往來寒熱胸脇滿心下悸而小便不利者小柴胡去

黃芩加茯苓方論見往來寒熱

太陽病小利者以飲水多必心下悸小便少者必苦裏

急也

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之

傷寒脈結代心動悸炙甘草湯主之

炙甘草湯

甘草短

生薑三斤

人參半斤

生地黄四斤

桂枝三斤

麥門冬一斤

大棗五十

麻仁合

制碎每服五升水一盞半入酒半盞煎至八分去渣細

霍乱心悸
厥逆心悸

脉沉
结胸藏结皆

寸沉
寸沉为结胸
寸浮为结胸
寸沉为结胸
寸浮为结胸
寸沉为结胸
寸浮为结胸

阿膠一片容尽温服日三服

霍乱吐利心悸者理中丸加茯苓

手足厥冷而悸者茯苓甘草湯手足逆而不温者
悸者曰逆散加桂

藏结與结胸痞气大同小異

問曰痛有结胸有藏结其状何如答曰按之痛寸脉浮沉

脉沉者曰结胸也何藏结答曰如结胸状飲食如故時

時下利寸脉浮沉脉小細沉緊者曰藏结舌上白胎滑

者難治王朝奉云可刺関元穴

藏结無陽証不往来寒热其人反静舌上滑胎者不可

攻也 王朝奉云可刺関元穴服小柴胡湯

病者陽下之成

結胸

病者陰下之成

痞氣

心下滿而痛者

為結胸

滿而不痛者

為痞氣

表裏寒熱

一云藏結之症寒而不熱其人反靜此藏結也仲景謂

病脇下素有痞連在臍傍引入少腹陰筋者此名藏結死

病者於陽而反下之熱入目作結胸病者於陰而反下

之目作痞所以成結胸者以下之大早故也

傷寒五六日嘔而反熱者柴胡湯証具而它以藥下之

柴胡証仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸

蒸而振却若熱汗出兩解者心下滿而硬痛者此為結

胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中

與之宜半夏瀉心湯

結胸

大陽病重者汗而後下之不大便五六日舌上燥而渴

大陽病重者下而後下之不大便五六日舌上燥而渴

結胸皆

下滿痛

大結胸不樓而

痛

小結胸按之則

痛

水結胸頭無

汗大挾

日晡所小有潮熱從心下至小腹硬滿而痛不可近者

大陷胸湯主之

太陽病腹脈浮而動浮則為風數則為熱動則為痛數

則為虛頭痛若熱微盜汗出而反惡寒者表未解也豎

及下之動數變遲高內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣

燥煩心中懊惱陽氣內陷心下因鞅則為結胸太陽胸

陽主之若不結胸但頭汗出餘無汗劑頸而還小便不

利身必黃也丹溪云註曰胃中空曰短氣燥煩曰脈

浮大陷胸湯不可輕用

浙

大陷胸湯

大黃 一兩半 去皮 錦文者為末

芒硝 一兩 八分半

甘遂 一字者連珠者為細末

右水二盞煮大黃至八分去渣下硝一沸下甘遂末

溫服得快利

小結胸湯病正在心下按之則痛脈浮滑者小陷胸湯主之

半夏湯洗秤之半

黃連一分瓜蒌一個用豕之一

右制如麻豆大小水二盞先煮瓜蒌至一盞半夏諸藥

取八分去渣溫服未和再服微解黃芩便安也

孫兆云工部郎中鄭忠厚曰患傷寒胸腹滿面色

黃如金諸翰林醫官高議畧不定推議曰胸滿可

下然脈浮虛召孫兆曰諸公難疑不用下桑鄭之

福也下之心死其有一二服桑服之必差遂下小

福也下之心凡其有一二脈柔服之必差遂下小

陷胸湯尋利其病遂良明日面色改白京城之人
曰孫尚藥乃孫真人後身耶

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但
結胸無大熱者此為小結在胸脇也但頭微汗出者大
陷胸湯主之活人云小結胸小半夏加茯苓湯小柴胡
湯去大棗加牡蛎主之



傷寒六七日結胸熱實脈沉而緊心下痛按之石鞭者

大陷胸湯主之云岐云三証陷胸皆日晡潮熱

病在陽應以汗解之反以冷水熨之若霍之其熱被却
不得去彌更益煩由上粟起意欲飲水反不喝者服文
蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱証者與三物

熱
熱
寒宜倍胸無

小陷胸湯白散亦可服

桔梗三分 巴豆一分去皮心熬黑研如脂 貝母二分

右件三味為末內巴豆更於臼中杵之以白飲和服
強人半外瀉者減之病在膈上必吐在膈下必利下
利進熱粥一椀利過不止進冷粥一椀

右熱實結胸寒實結胸活人不拘寒熱但是用陷
胸湯不差者皆用枳實理中丸鷹手而愈

結胸項亦強如柔瘕狀下之則和宜大陷胸丸結胸項
強者大陷胸丸不項強者大陷胸湯

大黃二兩 葶藶二分 芒硝一分 杏仁三升去皮尖炒思

右搗羅二味內杏仁芒硝令研如脂和散取如彈丸

結胸項

右攝羅二味內者仁是稍令研如脂和散取如彈丸

一枚甘遂末一字白蜜少許水二盞半者取一盞半

頓服一宿乃下如不下再服

右海藏云大陷胸湯太陽入本藥也大陷胸丸陽

明藥也小陷胸湯少陽藥也大陷胸盜熱實大陷

胸丸並喘小陷胸治痞

心下滿痛如結胸狀若頭項強痛眩冒者刺大椎

肺俞肝俞若汗下後頭項強痛者執小便不利者

桂枝去桂加茯苓白朮湯方論並見項強若婦人

經水未執除脈遲譴語刺期門論見譴語

太陽病二三日不能卧但欲起心下必結脈微弱者此

本有寒分也反下之若利止必作結胸未止者曰日

心下滿痛如結

胸狀

眩冒者刺大椎

小便不利者蒼

朮

經水未執除者

刺期門

診

太陽下後利止

必厚者必結者

結胸煩燥者死

急

結胸脈浮下之

死

虛

設下未成結胸者急用理中解之

若下之此作協熱利也 四日後下之五日行文也

太陽病下之 脈浮者必結胸也 論見大法

太陽少陽併病而下之或結胸心下硬下利不止水

漿不下其人心煩結胸証甚具煩燥者亦死

結胸証其脈浮大者不可不下之則死

結胸續法

活若設下了初未成結胸者急類與理中湯自然解了更

不作結胸蓋理中治中焦故也此古人亦說不到後因人

消息得之若大段轉損有厥証者並用四逆湯便如胃

中雖和傷寒未退者即候日數足可下却以承氣再下

之蓋前下得未是故也

之蓋前下得未是故也

此投仲景陷胸不
含者

以枳實理中治

大小結

以羊夏在卷

治水結

西晉催行功云傷寒結胸欲絕心鬲高起手不得近用

大陷胸湯皆不差者此是下後虛逆氣已不理而毒復

上攻氣毒相搏結於胸中當用枳實理中丸先理其氣

次療諸疾古今用之如神應手而愈

枳實理中丸治傷寒結胸欲絕心鬲高起手不得近

枳實

十六片
麩炒

茯苓

人參

白朮

乾姜炮

甘草

炮已上各二兩

右搗羅烏末煉蜜為丸如雞子黃大每服一丸熱湯

化下連進二三服豁然渴者加瓜蒌根一及下利者

加牡礪二兩煨

海藏增損理中此王朝奉云大小陷胸湯丸不愈者宜與之

人參

白朮

芫蕪

牡礪各三升

甘草炙三升

乾薑炒五升

枳實炒三升

黃芩

去核五

升

右為末煉蜜丸如彈子大湯一盞吞服不効復與之
不過五六丸胸中豁然用藥神速未嘗見也

渴者加瓜蒌根

汗者加牡礪

活水結在胸脇間為名結胸其証頸微汗出但結胸無大

熱者小半夏加茯苓湯小柴胡去棗加牡礪主之

^{的案}俞伯道忽患微熱心下滿腹有汗不能解衆醫以為濕

病者用表藥者謂食在膈者治之皆不愈召孫、至曰

用半夏茯苓湯遂痊衆問其故曰頸有汗心下滿作溫

証乃水結胸膈也水既去其病乃愈且如濕氣心下滿

証乃水結胸膈也水既去其病乃愈且如濕氣心下滿

自當遍身汗若有食心滿豈得頭有汗若是言表身不

疼下惡寒表証在何故凡水結於胸膈頭必有汗宜

小半夏加茯苓湯方見喉門

穿結散大實大滿心胸高起氣塞不通者為結也

饘酥 射香 輕粉 巴豆少許另研

右再研至細以孩兒乳汁為丸黍米大二粒姜湯下特無

本事婦人傷寒血結胸膈揉而不可撫近海珍散

海珍 滑石 甘草各二兩 芒硝半兩

右為末每服二錢雞子清調下

小腸通利則胸膈血散膈中血聚則小腸壅小腸壅膈

中血不流行宜此方小便血數行宜桂枝紅花湯若

實

氣塞不通

宜穿結

血結胸膈

珍

針灸

其汗則愈 活人書云此方是非仲景然其言頗有理姑存之
治結胸灸法

巴豆十四个

黃連 七寸去皮用

右搗細津唾和成膏填入臍心以艾灸其上腹中有
声其病去矣不拘壯數病去為度終灸了便以溫湯
浸手帕拭之恐生瘡也

摘英傷寒結胸

先使人以手於心蔽骨下正痛處左畔揉之以毫針
刺左畔支溝正坐側臂取之二分次刺左間使各曰
双間刺次刺左行間卧取之針入六分此支溝行間
穴下針至分数内挫針令病人五吸次外挫針三呼

穴下針至分數內推針合病人五吸次外推針三呼

又決白樞針五吸訖長呼一口气出針即右畔一辟
結胸立効古研依上刺之慢呼吸停膳用針獲時
而愈無有不効

云岐傷寒結胸痞氣

胸中結痞 湧泉 中冲 太陵

心中結痞 隱白 少冲 神門

胃中結痞 女高 大冲 并上中

下院寫之

通玄結胸身黃 湧泉 漸

摘英血結胸面赤火燥口乾消渴胸中疼痛不可忍

期門 關元 姪娘不得刺關元胎元不出子母便亡慎之

集成傷寒胸膈痛

期門

太棧

近世治結胸多行金針元用瓜黃陽起石者若寒實結

胸或有差者熱實結胸必死也

痞

虛實表裏

心下痛痞閉者

者大黃瀉心

瀉寒下者

加附子

瀉寒表裏

解者先解

表

心下痞按之濡其脈閉上厚者大黃黃連瀉心湯主之

伍人云結胸血痞閉脈沉者瀉心脈浮者大黃黃連

瀉心湯

大黃黃瀉心湯

大黃二黃連三五黃芩一五

右三味以麻沸湯二升燻之一時久後去渣分溫再服

右三味以麻沸湯二升漬之一時久候去渣今區再服

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

附子瀉心湯

下大黃二兩 黃連

黃芩各二兩

附子一枚

炮去皮脂破別煮取汁

三味剉碎百沸湯二大盞執漬之一時久絞去渣內

附子汁分溫再服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻

痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大

黃黃連瀉心湯後人云表証未解心下妨悶者非痞也

謂之支結柴胡桂枝湯主之胸脇滿微結小柴胡加干

姜牡礪湯主之

傷寒嘔而發熱者柴胡湯証具而以他藥下之若心

心下痞硬瀉心
心下痞硬瀉心
心下痞硬瀉心

嘔利者管草
噫利者加生姜

下滿而不痛者此為痞宜半夏瀉心湯論見結胸痞同異

半夏瀉心湯

半夏 一升一分 湯洗七次

黃芩

人參

甘草 各一升半

黃連 半升 大棗 六分

干姜 一升半

制碎每服五升水一盞半煮至八分去渣溫服

半夏瀉心湯若甘加草即後條甘草瀉心湯治痞

鞭嘔利也若加生姜即後條生姜瀉心湯治痞鞭

噫氣下利也

傷寒中風鑿反下之其人下利日數十行穀不化腹

中當鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安鑿見心

下痞謂病不尽復下之其痞益甚此非結熱但以

心下痞鞭嘔

利下後煩者甘

草

胃中不和容九上逆故鞭也甘草瀉心湯主之

未下熱不解

者大柴

表解者下藥

心下痞硬下

利後未解者

生薑

下後表裏

解者桂苓

胃中虛客九上逆故鞭也甘草瀉心湯主之

甘草瀉心湯即半夏瀉心加甘草分四服

甘草二兩炙 黃芩 乾薑各兩半 半夏一兩一分

大棗六枚 黃連半兩 人參一兩半

剉碎每服五分水一盞半煮至八分去渣溫服酒人

云伊尹湯論甘草瀉心七味監本無人參旋落之也

傷寒若熱汗出不解心下痞硬嘔吐而下利者大柴胡湯主之

心下痞硬嘔逆下利者表解身涼脇痛十棗湯方詳別

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞硬乾噎食具脇下

布小氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之

生薑瀉心湯即半夏瀉心加生薑也

下之痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以

生薑二兩

黃芩

甘草炙各一兩

人參一兩

干薑二兩

半夏一兩

黃連一兩

大棗三枚

剉碎每服五升中一盞早者至七分去渣溫服

去陽病針証未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞

鞭表裏不解者桂枝人參湯主之

桂枝人參湯

桂枝

二兩三分 別剉用

甘草二兩三分 炙

白朮一兩

人參二兩

干薑二兩

剉碎每服五升中二盞者至一盞內桂枝者七分去渣溫

服日再服夜一服

傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭寬氣不除者旋覆

代赭石湯主之臣人云有旋復代赭湯証其人或效逆

虛者先服四逆湯胃寒者先服理中丸次服旋復代赭湯

代 諸 石 湯 主 之 虛 人 云 有 旋 復 代 諸 石 湯 証 其 人 則 夜 逆
氣 虛 者 先 服 四 逆 湯 胃 寒 者 先 服 理 中 丸 次 服 旋 復 代 諸 石 湯

旋復代諸石湯

旋復花 三分 人參 半兩 生薑 一兩一分 代諸石 一分

甘草 三分 半夏 三分 湯洗 大棗 二升

劉 碎 每 服 五 分 水 一 盞 半 煮 至 八 分 去 滓 溫 服

疝 解 後 心 下 痞 硬 噎 氣 差 不 下 利 者 此 條 旋 復 代

諸 湯 也 差 下 利 者 前 條 生 姜 瀉 心 湯 也

胸 中 痞 鞭 氣 上 冲 咽 不 得 息 者 瓜 蒂 散 差 心 下 痞

鞭 脇 痛 氣 上 冲 咽 眩 暈 者 成 痿 方 論 並 見 氣 上 冲 心

本 以 下 之 故 心 下 痞 與 瀉 心 湯 痞 不 解 其 人 渴 而 口 燥

煩 小 便 不 利 者 五 苓 散 主 之

心 胸 痞 硬 氣 上 冲
脈 滯 心 不 解 渴 而 小 便 秘 者 差

心下支結似痞
而表未解
支結者柴胡
加桂
痞滿者先
表後攻
心下滿似痞而
手足冷
脈結心煩者
宜吐
脈細頭汗
者宜和
診忌
病色青黃膚
臈維心
脈浮緊按下
成氣痞
心下硬脈浮大
屬裏者宜攻
忌汗

發熱惡寒身疼表証未解者心下支結妨悶者皆胡

桂枝湯也方論見發熱者心下痞而外喘者即前

條先以桂枝解表復用大黃黃連瀉心攻痞也

心下滿似痞而手足厥冷者脈乍結乍緊心煩飢

不食食者瓜蒂散若脈沉細頭汗惡寒大便硬者

小柴胡湯論見厥

太陽病發汗遂發熱惡寒日復下之心下痞表裏俱

虛陰陽氣並竭陰獨復加燒針因胸煩面 色青

黃膚臈者難治今色微黃手足溫身愈

脈浮而緊而反下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳

脈浮而大心下反硬有熱屬臈者攻之不令發汗屬府

屬胃者忌攻

屬胃者忌攻

忌攻

下硬胃實為

攻

虛滯

枳實理中治痞

最良

痞先用枳枳

行氣

者不令溲數溲數則大便硬汗多則熱多汗少則便難
脈遲尚未可攻

陽明痞胃實心下硬滿者不可攻三論見胃實

痞續法

治傷寒本無痞壅渣汗盪及下之遂成痞枳實理中丸

最良

審知是痞先用枳梗枳殼湯尤妙緣枳梗枳殼行氣下
高先用之無不驗也

枳梗枳殼湯治傷寒痞多胸滿欲絕

枳梗

枳殼 楚炒去穰各二兩

劉如麻豆大以水二盞煎至一盞去渣今二服

表裏
吐下後懊懷
而損
無燥亦便
者枳子豉
有燥亦不便
者大承小承

煩

發汗吐下後虛煩不得眠者必反覆顛倒心中懊
懷枳子豉湯主之若少氣者枳子甘草豉湯主之若嘔
者枳子生薑豉湯主之

陽明病共下之共外有執手足溫不結胸心中懊懷飢
不能食但頭汗出者枳子豉湯主之

陽明病脈浮緊若下之則胃中空虛客氣動而心中
懊忪舌上胎者枳子豉湯論見自汗

下利後更煩按之心下濡者為虛煩也宜枳子豉湯
枳子豉湯陶岳云煩者氣也燥者血也氣主肺血主腎故

以枳子治肺煩用香豉以治腎燥

莫息之狀豎者不曉是何訛予診之日此懊忪佛

以施子治肺煩用香豉以治腎燥

嘆息之狀鑿者不曉是何証予診之曰此懊惱佛

鬱二証俱作也胃中有燥屎者承氣湯下燥屎者

二十餘按得利而解仲景云陽明病下之心下懊

懷微煩胃中有燥屎者可攻又云痾者小便不利

大便乍難乍易時有微熱鬱不得卧者有燥屎

也承氣湯主之素問云胃不和則卧不安此夜所

以不得眠也仲景云胃中燥大便鑿者必譫語此

所以有時若譫語也非燥非煩非寒非痛所以心

中懊惱也聲如嘆息而時若一聲所謂外氣佛鬱

也燥屎得除大便通利胃中安和故其病悉去也

不得眠而煩論見不得眠

不得眠而煩

胸滿而煩

未汗下者柴胡猪

膚

汗下後者桂姜

意牡

胸窒者枳豉

心下滿而煩

胸腹滿而煩

臥起不安者

枳朴有婦人

者承大

胸滿欲吐者調

胸滿而煩若不汗下並往來寒熱者小柴胡湯

方論見往來寒熱並下利咽痛者猪膚湯方論見下利

若汗下後並往來寒熱者柴胡桂姜湯方論見往來寒

並身重不可轉側者柴胡龍骨牡礪湯方論見驚

散汗若下之而煩熱胸中窒者枳子豉湯主之

心下鞭滿而煩若滿而不痛者腹中雷鳴下利者

甘草瀉心湯脇痛氣冲咽胃眩者成瘵方論見瘵

若滿痛下利不止水漿不下者併病方論見瘵

傷寒下後心煩腹滿臥起不安枳子厚朴湯主之

枳子厚朴湯

枳子曰枚 厚朴一尺切 姜汁炙 枳實一枚切

胸膈大吐者調

抱子日救

字朴

五切姜汁矣

枳實

一枚切

已上三味以水一盞半煮取八分去渣溫服得吐者

止後服

腹滿而煩若有燥屎者前条大承氣也若大便澹

胸痛欲吐先此時極吐下者調胃承氣湯也論見嘔

嘔而鬱微煩若與小柴胡湯嘔不止者大柴胡

也若極吐下後胸痛便澹腹滿者調胃承氣也論見嘔

太陰病吐之但太陰病當惡寒今反不惡寒不欲近衣

此為吐之內煩也

微數之脈不可下矣浙則煩論見大法

病欲解者必當先煩乃有汗而解論見大法

太陰病初服桂枝湯反煩下解者先刺風池風府却

嘔而鬱
微煩

先煩後悸為
熱
先悸後煩為
虛

與桂枝湯則愈

傷寒散汗解半日許復煩脈浮數者可更散汗宜桂枝

湯主之

病人脈已解而日暮微煩以病新差人強與穀脾胃氣
尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈

吐利汗後脈平小煩者以新虛不勝穀食也

論見吐利

心悸而煩若少飲汗後讖語胃不和煩悸者活人

用調胃承氣也論見口苦若二三日心中悸而煩者

小建中也論見悸

心煩而渴方論見渴

少陽病但欲寐而煩若自利而渴小便白者活人

已施子四叔破
香散半丹

少壯病但欲寐而煩若自利而渴小便白者活人

肥枳子 四枚破

香豉 半升

右用水二盞先煮枳子至一盞內豉同煮取七分去

渣溫服得快吐血後服

枳子甘草豉湯

右於枳子豉湯中加半升餘甘草依前法得吐止後服

枳子生姜豉湯

右於枳子豉湯中加生姜一升二分依前法得吐止後服

傷寒證以丸藥攻下之身熱不去微煩者枳子干姜湯主之

枳子干姜湯

枳子 四枚切

干姜 半升切

右二味以水一盞半煮取如分去渣溫服得吐者止後服

胃實證
吐下後者亦
承不吐下者
調胃承

散汗吐下後心中懊惱而煩者無燥屎大便柔者此
条枳子豉湯也若有燥屎不大便者後条大小承氣湯
太陽病若吐若下若散汗微煩小便數大便自硬者此
小承氣湯和之愈陽明病下之心中懊惱而煩胃中
有燥屎者可攻腹微滿初頭鞭後必澀不可攻之若
有燥屎者宜大承氣湯方見陽明潮熱

胃實不大便心煩者吐下後者此条大小承氣也
若不吐不下者調胃承氣也 論見胃實

許學士云有人病傷寒八九日身熱無汗時、請
語時曰下利大便不通三日矣非燥非煩亦寒亦
痛終夜不得卧但心中無曉會處或時發一聲如

自利便暑
四逆

用四逆湯也 論見欲寐若白通湯後下利不止厥逆

無脈乾嘔者白通加猪膽汁也若脈緊至七八日

自利脈緊變暴微手足反溫者微解也 方論並見下利

若惡寒身蹇時煩欲去衣者可治也 論見但欲寐

手足厥冷而煩若脈乍結乍緊心中滿飢不能食

者瓜蒂散吐之也 論見厥若下利無脈乾嘔者白

通加猪膽汁也 論見下利

煩躁

煩燥有表裏証 若汗不微太陰証不罷其人面赤

方論見黃芩 若汗不微太陰証不罷其人面赤

躁煩短氣者更黃汗則愈也 論見短氣

表裏

已汗下脉沉微
無太热宜温

得病二三日脉弱無太热柴胡証煩躁心下鞭至四
五日雖能食以小承氣湯少與微和之令小
至六日承氣湯一升若不大便六七日小便少者難
不能食但初頭硬後無必澹未定成硬攻之必澹須
小便利氣定硬乃可攻之且大承氣湯証云無太热
証為無表証也無柴胡証為無半裏半裏証証也

煩躁不大便繞臍痛者有時者有燥屎也

下之後復發汗盡日煩躁不得眠夜時安靜不嘔不
渴無表証脉沉微身無大热者干姜附子湯主之

干姜附子湯方

干姜一两

附子一枚生用

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

海藏云服姜附湯有二法

一法當熱服手少陰心也水包火熱服以接心火

身表寒盛外火少也寒從外生熱從內消譬如凍

死寒在外也

一法當寒服足少陰腎也邪入水冷服以類腎水

身表微熱內水多也熱從外生寒從內消譬如飲

冷寒在內也

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之

茯苓四逆湯

茯苓一兩

人參八分

附子

一枚生用去皮破八片只用二片

煩躁心下硬

去下非結胸宜

小承

已下是結胸宜

宿胸

曰火煩燥者

火下後燒針

者者骨壯

汗後振利者欲

解

甘草 二分

干姜 三分 去字

右剉如麻苳大作一服水一盞半煮至八分去渣溫服

煩躁心下鞭痛短氣蹻煩者大陷胸也若結胸証

悉具煩躁者死也方論見結胸

火下下之曰燒針煩躁者桂枝甘草龍骨牡礪湯主之

桂枝 半兩 去皮

甘草 炙

牡礪 熬

龍骨 各一兩

剉碎每服五升水一盞半煮至八分去渣溫服

太陽病以火熏之不得汗其人必躁到不解必清血名

為火邪

大陽病火熨其背大汗出火熱入胃中水竭躁

煩必發讖語十餘日振慄下利者欲解也論見讖語

陰

煩躁厥逆

先煩後躁可

治

先躁後煩死

獨躁不煩死

煩躁厥逆若吐利者吳茱萸湯論見吐利若脈微

者灸厥陰厥不還死也論見厥

躁煩四逆若吐利者死也論見吐利若不煩而躁四

逆脈不至死也論見厥不得臥者死也論見下利

成無已云所謂煩躁者謂先煩漸至躁也所謂躁

煩者謂先發躁而迤邐復煩者也從煩至躁為熱

未有漸不煩而躁者為怫怫然便作燥渴此為陰

盛隔陽也雖大躁欲於泥水中卧但飲水不得口

者是矣此氣欲脫而爭蘇猶灯將滅而暴明也蓋

內熱曰煩謂中心鬱煩也外熱曰躁謂外氣熱躁

也內熱謂有根之火故但煩不躁及先煩後躁者

煩必發識語十餘日振慄下利者欲解也論見識語

躁無暫安為

歲厥

靜而復煩為

蛇厥

言

煩躁不食數日

後便白欲食者

金煩滿者便

血

初欲卧不煩至

六日煩躁不卧

死

陰

皆可治也外熱為無根之火故但躁不煩及先躁

後煩者皆不可治也

歲厥蛇厥煩躁方論見厥

躁無暫安而厥者為歲厥靜而復煩吐衄而厥者

宜烏梅丸方論見厥熱少厥微不欲食煩躁數日

小便白者熱除也若飲食者食若厥而嘔胸脇煩

滿者便血論見厥

少陰病但願欲卧不煩至五六日變自利煩躁不

得卧死論見欲寐

煩躁續法

活病人身冷脉細沉疾煩躁而不飲水者陰盛隔陽也宜

不飲水身
冷脉沉望
寒

服四逆煩躁
渴

服霍亂散須臾躁止得睡汗出即差大燄散丹砂丸並主
之丹砂丸見活人書

霍亂散治陰盛隔陽煩躁不飲水

附子一枚炮熟取用冷灰焙細研入真臘茶一大錢和勻

右為細末分作二服以書一大盞煎至六分臨熟入蜜

半匙放溫或冷服之須臾躁止得睡汗出即差

海藏已寒丸此丸不上陽生於下治陰証服四逆輩胸

中發躁而渴者或數日大便秘小便澀亦服此丸上不

躁大小便自利

肉桂 茯苓各五兩 良姜 烏頭 炮各七錢 附子 炮

干姜 炮 芍藥 茴香 炒各二兩

陰中伏陽

右等分爲細末糊爲丸桐子大溫酒下空腹食前五
七十丸八九十丸亦得酒醋爲糊俱可

本事破陰丹治陰中伏陽煩躁之脈沉伏方見陰毒

頃年鄉人李信道得疾之脈沉伏不見深按至骨則
弱豎有力頭疼身溫煩躁指末皆冷中滿惡心更面
鑿矣鑿者不識止供調氣藥子曰診視曰此陰中伏
陽也仲景法中無此証世人患此者多善用熱藥以
助之則爲陰邪隔絕不能導引真陽反生客熱用冷
藥則兩伏真火愈見消鑠須用破散陰氣導達真火
之藥使火升以降然後得汗而解予擾此藥二百粒
作一服冷鹽湯下不半時煩躁狂執手足躁擾其家

大驚予曰俗所謂梅陽須臾稍定略睡身已大汗自

陰陽
表不解而欲
屬太陽宜表
龍

大驚予曰俗所謂換陽漢史稍定略睡身已大汗自
尿達旦方止身凉而病除

欬

傷寒表不解心中有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或
噎或小便不利小腹滿或喘者小青龍湯主之

小青龍湯

麻黃 三分用布沸湯泡去薑汁焙干秤 五味子半兩

芍藥 三分 干姜 三分 甘草 三分 細辛 三分

桂枝 三分去皮 半夏 三分

右剉如麻豆大每服五升水盞半者八分去渣溫服

若微利者去麻黃加芫花如彈子許赤色者半

往來寒熱而
 效屬少陽是也
 胡
 表解胃實而
 效屬陽明
 小利嘔飲者
 頭痛頭眩欲
 食者則痛
 但欲定味而效屬
 少陰
 小閉肢重者
 真武

夏者加瓜蒌根三分

若噎者去麻黃加附子一分半炮

若小便不利小腹滿者麻黃加茯苓一兩

若喘者去麻黃加杏仁三分去皮尖

效而往來寒熱胸腹滿心煩喜嘔者小柴胡去人

參大棗生姜加五味干姜也方論見往來寒熱

效而表解胃實屬陽明病若反無汗小便利而嘔

手足厥者必苦頭痛苦頭眩不惡寒能食者必咽

痛論並見月實

效而但欲寐屬少陰病若下利腹痛小便不利四

支重痛者真武湯加五味細辛干姜也若不利六

變嘔渴不眠者
 七日變飲
 嘔渴不得眠者
 精水渴也
 若下利瀉語

變嘔渴不眠者
猪苓譏語小便
難者火氣
逆者四逆散

診忌
欬厥散死
欬忌散汗

虛實
補散隨証
加減

七日變欬嘔渴不得眠者猪苓湯也若下利譏語

小便難者被火氣劫也若四逆者四逆散加五味

干姜也方論並見欬深

傷寒欬逆上氣其脈散者死其形損故也

欬而失小便者不可發汗、出則四肢厥冷論見遺尿

欬續注

丹崇慶和尚曰醉飽後發熱嗽而右脇痛渴不安眠

柴胡 黃芩 白朮 陳皮 桔梗

木通各象 人多 麻黃象半 甘少二分

右分三帖

雲岐傷寒汗下後喘咳不止恐傳肺痿補肺散

肺實氣治

人參一兩 五味子五錢 桑白皮二兩 欬冬花 蛤蚧一對

右為末每服五錢沸湯一盞調服

傷寒汗下後咳嗽肺虛音嘶敗者河膠散

薯蕷一兩 河膠一兩炒書人多一兩 五味子一兩

麥門冬一兩煮 白朮一兩 干姜三錢 炮 桂枝象

杏仁煮去皮尖

右剉末每服七錢水二盞入烏梅一錢同煎服

傷寒汗下後喘嗽痰濕氣滯瀉邪氣逆者桔梗湯

桔梗 桑白皮各一兩 甘草 貝母 河黎勒各五錢

右剉末每服五錢水二盞入五味子烏梅肉各一錢

同煎

小便不利

表裏

小便不利

表不解者青

芩苓木胸脇

滿者柴胡芩

牡大難不卧

者大承氣湯

小便不利而渴

小便不利

小便不利表不解者乾嘔設抵而效少腹滿者小青

芩去麻黃加茯苓也方論見效若汗下後仍項強設抵

又下滿痛者桂枝去桂加茯苓白朮也方論見項強

小便不利胸脇滿者往來寒熱未汗下者小柴胡去

黃芩加茯苓也汗下後者柴胡桂姜也方論見往來寒熱

若煩驚譫語身重不可轉側者柴胡加朮骨牡蛎也

方論見驚

小便不利大便下難乍渴喘冒不能卧者大承氣也

論見不得卧

小便不利而渴者脈浮數發熱者五苓散猪苓湯方

脈浮者五苓

猪苓

發汗者柴胡

茵陳

小便不利閉結

疼痛惡風

不屈伸者甘

麻沉大便硬者

五苓

小便不利發

汗

小便不利身黃

証勿治

小便不利無條

陰

論見渴者發汗者柴胡姜桂湯茵陳蒿湯 方論見往

未寒熱。茵黃

小便不利閉結疼痛若痛不得屈伸汗出惡風身腫

者屬風濕宜甘附子湯也若脈沉緩大便反快

者屬濕痺活人用五苓散也方論見身痛

小便不利發汗者脇滿者柴胡桂姜也方論見往來寒熱

若茵黃茵陳蒿也方論見發黃

小便不利發黃方論見黃

大下之後後發汗小便不利者亡津液故也勿治之得

小便利必自愈活人云若大渴引飲汗利之

小便不利但欲寐者屬少陰若腹脹痛下利膿血者枳

小便不利但欲寐者屬少陰若腹脹痛下利膿血者枳

小便不利但欲寐者屬少陰若腹瀉下利膿血者地

小便不利但欲

寐

利膿血者地

四肢重者真

武

四肢逆者四逆

診

陰

小便不利厥逆脈

微者返陰

針灸

表裏

花湯也腹痛下利四肢重痛者真武湯也 方論見下利

四肢逆者四逆散加茯苓也 方論見但欲寐

陽明病小便不利濼然汗出若欲食者食不能食者

欲作固瘕者寒氣治積也

小便不利續法 書

活陰証小便不利手足逆冷脈微細者不宜服利小便矣

滑藥但服返陰丹并濟下石門穴灸之 方論見陰毒返陰丹

集或倍寒小便不通取陰谷陰陵泉

倍寒後小便不利見小便不通門

小便難

汗後小便難若太陽發汗遂漏不止者則惡風小便

汗後小便難
惡凡難屈伸

者桂附

火劫陽汗者身

黃欬衄

火劫陰汗者欬

利瀉語

下後小便難

脇痛身黃小便

難

未下宜柴胡

下後忌柴胡

虛寒

難四支難屈伸宜桂枝附子湯也 方論見自汗若太陽

以火劫汗者別邪凡被火熱血氣流溢身黃湯盛欬

劫陰虛小便難也 論見自汗若少陰以火劫汗者別

欬而下利瀉語也小便難也

下後小便難有一若脈遲浮弱惡風寒下之者別脇

滿身黃項強小便難也 論見脇痛若陽明痛胃實發

抵惡寒脈浮緊下之者別腹滿小便難也 論見胃虛

脇痛身黃小便難若陽明胃實未下者宜小柴胡也

若下後不食項強者忌柴胡也

尸厥鬱胃

少陰脈不至腎氣微少精血奪氣促迫上入胸鬲宗氣

反聚血待心下陽氣退下熱滯陰散與陰相動今身不
仁此為尸厥當刺期門臣聞

太陽病先下之而不愈曰復發汗以此表裏俱虛其人

目至胃冒家汗自出食所以然者汗出表和故也得裏

和然後復下之得裏和三字中間必有脫簡得字

當是若字之誤裏和當是裏未和蓋脫落盧字未也

下利清穀脈沉遲其人面赤身有微熱者必鬱冒汗

出解論見下利

小便不利大便乍難乍易喘胃不能臥者大厚氣湯

論見不卧

諸乘寒者則為厥鬱胃不仁口急不能言戰慄也
論見大結

眩冒心下鞭若不經汗下吐而項強者為併病但利
大椎肺俞肝俞論見項強

善汗下吐後脈復氣上冲咽者成痿論見氣上冲
少陰病但欲寐下利止而眩冒者死論見欲寐

胃續法

每歲傷寒傳至五六月間漸變神昏不語或睡中獨語一

二句目赤唇焦舌乾不飲水稀粥逆之則燕不與則不

思六脈細數而不洪大心下不痞腹中不滿大小便如

常或傳至十日已未形見如醉鑿見神昏不已多用大

承氣湯下之則誤矣蓋不知此熱傳手少陰心經也然

又未知自向經而來者曰本太陽傷風以風為陽邪傷衛

又未知自何經而來卷曰本太陽傷風以風為陽邪傷衛
陰血自躁熱畜膀胱壬病逆傳于丙壬是太陽膀胱水
也丙丁兄妹由是傳心心火上逼而重肺所以神昏也
而肺為清肅之藏內有火邪故令神昏宜梔子黃 芩
黃連湯若脈在丙者導赤散脈在丁者瀉心湯若誤凍
南散乃氣中之血藥也如右手寸脈沉有力者則可用
也或用犀角地黃湯近於是也本方所說若無犀角以
升麻代之是陽明經藥也是解陽明經熱藥也若脈浮
沉有力者是丙丁俱有熱也可以導赤散瀉心湯各半
服之則宜矣此証膀胱壬傳丙足傳手經也下傳上也
丙傳丁合如表傳裏也壬傳丁者艮之離也越經傳也
又為腑臟也活人云傷寒只傳足經不傳手經者此言

濕痰

不盡意也。有從足而傳于者，何以知之？經云：傷寒或止在一經，或同傳一二經，不可一途而取之。但視其脈，其証治之此活法也。其食則咽者，邪不在胃也。不食則不思者，以其神昏故也。邪熱既不在裏，候用承氣下之，其死必矣。脈在丙者，脈浮也；脈在丁者，脈沉也。脈丙丁俱有熱者，脈浮沉俱有力也。

噫

噫而心下痞硬，不下利者，旋復代赭湯；若下利者，生

姜瀉心湯。方論見痞。

噫續法

雲岐：傷寒噫氣者，何氣使然？答曰：胸中氣不交故也。少陰

經至胸中交於厥陰水火之相傳而有聲故噫氣也
如聖加枳實湯

甘草 桔梗 枳實 炒三各五分

右剉末每服五分入五味子半分水煎

傷寒汗下後喘而噫氣者如聖如人參藿香杏仁湯

甘草 桔梗 人參 藿香各五分 杏仁 三个去皮尖

右剉細每服五分水煎

噦

傷寒大吐大下之極虛復極汗出者以其人外氣怫鬱

復熨之水以散其汗目得噦所以然者胃中寒冷故也

胃中虛冷不能食者飲水則噦

與小承氣湯入腹中不轉失氣者不可攻之攻之必
脹滿不食其水則噦論見潮熱

本渴而飲水嘔者食穀者噦論見脇痛

陽明病胃實不能食者攻其熱必噦論見胃實

濕家頭汗出背強惡寒欲覆被向大者下之早則噦

論見体痛

太陽病以火劫發汗血氣流溢身黃欲衄頭汗腹滿

諛語甚者至噦捻衣摸床小便利者可治論見頭汗

傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈

陽明胃實脈弦浮大短氣腹滿脇痛嗜卧身黃小便

難有潮熱時、噦脈浮者小柴胡湯若不尿腹滿

雖有潮熱時、噦脈浮者小柴胡湯若不尿腹滿

加噦不治論見胃實

噦續法

寒熱

活活

胃實者橘皮

干姜

陽証者橘皮

竹茹

活胃寒所生橘皮干姜湯羌活附子散半夏生姜湯退陰

散主之若服藥不差者灸乳直下一指許三壯若婦

人則屈乳頭向下尽處是穴然亦有陽証者小柴胡

湯橘皮竹茹湯方見雜病噦

橘皮干姜湯

橘皮 通草 干姜 桂心 甘草 炙 人参 一升

右剉如麻豆大每服四升水一盞煎至六分去滓温

服日三服

羌活附子散方見雜病噦

潔古海藏注

便熱失下者

便秘脈實宜

承氣

便軟脈微宜

瀉心

半夏生薑湯治噦欲死

半夏一升一分 生薑二升切

右水二盞益至八分去滓

海傷寒欬逆脈散死仲景之言不虛偽大抵脈流失下生

一厥逆喉中陰不內便軟惟宜用瀉心便硬尤宜大承氣

二藥神功作者誰卓桓潔古為良劑

潔古咳逆者火熱奔急上行而肺陰不內何其當哉故便

秘者大承氣陽下之便軟者瀉心陽主之

海火陰咳逆者失下也陰消特盡陽逆上行使陰不內也

然陰盡陽亦特盡也吸入腎與肝陽逆上行陰入不內

故為之惡候生也或兼以舌穿語言不正而反昏胃與

故為之為候生也或黃以舌平語言不正而反昏胃其

咽痛者少陰也連下之宜大瀉氣湯

若陽極脈微將盡者不宜下宜服瀉心湯養陰退陽而

已如不用瀉心湯涼膈散去硝黃清肺亦可

若脈左浮右沉實非表也裏極則反出于表也何以然

咳逆者強右脈實知少陰裏也飲水過多心下痞而

渴逆者五苓散主之別無惡候是也

何以脈浮為表浮之實大沉之損小是為表也浮之實

大沉之亦然即非表也邪入已深矣內熱當沉反浮陽

極復之表也

浙

陰証者內已伏陰陰氣大甚腎水擅權肝氣不生胃火

已病丁火又消所有也行相火寒邪迫而萃集於胸中

身實如冰厚湯不欲近者為

亦欲盡也故令人發熱大渴引飲并去蓋覆病人得覺
熱他人按執之身體肌肉骨髓血脉皆寒此火即無相
之火也故用丁香干姜之類執藥溫胃其火自下
勻氣散

川烏頭大者三个炮製去皮脂

右為末每服二分黑豆二十一粒砂糖雞頭仁大亦

煎承熱細飲之

本事治陰毒吃速方

川烏頭 干姜

附子已上俱炮

肉桂 芍藥

炙甘草 半夏 吳茱萸

陳皮 大黃

右各等分為末每服一分水一盞生姜三五片煎至

右冬等分為末每服一分水一盞生姜三五片煎至

七公去濁滓取清汁服之
治傷寒汗後吃逆噎

白豆蔻湯

白豆蔻一分 石蓮肉炒 茴香各一分 丁香半份

人參半兩 枇杷葉五片去毛炙

右細剉用水四盞生姜十片煎二盞去滓空心溫分

二服

房姜湯

橘皮 房姜 桂枝 當歸各一分

杏仁手不 甘草一分 檳榔三個 麻黃半兩

右粗末水四盞姜十片棗三個同煎至二分去渣下

檳榔末更煎三沸通口服二盞未已再一副

龐老云傷寒吃噎不止是陰陽氣升降欲作汗升之不下故胃氣上逆為吃噎無休止宜此方

無汗

書

太陽病發熱惡風寒體痛脈浮緊無汗其人若喘者麻

黃湯也若煩躁者大青龍湯也若項背強者葛根湯也

方論見發熱若小便少氣冲胸口噤者劉涓子亦葛根湯

也論見虛若自汗者金也論見自

陽明病胃家實此當多汗若反無汗少者有四証脈浮而喘者邪尚在表宜麻黃汗之身如虫行痒者久虛宜建中之類小便利而喘者寒邪宜溫之小便不利發黃

建中之類小便利而服者寒邪宜退之小便不利發黃者於熱宜箇疎利之也 論見胃家實

無汗身痺其人若脈微惡寒面反有熱色者桂枝麻黃

各半湯也 方論見發熱

若脈浮遲面赤戰惕發熱者遲為無限不能作汗也 論

見面赤若陽明胃實身如炙行者久虛也 論見胃實

無汗小便不利其人若身黃頭汗渴引水漿或懊惱者

茵陳湯也 方論見發黃

若身黃脇痛冥于嗜卧有潮熱脈浮者小柴胡也 方論

見胃實若項強發熱心下滿痛桂枝去桂加茯苓白朮

也 方論見項強

無汗禁忌若脈浮緊身痛者忌桂枝也 論見大法若脈

浮散熱表不解者忌白虎也論見渴若少陰欲寐但厥者忌散汗強必動其血也論見欲寐凡散汗如服一劑病証猶在當再作本湯與之至有不肯汗出者服三劑乃解若汗不出者死病也論見大法

無汗續法

瘧疾傷寒在表散熱惡寒頭項痛腰脊強無汗尺寸脈浮合谷五分候通身汗出即止針此穴解表散汗大效

集成傷寒無汗

合谷補

復留寫

雲收又法

手陽明有商陽合谷

手太陽有腕骨陽谷

足少陽有俠谿

足陽明有厲兌

手陽明有商陽合谷
手太陽有腕骨陽谷

足少陽有俠谿

足陽明有厲兌

手厥陰有勞宮皆隨經辨脉刺之

又十二經索皆可

擗英傷寒交汗不出

風池

俠谿

書魚際

散脉中二今雷王呼

經渠 二分

內庭應時出汗

瘧狀

太陽病如瘧狀一日二三度發其人若脉微緩不嘔

噎便者欲愈也若脉微澁寒面有熱色身痒者挂技

麻黃各半也方論見發熱

服挂技湯大汗出脉洪大者挂技湯如前法若形如瘧

日再發者汗出必解宜挂技二麻黃一湯

挂技二麻黃一湯

挂技八分半 芍藥 五分半 麻黃 三分一字 大棗 二个

生姜 豕半 杏仁 八分度夫 甘草 半兩

右坐如麻豆大每服五分水一盞半並至八分去渣

病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明

也脉實者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與大承氣湯

發汗宜挂技湯

婦人寒熱經水適斷者為熱入血室其血必結故使

如瘧狀發作有時小柴胡湯主之 論見婦人傷寒

頭汗

頭汗小便不利其人若胸脇滿往來寒熱者柴胡桂

陽

頭汗不利

胸滿者柴胡桂

枝黃耆首蔞

湯也

下血者刺期門

懊憹者梔子豉

被者必薑

頭汗心下滿

便硬脈細者

柴胡無之熱

者陷胸

頭汗

頭汗小便不利其人若胸脇滿往來寒熱者柴胡桂

姜湯也方論見往來寒熱若散黃渴引水漿者首蔞

湯也方論見散熱

陽明胃實頭汗其人若下血譫語者為熱入血室宜

刺期門也論見譫語若下後手足溫不結胸心中懊

憹飢不欲食梔子豉湯也方論見煩若被火額上汗

出小便下利者必散黃也論見胃實

頭汗心下滿其人若脈沉細微惡寒手足冷口不欲

食大便硬者小柴胡湯也論見厥方見往來寒熱若

水結胸無大熱者大陷胸湯孫此改用半夏茯苓湯

也

診

大後頭汗便

難

微者身粘腹

喘不便

甚有擦之握

頭汗不流死

下後額汗亦

利死

忌

濕家頭汗惡

寒忌下

診治

太陽病中風以大刺發汗邪風被火熱血氣流溢失其

常度由陽和熏灼其身發黃陽盛則欲飲陰虛小便難

陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出前額而後腹滿微

喘口乾咽爛或不大便必則譫語甚者 噦手足躁擾

捻衣摸床小便利者可治

閉格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死

濕家關節疼痛下之額上汗出微喘小便利者死下

利不止亦死濕家頭汗出欲被覆向大者羞下之早

則噦胸滿小便不利羞上如胎也 論見身痛

頭汗續法

孫兆凡以結胸脇間頭必有汗注以半夏茯苓湯

脈病人表實裏虛者不閉則陽氣上出汗見於頭凡

孫北氏不結胸脇間頭必有汗治以半夏茯苓湯

活病人表實裏虛玄府不開則陽氣上出汗見於頸凡
頸汗出者五內乾枯胞中空虛津液少也慎不可下
下之者謂之重虛

成頭者諸陽之會邪禱諸陽津液上湊則汗見於頭也
海頭汗出劑額而還血証也額上偏多者屬心部為血
証也獨益中州脾胃土以平藥治之其法無以加矣

舌白胎

舌上白胎者陽明胃實脇下滿不大便而嘔者小柴
胡湯論見脇滿者下後心下懊惱者梔子豉湯方論
見煩者下後噦而胸滿小便不利者丹田有熱胸中
有寒也論見身疼

脉陰陽俱緊者口中氣出唇口乾燥卷卧足冷鼻出涕
舌上胎渴勿妄治也到七日已來其人微發熱手足溫
者此為欲解或到八日已上反大發熱者此為難治設
使惡寒者必欲嘔也腹內痛者必欲利也 梅巖云誤惡
寒必欲嘔者小柴胡湯腹中痛必欲利者理中湯

歲結如結胸狀飲食如故時時下利寸脉浮關脉小
細沉緊舌上白胎滑者難治也若無陽証不佳來寒
熱其人反靜者不可攻也 論見歲結

舌胎續法

成舌者心之官法應南方火本紅而澤傷寒三四日已後
舌上有膜白滑如胎甚者或燥或盛或黃或黑是數者

舌白胎邪淺

舌黃胎邪深
甚者白虎
黃者下云

舌上有膜白滑如胎甚者或燥或澀或黃或黑是數者
 熱氣淺深之謂也邪氣在表者舌上則無胎及邪氣傳
 裏津液結搏則舌上生胎也寒邪初搏未全成熱或在
 半表或在半裏或邪氣密於胸中者皆舌上胎白而滑
 也經曰舌上如胎者以丹田有熱胸中有寒邪初傳入
 裏者也陽明病脇下硬滿不大便而嘔舌上白胎者可
 與小柴胡湯是邪氣在半表半裏者也太陽病舌下之
 則胃空虛客氣動心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主
 之是邪客於胸中者也藏結宜善可下舌上滑胎者則
 云不可攻也是邪未成熱猶帶表寒故也及其邪傳為
 熱則其舌上之胎不滑而澀也經曰傷寒七八日不解
 熱結在裏表裏俱熱時、惡風大渴舌上乾燥而煩欲

欲飲水數升者白虎加人參湯主之是熱耗津液而滑
 者已乾也若熱聚於胃則舌黃之黃是熱已深也金匱
 要畧曰舌黃未下者下之黃自去若舌上色黑者又為
 熱之極也黃帝針經曰熱病舌黑口乾者死以心為君
 主之官開竅於舌黑為腎色見於心部心者火腎者水
 邪熱已極見賊相刑故知必死桓夏月病嗽加五味子
 夾門冬如舌上有滑胎者是胸中有寒勿用之胸有寒
 微加辛熱之劑立効

世傳舌燥澁如楊梅刺者用生薑切厚片蘸蜜於舌上揩
 之其刺立消去神効

無擇薄苛蜜治舌上生白胎乾澁語訖不真先以生薑蘸

無擇傳苛寒陷台上生白胎乾滋認能不真先以生姜之醃
水措洗竟却用薄苛自然汁與白蜜等分調勻付之良

動氣

成無已云動氣為繁、然動跳於腹中者是矣

動氣在右不可散汗散汗則衄而渴心苦煩飲即吐水

臣入云先服五苓散三服次服竹葉湯

動氣在左不可散汗散汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤

人云先服隨防風白朮牡蠣礪湯汗止次服建中湯方

見自汗

動氣在上不可散汗散汗則氣上衝正在心端活人云

宜服李枏陽方見氣上冲

動氣在下不可散汗散汗則無汗心中大煩骨節疼痛

自運惡寒食則反吐及不得前居入云先服大猪皮湯吐土後服小建中湯

動氣在右不可下下之則津液內竭燥鼻乾頭眩心悸也
動氣在左不可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇

雖有身熱臥則欲蹶

動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱行自

此欲得水自漉

動氣在下不可下下之則腹脹滿卒起頭眩食則下清

殺心下痞也

動氣續法

雲岐傷寒下後曠左右動氣者防莖散

滯氣

方藥一劑 木香五小 柴胡 黃芩各半

傷寒汗下後臍左有動氣者防其發

防葵一兩 木香五分 柴胡 黃芩各半

右剉細每服五分十煎

傷寒汗下後臍上布動氣者枳殼湯

枳殼 五分 麩炒 赤茯苓一兩 當歸一兩 京三稜炮一兩

木香五分 阿膠勒五分

右為末每服五分沸湯點服

傷寒汗下後臍右有動氣者前胡散

前胡 赤茯苓各二兩 大腹皮 人參各五分 木香三分

枳殼 大黃各三分

右為末每服五分沸湯點服

傷寒汗下後臍下有動氣者茯苓散

赤茯苓一两 蜈蚣三小 桂心 大腹皮

川芎香炮炒 白芷各五分

右为末每服五分 佛手散服

如久不消得热治之难痊不可汗下也

鼻衄

傷寒脈浮豎不設汗自致衄者麻黃湯主之

脈浮者宜麻黃湯衄後脈已微者不可行麻黃湯宜更甚者

太陽病脈浮豎無汗苦热身疼痛八九日不解表証仍

在此當發其汗服藥已微除其人苦煩自暝劇者必

衄衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之

不大便頭痛有熱者小便赤者承氣湯也者小便赤

表者麻黃
衄而体痛無汗

衄而頭痛便清
者桂枝

細而頭痛便清者桂枝

脈浮數目

者愈

虛實

汗後

被者陽盛陰虛

脈者難治

動氣者喘而吐水

診忌

取浮裏口燥

微而不咽者死

衄

衄非脈浮忌

發汗

而衄者桂枝湯也 論見發熱

太陽病脈浮發熱無汗而衄者 論見發熱

太陽病以火劫發汗血氣流溢失其常度陽盛則欲

衄陰虛則小便難 論見頭汗

少陰病但厥無汗而發強之必動其血或從口鼻出

或從目中出者難治 論見欲寐

動氣發汗則衄而渴飲水吐水 論見動氣

脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄

陽明胃實口燥欲飲但嗽不咽者必衄也

衄家不可發汗汗出必額上陷脈急緊直視不能瞬不

得眠衄忌發汗者為無脈浮發熱惡寒之証

不大便頭痛有熱者小便赤者承氣湯也 若小便赤者

衄血
衄者厚有群
黃桂枝
脈微者犀角
黃芩

也 有其証宜發之

衄血續法

後歲仲景言衄不可發汗者蓋為脈微也若浮緊者麻黃湯
湯浮緩者桂枝湯脈已微二藥不用可犀角地黃湯
主之付景云衄家不可發汗汗出必額上陷脈豎在
視不能瞬不得眠之云亡血不可發其表汗出即寒
燥而格此二說皆為脈微而不可汗也若脈浮緊反
浮緩者皆當發之也

活傷寒衄血脈已微者黃芩芍藥湯犀角地黃湯

犀角地黃湯治傷寒應發汗而不發汗內有淤血鼻衄

吐血面黃大便黑此方主消化瘀血

吐血面黃大便黑此方主消化瘀血

芍藥三 生地黄半斤 牡丹皮二 犀角屑 一又如無以升 治氏之

右剉研每服五升水一盞半者取一盞有熱如狂者加

黃芩二又真人脈大來遲腹不痛自言喘者為無

熱不用黃芩

茅花湯治鼻衄不止

茅花尖一把以水三盞濃煎汁一盞分二服即差無花

以茅根代之

活者內而喝者心煩飲則吐水先服五苓散次服竹葉湯

本方治傷寒衄血骨石丸

滑石末不以多少散丸如梧子大每服十丸微嚼

破斷水咽下立止用藥末一大錢餘少許同嚼下

衄不止者茅花

飲

衄而渴心煩吐宜不飲

熱

下血

少腹急信者

桃承氣

胃實諸者

刺期門

汗下後下血

論

亦得老幼皆可服錫晦時云鼻衄者當汗不汗所
致其血青黑時不以少乃止且溫服而藥以調
其榮衛後見血鮮急以此藥治之

下血

傷寒下血者太陽病外已解但少腹急信者桃仁

承氣湯也方論見書血

若陽明胃實譫語者刺期門也論見諸語

太陽病以火重汗不得汗其人必躁而清血之論見

淋家不可灸汗後汗則便血

太陽病下之其脈浮滑者必下血論見大論

少陰病但欲寐一身手足盡熱者必便血也

傷寒熱少厥微不欲食煩躁數日小便不利也白者

少陰病但欲寐一身手足盡熱者必便血也

傷寒熱少厥微不欲食煩躁數日小便利色白者

欲食者愈若厥而嘔胸脇煩滿者必便血也

唾血

咽痛唾血若面赤斑斑如錦紋者為陽毒且外麻

驚甲湯方論見陽毒若下後和不止手足厥逆下

部脈不至者麻黃外麻湯方論見下利

脈浮熱其反灸之必咽燥唾血論見大法

服桂枝湯吐者必吐膿血論見吐

畜血

身黃如狂屎黑喜忘為畜血

太陽病表証在而發熱惡寒其脈反沉而身黃者

狂少腹硬喘者若小便不利為魚血小便不利血
熱譫也抵當湯主之論見芟也

抵當湯

水蛭十枚去足 蟅虫十枚去足 大黃二兩 桃仁七枚去皮

右物碎作一服水一盞煮至七分去渣用溫服

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當

下之不可餘藥且抵當丸

水蛭五枚炙 蟅虫五枚去足 桃仁二十 大黃三分去皮

右為末煉蜜和丸一丸以水一盞送下七分鐘服時

當下血不下再作之

太陽病不解熱結胸臑其人如狂血自下者盍其外

不解者尚未可攻當先解外外解已但必腹急結

太陽病不解熱結胸臑其人如狂血自下者愈其外

不解者尚未可攻當先解外外解已但少腹急結者乃可攻之宜承氣桃仁湯

桃仁去皮尖 大黃一兩 甘草半兩

桂半兩 芒硝半兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一半去渣入硝化間

食後服王海藏方有姜七片桂硝各三片

陽明病胃家實喜忘大便色黑雖硬反易者有畜

血宜抵當湯論見胃實

海藏云初便褐色者重再便深褐色愈重三便黑

色者為尤重變者以其火燥也如羊血在日氣中

頃更變褐久則漸變為黑色也飲酒亦便褐黑色

陽明畜胃實
喜忘屎黑少
腹不滿

下後畜血脈
數消是不便

當察之

許學士云血在上則喜忘在下則發狂

病人無表裏証發熱七八日雖脈浮數者可下之假令
已下脈數不解合熱則消穀喜飢至六七日不大
便者有瘀血宜抵當湯若脈數不解而下不止必
協熱而便膿血也成無已云當不大便六七日之
際又無喜忘如狂之証亦無少腹硬滿之候何以
知其有畜血也蓋脈浮而數輕容於氣則脈浮熱
容於血則脈數曰下之後
浮數俱去則病已差下之後數去脈但浮者則榮
血中熱去衛氣中熱在矣為邪氣獨畜心中則飢

血中熱去衛氣中熱在矣為邪氣獨留心中則飢

邪熱不殺受潮熱發渴也及下之後浮脈去而數
不鮮者則衛氣中熱去而榮血中熱在矣熱氣合
併迫血下行胃虛協熱消穀善飢血至下焦若大
便利者下血乃愈若六七日不大便則血不得行
畜積於下為瘀血故其抵當湯以下去之

口燥漱水不唾
者畜血在胸

病人胸滿唇痿舌清口燥但嗽水不欲嚥無寒熱
脈微大來遲腹不滿其人言我滿為有瘀血海藏
云嗽水不嚥胸滿心下手不可近者桃仁承氣湯主之
病者如熱狀煩滿口乾燥而渴其脈反無熱此為
陰狀是於血也當下之

衄血唾血畜血續法

上下

衄唾嘔吐血為
血在上

海藏血証古人用藥雖有輕重之殊而無上下之別
今分作上中下三等以衄血嘔血唾血吐血為上部
血結胸中為中部畜血下焦為下部 夫既有三部
之分故藥亦隨其輕重也
汗多為衄血脈浮灸之者咽燥為唾血當汗不汗熱
入于裏者為嘔血為吐血此血在上也犀角地黄湯
主之涼膈散如生地黄亦可然衄唾嘔吐俱在上亦
當以輕重分之大凡血証皆不飲水惟氣証則飲之
宜詳之此証是太陰所主脾所不果越而上行所以有
嘔血吐血之候也實者犀角地黄湯虛者黃芩芍藥
湯凡病嘔吐者以脾所主故咸用芍藥主之是知是

嗽水不嚥胸滿
手不可近為血
在中

小腹滿小便利
大便黑為血在
下

太陰藥也

血結胸中。○頸痛身痛嗽水不嚥者，衄無熱胸滿嗽
水不欲嚥者，喜忘昏迷其人如狂，心下手不可近者，
血在中也。桃仁承氣湯主之。

蓄血下焦。○其人發狂，小腹滿硬，小便自利，大便反
黑，乃臍下疼者，抵當湯丸主之。如狂者在中，發狂者
在下，抵當湯丸藥味同，煎煮如何，是二法。但喜忘發
在身黃，屎黑者，疾之甚也。無此則小腹滿，小便利者，
輕也。故有湯丸之別。桃仁、大黃、芩、芍、蟅、蟲、蛭多者，
作湯，三之二者為丸。丸之名，取其數少而緩，故湯同
煮服，一升九分者，一服七合也。

血分輕重

喜忘發狂身

黃者重宜抵

當湯丸

但少腹滿小

便者輕宜桃

仁犀角

虛弱及年老
者宜地黃丸

活病人無表証不發寒熱唇燥但欲嗽水不欲入咽其

脈微而沉小腹硬滿小便反利大便必黑身黃發狂

此血証諦也大抵傷寒當汗不汗熱畜在裏熱也為

血其人喜忘而如狂血上逆則喜忘血下畜則如狂

輕者犀角地黃湯桃仁承氣湯甚者抵當湯抵當丸

須取盡黑物為效按太陽病畜血者表証仍在也今

云無表証者但說得陽明畜血為未備

海喜忘發狂身黃屎黑者疾之甚也但少腹滿小便利

者輕也

生地黃丸病人七八日後兩手脈沉細微胃冷臍下滿

或狂或燥大便實而色黑小便自利者此畜血証具

者宜地黃丸
或狂或燥大便實而色黑小便自利者此蓄血証且

也若年老及年少氣虛弱者宜此方主之

生地黃 自然汁一升如無生地黃只用生干地黃二兩

乾棗 半兩炒烟斂尽 藍葉 一握切細干者用末半兩

生藕 自然汁半升如無藕用刺菊汁半升如無刺菊汁

用刺菊末半升

蠶蛭 二十个去翅足 麩炒黃 水蛭 十个炒

大黃 一兩剉如骰子大 桃仁 半兩研碎

右一處入水三升半同慢火熬及二升以來放冷分

三服投一服至半日許血未下再投之此地黃湯

比抵當湯丸其勢甚輕如無地黃共藕汁升數添

水同煎抵當湯丸恐用之太過有不止損血之候

表裏
表虛脈浮緊
者麻黃加參
芪

故立此湯

續增吐血

東垣治一貧士病脾胃虛弱與補劑愈後繼而冬居幃室
卧熱坑而吐血數次予謂此久虛弱臍有形而有火
熱在內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣瀉裏之
虛熱冬居幃室衣服復單薄是重虛其陽表有大寒
壅遏裏熱火邪不得舒伸故血出口目思仲景治傷
寒脈浮緊當以麻黃湯發汗而不與之遂成衄血却
與之立愈此與其同曰與麻黃人參芍藥湯

麻黃 一石去其外寒

桂枝 半石以補表虛

白芍藥 一石

黃芪 一石

甘草 炙一石以補脾

麥門冬 三石

人參 三石益三焦元氣不足而實其表也

昔者一為 甘草參一為以補脾 麥門冬三為

人參三分益三焦元氣不足而實其表也

五味子二枚芩其肺氣 當歸身 半為和血養血

右件吹咀都作一服水三盞煎麻黃一味令沸去沫

至二盞入餘藥同煎至一盞去滓熱服臨卧一服愈

觀此一方足可以為世模範也蓋取仲景麻黃湯與

補劑各半服之但凡虛人合用仲景方者皆當視

此為例也

臣 傷寒吐血由諸陽受邪熱初在表應發汗而不發汗熱

毒入深結於五臟內有瘀積故有吐血也瘀血甚者

抵當丸輕者桃仁承氣湯煎服犀角地黃湯三黃丸

短氣

抵毒入內藏者抵當與桃仁

表裏

短氣痛不屈伸

者甘附

短氣腹滿脇痛

表不解脈弦浮

者柴胡

表解潮熱者

承氣身涼者

十棗

短氣躁煩

汗後面赤表在

者更汗

下後心下硬痛

者陷痛

短氣骨節痛不得屈伸汗出小便不利惡風身腫者

為風濕宜甘草附子湯方論見体痛

短氣腹滿脇痛其人若脈弦浮大外不解無汗嗜卧

身黃小便難有潮熱者宜柴胡湯也論見胃實方見

往來寒熱若表解手足濇然汗出有潮熱者大承氣

湯也方論見潮熱若表解心下痞硬干嘔短氣者十

棗湯也方論見脇痛短氣煩燥若發汗不微續微汗

出不惡寒表証不罷面赤者為併病更發汗則愈也

論見面赤者下後心中懊憹心下硬滿者為結胸屬

大陷胸湯也論見結胸

跌陽脈微而緊則為寒微則為虛微緊相搏則為短氣

診... 生而伏者短氣也... 論見大... 也

診
短氣脈微緊
為虛寒

表裏

下後中結痛

者施鼓

脈弦脇反心痛
者柴胡

針灸

坐而伏者短氣也
論見大法

心痛

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解

也施子鼓陽王之

陽明病胃實脈弦浮大短氣腹滿下及心痛鼻干

無汗喘卧身黃小便難有潮熱時一噦者小柴胡湯

論見胃實方見律未栗也

心痛續法

插英傷寒飲水過多腹脹氣喘心下痛不忍可

中腹
言海立愈

如少腹有氣上冲者天樞氣冲三里三陰交
如魚此証
六月前

跌陽脈微而緊則為寒微則為虛微緊相搏則為短氣

診

脈遲與黃芩
反能食為陰

口中欲言舌不轉

眼不慧反能
食為陰中

厥利反能食
者恐為陰中

熱

世利下重

陰中

傷寒麻痺六七日而反與黃芩陽微其熱脈遲為寒合

與黃芩湯復陰其熱腹中瘕冷當不能食今反能食

此中各除中必死書

眼睛不慧語言不休而穀氣多入此為除中口雖欲言

舌不能前

凡手足厥冷而利當不能食反能食者恐為除中誠

然索餅食之若熱者陰中不若熱者外除中也論之厥

下重

世利下重若少陰病欲寐四逆者四逆加薤白散若

熱而者白頭翁湯方論見下利

脈浮誤矣必

脈浮宜汗解用大棗之類無從出因大而感病從陰

脉浮誤灸必
下重

脉遲浮誤
誤和必下重

診

診治

脉浮宜汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰

目下必重而痺名火逆也

脉遲浮弱惡風寒者表証豎反下之遂不能食脇痛

身黃項強小便難復与柴胡湯者必下重論見脇痛

下利脉沉弦者下重也論見下重

身熱惡寒身寒惡熱

病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也活人

云先與桂枝湯治寒已次以小柴胡加桂以溫其表

身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也活人云先

與白虎加人參湯除熱次以桂枝麻黃各半湯以解其外

續增啞

射干湯治初秋暴雨冷反天行暴寒其熱喜伏於內欬

嗽曲折不可得氣息喉啞失聲乾嗽無吐喉中如梗

射干一兩 半夏五兩 杏仁三兩去皮尖兩仁炒 生姜四兩炮

甘草二兩 紫苑二兩 橘皮二兩 肉桂二兩 枳實二兩炙

當歸 獨活 麻黃已上各二兩去節

右剉如麻豆大每服五升水一盞半啜至八分去渣溫服

續增癩

海陽証發癩有四有溫毒發斑 活人有治法見後 有熱病發

癩有時氣發癩有傷寒發癩 熱病癩與時氣癩傷寒斑

並同活人有活法見後 癩如錦紋或熱之四支或

發之面部或發之胸背色紅赤者胃熱也紫黑為胃

熱也一則下早一則下晚乃外感熱病而發癩也當

温毒班咳嘔至
春散

散之面部或散之胸背色紅赤者胃熱也紫黑為胃
爛也一則下早一則下晚乃外感熱病而發班也當
服玄參升麻湯白虎等藥王頌奉云赤班出五死一生
黑班出十死一生皆用白虎人多渴河膠大青湯兼与
紫雪大妙可下者謂調胃承氣湯

活温毒發症者初春病人肌白發癩疹如錦紋或咳心
悶但嘔者是也冬時觸冒寒毒至春始發病初在表
或以發汗吐下而表証未罷毒氣不散故發班黑膏
主之又有冬日温暖人感乖戾之氣冬末即病至春
或被積寒所折毒氣不得泄至天氣暄熱温毒始發
則肌肉癩爛癢疹如錦故而咳心悶但嘔清汁着根
播皮湯主之

黑膏方療温毒皮癩

生地黃 半斤 切碎 好豉 一升

右二味以猪膚二斤 合煮之 並令三分減 一絞去渣

用雄黃 射香 如大豆者 納中攪和 尽服之 毒便從

皮中出者 則愈 忌葷菜

葛根 搗皮湯療冬温未即病 至春被積寒所折 不得發

至夏得熱 其寒解 冬温始發 肌中癩 爛癰疹 如錦紋

而效 心但嘔吐 清汁服 并湯即靜

葛根

橘皮

杏仁 去尖 研碎

知母

黃芩

麻黃

去節 剉 二 沸 焙 干 秤

甘草 炙 各 半 兩

右剉如麻豆大 每服五升 水一盞 半煎至一中盞 去

热病傷寒斑
身热無時發

查温服

热病发斑与時气发斑並同夫病人或未发汗或已經汗下而热毒不散表虛裏实热毒乘虛出於皮膚所以发斑瘡癩疹如錦纹俗名慧瘡素問謂之疹大抵发斑不可用表藥盖表虛裏实若发其汗重令開泄更增癍爛也玄多升麻湯大青四物湯猪胆鸡子湯選用之

玄多升麻湯治傷寒发汗吐下後毒氣不散表虛裏实

热发於外故身斑如纹甚则煩躁譫語兼治候閉

腫痛

玄多 升麻 甘少 炙各半兩

右剉如麻豆大每服五分水一盞半煎八分去查热服大青四物湯治傷寒热病十日已上发汗及吐利後热

不除身上癩出

大青 四兩 阿膠 一兩 炙 甘草 一兩 炙 豉 八合

右剉如麻豆大每服五升水一盞半煎至一盞旋入

膠再煎令溶尽

猪胆鸡子湯治傷寒五六日癩出

猪胆 三合 鸡子 一枚 苦酒 三合

右三味和合煎三沸強人尽服羸人並六七沸湯

陽毒升麻湯治癩在面方見陽毒

海消毒飲子治癩

黍粘子 六 荆芥穗 三 甘草 一 防風 三

水煎服

面 陽毒癩在

陰癰如蚊
咬狀

陰証。發斑之出。胸背又出手足。稀少而微紅。若作熱疾。

投之涼藥。大悞矣。此無根失守之火。聚於胸中。上燄薰。

肺傳於皮膚。而為斑點。但如蚊蚋。蚤虱咬形狀。而作錦。

紋也。調中溫胃。加以苗香芍藥。以大建中之類。其火自。

下。癰自退。可謂治本而不治標也。海藏云。陽明發斑。亦。

有紅点如斑。出于皮毛之間者。治宜白虎。瀉心等藥。當審之。

大建中湯方見治惡寒門

陰毒什麻。鱉甲湯治陰癰。方見陰毒。

侯國華病傷寒。四五日身微斑。渴飲。眩之沉弦。欲絕。厥。

陰脉也。溫藥數日不已。又以姜附等藥。陽微。回脉。生目。

渴。和飲水一盞。脉復退。但見頭不舉。目不開。問之則犯。

宜忌

上下

仲景但名狐惑

活人更言狐惑傷

寒欲眠目閉面

赤黑曰為狐惑

舌喎者瀉心

咽干者洗之

蝕肛者熏之

目赤皆瀉者豆

歸

陽昌若只与燒裨散則寒而不濟矣遂宜吳茱萸湯一

大便調燒裨散連二服作大汗兩晝夜而愈

丹發痲似傷寒者痰起之病發於外微汗以散之下之非理

欲眠目不閉舌喎為狐惑為匿

狐惑之為病狀如傷寒默欲眠目不閉臥起不安

蝕於喉為惑蝕於陰為狐不欲食惡聞食臭其面目乍

赤乍黑乍白蝕於上部者喝一作喎甘少瀉心湯主之

方見症

蝕於下部則咽干苦多瀉洗之

蝕於肛者雄黃熏之

雄黃

右一味為末筒瓦二枚合之燒向肚重之

脈經云病人或從呼吸上蝕其咽或從下鼻蝕其

肛陰蝕上為感蝕下為狐狐感病者猪苓散主之

方未考

病者脈數無熱微煩默汗出初得之三四日

目赤如雄眼七八日四背一本此有黃字黑若能食

者膿已成也去蓋當歸散主之方見下血

狐惑續法

濕瘰

一婦人狐惑聲啞多眠目不閉惡聞食臭不省人事

者半月後又手足拘強脈數而微細先與竹瀝薑汁

一盞服之忽胸有汗暖鳴即目閉省人事遂用多朮

診治

欲眠齒無色

舌白唇黑

匿

上唇有瘡

藏

下唇有瘡

蝕壯

歸陳入竹瀝姜汁飲之五六帖而全愈

活狐惑傷寒与濕毒皆虫证初得状如傷寒或曰傷寒變

成此疾云云大抵傷寒病腹内熱入食小腸胃空虛三

虫行作求食蝕人五藏及下部為匿虫病其候齒無色

舌上尽白甚者唇里有瘡四肢沉重忽喜眠虫蝕其

壯爛見五藏則死當救者其上下唇上唇有瘡虫蝕其

藏下唇有瘡虫食其壯殺人甚急多目下利而得治匿

桃仁湯黃連犀角湯雄黃散主之

桃仁湯治匿

艾 桃仁 去皮尖并双仁者炒

槐子 碎已上各一两 大棗 十五枚去核

右用水二大盏半煎至一盏半分三服

黄連犀角湯治傷寒反諸病之後內有瘡出下部者

黄連半兩 犀角一兩如無以升麻代之

烏梅七斤 木香一分

右用小二大盏半煎至一盞半分三服

雄黄銳散治下部膿瘡

雄黄研 青箱子 共之 黄連各二分

枇杷仁 去皮尖研一分

右為散以生艾搗汁和如枣核大綿裹內下部扁竹

汁更佳冬間無艾只用散綿裹內下部亦得

欲食不食欲卧不卧欲行不行為百合

百脈悉病

為百合

仲景但名百合

活人更為百合

傷寒

論曰百合病者百脈一宗悉致其病也意欲食復不能
 食常默欲卧不能卧欲行不能行飲食或有美時或
 有不用聞食臭時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸
 藥不能治得藥則劇吐利如有神矣者身形如和其脈
 微數每溺時頭病者二十日乃愈若溺時頭不痛淋然
 者四十日愈若溺時快然但頭眩者二十日愈其証或
 未病而預見或病四五日而出或病二十日或一月微
 見者各隨証治之活人云此名百合傷寒多因傷寒虛
 黃大病之後不平復變成斯疾也百合病發汗後者百
 合知母湯主之

百合七枚 碎手

知母

三兩 切

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水

二升煎至一升去查別以泉水二升煎知母取一升

去查後合和煎取一升五合分溫再服

百合病下之後者滑石代赭湯主之

百合 七枚擘

滑石 三兩碎綿裹

代赭石

如彈丸大一枚碎綿裹

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水

二升煎取一升去查別以泉水二升煎滑石代赭取

一升去查後合和重煎取一升半分溫服

百合病吐之後者百合雞子湯主之

百合 七枚擘

雞子黃 一枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水

二升煎取一升去渣内雞子黃攪勻煎五分温服
百合病不經吐下發汗病形如初者百合地黃湯主之

百合七枚擘

生地黃汁一升

右以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水
二升煎取一升去渣内地黃汁並取一升五分温
再服中病自更服大便當如溲

百合病一月不解變成渴者百合洗方主之

百合一升以水一斗漬之一宿以洗已食煮餅勿以
鹽豉也

百合病渴不差者括萎牡砺散主之

括萎根

牡砺 炒等分

右為末飲服方寸七日三服

百合病變發熱者一升散客熱百合滑石散主之

百合 一兩炙 滑石 三兩

右為散飲服方寸七日三服當微利者止服熱則除

百合病見於陰者以沝法救之見於陽者以沝法救之

見陽攻沝復發其汗此為逆見沝攻沝乃復下之此

亦為逆

浙 江

國朝學子綱目卷之三十三

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

浙江圖書館

醫學綱目卷之三十三

傷寒部

勞復門

陰陽易

四時傷寒不同

冬為傷寒
夏為暑病

春為瘟疫病
秋為瘧病

一歲長幼病相似為瘟疫

多眠多汗脈浮為風瘟

一身盡痛為濕

身反張為瘧

婦人傷寒

熱入血室

產後傷寒

小兒傷寒

痘病

韓氏和鮮同時法

韓氏溫中法

太病差後勞復者枳實梔子湯主之若有宿食加大

黃芩博基子大五六枚

枳實梔子豉湯方

仲景致邪會
復者枳實大
黃

散執者望胡差
後餘邪
水氣者滲之
喜唾者溫之
欲吐者抑之
不了了者十
二日愈

枳實

一枚去穢熬炒

梔子

三枚半肥者

豉

一兩二分半

右三味以清漿水二盞煮退一盞內枳實梔子煮取

八分下豉更煮五六沸去查溫服覆令微似汗若

有宿食內大黃如博碁子五六枚同煎

傷寒差後更散執者小柴胡湯主之脈浮者以汗解之脈沉實

者以下解之大病差後從腰以下有水氣者牡礪澤瀉散主之

牡礪熬

澤瀉

蜀漆

洗去腥

商陸熬

葶藶熬

海藻

洗去鹹

枳實

各等分

右為末水服方寸以小便利止後服日三

大病差後喜唾久不了了胃上有寒當以丸藥溫之宜理中丸

傷寒解後虛羸少氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之

淡竹葉

半把

石膏

四兩碎

半夏

二分

人參

半兩

麥門冬

二兩去心

甘草

半兩炙

嘔者加生姜一兩半

淡竹葉半把 石膏四兩碎 半夏二升 人參半兩

麥門冬 二兩去心 甘草 半兩炙 嘔者加生姜一兩半

右剉碎每服五錢水一盞半入粳米百余粒煮取八分米熟湯成去渣溫服

風家表解而不了了者十二日愈

勞復續法

書

後腎補虛
勞氣者舉氣
勞血者補血
勞中者補中
勞心者補脾

海藏大抵勞者動也勤非一種有內外血氣之異焉若勞

乎氣則無力與精神者微舉之若勞乎血與筋骨以四

物之類補之若勞在脾內為中州也調中可矣此為有形

病也但見外証則為復病非為勞也再感風寒是也

本事記有人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脉弦數心不

得寧真勞復也予診曰勞心之致所神之所舍未復

其初而又勞傷其神榮衛失度當補其子益其脾解
散其勞庶幾得愈授以補脾湯佐以小柴胡湯解或
者難曰虛則補其母今補其子何也予曰子不知虛
勞之異乎難經曰虛則補其母實則瀉其子此當補
其母人所共知也千金曰心勞甚者補脾氣以益之
脾王則惑之於心矣此當勞則補補其子人所未聞
也蓋母生我者也子繼我而助我者也方治其虛則
補其生我者與錦囊所謂本骸得氣遺躰受蔭同義
方治其勞則補其助我者與荀子所謂未有其子富
而父貧同義此治虛與勞所以異也

補脾湯治傷寒得汗差後脾胃傷冷物胸膈不快尋常血氣不和

補脾湯治傷寒得汗後脾胃傷冷物胸高不快尋常血氣不和

人參 乾姜 白朮 甘草 橘皮去白

青皮去白冬等分

右為末每服三升水一盞煎數沸執服入鹽点亦得

海治勞復能起死人麥門冬湯氣欲絕者用之有效

麥門冬一兩 甘草二兩 粳米半合

右麥門冬去心為細末水二盞煎粳米令熟去米約

湯一小盞半入葉五升七葉二枚去核新竹葉一十

五片同煎至一大盞去渣大溫服不能服者綿滴口

中後人治小兒不能灌注者宜用此綿滴法

此方不用石羔以其三焦無大熱也煎自欲死之人

陔氣將絕者故不用石羔加人參大炒

冬 氣欲絕者門

外臺大病後不足病虛勞補虛取七歲已下黃牛乳一升
用水四升並取一升如人飢稍稍飲不得多十日服不
位佳

肘後治舊疾新起早勞食飲多致復欲死燒蟹甲服方寸匕
雄鼠屎湯治勞復

梔子十四个擘

雄鼠屎

二十七枚兩頭尖者是

枳壳三枚炙

右為簾末每服四錢水一盞半入葱白二寸香豉三十粒同煎一盞分二服勿令病人知鼠屎

七味葱白湯許仁則傷寒或曰起動勞後或曰吃食稍多皆成此候若復甚者一如傷寒初有此証宜服此方

連鬚葱白

葛根切三合

新豉半合

生姜切一合

連翹黃芩白 葛根切三合 新豉半合 生薑切一合

麥門冬 去心 乾地黄 三兩 流水 四升 以杓揚之

右七味用滂水煎三分減二去滓分二服漸服之

取汗

右傷寒勞復若莫仍用丹谿次參芪歸朮加散散之

劑汗之為的當也

冰伏易

傷寒冰伏易之為病其人身体重少氣少腹裏急或引

冰中拘挛熱上冲胸頭重不欲舉眼中生花膝胫拘

急者燒棍散主之

燒棍散

右取婦人中棍近隱處煎燒灰以水和服方寸匕以

差後交接 復病為冰 伏易

日三服小便即利此頭微腫則愈婦人病取男人棍
襠燒灰用

嘗治傷寒病未平復犯房垂死者命在頃臾用獨
參湯調燒棍散凡服書一斤愈得愈者三四人信
哉用藥不可執一也

此陽易續法



活傷寒病新差此臥氣未和曰合房室則令人此腫入腹
絞痛婦人則裏急腰膝連腹內痛名為此臥易也其
男子病新差未平復而婦人與之交接得病名曰臥
易婦人病新差未平復男子與之交接得病名曰此
易若二男三女並不相易所以呼為易者此臥相感

易者二男三女並不相易所以呼為易者此以相感

動其毒疫着於人如換易然其病狀身體熱衝胸頭
重不能舉眼中生花四肢拘急小腹絞痛手足拳則
皆死其亦有不即死者病若少腹裏急熱上冲胸頭
重不欲舉眼百節解齋經脈緩弱血氣虛骨髓竭便
翕翕氣力轉小着床而不能動搖起止仰人或引歲
月不死燒棍散音殺音鼠糞湯竹茹湯青竹茹湯干姜
湯當歸白朮湯選用之海藏云熱者燒棍散竹皮湯
寒者殺鼠糞湯當歸白朮湯至於校正方妙香丸条
下活雜病冰炭易藥中有牛黃腦射之類是知治熱

証也

竹皮湯療交接勞復卵腫腹中絞痛欲絕

執者水調
燒棍竹皮

竹皮刮一升

右一味煮用水三升煮至一升半絞去渣分服立愈

青竹茹湯婦人病未平復回有所動致熱氣上冲胸手

足拘急搐搦如中風狀宜此湯

瓜蒌根無黃者一兩 青竹茹刮半斤淡竹是

右以水二升煮取一升二合去渣分二三服

妙香丸 見積熱

百一方治交接勞復少腫或縮入腹、絞痛或便

絕蚯蚓數條絞取汁服之良

海 若少臥易果得少脈當隨証用之。若脈在厥少當歸

四逆湯送下燒棍散。若脈在少少通脈四逆湯下燒

寒而脈沉細
微者四逆調
燒棍散

棍散。若脈在少少通脈中丸送下燒棍散所用

燒視散
四逆湯送下燒視散○若脈在少陽通脈四逆湯下燒

視散○若脈在太陽四逆理中丸送下燒視散所用
之藥各隨其經而効為之速也

猥鼠糞湯療傷寒病後男子冰易

韭白根 一把 猥鼠糞 十四枚

右二味以水二升煮取半升去渣再煎三沸溫溫
服必有粘汗出為効未汗再服亦理諸猥勞復猥
鼠糞兩頭尖大者是也

當歸白木湯治婦人未平復因有所動小腹急痛腰膝

四肢不任舉動無熱散者

白木 當歸 桂枝 附子生 甘草

芍藥 黃芪 人參各二分半 生姜 半兩

右剉水三升煮取一升半去渣通口服一盞食頃再服溫覆微汗差

李良佐子病太伏証尺寸脈俱浮數按之無力余見其內脈與神術加干姜湯食後再病余視之見神不舒垂頭不欲語疑其有房過問之犯房過乎必頭重目暗曰唯與大建中三四服外伏內收脈反沉小始見脈候又與已寒加芍藥茴香等丸五六服三日內約服丸六七百丸脈復生又用大建中接之大汗作而解

山居曰女色病脈証傷寒者用陳皮煎鍋內炒佳以酒煮下瀘酒飲之

四時傷寒不同

冬為傷寒
春為溫病
夏為暑病
秋為瘧病

傷寒不同
四時正氣
獨辛
若人觸冒之
為傷寒

非時邪氣不
拘長幼皆染
之為溫疫

冬為傷寒 春為溫病 夏為暑病 秋為瘧病

一歲長幼病相侷為溫疫 多眠多汗浮為風溫脉

一身尽痛為濕 身反張為瘧

陟陔大論云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冷冽

此則四時正氣之序也今時嚴寒萬類深藏君子固密

則下傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時之氣

皆能為病以傷寒為毒者以其最成殺厲之氣也中而即

病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變為瘧

病至夏變為暑病熱極重者於溫也是以辛苦之人春

夏多溫熱病皆由冬而觸寒所致非時行之氣也凡時

行者春時應暖而復大寒夏時應大熱而反大涼秋

時應涼而反大熱

溫冬時應寒而反

太溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相侶者此則時行之氣也

從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆為時行寒疫也三月四月或有暴寒其時天氣尚弱為寒所折病熱猶輕五月六月天氣已盛為寒所折病熱則重七月八月天氣已衰為寒所折病熱亦微其病與溫及暑病相侶但治有殊耳其冬又非節之暖者名冬溫冬溫之毒與傷寒大異冬溫復有先後更相重沓亦有輕重為治不同冬溫應帝紀者有三歲少陰司天之政五之氣陽明司天之政終之葉厥陰司天之政終之氣皆

病冬溫其不應帝紀而反常者則不可候之而隨變易也

四時傷寒
通宜補散
補中益氣通
治四時傷寒
神木白木通
治濕痺暈溫
黃芪治暈

病冬溫其不應常絕而反常者則不可候之而隨變易也
氣候亦有應至而不至或有未應至而至者或有至而
太過者皆成病氣也

凡四時傷寒通宜補散故丹谿治傷寒多用補中益
氣湯氣虛者四君子湯加散散劑血虛者四物湯加
散散劑東垣治風濕用補中益氣加羌活防風升麻
藁本蒼朮湯海藏治風濕無汗者用神木湯有汗者
用白木湯治剛瘧用神木湯加羌活麻黃治柔瘧用
白木湯加桂心芪朮治風濕用白木湯隨証加藁治
中暈脈弦細芤遲用黃芪湯此皆與仲景所謂辛甘
之人觸冒之者病傷寒同意也

傷寒與中寒不同

霜降至春

丹仲景論傷寒而未及乎中寒傷寒有即病有不即病必大發熱病邪補經而入以漸而深中寒則倉卒感受其病即發而暴傷寒之人曰其舊有鬱熱寒氣外束肌腠反密鬱發為熱其始也用桂枝麻黃輩發表而安以病体不甚虛也中寒之人乘其腠理舒豁一身受邪難分經絡無熱可發溫補自解此胃之火虛也傷寒熱雖甚不死中寒若不急治去生甚遠中寒治法見辛中暴厥門

傷寒傷暑傷濕亦如傷寒之漸入也中風中暑中濕亦如中寒之暴受也

冬為傷寒

從霜降以後至春分以前凡有觸冒霜露体中寒即病

者謂之傷寒也治法除溫暑瘧疾外皆傷寒治法也

霜降至春

分爲傷寒

立春至夏

至爲溫病

初春者班
爲溫毒
汗後灼熱
爲風濕

者謂之傷寒也 治法除溫暑瘧疾外皆傷寒之法也

春爲溫病

從立春節後其中無暴寒又不冰雪而有人吐衄爲病

者此屬春時陽氣蓄於冬時伏寒變爲溫病寒溫應常記者有四歲少陽司

天之政初之氣太政司天之政初之氣以明司天之政二之氣太陰司天之政二之氣皆病溫其不應常記而又常者不可候之也

太陽病者熱而渴不惡寒者爲溫病以見冬溫

冬傷於寒春必病溫全云見五藏○陽脈洪數陰脈實大者

遇溫熱變爲溫毒論見大法皆見者班語人云初春者班咳嘔爲溫毒 發汗不解身灼

熱爲風濕其証脈浮汗出身多眠蓋其病不獨見於

春間故另立風濕門

尺膚熱其脈盛躁者病溫也 全云見診

針灸
論忌

夫精者身之本也故藏於精者春不病溫全之見五藏
凡治溫病可刺五十九穴

成註云所謂五十九穴者刺五手內外側各三凡
十二痛五指間各一凡八痛之亦如是頭八髮際一
一寸傍三分各三凡六痛顛上一顛會一髮際一
廉泉一風池二天柱二內註云氣口靜人迎躁者
取之若氣口少人迎皆靜者勿刺也人迎謂挾候
動脈也

王大僕註素問五十九刺云頭上五行一五者以
越諸陽之熱逆也謂頭中行上星顛會前項谷會
後項五穴頭第二行又傍五處承光通天絡却玉

雲門腧骨委
中髓空此
者以寫胃之
熱也

論溫不同
仲景謂溫
病壯熱不惡
寒
活人謂溫病
者熱惡寒

後項五穴 頤第二行又傍五處承光通天絡却玉

枕十穴第三行又傍臨泣目窓正營承天腦空穴也
大杼應命缺盆皆俞此八者以寫胸中之熱也
氣街三里巨虛上下廉此八者以寫胃中之熱也
○五藏俞傍五此十者以寫五藏之熱也 謂背第
三行兩傍魄戶神堂魂門意舍志室十穴也

溫病續法

活夏至前若熱惡寒發疼身痛其脈浮緊者溫病也春
月傷寒謂之溫病冬傷於寒輕者夏至已前若為溫
病蓋因春溫暖之氣而發也治溫病與冬月傷寒夏
月熱病不同蓋熱輕故也升麻解肌湯最良熱多者
小柴胡湯主之不渴外有微熱者小柴胡加桂枝也

嗽者小柴胡加五味子也煩躁者渴脈實大便秘澀者大柴胡湯微利也虛煩用竹葉湯吹鼻脈之仲景謂溫病吐熱不惡寒今傳人謂溫病者熱惡寒不同當仲景為正

升麻解肌湯治傷寒溫病天行頭吐熱

葛根一兩 黃芩 芍藥各半兩 炙甘草

桂心各五分 麻黃 三分 去節湯泡

右剉每服五合水一盞半棗子一枚煮八分日三服

三四日下解脈浮者宜重服取汗脈沉實者宜下之

雲岐傷寒汗下不食而過經其証尚在而不除者亦溫病

也經曰溫病之脈行在諸經不知何經之動隨其經

汗下後過經不食亦溫病

也經曰溫病之脈行在諸經不知何經之動隨其經

所在而取之

如太陽証下後過經不食診得尺寸俱厚者太陽溫病也

如身熱目疼汗下後過經不食診得尺寸俱長者陽

明溫病也

如胸脇痛汗下後過經不食診得尺寸脈俱弦少陽

溫病也

如腹滿噎乾診得尺寸脈俱沉細過經不食者太陰

溫病也

如口燥舌乾而渴診得尺寸俱沉過經不食者少陰

溫病也

如煩滿囊縮診得尺寸俱微緩過經不食者厥陰

溫病也

是故隨其經而取之隨其証而治之如若班乃溫毒也

夏為暑病

中暍即暑

病脈弦細孔暍

身汗下針

身熱惡寒汗

出而渴者白虎

身疼重者瓜蒂

便已洒、然毛聳手足逆冷亦有勞身即熱口開前
板齒燥若發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之
則淋甚暍音謁傷暑也

太陽中熱者暍是也其人汗出惡寒身熱而渴白虎加
人參湯主之
人參湯主之
人參湯主之
手足冷脈微無力者中暑也白虎湯主之

太陽中暍者身熱疼重而脈微弱此亦夏月傷冷水、

十三經在藥
下為毒也

身熱重者小
太陽中暈者身熱重而脈微弱此亦夏月傷冷水

行皮中所致也一物瓜蒂湯主之

一物瓜蒂湯

瓜蒂 二十七斤

右剉以水一升煮取五合去渣頓服

瓜蒂湯後賢罕用蓋其劑峻故也若果疼痛不退

者亦宜用之

暑病續法

暑病有三

活中暑與熱病外証相仿但熱病者脈盛中暑者脈虛以

此別之甲乙經云脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得

之傷暑蓋寒傷形而不傷氣所以脈盛熱傷氣而不

傷形所以脈虛

脈洪身熱
惡寒為熱
病
有汗者桂枝
加蒼朮
無汗者麻黃
加蒼朮
無汗加燥者
青龍加蒼朮

又有濕溫與中暑同但身不得為異耳

丹暑熱病用黃連香薷飲挾痰者加半夏挾虛者加參芪

或用清暑益氣湯

匠夏月發熱惡寒頭疼身體支節痛重其脈洪盛者熱病

也冬傷於寒因暑氣而發為熱病治熱病與傷寒同

有汗宜桂枝湯無汗宜麻黃湯加煩躁者宜青龍大

湯然夏月藥性須帶涼不可太溫桂枝麻黃大青龍

須用加減夏至前桂枝加黃芩半及夏之後桂枝麻

麻黃大青龍加知母一及石膏二及或加升麻半及

蓋桂枝麻黃湯性熱及暖之處非西北之比夏月服

之必有發黃斑出之失熱病三曰外與湯不差脈勢

前藥不差
者桂膏

之必有發黃斑出之失熱病三日外與陽不差脈勢

脈勢仍數邪氣猶在經絡未入臟腑者桂枝石膏

湯主之此方夏之後代桂枝証用若加麻黃半又可

代麻黃青龍証用也若方三月多夏為晚發傷寒抱

子升麻湯亦可選用之

桂枝石膏湯治熱病三日外與諸陽不差脈勢仍數邪

氣猶在經絡未入臟腑宜此湯此方可夏之後代桂

枝証用若加麻黃去節半又可代麻黃青龍湯用之

也有汗脈緩為桂枝証無汗脈緊為麻黃青龍証

桂枝半斤去皮 石羔 一升碎 黃芩半斤 甘草炙二斤 白朮子

枳子四升如小者一斤升麻 乾葛 生姜已上各三斤

右剉每服五升水一盞半煮至八分去渣食頃再服若

病在三焦為
晚發

避暑安閱者
無汗惡寒脈
沉疾

得汗即停後服

梔子升麻湯治晚發傷寒三月至夏為晚發

生地黄

半斤切碎

梔子十斤升麻一斗半

柴胡

石膏

各二斗半

右剉每服五斗水一盞半煮至八分頓服病不解再

煮頭面赤去石膏用葛根二兩無地黃以豉代之

恒靜而得之為中暑中暑者陰証當發散也或避暑納涼

於深堂大厦得之曰中暑其病必頭痛惡寒身形拘

急支節疼痛而煩心肌膚大熱無汗為房室之陰寒所

遏使周身陽氣不得神越世多以大順散主之是也海

藏云靜而傷暑惡寒脈沉疾靜而濕勝傷形者白虎加

蒼朮湯。大順散見局方甘草七斗半干姜杏仁桂各斗是也

日中勞役者汗多惡寒脈洪大

脈虛身熱惡寒為中暑者白虎

動而得之為中熱中熱者陽証為熱傷原氣升形體受病也若行人或農夫於日中勞役得之者名曰中熱其病必苦頭疼若躁熱惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣而動乃為天熱外傷肺氣蒼木白虎湯主之海藏云動而傷暑身熱脈洪大動而大勝傷氣者白虎加人參湯主之

活中暑背寒面垢手足微冷煩渴口燥急回支不痛重其脈微弱按之無力白虎湯主之白虎湯者見於熱

本事有人頭痛身熱心煩躁渴訖其脈大而虛予授以白虎湯數服愈仲景云脈虛身熱得之傷暑又云其脈弦細芤遲也何素問曰寒傷形熱傷氣蓋傷氣不傷形則

蒼木陽日大順散見局方甘草七名半干姜杏仁桂各五分也

渴仍不差者
黃連

痰逆惡寒
者橘皮

氣消而脈虛弱所謂弦細芤遲者皆虛脈也仲景以

弦為陰朱肱亦云中暑脈微弱則虛可知

海身熱脈虛自汗惡寒者中暑也白虎加桂湯主之方見

活酒蒸黃連丸治暑毒伏深累取不差無葉可治伏暑也

渴者

黃連 四錢以無灰酒浸面上約一寸蒸干

右為末糊丸熟水下三十丸胸涼不渴為驗

橘皮湯治中暑痰逆惡寒

橘皮 二錢去白 生姜 一兩 棗子 五個去核 甘草 炙半兩

人參 一分 竹茹 半升

右分五服每服水一大盞二分者煎八分去渣執脈

不惡寒者

竹葉

惡心痞滿者
五苓

脈弦細乳
遲者苓

竹葉石膏湯治中暑不惡寒不見勞復

五苓散治中暑頭疼惡心煩躁心下不快方見渴

後若先飲冷後傷暑者五苓散主之此必心下痞澀生姜

調服佳或四君子湯調中亦可中和後或小便不利或

莖中痛宜下方

蒲黃三分 滑石五錢 生甘草一分

右為末熱水調下

中獨脈弦細乳遲黃芩湯主之

黃芩湯

人參 黃芪 白朮 茯苓

芍藥 甘草 各等分

右吹咀每服三分水一大盞生姜三片煎至六分去

查濕服

丹徐三官六月間發熱大汗惡寒戰慄不目禁持且煩渴
子曰此暑病脈之皆虛微細弱而數其人好賭致勞而
虛遂以人參竹葉作湯調服砂四苓散八則而愈

齒燦者灸

大椎

濕溫比中

暑無執一

脛冷腹滿

多汗頭痛

渴而無執者

活濕溫者兩脛逆冷胸腹滿多汗頭目痛若妄言其人常
傷於濕日時中暑濕熱相搏則發濕溫其脈陽濡而弱
陰小而急治在太陰不可發汗汗出必不能言耳聾不
知痛所以身青面色變名曰重暈如此死者墜殺之耳

渴而無水者

知痛所以身青面色變名曰重暈也此死者望服之耳

白虎加蒼朮湯主之

本事癸丑年古人王彥龍作 凌倉官季夏時病胸項多

汗及足逆諺語鑿者不曉雜進已旬徑日子於之其脉

閱前儒閱後難予曰當作濕溫治蓋先受暑後受濕暑

相傳是名濕溫先以白虎加人參湯次白虎加蒼朮湯

頓痛漸退且漸溫汗漸止三日愈此名賊邪誤用藥有

死之理有人難曰何名賊邪予曰難經云五邪有實邪虛

邪正邪微邪賊邪從後來者為虛邪從前來為實邪從

所下勝者為賊邪從所勝者為微邪自病者為正邪又

曰假令心病中暑為正邪中濕得之為賊邪今心先受

暑而濕邪勝之水剋火從所不勝斯謂之賊邪五邪之

中氣逆也。雖經云：濕溫之脈，陽濡而弱，陰小而急，濡弱見於陽部，濕氣搏暑也。小急見於陰部，暑氣蒸濕也。故經曰：暑濕相搏，冬曰濕溫，是謂賊邪也。不特此也。予素
有停飲之疾，每至暑月，兩足汗蒸，熱未嘗干。每服此藥
二三盞，即便愈。

海濕溫汗少者，白虎加蒼朮；汗多者，白虎加桂枝。白虎加
枝湯方見。

孫業保慶門外有酒家，姓姜，善歌，唱孫常愛之，忽數日不
見，使人問之，曰：病矣，相好，命絕。孫診之，遍身皆潤，兩足冷
至膝，下腹滿，不省人事。六脈皆小，弱而急，問其所服藥，
形而視之，皆陰病藥也。孫曰：此非受病重藥，能重病耳。

形而視之皆陰病藥也孫曰此非受病重藥能重病耳

遂用五苓散白虎湯十餘病少甦再服全愈姜氏既安

詣孫謝於階下請問於孫曰某得病處蒙高藥一治而

甦願聞治法孫曰汝病傷暑也始則陽微厥而脈小無

力衆醫謂陰病遂用陰藥其病厥用五苓又利小便則

腹臃白虎解利邪熱則病愈凡陰病臃冷則臂亦

冷汝今臃冷臂不冷則去下厥上行所以知是陽微厥

也此証孫雖曰傷暑乃先傷濕後傷暑為濕濕証也

濕濕又謂之濕 伍蒼朮石膏湯主之

蒼朮石膏湯即白虎湯加蒼朮也

蒼朮半斤 石膏二斤 知母二斤半 甘草五

右剉作一脂水一盞量至一半溫服清謂內有濕也

通用雜方

多不飲飲水如身熱脈洪無汗多渴者熱在上佳積於胸中宜栝梗湯此非濕濕乃熱病也

栝梗散

薄荷 黃芩 甘草 梔子 各子 栝梗半斤

連翹散

右剉每服五子或七子秤一及半水煎加竹葉如大

便澀加大黃半斤

海消暑丹

半夏一斤 茯苓半斤 甘草生半斤

右以醋五升煮半夏尽醋然干姜汁作糊無見生水

為丸每服五十丸熱水咽下精意備治用之極効

為丸每服五十九丸熱水咽下精意備用之極效

中暑為患藥下即甦。傷暑發熱頭痛服之尤妙

夏月常服止渴利小便雖飲水多亦不為害應是

暑藥皆不及此。若疾飲停節並用生姜湯下入

夏之後不可缺此

又方消暑丸治頭疼惡心煩躁渴渴霍亂

萊菔粉四兩 石膏四兩 白礬粉 磁黃各二兩

水浸蒸餅為丸彈子大每服五丸用姜汁數點新

汲水化開妙

丹暑風挾痰挾火實可用吐法

玉龍丸治一切暑毒伏暑腹疼神效

礞石 滑石 明礬各五 好面六兩

用無根水調為丸

秋為瘡

夏傷於暑秋必瘡治法見瘡門

脈陰陽俱盛重於陰者變為溫瘡

一歲長幼疾狀相侷為溫瘡

春應暖反寒夏應熱反涼秋應涼反熱冬應寒反溫

此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相

侷者為時行溫瘡病也論見傷寒各不同

溫瘡續法

一歲之中病無長少率相侷此則時行之氣俗謂之天

行是也老君神明散○務成子螢火丸聖散子毒仁散

非其時有
其氣為溫
瘡

大法
非其時寒者
宜執之

非其時寒者
不投之

行是也老君神明散○務成子靈火丸聖散子毒公散

不拘日數淺深吐下隨証施行所以聖散子不問陰陽
表裏也

老君神明散治溫疫

白朮 芍藥 桂梗 芍藥 細辛 五華陰者

附子 又炮去黑皮 烏頭 又炮去皮尖

右五味搗篩縫絹袋盛帶之居閭里皆無病若有疫

癘者置酒服方寸七覆而汁得吐則差若經三四日

抄三寸七以水一碗椀者令大沸分三服

聖散子蘇內翰序全文見唐人書時毒流行用聖散子

者一切不問陰陽之惑連服形差不可與傷寒比也

若疫疫之行平旦輒者一釜不問老幼良賤各一大

盪即時氣不入

草豆蔻 十个去皮
面裹炮

猪苓 去皮

石菖蒲

茯苓

附子 炮去裂皮脐

独活 去芦

良姜

麻黄 去根

厚朴 去皮姜制

藁本

芍药

枳壳 夫炒
去穰

柴胡

泽泻

细辛 莘陰
者

防风 去芦

白术

藿香 各半又

半夏 半又

甘草 一又炙

右制每服去分亦一盪半者一而八分去查热服餘滓

两服合为一服重宜空心服之

右二方治疫雖不分陰陽然亦寒多表多者宜之

丹衆人病一般者是謂天行時疫有宜補宜散宜降方

大黃 黃芩 黃連 人參 桔梗

防風 人中黃 滑石 香附

右麩糊為丸每服五七十粒分氣血痰作湯便送下
氣虛四君子湯送下血虛四物湯送下痰多者二陳
湯送下熱甚者用童便和煎藥同送下

本少糞清腸月截淡竹去青皮浸參取汁治天行熱喉
中毒并要瘡毒取汁浸皂角甘藷治天行熱疾

丹鮮一切災病用

粉草 五斤細切微炒

量病人吃得多少酒所無灰酒一處研去查溫服須
更大瀉毒亦隨出雖十分渴亦不可飲水、雞赦
右三方熱多裏多者宜之

非其時執者
宜寒之

繫椎黃丸治時疾不相染

雄黃一升研赤小豆炒熟丹參鬼箭羽各二升

右為細末煉蜜為丸如梧子大每月空心以溫水下

五丸可與病同床者衣服亦不相染矣

居務成子黃火丸主辟疾疫惡氣百鬼虎狼蝮蛇蜂蟻諸

毒五兵白刃盜賊凶害皆避之

黃火 鬼箭 削取皮用 芝蔴 各二升 雄黃

雌黃各二升 礬石二升燒汁尽 羚羊角 鍛鼈灰

鐵錘柄入鉄處燒焦用一分半

右九味搗篩為散以雞子黃并雄雞冠一具和之如

杏仁大作三角條囊盛五丸臍右臂上仍可更掛於

春夏
夏反寒

戶上

春應暖而清氣折之則責邪在肝升麻解肌主之

方見溫下

夏應暑而寒氣折之則責邪在心調中湯射干湯半夏

桂枝甘少湯選用之

調中湯治夏月初初忽有暴寒折於盛熱、結於四肢則

拙熱頭疼寒傷於胃則下利或血或水或赤壯熱暈

問脈數宜下之

大黃

去皮三分

黃芩

芍藥

葛根

桔梗

茯苓

去皮

葉本

擇夏者無則言代之

白朮

甘少

冬已上各半

右制每服五升水一盞半煮取一鍾弱時再服之得快

利壯熱便歇小兒減其服虛冷人不收熱但不利或霍

乱不宜服此法

射干湯方見唾

半夏桂枝甘少湯方見咽痛

秋應涼而反大熱抑之則責邪在肺白虎加蒼朮湯首
障汁調五苓散白虎蒼朮湯見暑五苓散見渴

冬反

丹冬溫為病非其時而有其氣者冬氣君子當閉藏而反
後世於外專用補藥帶表入方

以竹筒升頭留節一節中作一竅內甘少於中仍以
竹木釘密其竅於大薰缸內浸一月取出晒干用治
疫毒用此藥一味入補藥帶表同煎服也

活冬應寒而反大溫抑之則責在腎宜善養生湯方見風溫

風溫是汗

下火重

大法

風溫忌汗宜

姜豕

多眠多汗脈浮為陰溫

陽脈浮滑陰脈濡弱更遇於風變為風溫 論見大法

發汗已身均熱者名曰風溫、為病脈陰陽俱浮自

汗出身重多眠嗜寘息必齟語言難出若被下者小便

不使直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癎時瘳

瘳若火重之一日逆尚引日再逆促命期 註云傷寒黃

汗已則身涼若發汗已身仍熱者非傷寒為溫風也

風溫續法

風溫者脈尺寸俱浮頭疾身熱常自汗出体重其息必

喘四支不收理、但欲眠治在少陰厥陰不可發汗即

謬言獨語內煩躁擾不得卧者蠶癩目亂無如此死者

鑿殺之耳以溫不可發汗宜萎蕤湯以溫身灼熱者知
母干葛湯以溫加渴甚者括萎相湯以溫脈浮身重汗
出漢防己湯萎蕤湯治以溫蕪療冬溫及春月中冷傷
寒發熱頭眩痛喉咽干舌強胸內疼痛滿腰背強

葛根半斤 萎蕤 三分一名女萎 石膏一兩 白朮五兩

麻黃用沸湯炮三沸焙干秤半斤 羌活去芦一兩 芎藭三兩

甘草炙半斤 杏仁去皮尖及 青木香一分

右剉每服五升水一盞羊脂一鐘日三四服

知母乾葛湯治以溫身體灼熱甚者

知母 三兩 乾葛 一兩 石膏 八兩 甘草 二兩 黃芩 二兩

木香 二兩 升麻 一兩 萎蕤 五兩 南星 二兩 人參

母 灼熱甚者知

渴甚者括萋

川芎 各二分 麻黄 四分去節 防风 杏仁 羌活 各二分

右剉每服五分水一盞半煎至一中盞去渣服

括萋根湯治冷濕加渴甚者

葛根 一兩半生用乾者三分 石羔 一兩 括萋根 三分

人參 防风 甘草 炙 各半兩

右剉每服五分水一盞半煎至一中盞去渣服

防己湯治風濕服浮身重汗出

漢防己 蜀椒 甘草 一兩 黃芪 一兩 生姜 二兩

白朮 三兩 大棗 十二枚

右剉每服五分水一盞半煮取一中盞去渣飲訖仍

坐被中汗出如索行或臥取出汗許學士云風

身重者防已

海藏以皂
加減代歲雜

濕候汗用防已黃芪湯枚之

海後以溫時人本方歲雜湯以有麻黃不敢用宜白朮湯

主之方見前太陽病發熱續法

若頭眩汗出筋惕肉瞤者加牡蛎

若腰背強硬者加羌活

若舌乾發渴者加人參

若身灼熱甚者加知母

若身體重多汗加黃芪

若內傷冷者不加

一身尽痛為濕

痛而發黃為中濕痛不得轉側為風濕活人又以身

濕病有二

濕病有二

痛而者蓋為
中濕痛不轉
側為風濕

血熱
經水不來
為諸諸如
結胸者刺
唇明者諸
者不柴切

痛脈沉為中濕脈浮為風濕亦通見太陽病体痛門

未變身反張為瘧

有汗為柔瘧無汗為剛瘧治法見肝部瘧門

婦人傷寒

熱入血室書婦人傷寒

產後傷寒

熱入血室

婦人中風者熱惡寒經水通來得之七八日熱除而脈

遲身涼胸脇下滿如結胸狀諸語者此為入血室也當

刺期門隨其實而瀉之東垣云見妄聞夜夢亡人皆肝

木大盛而為邪也刺期門與此義同

七七右許學士云有婦人忽熱入血室証醫者不識用
補血調氣藥函養數日遂成血結胸或勸用前藥
予曰小柴胡也已遲不可行也無已則有一馬刺
期門穴斯可笑予不能針請善針治之如言而愈
或者問曰熱入血室何為而成結胸也予曰邪氣
傳入經絡與正氣相搏上下流行或遇經水滯未
適斷邪氣乘虛而入血室血為邪迫上入肝經肝
受邪則譫語而見鬼復入膈中則血結於胸也何
以言之婦人平居水當養於木血當養於肝也方
未受孕則下行之以為月水既妊則中畜之養胎
及已產則上壅之以為乳皆血也今邪畜血併滯

及已產則上雍之以為乳皆血也今非富血得歸

肝經聚於臆中結於乳下故手觸之則痛非湯劑可及故當刺期門也

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈後人云小柴胡和之。犯胃氣謂下之犯上二焦謂苦汗刺期門也

何義云有一婦人溫病已十二日診之其脈六七至而牆寸稍大尺稍小發寒熱頰赤口乾不了了耳聾問之病數日經水乃行此為少陽熱入血室也若治不對病則必死乃按其証與小柴胡湯服之二日又與小柴胡湯加桂干姜也一日寒熱遂

止又云我臍下急痛又與抵當丸微利臍下痛痊
身漸涼脈漸勻尚不了了乃復與小柴胡湯次日
云我但胸中熱燥口鼻乾又少與調胃承氣湯不
得利次日又云心下痛又與大陷胸丸半服利三
行次日虛煩不寧時妄有所見時復狂言雖知其
尚燥屎以其極虛不敢攻之遂與竹葉湯去其
煩熱其夜大便自通至晚兩次中有燥屎數枚而
狂言虛煩盡解但咳嗽唾此肺虛也若不治恐乘
虛而成肺痿遂與小柴胡去人參大棗生姜加干
姜五味子湯一日咳減二月而病悉愈以上皆用

張仲景方

經水適經
為瘧狀

大法

婦人傷寒

男子同

惟熱入血室

妊娠暑暈

預防熱入血

室

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者以
為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡
湯主之

熱入血室續法

云此夫婦人傷寒中風治法與男子無異惟熱入血室妊
娠傷寒則不同也宜以四物安養胎血佐以汗下之藥
而治之也

婦人傷寒中風自汗頭痛項背強發熱惡寒脈浮而緩
恐熱入血室故倍加芍藥桂枝加芍藥湯

桂枝一升芍藥三升半生薑一升半大枣六升

右剉每服五升水煎

婦人傷寒脈浮而緊頭痛身熱惡寒無汗復乃熱入血

室宜麻黃生地黃傷

麻黃二升半 桂枝二升 甘草半升 杏仁廿三升
去皮尖

生地黃一升

右剉每服五升水煎

活婦人傷寒怪脈方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼宜服干

姜柴胡湯

柴胡四升 括萎根 桂枝一升半 牡礪一升

干姜 甘草各一升

右剉每服五升水一斗半煎一斗七升去滓溫服初服

微燒丹服汗出而愈

怪脈方來初斷
寒熱如瘧狂
言見鬼
寒多者藟
干姜
熱多者加地
牡實沸作
硬者挑角
硝黃
喘急者先化

羅小柴胡加地黃湯治婦人室女傷寒甚熱經水適來或
斷昼則明了夜則譫語如見鬼神亦治產後惡露不來
息見斷絕

柴胡一升 芍藥半斤 人參 黃芩 炙甘草

半夏 湯洗七次 生地黃各七升

右為籩末 生姜三片 棗二枚 同煎

岐婦人傷寒身熱脈長而弦屬陽明少陽往來寒熱夜
燥昼寧如見鬼狀徑小適斷熱入血室不實喘者小
柴胡加牡丹皮主之 大實喘者桃仁承氣湯主之
小柴胡加牡丹皮湯

柴胡二升 黃芩七分半 人參二升 半夏六升

大棗 三枚 甘草 七外半 生姜 七外半 牡丹皮 二外

右剉細每服一又生姜同煎

桃仁承氣湯方見畜血

婦人傷寒頭痛脈浮豎及下之邪氣乘虛而傳於裏經
水而閉不行心下結硬口燥舌乾寒熱往來狂言如
見鬼狀脈沉而數當下之宜小柴胡加芒硝大黃湯
主之

柴胡 二外 黃芩 七外半 半夏 制一又外 甘草 七外半

大黃 七外 芒硝 七外 大棗 三枚 生姜 七外半

右剉每服一又生姜同煎去渣下芒硝再沸溫服若

脈不沉數即不可下

去冬辛亥中寓居毗陵陸學子官王仲禮其妹病瘍寒炭寒
熱過夜則如鬼物所擾六七月忽昏塞及響音如引鏡
牙關緊急瞑目不知人疾勢極危召手祝之予曰得
病之初曾值月經來否其家曰月經方來病作而經
遂止得一二日炭寒熱晝雖靜夜則有鬼祟從昨日
涎生不省人事予曰此熱入血室之証也仲景云婦
人中風炭熱惡寒經水適來晝則明了夜則譫語如
見鬼狀炭作有時此名熱入血室證者不曉以剛劑
與之遂致胸膈不利涎潮上骨喘急息高昏胃不知
人當先化其後當除其熱予急以一呷散投之兩時
頃涎下得甦省人事次授以小柴胡加地黃湯三服

自汗多原經
斷者附經

表除汗解經
之者甘芍

而熱除不汗而自解矣

雲係 婦人傷寒表虛自汗身涼四肢拘急脈沉而遲太陽

標與少陽本病經水適斷桂枝加附子紅花湯

桂枝二兩半 芍藥 生姜各半兩 甘草一兩炙

附子炮

紅花各五分

右剉細每服一兩水三盞並服

婦人傷寒太陽標病汗解表除邪熱內攻熱入血室經
水過多無喘實者甘草芍藥湯

甘草 芍藥 生地黃 川芎 四味各一兩

右剉每服一兩水三盞並至一盞半去渣入 灰五

分調勻溫服不止者刺隱白

大法
繫古海藏
參芪四物湯
居汗下之五
為佐

續增妊娠傷寒

索厲風黃著鮮肌湯治婦人妊娠傷風自汗

人笑

黃芪

當歸

川芎

炙甘草

各五分

芍藥二分

加蒼木生地黄亦可書

右為僉末每服五分小煎溫服無時

海若妊娠傷寒中風寒表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脈

浮而弱太陽經且表虛六合湯

四物湯四升

桂枝浙地骨皮各七升

若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈緊太陽經病宜表實六

合湯如

四物湯 四升 麻黃 細辛 各半升

若妊娠傷風中風濕之氣 肢節煩疼 脈浮而熱 頭痛宜

風。六陽合太陽標病也 館 溫

四物湯 四升 防風 蒼朮 制各七升

若妊娠傷寒下後過經不金 溫毒 發痲如錦紋 宜升麻

六合湯

四物湯 四升 升麻 連翹 各七升

若妊娠傷寒胸脇喘痛而脈弦 少陽也 宜柴胡六合湯

四物湯 四升 柴胡 黃芩 各七升

若妊娠傷寒大便硬小便赤 氣喘而脈沉 數陽明太陽

本病也 急下之 宜大黃六合湯

本病也急下之宜大黃六合湯

四物湯四又 大黃 五子 桃仁 去皮尖十斤 楚炒

若妊婦傷寒汗下後咳嗽不止者宜人參六合湯

四物湯四又 人參 五味子各五子

若妊婦傷寒汗下後虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴

六合湯

四物湯四又 厚朴 枳實 楚炒各五子

若妊婦傷寒汗下後不得眠者宜枳子六合湯

四物湯四又 枳子 黃芩各五子

若妊婦傷寒大渴蒸、而煩脈長而大者宜石膏六合湯

四物湯四又 石膏 知母各五子

若妊婦傷寒小便不利太陽本病宜茯苓六合湯

四物湯曰又 茯苓 澤瀉各五子

若傷寒妊娠太陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六合湯

四物湯曰又 琥珀 茯苓各五子

若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣換者宜膠艾

六合湯

四物湯 劉河膠艾 各五子 一方加甘草同上

一方加干姜甘草黃芪

若妊娠傷寒曰支拘急身涼微汗腹中痛脈沉而遲少

陰病也宜附子六合湯

四物湯曰又 附子炮去皮臍 桂各五子

若妊娠傷寒畜血証不宜墮胎藥下之宜四物大黃湯下

石妊婦傷寒畜血証不宜墮胎藥下之宜四物大黃湯下

四物湯 生地黃 酒浸大黃

婦人妊姪或蓄血抵當桃仁勿妄施要教子母俱無損

大黃四物對分之

丹施孺人傷風未解兩足下胫冷嗽又不吐痰頭眩豈其

性急又當臨月

芩半錢 陳一錢 白朮一錢 蘇梗三分

通半錢 炒枳半分 麻黃三分 灸草二分

桔梗 蒼半分

雲岐婦人有孕傷寒肌厚頭腫腹中切痛宜桂枝加芍藥

當歸湯

桂枝 芍藥 當歸 各二分

右剉每服一又水煎

婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不下脉沉者太陰也

宜芍藥湯

芍藥 白朮各二兩 甘草 茯苓各四兩 黃芪二兩

右如前備煎服

活治妊娠傷寒安胎宜阿膠散

人參 白茯苓 阿膠 桑寄生 白朮各等分

右搗羅為末並糯米飲調下二錢日二服

治妊娠傷寒安胎宜白朮散

白朮 黃芩等分脉凡上炒香

右為末每服三錢水一中盞生姜三片大棗一枚碎刀

石為末每服三錢水一中盞生薑三片大棗一枚研

破同煎至七分去渣溫服但覺頭疼發熱便可二三

服即差惟四支厥冷陰証見者未可服

治妊婦傷寒憎寒發熱當發其汗宜蒼白湯

蒼白十莖 生薑二兩切

右剉小二盞煎至一盞連服取汗

海慈白一物湯

蒼白二把

右以水一斤者煎取汁令食尽亦主安胎若胎死頂

治婦人傷寒妊婦服藥例

若發熱惠寒不離桂枝為藥

若往來寒熱不離柴胡全胡

史則出

若大渴不離知母石膏五味子麥門冬

若大便泄者不離桂附白朮干姜

若大便燥結者不離大黃黃芩

若怪水適來適去研者不離小柴胡

若服藥者不離人參阿膠白朮黃芩

若盜汗者不離葱豉生姜麻黃旋覆

若頭痛者不離前胡石膏枳子

若傷暑頭痛者不離柴胡甘少石羔

若喘悶者不離枳實陳皮

若胎氣不安者不離黃芩麥門冬人參

若癩瘡黑者不離黃芩枳子升麻

雜方

大全治妊娘時氣身大熱令子不落護胎方

伏龍肝研令極細水調塗臍下二寸乾即易差即止

又方

井中泥塗心下乾即易二方法本多有効

又方

浮萍 川朴硝 蛤粉 藍胡等分 大黃微炒

右為末水調付臍上安胎解熱極効

治妊娘霍亂二方 附少陰吐利門

治妊婦發痧變為黑色宜梔子大青陽

黃芩 升麻 梔子仁各二兩 大青 杏仁各半兩

右剉每服五錢水一盞半細切葱白三寸並至一盞去渣服

產後傷寒

產後中風續之數十日不解微頭痛惡寒時有熱心
下悶乾嘔汗出雖久陽旦証在耳可與陽旦湯即桂
枝湯方見太陽病

產後中風發熱面正赤喘而頸痛竹葉湯主之

竹葉一把 葛根三斤 防風一兩 桔梗 桂枝

人參 甘草一兩 附子一枚炮

右吹咀每服五升棗一枚生姜五片水一盞半煎一
中盞去渣溫服覆便汗出口致項強用大附子半升
破之如豆大煎藥去楊沫嘔者加半夏一升洗

產後傷寒續法

大法

產後者熱惡寒

宜補虛忌苦寒

忌苦寒

腹痛者去惡

血

乳汁不通者

無子且麥芽

有子宜通草

丹產後發熱惡寒皆屬血虛虛左手脈不足補血右手脈不

足補血

惡寒發熱腹痛者當去惡血

惡寒發熱乳汁不通無子當出麥牙二兩炒研細末清

湯作四服調下

如有子用木通通草猪蹄汁調並服

產後才見身熱不可發汗表并一切苦寒藥必用于姜

治大發熱輕用茯苓淡湯其熱

大舍凡產後發熱頭痛身疼不可便作感冒治之此等多

是血虛或敗血作梗血以平和之劑與服必效如玉露

散或四物加此柴胡等分並服若便以小柴胡湯及竹

產後傷風寒瀉法

葉石羔湯之類竟不救者

玉露散治產後乳脉行身體壯熱疼痛頭目昏痛大便

澀滯悉能治之涼平盤熱館乳

人參

茯苓

甘草

各半兩

苦梗炒

川芎

白芷各兩

當歸一分

芍藥三分

右為末每服二錢

水一盞

並至七分溫服如煩熱

甚大便秘者加大黃三錢

續增小兒傷寒溫病

素傷寒表裏攻葭

右表証者惡風惡寒者當葭表

海藏云惡風者白朮散

惡寒者神木湯

大法

如氣盛能會不大便無表証可攻裏海藏云通鼻丸王

春主溫屬木身溫當芫汗海藏云神木湯

夏主長屬火身熱而煩躁合大芫散海藏云神木加黃芩湯

長夏主化屬土及居四季同當調其飲食海藏云益君子湯

秋主收屬金身涼內溫合微下海藏云通鼻金花丸

冬主藏屬水身極而惡寒是熱在外而寒在內身涼寒

而惡熱在內而寒在外海藏云熱在內者調胃承氣湯

寒在內者調中湯丸

右是依四時陰陽升降逆順剛柔而施治法氣升浮則

順芫之氣收斂則下之有汗芫熱惡風脈浮緩者風傷

衛桂枝湯

無汗發熱惡不當寒風而憎寒脈浮緊者寒傷榮麻黃湯
有汗發熱惡風脈浮緊無汗發熱惡寒脈浮緩謂之榮
衛俱傷青龍湯桂枝麻黃各半湯

無汗發熱不惡風寒脈沉洪者可下之
更詳認其脈與不願量寒熱淺深而治之

有汗四支厥脈沉微者名陰厥四逆湯

無汗四支厥脈沉滑者名陽厥大承氣湯加膩粉

如四支不厥身熱內外皆陽不動涼藥三五服下之

黃芩甘草湯 黃芩芍藥湯 黃芩白朮湯 黃芩蒼

朮湯 黃芩梔子湯 連翹飲子 小柴胡湯 涼膈散

八正散 白虎湯 五黃散此上中下三焦藥宜選之

中暑脈虛皆惡寒白汗而渴白虎湯身涼脈緊熱在內者急下之。燥咽乾不大便是也。

無汗身大熱者可葭苈升麻湯大青膏天麻膏

布汗身大熱者桂枝湯惺惺散解肌湯小柴胡湯白朮

防風湯可選用之葭苈者量四時暄暑燥濕以寒各宜

春涼夏寒秋溫冬熱而葭之

錢傷風貪睡口中氣熱呵欠頓悶當葭散慎大青膏表証

也索古補遺云小兒外感於風寒怕急呵欠頓悶皮毛

疏口中氣熱當葭散冬用溫熱藥夏用涼藥寒藥

大青膏

天麻末 一匙一分
白附子末 生一分半
蜈蚣 去毒生半外

表
貪睡口熱可
頓悶為表

硃砂研三字已 青代五研 天竺黃一字研 麝香一字七

烏梢蛇肉酒浸焙干取末半分

右同并研細生蜜和成膏每服半皂子大至皂子丈
月中兒粳米大同牛黃膏薄荷水化一處服之五歲
已上同甘露散服

牛黃膏治及傷風溫壯痲痘引飲

雄黃小秦大研薤菹根中并醋一大盞煮尽 甘草末三分

川甜硝三分 寒水石五分七研細 腦子三分 朱砂半分

右研勻煉蜜和成膏薄荷湯化下半皂子大

右大青膏散散貪嗜口氣熱呵欠頓悶表証者蓋
為三歲已下小兒米能言者設也

頭疼發熱
要同寒為
表

活尋常風壅發熱鼻涕痰嗽煩渴惺一散主之方見瘧

海傷 寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和四君子加細辛

瓜蒌枳殼各一分生薑薄荷各一分防風川芎各一

分內有寒及遇天寒欲發散者則去瓜蒌枳殼多虛

汗夜啼加麥門冬

傷風身熱頭痛氣促四君子加川芎防風等分細辛羌

活減半同煎

居咽嗑不利痰實咳嗽鼻粘子湯

云岐人參羌活散治小兒寒邪 溫氣時疫瘡疹頭痛休

疼壯熱尋脈下治潮熱煩渴痰實咳嗽

羌活 獨活 柴胡 人參 芍藥 枳殼

甘草 炙各二兩 前胡 桔梗 天麻 何處矣

地骨皮 各半兩 白茯苓 去皮二兩

右為散每服二升水一盞入薄荷少許同煎去渣溫

服不拘時候

湯治時氣頭昏体重七言散小兒同乳母服大人亦可

紫蘇葉 香附各三兩炒 橘皮 炙甘草

桔梗 白芷 川芎各一兩

右咬咀姜棗煎服

活麻黃 蒼湯治小兒傷寒無汗頭疼發熱惡寒

麻黃 三兩 赤芍藥 黃芩半兩 甘草炙 桂枝 各二兩半

右粗末水煎

升麻黃芩湯治傷風有汗頭疼發熱惡寒

升麻 葛根 黃芩 芍藥 各五分 甘草 一分半

右剉每服二錢水煎服

右惺、散等藥發散頭痛發熱惡風寒表証者蓋

為三歲以上小兒能言者設也。能言故頭疼惡風

寒可問而知也。前五方通治。有汗無汗惡冷惡

寒第五方治無汗惡寒第六方治有汗惡風

錢其大青膏不解散有下証當下大黃丸主之。大飲水不

止而善食者可微下餘不可下也。裏証也。鹽古補遺

云大熱飲水能食不大便用大黃丸作散子服之如

清便自調慎不可妄。不恐外熱逐於內。變結胸危証

裏
大便秘而飲水
散食為裏

多矣

大黃丸治風熱口燥裏實口中氣熱大小便秘赤飲水

不止有下証者宜服之

川芎 半兩 黑牽牛 半兩 半生半熟炒

甘草 炙 大黃 一兩 酒洗過米下蒸熱切片焙干

右為末稀糊為丸如麻子大二錢歲每服十丸溫蜜

湯下乳後服以糖利為度未利加丸散

活頭額身體發熱大便黃赤腹中有熱四順散連翹飲三

黃丸主之四順飲連翹飲三黃丸並見痘門

身體潮熱頭目疼痛心神煩躁小便赤大便秘此熱劇

也洗心散調胃承氣湯主之洗心散見痘門

大便白而酸
身為食積
小便不利宜利
小便

傷風蕪歲
無脾則或散
冷盛利或脹
或吐瀉

頭頸身體濕熱大便白而酸臭也胃中有食積雙丸主
之才見食積門

繫如身表無大熱而小便不利是為有濕熱結膀胱仍用
勝濕藥白朮茯苓之類利小便則其熱自退

雲坡小兒傷寒煩熱小便赤澀大便褐色面赤氣熱者導赤散

錢傷風蕪歲○無心則驚悸○無肺則問亂喘急哽氣長

出氣嗽無腎則畏明各隨補母歲虛見故也

傷風予足冷○脾歲性也當和脾後散散和脾益黃散

昔散大青膏主之况滑者不利此法者若陽取無汗脈

傷今自利○脾歲虛怯也當補脾益黃散散大青膏

主之末差調中丸主之有下証大黃丸下之後服溫散丸

魚心則驚搖

傷氣腹脹。脾藏虛也。當補脾。必不喘。後散散仍補脾。

也。去脹塌氣丸。主之。散散大青膏。主之。

傷風吐瀉。及見吐瀉。門治吐瀉。益黃散。白朮散。散散用。

大青膏

易治。夾驚。傷寒。熱。極。生。冷。薄。荷。散。

薄荷葉 半兩 羌活 全蝎 麻黃 去節 甘草 半兩

天竺黃 姜蚕 白附子 炮 各一分

右為末。每服一錢。水。小。半。盞。薑。至。三。分。加。竹。瀝。少。許。炒。

寒。收。小。兒。表。傷。寒。則。皮。膚。閉。而。為。熱。盛。即。生。風。欲。為。驚。膏。

血氣未實。不能勝。邪。故。散。膏。也。大。小。便。依。度。口。中。氣。熱。

當散之。且。大。青。膏。

金肺則喘

金腎則明

禱方

渴分虛實

肺感復有冷風。胸滿短氣，氣急喘嗽，上氣當先散肺。後散風冷，散肺用白散。大青膏主之。肺只傷寒，則不胸滿。

腎虛則畏明，宜補腎地黃丸。有表者，間用大青膏散。

傷冷下後餘熱，以藥下之。太過胃中虛熱，飲水無力。

也。當生胃中津液，多服白朮散。

小兒結熱於內，口乾而渴，身黃體重者，白朮散。

湯傷寒，散渴宜白虎湯。

藥大熱，飲水能食不大便，用大黃丸作散服之。

右三方治渴。白朮散治虛渴，為下後而食少胃虛者設。

也。白虎湯、大黃丸治實渴，為未結下而不能食不大便。

嗽分虛實

者設也

熱傷寒咳嗽吐清水哽氣長出氣是肺之不足也令用阿

膠散面白如拈骨者死不治

身熱咳嗽吐痰者常用福銀丸
方見咳嗽門

右二方治嗽阿膠散治虛嗽為哽氣長出氣者設也

福銀丸治實嗽為痰盛喘喘者設也若有表設表証

惡風寒而嗽者當用惺惺散加減四君子湯舉拈子

湯五類是也

陰厥陽厥見大法條

潔身有大熱吐逆不止者茯苓半夏湯即小半夏加茯苓

湯方見嘔門○

厥分陰陽
吐分表裏

湯傷寒嘔者枳壳半夏湯

枳壳

半夏各半升

右水一椀姜十片葱五寸半椀十歲已下作五服

藿香正氣散治傷寒發嘔

藿香葉

厚朴製

半夏製

甘草炙

陳皮

蒼朮

米泔浸炒各等分

右咬咀每服二升水半盞姜三片棗半枚煎至二分

去渣服

索大吐者當下之白餅子稱疎也消積丸三方至見瘳用

朝熱有時胸滿短氣嘔吐者桃支丸

右七方治傷風嘔吐前二方治疾飲吐中一方治百

自汗為虛

衰而吐後四方治有裏而吐其桃支丸治裏熱而吐

餘三方治裏寒而吐也

陽傷寒自利當補虛和陰陽用小建中湯減桂加黃芩人

參地黃

黃芩一兩 白芍藥三兩 甘草

熟地黃各半兩

右咬咀每服二錢水半盞煎至三分去渣服

頭痛眩痛是傷寒 〇鼻塞或流涕是傷寒 〇喉內喘息是

傷寒 〇手足脈洪數是傷寒 〇頰赤眼赤是傷寒 〇身

上寒毛起是傷寒 〇口鼻出沫是傷寒 〇眼赤黃是傷寒

〇口乾渴是傷寒 〇咳嗽者是傷寒 〇山根赤色是傷寒

診

痲疹與傷寒
相似

溫

○噴嚏是傷寒

活頭目疼痛而偶人惡寒者此傷寒証也

雲岐熱令小兒卒暴身壯熱惡寒曰支冷或耳熱冷鼻氣

熱或為痲疹也與傷寒衆証相似胎氣始者目內之

外與傷寒表証同治者慢也當作小斑瘡治之

溫病 溫病者春月之溫病而不熱也

田氏春日溫病。未滿三日先用慳、散二脈後曰五之

日不解煩渴嘔用白朮散如自汗口燥用製白虎湯至

六七日大便燥結用白順飲子下心腹大實大滿牛黃

通高丸 下初覺之時疑是瘡疹只用葛根升麻湯解肌

傷寒拾遺

和解目時法 溫中法 灰包熨法

寸脈定者
表隨氣候
立寸

治中風自汗用桂枝湯治傷寒無汗用麻黃湯此仲
景表散之法百世不易者也至於韓祗和戒桂枝而
以中風傷寒通作一法治之者此當時之權變非百
世之常行也王梅藏云仲景用桂枝當漢之末也
韓祗和戒桂枝當宋之隆也時世之異不可不知今
編祗和之法於篇末以廣後學之見云

韓祗和解回時法

傷寒病有可汗者論中但統言其可汗証及可汗脈或云
脈浮弱或云脈浮而數或云脈浮緊或云脈浮無汗而
喘或云脈浮為在表今畧舉為條後人但傷其脈之大
○舉並不分脈浮有陰陽虛盛之理又不分有可汗不可

寸尺力齊等
而軟者可為表

寸少宜慎陰
助陽表藥
見傷寒証宜
和

汗之趣設投散表藥則多變成陽毒之患今舉病人有
汗惡風無汗惡寒分三等及據立春以後立秋以前氣
候輕重各立有治之庶學者易為開悟耳

病人二三日以前兩手脈浮數或後或緊按之差軟寸關
尺若力齊等其力不甚大不甚者小亦未可便投解表
藥此是見表証未見表脈也直候寸脈力小如關尺即
可投解表藥大抵治傷寒病見証不見脈未可投藥見
脈不見証雖少投藥亦無害矣凡治雜病以色為先脈
為後治傷寒病以脈為先証為後

病人兩手脈浮數而緊名曰傷寒若關前寸脈力少關
後尺脈力大雖然不惡風不自汗出此乃陰氣已盛

先見于脈也若不按彙和之後必惡風及自汗中若之
春以後至清明已前宜調脈陽主之清明以後至芒種
已前宜葛根柴胡湯主之芒種以後至立秋以前宜人
參桂枝湯主之

調脈湯

葛根 一兩

防風 去芦半兩

前胡 去苗

甘草 炙半兩

右粗末每服二升水一盞生姜一塊如小指大擘手破
豈至七分去渣溫服如寸脈依前力小加棗擘同煎

葛根柴胡湯

葛根 一兩半

柴胡 去芦一兩

芍藥 二分

桂枝 三分

甘草 炙三分

右吐咀每服二升水一盞生姜二片煎至七分去渣煎一服若如寸脈依前力小加葱白三寸同煎服

人參栝樓湯

人參三分 栝樓三分 麻黃去節一兩 石膏三兩

甘草炙三分

書

右吐咀每服二升水一盞煎至七分去渣煎一服若如寸脈依前力小加麻黃二分去節同煎服

見中風脈書
中風証亦和

病人身手足脈厚數而後名曰中風若寸脈力小尺脈力大熱不惡風不自汗出此陰氣已先見于脈若不殺藥和之後必惡風自汗出若主脊已前後清明以前宜厚苛陽主之清明以後至首種以前宜防風湯主之首種

以後至立秋以前宜香芎湯主之

薄荷湯

薄荷一升 葛根半升 人參三分 甘草半升 防風去芦半升

右咬咀每服三升水一盞煎至七分去渣熱服如三

五服寸脈力尚小加薄荷二分用煎

防風湯

防風去芦一升 桔梗三分 甘草半升 旋覆花半升

厚朴制三分

右咬咀每服三升水一盞生姜一塊如指大擘破煎

至七分去滓熱服如三五服寸脈力尚加荆芥五七

穗同煎

香芎湯

芎 一分 石膏 二兩 升麻 三兩 甘草 炙半兩

厚朴 制半兩

右以咀每服三分水一盞煎至七分去滓溫服如三
五服後寸脈尚小加細辛二分

前二段文將中風傷寒各立法者何蓋調病人始得病
三日以前或目中風脈緩或目傷寒脈緊然脈雖先亂
而病証猶未見尚可以藥解之故各立方耳

病人而手脈浮數或緊或緩寸脈短及力小於關尺脈
者此名陰盛陽虛也若自汗出惡風者是邪氣在表陰
氣獨有餘也素問曰陰氣有餘為多汗身寒是也即可
投消陰助陽發表藥治又若立春以後清明以前宜示

傷寒中風
証俱見其要

物麻黃湯主之清明以後至芒種以前宜七物紫胡湯
主之芒種以後至立秋以前宜葭麥表湯主之

六物麻黃湯

麻黃

去節一兩

葛根三分

人參半兩

甘草炙半兩

蒼朮

去黑皮三分

右吹咀每服三升水一盞棗二枚並五七合去渣

服如三五服後汗未止猶惡寒者加荊芥三分如三

五服後不惡風猶汗自出者加船上下香皮半兩

七物紫胡湯

紫胡

去節二兩

蒼朮

去黑皮一兩

荊芥穗

一兩

炙甘草一兩

麻黃

去節一兩

發表湯

右吹咀每服二升水一盞生薑一塊如指大擘破棗
二枚擘碎同煎至七分去渣熱服如服盡五服後
汗未止猶惡風者入蒼白三寸如三五服猶未止者
加當歸一兩每服棗三枚同煎服

麻黃

去節一兩半

蒼朮

三兩

人參

半兩

當歸

甘草

炙三分

舶上

丁香

皮

三分

全椒

右吹咀每服三升水一盞入生薑一塊如指大擘破

棗三枚同煎至七分去渣熱服如三五服汗未止猶

惡冷者加桂枝三分如汗未止更加細辛半兩以汗

止為度

寸大宜消
陽助陰表
藥

病人脈浮數或豎或緩其脈上出魚際寸脈大於關尺
此名陽盛陰虛也若安胃間燥咽乾者乃是邪氣在
表陽氣独有餘也素問曰陽氣有餘為身熱無汗是也
可投消陽助陰藥以解表若立春以後至清明以前宜
人參湯主之清明以後至芒種以前宜全胡湯主之芒
種以後至立秋以前宜石美湯主之

人參湯

人參半兩 芍藥三分 石膏二兩 芫胡去苗一兩
甘草炙三分

右以咀每服三分水一盞入生姜一塊如指大劈破
同煎至七分去渣熱服如三五服後依前熱未解每

服入豉三十粒水一盞半同煎至八分去渣熱服

前胡湯當尋祛和書補之

石膏傷

石膏三升芍藥一升升麻三分黃芩三分

柴胡

去苗一升甘草炙三分

右為末每服三升水一盞半入豉一合煎至八分去

渣熱服如服藥三五服後熱未解加知母一升又塊一

圖書

寸尺俱有
力宜平之

未解加大青一升

病人寸手脈厚數或緊或緩三部俱有力無汗惡風者
此是陰陽氣俱有餘素開曰陰陽有餘則無汗而寒是
也可用藥平之若立春以後至清明以前宜解肌湯主
之清明以後至芒種以前宜為導湯主之芒種以後至
立秋以前宜知母湯主之

解肌湯

石膏二升 麻黃去節三分 升麻半升 甘草炙半升

右咬咀每服三分水一盞半入豉半合並至八分去
渣熱服如三五服後猶惡風者加麻黃半升石膏一升

為藥湯

芍藥一兩 麻黃一兩 升麻一兩 甘草炙一兩 豉一升

芍藥一兩 石膏三兩 荆芥穗一兩 甘草炙半兩

右吹咀每服三錢水一盞入生姜一塊如指大劈破同

煎至七分去渣熱服如三五服後猶惡風者每服加

生薑一塊如指大劈破同煎服

知母湯

知母 石膏 麻黃 升麻 甘草炙半兩

右吹咀每服三錢水一盞入生薑一塊如指大劈破同

煎至七分去渣溫服加三五服後猶惡風者加麻黃

半兩升麻半兩

仲景云傷寒為病脈緩者名中風脈緊者名傷寒今今此

二端者何也始曰冬寒毒之氣中人其內伏之陽况

中風傷寒
你一法治

或曰外傷風而引內邪也

於骨髓之內每至春夏黃時或曰外傷寒而引內邪出
及手內邪既出而為病一也故古人之立此二端恐後
人疑其鑿脈其緩脈治法別也若中風與傷風寒脈異
何故仲景無別法治之此乃後人不究仲景之心也
前三段文將中風與傷寒一法治者何蓋病人始得病
後脈其証俱見若投解利藥必不能愈故立前方同法
治之

病人始得病一二日至五六日尚有表脈及表証亦可
依証脈投藥凡投解表及發表藥每一日可飲三服
病証甚可至五服外不可頓服藥也如証未解次日依
前再投如証依前未解可作熱粥投之粥內加蒼白赤

診治

可如有汗出勿厚衣蓋覆恐出汗太過作亡陽証也

海藏云韓氏微旨可汗一篇有和解同時法言傷者之脈

頭小尾大傷風之脈頭大尾小李思訓保命新書亦分

尺寸與韓氏同之非若前人怒言尺寸脈俱厚而緊尺

寸脈俱厚而後緊則為傷寒無汗後則為傷風自汗

之有傷寒有汗者傷風無汗者脈亦互差其証不同前

人已盡之矣惟韓李所言頭小尾大即為傷寒尾小頭

大即為傷風也人病間有脈証未頭手尺寸者故韓李

述為和解同時法也又恐後人疑其不與前聖合遂與

在方藥內又立加減法數条亦不越前人之意何其當

哉垂二公者當宗之盛時故又戒麻黃桂枝不用輕用

韓氏法當時
則可仲景法
百代可行

傷寒寸脈小
飲令寸脈無

改用石膏升麻葛根柴胡之平劑當時則可非百代常
行時世過移之活法也可汗一篇若隨湯液隨証應見
自有定規雖明哲不可踰

又寸口脈小飲冷與霧露前傷同作中焦治今韓李云

傷寸小者勿認與飲冷而霧露同傷一體也飲冷霧露寸

口舉按全無是陰氣在胃不能和陽氣不能升越也傷

寒寸口小者只於關已下至膀胱本部見之寸口雖小

已是舉之微小况得之有也試若飲冷舉按全無也若

果寸口舉按全無即不可解表只宜溫中不可不知

韓氏溫中法

夫傷寒之說始自黃帝以闢其端由至於仲景方陳其

陰

條自自後膚淺之學莫知其數立言者只去病在表可
豈汗病在裏可下之或云不可汗或云不可下即未嘗
有溫中之說仲景傷寒例云尺寸俱沉細太陰受病也
尺寸俱沉少陰受病也尺寸俱微後厥陰受病也又辨
太陰証云太陰病脈浮可發汗宜桂枝湯又自利不渴
者宜四逆湯又腹滿時痛桂枝芍藥湯難少陰証云少
陰病始得之發熱脈沉者麻黃附子細辛湯又少陰病
二三日麻黃附子甘少湯又少陰病手足寒身體痛骨
節痛脈沉者附子湯又少陰病吐利手足逆冷煩躁欲
死者吳茱萸湯又少陰病脈沉急溫之宜四逆湯今舉
仲景論中數條最是二陰病之良法于今世之用而有

手岑証者異常旋自至和初歲迄於今三小餘年不以
歲之太過不及為則每至夏至已前有病傷寒人十中
七八手脈俱沉細數多是胸膈悶或嘔逆或氣塞
或脹為或腹痛與仲景三陰病說理同而証不同且茲
不敢妄投仲景三陰藥才見脈沉及胸膈滿便投下藥
下之往往不效常斟酌仲景理中與之服其病勢輕者
即胸中便快其病勢重者半日許喘依然或有病人脈
沉細遲挾仲景四逆湯溫之多藥力大熱復必發煩躁
目校量此形証令別之方以治之得對証藥不可不
傳焉

病人但及手脈沉細數或有有力無力或關脈短及力小

胸膈塞悶氣短不能相接便可隨脈証投溫中藥治之
。病人手足脈沉遲或緊皆是胃中寒也若寸脈短及力
小於關尺者此陰盛陽虛也或胸膈滿悶腹中脹滿身
體拘急手足逆冷為宜溫之若立春以後至清明以前
宜溫中陽生之情明以後宜種以前宜橘皮湯主之若
種以後至立秋以前宜七物理中丸主之

溫中丸

丁香一分

干姜二分

白朮

陳皮

丁香各二分

厚朴一分

右為末每服二分小一匙著白三寸荊芥五種煎至七分
去渣熱服未快手足又逆吐嘔加舶上丁香干姜二分

橘皮湯

橘皮一丸 藿香三分 白朮 葛根各二分

厚朴一丸制

右為末每服二分以一盞生姜一塊如棗大搥破用煎至七分去渣熱服如三服未快手足尚逆嘔然不
定加半夏半丸 丁香桂枝半丸每服加葱白三寸煎服
七物理中湯

白朮五分

乾姜二分半

人參七分半

桔梗七分

葛根七分半

藿香半五分

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸以一盞煎至七分和渣熱服如三服未快手足尚逆嘔者加半夏半丸于姜半丸

病人兩手脈沉細無力雖三部脈力停亦是陰氣盛也
更不煩候寸脈短治之或脈弱喘悶身體拘急痞
痛手足逆冷連宜溫中藥和之

若立春以後至清明以前宜厚朴丸主之清明已後
至芒種以前宜白朮湯主之芒種以後至立秋已前
宜橘皮湯主之

厚朴丸

當歸半兩

二皮 故技半兩

厚朴一兩制

細辛四兩半

人參七兩

甘少 炙半兩

干姜半兩炮

右為末煉蜜為丸彈子大每服一丸水一盞黃至六
分和查熱服三服後脈尚細及寸脈尚細無力每服

加茺白三寸同煎服

白朮湯

白朮

半夏

當歸

厚朴制

干姜

炮已上各半兩

丁香七分

右為末每服三升水一盞生薑棗許大搥破同煎至

七分去渣熱服三五服脈未有力寸脈尚不加細辛

半兩每服加茺白三寸同煎服之

橘皮湯

橘皮半兩

藿香

葛根各三分

半夏

厚朴制各半兩

右為末每服三升水二盞生薑如棗大同煎至七分

去查熱服三五服脈尚小手足逆冷加細辛半兩
病人胸高滿悶時嘔吐逆支節痛兩脇下痛腹中
鳴此是停飲宜二苓湯
二苓湯

赤茯苓 木猪苓 白朮 各半兩 滑石 一兩

通草 白豆蔻仁 各半 丁香皮 七分半

陳皮 五分 桂枝 半兩

右為末每服三分以一盞煎至七分去查熱服小便
未快加瞿麥七分半嘔未止加半夏半兩漸惡寒
甚每服加葱白三寸

灰包慰法

病人眼前葉胸高不滿悶者此上焦有吐也或葉力太過
上焦有熱腹滿虛鳴時、疼痛此是被吐葉消逐得上
焦水氣併入下焦也雖是下焦積寒冷上焦吐盛更難
投溫下焦葉也當用灰包法炭灰或葉柴灰二三升許
一好醋拌和乾濕得所銚內炒令灰熱以帛包裹置臍
下熨之頻換灰包令常熱以腹不滿痛為度初熨時病
人不愛者但聽但令亟熨之不住灰包可也如灰包熨
後得下利三兩行或小便二三升或微汗有汗此是水
氣外出或下泄也勿疑之痛輕者乃得愈後出餘氣而
解病人三部脈沉寸脈小於關尺此為水盛當溫中葉
以消水氣宜厚朴丸

厚朴丸

陳皮

人參

白朮

藿香

當歸

細辛 之類是也

神木湯亦同治

水燥而渴不可誤用涼藥若執藥

冷服內有伏飲則可若脈已虛按之全無力或病

人素無食養只可溫服

浙江

浙江圖書館



藝林

新刊

臨平

林木

全洲

入

藝林

新刊

臨平

林木

全洲

入





浙江圖書館

浙江圖書館善本

甲登記號：010775

一九 年 月 日

浙江圖書館





卷
三十二
三十三



浙江圖書館



浙江圖書館



Centimetres

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue

Cyan

Green

Yellow

Red

Magenta

White

3/Color

Black