T7780/4443(2)
CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
OCT 10 1952

十

卷之三十二

合病併病汗下吐後等病　喘
身重　難轉側　遺尿　盜汗
面赤　壞病　戰慄振搖　筋惕肉瞤
叉手冒心　驚　悸　臟結結胸
痞氣同異　結胸　痞　煩　煩躁
欬　小便不利　小便難　噫
尸厥鬱冒　噦　無汗　瘧狀
頭汗　舌白胎　動氣　鼻衂

十

卷之三十二

下血　唾血　畜血　吐血
短氣　心痛　除中　下重
身熱惡寒　身寒惡熱　痙　癍
狐惑　百合病

卷之三十三

勞復　陰陽易　四時傷寒不同
冬傷寒　春温病　夏暑病　温疫
秋瘧疾　風温　濕　痓　婦人傷寒
熱入血室　妊娠傷寒　産後傷寒
小兒傷寒　温病　韓氏和解因時法
温中法　灰包熨法

醫學綱目卷之三十二　傷寒部

合病併病汗下吐後等病　喘　身重

難轉側　遺尿　盜汗　面赤　壞病
戰慄振搖　筋惕肉瞤　义手冒心
驚　悸　藏結結胷痞氣同異　結胷
痞　煩　煩躁　欬　小便不利
小便難　尸厥鬱冒　噫　噦　無汗
瘧狀　頭汗　舌白胎　動氣
鼻衄　下血　唾血　畜血　吐血
短氣　心痛　除中　下重　身熱惡
寒身寒惡熱　痓　斑　狐惑　百合

合病併病汗不吐後等病

合病宜

太陽與陽明合病必自下利葛根湯主之不下利但嘔者

哈佛大學哈佛燕京圖書館珍藏印

葛根加半夏湯主之

（宜和）太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏湯生薑湯主之

（宜下）陽明與少陽合病必下利脉滑而数者有宿食也當下之宜大承氣湯（論見下利）

（併病宜汗）二陽併病太陽出汗不徹因轉屬陽明自汗不惡寒太陽症不罷面赤燥煩短氣者更發汗則愈

（宜下）二陽併病太陽症罷潮熱譫語者下之則愈（論見譫語）

太陽與少陽併病項強眩冒心下硬如結胸者刺胸腧肝腧（論見項強）

喘

（和表）太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下麻黃湯主之

（發汗）凡有人病傷寒脉浮而長喘而胸滿身熱頭痛腰脊強乾不得臥予曰太陽陽明合病仲景云中有三證下利者葛根湯不下利嘔逆者加半夏喘而胸滿者麻黃湯也治以麻黃湯得解

太陽病頭疼發熱身疼惡風無汗而喘者麻黃湯（論見發熱）

陽明病脉浮無汗而喘者麻黃湯（論見不大便）

喘家有汗桂枝湯加厚朴杏仁佳

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝（去皮）　芍藥（各一兩）　甘草（炙）　厚朴（各六錢）

杏仁（去皮尖二十个）

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑五片肥棗三枚擘破同煎至八分温服覆取微汗

表不解乾嘔發熱欬喘者小青龍去麻黃加杏仁湯（論見欬）

（喘潮熱腹滿大小便秘脉沉乌）陽明病潮熱汗出不惡寒短氣腹滿而喘者大承氣湯（論見）

裏

（不大便註云在裏而喘者腹滿在表而喘者腹不滿）小便不利大便乍難乍易微熱喘冒不能臥者大承氣湯　脈沉喘滿反發汗大便難者裏實（从論見譫語）

汗後而喘

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃（四兩）　杏仁（五十个）　甘草（二兩）　石膏（半斤）

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取二升去查溫服一升

發汗後飲水多必喘以水灌之亦　浮後脈沉喘滿大便難譫語者裏実（从論見譫語）

下後而喘

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯　下後利不止脈促而喘汗者葛根黃芩黃連湯（从論見喘利）　太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏仁湯主之

許有武臣爲寇執置舟中艎板下數日得脫乘飢恣食良久解衣捫虱次日遂傷寒自汗而膈不利一醫作傷食而下之一醫作解衣中邪而汗之雜治數日漸覺昏困上喘息高予診之曰太陽下之表未解微喘者桂枝加厚朴杏仁湯此仲景之法也指令醫者急治藥一啜喘定再啜漐漐汗出至晚身涼脈已和矣醫曰某平生不曾用仲景方不知其神捷如此

診

傷寒吐下後不大便潮熱若劇則不識人循衣摸床微喘直視脈弦者生濇者死（論見循衣摸床）　濕家下後額汗微喘大小便利者死（論見体痛）　少陰病息高者死（詳見欬利論見欬寐）　厥冷無脈灸之不還反微喘者死（詳見欬利）　直視譫語喘滿者死（論見譫語）　脈浮洪汗出如油髮潤喘不休者爲命絕（論見大法）

喘續法

陰症喘

活陰證喘促者返陰丹主之四肢逆冷喘促入口便住（方見陰毒）

飲水喘

病人小渴與水劇飲之致停飲心下滿結者喘死甚衆當以五苓散或陷胷丸主之（方見渴及結胷）

身重

身重面垢遺尿

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上出汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之

身重脈浮多眠

風温爲病脈浮汗出身重多眠鼻息鼾（論見風温宜活人萎蕤湯）

身重脈浮緊

陽明病脈浮緊口苦咽燥腹滿而喘發熱汗出不惡寒反身重忌汗忌燒鍼忌下（論見自汗許云此証宜和解之）

身重腹滿潮熱

陽明病汗出不惡寒身重短氣腹滿而喘有潮熱者宜大承氣湯（論見大便）

風温身重

風温脈浮身重汗出惡風者宜防己黄芪湯

防己（一兩）　甘草（半兩）　白术（七錢半）　黄芪（去蘆一兩一錢）

右㕮咀每服五錢生薑四片大棗一枚水盞半煎八分温服良久再服服後當如蟲行皮中從腰下如冰後坐被上又以一被繞腰巳下温令微汗瘥　喘者加麻黄半兩　胃中不和者加芍藥三分　氣上衝者加桂三分　下有沉寒者加細辛三分

中暑身重

中暑病發熱惡寒身重痛汗出足冷脈虛而渴者忌汗下鍼宜瓜蔕散白虎湯（論見中暑）

身重無汗

傷寒脈浮緩身不疼但重無少陰但欲寐吐利證者宜大青龍湯

身重心悸

下後身重心悸者不可發汗當自汗者乃解（論見悸）

身重陰陽中拘攣

陰陽易為病身重少氣少腹急引陰中拘攣上衝胷眼花者燒裩湯（論見陰陽易）

四肢重為門

少陰病腹痛小便不利四肢沉重疼痛下利者真武湯（論見）

身重

挾濕屎

難轉側

三陽合病腹滿身重難轉側汗出者白虎湯（論見身重）　下後胷滿煩驚小便不利譫語身重不可轉側者柴胡牡蛎湯（論見驚）　風濕相搏身体煩疼不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而澁者桂枝附子湯（論見身疼）

遺尿

[illegible]

三陽合病腹滿身重難轉側譫語遺尿汗出者白虎湯（論見）

多眠忌發汗屬風溫

風溫病脉浮汗出者身重多眠若下之則小便不利直視失溲（論見風溫）

診

寸口脉微而澁微者衛氣不行澁者榮氣不逮榮衛不能相將三焦無所仰身体痺不仁榮氣不足則煩疼口難言衛氣虛則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者噫而呑酢中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則遺溲

遺尿忌汗

熱而小便利若失小便者不可發汗汗出則四肢厥冷　太陽病火熨其背大汗出譫語十餘日振慄下利欲小便不得反嘔而失溲者此為欲解也（論見譫語）　遺溲狂言目反直視者此為腎絕（論見大法）

盜汗

盜汗脉浮邪在半表半裡

三陽合病脉浮大見關上但欲眠睡目合則汗　陽明病脉但浮者必盜汗出（論見胃實成无己云陽明病當作裏實而脉浮者去必盜汗是猶有表邪）

（汗也）太陽病脈浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也（論見結胸）

成 傷寒盜汗者非若雜病之虛是由邪氣在半表半裏使然也何者若邪氣一切在表干於衛則自然汗出也此則邪氣浸行於裏外連表邪及睡則衛氣行於裏乘表中陽氣不緻津液得泄故但睡而汗出覺則氣散於表而汗止矣其證悉當和表而已

面赤

（面赤燥煩短气脈濇者汗不徹）二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽症不罷者不可下之下之為逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不出出不足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脈濇故知也（因發不透徹而面赤躁煩短气者不足言陽气怫鬱止是當汗不汗也故更發汗則）

（身痒脈浮遲者陰虛）脈浮而遲面熱赤而戰惕者六七日當汗出而解反發熱者瘥遲為無陽不能作汗其身必痒也　太陽病如瘧狀若脈微惡寒面反有熱色而身痒者桂枝麻黃各半湯小汗之（論見發熱）

（口噤背張若痓）身熱足寒面赤卒口噤背反張者痓病

（赤斑者陽毒）陽毒面赤斑斑如錦紋咽喉痛唾膿血者宜升麻鱉甲湯（方論見陽毒）

（面赤下利脈微肢厥者為陰）少陽病下利清穀手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒面赤色者通脈四逆湯加葱白（論見下利）　下利清穀脈沉遲面少赤手足微厥者必鬱冒汗出解（論見下利）

面赤忌下

陽明病面合赤色者不可攻之（論見便难）

壞病

太陽病三日已發其汗若吐若下若温鍼仍不解者此爲壞病桂枝不中與也觀其脈症知犯何逆隨証治之

壞病續法

虚

山治傷寒壞症獨参湯好人参一兩煎服

海陽症大汗大下後亡陽於外亡血於内上而津脫下而液脫津液兩亡宜以羊肉湯補之矧陰症者豈可不温補哉此與傷寒太陽症振搖與真武湯一例外之陽病至此尚温况内之陰候豈得不補耶

韓産脫血虚者宜用羊肉湯傷寒汗下太過亡陽失血若只用救逆效必遲矣與羊肉湯爲效神速病人面色鮮見陽是客熱上焦中下二焦陰氣已盛若調得下焦有陽則上焦陽氣下降丹田知所歸宿大氣有高下病有遠近証有中外治有輕重各適其至所爲故病八九日汗下太過二脈沉細無力多踡足臥惡聽人聲皮有粟時戰如瘧宜羊肉湯主之

當歸　白芍藥（各一兩）　黑附子（炮去皮臍八錢）

龍骨（燒通赤半兩）　生薑（二兩）　牡蠣（燒赤一兩）　桂枝（[illegible]七錢）

右爲麄末每服一兩羊肉四兩葱白五寸去黃心同剉爛以水五升（一升八之大盞也）煑至一半以絲濾絞去查分三服服之

戰慄振搖

虛

成戰者身爲之戰搖也慄者心戰是也戰之與慄戰外而慄内也又云戰爲正與邪爭爭則鼓慄而戰振但虛而不至爭故心從動而振也戰之與振振輕而戰重也

汗後振為虛

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊發汗則動經身爲振振搖者宜

茯苓桂枝白术甘草湯

茯苓（二兩）　桂枝（一兩半）　白术　甘草（各一兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎八分去查溫服

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者真武湯主之（方見少陰下利）

孫太乙宮道士周德真患傷寒發汗出多驚悸目眩身戰掉欲倒地衆醫有欲發汗者有作風治者有用冷藥解者病皆不除召孫至曰太陽經病得汗早欲解不解者因太陽經欲解復作汗腎氣不足汗不來所以心悸目眩身轉遂作真武湯服之三服微汗自出遂解蓋真武湯附子白术和其腎氣腎氣得行故汗得來也若但責太陽者惟能乾涸血液爾仲景云尺脈不足榮氣不足不可以汗以此知腎氣怯則難得汗也明矣許學士云鄉里有一姓高者子年三十初得病身微汗脈弱惡風醫以麻黃藥與之汗遂不止發熱心多驚悸夜不得眠譫語不識人筋惕肉瞤振振動搖醫又進鎮心藥予曰強汗之過也仲景云脈微汗出惡風不可服青龍湯服之則筋惕肉瞤此爲逆也惟真武湯可救進此三服佐以清心竹葉湯數日遂愈（清心竹葉湯未考）

下後復發汗必振寒脈微細所以然者以內外俱虛故也

亡血家不可發汗發汗則寒慄而振

太陽病火熨其背大汗出火熱入胃發譫語十餘日振慄自下利者此爲解也（論見譫語）

未汗戰振為欲

脈浮緊按之芤當戰而汗出解脈芤爲虛是以發戰脈浮

解一
爲在表故當汗出解也（論見大法）　太陽病脈陰陽俱停等必戰慄汗出而解（論見發汗後）　凡柴胡症下之若柴胡症不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振發熱汗出而解（論見往來寒熱）　脈浮而遲面熱赤而戰惕者當汗出解也反發熱者脈遲不能作汗其身必痒也（論見面赤）

平居忽戰慄者
諸乘寒者則爲厥鬱冒不仁口急不能言戰而慄也陰中
初中邪
於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故邪中於陰也

筋惕肉瞤

虛
汗出筋惕肉瞤若眩悸振振欲擗地者及服大青龍湯後厥逆者俱宜真武湯（方見戰掉及發熱）　若動氣在左頭汗不止者活人用防風白朮牡砺次服建中湯（論見動氣）

汗吐
下汗下吐溫鍼後若膚瞤動胷煩面色青黃者難治（論見[illegible]后）

若經脈動惕脈微心下痞氣衝咽喉者久而成痿（[illegible]見[illegible]）

叉手冒心

虛
發汗過多叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯（論見悸）

驚悸

虛
少陽耳聾目赤胷滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚（論[illegible]）

下后驚
傷寒八九日下之胷滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者宜

柴胡加龍骨牡砺湯

半夏（二合）　大棗（六枚）　柴胡（四兩）　生薑
人參　龍骨　鉛丹　桂枝
茯苓（各一兩半）　大黃（二兩半）　牡砺（一兩半）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服

火逆驚

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起臥不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之（活人云醫以火於臥床下或周身用火迫劫汗出或熨而成火邪者是也）

桂枝蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

桂枝（去皮三兩）　甘草（炙二兩）　生薑（切三兩）　牡蠣（炒五兩）

龍骨（四兩）　大棗（十二枚）　蜀漆（三兩洗去腥）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服

太陽傷寒者加溫鍼必驚也　風溫脈浮自汗身重多眠若被火者微則發黃劇則如驚癇時瘈瘲（論見風溫）　陽明病脈浮緊口苦咽乾腹滿若加燒針必怵惕煩躁不眠（論見自汗）

驚悸續法

傷寒后虛熱

海藏茯苓丸治傷寒後或用心勞倦四肢羸弱心忪驚悸吸吸短氣

茯神　麥門冬（去心）　熟地（各一兩）　牡丹皮

人參　黃芪（各七錢）　桂枝　甘草（炙）

牛膝　澤瀉（各半兩）

右爲細末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大食前溫酒下二十丸

犀角湯治傷寒後伏熱在心怔忪驚悸不得眠睡

犀角屑（半兩）　茵陳蒿（七錢半）　茯苓（二兩）　芍藥

生地（焙二兩）　麥門冬（去心兩半）　山梔（半兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半薑三片竹葉三七片同煎食後服

麥門冬茯苓飲子治傷寒後心神恍惚不得臥

麥門冬（去心）　赤茯苓（去皮）　知母（焙）　芎藭

甘草（炙）　酸棗仁（炒）　陳皮（去白炒）　檳榔（各兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑五片煎温服日三服

肯道温禁温

少陰心悸者四逆不可與也心悸者火懼水也惟腎欺心故爲心悸者是足經上手經也若與四逆湯變無形中惡候生矣故先以甘草茯苓湯導其濕次以四逆湯温之者爲心悸全無手經火令入足水也心悸在濕未去悉至於斃故不敢温之温之則壞矣

悸

汗后心悸

汗後心下悸若頭眩身瞤動振振欲僻地者真武湯也（論見）

戰振

若叉手自冒心者後條桂枝甘草湯也若譫語胃不和煩悸者活人用調胃承氣湯也（論見口苦）　若臍下悸者後[illegible]湯也

發汗過多其人叉手自冒

桂枝（四錢）　甘草（二錢）

右二味以水一盞半煎八分去查温服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚宜

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓（八錢）　甘草（炙二錢）　桂枝（四錢）　大棗（一枚）

右作二服以甘爛水二鍾先煮茯苓減二分納諸藥煮取一盞去查温服日三作甘爛水法取水斗許置大盆中以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之

下後心悸

脉浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗當自汗出乃解所以然者尺中脉微此裏虛須表裏實津液自和便自汗出愈　少陽病耳聾胸滿不可吐下吐下則悸而驚者註云氣血虛往來寒熱胸脇滿脹下悸而小便不利者小柴胡去黃芩加茯苓湯（方論見往來寒熱）

停飲心悸

太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必若裏急也

氣虛心悸

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之　傷寒脉結代心動悸宜

炙甘草湯

甘草（炙一兩）　生薑（三片）　人參（半兩）　生地（一兩）

桂枝（去皮）　麥門冬（去心各一兩）　麻仁（一合）

阿膠（半兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半入酒半鍾煎至八分去查納阿膠溶盡溫服日三

霍亂心悸

霍亂吐利心悸者理中丸加茯苓

厥逆心悸

手足厥冷而悸者茯苓甘草湯手足逆而不溫悸者四逆散加桂枝

臟結與結胷痞氣大同小異

寸浮關沉不下利為結胷

寸浮關沉下利飲食如故為藏結

問曰病有結胷有臟結其狀何如答曰按之痛寸脉浮關脉沉名曰結胷也何謂臟結答曰如結胷狀飲食如故時時下利寸脉浮關脉細小沉緊名曰臟結舌上白胎滑者難治（王朝奉云可刺關元穴）　臟結無陽症不往來寒熱其人反靜舌上滑胎者不可攻也（王朝奉云可刺關元穴服小柴胡湯）　病胷中素有痞連在臍旁引入小腹入陰筋者此名臟結死

病發於陽下之成結胷

病發於陰下之成痞氣

病發於陽而反下之熱入因作結胷病發於陰而反下之因作痞所以成結胷者以下之太早故也　傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯症具而以他藥下之柴胡症仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心滿而硬痛者此爲結胷也大陷胷湯主之但滿而不痛者此爲痞柴胡不中與之與半夏瀉心湯

大結胸不按而痛

結胸

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所有潮熱從心下至少腹而痛不可近者大陷胸湯主之

太陽病脉浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞕則爲結胸大陷胸湯主之若不結胸但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃也（丹溪云此症曰胃中空曰短氣躁煩曰脉浮大陷胸湯不可輕服）

傷寒六七日結胸熱實脉沉而緊心下痛按之石鞕者大陷胸湯主之（雲岐云三症陷胸皆日西潮熱）

大陷胸湯

大黃一（兩半去皮爲末錦紋者佳）　芒硝一（兩六錢）　甘遂一（字赤連珠者爲細末）

右水二盞煮大黃至八分去查下硝一二沸下甘遂末溫服得快利止後服

小結胸按之則痛

小結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者宜

小陷胸湯

半夏（二兩湯洗）　黃連一（兩）　瓜蔞一（枚用四分之一）

右㕮咀水二盞先煎瓜蔞至一盞半後用半夏黃連煎取八分去查溫服未和再服微解下黃涎便安也

孫工部郎中鄭忠厚因患傷寒胸腹滿面黃如金色諸翰林醫官商議略不定推讓曰胸滿可下恐脉浮虛召孫至曰諸公雖疑不用下藥鄭之福也下之必死其有一二服藥服之必瘥遂下小陷胸湯尋利其病遂良愈明日面色改白京城人稱服

热実結胸潮热

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯

水結胸頭汗无大热

但結胸無大熱者此爲水結在胸脇也但頭微汗出者大陷胸湯主之（活人云水結胸小半夏加茯苓湯小柴胡去牡蠣湯亦主之）

病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散

寒実結胸无热證

若不瘥者與五苓散寒実結胸無熱證者與三物小陷胸湯此三物白散亦可

桔梗（三分）　巴豆（一分去皮心熬黑研如脂）　貝母（三分）

右三味爲末納巴豆更於臼中杵之以白飲和服強人半錢羸者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一碗利過不止進冷粥一碗汗出已腹中痛與芍藥一兩

右熱実結胸及寒実結胸活人不拘寒熱但用陷胸湯不瘥用枳實理中丸應手而愈

結胸項強

結胸項亦強如柔痓狀下之則和宜大陷胸丸

大黄（二兩）　葶藶（[illegible]）　芒硝　杏仁（去皮炒各二分）

右搗羅二味納杏仁芒硝合研如脂相和爲丸如彈大後用甘遂末一字白蜜少許水二盞半煎至一盞頓服一宿乃下如不下再服

王海藏云大陷胸湯太陽本藥也大陷胸丸陽明藥也小陷胸湯少陽藥也大陷胸治熱実大陷胸丸兼喘小陷胸治心下滿痛如結胸狀若頭項強痛眩冒者刺大椎肝兪若汗下後頭項強痛發熱小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯（方見頭痛）

热入血室

若婦人經水來熱除譫語者刺期門（論見譫語）

診太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脈微弱者此本有寒也反下之若利止必作結胸未止者四日復下之此作協熱利也（四日復下之五字衍文也）太陽病下之脈浮者必結胸也（論見大法）太陽少陽併病而反下之成結胸心下硬下利不止水漿不下其人心煩　結胸症悉具煩躁者亦死

結胸續法

（誤下未成結胸者急用理中解之）**活**若誤下了初未成結胸者急頻與理中湯自然解了更不作結胸蓋理中湯治中焦故也此古人亦說不到後因人消息得之若大段轉損有厥症者兼與四逆湯便安胃中雖和傷寒未退者宜候日數足可下却以承氣湯下之蓋前來下之未是故也

（脈[illegible]結胸[illegible]）西晉崔行功云傷寒結胸欲絕心膈高起手不得近用人[illegible]胸湯皆不差者此是下後虛逆氣已不理而毒復上攻[illegible]結胸者常用枳實理中丸先即其氣欠疾古今用之如神應手而愈

枳實理中丸治傷寒結胸欲絕心膈高起手不得近

枳實（十六片去麩炒）　茯苓　人參　白朮

乾薑（炮）　甘草（炮已上各二兩）

右爲末煉蜜丸如雞子黃大每服一丸熱湯化下連進二三服胸中豁然渴者加瓜蔞根一兩自汗者加牡蠣二兩煆過下利亦加

海增損理中丸王朝奉云大小陷胸湯丸不愈者宜與之

人參　白朮　瓜蔞　牡蠣

甘草（炙各一兩）　乾薑（炒白半兩）　枳實（炒二十四個）　黄芩（去朽一兩）

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大湯一盞煎服不效復與之不過五六九胸中豁然矣用藥神速未嘗見也渴者

加瓜蔞根有汗加牡蠣

以半夏茯苓治水結

治 水結在胸脇間亦名結胸其證頭微汗出但結胸無熱若小半夏加茯苓湯小柴胡去棗加牡蠣主之

孫 按俞伯道忽患微熱心下滿頭有汗不能解衆醫以爲溫病用表藥有謂食在膈者治之皆不愈召孫至曰用半夏茯苓湯遂瘥衆問其故曰頭有汗心下滿非濕證乃水結胸脇也水既去其病乃愈且如濕氣心下滿自當遍身汗若有食心滿頭豈得有汗若言是表身又不疼不惡寒表証何在故凡水結胸脇頭必有汗耳

小半夏加茯苓湯（方見嘔門）

氣塞不通[illegible]結

穿結散 大實大滿心胸高起氣塞不通者爲結也

蟾酥　麝香　輕粉　巴豆（炒研少許）

右爲研過至細以乳汁爲丸如黍米大每服二丸用薑湯下不時服

血結胸宜海蛤

本 婦人傷寒血結胸膈揉而痛不可撫近宜

海蛤散

海蛤　滑石　甘草（炙各一兩）　芒硝（半兩）

右末每服二錢雞子清調下

小腸通利則胸膈血散膻中血聚則小腸壅小腸壅膻中血不流行宜此方若小便血散數行更宜桂枝紅花湯發其汗則愈活人書云此方宜非仲景然其言有理姑有之

鍼灸

治結胸灸法

巴豆（十四箇）　黃連（七寸和皮用）

右搗細津唾和成膏填入臍中以艾灸其上腹中有聲其病去矣不拘壯數病去爲度纔灸了便以溫湯浸手帕拭之恐生瘡也

〔摘〕傷寒結胸　先使人心蔽骨下正痛處左畔揉之以毫針刺左畔支溝穴（正坐側臂取之二分）次刺左間使名曰雙關刺次左行間（臥取之針入六分此支溝行間穴下針至分數內撚針令病人五吸次外撚針三呼又次內撚針五吸乾長呼一口氣出針即左畔一壁結胸立效右畔依上刺之慢七呼吸停針用針獲時而愈无有不效）

〔云〕傷寒結胸痞氣

胸中結痞涌泉　太溪　中衝　太陵

心中結痞隱白　太白　少衝　神門

胃中結痞少商　太淵　大敦　太衝并上下中脘瀉之

〔通玄〕結胸身黃　涌泉

〔摘〕血結胸面赤大燥口乾消渴胸中疼痛不可忍

期門　太陵　關元（姙娠不得刺關元胎死不出子母俱亡慎之）

〔集〕傷寒胸膈痛　期門　太陵

〔海〕近世治結胸多用金針并用硫黃陽起石著若[illegible]實大結

傷或有燥者若熱實結胸必死也

痞

心下痞濡關脈浮名大黃瀉心

心下痞按之濡其脈關上浮者大黃黃連瀉心湯主之（活人）

（云結胸與痞關脈須沉若關脈浮者大黃黃連瀉心湯）

大黃黃連瀉心湯

大黃　黃連（各二兩）　黃芩（一兩）

右㕮咀以麻沸湯二升漬之一時良久絞去滓分溫再服

惡寒汗出加附子

心下痞而復惡寒汗出者宜

附子瀉心湯

大黃　黃連　黃芩（各一兩）　附子（一枚炮去皮臍）

（破別煮取汁）

右㕮咀百沸湯二大盞熱漬之一時久絞去滓納附子

汁分溫再服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯（活人云表症未解心下妨悶者非痞也謂之支結柴胡桂枝湯主之胷脇滿微結小柴胡加乾薑牡蠣湯主之）

（心下痞鞕關脉沉者半夏瀉心）

傷寒嘔而發熱者柴胡湯症具而以他藥下之若心下滿而不痛者此爲痞宜半夏瀉心湯（論見結胷痞門與）

半夏瀉心湯

半夏（湯洗七次一兩）　黃芩　人參　甘草（各一兩半）

黃連（半兩）　大棗（六枚）　乾薑（一兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去杏溫服半夏瀉心湯若加甘草即後條甘草瀉心湯治痞鞕嘔吐利也若加生薑即後條生薑瀉心湯治痞鞕噫氣下利也

（[illegible]殺者加甘草二）

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也宜

甘草瀉心湯

甘草（炙二兩）　黃芩　乾薑（各一兩半）　半夏（一兩）

大棗（六枚）　黃連（半兩）　人參（一兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去杏溫服（活人云伊尹湯液論甘草瀉心七味今本无人參）

（痞硬木下）

傷寒發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐而下利者大柴胡湯主之

（痞鞕表解身凉脇痛）

心下痞硬嘔逆下利若表解身凉脇痛十棗湯主之（方論症見）

脇痛

（痞硬下利）傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者宜

生薑瀉心湯

生薑（二兩）　黄芩　甘草（炙）　人参（各一兩半）

乾薑（半兩）　半夏（一兩）　黄連（半兩）　大棗（六個）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至七分去查温服

（太陽表裡不解苦桂人参）太陽病外症未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞鞕表裏不解者宜

桂枝人参湯

桂枝（四兩）　甘草（炙各一兩二錢）　白术　人参

乾薑（炮各一）

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞納桂更煮取七分去滓温服日再服夜一服

（汗下解後心下痞硬者旋覆）傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞕噫氣不除者旋覆代赭石湯主之（活人云有旋覆代赭石湯證其人或欬逆氣虚者先服四逆湯胃虚者先服理中丸次服旋覆代赭石湯為良）

旋覆代赭石湯

旋覆花（一兩）　人参（半兩）　生薑（一兩半）　代赭石（三錢）

甘草（炙一兩）　半夏（湯泡八錢）　大棗（六個）

右㕮咀每服五錢水一盞煎至八分去查温服　病解後心下痞鞕噫氣若不下利者此條旋覆代赭石湯也

若下利者前條生薑瀉心湯也

（痞硬氣上冲咽）胷中痞硬氣上衝咽不得息者瓜蔕散若心下痞鞕脇痛氣上衝咽眩冒者成痿（方論並見氣上中心）

（服瀉心痞不解）本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口煩燥小便不利者五苓散主之

心下支結似痞表未解

發熱惡寒身痛表症未解若心下支結妨悶者柴胡桂枝湯也（方見發熱若心下痞而腹滿者即前條先以桂枝湯解後用大黃〻連瀉心也）

心下滿似痞手足冷

心下滿似痞而手足厥冷若脈乍結乍緊心煩飢不欲食者瓜蒂散若脈沉細頭汗惡寒大便鞕諸小柴胡湯（論見殆）

診

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽並竭無陽則陰獨復加燒針因胸煩面色青黃膚瞤者難治今色微黃手足温易愈

脈浮而緊而反下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳

脈浮而大心下反鞕有熱屬藏者攻之不令發汗屬腑者不令溲數溲數則大便鞕汗多則熱愈甚汗少則便難若脈遲尚未可攻　陽明痞胃實心下硬滿者不可攻之（論見）

客熱頭法

虛滯

活傷寒　無痞應發汗醫反下之遂成痞枳實理中丸最良審知是痞先用桔梗枳殼湯尤妙緣桔梗枳殼行氣先用之無不驗也

桔梗枳殼湯治傷寒痞氣胸滿欲絕

桔梗　枳殼（麩炒去穰各二兩）

右㕮咀以水二盞煎至一盞去查分二服

煩

汗吐下後懊憹虛煩

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯主之　若少氣者梔子甘草豉湯主之　若嘔者梔子生薑豉湯主之　陽明病下之其外有熱手足温不結胸心下懊憹飢不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

陽明病脈浮緊若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊

懊憹舌上白胎者宜梔子豉湯（論見自汗）　下利後煩按之心下濡者爲虛煩也宜梔

梔子豉湯

肥梔子（四箇破）　香豉（半刃）

右水二盞先煎梔子一盞納豉同煎取七分去查温服得快吐止後服

梔子甘草豉湯於梔子豉湯中加甘草半兩餘依前法得吐止服　梔子生薑豉湯於梔子豉湯中加生薑一兩二錢餘依前法得吐止後服

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯主之

梔子（四刃破）　乾薑（半）

右二味以水一盞半煎取八分去查温服得吐者止後服

發汗吐下後心中懊憹而煩若無燥屎大便硬者此條梔子豉等湯也若有燥屎不大便者後條小承氣湯也

胃實而煩

太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞕者與小承氣湯和之愈

陽明病下之心下懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞕後必溏不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯（方見陽明）

（朝热）胃實不大便心煩若吐下後者此條大小承氣湯也若不吐不下者調胃承氣也

証有人病傷寒八九日身熱無汗時時譫語時因下後大便不通三日矣非躁非煩非寒非痛終夜不得臥但心中無曉會處或時發一聲如歎息之狀醫者未知是何症予診之曰此懊憹怫鬱二症俱作也胃中有燥屎者服承氣

湯下燥屎二十枚得利而解仲景云陽明病下之心中懊憹微煩胃中有燥屎者可攻又云小便不利大便乍難乍易時有微熱怫鬱不臥者有燥屎也承氣湯主之素問云胃不和則臥不安此夜所以不得眠也仲景云胃中燥大便堅者必譫語此所以有時發譫語也非煩非躁非寒非痛所以心中懊憹也聲如歎息而發一聲所謂外氣怫鬱也燥屎得除大便通利胃中安和故其病悉去也

不得眠而煩（論見不得眠）

胷滿而煩

胷滿而煩若不經汗兼往來寒熱者小柴胡湯（方論見往來寒熱）　兼下利咽痛者猪膚湯（方論見下利）　若汗下後往來寒熱者柴胡桂枝薑湯（方論見往來寒熱）　兼身重不可轉側者柴胡龍骨牡蠣湯（方論見驚）

胷中窒而煩

發汗若下之而煩熱胷中窒者梔子豉湯主之

心下痞而煩

心下鞕滿而煩若滿而不痛腹中雷鳴下利者甘草瀉心湯（方論見痞）　脇痛氣衝咽胃眩者成痿（方論見痞）　若滿痛下利不止水漿不下者併病（方論見痞）

心煩腹滿臥起不安

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者宜

梔子厚朴湯

梔子（去殼四分）　厚朴（薑製一分）　枳實（切一枚）

已上三味用水一盞半煎取八分去渣溫服得吐者止後服

腹滿而煩

腹滿而煩若有燥屎者前條大承氣湯也若大便溏胷痛欲吐先此時極吐下者調胃承氣湯也（論見嘔）

吐後火而煩

太陽病吐之但太陽當惡寒今反不惡寒不欲近衣此為吐之內煩也脉之微數不可灸灸則煩逆（論見火大法）

嘔時煩鬱

嘔時鬱〻微煩若與小柴胡湯嘔不止者大柴胡湯也若

極吐下後胃滿便溏腹痛者調胃承氣湯也

（脈浮数而煩）病欲解者必當先煩乃有汗而解（論見大法）　太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈　傷寒發熱汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗宜桂枝湯主之

（脈平後煩者損穀）病人脈巳解而日暮微煩以病新瘥人强與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微熱煩損穀則愈　吐利汗後脈平小煩者以胃虚不勝穀氣也（論見吐利）

（先煩後悸為热）心悸而煩若少陽汗後譫語胃不和煩悸者活人用調胃承氣湯（論見口苦）

（先悸後煩為虛）若二三日心中悸而煩者宜小建中湯（論見厥）　心煩而渴

（方論見渴）少陰病但欲寐而煩若自利而渴小便白者活人用四逆湯（論見欲寐）

（下利厥逆而煩）若與白通湯後下利不止厥逆無脈乾嘔者白通湯加猪膽汁

（惡寒而煩）若惡寒身倦時煩欲去衣者可治也（論見但欲寐）

（手足厥而煩）手足厥冷而煩若脈乍結乍緊及心中滿飢不能食者宜瓜蒂散吐之

（診）若脈緊至七八日自利脈緊變暴微手足反温者欲解也

（方論並見下利）若下利無脈乾嘔者白通湯加猪膽汁也（論見下利）

煩躁

（煩躁有表症宜汗）煩躁有表証發熱惡寒体病脈浮緊者大青龍湯也（方論見發）

（熱係）若發汗不徹太陽証不罷其人面赤躁煩短氣者更發汗則愈（論見短氣）

煩燥无表証宜下宜溫

得病二三日脈弱無太陽柴胡症煩躁心下鞕至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞕後必溏未定成鞕攻之必溏須小便利屎定鞕乃可攻之宜大承氣湯（許云无太陽証為无表証也无柴胡症為无半表半裏証也）煩躁不大便繞臍痛發作有時者有燥屎也，下之後復發汗日夜煩躁不得安眠時安靜不嘔則渴無表証脈沉微身無大熱者宜

乾薑附子湯

乾薑（一兩）　附子（生用一枚）

右二味以水三升煑取一升去查頓服

海服薑附湯有二法一法當以熱服手少陰心也水包火熱服以接心火身表寒盛外火少也寒從外生熱從內消譬如凍死寒在外也一法當以寒服足少陰腎也寒邪入水冷服以類聚水身表微熱內水多也熱從外生寒從內消譬如飲冷寒在內也

發汗若下之病仍不解煩躁者宜

茯苓四逆湯

茯苓（一兩）　人參（六錢）　附子（一枚生用去皮臍作八片只用二片）

甘草（二錢）　乾薑（各二錢）

右剉如麻豆大作一服水一盞半煎至八分去查溫服

煩躁心下鞕

煩躁心下鞕若未曾下者即前條無太陽柴胡症以小承氣少少微和之也若已曾下心下鞕痛短氣躁煩者大陷胷也若結胷証悉具煩躁者死也（方論見結胷）

火逆煩躁

火逆下之因燒鍼煩躁者宜

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝（去皮）　甘草（炙）　牡蠣（熬）　龍骨（各一）

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去查温

服

太陽病以火熏之不得汗其人必躁如不解必清血名爲

火邪

太陽病火熨其背大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必發譫語十餘日振慄下利者欲解也（論見譫語）

診

煩躁厥逆若吐利者呉茱萸湯也（論見吐利）

若不煩而躁四逆脈不至死也（論見厥）　不得臥者死也（論見下利）

成所謂煩躁者謂先煩漸至躁也所謂躁煩者謂先發躁而迤邐復煩者也從煩至躁爲熱來有不漸煩而躁者也先躁後煩謂怫怫然更作煩悶此爲陰盛隔陽也雖大躁欲於泥水中以口飲水不得入口是也此氣欲脫而爭譬如燈將滅而暴明也蓋內熱曰煩謂心中鬱煩也外熱曰躁謂氣外熱躁也內熱爲有根之火故但煩不躁及先煩後躁者皆可治外熱爲無根之火故但躁不煩及先躁後煩者皆不可治也　臟厥蚘厥煩躁（方論見厥）　躁無暫定而厥者爲臟厥靜而復煩吐蚘而厥者爲蚘厥烏梅丸主之（方論見厥）　熱少厥微不欲食煩躁數日小便白者熱除也若欲食者愈若厥而嘔胸脅煩滿者便血（論見厥）　少陰病但欲寐不煩至五六日變自利煩躁不得臥者死（論見欲寐）

煩躁續法

（煩渴不飲水爲陰盛隔陽）

活病人身冷脈沉細疾煩躁而不飲水者陰盛隔陽也宜服霹靂散須臾躁止得睡汗出即瘥火焰散丹砂丸並主之（丹砂丸方見活人云）

霹靂散治陰盛隔陽煩燥不飲水

附子（一枚炮熟取出用冷灰焙細研入真臘茶一錢和勻）

右爲細末分作二服水二盞煎至六分臨熟入蜜半匙放温或冷服之須臾躁止得睡汗出即瘥

（煩燥渴爲上熱下寒）海巳寒丸此丸不僭上陽生於下治陰症服四逆輩胷中發躁而渴者或數日大便秘小便澁亦服此丸上不躁大小便自利

肉桂　茯苓（各五錢）　良薑　烏頭（炮各七錢）

附子（炮）　乾薑（炮）　芍藥　茴香（炒各一兩）

右等分爲細末糊爲丸如桐子大温酒下空心服五七十丸八九十丸亦得酒醋爲糊俱可

本破陰丹治陰中伏陽煩躁六脈沉伏（方論見前青）

頃年鄉人李信道得疾六脈沉伏不見深按至骨則若有力頭疼身温煩躁指末皆冷胷中滿惡心更兩醫矣皆識止用調氣藥予診之曰此陰中伏陽也仲景法中無此證世人患此者多若用熱藥以助之則爲陰所隔絕不能導引真陽反生客熱用冷藥則所伏真火愈見消爍非其治也須用破散陰氣導達真火之藥使火升水降然後得汗而解矣予授此藥二百粒作一服冷鹽湯下不時煩躁狂熱手足躁擾其家大驚予曰俗所謂換陽也須臾稍定畧睡身已中汗自昏達旦方止身凉而病除矣

欬

（表不解而欬屬太陽）傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者宜

小青龍湯

麻黃　芍藥（各三錢）　五味子（半兩）　乾薑

甘草　細辛　桂枝（去皮）　半夏（各三錢）

右㕮咀每服五錢水盞半煎八分去查温服　若微利者去麻黃加芫花如彈子大熬赤色　若渴者去半夏加瓜蔞根三分　若噎者去麻黃加附子一錢五分炮　若小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓一兩　若喘者去麻黃加杏仁三分去皮尖

（往來寒熱而欬者屬少陽）欬而往來寒熱胷滿心煩喜嘔者小柴胡去人參薑棗加五味乾薑也（方論見往來寒熱）

（表解胷實而欬者屬陽明）欬而表解胷實屬陽明病若反無汗小便利而嘔手足厥者必苦頭痛若頭眩不惡寒能食者必咽痛（論見胷實）

（下利而欬者屬少陰）欬而但欲寐屬少陰病若下利腹痛小便不利四肢重痛者真武湯加五味子細辛乾薑也　若下利六七日變欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯也　若下利譫語小便難者被[illegible]也　若四逆者用四逆散加五味子乾薑也（方論見四逆）

（[illegible]）

（診）傷寒欬逆上氣其脈散者死謂其形損故也　（欬[illegible]）便者不可發汗汗出則四肢厥冷（論見逆厥）

欬嗽法

（内傷外感俱而散之）丹崇慶和尚因飽醉後發熱欬嗽而右脇痛渴不安眠

柴胡　黃芩　白术　陳皮

桔梗　木通（各二錢）　人参　麻黃（各一錢半）

甘草（三錢）　右分二貼水煎服

（肺虛氣之宜補）雲僧傷寒汗後喘咳不止恐傳肺痿補肺散

人参（一兩）　五味子（五錢）　桑白皮（二兩）　款冬花

蛤蚧（一對）

右為細末每服五錢沸湯一盞調服

傷寒汗下後咳嗽肺虚聲音嘶敗者宜

阿膠散

薯蕷　阿膠（炒）　五味子　麥門冬（去心）

白朮（各一兩）　乾薑（炮）　桂枝（各二錢）　杏仁（三錢去皮尖）

右剉細末每服七錢水二盞入烏梅肉一錢同煎服

（肺實氣滯宜散）傷寒汗下後喘咳煩躁氣滯澀邪氣逆者用

桔梗湯

桔梗　桑白皮（各一兩）　甘草　貝母

訶黎勒（各五錢）

右爲細末每服五錢入五味子烏梅肉各一錢水二盞

同煎服

小便不利

（小便不利表不）小便不利表不解若乾嘔發熱而欬少腹滿者小青龍湯

去麻黄加茯苓也（方論見欬）　若汗下後仍項强發熱心下滿

痛者桂枝去桂加茯苓白朮（方論見項强）

（小便不利胷脇滿身重）小便不利胷脇滿若往來寒熱未汗下者小柴胡去黄芩

加茯苓汗下後者加柴胡桂薑（方論見往來寒熱）　若煩驚譫語

身重不可轉側者柴胡湯加龍骨牡蠣也（論見不得臥）

（小便不利大便难）小便不利大便乍難乍易喘急不能臥者大承氣湯（論見不得臥條）

（小便不利而渴）小便不利而渴若脈浮數發熱者五苓散加猪苓湯（方論見渴）

（小便不利頭汗）若頭汗者柴胡桂薑湯加茵陳蒿湯（方論見發黄）

（小便不利關节疼）小便不利關節疼痛若痺不得屈伸汗出惡風身腫者屬

風濕宜甘草附子湯若脈沉緩大便反快者屬濕痺活人

用五苓散也（方論見身痛）

（小便不利頭汗脇滿）小便不利頭汗若脇滿者柴胡薑桂也（方論見往來寒熱）

（小便不利身黃）若發黃者茵陳蒿湯也　小便不利身發黃（方論見發黃）

（下後无他症勿治）大下後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈（活人云若大渴引飲須利之）

（但欲寐者陰症）小便不利但欲寐者屬少陰若腹滿下利膿血者用桃花湯　腹痛下利四肢重濕者用真武湯也（方論見下利）　若四逆者用四逆散加茯苓（方論見但欲寐）

（診）陽明病小便不利濈然汗出者若欲食者愈不能食者欲作痼瘕痼瘕者寒氣積結也

小便不利續法

（陰症治法）活陰症小便不利手足厥冷脈微細者不宜服利小便冷滑藥但服返陰丹并取臍下石門穴灸之（方論見陰毒返陰丹）

（針灸）集傷寒小便不通取陰谷　陰陵泉

活傷寒後小便不利（見小便不通門）

小便難

（汗後小便難）汗後小便難若太陽發汗遂漏不止者則惡風小便難四肢難屈伸宜桂枝附子湯也（方論見自汗）　若太陽症中風以火劫發汗則邪風被火熱血氣流溢身黃陽盛陰虛欲衄小便難也（方論見頭汗）　若少陰以火劫汗者則欬而下利譫語小便難也（論見咽痛）

（下後小便難一）下後小便難有二若脈遲浮弱惡風寒下之者則脅滿身黃項強小便難也（見腹痛）　若陽明胃實發熱惡寒脈浮緊下之者則腹滿小便難也（論見胃實）

（脅痛身黃小便難）脅痛身黃小便難若陽明胃實未下者宜小柴胡湯若下後不食項強者忌柴胡（論見脅痛）

尸厥鬱冒

（少陰脈不至尸）少陰脈不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胸膈宗氣反

聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此爲尸厥當刺期門

太陽汗下後鬱冐

太陽病下之不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因至冐冐家汗出自愈所以然者汗出表和故也得裏和然後復下之（得裏和三字中間必有衍文脈簡得字當字若字之誤裏和當是裏未和蓋脫一未字也）

下利清穀鬱冐

下利清穀脈沉遲其人面赤身有微熱者必鬱冐汗出解（論見下利）

喘冐必譫

小便不利大便乍難乍易喘冐不能臥者大承氣湯（論見下利）

乘寒鬱冐

諸乘寒者則爲厥鬱冐不仁口急不能言戰慄也（論見大法）

心下硬眩冐

眩冐心下鞕若不汗下吐而項強者爲併病宜刺大椎肺腧肝腧（論見項強）

若汗下吐後脈微氣上衝咽者成痿（論見氣上衝）　少陰病但欲寐下利止而眩冐者死（論見欲寐）

尸厥鬱冐續法

熱

海傷寒傳至五六日間漸變神昏不語或睡中獨語一二句目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則咽不與則不思六脈細數而不洪大心下[illegible]不滿大小便如常或傳至十日已來形貌如醉醫見神昏不[illegible]大承氣湯下之則誤矣盖不知此熱傳手少陰心經也然又未知自何經而來答曰本太陽經傷風風爲陽邪傷衛陰血自燥熱畜膀胱壬病逆傳於丙丙丁兄妹由是傳心心火自上迫熏肺所以神昏也盖肺爲清肅之臓内有火邪故令神昏宜梔子黄芩黄連湯若脈在丙者導赤散脈在丁者瀉心湯若誤用凉膈散此乃氣中之血藥也如右手寸脈沉滑有力者則可用之或用犀角地黄湯近於是已本方所說若無犀角以升麻代之是陽明經藥也此解陽明經血中

熱藥若脈浮沉俱有力者是丙丁俱有熱可以導赤散瀉心湯各半服之則宜矣此症膀胱傳丙足傳手經者下傳上也丙傳丁者表傳裏也壬傳丁者艮之離也越經傳者又爲腑傳臟也活人云傷寒只傳足經不傳手經者此言不盡意也有從足經而傳手經者何以知之經云傷寒或止傳一經或間傳三經不可一途取之但視其脈與外證治之此活法也與食則咽者邪不在胃也不與則不思者以其神昏故也邪熱既不在裏誤用承氣下之其死也必矣（脈在丙者脈浮也脈在丁者脈沉也脈丙丁俱有熱者浮沉俱有力也）

噫

見痞

噫而心下痞硬不利者旋覆代赭湯若下利者生薑瀉心湯也（方論見痞門）

[illegible]

水火相傳噫氣

雲傷寒噫氣者何氣使然答曰胃中氣不交故也少陰[illegible]手胃中交於厥陰水火相傳而有聲故噫氣也宜

如聖加枳實湯

甘草　桔梗（各五錢）　枳實（炒二錢）

右剉細每服五錢入五味子半錢水煎服

汗下後喘而噫氣

傷寒汗下後喘而噫氣者宜如聖加人參藿香杏仁湯（各等分）

右剉細每服五錢水煎服

噦

汗下吐後噦

傷寒大吐大下後極虛復極汗出者以其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

飲水而噦

胃中虛冷不能食者飲水則噦與小承氣湯入腹中不轉矢氣者不可攻之攻之必脹滿不食與水則噦（論見熱病）本渴而飲水嘔者噦食穀者噦（論見嘔吐）陽明病胃實不能

食者攻其熱必噦（論見背実）、濕家頭汗出背強惡寒欲厥被向火者下之早則噦（論見体痛）

（火劫汗噦）太陽病以火劫發汗血氣流溢身黃欲衄頭汗腹滿譫語甚者至噦捻衣摸床小便利者可治（論見汗）

（噦滿下利）傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈

（診）陽明胃実脈弱浮大短氣腹滿脇痛嗜臥身黃小便難有潮熱時時噦脈浮者小柴胡若不尿腹滿加噦者不治（論見）

（胃実）

噦續法

（寒熱異治）治噦胃寒所二橘皮乾薑湯羌活附子散半夏生薑湯退陰散主之若服藥不瘥者灸乳直下一指許三壯若婦人則屈乳頭下盡處是穴亦有陽症者小柴胡湯橘皮竹茹

橘皮乾薑湯

橘皮　通草　乾薑　桂心

甘草（炙各三兩）　人參（二兩）

右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服日二

羌活附子散（方見雜病噦）

半夏生薑湯治噦欲死

半夏（一兩）　生薑（二兩切）

右水二盞煎至八分去滓溫服

（胃熱欬下）海傷寒欬逆脈散死　仲景之言不虛偽　大抵原因失下生　欬逆喉中陰不內　便軟惟宜用瀉心　便硬尤宜大承氣　二藥神工作者誰　東垣潔古為良劑

潔欬逆者火熱奔急上行而肺陰不內何其當哉故便秘者宜大承氣下之便軟者瀉心湯主之

海少陰欬逆者此失下也陰消將盡陽逆上行使陰不內

也然陰既盡陽亦將盡也吸入腎與肝陽遁上行陰入不内故爲陽極脈微將盡者不宜下宜服瀉心湯養陰退陽而已如不用瀉心湯凉膈散去硝黄清肺散亦可若脈左浮右沉実非表也裏極則反出於表也何以然欬逆舌強右脈実者知少陰裏也飲水過多心下痞而渴逆者五苓散主之别無惡候是也惡候生或兼以舌攣語言不正而反昏冒與咽痛者少陰也速下之宜大承氣湯也何以脈浮爲表浮之実大沉之損小是爲表也浮之失大沉之亦然即非表也邪入已深矣内熱當沉反浮陽極復之表也

（身寒大渴不欲近衣爲明）

陰症者内已伏陰陰氣太甚腎水擅權肝氣不生胃火已病丁火又消所以遊行相火寒邪迫而萃集於胸中亦欲盡也故令人發熱大渴引飲欲去盖覆病人獨覺熱他人按執之身體肌肉骨髓血脈俱寒此火即無根之火也故用丁香乾薑之類熱藥溫胃其火自下

（京室一）勻氣散

川烏頭（大者三个炮裂去皮臍）

右爲細末每服三錢用黑豆二十一粒砂糖同泡湯調乘熱細細飲之

本治陰毒吃逆方

川烏頭　乾薑　附子（已上俱炮）　肉桂

芍藥　半夏　炙甘草　吳茱萸

陳皮　大黄（各等分）

右爲細末每服一錢水一盞生薑三五片煎至七分去查溫服

肉荳蔻湯治傷寒汗後吃逆噫氣

肉荳蔻（一个）　石蓮肉（炒）　茴香（各一分）　人参

丁香（各半兩）　枇杷葉（五片拭去毛炙）

右剉細用水四盞生薑十片煎二盞去査空心溫服分二服

[illegible]寒

良薑湯

橘皮　良薑　桂枝　當歸（各一兩）

麻黃（半兩）　杏仁（二十個）　甘草（半兩）　檳榔（三個另爲末）

右㕮咀用水四盞薑十片棗三枚同煎至二盞去査下檳榔末再煎三沸通口服一盞未已再服　厖老云傷寒吃逆不止是陰陽氣升降欲作汗升之不下故胃氣上逆爲吃逆無休止宜服此方

無汗

无汗麻黃證

太陽發熱惡風寒体痛脈浮緊無汗其人若喘者麻黃湯也若煩躁者大青龍湯也　若項背強者葛根湯也（方論見發熱）　若小便少氣衝胸口禁者爲剛痓亦葛根湯也（論見痓）

若自衄者必自愈（論見衄）

无汗不大便屬陽明

陽明病胃家實法當多汗若反無汗者有四證脈浮而喘者邪尚在表宜麻黃汗之身如蟲行痒者久虛宜建中之類小便利而厥者寒邪宜溫之小便不利發黃者瘀熱宜茵陳利之也（論見胃實）

无汗身痒為虛

無汗身痒其人若脈微惡寒面反有熱色者桂枝麻黃各半湯也（方論見發熱）　若脈浮遲面赤戰惕發熱者遲爲無陽不能作汗也（論見面赤）　若陽明胃實身如蟲行者久虛也（論見胃實）

无汗小便不利腹痛心下滿

無汗小便不利其人若身黃頭汗渴飲水漿或懊憹者宜茵陳湯（方論見發黃）　若身黃脇痛鼻乾嗜臥有潮熱脈浮者柴胡湯（方論見胃實）　若項強發熱心下滿痛桂枝去桂加茯

苓白朮也（方論見項強）

禁忌
無汗禁忌若浮緊身痛者忌桂枝（論見大法）　脈浮發熱表不解者忌白虎（論見湯）　若少陰欲寐但厥者忌強發汗必動其血也（論見欲寐）　凡發汗如服一劑病症尤在當再作本湯與之至有不肯汗出者服三劑乃解若汗不出者死病也（論見大法）

無汗續法

針灸
摘傷寒在表發熱惡寒頭項痛腰脊強無汗尺寸脈俱浮
合谷（五分候遍身汗出即出針此穴發汗大妙）　復溜（瀉）
又法　手陽明商丘　合谷　手太陽腕骨　陽谷
足少陽俠谿　足陽明厲兌　手厥陰勞宮　皆隨經辨脈刺之　又十二經榮皆可刺
摘傷寒發汗不出　風池　俠溪　魚際（散脈中二分留三呼）　經

渠（一寸分）　內庭（[illegible]時出汗）

瘧狀

日二三發者宜桂麻各半湯
太陽病如瘧狀一日二三度發其人若脈微緩不嘔清便者欲愈也若脈微惡寒面有熱色身痒者桂枝麻黃各半也（方論見發熱）　服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧日再發者汗出必解宜
桂枝二麻黃一湯
桂枝（八錢半）　芍藥（五錢半）　麻黃（二錢二字）　大棗（二箇）
生薑（五錢半）　杏仁（去皮尖八枚）　甘草（半兩）
右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

日晡發者宜下宜汗宜和
病人煩熱汗出解又如瘧狀日晡所發者屬陽明也脈實者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯　婦人寒熱經水適斷者為熱入血室其血必結故

小便不利頭汗　胃實頭汗　心下滿頭汗　診

使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之（論見婦人傷寒）

頭汗

頭汗小便不利其人若胸脇滿往來寒熱者柴胡桂薑也（方論見往來寒熱）　若發黃渴飲水漿者宜茵蔯湯（方論見發黃）

陽明胃實頭汗其人若下血譫語者為熱入血室宜刺期門（論見譫語）　若下後手足溫不結胸心中懊憹飢不欲食者宜梔子豉湯（方論見煩）　若被火額上汗出小便不利者必發黃也（方見胃實）

頭汗心下滿其人若脈沉細微惡寒手足冷口不欲食大便鞕者小柴胡湯（論見厥往來寒熱）

若水結胸無大熱者大陷胸湯孫兆改用半夏茯苓湯

太陽病中風以火刼發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛則小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾捻衣摸牀小便利者可治　關格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死　濕家關節疼痛下之額上汗出微喘小便利者死下利不止者亦死　濕家頭汗出欲被覆向火者若下之早則噦胸滿小便不利舌上白胎也（論見身痛）

頭汗續法

診

孫凡水結胸脇間頭必有汗治以半夏茯苓湯

活病人表實裏虛玄府不開則陽氣上出汗見於頭凡頭汗出者五臟乾枯胞中空虛津液少也慎不可下下之謂之重虛

成頭者諸陽之會邪搏諸陽津液上湊則汗見於頭也

海頭汗出劑頸而還血証也額上偏多者屬心部為血証

也獨益中州脾土以血藥治之其法無以加矣

舌白胎

半表半裏

舌上白胎若陽明胃實脇下滿不大便而嘔者小柴胡湯（論見胃實）　若下後心中懊憹者梔子豉湯（方論見煩）　若下後噦而胷滿小便不利者丹田有熱胸中有寒也（論見呃逆）

診忌

脈陰陽俱緊者口中氣出唇口乾燥倦臥足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也到七日以來其人微發熱手足溫者此為欲解或到八日巳上反大熱者此為难治設使惡寒者必欲嘔也腹內痛者必欲利也（海藏云惡寒必欲嘔者小柴胡湯腹中痛者理中湯）

臟結如結胷狀飲食如故時時下利寸脈浮關脈小細沉緊舌上白胎滑者难治也若無陽症不往來寒熱其人反靜者不可攻也（論見臟結）

舌滑續添

白胎邪淺黃黑者邪深

成舌者心之官法應南方火本紅而澤傷寒三四日已後舌上有膜白滑如胎甚者或燥澀黃黑是數者熱氣淺深之故也邪氣在表者舌上即無胎及邪氣傳裏津液結搏則舌上生胎矣寒邪初傳未全成熱或在半表或在半裏或邪氣客於胷中者皆舌上白胎而滑也經曰舌上如胎者以丹田有熱胷上有寒邪初傳入裏也陽明病脇下硬滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯是邪在半表半裏也太陽病若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之是邪客於胷中也若病在臟宜若可下如舌上滑胎者則不可攻是邪未全成熱猶帶表寒故也

澁者白况

及其邪傳為熱則其舌上之胎不滑而澁也經曰傷寒七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥

而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之是熱耗津液而滑者已乾也

黃者當下

若熱聚於胃則爲之舌黃是熱已深矣金匱要畧曰舌黃未下者下之黃自去

黑者不治

若舌上黑色者又爲熱之極也鍼經曰熱病口乾舌黑者死以心爲君主之官開竅於舌黑爲腎色見於心部心部者火也腎者水也水之邪熱已極鬼賊相刑故知必死也

雜方

垣下後病嗽加五味子麥門冬如舌上有滑胎者是胃中有寒勿用之胃有微寒加辛熱之劑立效　舌燥澁如楊梅刺者用生薑切厚片蘸蜜於舌上揩之其刺立消神效

無薄苛蜜治舌上白胎乾澁語話不真先以生薑厚片蘸蜜水揩洗有用薄苛自然汁與白蜜等分調匀傅之良

動氣

禁忌

成　動氣者爲築築然動跳於腹者是也　動氣在右不可發汗發汗則衂而渴心苦煩飲即吐水（活人云先服五苓散三服次服竹葉湯）　動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤（活人云先服防風白术牡蠣汁止次服建中湯方見自汗）　動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端（活人云宜服李根湯方見氣上衝）　動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼目暈惡寒食則反吐穀不能進（活人云先服大橘皮湯吐止後服小建中湯）　動氣在右不可下下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸也　動氣在左不可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖身有熱臥則欲踡　動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自泄欲得水自灌　動氣在下不可下下之則腹脹滿卒起頭眩食則下清穀心下痞也

動氣續法

滯氣

雲傷寒汗下後臍左有動氣者宜

防葵散

防葵（一刃） 木香（不見火） 柴胡 黃芩（各半刃）

右剉為細末每服五錢水煎服

傷寒汗下後臍上有動氣者宜

枳殼散

枳殼（麩炒五錢） 赤茯苓 當歸 三稜（炮各一刃）

木香 訶黎勒（各五錢）

右為末每服五錢沸湯點服

傷寒汗下後臍右有動氣者宜

前胡散

前胡 赤茯苓 大腹皮 人參（各五錢）

木香 檳榔 大黃（各三錢）

右為細末每服五錢沸湯點服

傷寒汗下後臍下有動氣者宜

茯苓散

赤茯苓（一刃） 檳榔（三錢） 桂心 大腹皮

川芎（炮炒） 良薑（各五錢）

右為細末每服五錢沸湯點服

如久不治傳為積熱治之難痊不可汗下也

鼻衄

溙傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之（活人云衄後脈浮者宜麻黃湯衄後脈已微者不可行麻黃湯宜黃芩芍藥湯） 太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表症仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之 不大便頭痛有熱若小便赤者承氣湯也若小

便清而衄者桂枝湯也（論見發汗）　太陽病脈浮緊發熱無汗而衄者愈也（論見發熱）

虛

太陽病以火刼發汗血氣流溢失其常度陽盛則欲衄陰虛則小便難（論見頭汗）　少陰病但厥無汗而強發之必動其血或從口鼻出或從目中出者難治（論見欲寐）　動氣發汗則衄而渴飲水就吐（論見動氣）

汗忌

脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄　陽明胃實口燥但欲漱水不咽者必衄也　衄家不可發汗汗出必額上陷脈急緊直視不能瞬不得眠（衄忌發汗者爲无脈若浮緊身疼發熱惡寒之症宜發之）

鼻衄續法

脈浮者麻黃桂枝脈微犀角[illegible]

海藏仲景言衄不可發汗者蓋爲脈微也若浮緊者麻黃湯浮緩者桂枝湯脈已微二藥不可用犀角地黃湯主之（仲景云衄家不可發汗汗出必額上陷脈緊直視不能眴不得眠又云衄不可發其表汗出即額陷脈急此二說皆爲脈微不可汗也若脈浮緊及得緩者皆當發之是也）

活傷寒衄血　脈已微者黃芩芍藥湯犀角地黃湯主之

犀角地黃湯治傷寒應發汗而不發汗內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑此方主消化瘀血

芍藥（一兩）　生地（一兩半）　牡丹皮（二錢半）　犀角（二錢半）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎服一盞有熱如狂者加黃芩一兩其人脈大來遲腹不滿自言滿者爲無熱不用黃芩

茅花湯治鼻衄不止用茅花尖一把以水三盞濃煎汁一盞分二服即瘥無花以根代之

若衄而渴者心煩飲則吐水先服五苓散次服竹葉湯

本治傷寒衄血滑石丸

滑石末不以多少飯丸如桐子大每服十丸微嚼破新

水咽下立止用藥末一錢飯少許同嚼下亦得老幼皆可服湯晦叔云鼻衄者當汗不汗所致其血青黑時不以多少乃止宜服溫和藥以調其衛纔見鮮血急以此藥治之

下血

（少腹結急下血）傷寒下血若太陽病外已解但少腹急結者桃仁承氣湯也（方論見畜血）

（胃實譫語下血）若陽明胃實譫語者宜刺期門穴（論見譫語）

（汗下後下血）太陽病以火熏汗不得汗其人必躁而滑血（論見躁）　淋家不可發汗發汗則便血　太陽病下之其脈浮滑者必下血（論見大法）

（厥）少陰病但欲寐一身手足盡熱者必便血也　傷寒熱少厥微不欲食煩躁數日小便利色白若欲食者愈若嘔而胸脇煩滿者必便血也

唾血

（陽明畜血）咽痛吐血若面赤斑斑如錦紋者為陽毒宜升麻鼈甲湯（方論見陽毒）

（下後呼逆吐血）若下後利不止手足厥逆下部脈不至者麻黃升麻湯（方論見下利）

（灸後汗後吐血）脈浮熱甚反灸之必咽燥唾血（論見大法）　服桂枝湯吐者必吐膿血（論見吐）

畜血

（太陽畜血）身黃如狂屎黑喜忘者為畜血　太陽病表證在而發熱惡寒脈反沉結而身黃發狂少腹硬滿者若小便不利為無血也小便自利血證諦也宜以抵當湯主之（論見發熱）

抵當湯

水蛭十箇（熬去子杵）　虻蟲十枚（去翅足熬）　大黃一兩（湯浸）　桃仁七枚（去皮尖碎）

右㕮咀作一服水一盞煎七分去查溫服

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者爲有血也當下之不用餘藥宜

抵當丸

水蛭五枚（熬）　虻蟲五枚（去翅足炒）　桃仁六枚　大黃三錢

右爲末煉蜜和作一丸以水一盞煎至七分頓服晬時當下血不下再服

太陽病不解熱結膀胱其人似狂若血自下者病愈其外未解者尚未可攻當先解外外解但小腹急結者乃攻之

桃仁承氣湯（活人方有薑七片桂硝各二錢）

桃仁十二枚（去皮尖雙仁者不用）　大黃（一兩）　甘草（炙）

桂枝　芒硝（各半兩）

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去查入硝化開食後服

陽明畜血

陽明症胃家實喜忘大便黑色雖硬反易者有畜血宜抵當湯（論見胃實）

瘀初便褐色者重再便深褐色者愈重三便黑色者爲尤重色變者以其火燥也如羊血在日色中須臾變褐色久則漸變而爲黑色即此意也當詳察之

許血在上則喜忘在下則發狂

下後畜血

病人無表裏症發熱七八日雖脉浮數者可下之假令已下脉不解胃熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血宜抵當湯若脉數不解血下不止必協熱而便膿血也

成當不大便六七日之際無喜忘如狂之症又無少腹鞕滿之候何以知其有畜血盖以其脉浮數故也浮則熱客

於氣數則熱客於血下後浮數俱去則病已若下後數去而浮仍在則榮血中熱去而衛氣中熱在為邪氣獨留心下善飢邪熱不殺穀潮熱反渴也若下後浮去而數不解則衛氣中熱去而榮血中熱在血熱合併迫血下行胃虛協熱消穀善飢血至下焦若下不止則血得以泄必膿血也若不大便六七日則血不得出泄必畜在下焦為瘀血故須以抵當湯下之

口燥漱水不欲咽者瘀血在胸

病者胷滿痞痿舌青口燥但漱水不欲下咽無寒熱脈微大來遲腹不滿其人言我滿為有瘀血（海云漱水不咽胸滿心下手不可近者桃仁承氣湯主之）

病者如熱狀煩滿口乾燥而渴其脈反無熱此為陰伏是瘀血也當下之

衂血唾血畜血續法

血分上中下三部

瘀血症古人用藥雖有輕重之殊而無上下之別今分上中下三等以衂血嘔血唾血吐血為上部血結胷中為中部畜血下焦為下部夫既有三部之分故藥亦當隨其輕重也

上部血

汗多為衂血脈浮灸之咽燥為唾血當汗不汗熱入於裏者為嘔血吐血此在上也犀角地黃湯主之涼膈散加生地黃亦可然衂唾嘔吐俱在上亦當以輕重分之大凡血證皆不飲水惟氣證則飲之宜詳之此證乃是太陰所主脾所不裹越而上行所以有吐血嘔血之候也實者犀角地黃湯虛者黃芩芍藥湯凡病嘔吐者以脾所主故咸用芍藥主之是知太陰藥也

中部血

血結胷中　頭痛身痛漱水不咽者衂無熱胷滿漱水不欲咽者喜忘昏迷其人如狂心下手不可近者血在中也

桃仁承氣湯主之

下部血

畜血下焦　其人發狂小腹滿硬小便自利大便反黑及臍下疼者抵當湯丸主之如狂者在中發狂者在下

血分輕重異治

抵當湯丸藥味同劑如何是二法蓋喜忘發狂身黃屎黑者疾之甚也但小腹滿硬小便利者輕也故有湯丸之別桃仁大黃等分水蛭虻蟲多者作湯三之二者作丸丸之名取其數少而緩也故湯用煎服一升丸止服七合也

活病人無表症不發寒熱唇燥但欲漱水不欲入咽其脈微而沉小腹硬滿小便反利大便必黑身黃發狂此血證諦也大抵傷寒當汗不汗裏熱畜化爲血其人喜忘而如狂血上逆則喜忘血下畜則如狂輕者犀角地黃湯桃仁承氣湯甚者抵當湯丸須取盡黑物爲效（後太陽病畜血者表症仍在也今云无表証者但說得明畜血爲未蘭）

海喜忘發狂身黃屎黑者疾之甚也但小腹滿小便利者輕也

生地黃丸　病人七八月後兩手脈沉細微膚冷臍下滿或狂或躁大便實而色黑小便自利者此畜血証也若老幼氣虛弱者宜此方主之

生地黃（自然汁一升如無生地黃只用生乾地黃二兩）　乾漆（半兩炒烟盡）

生藕（自然汁半升如无藕用小薊汁一升半）　藍葉（一握切細乾者用末半升）

虻蟲（二十个去翅足炒黃）　水蛭（十个炒）　大黃（一兩剉如豆大）

桃仁（廿个研）

右一處入水三升同慢火熬及二升放冷分二服先投一服至半日許血未下再投之此地黃湯比抵當湯丸其勢甚輕如無地黃與藕汁升數添水同煎抵當丸恐用之太過不止損血故以此湯主之

吐血續法

（表虛脈浮緊者麻黃参芪）垣治一貧士病脾胃虛與補劑藥愈後繼而居病室臥熱炕咳而吐血數次予謂此久虛弱外有寒形而有火熱在內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣瀉裏之虛熱蓋冬居曠室衣服单薄是重虛其陽表有大寒壅遏裏熱火邪不得舒伸故血出於口因思仲景治傷寒脈浮緊當以麻黃湯發汗而不與之遂成衄血却與麻黃湯立愈與此甚同因與

麻黃人參芍藥湯

麻黃（一錢去外寒） 桂枝（半錢補表虛） 白芍藥（一錢） 黃芪（一錢實表益衛）

甘草（炙一錢補脾） 五味（五粒安肺氣） 門冬（三分保肺氣） 人參（三分益三焦元氣不足而實其表）

當歸（五分和血養血）

右㕮咀作一服水三盞煮麻黃一味令沸去沫至二盞入餘藥同煎至一盞去查熱服臨臥一服愈觀此一方足以爲萬世模範也蓋取仲景麻黃湯與補劑各半服之但凡虛人合用仲景方者皆當以此爲則也

（熱蓄入裏者抵當桃仁）**活**傷寒吐血諸陽受邪初熱在表應發汗熱毒入經結於五臟內有瘀積故吐血也瘀血甚者抵當湯也輕者桃仁承氣湯兼服犀角地黃湯三黃丸

短氣

（短氣表症）短氣骨節痛不得屈伸汗出小便不利惡風身腫者爲風濕宜甘草附子湯（方論見濕痛） 短氣腹滿脇痛其人若脈弦浮大外不解無汗嗜臥身黃小便難有潮熱者小柴胡湯也（論見胃實方見往來寒熱）

（短氣裏症）若表未解手足濈然汗出或有潮熱者宜大承氣湯（方論見潮熱條） 若表解心下痞鞕乾嘔短氣者宜十棗湯（方論見上）

短氣汗不徹

短氣煩躁若發汗不徹續微汗出不惡寒表證不罷面赤者爲併病更發汗則愈（論見面赤）

短氣心硬痛　診

若下後心中懊憹心下硬痛者用大陷胸湯（論見結胸）

趺陽脈微而緊緊則爲寒微則爲虛微緊相搏則爲短氣

坐而伏者短氣也（論見大法）

心痛

下後心中結痛

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未全解也梔子豉湯主之

脈弦脇及心痛

陽明病胃實脈弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾無汗嗜臥身黃小便難有潮熱時時噦者小柴胡湯（論見胃實方見往來寒熱）

心痛續法

針灸

續　傷寒飲水過多腹脹氣喘心下痛不可忍宜灸中脘氣海二穴　如小腹有氣上衝者宜灸天樞氣衝三里三陰交（如無此症只用前穴）

除中

診

傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脈遲爲寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除中必死　眼睛不慧語言不出而穀食反多者此爲除中口雖欲言舌不能語　凡手足厥冷而利不當食而食者恐爲除中試與索餅食之發熱者除中不發熱者非也（論見厥門）

下重

泄利下重

泄利下重若少陰症欲寐四逆者四逆湯加薤白散若熱者白頭翁湯（方論見下利）

脈浮誤灸下重

脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰㠯

下必重而痺名火逆也

脈遲浮弱誤下下重

脈遲浮弱惡風寒者表症醫反下之遂不食脇痛身黄項強小便難復與柴胡湯必下重（論見脇痛）

診

下利脈沉弦者下重也（論見下重）

身熱惡寒身寒惡熱

診治

病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也（活人云先以桂枝湯治寒次以小柴胡加桂以温其表）身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也（活人云先與白虎湯加人參除熱次以桂枝麻黄各半湯以解其外）

續增症

表

射干湯治初秋暴雨冷及天行暴寒其熱喜伏於内咳嗽曲折不可得氣息喉啞失聲乾嗽無唾喉中如梗

射干（一兩）　半夏（二兩半）　杏仁（兩半去皮尖炒）　生薑（炮二兩）

甘草　紫菀（各一兩）　橘皮　肉桂

枳實（炙各二兩）　當歸　獨活　麻黄（去節）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去查温服

續增斑

海陽症發斑有四有温毒發斑有熱病發斑有時氣發斑有傷寒發斑（已上四斑活人有治法見後）

陽斑如錦紋

斑斑如錦紋或發之四末或發之面部或發之胸背色紅赤者胃熱也紫黑者胃爛也一則下早一則下晚乃外感熱病而發也宜用玄參升麻湯白虎等藥（王朝奉云赤斑出五死一生黑斑出十死一生皆用白虎人參湯阿膠大青龍湯黒奴與紫雪散大抵可下者調胃承氣湯）

温毒斑咳嘔至春發

活温毒發斑者初春病人肌肉發斑癮疹如錦紋或咳心悶但嘔者是也冬時觸冒寒毒至春始發初病在表或已汗吐下而表証未罷毒氣未散以此發斑宜用黑膏主之

又有冬月温煖人感乖戾之氣冬未即病至春或被積寒

所折毒氣不得洩至天氣暄煖溫毒始發則肌肉斑疹如錦紋而咳心悶但嘔有清汁宜用葛根橘皮湯主之

黑膏方療溫毒發斑

生地（半斤切碎）　好豉（一升）

右二味猪膏二斤合一處煎令三分減一絞去查用雄黄麝香如荳大爲末同藥再煎服之其毒便從皮中出者則愈忌蕪荑

葛根橘皮湯療冬溫未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其寒解冬溫始發肌中斑爛癮疹如錦紋而咳心悶但嘔吐有清汁宜服此湯即止

葛根　橘皮　杏仁（去皮麩炒）　知母

黄芩　麻黄（去節湯泡）　甘草（炙各半兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去查溫服

熱斑附　氣疹瘢　時發

熱病發斑與時氣發斑並同夫病人或未發汗或已經發汗而熱毒不散表虛裏實熱毒乘虛出於皮膚所以發斑瘡癮疹如錦紋俗名謂之麸瘡素問謂之疹大抵發斑不可發表虛裏實若發其汗重令開洩更增斑爛也宜用玄參升[illegible]湯者臙脂子湯選用之

玄參升麻湯治傷寒發汗吐下後毒氣不能散表虛裏實發熱於外故身發斑如錦紋甚則煩躁譫語兼治喉閉腫痛

玄參　升麻　甘草（炙各半兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去查熱服

大青四物湯治傷寒熱病十日已上發汗及吐利後熱不除身上斑出

大青（一兩）　阿膠　甘草（炙各一錢半）　豆豉（一合）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞旋入膠再煎令

溶服

豬膽雞子湯治五六日斑出

豬膽（三合）　雞子（一枚）　苦酒（三合）

右三味合煎三沸強人盡服瘦人煎六七沸服之

（陽毒斑在面）

陽毒升麻湯治斑出面（方見陽毒）

海消毒飲子治斑

黍粘子（六錢）　荊芥　防風（各二錢）　甘草（一錢）

右㕮咀水煎服

（陰斑如蚊咬狀）

陰證發斑出胷背又出手足亦稀少而微紅若作熱症投之涼藥大誤矣此無根失守之火聚於胷中上獨熏肺傳於皮膚而爲斑點但如蚊蚋蚤虱咬形狀而非錦紋也宜調中溫胃加茴香芍藥以大建中陰毒升麻鱉甲湯發之

類其斑自退可謂治本而不治標也（海藏云陽明發斑胸[illegible]有紅點如斑出於毛之間者宜白虎瀉心等藥當審之）　大建中湯（方見治惡寒門）　陰毒升麻鱉甲湯治陰斑（方見陰毒）

侯國華病傷寒四五日身微斑渴欲飲診之沉弦欲絕厥陰脈也服溫藥數日不已又以薑附等藥覺陽微回脈生因渴私飲水一杯脈復退又見頭不舉目不開問之則犯陽易若只與燒裩散則寒而不濟矣遂更用吳茱萸湯一大服調燒裩散連進二服出大汗兩晝夜而愈

宜忌

丹發斑似傷寒者痰熱之病發於外汗以散之下之非理

欲眠目不閉聲嗄爲狐惑爲䘌

（虫蝕上爲狐　虫蝕下爲惑）

狐惑之爲病狀如傷寒或因傷寒而變成斯病其狀默默欲眠目牽不得閉臥起不安虫蝕於喉咽爲惑蝕於陰肛爲狐不欲食惡聞食臭其面目乍赤乍黑乍白蝕於上部

則聲嗄甘草瀉心湯主之（方見痞）　蝕於下部則咽乾苦參湯洗之　蝕於肛者雄黃散熏之用雄黃一味為末取二瓦合之燒向肛熏之

脈經云病人或從呼吸上蝕其咽喉或從下焦蝕其肛陰蝕上為惑蝕下為狐狐惑病者豬苓散主之（方未考究）

病者脈數無熱微煩默默但欲臥汗出初得之三四日目赤如鳩眼七八日目四眥（一本眥有黃字）黑若能食者膿已成也赤豆當歸散主之（方見下血）

狐惑續法

濕痰

一婦人狐惑聲嗄多眠目不閉惡聞食臭不省人事半月後又手足拘強脈數而微細先與竹瀝薑汁一盞服之忽胃中有汗腹鳴即目開省人事遂用參朮歸陳入竹瀝薑汁飲之五六貼而愈

上唇有瘡蝕臟
下唇有瘡蝕肛

活狐惑傷[illegible]濕䘌皆蟲證初得狀如傷寒或因傷寒變成此疾大抵傷寒腹內熱食少腸胃空虛三蟲行作求食蝕人五臟及下部為䘌蟲病其候齒無色舌上盡白甚者唇黑有瘡四肢沉重忽忽喜眠蟲蝕其肛爛見五臟則死當數看其上下唇上唇有瘡蟲蝕其臟下唇有瘡蟲蝕其肛殺人甚急多因下痢而得治䘌桃仁湯黃連犀角湯雄黃銳散主之

治䘌桃仁湯

生艾　桃仁（去皮尖炒雙仁不用）　槐花子（碎各一兩）

大棗十五个（去核）

右水二盞煎至一盞半分三服

黃連犀角湯治傷寒及諸病之後內有䘌出下部者

黃連（半兩）　犀角（一兩）　烏梅（七个）　沒藥（一分）

右水二大盞半煎至一盞半分三服

雄黃銳散治下部䘌瘡

雄黃　苦參　青葙子　黃連（各一分）

桃仁（去皮尖一分）

右爲散以生艾搗汁爲丸如棗核大綿裹納下部匾竹葉汁更嘉冬月無艾只用散裹納亦得

百合病

百脈一宗悉致其病

百合病論曰百合病者謂無經絡百脈一宗悉致病也人常默默然意欲食不能食意欲臥不能臥意欲行不能行或有時聞食臭或時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤澀

診

藥不能治得藥則劇吐利如有神靈者身形雖似和其人脈微數每溺時輒頭痛者六十日乃愈若溺時頭不痛淅然者四十日愈若溺時快然但頭眩者二十日愈體症或未病而預見或病四五日而出或病二十日或一月微見者各隨其症治之（活人云此名百合傷寒多因傷寒虛勞大病之後不平後變成奇疾也）

百合病發汗後宜服

百合知母湯

百合（七枚擘）　知母（三兩切）

右先將百合水洗浸一宿當白沫出去其水更以井水二盞煎至一盞去查又將井水二盞另煎知母取一盞去查和百合一盞同煎取一盞半分溫再服

百合病下後者宜用

滑石代赭湯

百合（七箇擘）　滑石（三兩碎綿裹）　代赭石（如彈大一枚綿裹）

右先將百合水洗淨浸一宿當白沫出水更以井水二升煎取一盞去查另用水二升煎滑石代赭石取一升

去查後合和同煎取一升半分温服

百合病吐後宜用

百合雞子湯

百合（劈）七枚　雞子黃一枚

右先將百合水浸一宿當白沫出去其水更以井水二升煎取一盞去查納鷄子黃攪勻煎五分温服

百合病不經吐下發汗病形如初者宜

百合地黃湯

百合（劈）七箇　生地黃汁一升

右水洗百合浸一宿當白沫出去水更以井水二升煎取一升去查納地黃汁煎取一升五合分温再服中病勿更服大便當如漆黑

百合病一月不解變成渴者百合洗方主之用百合一升以水一斗漬之一宿洗身已食煮餅勿以鹽豉也

百合病渴不瘥者宜

括蔞牡蠣散

括蔞根　牡蠣（熬各等分）

右爲末飲服方寸匕日三服

百合病變發熱者（一作發寒熱）宜用

百合滑石散

百合（一兩）　滑石（三兩）

右爲散飲服方寸匕日三服當微利止服熱則除

百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此爲逆見陰攻陽乃復下之此亦爲逆也

醫學綱目卷之三十三　　傷寒部

勞復門　陰陽易

仲景主於攻邪

大病瘥後勞復者枳實梔子豉湯主之

枳實（炒四枚）　梔子（十四枚）　豉（一兩）

有食者大黃

右三味以清漿水二盞空煮退一盞內枳實梔子煮取八分下豉更煮五六沸去查溫服覆令取微汗若有宿食內大黃（量虛實）加減

有熱者柴胡

傷寒瘥後更發熱者小柴胡湯主之脈浮者以汗解之沉實者以下解之

有水氣者滲之

大病瘥後從腰以下有水氣者牡蠣澤瀉散主之

牡蠣（熬）　澤瀉　蜀漆（洗去腥）　商陸（熬）

海藻（洗）　栝蔞根　葶藶（各等分）

右爲散水服方寸匕小便利止後服日二

胃有寒者溫之

大病瘥後喜唾久不了了者胃上有寒當以丸藥溫之宜

理中丸

氣逆欲吐者抑之

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之

淡竹葉（二把） 石膏（半斤碎） 半夏（三兩） 人參（三兩）

麥門冬（四兩去心） 甘草（一兩炙） 嘔者加生姜（一兩半）

右㕮咀每服五錢水一盞半入粳米百餘粒煮取八分

米熟湯成去查溫服

診

風家表解而不了了者十二日愈

勞復續法

後資生於補虛

海大抵勞者動也動非一種有內外血氣之異焉若勞乎氣則無力與精神者法宜微舉之若勞乎血與筋骨者以四物之類補之若勞在脾內為中州調中可已此為有形病也但見外證則謂之復病非為勞也如再感風寒是已

勞當補其子

本記有人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脈弦數心不得寧眞勞復也予診之曰勞心之所致神之所舍未復其初而又勞傷其神榮衛失度當補其子益其脾解其勞庶幾得愈授以補脾湯佐以小柴胡湯解之或者難曰虛則補其母今補其子何也予曰子不知虛勞之異乎難經曰虛則補其母實則瀉其子此虛當補母人所共知也千金曰心勞甚者補脾氣以益之脾王則感之於心矣此勞則當補子人所未聞也蓋母生我者也子繼我而助我者也方治其虛則補其生我者與錦囊所謂本骸得氣遺體受蔭同義方治其勞則補其助我者與荀子言未有子富而父貧同義此治虛與勞所以異也

補脾湯治傷寒得汗瘥後脾胃傷冷物胸膈不快尋常血氣不和

人參　白术　甘草　橘皮（去白）

青皮（去白）　乾姜（各等分）

右爲末每服三錢水一盞煎數沸熱服入塩點亦得

海治勞復麥門冬湯氣欲絶者用之有效能起死回生

麥門冬（一兩）　甘草（二兩炙）　粳米

右麥門冬去心爲細末水二盞煎粳米令熟去米約湯一小盞半入藥五錢棗二枚去核新竹葉一十五片同煎至一盞去查溫服不能服者綿滴口中又治小兒不能灌藥者宜用此綿滴法　此方不用石膏以其三焦無火熱也兼自欲死之人陽氣將絶者故不用石膏若加人參大妙

外大病後不足病虛勞補虛取七歲已下五歲已上黃牛乳一升水四升煎至一升如人饑稍稍飲不得多與十日服不住佳

肘治篤病新起早勞食飲多致勞復欲死燒鱉甲服方寸匕

活雄鼠屎湯治勞復

梔子（十四箇）　雄鼠屎（二七枚兩頭尖者是）　枳殼（三枚炒）

右爲細末每服四錢水一盞半入葱白二寸香豉三十粒同煎一盞分二服勿令病人知鼠屎

七味葱白湯治傷寒或因起動勞復或因吃食稍多皆成此候若復甚者一如傷寒初有此證宜服此方

葱白（連鬚）　乾葛　新豉（半合）　生姜（切一合）

麥門冬（去心）　熟地（三兩）　流水四升以杓揚之

右七味用清水煎三分減二去查分二服漸漸服之取汗

右傷寒勞復莫若仍用丹溪以參芪歸不加發散之劑汗之爲的當也

陰陽易

虛邪

傷寒陰陽易之爲病其人身體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急者燒裩散主之

燒裩散取婦人中裩近隱處剪燒灰以水和服方寸匕日三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子裩襠燒灰用

嘗治傷寒病未平復犯房室死者命在須臾用獨參湯調燒裩散凡服參一二斤餘得愈者三四人信哉用藥不可執一也

陰陽易續法

治傷寒病新瘥陰陽未和因合房室則令人陰腫入腹絞痛婦人則裏急腰胯連腹內痛名爲陰陽易也其男子病新瘥未平復而婦人與之交接得病名曰陽易婦人病新瘥未平復而男子與之交接得病名曰陰易若二男二女並不自相易所以呼爲易者以陰陽相感動其毒着於人如換易然其病之狀身熱衝胸頭重不能舉眼中生花四肢拘急小腹絞痛手足拳則死亦有不即死者病苦少腹裏急熱上衝胸頭重不欲舉百節解離經脈緩弱血氣虛骨髓竭便怳怳翕翕氣力轉小著床不能動搖起止仰人或牽引歲月方死宜燒裩散豭鼠糞湯竹茹湯青竹茹湯乾姜湯當歸白术湯選用之（海藏云熱者燒裩散竹皮湯寒者豭鼠糞湯當歸白术湯）

（至於校正方妙香丸條下治雜病陰陽易中有牛黄腦射之類是治其熱症也）

熱者寒治

竹皮湯療交接勞復卵腫腹中絞痛欲絕竹皮青刮一升

用水三升煑取一升絞去查分二服立愈

青竹茹湯婦人病未平復因有所動致热氣衝胸手足拘急搐搦如中風狀宜此湯

瓜蔞根（一兩）　青竹茹（刮半升淡竹是）

右以水二升煑取一升二合去查分二三服

妙香丸（方見積熱條）

寒者熱治

百一治交接勞復陰卵腫或縮入腹腹絞痛或便絕蚯蚓數條絞取汁服之良

海若陰陽易果得陰脈當隨症用之　若脈在厥陰當歸四逆湯送下燒裩散　若脈在少陰通脈四逆湯送下燒裩散　若脈在太陰四順理中丸送下燒裩散所隔之藥各隨其經而效自速也

豭鼠糞湯療傷寒病後男子陰易

韭白根（一把）　豭鼠糞（十四粒兩頭尖者是）

右二味以水五升煑取半升去查再煎三二沸溫服得汗未汗再服亦理諸般勞復

當歸白术湯治婦人未平復因有所動小腹急痛腰胯四肢不任舉動無力發热者

白术　當歸　桂枝　附子（生）

甘草　芍藥　黃芪　人參（各二錢半）

生薑（半兩）

右㕮咀水煎服食頃再服溫㬢取微汗瘥

李良佐子病太陽症尺寸脈俱浮數按之無力余見其內陰虛與神术加乾薑湯愈後再病余視之見神不舒垂頭不欲語疑其有房過問之犯房過乎必頭重目眩曰唯與大建中三四服外陽內收脈反沉小始見陰候又與已寒

加芎藭茴香等丸五六服三日內約服丸六七百丸脈復生又用大建中摟之大汗作而解

四因女色病陰証傷寒者用陳皮熱鍋內炒焦以酒一烹下濾酒飲之

四時傷寒不同

冬爲傷寒　春爲溫病　夏爲暑病　秋爲瘧

一歲長幼病相似爲溫疫　多眠多汗脈浮爲風溫　一身不痛爲濕　身反張爲痓

（四時傷寒）陰陽大論曰春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冷冽此四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏若能固密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能爲病惟傷寒爲毒者以其最爲殺厲之氣也中而即病者爲傷寒不即病者爲寒毒藏於肌膚中至春變爲溫病至夏變爲暑病暑病者熱極重於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱病皆由冬時觸寒所致非時行之氣也

（瘟疫）凡時行者春時應暖而反大寒夏時應熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也

從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆爲時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱爲寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦微其病與溫病及暑病相似但治有殊者要在办其病原寒熱溫三者之異則用藥冷熱之品味判然矣

其冬有非節之暖者名冬溫冬溫之毒與傷寒大異冬溫復有先後更相重沓亦有輕重治亦不同（冬溫應常紀者有三歲少陰司）

（天之政五之氣陽明司天之政終之氣皆病溫其不應常紀而反常者則不可候之而適時變易也）氣候亦有應至而不至者或有未應至而至者或有至而太過者皆成病氣也

丹溪用補中益氣通治四時傷寒

海藏用神术白术通治濕痙濕温

凡四時傷寒通宜補散故丹溪治傷寒多用補中益氣湯氣虛者四君子湯加發散劑血虛者四物湯加發散劑東垣治風濕用補中益氣加羌活防風升麻藁本蒼术海藏治風濕無汗者用神术湯有汗者用白术湯治剛痙用神术湯加羌活麻黄治柔痙用白术湯加桂心芪术治風濕用白术湯隨證加藥治中暍脈弦細芤遲者用黄芪湯此皆與仲景所謂辛苦之人觸冒之病傷寒同意也

傷寒方中寒不同

丹仲景論傷寒而未及乎中寒先哲治冒大寒昏中者用附子理中湯其議藥則得之矣曰傷曰中未有議其異同者夫傷寒有即病有不即病因其舊有鬱熱風寒外束肌腠自密鬱發爲熱病邪循經而入以漸而深初用麻黄桂枝輩微表而安以病体不甚虛也若中寒則倉卒感受其病即發而暴因其腠理疎豁一身受邪難分經絡無熱可發温補自解此气大虛不急治則死矣

傷寒傷暑傷濕亦如傷寒之漸入也中風中暑中濕亦如中寒之暴受也中寒治法見卒中暴厥門

冬爲傷寒

傷寒

從霜降已後至春分已前凡有觸冒霜露体中寒即病者謂之傷寒也（治法除濕暑瘧疾外皆傷寒法也）

春爲温病

温病

從立春節後其中無暴寒又不氷雪而人有壯熱爲病者此屬春時陽气發於外冬時伏寒變爲温病（春温應常紀者有四歲少陽司天之政初之气太陽司天之政初之气陽明司天之政終之气太陰司天之政二之气皆病温其不應常紀而

（反常者不可候之而隨時変易也）冬傷於寒春必温病（全文見五臓）　太陽病発熱而渴不悪寒者爲温病（治見多温）

温毒　陽脈洪数陰脈実大者遇温熱変爲温毒（論見大法治見発班活人云初春発班咳嗽爲温毒）

風温　発汗不解身灼熱爲風温其證脈浮汗出身重多眠蓋其病不獨見於春間故另立風温門

診　尺膚熱甚脈盛躁者病温也（全文見診）　夫精者身之本也故藏於精者春不病温

鍼灸　凡治温病可刺五十九穴　成註云所謂五十九穴者刺兩手内外側各三凡十二痏五指間各一凡八痏足亦如之頭入髮際一寸傍三分各三凡六痏巔上一顖会一髮際一廉泉一風池二天柱二（内経云気口静人迎躁者取之若気口人迎皆静者勿刺也人迎謂結喉動脈也）　王太僕註素問五十九刺云刺頭上五行五行者以越諸陽之熱逆也（謂頭中行上星顖会前頂百会後頂五穴頭第二行兩傍五穴承光通大絡却玉枕十穴第三行兩傍臨泣目窓正営承霊脳空十穴也）　大杼膺俞鈌盆背俞此八者以瀉胸中之熱也　気街三里巨虚上下兼此八者以瀉胃中之熱也　雲門髃骨委中髓空此八者以瀉四肢之熱也　五臓俞傍五此十者以瀉五臓之熱也（謂背第五行兩傍魄戸神堂譩譆門意舍志室十穴也）

温病續法

活　夏至前発熱悪寒頭疼身体痛其脈浮緊者温病也春月傷寒謂之温病冬傷於寒軽者夏至已前発爲温病蓋因春温暖之気而発也治温病與冬月傷寒夏月熱病不同蓋熱軽故也升麻解肌湯最良熱多者小柴胡湯主之不渴外有微熱者小柴胡加桂枝嗽者小柴胡加五味子

煩躁発渴脈実大便秘澁者大柴胡湯微利之虚煩用竹葉湯次第服之

（仲景活人論温不同）仲景謂温病壯热不悪寒活人謂温病発热悪寒各不同當以仲景爲正

升麻解肌湯治傷寒温病天行頭痛壯热

葛根（一両）　黄芩　芍薬（各半両）　甘草（炙）

桂心（各一分）　麻黄（三分去節湯泡）

右㕮咀毎服五钱水一盞半棗子一枚煑八分日三服

三四日不解脈浮者宜重服取汗脈沉実者宜下之

（汗下後過經不解亦爲温病）雲傷寒汗下不愈而過經其證尚在而不除者亦温病也

經曰温病之脈行在諸經不知何經之動隨其經所在而取之　如太陽症汗下後過經不愈診得尺寸俱浮者太陽温病也　如身热目疼汗下後過経不愈診得尺寸脈俱長者陽明温病也　如胸脇痛汗下後過經不愈診得尺寸脈俱弦者少陽温病也　如腹満嗌乾診得尺寸脈俱沉細過經不愈者太陰温病也　如口燥舌乾而渴診得尺寸俱沉過經不愈者少陰温病也　如煩満嚢縮診得尺寸俱微緩過經不愈者厥陰温病也是故隨其經而取之隨其症而治之如発班乃温毒也

夏至爲暑病

（中暍忌汗下温針）太陽中暍者発热悪寒身重而頭痛其脈弦細芤遲小便已洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身即热口開前板齒燥若発汗則悪寒甚加温針則発热甚數下之則淋甚

（悪寒身热而渴白虎參）太陽中热暍者其人汗出悪寒身热而渴白虎加人參湯主之（活人云夏月自汗悪寒身热而渴面垢手足冷脈微無力者中暑也白虎湯主之）

太陽中暍者身热疼重而脈微弱此由夏月傷冷水水行

皮中所致也一物瓜蒂湯主之

一物瓜蒂湯用瓜蒂二七箇以水一升煑取五合去査頓服

右瓜蒂湯後賢罕用蓋其劑緩故也若果疼痛不退者亦宜用之

暑病續法

暑病有三

活中暑與熱病外證相似但熱病者脈盛中暑者脈虛以此別之甲乙經云脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑蓋寒傷形而不傷氣所以脈盛熱傷氣而不傷形所以脈虛　又有濕溫與中暑同但身凉不渴為異耳

丹暑熱病用黄連香薷飲挾痰者加半夏挾虛者加參芪或用清暑益氣湯

脈洪身[illegible]

活夏月發熱惡寒頭疼身体肢節痛重其脈洪盛者熱病也冬傷於寒因暑者氣而發為熱病治熱病與傷寒同有汗宜桂枝湯無汗宜麻黄湯加煩燥者宜大青龍湯然夏月藥性須帶凉不可大温桂枝麻黄大青龍須用加減夏至前桂枝加黄芩半兩夏至後桂枝麻黄大青龍加知母一兩石膏二兩或加升麻半兩蓋桂枝麻黄湯性熱及煖處非西北之比夏月服之必有發黄斑出之失熱病三日外與前湯不瘥脈勢仍數邪氣猶在經絡未入臓腑者桂枝石膏湯主之此方夏至後代桂枝證用若加麻黄半兩可代麻黄青龍證用也若三月至夏為晩發傷寒梔子升麻湯亦可選用之

桂枝石膏湯治法見前論有汗脈緩為桂枝證無汗脈緊為麻黄青龍證

桂枝（半兩去皮）　石膏（一兩半）　黄芩（半兩）　甘草（炙一兩）

梔子（三錢）　白芍藥　升麻　乾葛

生姜（已上各三分）

右㕮咀每服五錢半水一盞半煮至八分去滓食頃再服若得汗即停後服

梔子升麻湯　治晚發傷寒三月至夏爲晚發

生地（半斤切碎）　梔子（十箇）　升麻（一兩半）　柴胡

石膏（各二兩半）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓服病不解更作

（脈虛身熱惡寒爲中暑）【暍】靜而得之爲中暑中暑者陰證當發散也或避暑熱納涼於深堂大廈得之者曰中暑其病必頭痛惡寒身形俱急肢節疼痛而煩心肌膚大熱無汗爲房室之陰寒所遏使周身陽氣不得伸越世多以大順散主之是也（海藏云靜而傷暑惡寒脈沉細靜而濕勝傷形者白虎加蒼朮湯主之大順散見局方甘草一錢半乾姜杏仁桃桂各一錢是也）動而得之爲中熱中熱者陽證爲熱傷原氣非形體受病也若行人或農夫於日中勞役得之者名曰中熱其病必苦頭疼發躁熱惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃爲天熱外傷肺氣蒼朮白虎湯主之（海藏云動而傷暑身熱脈洪大動而火勝傷氣者白虎加人參湯主之）

【活】中暑背寒面垢手足微冷煩渴口燥倦怠四肢不痛重其脈微弱按之無力白虎湯主之（方見熱門）

【丹】有人頭痛身熱心煩燥渴診其脈大而虛予授以白虎湯數服愈仲景云脈虛身熱得之傷暑又云其脈弦細芤遲何也素問曰寒傷形熱傷氣蓋傷氣不傷形則氣消而脈虛弱所謂弦細芤遲者皆虛脈也仲景以弦爲陰朱肱亦云中暑脈微弱則虛可知

海脈虛身熱自汗惡寒者中暑也白虎加桂湯主之（方見瘧）

活酒蒸黃連丸治暑毒深伏累取不瘥無藥可治伏暑發渴者

黃連（四兩以無灰酒浸蒸乾）

右為末糊丸熟水下三十丸胸膈涼不渴為驗

橘皮湯治中暑痰逆惡寒

橘皮（二兩去白）　生姜（一兩）　棗子（五枚去核）　甘草（半兩炙）

人參（一錢）　竹茹（半升）

右分五服每服水一盞二分煎取八分去滓熱服

竹葉石膏湯治中暑不惡寒（方見勞復）

五苓散治中暑頭痛惡心煩躁心下不快（方見渴）

海若先飲冷後傷暑者五苓散主之此必心下痞懷生姜湯調服佳或四君子湯調中亦可中和後或小便不利或莖中痛宜服下方

蒲黃（三錢）　滑石（五錢）　生甘草（一錢）

中暍脈弦細芤遲黃芪湯主之

人參　黃芪　白朮　甘草

茯苓　芍藥（各等分）

右㕮咀每服三錢水一大盞生姜三片煎至六分去滓溫服

丹徐三官六月間發熱大汗惡寒戰慄不自禁持且煩渴予曰此暑病脈之皆虛微細弱而數其人好賭致勞而虛遂以人參竹葉作湯調辰砂四苓散八貼而安

鍼灸

雲口開前板齒乾燥者牙乃骨之精今燥者骨熱也鍼藥不能治當灸大椎穴

脛冷腹滿頭痛

活濕溫者兩脛逆冷胸腹滿多汗頭痛妄言其人常傷於

渴而无熱者濕温

濕因而中暑濕熱相搏則發濕温其脉陽濡而弱陰小而急治在太陽不可發汗〻出必不能言耳聾不知痛所在身青面色变名曰重暍如此死者醫殺之耳白虎加蒼朮湯主之

本癸丑年故人王彥龍作毗陵倉官季夏時病胸項多汗兩足逆冷譫語醫者不曉雜進藥已經旬日予診之其脉關前濡關後数予曰當作濕温治之蓋先受暑後受濕暑濕相搏是名濕温先以白虎加人參湯次白虎加蒼朮湯頭痛漸退足漸温汗漸止三日愈此名賊邪誤用藥有死之理有人難曰何名賊邪予曰難經云五邪有实邪虚邪正邪微邪賊邪從後來者爲虚邪從前來者爲实邪從所不勝來者爲賊邪從所勝來者爲微邪自病者爲正邪又曰假令心病中暑爲正邪中濕得之爲賊邪令心先受暑而濕邪勝之水剋火從所不勝斯謂之賊邪五邪之中最逆也難經曰濕温之脉陽濡而弱陰小而急濡弱見於陽部濕氣搏暑也小急見於陰部暑氣蒸濕也故經曰暑濕相搏名曰濕温是謂賊邪也不特此也予素有停飲之疾每至暑月兩足汗漐〻未嘗乾每服此藥二三盞即愈

海濕温汗少者白虎加蒼朮汗多者白虎加桂枝（白虎加桂枝方）見

孫保慶門外有酒家姓姜者善歌唱孫愛之忽數日不見使人問之則曰病久將命絕孫診之遍身皆潤兩足冷至膝下腹滿不省人事六脉皆小弱而急問其所服藥取而視之皆陰病藥也孫曰此非受病重藥能重病耳遂用五苓散白虎湯十餘貼病少甦再服全愈姜氏既安詣孫謝因請問曰某得病劇蒙尚藥一治而甦願聞治法孫曰汝

病傷暑也始則陽微厥而脈小無力衆醫謂陰病遂用陰藥其病愈厥子用五苓散大利小便則腹減白虎解利邪熱則病愈凡陰病脛冷則臂亦冷汝今脛冷臂不冷則非下厥上行所以知是陽微厥也

〔保〕立夏之後至立秋處暑之間傷寒者身多微凉自汗四肢沉重謂之濕溫蒼朮石膏湯主之（即白虎加蒼朮湯是也）

蒼朮（半兩）　石膏（三錢）　知母（二錢半）　甘草（一錢）

右㕮咀水一盞煎至一半溫服謂內有濕也多不欲飲水如身熱脈洪無汗多渴者熱在上焦積於胃中宜桔梗散（此非濕溫證乃熱病也）

桔梗散

薄荷　黃芩　甘草

梔子（各一錢）　桔梗（三錢）　連翹（二錢）

右剉每服五錢水煮加竹葉如大便澁加大黃半兩

〔海〕消暑丸　半夏（一斤）　茯苓（半斤）　生甘草（半斤）

右以醋五升煮半夏盡醋焙乾姜汁作糊無見生水爲丸每服五十丸熱水咽下精意修治用之極效　中暑爲患藥下即甦　傷暑發熱頭痛服之尤妙　夏月常服止渴利小便雖飲水多亦不爲害應是暑藥皆不及此　若痰飲停節並用生姜湯下入夏之後不可缺此

又方消暑丸治頭疼惡心煩躁消渴霍亂

菉荳粉（四兩）　石膏（四兩）　白礬（枯）　硫黃（各一兩）

水浸蒸餅爲丸彈子大辰砂爲衣用姜汁醋點新汲水化開服之

〔丹〕暑風挾痰挾火實可用吐法

玉龍丸治一切暑毒伏暑腹脹疼痛神効

硫黃　硝石　滑石　明礬各一

用無根水調九

秋爲瘧

夏傷於暑秋必病瘧（治法見瘧門）

診脈陰陽俱盛重於隂者變爲温瘧

一歲長幼疾狀相似爲瘟疫

（非時之氣爲瘟疫）春應煖反寒夏應熱反凉秋應凉反熱冬應寒反温此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者爲時行瘟疫病也（論見傷寒）

瘟疫續法

活一歲之中病無長幼率相似此則時行之氣俗謂之天行是也老君神明散務成子螢火九聖散子敗毒散不拘日數淺深吐下隨症施行所以聖散子不問陰陽表裏也

老君神明散治瘟疫

白术（一錢）　桔梗（一分）　細辛（一分）　附子（一兩炮去皮臍）

烏頭（四兩炮去皮尖）

右五味為粗末縫絹袋盛帶之居閭里皆無病若有疫癘者温酒服方寸匕覆取汗得吐則瘥若經三四日抄三寸匕以水一碗煮令大沸分三服

聖散子蘇内翰序全文見活人書特壽流行用聖散子者一切不問陰陽之感連服取瘥不可與傷寒比也若疾疫之行平旦輒煮一釜不問老幼良賤各一大盞即時氣不入

草荳蔻（十箇麪裹煨去皮）　猪苓（去皮）　石菖蒲

茯苓　良姜　獨活（去芦）　附子（炮製去皮臍）

麻黄（去根）　厚朴（去皮薑製）　藁本　芍藥

枳殼（去穰麩炒）　柴胡　澤瀉　細辛

防風（去蘆） 白术 藿香 半夏

吳茱萸（湯洗） 蒼术 甘草（各半錢）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎取八分去查熱服餘查

一再煎空心服之

右二方治疫雖不分陰陽然亦寒多表多者宜之

非時之抗者寒之

治衆人病一般者是謂天行時疫有宜補宜散宜降方

大黄 黄芩 黄連 人參

桔梗 防風 人中黄 滑石

香附 蒼术

右麪糊爲丸每服五七十丸分氣血痰作湯使送下氣

虛者四君子湯送下血虛者四物湯送下痰多者二陳

湯送下熱甚者用童便和前藥同送下

[illegible]瓶月截淡竹去青皮浸滲取汁治天行熱狂熱疾

中毒并惡瘡蕈毒取汁浸皂角甘蔗治天行熱疾

丹解一切災病用粉草五兩細切微炒量病人吃得多少

酒取無灰酒一處研去查温服須臾大瀉毒亦隨出雖十

分渴亦不可飲水飲水難救

右三方熱多裏多者宜之

禦瘟疫法

潔雄黄丸治疫不相染

雄黄（研一兩） 赤小豆（炒熟） 丹參 鬼箭羽（各二兩）

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每日空心以温水下五

丸可與病同床共衣亦不相染矣

活務成子螢火丸主辟疾疫惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠆諸

毒五兵白刃盜賊凶害皆辟之

螢火 鬼箭羽（去皮） 蒺藜（各一兩） 雄黄

雌黄（各二兩） 礬石（一兩燒汁盡） 羚羊角 鍛竈灰

鐵錘柄（入銀處燒用一分半）

右九味擣爲散以雞子黄幷雄雞冠一具和之如杏仁大作三角絳囊盛五丸帶左臂上仍可掛於戶上

春涼

春應煖而清氣折之則實邪在肝升麻解肌湯主之（方見溫病）

夏應暑而寒氣折之則實邪在心調中湯射干湯半夏桂枝甘草湯選用之

夏寒

調中湯治夏月初秋忽有暴寒折於盛熱結於四肢則壯熱頭痛寒傷於胃則下利或血或水或赤壯熱暈悶脈数宜下之

大黄（去皮三分）　黄芩　芍藥　葛根
桔梗　茯苓（去皮）　藁本（擇真者如無以川芎代之）
白术　甘草（炙已上各半兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半煮取一盞移時頓服之得快利便止小兒減與服（虛冷不壯熱但下利或霍亂者不宜服此）

射干湯（方見咽痛）　半夏桂枝甘草湯（方見咽痛）

秋熱

秋應涼而反大熱抑之則實邪在肺白虎加蒼朮湯茵陳汁調五苓散（白虎蒼朮湯見暑五苓散見渴）

冬溫

〔丹〕冬溫爲病非其時而有其氣者冬時嚴寒君子當閉藏而反發泄於外專用補藥帶表藥

作人中黃方以竹筒兩頭留節一節中作一竅內甘草於中仍以竹木釘塞其竅置大糞缸內浸一月取出晒乾用治瘟毒（用此藥一味入補藥帶表同煎服之）

〔活〕冬應寒而反大溫抑之則實邪在腎宜萎蕤湯（方見風濕）

診

多眠多汗脈浮爲風溫

陽脈浮滑陰脈濡弱更遇於風變爲風溫（見論大法）

發汗已身灼熱者名曰風溫風溫爲病脈陰陽俱浮自汗

出身面多眠睡鼻息必鼾語言難出若被下者小便不禁直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時瘛瘲若火熏之一逆尚引日再逆促命期（經云傷寒發汗已則身凉若發汗已身灼熱者非湯寒乃風溫也）

風溫續法

風溫忌發汗

活　風溫者脈尺寸俱浮頭疼身熱常自汗出體重其息必喘四肢不收嘿嘿但欲眠治在少陰厥陰不可發汗發即譫言獨語內煩躁不得臥若驚癇目亂無精如此死者醫殺之耳　風溫忌發汗宜萎蕤湯身灼熱者知母乾葛湯如渴甚者栝蔞根湯脈沉身重汗出者漢防己湯

萎蕤湯加減法

萎蕤湯治風溫兼療冬溫及春月中風傷寒發熱頭眩痛喉咽乾舌強胸內疼痞腰背強

葛根（二兩半）　萎蕤（三分）　石膏（一兩杵碎）　白薇（半兩）

麻黃（用沸湯泡半兩）　羌活（去蘆一兩）　川芎（三錢）　甘草（炙半兩）

杏仁（去皮尖双仁者半兩）　青木香（一錢）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎半鍾日三四服

知母乾葛湯治風溫身体灼熱甚者

知母（三錢）　葛根（八錢）　石膏（六錢）　甘草

黃芩　木香　升麻（各一錢）　萎蕤（三錢）

南星（生二錢）　人參　川芎（各一錢）　麻黃（去節）

防風　杏仁　羌活（各二錢）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一鍾去查服

防己湯治風溫脈浮身重汗出（一方无人參）

防己（四錢）　甘草　黃芪（各一兩）　生姜（二兩）

白朮（三兩）　人參（一兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半煮取一中盞去查飲訖仍

海藏以白朮加藏代萎蕤

濕病有二

坐被中汗出如蟲行或被臥取汗出（許斈士云風溫誤汗用防已黃芪湯）救之

海治風濕活人本方萎蕤湯以有麻黃不敢用宜白朮湯主之（方見前太陽病發熱續法）若頭眩汗出筋惕肉瞤者加牡蠣　若腰背強硬者加羌活　若舌乾發渴者加人參　若身灼熱甚者加知母　若身體重多汗者加黃芪　若內傷冷者不加

一身盡痛爲濕

痛而發黃爲中濕痛不得轉側爲風濕活人又以身痛脈沉爲中濕脈浮爲風濕亦通治法見太陽病体痛門

身反張爲痓

有汗爲柔痓無汗爲剛痓（治法見柔痓門）

婦人傷寒　熱入血室　姙娠傷寒　產後傷寒

血熱

血結胸者刺期門

熱入血室

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀譫語者此爲熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之（東垣云妄見妄聞夜夢亡人皆肝木火盛而爲邪也刺期門与此义同）

許學士云有婦人患熱入血室證醫者不識用補血調氣藥延養数日遂成血結胸或勸用前藥予曰小柴胡已遲不可行也無已則有一焉刺期門穴斯可矣予不能針請善針者治之如言而愈或問曰熱入血室何謂而成結胸也予曰邪氣傳入經絡與正氣相搏上下流行或遇經水適來適斷邪氣乘虛而入血室血爲邪迫上入肝經肝受邪則譫語而見鬼復入膻中則血結於胸也何以言之婦人平居水當養於木血當养於肝方未受孕則下行之以爲月水既姙則中畜之以养胎及已產則上壅之以爲乳

皆此血也今邪氣畜血併歸肝經聚於膻中結於乳下故手觸之則痛非湯劑可及故當刺期門也

（晝明了夜譫語者小柴胡）

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了夜則譫語如見鬼狀者此爲熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈（活人云小柴胡和之）

（○犯胃氣謂下之犯上二焦謂發汗也）

【衍】有一婦人温病已十二日診之其脉六七至而濇寸稍大尺稍小發寒熱頰赤口乾不了了耳聾問之病數日經水乃行此屬少陽熱入血室也若治不對病則必死乃按其證與小柴胡湯服之二日又與小柴胡湯加桂乾姜一日寒熱遂止又云我臍下急痛又與抵當丸微利臍下痛痊身漸凉脉漸勻尚不了了仍復與小柴胡湯次日又云我但胸中熱燥口鼻乾又少與調胃承氣湯不得利次日又云心下痛又與大陷胸丸半服利三行次日虚煩不樂時亦有所見時復狂言雖知其尚有燥屎以其極虚不敢攻之遂與竹葉湯去其煩熱其夜大便自通至曉兩次中有燥屎數枚而狂言虚煩盡解但咳嗽唾此肺虚也恐乘虚而成肺痿遂與小柴胡去人參大棗生姜加乾姜五味子湯一日咳減二日而病悉愈以上皆用張仲景方

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

熱入血室續法

【雲】婦人傷寒中風治法與男子無異惟熱入血室妊娠傷寒則不同也宜以四物安養胎血佐以汗下之藥治之

（預防熱入血室）

婦人傷寒中風自汗頭痛項背強發熱惡寒脉浮而緩恐熱入血室故倍加芍藥桂枝加芍藥湯

桂枝（一两半）　赤芍藥（三两半）　生姜（一两半）　大棗（六枚）

右剉細每服五錢水煎

婦人傷寒脈浮而緊頭痛身熱惡寒無汗發汗後恐熱人血室宜麻黃加生地黃湯

麻黃（二兩半）　桂枝（一兩半）　甘草（半兩）　生地黃（一兩）

杏仁（二十五箇去皮尖）

右㕮咀每服五錢水煎

寒多者柴胡乾姜

活婦人傷寒經脈方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼宜用乾姜柴胡湯

柴胡（四兩）　括蔞根　桂枝（一兩半）　牡礪（一兩）

乾姜　甘草（炙各一兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至七分去查溫服初服微煩再服汗出而愈

[illegible]

通小柴胡加地黃湯治婦人室女傷寒發熱經水適來

斷晝日明了夜則譫語如見鬼神亦治產後惡露方來[illegible]斷欲死

柴胡（一兩二錢半）　人參　黃芩　甘草（炙）

半夏（湯洗七次）　生地（各七錢）

右爲粗末生姜一片棗二枚同煎

不實滿者柴胡牡丹皮

雲婦人傷寒身熱脈長而弦屬陽明少陽往來寒熱夜躁晝寧如見鬼狀經水適斷熱入血室不實滿者小柴胡加牡丹皮主之大實滿者桃仁承氣主之

小柴胡加牡丹皮湯

柴胡（二兩）　黃芩（七錢半）　人參（二兩）　半夏（六錢）

大棗（三枚）　甘草　生姜（各七錢半）　牡丹皮（二兩）

右剉細每服一兩生姜同煎

實滿者桃仁承

桃仁承氣湯（方見畜血）

氣柴胡加硝黄

昏危者先化痰後除熱

婦人傷寒頭痛脈浮醫反下之邪氣乘虛而傳於裏經水閉而不行心下結硬口燥舌乾寒熱往來狂言如見鬼狀脈沉而数者當下之宜小柴胡加芒硝大黄湯主之

柴胡（二兩）　黄芩（七錢半）　半夏（製一兩五錢）　甘草（五錢半）

大黄　芒硝（各七錢）　大棗（三枚）　生姜（七錢半）

右剉每服一兩生姜同煎去查下芒硝再沸温服若脈不沉数即不可下

本辛亥中寓居毗陵斈官王仲礼其妹病傷寒發寒熱遇夜則如鬼物所憑六七日忽昏塞涎响如引鋸牙関緊急瞑目不知人疾勢極危召予視之予曰得病之初曾值月經來否其家曰月經方來病作而經遂止一二日發寒熱晝雖静夜則有鬼祟從昨日涎生不省人事予曰此熱入血室之證也仲景云婦人中風發熱悪寒經水適來晝則明了夜則譫語如見鬼狀發作有時此名熱入血室醫者不曉以剛劑與之遂致胸膈不利涎潮上脘喘急息高昏冒不知人事當先化其痰後除其熱予急以一呷散投之兩時頃涎下得睡省人事次授以小柴胡加地黄湯三服而熱除不汗而自解矣

自汗身凉經断者桂附紅花

表除汗解經多者甘芍地芎

雲婦人傷寒表虚自汗身涼四肢拘急脈沉而遲太陽標病少陽本病經水適断桂枝加附紅花湯

桂枝（二兩半）　芍藥　生姜（各一兩半）　甘草（一兩炙）

附子（炮）　紅花（各五錢）

右剉細各每服一兩水二盞煎服

婦人傷寒太陽標病汗解表除邪熱内攻熱入血室經水過多無滿實者甘草芍藥湯

甘草　芍藥　生地　川芎（各一兩）

右㕮咀每服一兩水三盞煎至一盞半去查入髮灰五錢調勻溫服不止者刺隱白

續增姙娠傷寒

大法以參芪四物為君汗下之藥佐之

潔黃芪解肌湯治婦人姙娠傷風自汗

人參　黃芪　當歸　川芎

甘草（炙五錢）　芍藥（六錢）　加蒼朮生地亦可

右為粗末每服五錢水煎溫服無時

海若姙娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脈浮而弱太陽經病宜表虛六合湯

四物湯（四兩）　桂枝　地骨皮（各七錢）

若姙娠傷寒頭痛身熱無汗脈緊太陽經病宜表實六合湯

四物湯（四兩）　麻黃　細辛（各半兩）

若姙娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼脈浮而熱頭痛者太陽標病也宜風濕六合湯

四物湯（四兩）　防風　蒼朮（製各七錢）

若姙娠傷寒下後過經不愈濕毒發斑如綿紋宜升麻六合湯

四物湯（四兩）　升麻　連翹（各七錢）

若姙娠傷寒胸脇滿痛而脈弦少陽症也宜柴胡六合湯

四物湯（四兩）　柴胡　黃芩（各七錢）

若姙娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脈沉數陽明太陽本病也急下之宜大黃六合湯

四物湯（四兩）　大黃（五錢）　桃仁（去皮尖十箇麩炒）

若姙娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜人參六合湯

四物湯（四兩）　人參（五錢）　五味子（五錢）

若姙娠傷寒後虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴六合湯

四物湯（四兩）　厚朴　枳實（麩炒各五錢）

若姙娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合湯

四物湯（四兩）　梔子　黄芩（各五錢）

若姙娠傷寒大渴蒸蒸而煩脈長而大者宜石膏六合湯

四物湯（四兩）　石膏　知母（各五錢）

若姙娠傷寒小便不利太陽本病宜茯苓六合湯

四物湯（四兩）　茯苓　澤瀉（各五錢）

若姙娠傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六合湯

四物湯（四兩）　琥珀　茯苓（各五錢）

若姙娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜膠艾六合湯

四物湯（四兩）　阿膠　艾（各五錢一方加甘草同上一方加甘草乾姜黄）

芪

若姙娠傷寒四肢拘急身凉微汗腹中痛脈沉而遲少陰病也宜附子六合湯

四物湯　附子　桂

若姙娠傷寒蓄血證不宜墮胎藥下之宜四物大黄湯下之

四物湯（四兩）　生地　大黄（酒浸各五錢）

婦人姙娠或蓄血抵當桃仁勿妄施要教子母俱無損大黄四物對服之

安胎方

丹施孺人傷風未解兩足下脛冷嗽多不吐痰頭眩蓋其性急又當臨月

黄芩（半錢）　陳皮　白术（各一錢）　蘇梗（三分）

木通　枳殻（炒各五分）　麻黄（三分）　甘草（炙二分）

桔梗　蒼术（半錢）　水煎服無時

雲婦人有孕傷寒脈浮頭重腹中切痛宜桂枝芍藥當歸湯

桂枝　芍藥　當歸（各一兩）

右剉細末服一兩水煎

婦人姙娠傷寒自利腹中痛食飲不下脈沉者太陰病也

宜芍藥湯

芍藥　白朮　甘草　茯苓（各一兩）

右如前修服

活 治姙娠傷寒安胎宜阿膠散

人參　白茯苓　阿膠（炒）　桑寄生

白朮（各等分）

右搗羅爲細末糯米飲調下二錢日三服

治姙娠傷寒安胎宜白朮散

白朮　黄芩（各等分新瓦上炒香）

右爲末每服三錢水一鍾生姜三片大棗一枚擘破同

煎至七分去滓溫服但覺頭疼發熱便可服二三服向

瘥惟四肢厥冷陰症見者尤可服

治姙娠傷寒憎寒發熱當發其汗宜葱白湯

葱白（十莖）　生姜（二兩切）

右剉水二盞煎至一盞連服取汗

海 葱白一物湯用葱白二把以水一升煮熟取汁令食盡

亦主安胎若胎死須臾卽出

治婦人傷寒姙娠服藥例　若發熱惡寒不離桂枝芍藥

若往來寒熱不離柴胡前胡　若大渴者不離知母石

膏五味子麥門冬　若大便泄者不離桂附乾姜白朮

若大便燥結者不離大黄黄芩　若月經適來適斷者不

離小柴胡　若胎不安者不離人參阿膠白朮黄芩　若

發汗者不離葱豉生姜麻黄旋覆　若頭痛者不離石膏

山梔前胡　若傷寒頭痛者不離柴胡甘草石膏　若滿

悶者不離枳實陳皮　若胎氣不安者不離黃芩麥門冬

人參　若斑發黑者不離黃芩梔子升麻

雜方

〔大〕治妊娠時氣身大熱令子不落護胎方

伏龍肝研令極細末調塗臍下三寸乾即易瘥即止

又方　井中泥塗乾即易之（二方出本事有效）

又方　浮萍　朴硝　蛤粉　藍根　大黃（微炒）

右爲末水調傅臍上安胎解熱極妙

治妊娠霍乱二方（附少陰吐利門）

治妊娠發斑變爲黑色宜梔子大青湯

黃芩　升麻　梔子仁（各二兩）　大青

杏仁（各一兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半細切葱白三寸煎至一盞

去滓溫服

產後傷寒

〔桑〕產後中風數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽旦證耳可與陽旦湯（即桂枝湯方見太陽病）

產後中風發熱面赤喘而頭痛竹葉湯主之

竹葉（一把）　葛根（三兩）　防風　桔梗

桂枝　人參　甘草（各一兩）　附子（炮一枚）

右㕮咀每服五錢棗一枚姜五片水一盞半煎一盞去查服溫覆使汗出若頭項強用大附子半錢煎藥揚去沫嘔者加生姜一錢

產後傷寒續法

（產後傷寒宜補虛）

〔丹〕產後發熱惡寒皆屬血氣虛左手脈不足補血右手脈不足補氣　惡寒發熱又腹痛當去惡血　惡寒發熱乳汁不通及膨者無子當消用麥芽二兩炒研細清湯作四

服調下　有子當下用木通々草猪蹄汁調煎服

（忌發表忌苦寒）產後纔見身熱不可發表并一切苦寒藥必用乾姜治之大發其熱輕則用茯苓淡滲其熱

（腹痛宜兼活血）【大】凡產後發熱頭痛身疼不可便作感冒治之此等多是血虛或敗血作梗宜以平和之劑與服必效如玉露散或四物加北柴胡等分煎服若便以小柴胡湯及竹葉石膏之類竟不救者多矣

（乳不通忌宜壓熱下乳）玉露散治產後乳脈不行身体壯熱疼痛頭目昏痛大便澁滯悉治之凉膈壓熱下乳

人參　茯苓　甘草各半　苦梗炒

川芎　白芷各一　當歸分一　芍藥二

右㕮咀每服五錢水一盞煎至七分溫服如煩熱甚大便秘者加大黃二錢半

續增小兒傷寒

【潔】傷寒表裏攻發　有表證惡風惡寒者當發表（海藏云惡風者白术散惡寒者神术湯）如氣盛能食不大便無表證者可攻裏

【春】主溫屬木身溫當發汗（海藏云神术湯）夏主長屬火身熱而煩躁合大發散（海藏云神术加黃芪湯）長夏主化屬土及居四季

【同】當調其飲食（海藏云四君子湯）秋主收屬金身凉內溫合微

【下】（海藏云通膈丸金花丸）冬主藏屬水身熱而惡寒是熱在外而寒在內身寒而惡熱是熱在內而寒在外（海藏云熱在內者調胃承氣湯寒在內者調中湯丸）

【潔】凡傷寒宜依四時陰陽升降逆順剛柔而施治法氣升浮則順發之氣收藏則下之　有汗發熱惡風脈浮緩者風傷衛桂枝湯　無汗發熱惡寒不當風而自憎寒脈浮緊者寒傷榮麻黃湯　有汗發熱惡風脈浮緊無汗發熱

惡寒脈浮緩謂之榮衛俱傷青龍桂枝麻黄各半湯　無汗發熱不惡風寒脈沉洪者可下之更詳認其厥與不厥量寒熱淺深而治之　有汗四肢厥脈沉微者名陰厥四逆湯　無汗四肢厥脈沉微者名陽厥大承氣湯加膩粉如四肢不厥身熱内外皆陽不動三焦宜涼藥三五服下之　黄芩甘草湯　黄芩白朮湯　黄芩蒼朮湯　黄芩梔子湯　連翹飲子　小柴胡湯　八正散　凉膈散　白虎湯　五黄散　此上中下三焦藥宜選用之　中暑脈虚皆惡寒自汗而渴者白虎湯身凉脈緊熱在内者急下之口燥咽乾不大便是也　無汗身大熱者可發汗升麻湯大青膏天麻膏　有汗身大熱者桂枝（湯見上七）散解肌湯小柴胡湯白朮防風湯可選用之　發汗（方見上四）時瘟暑燥濕風寒各宜春凉夏寒秋温冬熱而發之

錢傷風貪睡口中氣熱呵欠煩悶當發散與大青膏長解也（素古補遺云小兒外感於風寒拘急呵欠煩悶皮[illegible]口中氣熱者當發散秋冬用温熱藥春夏用凉寒藥）

大青膏

天麻（一錢）　白附子（生一錢半）　蝎尾（去毒生半錢）　硃砂（研一字七）

青黛（研一錢）　天竺黄（一字七研）　麝香（一字七）　烏稍蛇肉（酒浸）

（焙乾取末半兩）

右同研細生蜜和成膏每服半皂子或一皂子大月中兒粳米大同牛黄膏薄荷水化一處服之五歲已上同甘露散服

雄黄膏治傷風温壯熱引飲

雄黄（小棗大研薄荷根水并醋一大盞煮盡）　甘草末　川甜硝（各三錢）

寒水石（研細五秤七）　腦子（一字七）　硃砂（研五分）

右研勻煉蜜成膏薄荷湯化下半皂子大

右大青膏發散貪睡口氣熱呵欠煩悶表症者蓋爲三
歲已下小兒未能言者設也
治尋常風壅發熱鼻流痰嗽煩渴惺〻散主之（方見前）
治傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和者四君子加細辛
瓜蔞桔梗各一分生姜薄荷煎或加防風川芎各一分内
有熱及渴又大寒欲發散者則去瓜蔞加桔梗多虛汗夜啼
者加麥門冬　傷風身熱頭痛氣促者四君子加川芎防
風等分細辛羌活減半同煎
治咽喉不利痰實咳嗽鼠粘子湯
[illegible]人參羌活散治小兒寒邪及瘟氣時疫瘡疹頭痛体疼
壯熱多眠不語潮熱煩渴痰實咳嗽
羌活　獨活　柴胡　人參
芎藭　枳殼（炒）　甘草（炙各二分）　前胡
桔梗　天麻（酒浸炙）　地骨皮　白蒺藜（炒）
右爲散每服二錢水一盞入薄荷少許同煎去查溫服
不拘時候
七宝散治時氣頭昏體熱小兒同乳母服大人亦可
紫蘇葉　香附（炒各三分）　陳皮　甘草（炙）
桔梗　白芷　川芎（各一分）
右㕮咀姜棗煎服
[illegible]麻黃〻芩湯治小兒傷寒無汗頭痛身熱惡寒
麻黃　赤芍　黃芩（分半）　甘草
桂枝（各二錢半）
右爲粗末水煎服
升麻黃芩湯治傷風有汗頭疼發熱惡風
升麻　葛根　黃芩　芍藥（各五錢半）

甘草（一錢半）

右㕮咀每服二錢水煎溫服

右惺惺散等藥發散頭痛發熱惡風寒表證者蓋爲三歲已上小兒能言者設也能言故頭疼惡風寒可問而知也前五方通治有汗無汗惡風惡寒第五方治無汗惡寒第六方治有汗惡風

裏証

錢與大青膏不解散有下證當下大黃丸主之大熱飲水不止而善食者可微下餘不可下也（此裏症也潔古補遺云大熱飲水能食秘大便用大黃丸作散子与服之如清便自調者不可妄下恐外熱逐於內而變結胸危証多矣）

大小便秘能食飲水為裏証

大黃丸治風熱裏實口中氣熱大小便秘赤欲水不止有下證者宜服之

川芎（半兩）　黑牽牛（半兩半生半炒）　大黃（一兩酒蒸）

甘草（一炙半）

右爲細末稀糊和丸麻子大二歲每服十丸溫蜜水下乳後服以溏利爲度未利加丸數

海頭額痛身體發熱大便黃赤腹中有熱四順散連翹飲三黃丸主之（四順飲連翹飲三黃丸並見痓門）　身体潮熱頭目昏痛心神煩躁小便赤大便秘此熱劇也洗心散調胃承氣湯主之（洗心散見虛門）

大便白而酸臭為食積

頭額身體溫熱大便白而酸臭者胃中有食積雙聖丸主之（方見食癖門）

小便不利宜利小便

潔如身表無大熱而小便不利是有濕熱結膀胱仍用滲濕藥白朮茯苓之類利小便則其熱自退

雲小兒傷寒煩熱小便赤澁大便秘色面赤熱者導赤散

傷風兼藏

錢傷風兼藏兼心則驚悸兼肺則悶亂喘息哽氣長出氣嗽兼腎則畏明各隨補母藏虛見故也

兼脾則肢冷或利或脹或吐瀉

熱[illegible]則[illegible]驚搐

傷風手足冷脾藏怯也當先和脾後發散和脾益黃散發
散大青膏主之（此治陰癇有汗脈沉微者若陽癇无汗脈沉滑者不宜此法宜大承氣湯加膩粉）
傷風自利脾藏怯也當補脾後發散補脾益黃散發散
大青膏主之未差調中丸主之有下證大黃丸下之後服
温驚丸
傷風腹脹脾藏虛也當補脾必不喘後發散仍補脾也去
脹塌氣丸主之發散大青膏主之
傷風吐瀉（治兒吐瀉門治吐瀉用益黃散白术散發散用大青膏）
湯治夾驚傷寒熱極生風薄荷散
薄荷葉（半兩）　羌活　全蝎　麻黃（去節）
甘草（炒）　天竺黃　姜蠶　白附子（炮各一分）
右爲細末每服一錢水小半盞煎至三分加竹瀝少許

少

兼肺則喘嗽

兼腎則畏明渴分虛實

云小兒未傷寒則皮膚閉而爲熱盛即生風欲爲驚搐亂
氣未實不能勝邪故發搐也大小便依度口中氣熱當發
之宜大青膏
肺盛復有風冷則胸滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺後
發散風冷散肺瀉白散〻風大青膏主之若止傷寒則不
胸滿
腎虛則畏明宜補腎地黃丸（有表者間用大青膏發散之）
傷風下後虛熱以藥下之太過胃中虛熱飲水無力當生
胃中津液多服白术散　小兒結熱於內口乾而渴身黃
體重者宜白术散
湯傷寒發渴宜白虎湯
緊大熱飲水能食不大便用大黃丸作散服之
右三方白术散治虛渴爲下後而食少胃虛者設也白

虎湯六黄丸治實渴爲未經下而能食不大便者設也

嗽分虛實

〔潔〕傷寒咳嗽吐清水哽氣長出氣是肺之不足也合用阿膠散面白如枯骨者死不治　身熱咳嗽吐痰者當用褊銀丸（方見咳嗽門）

右二方治咳嗽阿膠散治虛嗽爲哽氣長出氣者設也褊銀丸治實嗽爲痰盛喘滿者設也若有表証惡風寒而嗽者當用惺惺散加減四君子湯鼠粘子湯之類是也

厥分陰陽

陰厥陽厥（見大法條）

吐分表裏

〔潔〕身大熱吐逆不止者茯苓半夏湯（即小半夏加茯苓湯方見嘔門）

〔湯〕傷寒嘔者枳殼半夏湯

枳殼　半夏（各半兩）

右水一碗姜十片煎至小半碗十歲已下作五服

藿香正氣散治傷寒發嘔

藿香葉　厚朴（製）　半夏（製）　甘草（炙）

陳皮　蒼术（米泔浸焙各等分）

右㕮咀每服二錢水半盞姜三片枣二枚煎至二分去查溫服

〔潔〕大吐者當下之白餅子珍珠丸消積丸（三方俱見癖門）　潮熱有時脘滿短氣嘔吐者桃枝丸（方見小兒積熱門）

右七方治傷寒嘔吐前二方治痰飲而吐中一方治有表而吐後四方治有裏而吐其桃枝丸治裏熱而吐餘二方治表寒而吐也

自汗爲虛

〔湯〕傷寒自汗當補虛和陰陽小建中湯減桂加黄芪人參地黄

黄芪（一兩）　白芍（三分）　甘草　人參

熟地路各半

右㕮咀每二錢水半盞煎至三分去查服

診

小兒傷寒形症　頭痛　體痛　鼻塞或流涕　喉內喘
息　兩手脈洪数　頰赤眼澁　身上寒毛起　口鼻出
水　眼赤黄　口乾澁　咳嗽　山根青色　噴嚏

【活】頭目疼痛而畏人惡寒者此傷寒證也

【雲】設令小兒卒暴身壯熱惡寒四肢冷或耳尻冷鼻氣熱為班疹也與傷寒表証相似此胎氣始發自內之外若與傷寒表證同治者悞也當作班疹治之

濕病（濕病者春月之濕病而不熱也）

溫

【回】春日溫病　未滿三日先用惺惺散二服後四五日不解煩渴嘔用白朮散如自汗口燥用製蒼白虎湯至六七日大便燥結用四順飲子下心腹大實大滿牛黄通膈丸下

初覺之時疑是瘡疹只用葛根升麻湯解肌

傷寒拾遺　和解因時法　溫中法

灰包熨法

祇和改用仲景法因時世

治中風自汗用桂枝湯治傷寒無汗用麻黄湯此仲景表散之法百世不易者也若元氣暴虧者以參芪與桂枝麻黄等藥表散此丹溪補仲景之法亦百世不易者也至於韓祇和戒桂枝而以中風傷寒通作一法治之者此當時之權變非百世之常行也王海藏云仲景用桂枝當漢之末也韓祇和戒桂枝當宋之隆也時世之異不可不知今編祇和之法於篇末以廣後學之見云

韓氏和解因時法

寸脈定發表隨氣候立方

傷寒病有可汗者論中但統言其可汗症及可汗脈或云脈浮而數或云脈浮緊或云脈浮無汗而喘或云脈浮為

在表今畧舉數條後人但憑其脈之大槩並不分脈浮有陰陽虗盛之理又不知有可汗不可汗之症誤投發表藥則多变成陽毒之患矣今舉病人有汗惡風無汗惡寒分二等及據立春已後立秋已前氣候輕重各立方治之庶學者易爲開悟耳

（寸関力齐等未可發表）

病人二三月已前兩手脈浮数或緩或緊按之差軟寸開尺若力齊等其力不甚大不甚小者亦未可便投解表藥此是見裏證未見表脈也宜候寸脈力小如開尺即可投解表藥大抵治傷寒病見證不見脈未可投藥見脈未見證雖少投藥亦無害也凡治雜病以症爲先脈爲後治傷寒病以脈爲先證爲後

（見傷寒脈未見傷寒症）

病人兩手脈浮數而緊名曰傷寒若関前寸脈力小開後（[illegible]）尺脈力大雖不惡風不自汗出此乃陰氣已盛先見於脈证若不投藥和之後必惡風及自汗出若立春已後至清明已前宜調脈湯主之清明已後至芒種已前宜葛根柴胡湯主之芒種已後至立秋已前宜人參桔梗湯主之

調脈湯

葛根（一兩）　防風　前胡（去苗三分）　甘草（炙半兩）

右爲粗末每服二錢水一盞生姜一塊如小指大劈破煎至七分去查温服如寸脈依前力小加棗三箇同煎

葛根柴胡湯

桔梗　甘草（炙各三分）　葛根（一兩半）　柴胡（去芦一兩）　芍藥

右㕮咀每服二錢水一盞生姜三片煎至七分去查热服如寸脈依前力小加葱白三寸同煎服

人參桔梗湯

石膏（三兩）　甘草（炙三分）　人參　桔梗（各三分）　麻黄（去節一兩）

右每服二錢水一盞荆芥五穗煎至七分去查熱服如

寸脈依前力小加麻黃二分去節同煎服

見中風脈未見中風症亦宜和

病人兩手脈浮數而緩名曰中風若寸脈力小尺脈力大雖不惡風不自汗此乃陰氣已盛先見於脈若不投藥和之後必惡風自汗出若立春已後清明已前宜薄荷湯主之清明已後芒種已前宜防風湯主之芒種已後至立秋已前宜香芎湯主之

薄荷湯

薄荷（一兩）　葛根（半兩）　人參（二分）

甘草（炙半兩）　防風（去芦十兩）

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去查熱服如三五服寸脈力尚小加薄荷二分同煎

防風湯

防風（去芦一兩）　桔梗（三錢）　甘草（半兩炙）

旋覆花（半兩）　厚朴（三分）

右㕮咀每服三錢水二盞姜一塊同煎熱服如三五服寸脈力尚小加荆芥五七穗同煎

香芎湯

甘草（炙半兩）　川芎（一分）　石膏（二兩）　升麻（三兩）

厚朴（製半兩）

右㕮咀每服二錢水二盞煎七分溫服如三五服後寸脈力尚小加細辛二分同煎

前二段文將中風傷寒各立湯者何蓋謂病人始得病三日已前或因中風脈緩或因傷寒脈緊然脈雖先見而症猶未見尚可以藥解之故立方耳

寸小於尺宜消陰助陽表藥

病人兩手脈浮數或緊緩寸脈短反力小於關尺脈者此名陰盛陽虛也若自汗出惡風是邪氣在表陰氣有餘也素問云陰氣有餘爲多汗身寒即可投消陰助陽表劑以治之若立春已後清明已前宜六物麻黃湯主之清明已

後芒種已前宜七物柴胡湯主之芒種已後立秋已前宜發表湯主之

六物麻黄湯

麻黄（去節一兩）　葛根（七錢半）　人參（五錢）
甘草（炙五錢）　蒼朮（七錢半）

右㕮咀每服三錢水一盞棗三枚煎七分熱服如三五服後汗未止惡風者加荊芥三分三五服後不惡風猶汗者加丁香皮半兩（一方又加荊芥七錢）

七物柴胡湯

柴胡（二兩）　蒼朮　荊芥
麻黄（各一兩）　甘草（炙七錢）

右㕮咀每服三錢水一盞姜一塊棗三枚同煎七分熱服如三五服後汗未止惡風者入葱白三寸如三五服後汗未止者加當歸一兩同煎

發表湯

麻黄（去節一兩）　蒼朮（二兩）　人參
當歸（各半兩）　甘草（炙三分）　丁香皮（三分）

右㕮咀每服三錢水一盞入姜一塊棗三枚同煎至七分去查熱服如三五服汗未止猶惡風者加桂枝三分如汗未止更加細辛半兩以汗止爲度

寸大於尺宜消陽助陰表藥

病人脉浮數或緊或緩其脉上出魚際寸脉大於關尺者此名陽盛陰虛也若發胃悶口燥咽乾者乃是邪氣在表陽氣獨有餘也素問曰陽氣有餘爲身熱無汗是也可投消陽助陰藥以解表若立春已後至清明已前宜人參湯主之清明已後至芒種已前宜前胡湯主之芒種已後至立秋已前宜石膏湯主之

人參湯

人參（半兩）　芍藥（三分）　石膏（一兩）
柴胡　甘草（炙三分）

右㕮咀每服三錢水一盞姜一塊煎七分熱服如三五

後熱不解者入豉三十粒同煎服

前胡湯方缺宜尋祇和方補之（傷寒便覽有前胡湯方用石膏一兩前胡半兩竹茹黃芩知母山梔大青各三錢姜葱煎服疑即是此）

石膏湯

石膏（三兩）　芍藥（一兩）　升麻（三分）

黃芩（三分）　柴胡（一兩）　甘草（炙三分）

右㕮咀每服三錢水一盞半豆一合煎八分熱服如三五服後熱未解者加知母一兩又未解加大黃一兩

（尺寸俱有力宜平之）

病人兩手脈浮數或緊或緩三部俱有力無汗惡風者此是陰陽氣俱有餘素問曰陰陽有餘則無汗而寒是也可用藥平之若立春已後至清明已前宜解肌湯主之清明已後至芒種已前宜芍藥湯主之芒種已後至立秋已前宜知母湯主之

解肌湯

石膏（三兩）　麻黃（三分去節）　甘草（炙）

升麻（各半兩）

右㕮咀每服三錢水一盞入豉半合煎至八分去查熱服如三五服後猶惡風者加麻黃半兩石膏一兩

芍藥湯

甘草（炙半兩）　芍藥（一兩）　石膏（三兩）　荊芥穗（一兩）

右㕮咀每服三錢水一盞生姜一塊煎至七分去查熱服如三五服後猶惡風者每服加生姜一塊同煎服

知母湯

知母　石膏　麻黃

升麻（各一兩）　甘草（炙半兩）

右㕮咀每服三錢水一盞入生姜一塊同煎至七分去查溫服如三五服後猶惡風者加麻黃半兩升麻半兩

前三段文將中風傷寒一法治者因病人始得病後脈症俱見若投解劑必不能愈故立前方同法治之

（中風傷寒作一法治）

仲景云傷寒爲病脈緩者名中風脈緊者名傷寒今分此二端何也始因冬寒毒之氣中人其內伏之陽沉潛于骨髓之內每至春夏發時或因外傷寒而引內邪出或因外傷風而引內邪出及乎內邪既出而爲病一也古人云立此二端恐後人疑其緊脈與緩脈治別也若中風與傷寒脈異何故仲景無別法治之此乃後人不究仲景之心也病人始得病一二日至五六日尚有表脈及表症亦可依脈症投藥凡投解表及發表藥每一日可飲三服病症甚可至五服外不可頓服藥也如症未解次日依前再投如症依前未解可作熱粥投之粥內加葱白亦可如有汗出勿厚衣蓋覆恐汗出太過作亡陽症也

診

海藏云韓氏微旨可汗一篇有和解因時法言傷寒之脈頭小尾大傷風之脈頭大尾小李思訓保命新書亦分尺寸與仲景同之非若前人總言尺寸脈俱浮而緊尺寸脈俱浮而緩緊則爲傷寒無汗緩則爲傷風自汗又有傷寒有汗者傷風無汗者脈亦互差與症不同前人已盡之矣惟韓李所言頭小尾大即爲傷寒尾小頭大即爲傷風人病間有脈症未顯于尺寸者故韓李述爲和解因時法也又恐後人疑其不與前聖合遂於本方內又立加減法數條亦不越前人之意何其當哉蓋二公者當宋全盛之時故又戒麻黃桂枝不可輕用改用石膏升麻葛根柴胡之平劑當時則可非百代常行之道時世遷移之法也可汗一篇若隨湯液隨症應見自有定規雖明哲不可踰也

又寸口脈小飲冷與霧露所傷同作中焦治今韓李云傷寒寸小者勿認與飲冷霧露同傷一體也飲冷霧露所傷寸口舉按全無是陰氣在胃不和陽氣不能升越也傷寒

寸口小者只於關部下至膀胱本部見之寸口雖小只是舉之微小沉得之有也非若飲冷舉按全無也若果寸口舉按全無卽不可解表只宜温中不可不知

韓氏温中法

陰証

夫傷寒之説始自黃帝以開其端至於仲景方陳其條目自後膚淺之學莫知其數立言者只云病在表可發汗病在裏可下或云不可汗不可下未嘗有温中之説仲景傷寒例云尺寸俱沉細太陰受病也尺寸俱沉少陰受病也尺寸俱微緩厥陰受病也又辨太陰證云太陰病脈浮可發汗宜桂枝湯又手足温自利不渴者宜四逆湯又腹滿時痛桂枝加芍藥湯辨少陰證云少陰病始得之發熱脈沉者麻黃附子細辛湯又少陰病二三日麻黃附子甘草湯又少陰病手足寒身体痛骨節疼脈沉者附子湯又厥陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯又少陰病脈沉急温之宜四逆湯今舉仲景論中數條最是三陰病之良法于今世用之尚有未盡證者愚常校之自至和初歲迄於今三十餘年不以歲之太過不及爲則每至夏至已前有病傷寒人十中七八兩手脈俱沉細數多是胸膈滿悶或嘔逆或氣塞或腸鳴或腹痛與仲景三陰病説理同而證不同因茲不敢妄投仲景三陰藥方纔見脈沉及胸膈滿便投下藥下之往往不救常斟酌仲景理中丸與服之其病勢輕者胸中便快其病勢重者半日許滿悶依然或有病人脈沉細遲投仲景四逆湯温之多藥力大熱後必發煩躁因校量此形證今別立方以治之藥多对證不可不傳焉

病人但兩手脈沉細數或有力或無力或關脈短及力小

胸膈塞滿氣短不能相接者便可隨脈證投溫中藥以治之　病人兩手脈沉遲或緊皆是胃中寒也若寸脈短及力小於關尺者此陰盛陽虛也或胸膈滿悶腹中脹滿身體拘急手足逆冷急宜溫之　若立春巳後至清明巳前宜溫中湯主之清明巳後芒種巳前宜陳皮湯主之芒種巳後至立秋以前宜七物理中丸主之

溫中湯

陳皮　丁皮（一兩）　乾姜（炮）　白术
丁香（各二錢）　厚朴（制一兩）

右爲細末每服二錢水一盞葱白三寸荊芥五穗煎至七分去查熱服如未快手足尚逆嘔吐者加丁香乾姜各二錢

陳皮湯

陳皮（一兩）　藿香（三錢）　白术
桔梗（各二炙）　厚朴（製一兩）

右爲末每服二錢水一盞姜一塊同煎至七分去查（溫服）服如三服未快手足尚逆嘔吐不定者加半夏丁香桂枝各半兩每服加葱白三寸煎服

七物理中丸

白术（五錢）　乾姜（二錢半）　人參（七錢半）　桔梗（七錢炙）
乾葛（七錢半）　藿香葉（五錢炙）　甘草（二錢炙）

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸水一盞煎八分和查熱服如三服未快手足尚逆嘔者加半夏生姜各半兩

病人兩手脈沉細無力雖三部脈力停等亦是陰氣盛也更不須候寸脈短治之或胷膈滿悶身体拘急疼痛手足逆冷速宜溫中藥和之　若立春巳後至清明巳前宜厚朴丸主之清明巳後至芒種巳前宜白术湯主之芒種巳

後至立秋已前宜橘皮湯主之

厚朴丸

當歸（半兩） 丁皮（半兩） 厚朴（一兩製）

細辛（二錢半） 人參（七錢半） 甘草（半兩炙） 乾姜（半兩炮）

右爲末煉蜜爲丸彈子大每服一丸煎至六分和查熱

服三服後脉尚細及寸脉尚細無力者每服加葱白三

寸同煎服

白朮湯

白朮 半夏 當歸

厚朴（製） 乾姜（炮各半兩） 丁香（七錢）

右爲末每服三錢水一盞姜一大片煎至七分去查熱

服三五服後脉未有力寸脉尚小者加細辛半兩每服

加葱白三寸同煎服

橘皮湯

橘皮（半兩） 藿香 葛根（各三錢）

半夏 厚朴（製各半兩）

右爲末每服三錢水一盞生姜如棗大同煎至七分去

查熱服三五服後脉尚小手足逆冷者加細辛半兩

病人胸膈滿悶時時嘔逆肢節痛兩脇下痛腹中鳴此是

停飲宜二苓湯

赤茯苓 木猪苓 白朮（各半兩） 滑石（一兩）

通草 白豆蔻（各二錢半） 丁香皮（七錢半） 陳皮（半兩）

桂枝（五錢）

右爲末每服三錢水一盞煎至七分去查熱服小便未

快加瞿麥七錢半嘔未止加半夏半兩渐渐惡寒甚每

服加葱白三寸

灰包熨法

病人服前藥胸膈不滿悶者此上焦有陽也或藥力太過

上焦有熱腹滿虛鳴時時疼痛此是被陽藥消遂得上焦

陰氣并入下焦也雖是下焦積寒冷奈上焦陽盛更難用溫下焦藥也當用灰包熨之其法用稻草灰或桑柴灰二三升許入好醋拌和乾濕得所銚內炒令灰熱以帛包裹置臍下熨之頻先炒灰包常更換令常熱以腹不滿痛爲度初熨時病人不受者勿聽但令亟熨之不住可也如灰包熨後得下利三兩行或小便二三升或微似有汗此是陰氣外出或下泄也勿疑之病輕者乃得愈後出餘氣而解病人三部脈沉寸脈小於關尺此爲陰盛當用溫中藥以消陰氣宜厚朴丸

厚朴丸

人參　白朮　厚朴　陳皮

藿香　當歸　細辛

本湯亦同治陰躁而渴不可誤用涼藥若大熱藥冷服有伏陽則可若脈已遲按之全無力或病人素無憂只可溫服