

醫方類聚卷之二百五十二

小兒門 十四

諸痢 三

醫林方

妙應丸治小兒水痢不止

巴豆壹个 丁香七

右為細末燒糯米餅為丸如針頭大一歲

小兒每服一丸新水送下

珍珠丸治小兒瀉後脾虛吐食不止



枯白礬 寒水石 燒過成粉等

水打麵糊為丸如黃米大每服二十九毛香湯溫下

烟霞聖效方

海上方治痢右棗裏胡粉煨之為末以熱瘦肉搵之與喫効

施圓端效方

定粉散治小兒瀉痢腸滑日久

瓦粉壹兩 蜜陸僧 四錢 烏魚骨壹錢

右同研為細末勿服半錢至壹錢米飲調

下江米陸僧 劉固木煎取 金煎取

小兒瀉痢

鶴頂丹 換腸丸 方並見小兒科諸府門 豆蔻香連

九香連丸 方並見小兒科諸府門

以上良方皆躬親日用的効者

吳氏集驗方 圓黍米大三粒良藥連三十圓

木鱉子圓治小兒久痢腸滑脫肛

沉香二錢 松殼半兩 五靈脂半兩 木鱉子

半兩  
去殼

右前三味爲細末次入木鱉子同研細醋  
煮麵糊爲圓黍米大三歲兒每服三十圓  
醋調茶清下

新效方

治脫肛脫囊

木香 甘草 黃連 當歸 黃芩

右五味等分咬咀水煎服金匱鉤  
玄同

玉機微義

治瀉痢之劑

錢氏白朮散

藿香葉 白朮 木香 白茯苓 甘草

人參各一錢 乾葛二錢

右爲末每壹錢至二錢水煎服

異功散四君子湯加陳皮一方只用參朮甘

草三味名溫中丸水煎服

按此三方補脾湯加減法也

益黃散

黃芩

白朮

甘草

丁香

...

陳皮壹兩 青皮 阿子肉 甘草各半兩 丁香

錢二

右為細末每二錢水煎服

沒石子丸

方見小兒藥證直訣

按此二方兼止瀉藥也

五苓散治瀉而渴

方見太方科諸濕門

羌活膏治小兒洩瀉發搐

方見驚癇

溫白丸

方見小兒藥證直訣

迴生散治小兒吐瀉

大南星

八九錢已上者

右用地坑子一箇深三寸燒赤入好酒半

盞下南星却用炭火三兩條蓋候南星微

裂取出剉再炒放冷為細末每半錢或一

字濃煎生薑防風湯調下

按此二方升肺脾之氣藥也

金液丹治吐利日久脾胃虛損手足厥逆精

神昏睡夕露睛口鼻氣冷欲成慢驚或身

冷脉微自汗小便不禁船上硫黃十兩去

砂石爲末砂合子盛八分滿水和赤石脂封縫塩泥固濟晒干再入水確內泥固濟火煨過候冷右於乳鉢內研爲細末水浸蒸餅九桐子大或如菜豆大每五十九至百丸米飲下

按此厥陰例藥也

玉露散治傷熱吐瀉黃色

寒水石

石膏

堅白者各半兩

生甘草

壹分

右同爲細末每服半錢或壹錢温湯調下

按此陽明例藥也

豆蔻香連丸

二聖丸

方並見小兒藥證直訣

按此解毒湯變法也與前方不同宜選用

羌活黃芩蒼朮甘草湯治壯熱體重而瀉方見

諸熱茯苓半夏湯治風瀉而嘔方見大方

東垣升陽益胃湯方見大方湯氏助胃膏方見

和劑局方

按此出太陽例冬月時令中藥

局方水浸丹治伏暑傷冷冷熱不調霍亂吐利煩渴

巴豆大者二十五个去皮研細去油盡黃丹壹兩炒

右研勻用黃蠟鎔汁為丸如梧子大每壹丸以水浸少頃別以新水吞之量大小與服

按此足陽明藥也

小香連丸方見小兒藥證直訣胃風湯方見大外科諸痢門

全嬰方訶梅散治小兒純下血痢腹痛

訶子半兩燒去核梔子仁壹錢半

右為末三歲半錢米湯調下食前

按此治熱之劑也

桃花丸方見永類鈐方

按此治寒之劑也

瀉腸丸治小兒下痢赤白後重頻併

龍骨海螵蛸訶子煨去核

右為末糊丸如小豆大三十九丸米湯下

按此止瀉之劑也

東垣厚腸丸治小兒乳食不能剋化或生腹脹瘦弱痢瀉無常色

橘皮二分大麥麩半錢半夏三分枳實半錢蒼朮三分

青皮二分人參三分厚朴二分麩末半錢

右為細末煮糊為丸如麻子大每二十九溫水下食前

按此足陽明太陰藥也

按已上諸方姑備其例宜兼看瀉痢二門而分治之

壽域神方

治洲瀉不止用肉豆蔻壹箇剉入乳香少

許麩裏煨熟去麩研為末作壹服陳米飲

調下或單用豆蔻煨紙裏去油為末和麩

作楮柑服之亦妙

衛生易簡方

治小兒瀉痢及脫肛用槐花為末每服壹錢

陳米湯調下

治小兒宿滯不化胸腹痞滿泄瀉如痢用杏

仁五十箇去皮尖別研赤石脂末牽牛末  
代赭石火煨醋淬研末各壹兩湯浸蒸餅  
丸如黍米大每服五七丸乳汁或米飲下  
治下痢赤白川黃連壹兩以吳茱萸炒去茱  
萸不用肉豆蔻二箇木香壹分爲末麩糊  
丸如粟米大赤痢粟米飲下白痢厚朴湯  
下  
治小兒疳痢久不差用赤石脂川芎等分爲  
末每服半錢米飲調下

又方用赤石脂爲末每服半錢陳米飲調下  
治小兒疳痢肚脹用鷄子壹箇剝眼入膩粉  
二錢以紙包十重於飯甑上蒸三次放冷  
取肉入麝少許研細糊丸如米粒大食後  
夜卧温湯下五七丸  
治小兒及大人赤白痢用新檟皮壹斤去粗  
黑細切以水一斗煎五升去滓更熬如膏  
和酒服立差  
治小兒血痢用生馬齒莧絞汁壹合和蜜一

匙空心呷服

治肛帶出用胡荽切壹升燒煙薰肛即入備

百要方同胡荽久食令人多忘發痼疾腋臭脚

氣氣治小兒下痢膿血小便澁兼水氣腹腫用葶

藶半兩微炒搗爛以棗肉和丸如棗豆大

每服五丸棗湯下空心晚下仍量兒大小

加減服之

治小兒冷熱不調下痢赤白裏急後重川黃

連二兩以吳茱萸壹兩同炒令赤去茱萸

不用木香四錢為末醋糊丸如粟米大每

服二十丸空心米飲下

金匱鈎玄

脫肛東北方陳壁土湯泡先薰後洗上

痢

黃連煎黃朴赤大黃甘草

右用水煎服赤加紅花桃仁白加滑石

食積痢

黃連煎黃朴赤大黃甘草

右用水煎服赤加紅花桃仁白加滑石

食積痢

炒麴 蒼朮 滑石 芍藥 黃芩 白

朮 甘草 陳皮 茯苓 白朮 白

右水煎下保和丸

備預百要方

小兒赤白痢方蜂房菜末酒服

小兒疳痢腹痛不止

胡黃連兩半沒藥壹分木香壹分

搗為末以糯米飯作丸如菜豆大粥下五

丸廿三

小兒熱痢

蒲根壹兩粟米壹合

水一大盞同煎米熟取汁溫服

諸痢食治

食醫心鑑

治小兒下痢不止瘦妳鷄子粥方右以鷄子

壹枚米聖惠方壹合煮米作粥臨熟破雞

子相和熟食之聖惠方空腹入少醋食之

治小兒下痢日夜數十度漸困無力黍米粥

方

黍米壹分 鷄子壹枚 蠟壹分

右煮黍米粥臨熟下鷄子及蠟攪勻令熟

聖惠方 食之

聖惠方

食治小兒諸方

治小兒血痢不差馬齒菜汁粥方

馬齒菜汁壹合 蜜半合 粟米壹合

右以水壹大盞煮作粥後入二味和調令

前服之

是齋醫方

治小兒泄瀉不止得効方治休息痢及右用

雞子一箇打破入銚子內同黃蠟壹塊小

指頭大炒熟如常啖之得効方空心食之

經驗良方 卽止頂文學從龍在臨安見鄉

人潘省幹之子服之其子方三歲

經驗良方

張子和治小兒暑月泄瀉無度以雞子五枚

同菜豆煮熟令豆軟下陳倉米作稀粥攪  
令粥溫食就以鷄子壓之喫一二頓病減  
而安

壽親養老書

猪子肝治小兒久痢

猪子肝壹  
具

右切作片炙熟空心食之

雞子餅治小兒秋夏中暴冷忽下痢腹脹乍  
寒乍熱渴甚

雞子

二枚  
去殼

胡粉

半兩炒  
令黃

黃蠟

一棗  
大

右先下黃蠟於銚子內微火上鎔次下雞  
子黃及胡粉調和候冷作餅與兒空心午  
後食之量兒大小增減

衛生易簡方

治小兒久痢不效用沒石子二箇切熬令黃  
研細和麵作餛飩食之沒石子能烏髭髮  
和氣安神生精益血

備預百要方

小兒秋痢柿子若干研之煮粥欲熟時下柿  
更三五沸令兒飽食

小兒冷痢椒子焙乾末乾薑末等分以醋和  
麵作小饊餛二七枚以水煮熟停冷空心  
粥下日壹度

禁忌

雜記九門

當禁不禁

一宦家小兒病痢自堰頭車載至朱葛寺入

門而死戴人曰有病遠行不可車載馬馱  
病已擾矣又以車馬動搖之是為重擾甚  
則死

脫肛鍼灸

拔粹方

小兒脫肛者灸臍中三壯

小兒脫肛久不差及風癩中風角弓反張多  
哭言語不擇發無時節盛即吐沫灸百會  
一穴七壯炷如小麥大

諸痔

聖惠方

目錄

治小兒痔疾諸方

龜甲散 桑木耳散 楸藤子散 龜甲

丸 槐鵝散 蝟皮散 鷄冠花散

黃耆散 木賊丸 穿山甲散 樺樹菌

子丸 屨藥 槐子丸

餘藥無名者散見本方

針鑿瘻子漆瘻及木疔

干武 煨藥 罌下武

黃漆瘻 木刺瘻 夜山甲瘻 棘刺瘻

武 罌餅瘻 微火瘻 酸水芥瘻

通甲瘻 桑木口瘻 益蘇子瘻 離甲

治小兒痔瘡諸方

日凝

諸痔

聖惠方

治小兒痔疾諸方

夫痔者有牡痔服痔巢氏病源牡痔腸痔血痔

酒痔皆因勞傷過度損動血氣所生小兒未

有虛損而患痔者止是大便有血出腸內有

結熱故也

治小兒痔疾肛邊生結核疼痛寒熱鼈甲散

方

盤甲一兩金箔炙 蝟皮壹兩炙 蛇蛻皮叁分

燒露蜂房半兩 猪懸蹄甲七枚炙 檳榔三分

麝香壹分

右件藥搗細羅為散入麝香都研令勻每服食前以粥飲調下半錢量兒大小加減服之

治小兒痔疾久不差肛邊痒痛桑木耳散方

桑木耳微炒 槐耳微炙 當歸剉微炒 羌活半兩

巴上各壹兩 枳殼壹兩 黃去壹兩

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半

錢日三四服量兒大小加減服之

治小兒痔疾下血無時槥藤子散方

槥藤子壹枚去殼微炙 皂莢子壹百枚與槥藤子

牛角鯁灰壹兩 醋石榴皮灰兩半

右件藥搗細羅為散每服以温酒調下半

錢日三四服量兒大小加減服之

治小兒痔疾結硬焮痛不止龜甲丸方

龜甲二兩塗醋 蛇蛻皮壹兩 露蜂房半兩

麝香

青分細研

猪後懸蹄甲

一兩炙微焦

右件藥搗細羅為散入麝香都研令勻每服以温酒調下半錢日三服量兒大小加減服之

治小兒痔疾下血不止熱毒氣流注發歇疼

痛槐鵝散方

槐鵝

側柏

炙微黃

荆芥穗

椶櫚

燒灰黃牛

角鰓

燒

膝牛

去苗已上各半兩

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半

錢日三四服量兒大小加減服之

治小兒痔疾下血大腸疼痛蝟皮散方

蝟皮

炙令黃

枳殼

去殼黃去瓢

木賊

當歸

剉微炒

槐鵝

炙微黃

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半

錢日三四服量兒大小加減服之

治小兒痔疾下血不止雞冠花散方

雞冠花

香兩

椶櫚

二兩

羌活

壹兩

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半

錢日三四服量兒大小加減服之

治小兒痔疾下血不止黃耆散方

黃耆剉枳殼煨炒側柏葉各壹兩

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下

錢日三四服量兒大小加減服之

治小兒痔疾下血發歇不定方

荆芥薄荷枳殼麩炒微黃去

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下

錢日三四服量兒大小

治小兒痔疾痛不可忍木賊丸方

木賊壹兩楸藤子二枚去殼烏賊魚骨二兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如棗豆大不

計時候以溫酒下五丸看兒大小以意加

減

治小兒痔疾疼痛腫硬不消宜用坐藥方

蛇床子半兩荆芥半兩蝸牛三七枚

右件藥爛研塗在紙上每塗時先用白礬

熱水洗痔頭子後用被褥止安藥紙坐三

兩上差

治小兒痔生肛邊如鼠乳及成瘡痛楚至甚  
宜服穿山甲散方

穿山甲

二兩炙

麝香

半分  
細研

右件藥搗研令勻細每於食前煎黃耆湯  
調下半錢量兒大小加減服之

治小兒痔下血不止肛邊生鼠乳疼痛櫟樹  
菌子丸方

櫟樹菌子

一兩

蝦蟆

壹枚炙

胡荽子

一合黃牛

角鯢

壹兩炙黃

鰻魚頭

壹枚炙

右件藥搗羅為末以水煎白膠香和丸如  
彈子大用瓶內如裝香法燒一九薰下部

差

治小兒痔疾下部痒悶熨藥方

枳實

二兩炒微黃

鬼箭羽

木香

鬼白

已上  
各壹兩

右件藥搗籠羅為散以頭醋和勻炒令熱  
用青布裏熨日二用之

治小兒痔疾鼠乳生肛邊煩熱疼痛槐子丸方

槐子壹兩 黃芩兩 榼藤子二枚去殼

右件藥搗羅爲末以水浸蒸餅和丸如棗豆大每服以桑耳湯下五九日三四服量兒大小加減服之

治小兒腸痔下血不止方

榼藤子三枚

右以七八重濕紙裏煨良久脹起取出殼

用肉細切碾羅爲散每服以黃耆湯調下半錢量兒大小加減服之

又方牛角鯁二兩炙

右搗細羅爲散每於食前以溫酒調下半錢量兒大小加減服之

又方蝟皮壹枚

右剉於瓶內燒煙熏痔上差

卷之三  
目錄

治小兒陰癩諸方

五等圓

千金方

癩疔 附陰腫

聖惠方

治小兒陰癩諸方

薏苡人散 魁蛤散 白蒺藜散 木香散 桃人丸 桂心散

治小兒偏癩諸方

昆布丸 防葵丸 藜香子丸

目錄

癩疔

五等圓

聖惠方

治小兒陰癩諸方

薏苡人散 魁蛤散 白蒺藜散 木香散

散 桃人丸 桂心散

治小兒偏癩諸方

昆布丸 防葵丸 藜香子丸

治小兒陰腫諸方

桃人丸 甘遂丸 牡丹丸 大黃散

牛蒡膏

小兒藥證直訣

地龍散

是齋醫方

直指小兒方

陰腫證治

桃仁圓 傅藥 母蠣散

癩疔證治

五苓散 當歸散 川練散

朱氏集驗方

疔疔

茵香散 桃仁湯 正氣散 立甦散

香附圓

十形三療

水腫畢丸

保童祕要

御藥院方

朱砂丸

得效方

疝氣

金鈴散

紅圓子

小檳榔圓立五苓散

陰腫

三白散

蟬退散

地龍膏

澹軒方

風熱陰腫

虫風吹陰腫

肘後方

聖濟總錄

小兒癩疝

狐陰丸

芍藥丸

牡丹丸

韭子丸

正氣散

蓖麻丸

木通散

滑石丸

漆燕散

三應散

拔粹方

當醫方大成

三好方

當歸散 海蛤散 三稜散

經驗良方

醫林方

郁李仁丸 木鱗鱗 散

金匱鈎玄

備預百要方

餘藥無名者散見本方

鍼灸

癩疔 附陰腫

千金方

治小兒狐疔傷損生癩方

桂心拾八銖 白朮壹兩十八銖 地膚子貳

半斤 泔水泔水 豉半升 大豆豉 三升 燻風

右三味為末以蜜和丸白酒服如小豆七

丸日三亦治大人大人 又眼眼 癩癩

又方芍藥 三稜苓 各治八銖 防葵 一作防風 大黃 各半兩

半斤 桂心 蜀椒 各半斤 乾薑 壹分

右七味爲末蜜和服如大豆壹九日五服  
又可加至三九

玉等圓治小兒陰偏大又卵核癩方

黃蘗 香鼓 牡丹 防風 桂心 各減兩

右五味爲末蜜丸如大豆兒三歲飲服五

丸如至十丸兒小以意酌量着乳頭上服

之

治小兒卵腫方取鷄翅六莖燒灰服之隨卵

左右取翮古今錄驗云○聖惠方治小兒

陰卒腫脹痛鷄翮六枚隨腫左右取之燒

灰

右細研三歲兒以溫水調下半錢日二服

量兒大小加減服之

治小兒癩方蜥蜴壹枚燒末酒服之○聖惠

方治小兒陰癩腫硬蜥蜴二枚右細研爲

散二歲兒每服以溫酒調下半錢早晨晚

後各一服量兒大小以意加減

治小兒氣癩方

土瓜根 芍藥 當歸 各壹兩

右三味咬咀以水二升煎取一升服五合

日二千金翼方同 ○聖惠方治小兒陰癩腫硬

時復疼痛土瓜根散方土瓜根赤芍藥當

歸剉微炒各半兩右件藥搗龜羅為散每服壹錢

以水壹小盞煎至六分去滓量兒大小以

意加減服之聖濟總錄治小兒氣癩土瓜

根湯方土瓜根當歸切焙各半兩右參味

翁搗篩壹二歲兒每壹錢匕小半盞煎至

參分去滓分溫二服空心日晚再服量兒

大小加減

又方三月上除日取白頭翁根搗碎隨偏處

傅之壹宿作瘡二十日愈 ○聖濟總錄治

小兒陰癩偏大白頭翁根傅方右取生白

頭翁根搗隨偏腫處傅壹宿當作瘡二十

日愈

治小兒陰腫方 聖惠方治小兒陰卒腫痛脹 狐莖炙搗末

酒服之 聖惠方半錢

又方聖惠方治小兒 研桑根 陰卒腫痛脹 斫桑木白汁塗之 經驗良方

又方擣蕪菁傅上

又方聖惠方治小兒 陰卒腫痛脹 搗垣衣傅之 治小兒陰卒

又以衣中白魚傅之○聖惠方治小兒陰卒

腫痛脹右取書中魚摩之○治小兒陰卒

又方猪屎五升水煮沸經驗良方 候稍溫 布裏安腫

上

治小兒核腫壯熱有實方

青木香 甘遂 石礬 甘草 各十八銖

方此壹味 麝香 三銖 大黃 前胡 各壹兩 黃芩

兩半 右八味咬咀以水七升煮取壹升九合每

服參合日四夜二

聖惠方

治小兒陰癩諸方

夫小兒陰癩者是陰核結腫大也小兒患此

者多因啼努軀氣不正巢氏病源 動於陰陰氣

者多因啼努軀氣不正巢氏病源 動於陰陰氣

下擊結聚不散之所成也

治小兒陰癩腫硬或時疼悶薏苡人散方

薏苡人 赤芍藥 土瓜根 黃芩 聖濟總錄

去黑蛇床子 總錄 微炒 地膚子 總錄 蛇含桔梗 去蘆頭已

上各三分 總錄炒

右件藥搗細羅為散壹二歲每服空心以

溫酒調下半錢日午晚後再服量兒大小

以意加減

治小兒陰癩衆藥未效魁蛤散方

魁蛤 三分 細研 狗陰 壹具 炙 令黃 白木 半兩 桂心 一分

右件藥搗細羅為散壹二歲兒每於空心

以粥飲調下半錢晚後再服酒下更良量

兒大小以意增減

治小兒陰癩不消白蒺藜散方

白蒺藜 半兩 微炒 去刺 香豉 半兩 微炒 鼠婦 壹分 蜚蠊 壹分

川大黃 剉微炒 桂心 細辛 已上各一分

右件藥搗細羅為散一二歲兒每服以溫

酒調下半錢早晨晚後各壹服量兒大小



治小兒陰癩腫大不消方

鵬砂壹分

右以水研化塗之立效

治小兒偏癩諸方

夫小兒偏癩者是陰核偏腫大亦由啼努軀氣不正所致其偏者乘虛而行故謂偏結也

治小兒骨疳聖濟總錄癩疳攻注連腎外囊腫脹或

疼或偏墜等宜服昆布丸方

昆布三分洗去鹹味 藁香子半兩微炒 木香 甘草炙

赤黃蘗剉 丁香 爛牡蠣生用 銅青已上各壹分

右件藥搗羅為末用棗肉和丸如麻子大

一二歲兒空心以熟甘草煎湯下三九量

兒大小以意加減

治小兒陰偏大卵核堅硬防葵丸方

防葵 牡丹 桂心 黃蘗剉 滑石已巳各壹

兩 豉半兩微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大三

四歲兒每服以粥飲下五丸早晨晚後各

一服量兒大小以意加減

治小兒偏墜或氣攻小腹疼痛藁香子丸方

藁香子

一分微炒

古文錢青

壹分研砂

細研桃人皮尖雙人生用

右件藥都研令勻以湯浸蒸餅和丸如麻

子大二三歲兒每服以橘皮湯下三丸

又方蛇床仁末

半馬鞭草汁合

右件藥相和如膏塗兒陰腫處效

又方

聖濟總錄治小兒癩疔腫痛

枳殼

參兩微炒

右擣細羅為散每用栢枝煎濃汁調厚塗

兒偏

總錄

腫處妙

治小兒陰腫諸方

夫小兒陰腫者為足少陰為痔之經其氣下

通於陰小兒有少陰之經虛者而為風邪之

氣衝於陰與血氣相搏結則令陰腫也

治小兒小腸虛冷因多啼氣下致令陰腫桃

人丸方

桃人三分湯浸去皮尖牡丹半兩黃蘗一分

白蒺藜三分微炒桂心半兩郁李人三分湯

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如棗豆大

歲兒每於食前以溫酒下七丸量兒大小

以意加減○保童秘要陰腎腫桂心白蒺

藜各二分郁李仁別搗牡丹各三分桃仁三七

皮黃蘗分右為末蜜和為丸如梧子大壹

歲兒每日以溫水研化下五丸

治小兒陰腫壯熱甘遂丸方

甘遂壹分微黃麝香壹分川大黃壹兩判前

胡蘆頭二兩去黃芩半兩木香壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如棗豆大三

歲兒每於食前以溫水下三丸量兒大小

以意加減

治小兒陰腫為腸虛冷多啼軀氣下所為宜

服牡丹丸方

牡丹半兩桂心半兩郁李人半兩湯浸桃人壹

去皮微炒

分

分

分

分

湯浸去皮尖雙  
人麩炒微黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸和麻子大壹  
二歲兒每服以溫水下五丸早晨晚後各  
壹服量兒大小以意加減

治小兒陰腫大黃散方

川大黃

壹分剉

木通

壹分剉

桑根白

皮

半兩剉

羌活

壹分

川朴消

壹分

右件藥搗羅為散壹二歲兒每服壹錢  
以水壹小盞煎至五分去滓量兒大加分

減溫服○秘要右以水五大合煎取二大

合去滓壹歲兒壹日每服壹合

又方小豆

壹合

川大黃

半兩剉  
生用

右件藥搗細羅為散用雜子白調塗

秘要

同兒陰腫處乾即易之

治小兒卒陰囊腫痒蛇床人湯熨方

蛇床人

壹兩

柳蚰屑

一兩

右件藥以水壹大椀煎六七沸洗之取  
滓以帛裏熨兒腫處妙

治小兒陰卒腫痛脹牛蒡膏方

生牛蒡汁二大盞煎赤小豆末兩肉桂末

一分

右件藥相和如膏塗兒腫處立消

又方右取蔓菁子末以豬脂調塗之

又方右以莧菜根搗汁頻頻塗之

又方右以馬鞭草爛搗裹之日二易之

又方桃人湯浸去皮尖雙

右搗研如膏三歲兒以溫酒化豇豆大服

之日三服量兒大小以意加減○直指小

兒方卵腫研桃仁唾調傅得效衛生易簡

方治小兒并男婦陰腫燥痒用桃仁搗爛

傅之備預百要方小兒癩疔桃仁杵付

小兒藥證直訣

地龍散治小兒外腎腫硬成疔澹寮方此下

腫乾蚯蚓為細末

右用唾調塗常避風冷濕地方澹寮方云一

糞牛蕪荷汁調塗尤炒

是齋醫方

治小兒風熱陰下赤痛退皮殼方  
滁州趙史君云渠長子數歲時忽連夕夜啼莫曉所謂繼而覺外腎下壹處焮赤不數日陰囊退皮宛如雞子殼然如此三五次愈而復作作即夜啼退皮如前忽見一道人說用杉木麩炭末膩粉得效方用老杉木燒灰入膩粉生油調塗一傳遂止經驗良方同

治小兒坐地為風或蟲蟻吹着陰腫不下蔣

簽判傳以種葱地內蚯蚓糞水調塗立效  
直指小兒方

陰腫證治

人有常言天生地長多與小兒近地然兒有大小壯弱起止中節可也夫苟腎經氣虛或坐石不起冷氣凝之或近地經久風邪濕氣傷之不為陰腫幾希矣間有叫啼怒氣閉擊於下結聚不散加以水竇不行亦能發為此疾治法用桃仁圓

桃仁芴去皮麩 梓桂 牽牛散少碾 白痰

藜炒香搗 牡丹皮北 大黃各二

右末煉蜜圓麻子大每服五圓或七圓青

皮木通葱白入搥少許煎湯灌下或煎大

大流氣飲研青木香圓灌下方見大方科積

人效訪方 入水煎其多飲小兒服飲熱良

傅藥

母蠣灰二乾地龍 壹

右細末津唾調傅外腎熱者雞子清調傅

母蠣散治小兒外腎腫大莖物通明母蠣粉

研十分細先以津唾塗腫處次以母蠣粉

摻傅得效

癩疔證治

癩疔者陰核氣結腫大而弔痛也多因小兒

啼怒不止傷動陰氣故陰氣下擊結聚不散

而得之或胎婦啼泣過傷令兒生下小腸氣

閉亦變此候惟是陰氣不得流行如以風冷

入焉血水聚焉故水氣上乘於肺先喘急而

後疝痛其狀有如李者亦有稀軟者亦有并  
腎腫大者亦有木硬者臍下痛楚皆不能忍  
用藥行心氣逐腎邪利其大小二便更無補  
法

五苓散方見大方科水腫門木通入少煎湯調下以

利小便

當歸散○得效方治疝氣大腑秘小腹陰囊

牽引撮聚痛甚

薤桂 牽牛微炒取仁各半兩 當歸 北大黃

桃仁浸去皮焙 全蝎一錢半

右細剉每膏錢水入蜜煎服以利大便利

後青皮 陳皮 伏苓 木香 縮砂 甘草得效

方為散生薑煎和胃惡證唇青不治

川練散得効方名治小兒疝氣痛腹痛引腰

奔攣曲身不甯直

木香 檳榔 三稜 蓬朮炮 青皮去白 陳

皮 川練肉 芫花米醋浸炒 薤桂 牽

牛生取仁 川巴豆肉不炒油

右細末飛麵糊圓麻子大每叁圓空心膏  
服午前壹服薑湯送下

朱氏集驗方

疔疔

茴香散治小兒疔疔大人膀胱疔氣疔

京三稜炒 茴香炒 甘草 沒藥

右等分爲末煎疔藤湯調下葱湯亦可中

黃子發方

桃仁湯治疔疔幼雛服之取效

木饅頭

切碎用葱炒

桃仁炒

右二味等分細末每服二錢溫酒下

治偏墜疔疔方正氣散壹貼入疔藤煎服即

愈

單方治小兒外腎腫痛生地竜於土瓦上研

如泥塗患處妙

又方生地黄甘草各等分爲末煎服壹效

又方五苓散煎蘿苣子煎湯調下即愈吉州

常他風習識式想林王丸 治疔疔

治小兒腎縮方思村王氏之子生七日兩腎  
 縮壹醫云以硫黃茱萸研大蒜塗其腹仍  
 以茵草蛇床子薰之遂愈蓋初生受其寒  
 氣而然

立甦散治小腸氣

蚘蜥九介馬蘭花二錢水木香壹錢沒藥半錢

胡椒末

右麝香酒下

香附圓治膀胱疝氣外腎腹痛

牽牛炒香附子炒石燕煨紅酒巴豆七粒

牛炒去巴

右末為圓用草麻湯下

治弔氣

釣藤干姜甘草

下右為末湯點下

治百二十日內陰囊腫如柿大者

大青刺黃芩煎黃連湯黃柏汁桂枝湯

右等分燒留性為末以雄猪膽汁調抹服

則消毒散血  
治小兒陰囊忽虛腫痛者  
龍糞輕輕塗之  
十形三瘵

水腫畢丸

霍秀才之子年十二歲畢丸膏旁腫臃戴人見之曰此因驚恐得之驚之為病上行則為嘔而下則腎傷而為水腫以琥珀丸通經散一瀉而消散

保童秘要

陰腎腫諸方

狐陰莖

淡豉

熬 荻子

熬 鱉甲

先以醋煮三五沸取

出淨洗勻 炙令黃色

茯苓

桂心

白朮

各一分

右為末蜜和為丸如梧子大三歲已下每日早以溫水研化下七晝夜以人參湯下

五丸

御藥院方

朱砂丸治小兒疝氣

朱砂膏錢七秤 當門子壹枚如皂子大石  
燕子燒燼碎五 木香三字 史君子末一 訶子

炮去核末壹錢

右件藥細研如粉用米飲為丸如黍米大  
從壹丸至七丸薄荷湯下日二服早晚乳  
食前各一服

得効方

疝氣

金鈴散治疝氣作痛時先曲腰啼哭眼中無

大 淚脚冷唇乾額上多汗或外腎釣上陰囊偏

金鈴子壹兩煨 縮砂七錢半 萹澄茄 木

香各五錢

右為末每服壹錢次者二錢煎湯或好酒

調服

紅圓子治同上但小圓如粟米大每服二七

粒金鈴子煎湯下

方見大方科諸瘧門

小檳榔圓治疝氣小腹痛引腰脊攣曲身不

能直

芫花醋浸炒木香 檳榔 三稜炒名茯苓

青皮去白全蝟 肉桂 附子煨 硃砂各貴

右為末將硃砂浸洗去上頓在湯瓶上候

成膏和糖醫方大成集成南北經驗方

醋打麵糊圓如菜豆大每服三十圓空心

溫酒送下未效再服

五苓散治陰核氣結腫大釣痛多因啼怒不

止傷動陰氣結聚不散得之或胎婦啼泣

過傷令兒生下小腸氣閉加以風冷血水

相聚水氣上乘於肺故先喘而後疝痛外

腎水硬臍下痛楚不可忍惟利二便則安

以木通葱白茴香食塩煎湯調下得小便

利為效方見大方

散治陰腫利為效

三白散治膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹大

小便不利利為效

白牽牛二兩桑白皮 白朮 木通去節陳皮

去白各半兩

布為末每服二錢姜湯調空心服醫方大成集

袖珍方永類鈐力衛生易簡方同

蟬退散治陰囊忽腫多坐地為風或虫蟻吹

着右用蟬退半兩水壹碗煎湯洗腫處其

痛立止腫亦消再溫再洗洗後仍與玉蓉

散加燈心煎服○澹寮方治小兒陰莖忽

腫多是為地龍所吹蟬退兩半右用煎湯洗

患處立止其痛腫亦漸消

又方用葱園內蚯蚓糞甘草汁調塗經驗良方同

○衛生易簡方治小兒陰囊熱腫痛用蚯

蚓糞甘草汁調塗

傅藥地竜膏治外腎腫硬或疝或風熱暴腫

及陰瘡乾地黄不以多少為末先以葱椒

湯於避風處洗次用津唾調傅其上外腎

熱者雞子清調傅或加牡蠣少許

又方地竜糞研生薄苛汁調傅

澹軒方

風熱陰腫

陰囊風熱腫而紅杉板燒灰最有功輕粉麻  
油調細末雞毛輕付兩三通

虫風吹陰腫

坐地虫風吹入囊葱蛙蚓糞水調良老茶葉  
末皆堪使清水塗調也復常  
肘後方

徐王駿方小兒腹痛大汗出名曰寒疝濃者  
梨葉汁壹服七合以意消息可作三四度

飲之良

聖濟總錄

小兒癩疝

小兒陰核氣結腫大者癩疝也由稟受之初  
肝經虛弱因啼怒軀氣氣脉下墜擊於陰器  
則筋脉緩縱結聚不散是為癩疝也若氣偏  
虛則其腫亦偏蓋足厥陰肝之經環陰器抵  
小腹是動則為癩疝少腹痛之疾  
治小兒陰癩狐陰丸方

狐陰壹具黃生蟲十四枚桂皮去鱗附子炮裂

去皮乾薑炮茯苓子炒去角細辛去苗各三分桃

人湯浸去皮尖雙炒別研卷柏各壹兩半

右九味搗研為末鍊蜜和丸如麻子大一

二歲兒米飲下五丸空心日晚各壹服量

大小加減

治小兒陰癩氣疝發作有時芍藥丸方

芍藥剉炒各半兩亦茯苓去黑皮半夏洗

去滑桂皮去蠹蜀椒去目及閉口炒

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如菜豆大三

四歲兒食前米飲下五丸日三服量兒大

小加減

治小兒陰疝偏腫牡蛎丸方

牡蛎皮大豉炒防風去黃蘗去鱗皮滑石

別桂法各壹分正共米泔下早錄外同各壹

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大壹

二歲兒每服五丸米飲下早晚各壹

服量兒大小加減

治小兒陰癩韭承丸方

韭子炒三兩附子炮裂去皮狐陰壹具

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大壹

二歲小每服五丸米飲下早晨夜卧各壹

服量兒大加減風去毒藥治小兒陰癩

治小兒陰癩日夜疼痛方

蝟皮一箇燒存性

右壹味研細臨卧熱酒調下壹錢治小兒陰癩

治小兒癩病及小陰受邪冷氣滯疰氣散方

京三稜壹枚緊小者猛火炮令中心存三分性紙裏一重淨土埋一宿

右壹味搗羅為散每服壹字匕煨葱米飲

調下不拘時候

治小兒癩疔蓖麻丸方

蓖麻人三十枚棘剛子去皮二十枚石燕子燒壹

滑石末二錢麝香研半錢

右五味搗研勻稀麵糊和丸如菜豆大每

服十五丸空心煎燈心湯下壹服即消

治小兒癩疔發作疼痛水通散方

木通剉 麝香研各壹分

右二味搗研為散每服半錢匕米飲調下

治小兒癩疔腫鞭疼痛滑石各二錢 粉霜一錢 續隨子去皮半兩

滑石碎 澤蘭各二錢 粉霜一錢 續隨子去皮半兩

右四味搗研為末白麵糊和丸如棗豆大

五歲以下每服五丸五歲以上七九豆蔻

酒下空心臨臥服

治小兒陰癩莧菜根傅方右取莧菜根搗碎

傅之立差馬鞭草傅亦佳

治小兒陰核氣結腫大或偏疼病腫漆燕散

方

漆燕一枚入瓦瓶子內用煑泥固濟陰乾炭火燒令通赤為度放冷取出研令

細續隨子去皮壹分

治二味搗研為細散每服半錢匕米飲調

下

治小兒肝經虛弱筋脉緩縱氣脉下墜陰器

腫大久成癩疔三應散方

藁香蟲一枚 膩粉七錢 胡黃連末壹分

右三味同研令乾每服壹字陳米飲調下不拘時

拔粹方

小兒狐疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛十四枚熬焦桂半兩二物為散每服八分壹匕日再酒調下蜜丸亦通

醫方大成

湯氏方當歸散治小兒胎中受寒生下即感外風面色青白四肢厥冷大便青黑及腹疼

盤腸內疝皆治之

當歸

剉微炒

黃耆

蜜炙

細辛

黃芩

龍骨

細研

桂心

赤芍藥

各半兩

右為末每服以乳汁調下一字日三服看

兒大小加減服之

醫方集成南北經驗方袖珍方衛生易簡方同

湯氏方海蛤散治小兒陰腫出啼料怒氣閉擊于下

海蛤

懷香

各三分炒

薏苡仁

白朮

枳殼

各半兩麩裏煨

右為末每服一錢食前溫酒下醫方集成

方神珍 方同

湯氏方三稜散治積氣肚疼

縮砂仁 甘草 益智炒去 三稜 莪朮

青皮去瓢炒 各等分

右為末白湯點下醫方集成 南北經驗方同

湯氏方治外腎腫硬及陰瘡用干地龍為末

先以葱椒湯於避風處洗次用津唾調傅

其上醫方集成 南北經驗方同

經驗良方

治小兒疳後虛熱水莖見腫右火焙煤灰為

末清油調塗水莖上并腹子上 右韭菜

內地菟糞火煨為末出火毒清油調塗水

莖上又朴硝為末鷄子清調塗水莖上

醫林方

仙李仁丸治小兒疳藥

仙李仁一兩 炒熟 桃仁壹兩 炒黃 杜蒺藜子兩

半炒 官桂兩 牡丹皮兩 下大研

右為細末煉蜜為丸桐子大每服壹丸食

前溫酒送下此方治小兒疳積

余匱鉤玄治小兒疳積

脫囊紫蘇葉為末水調付上

又方荷葉為末水調付上治小兒疳積

備預百要方治小兒疳積

小兒癩疔生射干汗亦可先服之治小兒疳積

小兒癩疔鍼灸治小兒疳積

千金方

治小兒陰腫方灸大敦七壯

拔粹方

偏墜宜服防葵丸令兒坐於土中午時灸卵

下偏墜之處七壯

小兒偏墜若非胎中所有在後生者於莖下

腎囊前中間弦子上灸七壯愈

衛生寶鑑

章門二穴治小兒身羸瘦黃豚腹脹四肢懈

惰肩背不舉依前禹講師灸癧處取之



治小兒諸蟲咬諸方

治小兒蛔蟲諸方

貫衆散 鶴蝨散 檳榔散 青箱子散

生乾地黃散 苦楝根散 桃仁散 胡

粉丸 乾漆丸 蕪荑人散 麝香散

檳榔散 備急散

治小兒寸白蟲諸方

青黛散 檳榔散

治小兒蟻蟲諸方

大棗膏 胡粉散

和劑局方

化蟲圓

小兒藥證直訣

安虫散 安虫丸 蕪荑散 靈禁散

釣藤膏 魏香散

大全本草

直指小兒方

白豆蔻散 蘿蔔子散 化虫圓 安息

香圓

保童秘要

得效方

殺蟲

史君餅

四君子湯

化虫圓

碧金散

肘後方

抵聖散

拔粹方

蟬花散

定風散

雄黃消毒膏

聖核

子

醫方大成

茴香散

木香散

化虫圓

金露圓

永類鈴方

三白散

釣藤膏

乾漆散

小沉香煎

元安虫散

遣虫元

木香散

經驗良方

虫證

化虫圓

立應散

除根散

君子餅

槐耳湯

衛生易簡方

金匱鈎玄

備預百要方

雜療方

餘藥無名者散見本方

諸虫

附諸獸諸虫傷

盤腸內疝

巢氏病源

三蟲候

三蟲者長蟲赤蟲蟻蟲為三蟲也猶是九蟲之數也長蟲蚘蟲也長壹尺動則吐清水而心痛貫心即死赤蟲狀如生肉動則腸鳴蟻蟲至細微形如菜蟲也居胴腸間多則為痔劇則為癩因人瘡處以生諸癰疽癬癩痂疥齧蟲無所不為此既九蟲之內三者而今則

別立名當以其三種偏發動成病故謂之三蟲也

### 寸白蟲候

寸白者九蟲內之壹蟲也長一寸而色白形小扁因腑臟虛弱而能發動或云飲白酒啻云以桑樹枝貫串牛肉豕并食生栗所作或云食牛魚後卽食乳酪亦令生之其發動則損人精氣腰脚疼弱又云此蟲生長壹尺則令人死也

### 小兒藥證直訣

虫痛

虛實腹痛附

面眇白心腹痛口中沫及清水出發痛有時安虫散主之小兒本怯者多此病積痛食痛虛痛大同小異惟虫痛者當口淡而沫自出治之隨其證用藥而口五白者黃白脈皆虫與癩相似口長歪哭而澀咽閉不白小兒本怯故胃虛冷則虫動而心痛與癩略相似但目不斜手不搖也安虫散主之

虫痛訣死

辛氏女年五歲病虫痛諸醫以巴漆桐餅之  
 厲治之不效至五日外多哭而俛仰卧不口  
 自按心腹時大叫面口正色或青或黃或白  
 口口無光晴而慢唇自吐沫至六日背高  
 而卧不安錢詳而視之用無黃散至服見日  
 不除青色錢氏曰此病大困若更加瀉則為  
 逆至次日錢見辛日夜來三更而瀉錢於瀉  
 盆中看如藥汁以杖攪之見有藥丸錢曰此

子肌厚當氣寔今證反虛不可治也何以然  
 師曰脾虛胃冷則虫動今反目青此肝乘脾  
 又脾加瀉知其氣極虛也而丸藥隨糞下即  
 脾胃已脫兼形病不相應故知死病後五日  
 昏篤七日而死  
 拔粹方

小虫痛

其候哭啼俛仰坐卧不安自按心腹時時大  
 叫面無正色或青或黃唇慢而白目無精光

口吐涎沫此爲虫痛宜服安虫散  
千金方  
治小兒蚘蟲方削棟木上蒼皮以水煮取汁  
飲之量大小多少爲此有小毒

治小兒羸瘦有蚘蟲方藿蘆二兩以水壹升  
米二合煮取米熟去滓與服○千金翼方  
藿蘆五兩黍米二升右貳味切以內泔中以  
水三升五合煮取二升五歲兒服五合日  
三服兒大者服壹升

又方藟蓄三兩水壹升煮取四合分服之搗  
汁服亦佳

又方桃白皮三兩東引吳茱萸根白皮四兩

右二味咬咀以酒壹升三合漬之一宿漸  
與服取瘥

又方取猪膏服之壹云治燒蟲

又方搗槐子內下部中瘥爲度壹云治燒蟲

又方揀實壹枚內孔中壹云治燒蟲

治寸白蟲方東行石榴根一把水壹升煮取

三合分服

又方桃葉搗絞取汁服之

治小兒三蟲方

雷丸 芎藭

右二味各等分為末服一錢匕日三

同

治小兒蠅蝮咬遶腹匝即死方搗蒺藜葉傅

之無葉子亦可

又方取燕巢中土聖惠方同猪脂和傅之乾即

易之

食醫心鑑

治小兒蟻虫下部痒方右取蒲竹葉一握以

水一升煎取五合去滓空心食之

小兒藥證

小兒久冷虫出章

且小兒百日已前縱病表極百日已後須憑

醫療固風傷於氣暖敗於寒乳食不忌所防

溫致致失序或則微瀉米止虫出狂疏三

五之間數周千萬如蟻如髮如蚰蟥如魚膠  
或三個之廉或五枚而數數並是四肢不節  
五臟傷安損益難明篤愁轉甚不依救治何  
遂愈痊聊定曲章用之拯濟

小兒久冷虫出吟

苦參切要是升麻各壹分厚朴全憑望朱砂

各半分麝香留向黃芩伴各半分葶藶還須待

菊花各半兩莨菪煞虫調嫩腹三令半淘去

黃連堅願度霜笳各半兩

右件已上二十二味搗散以水一茶椀煎

大至椀頭服又半椀時以醋二匙對半日

聖惠方

治小兒蠟螻蟻腰腹成瘡諸方

凡蠟螻虫長廿寸許身有毛如毫毛長五六

分脚多而甚細居屋壁之間其行走處遇人

影則尿之人隨所尿著影處人身即應之牛

瘡世病之者多著腰瘡初生之狀匝匝起初

結瘡癩小者如黍粟大者如麻豆染漸生長

開縑腰腹生膿汁成瘡也或取豆漿搗生具  
 治小兒蠟螻瘡方右取敗蒲扇以水煎濃汁  
 澆塗之  
 又方右以藕碎葉搗爛塗之其效去熱即入  
 又方右以生甘草搗末傅之  
 又方右鹿角燒灰細研以酒和塗之  
 又方右道邊蒲蓆燒灰細研傅之  
 又方右槐白皮半斤細剉以醋二升浸半日  
 以醋洗之日五六度差

又方右赤小豆搗末以醋和塗之差乾即再  
 塗

又方右以大麥爛嚼傅之日三上差

又方右以梨子嚼汁塗之乾則再塗之

又方右以栗子爛嚼傅之

又方右以蕭竹汁塗之

又方右生白礬細研以生葱汁調厚塗之

治小兒諸虫咬諸方

治小兒蛇咬方

白礬 甘草等分

右件藥搗羅為末如蛇咬著心神熱躁眼前暗黑用新汲水調下半錢如有腫赤用白礬搗漿水萵苣根等水煎三五沸淋洗即腫氣自消如大段蛇咬著未及修合藥用耳塞少許入在咬着處瘡口內以醞醋一滴滴在瘡口上即止

又方合口椒 壹兩 蒼耳苗 一兩

右件藥和搗傅之

又方生椒 壹兩 豆豉 三合炒

右件藥搗羅為末以津調看多少傅之立

又方在遠志嚼令爛傅之并內瘡孔中

治小兒蠟螫方以黃蠟文火煎過令勻煎咬

取夏藥同研令勻以酒味煎之

又方桂心水磨塗之

又方乾薑爛嚼傅之

又方大蒜研令爛塗之

治小兒蜈蚣咬方

頭垢小蒸參

末各燒

布件藥同研令勻以酒和塗之

又方右以桑白皮汁塗之

又方右以蝸牛活者坐破厚塗之

又方生薑

自然汁

右煎作濃膏入白熟末少許調厚塗之

治小兒蜘蛛咬方

聚葉

栢葉

五月五日收

牛鐵衣

右件藥擣細羅為散以生油和如膏先火

灸瘡然後塗咬處神効

又方雄黃一分麝香一分

右件藥細研以藍汁壹大盞攪令勻點咬

處立效

又方五加皮兩半夏兩

右件藥燒灰細研以醋和塗之

又方右生鐵上衣醋研濃汁塗之

又方右以菘蕪苗壹握搗如泥封之

又方右白殭蠶末以津和塗之若有絲出盡

又方右

雄黃末以葱汁調厚塗之

又方右生白礬末壹兩以醋熬成膏厚塗之

治小兒卒被諸蜂螫方

露蜂房 白礬 各半

右件藥搗羅為末以水煎如膏厚塗螫處

効

治小兒卒被狗咬方

乾葛

右搗羅為末傅於上更濃煎葛汁與兒飲

之

又方右以熱牛糞塗之

又方右以黃蠟鎔灌瘡中効

又方右以燕搗取汁

日三服之

又方右以地龍糞塗之毛出即差

又方右杏仁湯浸去皮搗 傅之不過三度

效

治小兒卒被猫兒爪損及  
右取剪

刀草搗取汁塗之

治小兒蛔蟲諸方中效

夫蛔蟲者是九蟲之內一蟲也長一尺亦有

長五六寸者小兒多因食甘肥而發動巢氏

或因腑臟虛弱而動則腹中痛發作煩聚行

或因食甘肥而動來上下痛有休止亦有攻心痛喜吐涎沫及

清水若貫傷心者則死診其脉腹中痛甚脉

當從沉而絃也今反脉洪而大則是蛔也

治小兒蛔蟲攢心合眼撲手心悶貫衆散方

貫衆 狗脊 狼牙草 草薺判記土小

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分

減溫服

治小兒多吐蛔蟲鶴蝨散方

鶴蝨曹分判 川大黃曹分判 胡椒曹分判 消曹分判 水曹分判 正火

右件藥搗麤羅為散都切水壹大盞煎空

七分去滓三歲兒溫服半合日三服量兒  
大小以意加減○保童秘要若以水五大  
合煎取三合去滓頓服

治小兒蛔虫咬心疼痛檳榔散方

檳榔三分 狼牙草壹分 酸石榴根二分 赤芍藥半分

川朴消半兩

右件藥搗麤羅爲散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓不計時量兒大小分減

溫服

治小兒蛔虫發作心痛多吐青箱子散方

青箱子 苦參剉 黃連去 篇竹 狼牙草

已上各 雷丸壹兩 雄黃半兩 桃人一兩 湯浸三分 人麩炒微黃

微黃

右件藥搗細羅爲散一二歲兒不計時以

稀粥飲調下半錢兒稍大以意加之若下

部痒縣裏少許內之日二度如不痒卽勿

用

治小兒蛔虫咬心痛生乾地黃散方

生乾地黄兩半 苦棟根壹分 鶴蝨半 酸石榴

根半兩 檳榔兩半

右件藥搗細羅為散三四歲兒空心以熱

茶調下半錢午後再服取蟲下為度量兒

大小以意加減

治小兒腹藏有蛔蟲苦棟根散方

苦棟根 鶴蝨 薏苡根壹兩 檳榔壹兩

米壹分 牽牛子壹兩

右件藥搗細羅為散三歲兒每服以粥飲

調下半錢日三服看兒大小臨時加減

治小兒蛔虫咬心痛桃人散方

桃人湯浸去皮尖 木香 拘脊 白蕪荑

狼牙草 苦棟根皮剉 鶴蝨 檳榔已上

右件藥搗細羅為散三歲兒每服煎苦棟

根湯調下半錢日三四服量兒大小臨時

加減

治小兒腹內有蛔蟲時時疔痛胡粉丸方

胡粉三分 獾猪膽三枚 麝香一分 牛黃一分

右件藥都研爲末用膽汁浸蒸餅和丸如  
菘豆大五歲兒每服以溫水下七丸看兒  
大小以意加減

治小兒蛔虫咬心疴痛四肢逆冷乾嘔不吐  
面色青宜服化蟲乾漆丸方

乾漆二錢○神功膽子壹錢

右件藥搗羅爲末用葱白湯煮麩糊和丸  
如麻子大二三歲兒以石榴皮湯下二丸  
日三服三四歲兒三丸

又方胡粉壹分膩粉半兩

右件藥細研令勻五歲每服以粥飲調下  
半錢量兒大小以意加減若用羊子肝壹  
具煮熟細切以藥末拌和與兒食之更佳

治小兒蛔蟲動作多吐清水蕪荑人散方

蕪荑人三分狼牙草半兩白欬一分

右件藥搗細羅爲散每服空心以溫酒調  
下半錢量兒大小加減服之  
治小兒蛔蟲咬心痛或吐清水麝香放方

麝香

一錢

研入

革薺

壹兩

苦棟根

壹兩

剉

右件藥搗細羅為散以獾猪膽三枚取汁

和令勻曝乾後却研為末每服以蕪荑湯

調下半錢看兒大小以意增減

治小兒蛔蟲攻藏腑疔痛下蟲檳榔散方

檳榔

半兩

苦棟根皮

半兩

麝香

壹錢

細研

東引石

剉

榴根皮

半兩

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻五歲

兒每服以熱茶調下半錢量兒大小以意

加減

又方醋石榴根

半兩入土五寸東引者

檳榔

壹枚

右件藥切碎以水一大盞煎取七分去滓

入粟米半合煮稀粥空心與食蟲下快利

立差量兒大小加減服之

治小兒蛔蟲疔刺心腹疼痛備急散方

鶴蝮

一兩

右件藥搗細羅為散每服煎肥猪肉汁調

下半錢其虫便出看兒大小以意加減

治小兒蛔蟲咬心痛神效方

乾漆

壹兩搗碎炒令煙出

右件藥搗細羅為散每服以新汲水壹合生油壹椀椀子空心調下壹字不過三服當取下虫即差

又方右搗篇竹取汁服半合効

備預百要方肘後方同

又方蕒苳根

壹兩去土剉

右件水一大盞煎取半盞去滓一二歲兒每服壹合三四歲至五六歲兒二合空心

服之隨兒大小以意加減

又方棟樹根

半兩

右細剉以水一中盞煎至五分去滓分為二服

又方石榴根皮

壹兩

右以水壹人盞煎至四分去滓分為二服

○經驗良方治虻蟲方用石榴枝東行根

一把水煮服專治寸白蟲

治小兒寸白蟲諸方

夫小兒寸白者是九蟲內之膏蟲也長身寸而色白形小扁小兒多因甘肥不節生冷過度之所致也其蟲發動則傷人藏腑飲食不成肌膚于母相生無有休止若蟲長壹尺則能害人也

治小兒寸白蟲連年不除面無顏色體瘦少方青黛散方

青黛壹分 苦棟根壹兩微炙判 鶴虱壹分 檳榔壹枚  
右件藥搗細羅為散每服時先喫淡肉脯

少許後以粥飲調下半錢量兒大小加減服之日二三服

又方朱砂錢壹 麝香錢壹 苦棟子肉壹兩 炒以米熟為度

右件藥都研令細以水浸蒸餅和丸如芥子大每於空腹春夏冷水秋冬熱水下七丸量兒大小加減服之

治小兒寸白蟲久不愈檳榔散方  
檳榔二枚為末 猪牙皂角三挺 苦棟子五枚

右件藥同研為散每服空心煎苦棟根白皮湯調下半錢三兩服後蟲皆自下量兒大小加減服之

又方鶴蝮三分雷丸三分使君子二分巴豆十枚紙裏壓去油皮心研

去油

右件藥擣羅為末以糯米飯和丸如棗豆大每服以沙糖水下三丸量兒大小加減服之

治小兒蟻蟲諸方

夫小兒蟻蟲者此是九蟲之內壹蟲也形甚細小如今之蝸蟲狀赤因腑藏虛弱而致發甚者則成痔瘻癩疥也

治小兒蟻蟲方右用鍊了臘月猪脂每日空

心取如皂莢子大服之甚良

又方右以槐實末每用少許內下部中

又方右以苦棟實末每用少許內下部中

治小兒蟻蟲蝕下部中痒大棗膏方

蒸人棗二枚水銀分

右件藥都研令水銀星盡捻為挺子長

寸以絲裹宿內下部神明並蠱由為效

治小兒蟻蟲蝕下部胡粉散方內下部中

又胡粉分一雄黃分壹

右件藥都研令細每用少許傅於下部中

又方杏人

壹兩湯浸去皮尖  
雙人熬炒微黃

右件藥研如膏以絲裹棗核大內下部中

甚者不過三度差

又方槐根白皮

膏兩  
桃仁一兩湯浸去皮苦  
剉雙人生研

棟子膏兩

右件藥搗羅為末以猪膏和丸如棗核大

內下部中更以葱白兩葉去鬚水煮濃汁

溫飲半合

和劑局方

化蟲圓治小兒疾病多有諸虫或因藏腑虛

弱而動或因食甘肥而動其動則腹中疼痛

發作腫聚往來上下痛無休止亦攻心痛吐

哭合眼仰身撲手心神悶亂嘔噦涎沫或吐

清水四肢羸困而色青黃飲食雖進不生肌  
肉或寒或熱沈沈嘿嘿不的知病之去處其  
虫不療則子母具生無有休止長一尺則能  
害人

鶴虱去苦練根皮去浮 檳榔 胡粉炒各五

白礬飛枯十

右爲末以麪糊爲圓如麻子大壹歲兒服  
五圓溫漿水入生麻油壹兩點打勻下之  
溫米飲下亦得不拘時候其蟲細小者皆

化爲水大者自下○醫方大成治一切疳

虫攻刺心腹疼痛不已叫哭合眼胡粉炒

鶴虱各五 白礬一兩二錢半 檳榔 苦練根各五

右爲末麵糊圓如麻子大量兒大小加減  
米湯下永類鈴方治虫咬心痛來去不定  
阻乳鶴虱實郎胡粉苦練根各半兩白凡

大二錢半生右爲末糊元小豆大三歲二十

元溫漿水入油三五滴吞下空心

小兒藥證直訣

安虫散治中動心痛○醫方大成凡虫不可  
盡去安安之施圓端效方治小兒虫動心腹  
大痛

胡粉炒黃 檳榔

川練子

去皮 鶴虱

炒黃各二兩○

按方各二錢

白礬

壹分鐵器內

端效方各三兩

右爲細末每服壹字大者半錢溫米飲調

下痛時宜服

醫方集成南北經驗方

○得

效方治因喫物麤肌膚消瘦虫生腹中極

痛不可忍者真胡粉

炒

檳榔川練子

炒去核

鶴虱

如各二兩

白礬

二錢

生用 右爲末米飲調痛

時那空心未洗面前服或圓如麻子大小

兒多有諸虫臟腑虛弱食肥甘則動腹痛

叫哭倒身撲手嘔清水涎沫而色青黃飲

食不進不生肌膚或寒熱或沉沉嘿嘿其

虫不療相生不已長壹尺則能害人壹歲

兒五圓溫漿水入清油壹二點打勻溫米

飲下其虫小者化爲水大者自下經驗良

方右爲末米飲調痛時服空心未洗面前

服之或為細米以麴糵為丸如麻子大小  
 鬼疾病多有諸虫或因臟腑虛弱而動或  
 因食甘肥而動其動則腹中疼痛發作嘔  
 聚在來上下痛有休止亦攻心痛叫哭仰  
 身撲手心神悶亂嘔噦涎沫或吐清水四  
 肢羸困面色青黃飲食雖進不生肌膚或  
 寒或熱流汗噤嚙不的知病之去處其蟲  
 不瘳則子母相半無有休止長一尺則能  
 害人膏歲兒服五丸溫漿水入生清油一

二點打勻下溫米飲下亦得不拘時候其  
 蟲細小者皆化為水大者自下

安蟲丸治上中二焦虛或胃寒蟲動及痛又

名川練元

乾漆二分并碎炒煙出盡○南雄黃壹分巴

豆霜壹錢

右為細末麴糊丸黍米大看兒大小與服  
 取東引石榴根煎湯下痛者煎苦練根方  
 大成集成經驗方湯下或蕪荑湯下五  
 珍方有子苦練根

七丸至二三十丸發時服  
 蕪荑散生治同前○肘後方治小兒胃寒蟲  
 上諸證危惡與痢相似醫方大成治諸蟲作  
 痛

白蕪荑去乾漆炒各等分○大

右為細末每服一字半錢或壹錢大成每服壹字

米飲調下發時服醫方集成南北經驗方神珍方衛生易簡方與

大成同

靈攀散治小兒虫咬心痛欲絕施圓端效方名靈白散

五靈脂末二錢匕白礬火飛半錢匕

右同研醫方大成集成本北每服壹二錢

水壹盞煎至五分溫服無時當吐出蟲

釣藤膏治小兒腹中極痛乾啼後偃名盤腸

內弔醫方大成集成本北

好乳香水中生乳鉢研細沒藥研木香一姜黃各

錢○得效方木鼈子仁二十介去外皮

各四錢半方十二木鼈子仁二十介去外皮

右先將後三味同為細末次研入上二味

煉蜜和成劑收之每一歲兒可服半皂子  
大餘以意加減煎釣藤湯化下無時次用  
魏香散○得效方右以木鱉子搜和四味  
末爲圓櫻桃大煎釣藤湯化下一歲可服  
半圓次魏香散醫方大成治內疳腹疼沒  
藥乳香各三錢木香南北經驗方姜黃各四錢  
木鱉針二右先將後三味爲細末叩前二  
味拌和煉蜜成劑收沙罐內量兒大小加  
減煎釣藤湯化下衛生易方同次服魏香散醫方

集成同

### 魏香散

蓬莪茂兩真阿魏壹錢

右先用溫水化阿魏浸蓬莪茂一晝夜焙  
乾爲細末每服一字或半錢煎紫蘇米飲  
空心調下得效方醫方大成集成南北經  
驗方袖珍方永類鈔方衛生易  
簡方同

### 大全本草

姚和衆治孫兒蛔蟲葶藶子一分生爲末用

以水二合煎取一合一日服盡  
藥性論云扁竹煮汁與小兒服生虻蟲等咬  
心心痛而青口中沫出臨死者取十斤細  
切以水一石煎去滓成煎如飴空心服蟲  
自下皆盡止

直指小兒方

白豆蔻散治盤腸氣痛

白豆蔻仁 縮砂仁 青皮 陳皮 甘

草 參 附子 蓬莪朮 各等

參 鈐方無

各等

右為末每服一錢紫蘇煎湯調下

蘿蔔子散治盤腸氣痛

蘿蔔子炒黃不拘多少

右為末每服半錢梓桂煎湯調下或只入

蘇合香圓則用薑湯調下

化虫圓治虫痛

蕪荑 川鶴蝨 鷄心檳榔 乾蝦蟇

各一分 蘆薈 分半

右為末雄猪膽汁為圓麻子大每服五圓

陳米飲下或史君子煎湯送下方同 承類鈔

虫月首則頭向上凌晨可服藥

安息香圓治內癆盤腸氣癆蟲痛通用

安息香 桃仁去皮尖炒 蓬莪朮炮 史君子肉

各半 阿魏錢一 茴香炒 全蝎各壹分

右阿魏并安息香以酒少許就湯瓶口上

以盞盛蒸溶去沙旋入桃仁同研次入諸

藥末煉蜜圓桐子大每壹圓生薑湯調下

保童秘要

吐蛔方 木出蘇即眼吓蒸露酒或酒煎藥

芍藥 狼牙各壹分 朴消 醋石榴根各三分

檳榔人一枚 雷五枚 代二枚 餅一枚 青

右以水五大合煎取三合去滓空心頓服

之 或 醫 問 甄 中 錄 淋 口 燥 中 出 熱 凡

治蛔方 竹筒內 煎 身 腹 痛 甘 半 煎 煎 數 餅 出 口

牽牛子四兩 東引石榴根 有子練皮

昔蓮各壹兩 高良薑 白蕪荑各二兩

右為末每服或三錢至五錢空腹煎葱湯

調下仍先與沙糖少許喫後服藥

得效方

殺虫 東民 白燕 各二

史君餅治因喫食麤肥甘生熱肌瘦體虛口

吐清涎唇間 腹中絞痛口鼻中出黑魚

虫不治 水止大 命煎取三合 大 碎 空 小 動 速

史君子 四十箇 雷丸 半兩 定粉 二錢 輕粉 半錢 青

箱子 鶴虱 壹分 木部 煎 不 離 懸 各 三

右為末用鷄鴨卵和蒸為餅先將此藥隔

日夜五更服 將葱湯圓取下 方見 積聚

四君子湯每服二錢苦煉根少許煎湯調服

近病亦效 方見 雜病

化虫圓

鶴虱 去 胡粉 檳榔 白礬 半生 苦煉根

皮 各半 蕪荑 黃連 酸石榴皮 各壹分

右為末以糊圓如麻子大壹歲兒三圓漿

水入香油三五滴下其虫小老化為水大

者白下加雷丸或用猪瘦肉湯下

碧金散治蛔虫寸有蟲者

苦煉根兩鶴虱兩檳榔兩猪牙皂角大

參餅兩吏君子仁半兩各搗好青黛半兩麝香兩

分

右同研勻每服壹字用淡猪肉湯食前調

肘後方

治小兒殺虫定疼痛抵壘散以苦楝兩生易兩方苦

楝皮二兩白蕪荑半兩為末水壹盞藥末壹

錢煎取二分放冷待發時服之

拔粹方

蟬花散治夏月大傷及諸般損傷蛆虫極盛

臭惡不可近者

蛇退皮壹兩用麩燒存性研為末蟬殼半兩青黛兩華細

辛二錢半

右為細末每服三分酒調下如六畜損傷

成瘡用酒灌如大傷用酸子和喫蛆皆化

為水蠅子不敢再落又以寒水石末乾糝

上

定風散治風狗咬破先口噙漿水洗淨川懸  
 搵乾貼藥更不再發大有神效  
 天南星生防風各等分  
 右為細末乾上藥更不再發無膿不可具  
 述

雄黃消毒膏治蝎蜥不可忍

雄黃信各半兩巴豆三錢白礬一兩  
 右為細末黃蠟半兩溶開入藥攪勻為定  
 手如棗子大用時將定子簽於燈焰上炙

開滴於蜥著處其痛立止

聖核子治蛇咬蝎蜥

雄黃三錢信壹錢皂角子巴豆各四十個耳塞  
 麝香各少許

右五月五日不聞鷄犬婦人處不語擣為  
 細末在杏子內封之針挑出止痛處為用  
 大有神效

醫方大成

湯氏方治盤腸氣痛用沒藥乳香各少許研

細用木香壹塊於乳鉢內磨水半盞調乳香沒藥末煎數沸服之立效醫方集成南北經驗方

珍方衛生易簡方同

幼幼方 茴香散治小兒盤腸氣痛

茴香炒 木香 黑附子炮 金鈴子去核用皮

蘿蔔子炒 檳榔 破故紙炒 白豆蔻煨

等分

右咬咀每服二錢水半盞入搗煎服醫方集成

南北經驗方 袖珍方同

經濟方 木香散治小兒盤腸氣痛不已面青手冷日夜啼叫尿如米泔

川練子七介去皮核用巴豆三拾五粒木

香 黃史君子肉 延胡索 茴香各壹分

右同為末清米飲空心調下量兒大小服

之醫方集成南北經驗方 袖珍方同

湯氏方 化虫圓治因疳生虫五心煩熱

蕪荑 黃連 神麴炒 麥蘖炒各等分

無 衛生易簡方

右為末麵糊圓如黍米大空心米飲下醫方

集成南北經驗方

湯氏方金露圓專治小兒勞瘵尸虫作痛而

口羸瘦五心煩熱如其他食積冷氣作痛又

非其治臨證審之又有心痛欲絕覺時無藥

可療急用艾灸足大拇指中男左女右

人參去蘆官桂去皮川椒去目令白茯苓川

烏炮菖蒲大黃吳茱萸各半附子一

炮桔梗去蘆紫花朮炒各三分○袖珍乾薑

炮○南北柴胡去蘆各一分○猪牙皂

角去皮厚朴二分皮姜製

右為末別研甜葶子半兩巴豆三分去

油膜續隨子半兩同前藥壹處麵糊元如

麻子大以意加減空心下醫方集

永類鈴方

三白散治盤腸氣吊先服此後服釣藤膏

白牽牛壹兩白朮炒末桑白皮陳皮淨木

通各三錢

右為末姜湯調

釣藤膏

乳香 沒藥 木香 姜黃 木別子

今

右為末煉蜜為膏釣藤煎湯化下四磨湯

化下更佳

煎漆散治疔蝨腹脹虫痛

煎漆 壹 史君子 十四 蕪荑仁 六十 練樹皮

向東取皮厚者 剉日乾壹兩

右為末砂糖熟水調下

演山小沉香煎元治冷積癥積疔積食積乳

積盤腸虫痛即感應元加沉香乳

乳香 沉香 杏仁 炒 木香 丁香 各壹

肉豆蔻 壹 个 百草霜 壹 分 巴豆 十四 粒 制如霜

右為末以煮酒封面蠟和元菘豆大每四

五元姜湯下釣藤湯送下尤佳凡下虫藥

在月初虫頭向上可下仍須空心凌早下

後以和胃藥調之

鄭氏安虫散治虫咬心痛不可忍

乾漆三分炒雄黃兩半射香炒

右為末三歲半錢煎苦練根湯調一方云

火煨史君子與食以殼煎湯送下甚妙

遣虫元治虫動腹痛啼叫吐涎沫

檳榔 蕪荑皮去雷元定粉 鶴虱各

右為末煎苦練湯煮糊元菜虫大每三十

元史君子煎湯下

千金方云蟲攻下部燒艾烟熏之吐蛇煩渴

陰極也唇青舌黑用生姜擦黑轉而紅即

回陽氣

仲景云藏寒胃虛蛔上時止時煩宜理中湯

方見活人書

木香散

黑牽牛末半生半熟大伏子各壹兩半檳榔 雷元

錫灰醋炒三稜 莪木並煨木香 大黃各壹兩

右細末每三錢空心蜜水或砂糖水調下

仍先用燒猪肉膏片細嚼不吞仍吐出却

服藥引出

經驗良方

蟲證

治小兒虫證腹痛啼哭如口角青者蟲證也  
木抱起稍止卧之則大啼蓋卧則虫致上起  
則虫攻下故也以平胃散加生硫黃一粒  
如小指大煎服痛即止  
又方白蕪荑檳榔各壹兩蒸餅爲丸每服貳  
十九熟水下

治小兒喫物麤肌膚消瘦蟲生腹內極痛不  
可忍者乾漆搗碎慢火炒令煙盡爲末用  
藥壹錢入生清油調勻新汲水化服

化虫圓治小兒好食炭土不長肌膚五心煩  
熱鼻赤齒搖量兒大小下二十圓

蕪荑 黃連 神麴 麥蘖 烏梅已上

炒陳皮去白各

右爲末麪糊丸黍米大空心米飲下肥猪  
汁尤佳

立應散治寸白右鷄心檳榔壹箇為末用熟  
精猪肉四兩不用塩醋只以酒淹切作薄  
片和檳榔末嚼肉下五更時以東行石榴  
根濃煎汁嚙下大人小兒皆可服  
除根散治寸白

川練子去皮檳榔各壹錢輕粉壹錢蕪荑二錢黃丹

貳錢

右為末作一服取石榴根煎酒調下須五  
更初服先用熟猪肉嚼取汁喫却服同喫

則吐

君子餅取疳蛔

史君子鷓鴣糞分等

右為末雞子一箇打破併藥為餅蒸熟五  
更初食其虫立可出

根耳湯治蛔心痛右取槐樹上木耳燒作灰  
痛發以棗肉碾和水調服

治小兒虫右石榴皮桑白皮椿皮苦練根皮  
等分為末水煎服

治小兒蠛蝮咬透腹匝即死石川梨葉研爛  
常傅之  
衛生易簡方

治小兒盤腸氣痛用炒茴香延胡索等分爲  
末空心米飲調下量兒大小服之

治諸虫作痛用乾漆炒煙盡二分雄黃一分  
爲末麪糊丸如黍米大量兒大小與服以  
東向石榴根煎湯下或苦楝根或蕪荑煎  
湯皆可

金匱鈎玄

虻虫練樹根爲君佐以二陳湯水煎服  
備預百要方

雜方療

莢莖煮枝汁和作粥甚美以飼小兒殺虻虫