国立国会図書館　　タイトル『金瘡秘術密方』　請求記号 す-101

金瘡秘密方

す
101

す-101

国立国会
27.6.7
図書館

U28109

国立国会図書館　　タイトル『金瘡秘術密方』　請求記号 す-101

夫金瘡者非内因得外傷良肉刀刃所傷或磁
鋒割損所破雖有淺深皆急卒之変症也故
平常貯置于用器宜為不時備又着席使患
者為圍不當風以軟木綿或絹覆疵口可
防風血出而不止者搏藥能計視疵之淺
深大小裁晒木綿每瘡二枚一枚浸雞蛋
清一枚浸醋應疵數裁木綿每疵為二藥
也又鍼線者古方用桑皮今時用麻作線
塗藥搏鍼又從傷處作卷木綿温燒酒如
斯調設畢向患人開疵用燒酒能洗疵去
瘀穢如法縫之畢以雞蛋木綿貼瘡上其上
貼醋木綿又其上如法卷木綿也換貼菜日一

国立国会図書館蔵書
富士川家蔵
国立国会図書館　タイトル『金瘡秘術密方』　請求記号　す-101

夫金瘡者非内因得外傷良肉刀刃所傷或磁
鋒割損所破雖有淺深皆急卒之変症也故
平常貯置于用器宜為不時備又着席使患
者為圍不當風以軟木綿或絹覆疵口可
防風血出而不止者搏藥能計視疵之淺
深大小裁晒木綿每瘡二枚一枚浸雞蛋
清一枚浸醋應疵數裁木綿每疵為二藥
也又鍼線者古方用桑皮今時用麻作線
塗藥搏鍼又從傷處作卷木綿温燒酒如
斯調設畢向患人開疵用燒酒能洗疵去
瘀穢如法縫之畢以雞蛋木綿貼瘡上其上
貼醋木綿又其上如法卷木綿也換貼菜日一
二次切去縫絲或五日或七日是則大法也疵
有大小淺深極難言是举大綱也委詳受口
授可覺知矣

證治論

誤傷者心不動而失血其症輕自刎者心大動
而失血其症重或自割其皮自切其肉倘無激
忿而傷之其症猶在輕重之間惟涕泣而刎頸
欝怒而断刺其症皆重也蓋破傷血失則止
有一線之氣相養使五臟平和尚可補氣以
生血活血以生肌也苟或求死不得而傷心
更甚補氣以至添嗔活血必至開裂安能服

国立国会図書館 タイトル『金瘡秘術密方』 請求記号 す-101

斯調設畢向患人開疵用燒酒能洗疵去
瘀穢如法縫之畢以雞蛋木綿貼瘡上其上
貼醋木綿又其上如法卷木綿也換貼菜日一
二次切去縫絲或五日或七日是則大法也疵
有大小淺深極難言是舉大綱也委詳受口
授可覺知矣

證治論

誤傷者心不動而失血其症軽自刎者心大動
而失血其症重或自割其皮自切其肉倘無激
忿而傷之其症猶在軽重之間惟涕泣而刎頸
麝怒而斷刺其症皆重也蓋破傷血失則止
有一線之氣相養使五臟平和尚可補氣以
生血活血以生肌也苟或求死不得而傷心
更甚補氣以至漆嗅活血心至閉裂安能服
藥以收功乎必須勸其解怒以平肝消愁
以養脾寛懐以安心然後用補氣補血之
藥而佐之止痛生肌之味始可奏効否則
瘡不能愈而命不可奪也淺者皮破血流
而已深者筋斷血飛不止或損骨或截落
手足至重無限也皮破者桃花散摻之其血
自止定痛筋斷者乳牡檀摻扎止後又流者
此症急用神仙奇功散塗傷處嚴蓋扎其血
方止斯人面色必黄外避風寒内忌冷物終
保無妨有失血過多者獨参湯八珍湯安栄
湯類参考而撰用補助為要又始傷之時半
傷其筋栄衛不通其瘡雖愈後仍令痺
不仁也若被瘡截断諸解身軀肘中及腕膝
離若躁際又可連續須急血氣未寒際搏茶
如法縫之如法貼藥筋骨断落者愈後直

国立国会図書館　タイトル『金瘡秘術密方』　請求記号　す-101

藥而佐之止痛生肌之味始可奏効否則
瘡不能愈而命不可奪也淺者皮破血流
而已深者筋斷血飛不止或損骨或截落
手足至重無限也皮破者桃花散摻之其血
自止定痛筋斷者乳㿗檀摻扎止後又流者
此症急用神仙奇功散塗傷處嚴蓋扎其血
方止斯人面色必黃外避風寒內忌冷物終
保無妨有失血過多者獨參湯八珍湯安榮
湯類參考而撰用補助為要又始傷之時半
傷其筋榮衛不通其瘡雖愈合後仍令痺
不仁也若被瘡截斷諸解身軀肘中及腕膝
髀若踝際又可連續須急血氣未寒際搏茶
如法縫之如法貼藥筋骨斷落者愈後直
難屈伸若碎骨不公令人痛煩轉血不絕
不絕者不得安諸中傷人神十死一生凡
金瘡通內血多內漏若腹脹滿兩脇脹不能食
者死內漏瘀血搏在內腹脹脉卒大者死脉沈
者死內漏血在肢不出以壯丹檮細羅為散不計
時候以溫酒調下二戔瘀血在肢中用大麻仁三
斛葱白十四枚搗熟水九升煮二斛半頓服血
出不盡更服又治內漏方蒲黃當歸各等分
為末相和更研令勻每服以溫酒調下二戔日
四五服矣病原候論曰金瘡冬月之時衣厚
絮溫故裹欲薄夏月之時衣單日涼故裹衣
欲厚重寒傷榮重熱傷衛筋勞結息內勞驚
瞳骨勞者沸難可屈伸血脉勞者變化作癰
榮衛不通留結成瘜云々實是為定則宜臨機
應變下手矣

主藥並製法

桃花散石灰一味寒中浸水陰干端午日以韮汁

国立国会図書館　タイトル『金瘡秘術密方』　請求記号 す-101

應変下手矣

●主藥並製法

桃花散 石灰一味 寒中浸水陰干端午日以韮汁煉又陰干加麒麟血石灰五分之一細末傅瘡上木綿縛之

乳牡檀方 乳蛎 紫檀 先入雞子白于皿中日乾削取各等分細末傅瘡上

神仙奇功散方 治出血過多不止者 龍骨剉少炒 草活 鹿茸去毛少黄色炒 突厥白各一両 烏樟根三両 已上六味細末傅瘡上即止又調温酒服之日三度

蛮黄散 治金瘡深入血内漏入者有口訣

蛮虫三十匹去翅足少炒 水蛭三十匹少黄色炒 逃一両浸湯去皮芽入麥粉々々黄色炒去麦粉 逃許用 桂心一両五戔 降三両別碎少炒 已上為細末每服二戔用童便一鍾煎五分共滓温服日五服夜三服若無童便則換用水或酒 右服訖即胡粉二両干姜二分生栗子二分陰干去皮渋已上細末傅疵

骨續蜘蛛泥方 山蜘蛛生研 牛額草 山藥 常盤艸 小麥殼黒燒 各等分研合搏瘡口其上以柳皮裹之又其上結置也

又方濱晒蛤貝細末調糊搏瘡上其上以紙蓋之

金瘡打撲骨續筋渡方外用朴黄散内服參黄湯

朴黄散方 糸生 栢生 翕生各小分 已上三味以無灰酒煉開瘡口摻之腦出愈

參黄湯方 人參 舶 浮靈 降各二戔 尾 鋌 蛇床子各三戔 露二両 草 空 菅各二戔 貴一両 兜三戔 雛一両 已上水煎温服

裁落接指方 蘇木細末搏指切口續合蚕繭裹縛置數日愈

又此方搏刀箭傷其効如神

治金瘡或壓傷而瘀血在内胸腹腫滿喘急者方

尾 降各二両 已上細末每腹二戔和調童便酒服之

數日愈

又此方搏刀箭傷其効如神

治金瘡或壓傷而瘀血在内胸腹腫滿喘急者方

尾、降各二兩 已上細末每腹二戔和調童便酒服之

主治金瘡内腐爛生蛆者方 水飞皂莓細末捻掛之蛆即死

治金瘡腐肉方 土丹一兩水飞少炒 天一石一兩黄色煆置地上出火毒

右細末傅瘡上化腐肉為黄水去肉肌作薄紅色用左茱

治金瘡不愈者方 花蕊石一兩 乳日 没日 先乳没為細末花蕊石煆炭火中為紅色取出入二味内蘸出烟又煆石又蘸二味烟出為度置地上去火毒細末塗之

治金瘡筋斷脉絶血盡已至危篤者方 瓦三兩 姜黄一兩 赤石茱二兩 菅一兩 已上四呆細末先以繩索或絹帯之類縛留血路此茱調茶搏瘡上其上絹縛置即止腫頓消若金瘡水腫灰白色者韮汁敷瘡口四傍火少灸或稻稈烟薰水出即愈

治金瘡出血過多昏暈者方 芎黄散加童便與酒一盞宛熱服即快或三黄湯或獨參湯之類從症撰用

治金瘡狂氣者方 翕尾人參各等分細末炊米汁調下日五度三日服之無不愈者矣

納治金瘡出腸者手術口授

右納畢如法縫纏瘡口若雄雞冠血塗瘡上如法卷木綿一宿翌旦換搏止痛生肌散或花蕊石散而後磁石三兩燒紅色能浸醋鉄精三兩滑石三兩各為細末附瘡上又磁石一兩作細末粥調下日三四服或花蕊石散細

治金瘡出血過多昏暈者方 芎黄散加童便與酒一盞宛熱服即快或三黄湯或獨參湯之類從症撰用

治金瘡狂氣者方 翕尾人參各等分細末炊米汁調下日五度三日服之無不愈者矣

納治金瘡出腸者手術口授

右納畢如法縫纏瘡口若雄雞冠血塗瘡上如法卷木綿一宿翌旦換搏止痛生肌散或花蕊石散而後磁石三兩燒紅色能浸醋鉄精三兩滑石三兩各為細末附瘡上又磁石一兩作細末粥調下日三四服或花蕊石散細末温酒送下亦可也

止痛生肌散 治金瘡止痛生肌肉遲不能收歛者或多骨疽腐骨脫出不能收口者此茶搽之 膏 輕粉 赤石脂各一兩 黄丹水飛二錢 龍骨 血衄 乳 朝脳各三錢 已上八味為細末先用甘艸當歸白芷各一錢煎湯洗淨患上用此乾摻軟油紙蓋扎二日一洗一換

花蕊石散 治跌撲傷損及金瘡箭傷斷筋損骨疼痛不止新肉不生者並効 乳 没 巨浮 細 牛 蛇含石便煅二次 翕 菅 降香 尾星 蘇木 檀香 龍骨 輕粉各二錢 麝香三分 花蕊石童便煅七次五錢 已上共研極細罐收聽用葱湯洗淨用此摻之軟綿紙蓋扎一日一換有神効然後做金瘡療方

治破傷風方 有口訣 巨 虎 草 藁 尾 鋌 露各四兩 以上七味每服四錢水二鍾煎一鍾

花蕊石散　治跌撲傷損及金瘡箭傷斷筋損骨疼痛不止新肉不生者並効　乳沒　巨浮　細　牛　蛇含石便煅二次　翕　菅　降香　尾星　蘇木　檀香　龍骨　輕粉各二錢　麝香三分

花蕊石童便煅七次五錢　已上共研極細罐收聽用葱湯洗淨用此摻之軟綿紙蓋扎一日一換有神効然後做金瘡療方

治破傷風方　有口訣　巨　虎　草　藁　尾　鋌　露各四兩　以上七味每服四錢水二鍾煎一鍾去滓温服若有熱者加腸大便閉者加降一兩

治破傷風腫痛寒熱者方　星　虎各一兩　已上二味作細末調香油搏瘡口又潤香油調温酒服一錢發汗則治　又治牙齒禁閉者此藥二錢入古酒与童便少許服有効若不愈者再服有即功

又方　定　菅　草各二錢　草烏頭　雄黃各一錢

右五味和酒丸桐子大每服十丸温酒送下

治破傷風禁口不語言者方　赤箭一兩　桂心　防風各三分　巴豆仁去皮心研紙包去油　走三分去皮大腑紙包爐温灰中　吳五錢浸湯七度焙干少炒　朱砂一兩水飛　乾蝎五錢生　已上八呆細末以醇酒三升煎為膏丸梧桐子大每服三丸不拘時氣用熱葱酒服發汗有効矣

大尾

古予家技而自祖先傳之秘術密方也今般依

台命令傳授之早誓而勿他見倘於瘡瘍醫之輩宜還附也

治破傷風腫痛寒熱者方　星　虎各一兩　巴上二
味作細末調香油搏瘡口又潤香油調温酒服
一錢發汗則治　又治牙齒禁閉者此藥二
錢入古酒与童便少許服有効若不愈者再服
有即功
又方　定　萑　草各二錢　草烏頭　雄黄各一錢
右五味和酒丸桐子大每服十丸温酒送下
治破傷風禁口不語言者方　赤箭一兩　桂心
防風各三分　巴豆仁去皮心研紙包去油　走三分去皮大腎紙包爐温灰中　吳五錢
浸湯七度焙干少炒　朱砂一兩水飛　乾蝎五錢生　已上八呆細末以醇
酒三升煎為膏丸梧桐子大每服三丸不拘時氣
用熱葱酒服發汗有効矣
大尾
古予家技而自祖先傳之秘術
密方也今般依
台命令傳授之早誓而刃他
見倘於瘡瘍醫之輩宜還
附也
于時文政九丙戌
初冬
百濟養軒重國
春發宣紙堂

生々乳ヲ用ユルヿ大抵十分一ヲ度トス痛軽キ
者ハ二十分ヲ度トス重キ者ハ生々乳三匁四匁ニモ
及ヘシ月々霜少キヲハ此薬ヲ服シ疲レシキ大草
辰砂少キトキハ呕逆ノ患アリ尤配セズンハ有ヘカラス
鉛丹入ルヲハ諸薬ヲ鎮墜シ口中腐爛ノ患ヲ免ル
必加入スベシ
先ツ本国方通ニ丸薬ニシテ初メニ鉛丹ヲ衣ニシ后
其上ニ又辰砂ヲ衣トス
用ル法軽症ニハ一分五厘位重キ症ニハ三分四分
迄一日ニ両度位砂糖湯ニテ用ル
凉膈かせ石山帯末　三貼了　口傳
便秘セハ梅肉丸ヲ夜中遅シ見許ニ用ユ症ヨリ毎晩
用ユ

国立国会
27. 6. 7
図書館
u 28109

国立国会図書館　タイトル『金瘡秘術密方』　請求記号 す-101
紙背