本草匯　十

伊藤大八郎寫記

特 7
9
493

蟲部
禽部
十八　人部
水部

鱗部
獸部
金石部
火部

介部
服器部
土部

共十

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

特7-493

岡氏文庫

# 本草滙卷十七目次

## 蟲部


蜂蜜 三百三八
露蜂房 三百四十
桑螵蛸 三百四二
蠶繭 已出蛾者 三百四四
原蠶沙 三百四六
蚱蜢 卽全蠡三百四八
水蛭 三百四九
蠐螬 三百五十
黃白蠟 三百三九
五倍子 一名文蛤三百四一附百藥煎
白殭蠶 三百四三
原蠶蛾 三百四五
斑蝥 三百四七芫青葛上亭長地膽附
蜣中蛆 三百五一




堀氏文庫

国立国会図書館　タイトル『本草匯卷1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

螻蛄 一名土狗 三百五二
蜚蠊 卽蜚蠊蟲 三百五
蜈蚣 三百五七
蝸牛 三百五九
鱗部
龍骨 三百六十 附紫梢花
鯪鯉甲 卽穿山甲 三百六二
蛇蛻 三百六四
烏梢蛇 三百六六
蠶蟲 卽地鼈 三百五三
蟾蜍 三百五五
蚯蚓 三百五八
龍齒 三百六一
蛤蚧 三百六三
白花蛇 卽蘄蛇 三百六五
青魚膽 三百六七
鰻鱺魚 三百六八
鱓魚 三百六九
烏賊魚骨 卽海螵蛸 三百七十 腹中墨附
鯽魚 三百七一
海馬 三百七三
河豚 三百七二
介部
龜甲 三百七四
鼈甲 三百七五
蟹 三百七六
牡蠣 三百七七
真珠 三百七八
石決明 三百七九
文蛤 三百八十
蛤蜊粉 三百八一


国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

禽部
鴨 三百八二
鷓鴣油 三百八四
雞子卵殼卵皮卵中白皮嬭雞湯俱附
雄雀屎 一名白丁香 三百八七
五靈脂 即寒號禽糞 三百八九
啄木鳥 三百九一
獸部
猪脊髓 三百九三
猪膚 三百九四
狗肉 三百九五
犍牛肉 三百九七 附倒倉法
阿膠 三百九九
虎骨 四百一
犀角 四百三
羚羊角 四百五
鹿角 四百七 麋角附
麝香 四百九
明月沙 四百一十一
羚羊肉 三百九六 血腎肝附
酥 三百九八
牛黃 四百
象皮 四百二
熊膽 四百四
鹿茸 四百六
白膠 即鹿角膠四百八 霜附
兔肝 四百十
獺肝 四百十二

鼠膽 四百十三 壯鼠及春骨附
膃肭臍 即海狗腎 四百十五

兩頭尖 即牡鼠屎 四百十四



# 本草滙卷十七

吳門郊西郭佩蘭章宜纂輯

男　樹畹芳谷　參閱
姪　維均梅在　參閱

紫藤陳陸坤白筆校訂

## 蟲部

**蜂蜜** 三百三八

味甘溫平。入手太陰足太陰經。和榮衛。潤臟腑。通三焦。調脾胃。潤口瘡。和百藥。除煩燥。導便結。

按蜂蜜採百花之英。合雨露之氣而釀成。其氣清

蜂蜜波知義知皆曰出和州十津川及石州長州近年渡海者多以沙

和。其味甘美。得中和之氣。故氣血虛實寒熱溫涼之症。十二藏之病。無不宜之。生則清熱。熟則補中。甘則解毒。柔則潤燥。張仲景治陽明燥結大便不通。蜜煎導法。誠千古神方也。性喜入脾。宜於西北高燥而不宜於東南卑濕。然多食亦生諸風濕熱。蟲蜃大腸虛滑者。雖熟蜜亦在禁例。同葱食。害人。同萵苣食。令人下利。食蜜飽後。不可食鮓。令人暴亡。與姜汁熬煉。治癩極効。凡煉蜜。一勷入水四兩。銀石器內。慢火煉掠去浮沫。至滴水不散為度。生者有毒。酸者勿食。色白如膏者良。試蜜以燒紅火筯插入提起。出氣是眞。起烟是僞。川蜜溫。西蜜涼。閩廣蜜熱。

蜜蠟　美知良宇康賴曰美知乃加須

黃白蠟　三百三九　味淡濇。溫。黃者治下痢膿血。白者療漏瀉後重。　按蠟即蜜之凝結於底者也。萬物之味。莫甘於蜜。莫淡於蠟。蜜之氣味俱厚而屬于陰。故養脾。蠟之氣味俱薄而屬乎秋。故養胃。厚者味甘而性緩。質柔。故潤臟腑。薄者味淡而性濇。質堅。故止漏痢。張仲景治痢有調氣飲。黃蠟三錢。阿膠三錢。同化。入黃連末五錢。分三次熱服。千金方治痢有膠蠟湯。用蠟二錢。阿膠二錢。當歸二錢半。黃連三錢。黃蘗一錢。陳

蝎者皆不宜服。露天樹上者爲最。炙末用。惡乾姜丹參黃芩芍藥牡礪。

**五倍子** 一名文蛤。三百四十一 味苦酸濇。氣薄味厚。斂也。降也。入手太陰足陽明經。斂肺化痰。止嗽有效。生津降火。斯消渴相宜。上下之血皆止。陰陽之汗咸瘳。自盜汗者用倍。初起無頭末。津調塡臍中縛住。一夜卽止。瀉痢久而能斷。腫毒發而能消。五倍爲末。水調塗四圍。或一味蜜調塗。糝口瘡。須臾可食。五倍一兩。末。先以滑石半兩。黃栢蜜炙半兩。爲末。漱淨摻之。便可飲食。洗脫肛。頂刻能收。五倍爲末。艾紙捲五倍末成筒。放便桶內。乘盛。令病者坐上。以火點着。使藥烟透入肛門。其肛自上。隨後將白礬爲

五倍子布志康賴曰美二布之

露蜂房波知乃須本中和名曰於保波知乃須



米半升。黃米熟。去米入藥。煎一鍾溫服。效甚捷。蓋有見於此。火熱暴痢。不宜用。貼瘡。生肌止痛。合大棗咀嚼。卽易爛。惡芫花。

**露蜂房** 三百四十一 味鹹甘。溫。有毒。入陽明經。拔疔腫附骨之根。合亂髮蛇皮。燒灰。爲末。以酒日服。止風蟲牙齒之痛。用鹽實蜂房孔內。燒末。擦之。鹽湯漱去。或用房帶綿包咬之。或同醋煎熱漱之。起陰痿。蜂房蟬蛻等分。爲末。酒服一錢。日三。洗乳癰陰寒痠弱。房灰水服。可御十女。傳陰上。卽熱起。而治風氣。蜂房蟬蛻等分。爲末。酒服一錢。日三。洗乳癰而塗瘰癧。按蜂房。卽黃蜂之窠也。性有毒。以其得火氣之甚也。外科方多用之者。皆取其以毒攻毒。兼殺蟲之義耳。若病屬氣血虛。與夫癰疽潰後。元氣乏

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

末。搽於肛門。即不脫。**染鬚髮之白。**聖濟總錄。用針砂八兩。米醋浸五日。炒略紅色。研末。五倍子。百藥煎。沒石子。各二兩。訶蔾勒皮三兩。研末各勻。先以皂莢水洗髭鬚。用米醋打喬麥麪糊。和針砂末傅上。荷葉包過一夜。次日取去。以蕎麥糊四味。敷之一日。脫去。即黑。　杏林摘要。用五倍一觔。研末。銅鍋炒之。勿令成塊。如有烟起。即提下攪之。從容上火慢炒。直待色黑爲度。以濕青布包扎。足踏成餅。收貯聽用。五倍子一兩。紅銅末。每用時。以皂角水洗淨鬚髮。酒炒一錢六分。生白礬六分。訶子肉四分。沒石子四分。研炒一分。爲末。烏梅酸榴皮煎湯。調勻碗盛。重湯煮四五十沸。待如飴狀。掠刷於鬚髮。一時。洗去再上。包住。次日洗去。再以核桃油潤之。半月一洗。甚妙。**治目爛之痾。**焙存性爲末。入飛過黃丹少許傅之。日三上。或單五倍子研末傅之。**陰囊濕瘡出水。**同蠟茶膩粉慈湯洗。繼以油調頭癩熱瘡風癬。偕臼芷爲末收膿水。

乾上清油。　按五倍子。乃蟲食木之津液結成者。得木氣而兼金水。性最急燥。善收頑痰。解熱毒。佐他藥尤良。其味酸鹹。故能斂肺止嗽。化痰止渴。收汗。其氣寒。故能散熱毒瘡腫。其性收。故能除泄痢濕爛。若咳嗽由於風寒外觸。肺火實盛者。誤服。則火氣無從泄越矣。黃昏咳嗽。乃火氣浮入肺中。不宜用涼藥。宜五倍五味。斂而降之。**瀉痢非虛脫者。忌之。風毒攻眼。癢澀痛爛不可忍者。用五倍一兩。**蔓荊一兩。爲末。服二錢。餘以水二鍾。銅石器內煎汁去滓。乘熱洗。查再煎。大能明目去澁。山海經作五構。其形似海中文

百藥煎今案阿世辛也久

蛤。故亦同名。又名百蟲瘡。會意也。蜀中者爲勝。生於鹽膚木上。圓長不等。綴於葉間。其殼堅脆中空。有細蟲如蟻螻。采蒸去蟲用。百藥煎功與五倍子不異。但經釀造。其體輕虛。其性浮收。且味帶餘甘。治上焦心肺咳嗽痰飲熱渴諸病。尤爲相宜。皮工造以染皂色。大爲時用。附造法用五倍子爲粗末。每一觔用眞茶一兩。煎濃汁。入酵糟四兩。擂爛拌和。器盛。置糠缸中暑之。待發起如發麪狀。卽成矣。捏作餅九。晒乾用。又方以五倍一斤研末。酒麪半觔。細茶一把研末。用小蘗汁調勻。入甕器中。蓋緊。以稻草封固。過一七後。長出霜。作餅晒乾用。

螳螂桑螵蛸今案伊保志利乃久和乃況乃須酷曰源順和名伊保先之利按俗加末岐利酷曰延喜式曰於保知加不久利

## 晒乾用。

桑螵蛸 三百四十二味鹹。氣平。氣薄味厚。陰也。入足少陰太陽厥陰經。止夢寐遺精。療血閉腰痛。治產後遺尿。理婦人轉胞。 按桑螵蛸。桑樹上螳蜋子也。稟秋金之陰氣兼得桑木之津液。爲肝腎命門之藥。男子以腎爲本。腎虛則五臟氣微。陰痿失精。故古方於男女虛損。腎衰遺溺。白濁陰痿。不可闕也。凡失精遺溺。火氣太盛者。少少用之。凡使勿用雜樹上生者。取桑上者。以熱漿水浸一日。火炙用。不則令人吐。此物一生



国立国会図書館 タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』 請求記号 特7-493 ガラス使用

九十九子。用一枚。即傷百命。仁人君子。聞之且當慘然。況忍食乎。得龍骨。療泄精。畏旋復花。

白殭蠶　三百四十三　味鹹辛溫。有毒。氣味俱薄。浮而升。陽中之陽也。入足厥陰太陰少陽經。治中風失音。口喎。面瘡。下咽立効。祛腹內龜背如磚硬。過時即軟。殭蠶同立軟如綿。

白殭蠶蠶之病風死者也。死而不朽。故名曰殭。屬火而兼土與金水。喜燥惡濕。能入皮膚經絡。逐皮膚蟲癢。散痰氣結滯如果實。療身膚蛇體如甲鱗。此由氣血痞塞。亦名胎垢。殭蠶去嘴為末。煎湯浴之。二加蛇蛻。理咽喉腫痛及喉痺。發散諸邪熱氣。祛風化痰之要藥也。元素曰。能去皮膚諸風如蟲行。



蓋厥陰陽明之藥。故又治諸血病。瘧病。疳病也。有餘之邪。及外邪為病者。宜之。今治小兒驚風。不問虛實。一概混施。誤之甚矣。

米泔浸一日。待涎浮水上。焙去絲及黑口。惡系螵蛸桔梗茯苓。蕳蘇。薑汁為之佐。頭蠶白直者。隹。

蠶繭　已出蛾者。三百四十四　甘溫。癰疽瘡無頭者。燒灰酒服即破。瘡疥膿爛者。填罅縫。假末摻良。按蠶繭。屬火。有陰之用。能瀉膀胱中相火。引清氣上朝於口。故能止消渴也。方書多用。而諸家本草並不及。誠闕文也。近世用治

癰疽代鍼用一枚卽出一頭二枚卽出二頭神効無比。

原蠶蛾 三百四五 味鹹氣溫小毒入足少陰經止精强陰。按原蠶蛾卽第二原蠶沙加伊呂久曾

交接不倦助陽起痿收泄固淋。

番蠶也其性最淫出繭卽媾至於枯槁乃已故强陰益精用之取未交雄蛾二升去頭足翅炒爲末蜜丸梧子大每夜服一丸可御十室以菖蒲酒止之。雄者入藥炒去頭足翅用。

原蠶沙 三百四六 味甘辛溫熨風痺及一切關節皮膚不能勝風去濕故蠶沙主療風濕之病病風癱緩者用醇酒三升拌蠶沙五斗甑蒸擇暖室中鋪油單紙上令患人臥於沙上厚蓋取汗虛人須露頭面未愈再作風弦爛眼以眞麻油浸蠶沙二三宿研細塗爛處。隔宿卽愈若無外邪風濕侵犯者忌之。淘淨晒乾用以飼牛可以代穀。

斑蝥 三百四七 味辛鹹寒大毒入手太陰陽明太陽足太



斑蝥未多良牟之又曰未米牟之皆日按必二大豆葉上有之

遂性溫燥除一切宿冷風濕癱緩。按原蠶沙卽第二番蠶所出之屎蛾與沙俱晚者爲良屬火性燥燥能勝風去濕故蠶沙主療風濕之病病風癱緩者用醇酒三升拌蠶沙五斗甑蒸擇暖室中鋪油單紙上令患人臥於沙上厚蓋取汗虛人須露頭面未愈再作風弦爛眼以眞麻油浸蠶沙二三宿研細塗爛處。隔宿卽愈若無外邪風濕侵犯者忌之。淘淨晒乾用以飼牛可以代穀。

斑蝥 三百四七 味辛鹹寒大毒入手太陰陽明太陽足太

陰經。破血結而墮胎孕。散癥癖而破石癰。拔疔腫之毒根。下風狗之惡物。九死一生。急用斑蝥七個。以大米炒黃。去米爲末。酒一盃煎。空心溫服。取下小狗爲度。如少。數日再服。本經主鼠瘻疽瘡疥癬。以其性能傷肌肉。蝕死肌也。按斑蝥。能使其根從小便中出。或人肌肉。即爲潰爛。毒可知矣。能追逐腸胃垢膩。復能破結走下竅。直至精溺之處。蝕下敗物。惟瘰癧癰顛狗被咬。或可制度如法。暫施。能使其根從小便中出。或如粉片。或如爛肉。皆其驗也。但痛不可當。以木通滑石燈心。輩道之。雖假性猶能嚙人腸胃。發泡潰爛致死。用者斟酌。切戒切戒。

七八月間生大豆葉上。黃黑斑文。尾後惡氣射出。臭不可聞。凡使用。糯米拌炒。至米黃黑色。去頭翅足用。一法用麩炒過。醋煮用。然不若用米取氣勿用。質爲穩。另有芫青（即青娘子。）其毒尤猛。色純青。綠背。生於芫花上。產寧州。又（葛上亭長）黑身赤頭腹中有卵。白如米粒。葛葉上採之。出雍州。又地膽（如大螞蟻。黑頭赤尾。在地中。或墻石內。）性治功用。皆與斑蝥無別。故不存文。案。皆是殺命之藥。用者愼之。

畏巴豆丹參甘草豆花。惟靛汁黃連黑豆葱茶。



芫青今案阿於未久良年志葛上亭長久呂年志

能解其毒。

蚺蛸音伊祁 即全蠍。三百四八 甘辛。有毒。入足厥陰經。善逐肝風深透筋骨。大人中風不遂。手足抽掣要矣。小兒驚癇臍風。慢脾天鈞需焉。按全蠍。風藥也。色青屬木。專理肝胆家症。故風客是經。非此辛溫走散之物。則不能祛風逐邪。入達病所也。蠍乃活風要藥。若似中風及小兒慢脾風病。屬於虛者。法咸忌之。出青州者獨勝。去足炒用。全用者爲全蠍。單用尾。謂蠍稍。其力尤緊。雄者螯人痛在一處。井泥傅之。雌者痛牽諸處。兩溝下泥傅之。或在手足。以冷水漬之。微暖即易。在身。以水浸布搨之。皆驗。古今錄驗云。被蠍螫者。但牛塗。毒即解散。蝸常食蠍也。

水蛭 三百四九 味鹹苦。寒。有毒。除瘀血。破血癥。血積。血勞。入堅結。利若鋒針。逐惡血。快如砭石。按水蛭。生於溪澗陰濕之處。乃食血之蟲。能通肝經聚血。爲攻血要藥也。成無已云。鹹走血。苦勝血。故畜血欲除。必用此。加麝香少許。同酒而下。則畜者立行。世醫多知百病之生於氣。而不知亦

有生於血者。蓋血猶水也。水行則無壅滯之患矣。一或疑滯於經絡腸胃之間。血症由此而作。所以抵當湯中。用水蛭蠐蟲。施於胍之沉滑數實。以鹹苦泄畜血也。但此物難斷制。煆苟存性。入腹便活。嚙人腸臟。非細故也。莫若四物湯加酒浸大黃各半。下之尤妙。奚必用此難制之惡藥也。談野翁方。有紛染白髮。用水蛭爲極細末。以龜水調撚鬚稍。自行入根也。以龜放荷葉上。用鏡照之。俟龜頭出。尿即得矣。一用白烏骨鷄殺血入瓶中。納活水蛭數十於內。待化成水。以豬胆皮包指蘸撚鬚稍。自黑入根也。凡用烈日晒乾。剉細炒極熟。腹中有子者去之。若誤食。生子爲害。惟用田泥和水數碗飲之。蓋得土氣而下耳。或以牛羊熱血。同豬脂飲之。亦下也。牛食蛭。以梅醬水喂之即解。畏石灰食鹽。

糞中蛆　三百五十

氣寒。治疳痰疳瘡。療癉積熱痢。　按蛆。即蠅之子也。凡物敗則生蛆。當治小兒疳積之病。張子和治癰疽瘡瘍生蛆。以木香檳榔散末。傅之。若生於瘡瘡。用猪肉片引出。以黎蘆貫衆白斂末。用香油調敷。



糞中蛆皆曰和名久曾辛之又曰辛棄加乇之

膜蜻和名知无之又云世美乃毛奴計

**蟬蛻** 三百五一 味鹹甘寒。入手太陰足厥陰太陰經。快瘡疹之毒。宣皮膚之風。小兒驚癇夜啼。用四十九箇去末。分四服。釣藤湯或薄荷湯下。若用前截。即復啼矣。目疾昏花翳障。按蟬蛻。乃土木之餘氣所化。飲風吸露。其氣清虛。故主療皆一切皮膚風熱之症。蟬性蛻而退翳。蛇性竄而祛風。又主啞病夜啼者。取其晝鳴而夜息也。瘡疹虛寒證不得服。凡使。沸湯洗去泥土翅足。漿水煮過。晒乾用。

**螻蛄** 一名土狗。三百五二 鹹寒。有毒。通便而二陰皆利。逐水而十種俱平。端午日取螻蛄陰乾。分頭尾焙收。治上身用頭末七個。治腹末七個。治下用尾末七個。治中用四十九箇去末。分四服。釣藤湯或薄荷湯下。若用前截。即復啼矣。目疾昏花翳障。按蟬蛻。乃土木之餘氣所化。飲風吸露。其氣清虛。故主療皆一切皮膚風熱之症。蟬性蛻而退翳。蛇性竄而祛風。又主啞病夜啼者。取其晝鳴而夜息也。瘡疹虛寒證不得服。凡使。沸湯洗去泥土翅足。漿水煮過。晒乾用。

**螻蛄** 一名土狗。三百五二 鹹寒。有毒。通便而二陰皆利。逐水而十種俱平。端午日取螻蛄陰乾。分頭尾焙收。治上身用頭末七個。治腹末七個。治下用尾末七個。食前酒服。小便閉者。用下截焙乾為末。水服半錢立通。俱要忌鹹一百日。面浮者。用土狗一個。輕粉二分半為末。每滴少許入鼻內。黃水出盡為妙。貼瘰癧。治石淋。按螻蛄自腰以前甚澀。能止大小便自腰以後甚利。能通二便。治水甚效。但其性急。虛人戒之。

**蚯蚓** 即地鼈。三百五三 味鹹苦寒。有毒。入手少陰足太陰厥陰經。去血積。搜剔極周。主折傷。補接至妙。煎含而生。去翅足炒用。入藥用雄。雄者善鳴而飛。雌者腹大羽小。不善飛翔。吸風食土。喜就燈光。或用火燒地。置蚯於上。任其跳死。覆者雄。仰者雌也。



蠶蟲康賴和名曰於米无之

本舌旋消。用五枚。同食鹽半兩爲末。水服而乳漿立至。按蠮螉。專主血症之劑也。以刀斷之中有白汁如漿。凍即連行。故今人以之治損傷續骨有効。乃足厥陰肝藥也。殊不知有瘀血作疼者。誠爲要藥。倘無瘀血而其傷在筋骨臟腑之間。法當和補者。豈可妄投。仲景有大黃䗪蟲丸。以其有攻堅下血之功耳。若虛癆毋者。乃必須之品也。然虛人亦須斟酌用。似鼈無甲。生於壁墻土壤中。去足焙存性用。畏皂莢菖蒲。一名過街。逢申日則過街也。



蠮螉　即蛣蜣。三百五四　苦寒。有毒。入足厥陰血分。攻血遍行經絡。墮胎只在須臾。除賊血在胸腹五臟。療喉痺與結塞不通　按蠮螉青綠入肝。專敗牛馬之血。仲景用以逐血。因其性而取用者也。故血結不行者。以此攻之。若氣虛之人。實有畜血者。不可輕用也。取腹有血者。去足翅炒。惡麻黃

蠮螉　音三百除五五　辛凉。微毒。入陽明經。主小兒勞瘦疳疾。治一切五疳八痢。用大蠮螉一枚存性。皂角去皮弦一錢。蛤粉水飛三錢。麝香一錢。爲丸。空心飲下。名五疳保童丸。又治疳積骨立。用立秋後大蝦蟇。去首足腸。以清油塗之。菟土炙熟食

蠮螉　比充加比笛源須和名曰比岐皆曰按左土比岐

蜚蠊　安布

之。積藏自下。連服五六枚。一月之後自愈。消時瘡發背之毒。未成者。用活蠔蜍一箇。繫放瘡上半日。蠔必昏憒。置水中救其命。再易如前法。三者之後。其蠔如舊。則毒散矣。若勢重者。以活蠔破開。連肚乘熱合瘡上。不久。必臭不可聞。如此二三易。其腫自愈。勿以微物見輕也。理冷癖食土之病。按蠔蜍。屬土與水。應月魄而性靈異。濕化之物也。過用能發濕助火。爲疳病疽瘡之要藥。以其能攻拔疔毒也。別錄謂蝦蟇。一名蠔蜍。誤矣。蠔蜍。多在人家下濕處。形大背多疣磊。行遲不能跳躍。亦不解鳴。銳頭皤腹。腹下有丹書八字。促眉濁聲。蝦蟇。多陂澤間。形小作呷呷聲。皮上多黑點。能跳躍。極急。

蠔酥比元加倍
蛮乃阿布良

今世用者。皆蠔蜍而非蝦蟇也。其味大辛。善能發汗。其毒在眉稜皮汁中。去皮腸爪。洒浸一宿。酥炙乾用。目赤。腹下無丹書八字者。不可用。〔膽〕治小兒失音不語。取汁點舌。立愈。

蠔酥 三百五六 味甘辛。温。有毒。入足陽明少陰經。治一切發背疔瘡。療脈絡風邪惡血。按蠔酥。卽蠔蜍眉間之白汁也。有大毒。不宜多食。諸家咸云治小兒疳瘦。恐非正治也。若齒痛。誤入牙根。頭目卽脹大而斃。觀陶氏云。其皮汁大毒。犬齧之唇口皆腫。此其驗矣。惟

疔毒服之。勿過二三釐。亦不過取其以毒攻毒之義耳。然必與牛黃明礬乳香沒藥之類同用乃可。雖外科方有奪命之功。如輕用。亦能爛人肌肉。若瘡已潰。欲其生肌長肉之際。得之作痛異常。不可不知也。

取酥法。以蒜及胡椒等辣物。納其口中。則蟾身白出。以竹篦刮下。乾用。眞者輕浮。入口味甜。不可入目中。令人赤盲。或以紫草汁洗點。即消。

**蜈蚣** 三百五七 辛溫。有毒。陽也。入足厥陰經。治腹內蛇癥。誤食菜中蛇精。成蛇癥。或食蛇肉。腹內常飢。食物即吐。以赤足蜈蚣一條。炙研酒服。驚弟瘡甲。趾甲內惡肉。突出不愈。蜈蚣一條。焙研敷之。外以南星末。醋和調敷四圍。療臍風撮口。但看舌上有瘡如粟大。是也。用東去走蜈蚣。以猪乳調半錢。分三四服。溫灌之。或以指甲刮破。研傅兩頭肉。即愈。

**腹大如箕。** 蜈蚣五條。酒炙研末。每服一錢。以鷄子二箇打開。入末攪勻。紙糊。沸湯煮熟。食一服。不過三次瘳。

**散天蛇** 蜈蚣燒烟薰。愈。或爲末。豬胆汁塗之。療癰瘤墮胎孕蟲毒癖毒。

按蜈蚣稟火金之氣。性善走竄。風氣暴烈。能截能擒。疽毒惡焰。能散能起。貴乎藥病相當。重在酌量作劑。或過劑以蚯蚓桑皮汁服而解之。爲瘡科小兒科緊關藥也。若烟瘴之鄉。多毒蛇氣。人有不服水土。感觸風氣而發蛇瘴者。惟此爲上藥耳。



国立国会図書館 タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』 請求記号 特7-493
ガラス使用

善能制蛇。欲噉其腦。淮南子云。騰蛇游霧而殆於蝍蛆。正指此也。驚風非由烟瘴。積聚非由結痕。咸在所忌。出京口茅山。取赤足黑頭者。以火炙去頭足尾甲。將薄苛葉火煨用。或酒炙亦可。入中其毒。以桑汁白鹽大蒜塗之。或卽以黃土水塗。以黃筒紙薰之。立效。畏蛞蝓。音括于。蝸牛類。卽托胎蟲。蜘蛛。鷄屎。桑皮。白鹽。

蚯蚓　三百五八　味鹹。大寒。有毒。治傷寒伏熱狂謬。能祛腎臟風注脚脛可理。癧風痛癢。棗肉搗丸。美酒下。勞復卽腫。絞汁下飲。索汗良。按蚯蚓。屬土。得陰水之氣。寒而下行。大能行濕病。解邪熱。治足疾。而通經絡也。故脚風藥中必須。又治腎臟風下注病。若入下體成片濕毒瘡。流水痛癢。取其糞。出韭地者。研末。二兩入輕粉。二錢。生桐油調塗之。如脾胃素虛。傷寒非陽明實熱。在所忌也。蛞蝓入耳。爲末入葱內。化水點入。則蛞亦化矣。凡用。以蜀椒糯米各二錢半。同熬至米熟。揀出用。若要水。以鹽日暴。須臾成水。若被咬中毒。惟以石灰水浸之。或鹽湯浸。并飲一盃。

蝸牛　音哇牛　三百五九　鹹寒。有毒。治小兒臍風撮口喉痺。消諸



利。蝸牛加多豆布

腫疔腮蟆蚣蠱毒。按蝸牛。即圓殼蜒蚰也。身有涎。能制蜈蝣。夏熱則自懸葉下。升高涎枯。則自死也。入嬰兒藥最勝。其所主病。大抵皆解熱消毒之功耳。

生池澤草樹間。形似小螺白色。頭有四黑角。以形圓而大者爲勝。其一種扁小者。不堪用。

## 鱗部

### 龍骨 二百六十

甘平。性澁。小毒。陽中之陰。入手足少陰厥陰經。澁精而遺泄能收。固腸而崩淋可止。縮小便而止自汗。生肌肉而收脫肛。本經治嗽逆者。陽虛而氣不歸元也。得此斂攝。則逆自止耳。小兒驚癇。皆由心肝二臟虛熱所致。驚氣入腹。則心腹煩滿。斂攝二經之神氣而平之。以清其熱。則熱氣散而諸病去矣。又別錄縮小便。止泄精者。小腸爲心之府。膀胱爲腎之府。二經之氣虛脫。則小便多而不禁。藏氣斂。則腑亦隨之。故縮便而止泄也。按龍。禀陽氣以生而伏於陰。爲東方之神。性澁氣收。益腎臟。兼入心與腸胃。能燥濕固腸。脫善斂浮越之正氣。有止泄澁精之用。帶脈爲病。此能主之。諸瘡久不收口者。略用最妙。病屬

虛脫者宜之若當通利疎泄者不可用也　産晉地者爲上其骨細文廣者是雌骨粗文狹者是雄五色全具上品白中黃者次黑色者勿用舐之着舌者佳煆赤研細酒浸焙乾水飛蒸晒用稍不細則沾着腸胃晚年作熱喪后膏得人參牛黃良牛黃惡龍骨而龍骨得牛黃更良忌魚及鐵器附（紫稍花）甘溫益陽秘精療眞元虛憊故集簡方治陽事痿弱遺精者同生龍骨各二錢麝香少許爲末燒酒下欲解須生姜甘草湯又治囊下濕癢同胡椒煎湯洗數次即愈

陳自明云此花生湖澤中乃魚蝦生卵於竹木之上狀如餹饊去木用之而孫光憲云海人言此是龍在水邊遺瀝值流槎着木如蒲槌音垂狀其色微青黃復似灰色坐湯多用之當以此說爲正附秘傳（接氣沐）

龍湯　治陽衰久痿滑精不用內服惟主外治大約患此者或由禀弱或由縱欲或憂鬱所致或心腎不交種種不一如緊服辛溫燥熱之劑不惟銷爍眞元禍不旋踵此方用外接之法所以爲妙先兄鳴吉患此二載百藥無濟獲此頓起紫梢花甘草甘遂良姜艾蛉母丁香巴戟天川烏附子吳茱萸川椒細辛淫羊藿蛇床子棟樹子甘松各一兩瓊陽蕤官桂羊皮紅蕪皮滿山紅墜粟殼各二兩紅豆七十粒酒藥內用辣者白頭蚯蚓七條炙倭鉛八兩切薄片勻七劑每日一劑瓦鍋內煎湯先薰後洗

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

以冷爲度晚重溫藥湯再洗如此七日內禁房事。

**龍齒** 三百六一 味澁氣涼入手少陰足厥陰經攻結氣與癲疾治煩悶之熱狂鎮心神安魂魄小兒五驚十二癎大人諸瘂之寒熱。按龍骨入心腎腸胃龍齒則單入肝心故骨兼有止瀉濟精之用齒唯鎮驚安魂魄而已許叔微云肝藏魂能變化故魂遊不定者治之以龍齒即此藥也胍緊病實氣盛火鬱者忌之。製同龍骨。

**鮫鯉甲** 即穿山甲。三百六二 味鹹微寒有毒入足厥陰經兼入手足陽明經除痰瘧通經竅消癰腫排膿血療蟻瘻。按字山甲穴山而居寓水而食能走竄經絡無處不到直達病所爲通經下乳之要藥諺云穿山甲王不留婦人食了乳長流亦言其迅速也。患病在某處即用某處之甲然性猛不可過服瘡瘡元氣不足不能起發者不宜服同乳香沒藥番降香紅麴山查通草童便治上部內傷疼痛。生湖廣嶺南肖鯉而有四足黑色能陸能水凡用之或酥炙便炙醋炙或土炒蛤粉炒或燒或油煎打碎

蛤蚧 三百六十三

蛤蚧今案於保伊毛利又云波世古伊今云阿无加宇康賴和名曰波多加須

味鹹氣平有小毒入手太陰足少陰經補肺虛之勞嗽治上氣之喘促壯元陽而解傳尸止咯血而下石淋開竅治肺勞傳尸咳嗽淋瀝者皆肺腎爲病也勞極則肺腎虛而生熱故外邪易侵內證兼發也蛤蚧屬陰補水之上源則肺腎皆得所養而勞熱咳嗽自除肺氣清則水道通而淋瀝亦止　按蛤蚧得金水之氣治久嗽有功肺積虛熱成癰咳血曉夕不止喉中氣塞胸膈噎滯者服之頗効何大英云定喘止嗽莫佳於此昔人云補可去弱人參羊肉之屬蛤蚧補肺氣定喘止渴功同人參益陰血助精扶羸功同羊肉近世治勞損痿弱許叔微治消渴俱取其滋補也劉純云氣液衰陰血竭者宜用之若風寒外邪咳嗽者不當用　其毒在眼用酒洗去頭足鱗鬣以酥炙研用口含少許奔走百步不喘息者乃爲眞也生廣南水中夜居榕樹上形如守宮尾與身等雌雄相隨藥力在尾而此物最惜其尾每見人取之多自嚙斷尾而去採之須以兩股鐵叉刺之爲得入

蛻蛻倍比乃毛奴
計皓曰倍美乃
岐奴

藥須用雌雄。雄爲蛤。皮粗口大身小尾粗。雌爲蚺。皮細口尖身大尾小。宜先散中用。

蛇蛻 三百六四 味鹹甘。平。有毒。入足厥陰經。治癲癎癖癥。弄舌搖頭。療喉痺吹奶。翳膜遮睛。按蛇蛻。蛇之餘性猶存。不以氣味爲用者。蛇之性上竄而主風。蛻之用入肝而碎惡。痹癥弄舌等症。皆肝經之患也。蛻能走竄。善引諸藥入肝而除邪耳。瘡後目翳。以蛻一條洗焙。天花粉五分爲末。以羊肝破開。夾藥縛定。米泔水煮食。亦奇方也。若癲癎非外邪。由於肝心虛者。不效。蛇蛻無時。但着不淨。或大飽。卽蛻須用青黃蒼色。色白如銀者。以皂莢水洗淨乾。或掘坑一尺二寸。埋地一宿。或酒或醋浸。鹽泥固。煆存性用。畏磁石。及酒。孕婦忌服。

白花蛇 卽蘄蛇。三百六五 味鹹甘。溫。大毒。治一切風症。力倍諸蛇。癩痲風。白癜風。髭眉脫落。鼻柱榻壞者。急須求之。鶴膝風。鷄距風。筋爪拘攣。肌肉消蝕者。速爲覓用。

按白花蛇。生于土穴陰霾之處。稟幽暗毒癘之氣。性竄最烈。徹骨搜風。外走經絡。內透臟髓。能引諸藥



国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

至有風疾處自臟腑而達皮毛也凡癘風癩癬偏痺不仁因風所生之症無不藉其力以獲瘥然非風氣交固不能通達者用之則引風入骨矣若中風口喎半身不遂定緣陰虛血少內熱而發與得之風濕者殊科非所宜也　雖有黔土惟取蘄州其蛇龍頭虎口黑質白花脇有二十四方勝文腹有念珠班口有四長牙尾有爪甲長一二分腸如連珠多在石南藤上諸蛇鼻向下獨此鼻向上諸蛇虺目閉惟此目開如生雖枯而眼光不陷他處者則否矣蘄兩界者一



開一閉去頭尾各三寸取其中段不過淨肉四兩而已亦有單用頭尾者取其倍毒也若黔者倍大頭尾可去一尺酒浸一二宿火炙去盡皮骨盛砂瓶埋地中出火毒密封藏之十年不壞其骨須遠棄之傷人毒與生者同也

烏稍蛇　三百六十六　甘平小毒功同白花但性善而不嚙物色黑如漆背有三稜如劒脊眼有赤光枯死不陷尾細長能穿小銅錢一百文者良頭上有逆毛腹下有白帶子一條長一寸者雄也入藥最妙此蛇不食生

命。多在蘆叢中。吸南風及其花氣。重七錢。至一兩者。爲第一。粗大者力殺減也。市中用他蛇薰黑亂眞。但眼不光耳。朝野僉載。治大風者。以烏蛇蒸熟取肉焙研。蒸餅丸米粒大。以喂烏鷄。待盡。殺鷄烹熟焙研。丸服。不過三五鷄。卽愈矣。又法以蛇打死。盛之待爛。以水二碗浸七日。去皮骨。入糙米一升。浸一日。晒乾。用白鷄餓一日。以米飼之。待毛羽脫去。殺鷄煮熟食。以酒下之。喫盡。以熱湯浸洗大半日。其病自愈。

青魚膽　三百六七　味苦。氣寒。點赤目腫痛。以去風熱。療乳蛾喉痺而塗熱瘡。按青魚膽。色青象木。入通肝膽。二物開竅於目。目赤障者。宜頻點。其塗惡瘡者。若寒能涼血熱也。若目病非風熱盛。而由於血虛昏暗者。不可用也。乳蛾喉痺。萬氏用膽礬盛青魚膽中。陰乾點喉少許。取吐。

鰻鱺魚　三百六八　甘平。氣寒。治風瘡如蟲行。療濕痺如水洗。男子骨蒸癆瘵。婦人產戶蟲瘡。按鰻鱺魚。熏上中之陰氣。常與水蛇同穴。雖有小毒。以五味煮羹。能補虛損癆瘵。然其功則專於殺蟲去風。耳風蟲痔瘻





青魚左波源順和名曰阿乎佐波万安乎伊乎。

鰻鱺魚字那岐本艸和名曰波之加美字乎

燒炙爲末。空腹食三五度。即瘥。張鼎云。夏月用骨燒烟。蚊化爲水。熏蟾及屋舍竹木。斷蛀蟲。置骨于衣箱中。則蠹魚不生。

斷諸蟲。脾胃薄弱易泄者。勿服。小者可食。重三四斤。及水行昂頭者。腹下有黑斑。背有白點。無鱗者。殺人。娠婦忌之。與銀杏同食。患軟風。

**鱓魚** 三百六十九味甘。大溫。善補氣。逐濕痺。除腹中冷氣。痢疾可醫。貼痔漏臁瘡。引蟲甚妙。用黃鱔打死。香油抹腹。蟠瘡上。痛後取看腹有針眼。皆蟲也。未盡再作。後以人脛骨灰。油調塗之。

按鱓魚得土中之陽氣。甘溫具足。所以能補中益血。性善穿竄。故走經脈。

療十二風邪。口眼喎斜。用其血同麝香少許。左喎塗右。右喎塗左。患耳痛者滴數點入耳。凡病虛熱者不宜食。時行病後食之。多致復病。過食亦能動風氣發諸瘡。黃者佳。黑者大者殺人。置缸水中。項下有白點。通身浮水上。此蛇所化也。棄之或以蒜瓣投於缸中。則群鱓跳擲不已。亦物性相制也。不可合犬肉血同食。中其毒者。以蟹解之。

**烏賊魚骨** 即海螵蛸。三百七十味鹹。微溫。入足厥陰少陰血分。治女子赤白漏下。經窒血閉。療丈夫陰中腫痛。囊濕



鱓魚今案地豆米字那岐新撰字鏡曰字那岐

烏賊骨伊加乃古字

烏賊蒲黃撲之。疳瘡。耳中膿水吹愈。目內熱淚能消。驚氣入腹。環臍腹痛。驚入肝肥。則榮氣不和。故腹痛環臍也。外科燥膿收水。眼科去翳清煩。亦治牛馬障翳。婦人水戶嫁痛。同鷄子黃塗小兒重舌鵝口。同蒲黃末傳。

按烏賊魚骨。稟水中之陽氣。味鹹入血。性澀能收。故有軟堅止滑之功。而所主皆肝傷血閉。不足之病。凡血枯血痕。經閉崩帶。下痢疳疾。皆厥陰本病也。寒熱瘧疾。聾癭。小腹痛陰痛。厥陰經病也。目翳流淚。厥陰竅病也。厥陰屬肝。爲藏血之臟。女人以血爲主。虛則漏下赤白。或經室血閉。寒熱癥瘕。痃氣少陰爲藏精之臟。主隱曲之地。虛而有濕。則陰蝕腫痛。虛而寒客之。則陰中寒腫。痃。男子腎虛。則精竭無子。女人肝傷。則血枯無孕。今用此藥通血脈而祛寒濕。自然諸病去而精血足。尙焉得而無子哉。又考陳氏治閨房三病。一犯月水行房。精血相射。入於任脈。留於胞中。而致小腹結痛。病如伏梁。水溺頻濇。是名精積也。二胸膈脇支滿。妨於食。如聞臊臭。出清液。先唾血。四肢清而目眩。時時前後。皆年少時大脫血。或醉入房。氣竭肝傷而成血枯也。三子處腹

中藏物不消。惡血淹留而致胞冷絶嫉。經旨用此以佐薑茹。通調血氣。施布惡積。允法三代以前湯液之美矣。若血病多熱者。勿用。以鹵水煮一伏時。炙令黃。過晝夜。研細水飛。輕脆而白。擇上紋直順者。纔眞。上紋橫者。沙魚骨也。不用。惡白茂。白斂附子。腹中有墨能吸水堅墨。令水溷黑。以自衛。名爲腹中墨。醞醋磨濃。蟲心痛。頓服即愈。寫幷略淡過歲全無。爲商客者不可不知。其性嗜烏口生腹下。每浮水上。飛烏啄之。卷取而食。故名烏賊。



療腸風血痢。活鯽魚去腸留鱗。滿入五倍子末。泥固。煅性爲末。酒服一錢。腸氣吐食。用大者去腸留鱗。切大蒜片塡滿。紙包炭煨。取肉和平胃散末一兩。杵丸。米飲下。卒病水腫。用三尾去腸。同商陸赤小豆煮糜。啖飲。消渴飲水。取一枚留鱗。以茶葉塡實。滿煨熟。調服。按鯽魚。得土氣以生。故諸魚屬火。惟鯽屬土。有調胃實腸之功焉。若多食之。未嘗不助火也。宜於夏月熱痢。鯽喜偎泥。不食雜物。故能補胃。不可與沙糖芥菜豬肝雞鹿肉。及麥冬同食。

河豚源頊曰布久

海馬志也久那岐唐賴曰豆久天皓曰出肥州有焉

河豚 三百七二 甘溫大毒。去濕氣。殺蟲瘡。按河豚。雖爲水族之奇味。必竟大毒殺人。卽其無鱗無腮無胆有聲。目胭音定者。自異於諸魚矣。原生者可不遠之。其肝及子。尤宜痛絶。中其毒者。以橄欖。甘蔗。蘆根。槐花。糞汁解之。反荆芥。菊花。桔梗。甘草。附子。烏頭。

海馬 三百七三 甘溫。暖水藏。壯陽道。療難産。或手握帶身。卽易産。治疔腫 按海馬。雌雄成對。其性溫暖。有交感之義。故陽虛房中術多用之。海人捕得。不以啖食。暴乾焙之。以備産患。又治遠年癥塊。用雌雄各一。木香一兩。大黃炒。白牽牛炒。各二兩。巴豆四十九粒。青皮二兩。童子小便浸軟。包巴豆紮定。入小便內再浸七日。取出。麪炒黃色。去豆不用。取皮。同衆藥爲末。每二錢煎服。

大小如守宮。首如馬。身如蝦。其背傴僂。有竹節文。長二三寸。

介部

龜甲 三百七四 味鹹甘。平。氣味俱陰。陰中之陰也。入足少陰經。專補陰衰。借性氣引達諸藥。善滋腎損。仗功力復足眞元。續筋治勞。四肢無力者有驗。腰背酸痛。手

足重弱者殊功。遲骨蒸。截痰瘧。小兒顖門不合。臍瘡
柝音息臭難聞。醋炙存性出火氣入輕粉麝香。慈湯洗淨搽敷。　按龜。禀北方之氣而生。爲陰中至陰之物。其形象離。其神在坎。大補陰分而主陰血不足。時珍曰。先賢用敗龜版。惟若人打壞者。次也。陶弘景用生龜炙。目華用灼多者。皆以其有生性神靈也。所謂敗者乃鑽灼陳久如敗也。愚意敗者。恐還指自敗者。是其血肉滲盡。氣味全足。方爲有用。若鑽灼者。已經燒炙焦燥。津液耗去。何益之有哉。是以下焦滋補丸藥多用爲君。方家亦入補心藥中用。以心藏神而龜性有神。借其氣以相通。且得水火既濟之義。實非補心之正藥也。第降火滋陰之物。大都寒涼損胃。惟龜甲。益大腸。止泄瀉。使人進食。真稱神良之品。其性與鼈甲相類。今人喜用鼈甲而惡用龜甲者。皆一偏之見耳。不知鼈甲走肝益腎以除熱。龜甲通心入胃以滋陰。陰性雖同。所用略異。靈而長壽。與鹿相等。龜首藏腹。能運任脈。故取其甲以養陰。鹿鼻向尾。能通督脈。故取其角以養陽。病人腎虛而無熱。與妊婦俱不宜用。丹溪補陰丸用龜下甲酒炙。熟地黃各六兩。黃栢知母。鹽水浸炒各四兩。后器爲末。以猪脊髓和丸。空心温酒下。一方去地黃加

五味子炒一兩。又抑結不散。用龜甲酒炙五兩。側栢葉炒兩半。香附童便酒炒一兩。爲末。米糊丸。空心溫酒下。若難產不下。及交骨不開。用龜甲一箇。婦人頭髮一握。燒灰。川芎當歸各一兩。用七錢水煎服。約人行五里許。再服取效。瘡後日腫不開。取龜胆汁點之最良。小兒龜胸龜背。以龜尿摩其胸背。久久即瘥矣。又滴耳。治聾。點舌下。治中風不語。蓋走竅透骨故也。取尿法。以龜置荷葉上。將鏡炤之。尿即出。或以猪鬃松葉。刺其鼻亦出。喲嘍神書。言龜尿磨瓷器。能令軟磨墨書后。能入數分。取四方透黃者。去脇用底。刮去黑皮。或酒醋猪脂。旋塗旋炙。或以酥。銚中熬黃。須研極細。否則沾人腸胃。能變癥瘕。勿令中濕。有毒。畏狗胆。惡沙參。要肉爛。老桑煮之。頭方殼圓。脚短者。爲陽龜。形長頭尖。脚長者。爲陰龜。陰人用陽。陽人用陰。今人不復分別。

**鼈甲** 三百七十五 鹹平。入足厥陰血分。解骨間蒸熱。消心腹癥瘕。婦人漏下五色。小兒胎肉。脇下堅疼。截久瘧。消瘧母。行瘀血。補陰氣。勞瘦痞疾。非此不除。產後陰脫。資之尤要。別錄。療瘟瘧者。以瘧必暑邪爲病。類多陰虛水衰之人。暑邪中入陰分。故出併於陽而熱甚。入於陰

而寒甚元氣虛羸則邪陷而中焦不治甚則結爲瘧母甲能益陰除熱消散故爲治瘧之要藥　按鼈甲全稟天地至陰之氣有養陰滌熱之用與龜同類而功各有主鼈色青故入東方而理肝家諸症龜色黑故走北方而理腎部諸疾陰虛往來寒熱勞復女勞復皆爲必須之劑凡陰虛胃弱泄瀉併妊娠及肝無熱者忌之目瞤唇動口喎皆風入血胍急以小續命湯服之外用鼈血或鷄冠血調伏龍肝散塗之乾則再上甚効蓋鼈血之性急縮走血也又五月午日收



爪藏衣領中令人不忘　七肋九肋不經湯煮者佳治癥塊用醋炙治勞熱用童便煎炙黃研細鼈肉主聚鼈甲主散食鼈刳少許甲含之性畏葱及桑灰惡礬石其膽味辣破入湯中可代椒而辟腥氣不可合鷄子莧菜薄荷食

## 蟹　三百七十六

鹹寒陰包陽也入足陽明厥陰經和經胍而散惡血清熱結而續筋骨合小兒之顱以螯同白茂搗塗解漆毒之瘡爪能墮胎殼辟壁虱　按蟹稟水氣而生性寒發風能薄藥力寄於蛇鱓之穴故食鱓中毒者

食之即解。性相畏也。其黃能化漆爲水。故塗漆瘡用以解之。燒其螯烟。可集鼠於庭。物性之相感相制。莫能究其義也。雖能散跌撲損傷之血。惟血熱者相宜。若因寒凝結。與夫脾胃寒滑之人。咸不宜服。千金神造湯。治子死腹中。用蟹爪一升。甘草二尺。煮濾。入眞阿膠三兩。頓服。或分二服。若人困灌服。獨螯獨目。兩目相向。六足四足。腹下有毛。腹中有骨。頭背有星點。足斑目赤者。並不可食。誤中其毒。以冬瓜汁。紫蘇。蒜。豉。蘆根汁。解之。不可與柿。及荊芥食。發霍亂動風。

牡蠣加岐本草和名曰乎加岐乃加比

木香汁可解。醃醬藏者。久留易沙。見燈亦沙。得皂莢或蒜。可免。得白芷則黃不散。得葱及五味子同煮則色不變。孕婦食之。令子橫生。

## 牡蠣　三百七七

味鹹微寒。氣薄味厚。陰也。降也。入足少陰厥陰少陽經。固女子赤白帶下。少陰熱也。澁男子夢遺精滑。實玄府不實汗泄。軟積血不軟堅癥。鹹能軟堅也。消胸中之煩滿。化痰凝之瘰癧。按牡蠣。海氣結成者也。蛤蚌之屬。皆有胎生卵生。獨此化生。純雄無雌。故得牡名。爲軟堅之劑。以柴胡引之。去脇下硬。以茶引之。

消項上核。以大黃引之。消股間腫。以貝母爲使。能消積結。以地黃爲使。能益精收濟。止小便。腎經血分之藥也。張元素曰。壯水之主。以制陽光。則渴飲不思。故蛤蠣之類。能止渴也。其性收斂。故能濟大小腸。止大小便利。搗粉粉身。亦治盜汗。凡病虛而熱者宜之。腎虛無火。精寒自出者忌用。同生地黃耆龍眼五味子棗仁門冬白芍茯神黃柏當歸治心腎虛盜汗。同麻黃根蛇床子爲粉去陰汗。先將童尿浸透。以黃泥固濟煅之。貝母爲之使。得甘草牛膝遠志蛇床子良。



惡麻黃辛夷吳茱萸伏硇砂。

**真珠**　三百七八味鹹甘寒入手少陰足厥陰經鎮心定悸磨翳墜痰收口生肌除驚拔毒。　按珠稟太陰之精氣而結。故中秋無月。則蚌無胎。其體光明。其性堅硬。要以新完未經鎖綴者爲上。本草所云。逆臚者。臚脹也。胸腹脹滿氣逆。以及於手足皮膚皆腫也。經云。諸濕腫滿屬脾土。又云諸腹脹大皆屬於熱。此因脾虛有熱。兼有積滯所致。真珠。味甘能益脾氣。寒能除熱。體堅能磨積。故手足皮膚逆臚皆治。古人未及斯義。

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

所以方書叙論不詳。亦闕略也。病不由火熱者。勿用。

人乳浸三日。絹包入豆腐中。煮一炷香。搗碎。研二

萬餘如飛麵。方堪用。不細。傷人臟腑。

石決明　三百七九　鹹寒入足厥陰。少陰經。內服而腎障消除。外點而赤膜盡散。清肝肺之風熱。解白酒之味酸。

火煆研末。以酒盪熱。攪入酒。蓋住一時取飲。

按石決明。得水中之陰氣以生。形長如小蚌而扁。外粗內光。細孔雜雜。背側一行有孔如穿成者。生於石崖之上。能入肝腎補陰。主諸目疾。又名千里光。以功名之也。可以浸水洗眼。目



病之外無他用也。久服令人寒中。鹽水煮。或以麪

裹煨熟。磨去粗皮。研一萬下。水爲鹹走腎。墜痰因鹹軟堅。

文蛤　三百八十　味鹹氣平。利水爲鹹走腎。墜痰因鹹軟堅。

療欬逆。止煩渴。按文蛤。即今花蛤。大小不等。背上有斑文者。得陰水之氣。故走腎以勝水氣。張仲景云。

病在陽。當以汗解。反以冷水噀之。或灌之。更益煩熱。

欲飲水不渴者。文蛤散主之。文蛤五兩爲末。每服方

寸匕。沸湯下。甚効。凡病屬邪熱痰結者。宜之。氣虛有

寒者。不得用也。火煆研粉用。不入湯藥。蜀漆爲之

使畏狗膽甘遂芫花。

蛤蜊粉　三百八十一　味鹹氣寒。入足少陰經。治氣虛水腫。大蒜十箇搗如泥。入蛤粉丸梧子大。食前白湯下十二丸。療白濁遺精。潔古云。陽盛陰虛。故泄精也。蛤粉一斤。黃柏新羌炒過一斤。爲末。白水丸梧子大。每服百丸。空心溫酒下。日二次。蛤粉味鹹而且能補陰。黃柏苦而能降心火也。清熱利濕。化結消癭。散浮腫。利小便。按蛤粉。能降能消。能軟能燥。寒。制火而鹹潤下。故能降焉。寒。散熱而鹹走血。故能消焉。堅者輭之以鹹。取其屬火而性潤也。濕者燥之以滲。取其經火化而利小便也。乃腎經血分之藥。故主濕嗽腎滑之疾。其肉鹹冷。止消渴。解酒毒。但濕中有火。不可不知。取紫口蛤蜊殼。炭火煆成。以熟括樓連子肉。搗和成團。風乾用。

禽部

鴨　三百八十二　味甘鹹平。入手太陰足少陰血分。流行水府。滋陰氣以除蒸。闖達金宮。化虛痰而止嗽。按鴨有數種。惟白毛而烏嘴鳳頭者。爲虛勞聖藥。取金肅水寒之象也。故葛可久治勞嗽發熱。有白鳳膏。用黑嘴白鴨一隻乾。拔去毛。脇下開竅。去腸拭淨。入大棗肉二斤。參苓白朮散末一升。縛定。用沙甕一箇。置鴨于內。以炭



舊安北呂吉人曰加生非也

火慢煨。將陳酒一甕。作三次入之。酒乾爲度。服者毒。

鸕鷀　三百八三　味酸鹹冷。微毒。治蠱脹。利水道。　按鸕鷀不載功用。惟雷氏序云。體寒腹大。全賴鸕鷀燒存性爲末。米飲服之立愈。時珍曰。諸腹脹大。皆屬於熱。衛氣並存於血脈。則體寒。此鳥氣寒。利水。寒能勝熱。利水能去濕。故也。　此鳥不卵生。口吐其雛。亦一異也。

鶺鴒油　三百八四　味鹹溫滑。塗癰腫。治風痺。透經絡。通耳聾。　按鶺鴒油。性走。能引諸藥入透病所拔毒。故能

鸕鷀

鸕鷀字順宜主豆主利

烏骨鷄久吕保祢乃登利

鷄冠血登佐加乃知

治聾痺腫毒諸病。

烏骨鷄　三百八五　味甘鹹平。入足厥陰少陰經。補虛勞羸弱。治滑泄脾虛。安心志。益胃氣。　按鷄屬土而有金木火。雖有丹黃白黑異色。而總不若白毛烏骨。翠耳金胸。爲最上乘也。蓋鷄爲陽禽。屬木。應風。茲骨反烏者。異變坎也。受水木之精。具五行之體。故肝腎血分之病。與虛熱者。皆宜用之。鷄稟土金木火之精。又得毛色之烏。是五行全具。不致偏勝。古人取義。實在於此。　若他色者。最能動風助火。

鷄冠血　發瘡瘍。和酒塗口喎。口喎。風中血脈之故。冠血。透肌而走血。肉也。須用三年

老者。取其陽氣克溢。若縊死心猶溫者。勿斷繩。刺冠血滴口中。男用雌。女用雄。以安心神。〔肝〕戶。起陰痿。又治小兒疳積昏目。取其導引入肝氣也。〔膍胵〕音脾鴟乃肫內黃皮。卽〔鷄內金〕也。爲消化水穀之所。通達大腸膀胱二經。能止洩痢。愈淋瀝。消酒積。固便遺。用鷄內金一具。并腸燒存性。酒服。男用雌。女用雄。〔屎白〕惟雄鷄有白。臘月收之。卽素問所謂鷄矢醴也。下氣消積。通利大小便。治蠱脹有殊功。食米成痕。以鷄矢同白米各半。合炒末。水調取吐。大虛者勿用。〔鷄子〕黃雌者爲上。烏雌者次之。清煩熱。止欬逆。其白微寒。其黃性溫。兼用則平。精不足者補之以氣。故卵白能清氣治伏熱。形不足者溫之以味。故卵黃能補血治下痢。性畏醯醋。不可多服。併不可與葱蒜韭子鱉肉兎肉同食。妊婦不可與鯉魚同食。令兒生瘡。同豬米食令兒生蟲。小兒痘疹忌食及間煎食之。氣令生翳膜。〔卵殼〕名泥池池抱出者用。研末磨翳障。油調傅下疳。〔卵白〕治產後血運。身痙直不知人。取白。以荊芥末二錢。調服卽安。甚敏捷。〔卵中白皮〕名鳳衣。主久嗽氣結。同麻黃紫菀。和服立效。刀傷。以白皮貼之能續。

燔鷄湯　治鷄眼作痛。剝去皮。以湯洗之。

〔雀卵〕三百八六　味酸。氣溫。入足少陰經。强陰經而壯熱。補



崔須。宋本中和名曰須。義

精水而多男。按雀屬陽。其性淫。最益精血。入下焦陰分。溫煖兩腎。夫人身左腎屬水爲陰。右腎屬火爲陽。天非此火不能生物。人非此火不能有生。又云陽生則陰長。可見命門眞陽之氣。乃人身生化之本。故命門衰敗。則陰痿精寒。絕化育之路矣。雀卵能令人精强而陽旺。其於人亦大有補哉。今人第知雀卵之能益男子陽虛。而不知其能治女子血枯也。〔肉〕味甘溫。亦能壯陽益精。但功不及卵。聖濟錄治虛寒有雀附丸。用肥雀肉三四十枚。同附子熬膏丸服。補下甚有驗也。陰虛火盛者忌之。古方同天雄服。雄性極熱大毒。非陰藏及眞陽虛憊者。愼勿輕餌。卯取第一番者佳。服术人忌之。雀肉不可與李同食。

雄雀屎　一名白丁香。味辛苦。溫。微毒。癰癤成膿不破者。塗之立潰。目赤胬肉貫瞳者。點之自消。同首生男子乳和之。癥癖伏梁。飲亦能化。瘡瘍吹乳。酒下成功。按雄雀屎性善消散。故外用療目翳決癰癤。內服除疝瘕消積脹。皆取其能消爛之義。凡目痛非風熱外邪者。不宜用。頭尖挺直者。是雄。兩頭圓者。是雌。臘月採。去



国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

兩畔附着者。研細。以甘草水浸一日。去水。焙乾。用（日華曰。凡鳥左翼掩者是雄。其糞頭尖挺。）

天鼠蝙蝠也屎　即夜明沙。三百八九味辛。氣寒。入足厥陰血分。開目盲翳障。治雀目疾瘧。按天鼠。又名伏翼。其屎爲夜明沙者。此鼠夜出喜食蚊蚋。故其屎中淘出細沙。皆未化蚊蚋眼也。所以令人主明目。治盲障。取氣類相從耳。明目之外。餘皆可略。多藏古寺屋板中。取糞。水淘去惡氣。將細沙晒乾焙用。惡白蘞白薇。

五靈脂　即寒號禽糞。三百八九味甘。氣溫。氣味俱厚。陰中之陰。降也。入足厥陰血分。止血氣之痛。無異手拈行冷滯之瘀。眞同仙授。調結血積痛腹疼。理痰涎挾血成塊。

按五靈脂。入肝最速。引經有功。不能生血而主行血散血和血。故治女科爲專。生者行血。炒熟止血。凡痛症。若因血滯者。下咽如神。女人血病。百藥不効者。立可奏功。亦神藥也。若病屬血虛無瘀者。不可用。

產五臺諸山。色黑如鐵。氣甚臊惡。粒大如豆。有如糊者。有粘塊如餹者。以餹心潤澤者爲眞。多夾沙石。極難修治。研細。酒飛去沙石。晒乾用。惡人參。損人。

斑鳩波登一云豆知久礼日本記曰以加留加康賴曰也未波土啄木鳥傳良豆、岐鷹多加



斑鳩 三百九十 甘平 明眼目。助陰陽。益精氣。補虛損。按斑鳩。即鶻鳩也。最能補腎助氣。故古方治目有斑鳩丸。錦鳩丸。皆取其明目。而不獨補腎已也。

啄木鳥 三百九一 味甘酸。平。追癆蟲。治風癇。按啄木鳥。能斲裂樹蠹。取蟲而食。故以是稱。善追癆。治癇及痔漏。牙蟲。淮南子曰。啄木愈齲。以類相攝也。鹽泥固煆五更。連泥埋土中三尺。次日取出。入藥用。服此藥須安排淨器。待蟲出。速鉗入油鍋煎之

鷹睛 三百九二 明眼目。退翳障。按鷹。以膺擊。故謂之鷹。

資金方之猛氣。擅火德之炎精。蓋梟鷙之鳥也。取其睛和乳汁研之。日三注眼中。三日見碧霄中物。忌烟熏附諸鳥有毒。凡鳥自死目不閉。自死足不伸。白鳥玄首。玄鳥白首。三足四距。六指四翼。異形異色。並不可食。食之殺人。

## 獸部

豬脊髓 三百九三 味甘。氣寒。補虛勞之脊痛。益骨髓。以除蒸。按豬。水畜也。性寒不補。入胃能生濕痰。易招風熱之物也。雖肺與慧故同食。可以蠲咳嗽而保肺。若，



多伊又曰伊乃古今案布多

腎。則冷而無益。止可引導而歸腎。至肝則大損於人。膽理傷寒燥結。要之皆無補於人者。而丹溪治虛損補陰丸。用春髓和丸。取其通腎命。以骨入骨。以髓補髓也。其性陰寒。陽事弱者勿食。

**猪膚** 三百九四 甘寒。治少陰下痢。咽痛心煩。 按猪屬水。其氣寒。先入腎。故仲景用治少陰客熱。加白蜜。則潤燥除煩。和白粉。以益氣斷痢也。弟膚論不一。王好古以爲猪皮。吳綬以爲燔猪時。刮下黑膚。二說不同。今攷禮運疏云。革。膚內厚皮也。膚。革外淺皮也。此正燔猪時膚之義也。

**狗肉** 三百九五 味鹹。氣溫。入足太陰少陰經。煖腰膝而壯陽道。厚腸胃而益氣力。填精髓而補虛寒。增元氣而理勞傷。 按犬屬土而能煖脾。脾煖則腎受瘉矣。黃者益脾。黑者益腎。他色者不宜用也。內外兩腎俱助陽事。屎中粟米起瘡治噎。

**羊肉** 三百九六 味甘。大溫。入足太陰少陰經。開胃健力。補益虛寒。壯陽道。理腰膝。宣通風氣。起發蟲瘡。 按羊。

得火土之氣以生。五臟齒骨。皆溫平。惟肉性大熱耳。東垣云。補可去弱。人參羊肉之屬。蓋羊肉補形。故凡形氣痿弱。虛羸氣乏不足者。皆宜此也。〔血〕爲水化其味鹹平。主產後血暈悶絕。及砒霜丹毒。生飲一盞。卽活。〔腎〕氣甘溫。補氣益髓。腰膝無力。下焦冷憊者。作羹食之。千金外臺有用此煮湯煎藥。蓋用爲引嚮也。〔肝〕性苦寒。能療肝風虛熱。目赤暗痛。故肝經受邪之病。用青羊肝丸治之。有效也。凡煮勿用銅器。男子損陽。女子暴下。不可不知。不可同半夏菖蒲豆醬食。



獐牛岐多之字之

若同醋食。傷人心。瘡家忌之。

獐牛 北牛曰獐。音秦。〔肉〕三百九七 甘溫。入足陽明經。養脾胃。補腰脚。安中益氣。止渴消涎。按牛。坤土也。而補氣。脾胃之物也。韓悉 同懋 言其與黃耆同功。朱氏有倒倉法論。本非吐下藥。特飲之既滿而溢爾。王綸所謂借補爲瀉。故病去而胃得補。亦奇法也。但病非腸胃者。似難施耳。牛數種。惟獐牛爲勝。青牛爲良。水牛僅可供食。百頭者。及黑者。獨肝者。不可服。中其毒者。人乳解之。附〔倒倉法〕出自西域異人。其法。用黃牡牛肉二十

觔。煮糜去滓取液。再熬成琥珀色收之。任飲。病在上則令吐。在下則令利。在中則令吐而利。吐利後渴。即服其小便一二碗。睡二日。乃食淡粥。養半月。即病退強健。仍忌牛肉五年。此治中宮愈和。非丸散所能去也。

酥 三百九八 甘寒。益心肺。除客熱。補虛勞。潤臟腑。按酥。本牛羊之乳液也。潤燥調營。與血同功。能除腹內塵垢。又追毒氣發出毛孔間也。酥乃醪之浮面所成。今人多以白羊脂雜之。不可不辨。附〔造法〕以乳入鍋煎二三沸。傾入盆內。冷定待面結皮。取皮再煎油出去渣。即成矣。

阿膠 三百九九 甘鹹微溫。氣味俱薄。浮而升。陽也。入手少陰。足少陰。厥陰經。止血兼能清肺。疎風。又且補虛。西歸金府。化痰止嗽。除癱瘓。東走肝垣。強筋養血。理風濕。安胎始終並用。治痢新久皆宜。本經主女子下血。洒洒如瘧。腰腹痛。四肢酸疼。胎不安者。皆由精血虛。肝腎不足。法當補肝益血。經曰精不足者補之以味。味者。陰也。補精以陰。求其屬也。此藥得水氣之精。具

補陰之味。俾入二經而得所養。故能療如上證也。

按烏賊。乃烏鱡皮所造。而其功專在於水。然鱡皮而取烏者。合北方之水色。以制熱則生風之義也。治喘嗽者。不論肺虛肺實。可下可溫。須用以安肺潤肺。大抵補血與液。爲肺與大腸之要藥耳。故傷暑伏熱而成痢者。亦必用也。性甚和平益陰。有熱毒留滯者。能疏導。無熱毒留滯者。能平安。皆足以發明阿膠之蘊矣。一切風症。治之如神。胃弱作吐。與脾虛食不消者。忌之。

此藥多僞。僞者能滯痰。當以光如漆色帶油綠者爲眞。眞者折之。即斷。亦不作臭氣。夏月亦不甚濕軟。蛤粉或糯米粉炒成珠。

## 牛黃 四百味苦甘涼。入足厥陰少陽手少陰經。清心主之煩熱。狂邪鬼俱消。攝肝藏之魂。驚癇健忘同療。利痰氣而無滯。入筋骨以搜風。本經主小兒驚癇寒熱。熱盛口不開者。小兒稟純陽之氣。其病皆胎毒熱痰所生。總肝心二經所發也。心熱則火自生。熠肝熱則木自生風。風火相搏。故發如上證。此藥苦涼。入二經而除熱。則火息神清。病自瘳也。

牛黃宇志乃多未

甘平。惟食百草。其精華凝結爲黃。故能解百毒而消痰散熱也。大抵牛病在心肝。則生黃。故還資其治心肝膽之病。所以入肝治筋。中風入臟者。用以入骨追風。若中腑中經者。誤用。反引風入骨。如油入麵。莫之能出矣。脾虛胃寒者。不宜用。有四種。惟口中吐出喝得者。名生黃。爲上。外有膜包如蒜頭中如鷄子黃。薄疊體輕。聞有香氣。揩摩手甲。黃色透爪。置舌上先苦後甘。清凉透心者。爲眞也。其次有角黃。角中得者。心中剝得者。膽黃。肝黃。殺而得之。皆不及生黃也。又有駱駝黃。極易得。亦能亂眞。不可不審。研細如塵用。人參爲之使。惡龍骨龍胆地黃。常山。畏牛膝乾漆。

虎骨　四百一

味辛。氣溫。壯筋骨而痿軟可起。搜毒風而攣痛堪除。初兒煎湯洗浴。辟惡去驚。大人煮汁浸膝。健骨追風。　按虎爲西方之獸。通於金氣。風從虎。虎嘯而生風。故骨可以入骨而搜風。凡上部風氣惡瘡等疾。用虎頭骨。以風行於頭也。手足諸風當用脛骨。腰背諸風當用脊骨。方中獨取前脛者。虎之一身。筋節氣力。皆出前足。取補骨氣。以氣合氣也。若血不足

以養筋者。宜少用。同當歸白芍炙甘草續斷牛膝白
膠門冬地黃。治遍身骨節疼痛。搥碎。去髓。塗酥炙。或酒。各隨方法。炭火炙黃。入藥。藥箭取者不可用。畏
蜀漆蜀椒磁石。

象皮　四百二　甘淡。治下疳膿爛。瘡金瘡不合。按象肉
壅腫。人以斧刃刺之。半日即合。故近時治金瘡不合
者。用其皮灰。

犀角　四百三　酸鹹苦。寒。味厚於氣。可升可降。陽中之陰
也。入足陽明。兼入手少陰經。解煩熱而寧心。驚悸狂
邪都掃。散風毒而清肝。目昏瘀壅俱消。吐血崩淋。投
之輒止。癰疽發背。用以消除。解毒高於甘草。祛邪過
於牛黃。按犀。陽物也。性能走散。有徹上徹下之功。
散邪清熱涼血解毒。爲陽明經正藥。凡蠱毒之鄉。飲
食中。用以攪之。有毒則生白沫。無毒則否。取以煮毒
藥。無復熱毒矣。肺火燥熱。及痘瘡氣虛無大熱者。不
宜用。傷寒陰症發燥者。尤不宜用。婦人勿多服。能消
胎。入藥。用黑尖生者爲佳。若現成器物被蒸者。不
堪用。鋸成。以薄紙裹懷中一宿。乘燥搗之。庶手如粉。

蓋此藥沾入氣則易搗。故曰人氣粉犀。松栢升麻爲之使。惡烏頭雷丸。忌鹽醬。

熊膽 四百四 苦寒。入手少陰厥陰足陽明。經去心中涎。清心中熱。平肝明目。退翳除黃。按熊胆。味苦入心。故能凉心。平肝。殺蟲爲驚癎。翳障。疳疼。蟲牙。蛇痛之劑。性善辟塵。試之以淨器塵幕其上。投胆米許。則凝塵豁然而開也。市中多僞。通明者佳。但取一粟許滴水中。若線不散。運轉如飛者眞。餘胆亦轉。但緩耳。

羚羊角 四百五 味鹹。氣寒。味厚氣薄。陽中之陰。降也。入手太陰少陰。足厥陰經。直達東方。理熱毒而昏冒無虞。專趨血海。散瘀結而眞陰有賴。清心明目。平肝舒筋。濕風伏熱宜加用。痢血癰疽不可無。按羊。火畜也。而羚羊則屬木。故獨入厥陰爲甚。提同氣相求也肝虛而熱者宜之。肝主木。開竅於目。故目病。而羚角能平。肝主風。在合爲筋。故筋病。而羚角能舒。魂者。肝之神也。神不寧而羚角能安。血者。肝之藏也。血瘀滯而羚角能散。稍火寄於肝胆。怒氣逆而羚角能降。其功類多。近俗不著。今特詳之。然過用。亦能伐生生之

鹿志加日本紀曰賀又云加乃之二
鹿茸志二乃布久呂豆乃

氣。產川蜀。取角。勿先中濕。外有二十四節挂痕。有偽作者。須辨。內有天生木胎。貼入耳。似響聲微出者眞。入藥不可單用。須不拆元對。銼細。避風搗篩。更研萬匝如飛塵。免刮人腸。蒐絲爲之使。

鹿茸　四百六　味甘鹹溫。入足少陰經。補男子腰腎虛冷。理下元腳膝無力。生精益髓。强筋健骨。虛勞之聖劑。崩漏之神丹。　按茸有麋鹿二種而其功用亦別。鹿。林獸也。黃質曰斑。身如小馬。性多驚烈。處必山岡。好羣而相比。陽類也。故夏至感陰氣而角解。陰生陽退之象。麋。鹿屬。水獸也。色青黑。肉蹄大如小牛。目下有二竅。爲夜目。多慾而善迷。陰類也。故冬至感陽氣而角解。陽生陰退之象。陰陽相反如此。今人多以麋鹿茸作一種者。非也。稟純陽之質。含發生之氣。一牡常御百牝。腎氣有餘。足於精者也。故有助陽扶陰之妙。而東坡言鹿補陽。麋補陰。可見主用之當辨矣。而沈存中。則有鹿茸利補陰。麋茸利補陽之說。以理推之。蘇說爲是。第多宜於老弱。而不宜於少壯。恐積溫成熱。助氣化火耳。陰衰火盛。胃有火者。俱忌。其力盡

在血中。取之極難。當其初生。不過一茶之頃。已成茄形。稍遲半日。便如馬鞍岐起。茄子茸。形如紫茄。血氣亦未甚全。嫩而易破。故不損破者。其值隆也。長三四寸。茸端如琥珀紅潤。形如分岐馬鞍。破之。肌如朽木者爲最。先用酥塗勻。於烈火中灼之。候毛盡炙脆。候黃褐色。研細入藥。不可缺酥。中有小白蟲。不可鼻臭。

鹿角　四百七　味鹹。氣溫。補腎生精髓。強骨壯腰膝。理虛勞之眷痛。療腎弱之酸疼。　按鹿。稟天地純陽之氣。氣化濃密。其角自生至堅。無兩月之久。大者至二十餘觔。凡物之生。無速於此。故能強陽補骨。非他藥可比也。與茸同功。力少遜耳。生則散熱行血。消腫辟邪。

凡婦人被鬼昏迷。不肯招實者。水調末服。卽自言。熟則補虛益腎。強精活血。若鍊霜熬膏。則專於滋補矣。然亦有麋鹿之分。麋者補陰。左腎血液不足。鹿者補陽。右腎精氣不足。此發千古之微秘。而楊氏家藏有二至丸。兩角並用。專治虛損。但其藥性過溫。止宜於陽虛寒濕。血痺者耳。於左腎無與也。　截斷。錯屑。以眞酥油。無灰酒。拌勻。慢火炒乾用。杜仲爲之使。麋角。以頂根上有黃毛。若金線。兼旁生小尖。色蒼白者爲

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

**白膠**　即鹿角膠　四百八　味甘溫平。氣薄味厚。降多升少。陽中之陰也。入足厥陰少陰。手少陰厥陰經。益氣大補虛羸。補中長肌益髓。遺精盜汗。食之止飲。四肢作痛。服之自和。　按白膠。益髓補羸。故陽虛氣衰。腰痛無子者。服之甚有奇功。經曰。勞則喘且汗出。凡作勞之人。中氣傷絕。四肢作痛。多汗。皆肝心之受病。服之血氣生。眞陽足。當不可盡述也。凡使鹿角。勝於麋角。今醫家多用麋茸。麋角云力緊于鹿。非也。腎虛有火者。恐偏於補陽。不宜用也。　全角鋸寸。流水中浸七日。入水再煮七日。則膠成矣。粉名鹿角霜。功用皆同。水浸七日。刮去皺皮。銚爲屑。以牛乳滿浸。乳耗再添。直候不耗。以油單紙封口。隔湯蒸之。水竭即添。頻頻看角屑。粉爛如麵。即住。細篩。漉去乳。焙用。

**麝香**　四百九　味辛苦。溫。開竅通經。穿筋透骨。治驚癇而理客忤。殺蟲蠱而去風疾。形勞胍虛所忌。氣實胍實奏功。消癥瘕。墮胎產。蝕潰爛之膿。銷瓜果之積。　按麝香一品。爲通關利竅之藥。凡邪氣着人。淹伏不起。

則關竅閉塞。用此辛香走竄。則毫毛骨節俱開。邪從而出。東垣云。風病在骨髓者。用之相宜。若在肌肉。反引風入骨。如油入麵矣。丹溪云。五臟之風。不可用腦麝以瀉衛氣。婦人血海虛。亦忌麝香之散。琥珀之燥。二公之言。誠得其肯。然諸風諸氣。諸血諸痛驚癇癡痕之病。經絡孔竅壅滯者。安得不用爲引導。以開通之耶。非不可用也。但不可過耳。證屬虛者。忌之。勞怯人。與孕婦不可佩帶。瓜果成積作脹。飲酒成消渴者。用之爲得。蓋果得麝則壞。酒得麝則敗也。　產陝西。

## 兎字左旁

文州。諸處市中每研荔核攙賣。用須辨之。當門子尤妙。不可近鼻。防白蟲入腦。

### 兎肝　四百十

辛平。甘冷。治風熱之目暗。療頭旋之眼花。

按兎爲太陰之精。得金氣之全者也。俗以肉飼小兒。云出痘稀。亦因其性寒而解熱耳。劉守眞云。兎肝明目。因其氣有餘以補不足也。眼科書云。兎肝能瀉肝熱。肝腎氣虛風熱上攻者。和夾明子丸服。甚効。若虛寒者戒之。　兎肉至秋深可用。金氣全也。白毛者尤妙。兎尻有九孔。子從口出。脣缺無脾。妊婦忌之。



国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

明月沙　即兎屎四百十一　治目中浮翳。理勞瘵五疳。瘡瘡入目能除。瘡瘡痔漏亦療。　按明月沙善能解毒殺蟲。故治目疾疳勞。瘡痔方中。往往用之。諸家本草並不言及。亦缺漏也。沈存中良方云。有病勞四體如焚。寒熱發燥。飲以明月丹。兎屎四十九粒。硇砂如兎屎大。四十九粒。生蜜丸梧子大。月望前。以水浸甘草一夜。五更初。取汁送下七丸。有蟲下。急錯入油鍋內煎殺。三日不下。再服。瘡後目翳。直往山中東西地上。不許回顧。尋兎屎二七粒。以雌雄檳榔各一枚同磨。不落



地并花水調服。百無一失。其效如神。

獺肝　四百十二　甘鹹。微溫。小毒。入手厥陰。足少陰經。鬼疰傳尸。慘滅門。水吞殊効。疫毒蠱災。常遍戶。末服靈奇。

按獺爲水中之獸。諸畜肝葉。皆有定數。惟此一月一葉。十二月十二葉。其間又有退葉。肉及五臟皆寒。惟肝溫也。其功長於治傳尸及鬼疰。蓋益陰氣補虛損。保勞極之藥也。故張仲景治冷勞。有獺肝丸。崔氏治九十種蠱疰傳尸。骨蒸伏連。有獺肝丸。二方俱妙。考屍疰。鬼疰。使人寒熱沉沉默默。不知病之所苦。而

無處不惡。積月累年。殲殲至死。死後傳人。乃至滅門。惟用獺肝。陰乾爲末。水服二錢。每日三服。以瘥爲度。其爪亦能搜逐癆蟲。用之須見形乃可驗。不爾則多僞也。

鼠胆 四百十三 青盲雀目。滴入復明。耳聾閉聽。點之即效。

按鼠屬水之物也。癸水之位在子。氣通於腎。開竅於耳。注精於瞳子。鼠目夜明。其精在胆。故胆能治耳聾青盲。精而能明目。皆腎病也。諸家本草。不言鼠胆治聾。而葛洪肘後方。甚稱其效。能治三十年老聾。若卒聾者。不過三度也。



牡鼠 臘月取之。以猪脂煎枯。去滓。入蠟。熬膏。傅湯火傷。滅瘢痕。極良。水鼓。石水。以肥鼠一枚。取肉煮粥。空心食之。兩三頓。即愈。

齒 治齒折多年不生。研末。日日揩之。甚效。雷公云。長齒生牙。賴雄鼠之骨末。

胆 其胆纔先便消。不易得也。用活鼠繫定。熱湯浸先。破喉取胆。真紅色者是也。

兩頭尖 即牡鼠屎。四百十四 甘寒。小毒。小兒疳疾大腹。葱豉煎飲。傷寒勞復發熱。尻枳末服。通室女之經閉。調婦人之吹奶。

按兩頭尖。爲足厥陰經血分之藥。故所治皆厥陰之病。張仲景及古今名方。多用之。然有是病

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

腽肭臍字仁字乃多計里
海狗皆曰安之加臨澀忌曰出東海水中狀若鹿形頭似狗長尾每日出即浮水面按蘇頌所謂獻出奧州北海臨海志所說出駿河海中二物全別物也



而服之。誤食令人目黃成疸。

腽肭臍 即海狗腎。味鹹大溫。入足少陰經。陰痿精寒。四百十五

瞬息起經年之恙。宿癥結癖。纖微消沉頓之疴。按腽肭臍。連臍取之。謂也。療勞瘵。壯元陽。脾胃虛損。極有功也。今之滋補丸中。多用之。精不足者。補之以味耳。能治鬼交尸疰。蓋陽虛而陰邪易侵。陽旺則陰邪自辟矣。宜於腎氣衰竭。精寒痿弱之人。若陰虛火熾陽事易舉。及骨蒸勞嗽者。俱不可服。出女直。及三佛齊國。毛色似狐。足形似狗。尾形似魚。腎上兩重薄皮。裹其九核。皮上有黃毛。一穴三莖。濕潤如常新置睡犬旁。驚狂躍跳者。眞也。酒浸炙香。剉搗。或酒煎熟。合藥。以漢椒樟腦。同收。則不壞。

卷十七 終



国立国会図書館 タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』 請求記号 特7-493 ガラス使用

人部
髮 四百十六
人中黃 四百十八
人中白 四百二十
人乳 一名仙人酒 四百廿一
紫河車 四百廿四
金石部
金箔 四百廿五
自然銅 四百廿六
牙齒 四百十七
輪廻酒 四百十九
秋石 四百廿一
天靈蓋 四百廿三





国立国会図書館 タイトル『本草匯卷1-8, 11-18』 請求記号 特7-493 ガラス使用

銅青 四百 廿七
胡粉 四百 廿九
蜜陀僧 即爐底 四百廿一
紫石英 四百 廿三
水銀 一名汞 四百廿五
銀朱 四百 廿七
石膏 四百 廿九
赤石脂 四百 四一
無名異 四百 四三
黑錫 即鉛 四百廿八
黃丹 四百 三十
古文錢 四百 卅二
硃砂 四百 卅四
輕粉 四百 卅六
雄黃 四百 卅八
滑石 四百 四十
爐甘石 四百 四二
石鐘乳 即鵝管石 四百四四
浮石 四百 四五
磁石 即吸鐵石 四百四七
禹餘糧 四百 四九
花乳石 四百 五一
空青 四百 五三
朴硝 四百 五五
玄明粉 四百 五七
硫黃 四百 五九
陽起石 四百 四六
代赭石 四百 四八
青礞石 四百 五十
石燕 四百五二 附禽部石燕
膽礬 四百 五四
芒硝 四百 五六
蓬砂 四百五八 硇砂附
白礬 四百六十 綠礬附

服器部

稗稹 四百六一
病人衣 四百六三
死人枕 四百六五
桐油傘紙 四百六七

水部

地漿 四百六八
漿水 四百七十

火部

艾火 四百七一
衣帶 四百六二
自經死繩 四百六四
吹火筒 四百六六
生熟湯 四百六九
火鍼 四百七二


梅苻岳


土部

東壁土 四百七三
西壁土附
伏龍肝 四百七四


国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

吳門郊西郭佩蘭章宜纂輯

男 樹畦馨阡

姪 維均梅在 參閱

紫藤陳陸坤白筆校訂

## 人部

### 髮 四百十六

苦溫。入手少陰足厥陰足少陰經。去瘀血。補眞陰。炙髮與鷄子同煎。兒驚悸。已髮與川椒共煅。令本體烏頭。吐血衄紅。取效。腸風崩帶宜求。按







国立国会図書館　タイトル『本草匯卷1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

髮者。血之餘也。故于血症多功。頭上髮。屬足少陰陽明。耳前鬢。屬手足少陽明。額下鬚。屬足少陰陽明。兩頰髯。屬足少陽。其經氣血盛。則美而長。氣多血少。則美而短。氣少血多。則少而惡。氣血俱衰。則白而落。素問云。腎之華在髮。王氷註云。腎主髓腦者髓之海。髮者腦之華。腦減則髮素。滑壽註云。水出高原。故腎華在髮。髮爲血餘。血即水也。今方家呼髮爲血餘。義蓋本此。其性雖走血分而帶散血病用之。亦取其治標之義居多。若欲全仗其補益。未必能也。胃弱者勿服。入外科藥神効。藏器曰。掛果樹上。則烏不敢來。亦奇。　以皂莢水洗淨。晒乾入礶火煆。冷研用。

## 牙齒　四百十七

鹹熱有毒。入足少陰經。痘瘡倒黶。黴加少許酒調吞。癰乳難穿。酥拌貼之。旋發潰。內托陰疽之不起。外敷惡漏之多膿。　按齒者。骨之餘也。爲痘家之劫劑。必毒自腎出。外爲風寒穢氣所觸。腠理閉塞。血澀不行。毒不能出。變黑倒黶。宜用此以酒麝達之。



国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

竄入腎經。瘡自紅活。若伏毒在心而昏眩者。及氣色虛白。癢塌不能作膿。熱沸紫泡之症。宜解毒補虛。誤用人牙。反成不救。火煆水飛。

人中黃 四百十八 苦寒。入足陽明經。止大熱狂渴。消瘡瘡血熱。解百毒。降陰火。 按人中黃。即金汁是也。尚治胃家熱毒有效。經曰。陽明實熱則登高而歌。棄衣而走。宜用此苦寒者除之。若傷寒非胃家實熱。瘡瘡非紫黑乾枯者。均禁。 用櫻皮綿紙。鋪黃土。澆糞淋土上。濾取清汁。入新甕內。椀覆埋土中。經年取出。清如泉水。全無穢氣。年久者彌佳。

輪廻酒 四百十九 味鹹氣寒。入肺胃膀胱三經。清熱病咽痛。解勞弱蒸煩。行血而不傷于峻。止血而無患其凝。吐衄產家稱要藥。損傷跌撲是仙方。 按輪廻酒。即小便之別名也。爲除勞熱骨蒸。咳嗽吐血。及婦人產後血暈悶絕之聖藥。褚澄勞極論云。降火甚速。降血甚神。飲溲溺百不一死。服涼藥百不一生。言其功用之優勝也。時珍云。飲入于胃。隨脾之氣。上歸于肺。下通水道而入膀胱。故能治肺病引火下行。但取十二



国立国会図書館 タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』 請求記号 特7-493 ガラス使用

歲以下童子。絕其烹炮鹹酸。多與米飲以助水道。每用一盞。入薑汁。或韭汁二三點。徐徐服之。久則自効。然宜于陰火虛動。熱蒸如燎。服藥無益者。若氣血虛無熱者。不宜多服也。童男者良。自便如雪者。亦妙。

人中白　四百二十　味鹹。氣寒。治傳尸熱勞。鼻衄不止。清咽喉肺痿。除火消瘀。按人中白。卽人溺之澄下結成者是也。能瀉肝腎三焦膀胱有餘之火。爲除熱去火之聖藥。蓋鹹能潤下走血。故也。以之治口舌疳瘡。每多効驗。以風日久乾者爲良。煆過。水飛用。

秋石　四百二十一　味鹹。氣溫。滋腎水。養丹田。還元復命。安五藏。潤三焦。消痰退蒸。虛勞冷疾堪用。鼓脹代鹽可嘗。煆過。少用之。按秋石。屬金與水。故能益肺補腎。爲滋陰降火之聖藥。既經煆煉者。其氣近溫。久服常令人成渴疾。蓋鹹爲走血之物。中寓煖氣。未免虛陽妄作。眞水涸竭。況甚則加以陽藥。助其邪火乎。惟丹田虛冷者。服之可耳。況火煉乃陽中之陰。得火而凝。入水則釋。歸于無體。蓋質去味厚。此離中之虛也。水煉乃陰中之陽。得水而凝。遇曝而潤。千歲不變。味去質存。此

秋石由汝里乃祢里伊之

坎中之實也。世但得火煉一法。而不知陰煉補陰。陽煉補陽。須陰陽兼用。得坎離既濟之妙。古方有秋石五精丸。常服補益。秋石一兩。蓮肉六兩。眞川椒紅五錢。小茴香五錢。白茯苓二兩爲末。棗肉爲丸。鹽湯溫酒空心下。又有四精丸。治思慮色欲過度。損傷心氣。遺精便數。秋石茯苓各四兩。蓮肉芡實各二兩爲末。蒸棗和丸。空心鹽湯下。〔陽煉法〕取便十桶。每桶入皂莢汁一碗。竹杖攪千下。候澄去清留墊。音佐濾淨。入鍋煎乾。擣細。再以清湯煮化。箚箕內鋪紙淋過。再熬如此七次。其白如雪。方入礶內。鐵盞蓋定。鹽泥固濟。升打三炷香。取出再研。如前升打。鐵盞上。用水徐徐擦之。水不可多。多則不結。又不可少。少則不升。從辰至未。退火冷定。盞上升起者。爲〔秋氷〕味淡而香。乃秋石之精英也。有滋腎固元。清熱退痰之妙。其不升者。即秋石也。但可蘸肉食。亦有小補。〔陰煉法〕用便四五石。以大缸盛。入新水。攪千回澄定。去清留濃汁。又入新水攪澄。候無臭氣。澄定。刮下曝乾用。秋月取童子溺爲最。近時不擇秋令。雜收人溺。盡失其道。奚取



国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

其名乎。媒利欺世。豈能應病。

人乳　一名仙人酒。味甘。平涼。入手少陰。足厥陰。太陰。四百廿二

經。大補眞陰。最清煩熱。補虛勞。潤噎膈。大方之玉液也。祛膜赤。止淚流。眼證之金漿耶。　按乳。乃血液所化。生于脾胃。攝于衝任。未受孕。則下爲月水。既受孕。則留而養胎。産後。則變赤爲白。上爲乳汁。此造化玄微之妙。却病延年之藥也。以人補人。功非淺小。世俗服者多瀉。遂歸咎焉。不知人乳若能發瀉。則嬰兒盡當脾泄矣。惟乳與食並進。便爾溏瀉。大人飲食既多。又服人乳。何怪其瀉。當夜半服之。昨日之食既消。明日之食未進。且陰分服陰藥。正相宜也。若虛寒滑瀉之人。禁服。　入藥晒粉用。或以乳放銀器內。微火候如麪漿。作丸送亦妙。

天靈蓋　四百廿三　味鹹。氣平。白湯煎液吞嘗。傳尸滅影。紅絹包藏巔頂瘧鬼潛踪。　按天靈蓋。即死人頂骨是也。雖治傳尸鬼疰邪瘧。然古人以掩暴骨爲仁厚。方士取人骨爲藥餌。有人心者固如是乎。犬且不食犬骨而人食人骨可乎。必不得已。或取年深絕屍氣者。



天靈蓋志也乳加字倍

仙人衣惠奈

然亦不可食。或包用。或煎湯。用畢。送還原處。報之以經懺。庶其可也。腐爛者佳。方家有用檀香湯洗過。酥炙用。或燒存性用。男慢骨色不赤。女骨色赤。

紫河車　四百廿四　味鹹甘。溫。入手少陰足少陰經。補心除羸瘦。滋腎理虛勞。氣血損弱。服之頓異。下元衰憊。餌之精生。按紫河車。卽人胞別立之名也。丹書云。天地之先。陰陽之祖。乾坤之素餻。鉛汞之胚胎。九九數足。我則載而乘之。故名河車。乃補陰陽兩虛之藥。雖稟後天之形。實得先天之氣。超然非他金石草木之類可比也。舌方有大造丸用河車一具。敗龜板使浸酥炙二兩。黃蘗鹽酒浸炒一兩半。杜仲酥炙一兩半。牛膝酒洗一兩二錢。生地二兩半。入砂仁六錢。白茯苓二兩。絹袋盛。入瓦罐。酒煮七次。去茯苓砂仁。杵地黃爲膏。聽用。天門冬麥門冬人參。各一兩二錢。夏月加五味子七錢。各不犯鐵器爲末。同地黃膏。入酒米糊丸。空心鹽湯下。女人去龜板。加當歸二兩。以乳煮配合之妙。服之大補。世醫用陽藥滋補。非徒無益。爲



国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

害不小。蓋邪火只能動欲。不能生物。龜板。黃蘗。補陽補陰。爲河車之佐。加以杜仲補腎強腰。牛膝益精壯骨。四味通爲足少陰之藥。古方加陳皮。爲補腎藥也。生地黃涼血滋陰。得茯苓砂仁同黃蘗。則走少陰。白飛霞以此四味爲天一生水丸也。天冬麥冬。能保肺氣不令火炎。使肺氣下行生水。然其性有降無升。得人參則鼓動元氣。有升有降。故同地黃爲固本丸也。大抵以金水二臟爲生化之原。加河車以成大造之功也。然而陰虛精涸。水不制火。發爲咳嗽。吐血。骨蒸。盜汗。等證。此屬陽盛陰虛。法當壯水主以制陽光。不宜服此並補之劑。以耗將竭之陰也。胃火齒痛。亦宜忌之。　長流水洗淨。蒸搗和藥。筋膜乃初結眞氣。不可剔去。

## 金石部

### 金箔 四百十五味

味辛。有毒。安鎮靈臺。神魂免于飄蕩。辟除惡祟。藏府搜其伏邪。　按金禀西方之質。性能制木。生者大毒殺人。用箔亦不過二分。借此以療驚癎風熟肝膽之病耳。仲景紫雪方。用赤金煎液。取其制肝



国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493
ガラス使用

自然銅　祢良
五留　阿加久祢

風。降炎逆也。然古方亦罕用之。蓋血肉之軀。水穀爲賴。豈可堪此金石重墜之物。故太清法云。金熏中宮陰已之氣。性本剛。服之損傷肌肉。觀此而世亦可鑒矣。若輕粉水銀所傷。非金莫療也。中其毒者。惟鵝鴿消瘀破滯。疼痛者。修爾堪除。按自然銅。不從鑛鍊。故號自然。世以爲接骨神藥。然壯實者。尚可暫施。若虛弱者。非所宜也。大抵折傷之症。宜補氣補血補胃。不可信俗工惟在速效。而用此燥散之劑也。蓋其火金之毒。有甚于刀劒耳。

銅青　四百廿七　味辛酸。澀。微毒。入足厥陰經。女科理血氣之痛。眼科主風熱之疼。內科吐風痰之聚。外科止金瘡之血。殺蟲有効。疳症亦宜。按銅青。熏土中陰氣以生。青則其英華秀出所結也。能入肝膽。故吐利風痰。明目殺疳。皆肝膽之病也。取銅器上綠色者。淘洗用之。近時人以醋制銅生綠。取收晒乾。

銅青　阿加乙祢
乃美登利



国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

治那未利皆白按有五種日本所產多黑錫也

黑錫　即鉛。四百廿八　味甘。氣寒入足厥陰經。安定心神。風癇吐沫皆可治。傷寒熱毒。噎膈嘔噦總堪除。能明目而烏鬚。堅牙齒而解毒。　按黑錫即鉛之別名也。秉北方壬癸之氣。陰極之精。其體重實。其性濡滑。其色黑。內通于腎。故局方黑錫丹。宣明補真丹。皆用之。能治一切陰陽混淆。上盛下虛。氣升不降。發爲嘔吐眩運。噎膈反胃。危篤諸疾。所謂鎮墜之劑。有反正之功。但性帶陰毒。不可多服。恐傷人心胃耳。鉛性入肉。故女即自穿孔。實女無竅者。以鉛作鍼。逐日紅之。久久自開。又鑄爲梳。梳髮光黑甚妙。或用藥煮之。尤佳。鉛十兩。錫三兩。婆羅得三箇。針砂。熟地黃。半兩。茜根。胡桃皮。一兩。沒石子。訶黎勒皮。硫黃。石榴皮。慈石。皂礬。爲末。烏麻油。各三錢半。先化鉛錫。入末一半。柳木攪勻。傾成梳模子。印成修齒。餘末同水。煮梳三日三夜。水耗加之。取出過五日。以熟軟皮襯手梳之。先以皂莢水洗淨髮用。　養正丹用之。治一切上盛下虛。孤陽發越上浮。煩躁面赤。恍惚驚惕。吐嘔反胃等症。用此以鎮墜陽氣。使火入陰分。則上焦得寧。而後可以隨症施治。黑錫丹用之。治一切下元虛冷。陽氣垂絕。陰陽將離。及沉寒痼冷。諸病。然偏于陰降。凡脾胃虛寒。陽火不足。下部陰濕者。法並忌之。

中輕粉毒者。打鉛壺盛燒酒十五斤。納土茯苓半斤。

乳香三錢重湯煮一日夜埋土中出火毒每日早晚任飲小便自有粉出至筋骨不痛乃止若中砒硫毒磨一二兩水灌即解　溶化濾去渣腳收用然必數次方好其黑錫灰能治積聚殺蟲同檳榔末五錢粳米飲下灰即鉛沙溶出之物也白錫灰不入藥

胡粉　四百廿九味甘辛寒去腹中髓瘕治乾濕癬瘡同蘇木能續折傷之骨等硃砂堪醫瘡似蜂窠　按胡粉即鉛之變黑爲白者也體用與鉛及黃丹相等但此有豆粉蛤粉雜內止能入氣分耳性善殺蟲止痢服之者以糞黑爲驗然性冷走而不守脾胃虛弱與娠婦均忌也亦可入膏藥代黃丹用

黃丹　四百三十味辛鹹寒止痛生肌宜于外傅鎮心安魄可作丸吞殺蟲墜痰截瘧止痢　按黃丹乃炒鉛所作體重性沉味兼鹹礬走血分能墜痰去怯治驚癎癲癇卽小兒癎風也能解熱拔毒長肉去腐入膏藥爲外科必用之物也　以水漂去消鹽飛去砂石澄乾微火炒紫色地上去火毒入藥用

蜜陀僧　卽爐底四百卅一味辛鹹平有毒鎮心主滅瘢黜



粉錫今俗云絡字乃豆知又云汝伊保皆曰本中和名曰古布尓按今俗曰汝伊保用鉛燒成白粉也

鉛丹皆曰本中和名曰多尓用鉛硝燒成赤粉也

蜜陀僧呂加祢乃祢里曾古皆曰和名呂曾志

古文錢布流
世仁

人乳抹夜塗旦洗。五痔牡酒腸。金瘡同借重瘧家痢證共尋求。按蜜陀僧。即煎銀爐底感銀鉛之氣而成性重沉墜直走下焦。故鎮心下痰食之能令人寒中胃虛。及因寒發吐者。勿服。搗細。火煮一伏時。水飛用。

古文錢 四百卅二 辛平。有毒。明眼目。點翳障。通五淋。治月腸。按古錢能去目中障。消瘀腐。蝕壞肉。甚妙。患此者。用生薑去皮。以古青錢刮汁點之。熱淚蔑面腫赤即散。此寇宗奭自試也。五六百年外者可用。唐開元通寶亦爲古今所重矣。

紫石英 四百卅三 味甘。氣溫。陽中之陰。降也。入手少陰足厥陰經。上通心主。鎮方寸之靡寧。下達將軍。助胎宮而有孕。按紫石英色屬南方。故功在血。分其性鎮而重。其氣煖而補上。能鎮君。重以去怯也。下能益肝。濕以去枯也。心主血。肝藏血。故神不安。血不足。血海虛寒不孕者。誠要劑也。然石類之物。止宜于暫用。不可久服。陰虛火熱者忌之。

出泰山山中。色有五品。

火煆醋淬。水飛。畏扁豆附子。惡黃連。

紫石英良伍岐多未乃沒奈本中和名曰出伯州今出泉州湧等者只有紫白二種白者最多紫者稀

硃砂以之尓本中和

硃砂 四百卅四 味甘。微寒。純陰。入手少陰經。鎮心而定癲



国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

名曰出倭國者
未見出日本者
方宜用渡海白色
緊不染紙者為上
色赤紅質嫩者次
黑暗暗火擂壁者
不堪入茶

水銀美豆加祢
延喜式曰美豆
加祢出勢州皆曰
比硃砂精液也本中所載有燒丹汰得別有出砂地者出汰地者其色青白入茶尤佳

狂藥邪而殺鬼祟解胎熱瘡毒療目膜宿癥　按硃砂禀離火之氣性反涼者離中有陰也味不苦而甘火中有土也為心經血分主藥同遠志龍骨之類則養心氣同當歸丹參之類則養心血同枸杞地黃之類則養腎同厚朴川椒之類則養脾同南星川烏之類則祛風隨佐使而見功也若人自覺本形作兩人行臥不辨真假者離竟病也參茯辰砂自不可缺耳獨用多用令人呆悶體中含汞止宜生用若經火煉毒等砒矣

戒之戒之　產辰州形如箭鏃透明者佳研細水飛用忌火畏磁石鹹水

## 水銀　一名汞四百卅五

味辛氣寒大毒殺皮膚中蟲消金銀之毒下婦人之死胎損男子之陰氣　按水銀即丹砂中液也禀至陰之氣其性下走而無停歇以傅男子陰能消陽氣而不起蓋其性沉滑入骨鑽筋頭瘡用之食腦至盡入肉則百節拘攣倒陰絕陽百藥不治或灸金物熨之庶冀其出耳陰毒之物無似之者若其外治之功蓋不可掩故外科黃白靈丹中每用之以奏功黃靈丹專治無名腫毒止痛止臭拔毒去腐肉生新肉收口水銀明礬各一兩火硝二兩石青二錢蜜陀僧一錢硼砂一錢倭鉛三錢硃砂三錢菉丹一錢雌黃一錢銀朱三分先用微火煨乾鍋內以砂碗蓋之光粉封固碗口昇三炷香取起俟冷取藥用白靈丹常治各樣未成腫毒用醋調點



国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

患處頭上。看毒大小。如桐子大泡起。毒即消。若已成不肯穿者。亦用此作餅。將膏藥貼頭上。半日即穿。水銀一兩。青鹽。明礬。皂礬。各二兩。火硝二兩五錢。硼砂。雄黃。硃砂。各三錢。研勻。放烊銅罐內。微火煨乾後。降三灶香。俟冷取藥。不可生人雞犬沖。撒失在地。但以川椒末。或茶末收之。或以眞金。及鍮石引之即上。

**輕粉** 四百卅六 味辛。氣冷。大毒。升也。浮也。治痰涎積滯。殺楊梅癬瘡。按輕粉。乃鹽礬煉水銀而成。其氣燥烈。其性走竄。至陰毒物。善劫痰涎。消積滯。故水腫風痰。濕熱毒瘡。服之則涎從齒齦而出。邪鬱暫開而疾因之亦愈。若服之過劑。及用之失宜。則毒氣被蒸竄入經絡筋骨。莫之能出。痰涎去而血液亡。變爲筋攣骨痛。發爲癰腫疳瘡。漏經年累月。遂成廢痼。因而夭者。不可枚舉。黃連。土茯苓。陳醬。黑鉛。可制其毒。　升煉輕粉法。用水銀一兩。白礬二兩。食鹽一兩。同研不見星。鋪于鐵器內。以小烏盆覆之。鹽泥封固盆口。以炭火打三灶香。取開。則粉升于盆上矣。

**銀朱** 四百卅七 味辛。氣溫。有毒。劫痰破積。療疥癬與疔毒。殺蟲。治蝨。驅腳股之濕風。　按銀朱。乃硫黃同汞。升

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

煉而成。其性燥烈。亦能爛齦。變筋。功過與輕粉同。廚人染供饌。未知其害耳。

雄黃 四百八味 辛。苦溫。大毒。氣味俱厚。升也。陽也。入足陽明厥陰經。搜肝氣。瀉肝風。解百毒。辟百邪。截邪瘧。理蛇傷。同礬甘 甘草 浸陰腫之如斗。與釅醋塗眉毛之脫落。驚癇嵐瘴皆除。五尸注病同制。按雄黃。稟火金之性。得正陽之氣。殺百毒。辟百邪之要藥也。入肝經氣分。故肝風。肝氣。痰涎。瘧痢。痢癖。癖積。諸病。用有殊功。然外用易見其長。內服難免無害。生武都焞煌山陽明徹者佳。有臭者。以醋洗之。油煎九日九夜。方可入藥。不爾有毒。二法用米醋入蘿蔔汁煮乾用。愼勿生使。南星地黃瓦加皮地榆黃芩白芷當歸皆可制。

石膏 四百卅九 甘辛。大寒。氣味俱薄。降也。陰也。入手太陰。少陽。足陽明經。除頭痛如裂。解皮熱如火。瀉陽明蒸熱而汗出。發傷寒鬱結而無汗。止消渴于胸中。療盛熱之喘嗽。營衛傷于風寒。青龍收佐使之勳。相傅囚于火熱。白虎定爲君之劑。按石膏。體重而沉。乃陽明經大寒之藥。善治本經頭痛牙痛。石膏二錢 煅荊芥二

錢丹皮二錢生薑一錢青皮二錢炒防風二錢甘草一錢上當門四齒屬心經加黃連麥冬上左二齒屬胃加川芎白芷上左盡二牙屬胆加羌活草龍胆上右一帶屬大腸加大黃枳殼下當門四齒屬腎加黃蘗知母下左二齒屬脾加芍藥白朮下左二齒屬肝加柴胡山梔下右一帶屬肺加杏仁桑白皮已上所加藥各二錢水二鍾慢慢煎嗽服止消渴中暑潮熱非腹有極熱者不宜輕用又陽明經中熱發熱惡寒燥熱日晡潮熱肌肉壯熱小便濁赤大渴引飲自汗之藥仲景用白虎湯是也若無以上諸證不可服也多有血虛發熱象白虎證而誤用之不可勝救成無已曰風爲陽邪寒爲陰邪陰陽兩傷則非輕劑所能獨散必須輕重之劑以同散之乃得陰陽邪散而榮衛俱和是以大青龍以石膏爲使石膏重劑而又專達肌表者也天抵脉數不退及少壯肺胃火熱之人功如反掌老弱虛寒之人禍不旋踵東垣云立夏前服白虎湯令人小便不禁降令太過也極能寒胃使人腸滑不能食若溫熱病邪在太陽未傳陽明者不當用七八日來邪已結裏有燥糞往來寒熱宜下者亦勿用方解石性氣相同白不透明可混石膏不能解肌發汗用者辨之有軟硬二種寒水石即昔人所謂軟石膏也

搗粉。生甘草水飛過澄晒。虛人煅用。或糖拌炒。則不妨脾胃。惡巴豆。

滑石　四百四十　甘淡大寒。降也。入足陽明太陽。手少陰。太陽陽明。經。利水道。除濕而定六府。泄逆氣。降火而解燥渴。石淋伏暑。必要。轉脬。因過忍小便而致。霍亂亦須。按滑石一味。用質之藥也。滑以利諸竅。通壅滯。下垢膩。甘以和胃氣。寒以散積熱。甘寒滑利。以合其用。是爲祛暑散熱。利水除濕。消積滯。利下竅之藥。然不獨小便也。上能利毛腠之竅。下能利精溺之竅。蓋甘淡之味。先入于胃。滲走經絡。遊溢精氣。上輸于肺。下通膀胱。肺主皮毛。爲水之上源。膀胱司津液。氣化則能出。故上能發表。下則利水。發表是燥上中之熱濕。利水是燥中下之熱濕。熱散則三焦寧而表裏和。濕去則陰陽通而關門利。劉河間之用益元散。（滑石六兩。甘草一兩。）治表裏上下諸病。亦是此意。性既沉滑。能泄上氣下行。不可與淡滲藥同用。氣虛者。兼人參甘草用之。又如天令濕淫太過。人患小便不利而渴。正宜用以滲泄。渴自不生。若或無濕。小便不利而渴者。則知內有燥

熱燥宜滋潤苟誤服之亡其津液而渴反盛矣陰火虛熾水涸者勿用精滑便利者禁之　刮淨研粉以牡丹皮同煮一伏時水飛晒乾用

赤石脂（酉白西一）甘酸辛溫陽中之陰降也入心胃大腸三經主生長肌肉療崩漏脫肛固腸胃有收斂之能下胎衣無推蕩之峻別錄養心氣明目益精者赤爲離火之象南方之色而甘溫則又有入血益血之功血足則目明心氣收攝則得所養而下交于腎故有如上功能也

按赤石脂收濇之劑也濇可去脫故張仲景用桃花湯治下痢便膿血取赤脂之重濇入下焦血分而固脫乾薑之辛溫煖下焦氣分而補虛粳米之甘溫佐石脂乾薑而潤腸胃也本草主胞衣不出者濇劑何以能下以其體重下降而酸辛能化惡血也惡血化則胞胎無阻滯之患矣東垣所謂胞衣不出濇劑可以下之此之謂也新痢與火熱暴注者不宜用

多產泰山赤者入丙白者入庚研細水飛三過澄者去之亦有火煆飛者粘膩綴唇者佳畏芫花惡大黃松脂



国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

爐甘石 四百四二 味甘氣溫入陽明經散風熱而消腫毒除翳膜而散赤昏 按爐甘石得金銀之氣而結成故能平肝治目清腫退赤去爛除翳爲眼科要藥川蜀湘中最多火煆紅童便淬七次研粉水飛入硃砂則不粘膩

無名異 四百四三 甘平鹹寒治金瘡療折傷收濕氣生肌肉 按無名異陽石也善理折傷內損止痛消毒故臨杖人用以溫服三錢則不甚傷亦善收水氣故煎煉桐油者不可缺

石鍾乳 即鶺管石 四百四四 味甘氣溫有毒補陽衰而治虛損下乳汁而壯腰膝 按石鍾乳乃陽明經氣分之藥其氣慓疾令陽氣暴充飲食倍進昧者得此自慶肆其淫佚精氣暗損發爲癰疽淋濁豈鍾乳之罪耶世人病陰虛有熱者十之九陽虛內寒者百之一是以自唐迄今因服鍾乳而發病者不可勝紀服之而獲効得力者不聞一二也尊生之士無惑乎長年之說致蹈前人覆轍也 生少室山谷鮮明薄而有光潤似鶺翎筒子者爲上置銀器中水煮三日夜色變黃

白。換水再煮。其水色青不變。即熟無毒矣。研膩水飛用。蛇牀爲之使。惡牡丹。畏紫石英。忌羊血參朮。當終身忌之。

浮石　四百四五　鹹平。大寒。清金降火。止渴治淋。積塊老痰逢便化。癭瘤結核遇旋消。　按浮石。乃江海間水沫結成。白質體輕。肺之象也。氣味鹹寒。潤下之用也。不獨入肺清源。又治一切淋病。余琰席云。肝屬木。當浮而反沉。肺屬金。當沉而反浮。何也。肝實而肺虛也。故石入水則沉。而南海有浮水之石。木入水則浮。而南海有沉水之香。虛實之反如此。多服損人氣血。

陽起石　四百四六　味鹹微温。有毒。補命門。散濕痺。治腰膝寒疼。療精滑陰痿。　按陽起石。稟純陽之氣。其產處之山。冬不積雪。則氣之温煖可知。入右腎。補助陽氣。併除積寒宿血。留滯下焦之聖藥也。然亦非久服之物。陰虛火旺者忌之。　齊州揀金山出者勝。凝白者佳。火煆酒淬七次。研細水飛乾用。桑螵蛸爲之使。惡澤瀉菌桂雷丸蛇蜕畏兔絲子。忌羊血。不入湯。

磁石　即吸鐵石。四百四七　甘鹹辛温。氣味俱厚。沉而降。陽中陰

也。入足少陰。兼入足厥陰經。養腎氣。填精髓。治目眼光明不收。理內障神水淡綠。除周痺之風濕。去肢節中痠疼。　按磁石生于有鐵處。得金水之氣。法水色黑而入腎。有補腎益精之功。明目聰耳之驗。蓋磁石入腎。鎮養眞精。使神水不外移。佐以硃砂入心。鎮養心血。使邪火不上侵。而又佐以神麯消化滯氣。生熟並用。溫養脾胃。故東垣磁硃丸用之。亦治心火乘金。水衰反制之病。然中病即已。不可久服。天都浸酒優于丸散。　河南磁州者佳。火煆醋淬水飛。柴胡爲之使。畏雄附。

禹餘糧　四百四九　味甘鹹。寒。療血閉癥瘕。赤白漏下。除煩



使。惡牡丹。皮。畏石脂。

代赭石　四百四八　味苦。氣寒。陰也。降也。入手少陰。足厥陰經。治陰痿不起。愈驚氣入腹。煎眞金湯。服半錢。連進三次。看兒脚上有赤斑。即是驚氣已出。當愈。如無赤斑不治。墮胎氣理難產。　按代赭。入肝與心胞。肖主二經血分之病。伸景治傷寒汗吐下後。心下痞鞕噫氣。用旋覆代赭湯。取其重以鎮虛逆。赤以養陰血也。　出山西代州。煆紅醋淬。水飛。乾薑爲之使。畏雄附。

滿欬逆寒熱結痛。按禹餘糧手足陽明血分重劑也。其性濇。故主下焦前後諸病。李知先詩曰。下焦有病人難會。須用餘糧赤石脂。生潞州。細研水澄飛勿令有沙土。牡丹爲之使。

青礞石 四百五十 味鹹甘。平。化頑痰結癖。行食積停留。按礞石。體重下行。乃厥陰之藥。肝經風木太過。來制脾土。氣不運化。積滯生痰。壅塞上中二焦。變生尸熱諸病。宜此藥重墜。令木平氣下。則痰症自愈。然宜于脾胃壯實而不用于虛弱也。如脾胃不運。或多食酒麪濕熱之物。以致膠固稠黏難出者。用之應如桴鼓如陰虛火炎。煎熬凝結爲痰者。投之未有不敗。出盱山。入礜打碎四兩。消石四兩。同拌火煆至消盡。石色如金爲度。研細。水飛用。

花乳石 四百五一 酸濇。氣平。治崩損噴血。消瘀血爲水。按花乳石。古方未有。亦無氣味。近世用以傳金瘡有驗。蓋厥陰經血分藥也。其功專于止血。能化血爲水。消化。則無壅阻之患。故婦人血暈惡血上薄也。用此消化。則無暈阻之患。故葛可久治吐血出升斗。有花蕊石散。皆是上原有瘀

血停凝者。暫用之。後必須多服童便獨參湯。若虛勞內熱火炎之人。切不可施。出陝州。火煆水飛。

石燕 四百五十二 味甘。氣凉。治小便淋瀝。療赤白帶下。按石燕性凉。乃利竅行濕熟之物。婦人難產者。兩手各把一枚。立驗。出零陵。火煆醋淬七次。爲末。周其助陽者。乃禽部之石燕。俗人往往用此謬矣。附〔禽部石燕甘煖。壯陽事。煖腰膝。添精禦風寒。縮便潤皮膚。按此乃土燕之乳于巖穴者。狀似蝙蝠。口方。食石乳汁。取二七枚。和五味子炒熟。以酒一斗浸三日。臥時隨飲。甚健力。冬月堪食。餘月止采治病。

空青 四百五十三 味甘酸。寒。治眼目瞎瞎不明。療黑翳覆瞳昏暗。按空青。狀若楊梅。其腹中有漿如油。治盲立效。故治眼翳障。爲最要之藥。大難得之物也。今方家以藥塗銅物生青。刮下僞作空青者。誤矣。產于銅處。明目之外。無別用。

膽礬 四百五十四 味酸辛。寒。有毒。治風痰喉痺。理風眼赤爛。按膽礬。少陽膽經之藥。其性收斂上行。能涌風熱痰涎。發散風木相火。又能殺蟲。故治咽喉口齒瘡毒

有奇功也。喉痺垂疽。醋調灌之。大吐膠痰即愈。出泰州羌道山谷。其狀如翠琉璃而有白文。易破折者眞。今市多以醋揉青礬假充。不可不細認也。研極細末用。畏辛夷白微芫花菌桂。

朴硝 四百五五 味醎辛苦。大寒。小毒。陰也。降也。入胃大腸二經。㕮咀六府積聚。破停痰痞食。除積熱。有峻泄之勇。破宿血。有洗滌之功。明目清躁。棟明淨皮硝煎化。露一夜濾清。朝久洗目。推陳致新。按朴硝。乃初次煎成入盆。凝結在下粗濁者。其氣味峻烈。能蕩滌三焦。腸。胃。實熱陽强之病。折治火邪之藥也。食鱠不消。以此蕩逐之。然僅可施于鹵莽。及傅塗之藥。若湯散中。必須芒硝爲佳。故仲景每用芒硝而不用此。以其太峻耳。

芒硝 四百五六 味鹹辛苦。大寒。小毒。氣薄味厚。沉而降。陰也。消痰滌熱。下燥潤腸。破堅積。墮胎氣。下瘰癧。通五淋。從枳實爲峻劑。隨甘草爲緩方。按芒硝。即朴硝之再經煎煉。凝結于上。有稜如麥。其質清明。其性和緩。乃硝之精者也。其性以消物爲主。故能消五金八石。況乎五藏之積聚哉。其味又兼鹹。內經云。鹹味下泄



国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

爲陰。又云鹹以耎之。熱淫于內。治以鹹寒。氣堅者。以鹹耎之。熱盛者。以寒消之。故張仲景大陷胸湯。大承氣湯。調胃承氣湯。皆用芒硝以軟堅去實。而本草言利小便而墮胎。然傷寒妊娠可下者。用此兼大黃引之。直入大腹。潤燥耎堅。瀉熱而子母俱安。經云有故無殞。亦無殞也。此之謂歟。惟脉實者爲良。附紫雪方療傷寒一切積熱狂叫毒癘。黃金一百兩。石膏寒水石。滑石。慈石。各三斤。搗碎水煮去滓。入犀角。羚羊角。青木香。沉香。各五兩。玄參。升麻。各一斤。炒甘草八兩。丁香一兩。入前汁中。煮取一斗五升去滓。入煉朴硝十斤。硝石三十二兩。于藥汁中。微火煎之。柳木不住手攪。至水氣盡。入麝香一兩二銭半。朱砂末三兩。攪勻收之。隨病輕重用。紅雪方治傷寒狂躁胃爛發斑。及積滯口瘡。喉痺。腸癘。等症。川朴硝十斤。鍊去滓。羚羊角屑。黃芩。升麻。各三兩。人參。赤芍。檳榔。枳殼。生甘草。淡竹葉。木香。各二兩。木通。梔子。葛根。桑皮。犬青。藍葉。各一兩半。蘇木六兩。並煎去滓。下硝不住手攪。水氣盡。下朱砂一兩。麝香半兩。經宿成雪。冷水調服。欲行用熱湯。碧雪方治時疾發狂積熱胃火諸病。朴硝芒硝。馬牙硝。硝石。各一斤。以甘草一斤。煎水。

## 玄明粉　四百五七

味辛甘寒。沉而降。陰也。入手少陰。足厥陰陽明經。去胃中之實熱。蕩腸中之宿垢。按玄明粉。即芒硝投滾湯沸化。夜置冰霜之下。結起在水面上者。其色瑩白。陰中有陽之藥也。善退膈上虛熱。心



国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

中煩躁熱厥發狂。一切實熱實火之病。蓋無堅不磨。無結不散。無熱不蕩。無積不推之物。故仲景于諸承氣湯用之。非結邪下焦。堅實不可按者。不可輕用也。其性大寒。苟非伏陽。決不可投。若治陰毒及陰症。立刻斃矣。

蓬砂　四百五八　甘涼。微鹹。退障除昏。開努肉。銷瘢痕。通腦殺蟲。按蓬砂之性。能柔五金。其消剋可知矣。能除噎膈。積塊瘀肉。痰結。骨硬。陰潰惡瘡等病。但可療有餘。難施于不足。虛勞證中。非所宜也。有二種。西戎者白如明礬。南番者黃如桃膠。又附硇音鐃砂　大熱大毒。能爛金銀銅石。可爲銲音翰藥。生食之化人心爲血。中其毒者生綠豆研汁解。重湯煮。則殺其毒。畏漿水忌羊血。

硫黃　四百五九　酸鹹大熱。有毒。氣味俱厚。純陽之物也。壯陽堅筋骨。陰氣全消。殺蟲燥寒濕瘡疥。盡掃。老人冷秘。君半夏而立通。泄痢虛寒。佐蠟礬而速止。艾湯投一七。陰毒回春。溫酒送三丸。沉寒再造。回陽氣于暴絕。理下白于脾虛。按硫

火熱而不燥。能潤腸結。亦救危神劑也。故養正丹用之。嘗有起死回生之功。今人治下元虛冷。元氣將絕。久患寒泄。脾胃虛弱。垂命欲盡。服之無不効。但中病當已。不可盡劑。況服食者。又皆假此縱慾。自速其咎。蓋知用而爲福。而不知其禍隨之也。若荒于色以致腹滿如斗。肢體厥逆。投以參附不應者。餌金液丹亦有生理。第疏非治滿之劑。祇因元陽將絕而參附無功。藉其純陽之精。令陰寒之滯。見現氷消耳。苟非眞病虛寒。不可服此熱毒之藥也。若有伏陽在內。須加陰藥爲佐。古方太白丹。來復丹。各有硝石之類。是皆至陽佐以至陰。正合宜爾。以蘿蔔劍空入硫合定。糠火煨熟。以紫背浮萍同煮過。皂莢湯洵去黑漿。畏細辛朴硝。中其毒者。惟煎黑錫湯。及食冷猪血。甘草湯可解。

**白礬** 四百六十 味澁酸寒。入肺脾二經。燥濕追涎。消痰滌熱。收脫肛陰挺。理疥癬濕淫。稀涎散。同皂莢研服。吐風痰通竅神方。蠟礬丸。和蜜蠟丸吞。平癰腫護膜要劑。

按礬石之性。燥急收澁。故虛脫滑洩久痢不止

者。用此以止脫。其用有四。吐痢風熱之痰涎。取其酸苦湧泄也。治諸血痛。脫肛。陰挺。瘡瘍。取其酸澁而收也。治痰飲泄痢。崩帶。風眼。取其收而燥濕也。治嗄痺。癰疽。中蠱。蛇傷。取其解毒也。癰疽方云。凡病癰疽發背。用明亮白礬一兩。生研。以好黃蠟七錢。溶化和丸。每服十丸。漸加至二十丸。熟水送下。如未破則內消。已破便合。其托裏化膿之功甚大也。然此乃劫水之藥。僅可資其引導。若多服損心肺。傷齒骨矣。陰虛火熾者。不宜用也。又綠礬。氣味酸涼。能消積滯。燥脾濕痟癉疥癩。釀鯽魚燒灰。療腸風瀉血。亦解毒之物也。而其化涎之功。差緩白礬耳。附〔綠礬和脾丸〕治濕毒腫脹。腰膝無力。陰囊水濕。穢氣不堪。綠礬。用舊草鞋合礬于內。煅通紅。山查。麥芽。各二兩。已上澄濁氣。扁豆炒。芡實。蓮肉。薏仁。白茯苓。乾山藥。各一兩。已上和脾。砂仁五錢。小茴。廣皮。煮米。泔浸一晝夜。各一兩。已上脾燥濕。破故紙一兩。五味子五錢。已上溫腎。車前沙參。各一兩。已上利水。開下行之路。爲末。用棗煮湯去核。麪糊丸。空心白湯送三錢。又用扁豆。芡實。蓮肉。薏仁。茯苓。山藥。各二兩。大米六升。糖二斤。柿

霜三兩蒸作白糕炙乾食之應驗神方也

服器部

褌襠 四百六一 陰陽易病燒灰服驗女勞復疸煮汁堪良按褌襲衣也其當隱處者爲襠張仲景云陰陽易病身體重少氣腹裏急或引陰中拘急熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急者燒褌散主之服之小便利陰頭微腫則愈男用女女用男成無已云此以導陰氣也胞衣不下以本婦褌覆井上或以所着衣籠竈上童女者尤良只取近隱處一塊



衣帶 四百六二 婦人難産及日月未至而産臨時取夫衣帶五寸燒末酒服裩帶尤佳

病人衣 四百六三 天行溫疫取初病人衣服干髁上蒸過則一家不染又小兒夜啼取本兒初穿汗衫放瓶內自不哭

自經死繩 四百六四 卒發狂顛燒末水服三指撮陳蒲煮汁服亦佳

死人枕 四百六五 治尸疰石蚘見鬼昔有嫗人患冷滯積年不瘥宋徐嗣伯診之曰此尸疰也當以死人枕煮

服。又一十五歲患腹脹面黃。衆藥不能治。嗣伯曰。此石蚘也。極難療。當取死人枕煮服。得大蚘虫。頭堅如石者五六升。病即愈。又一人患目痛。又多見鬼物。嗣伯曰。邪氣入肝。可取死人枕煮服。三病皆愈。蓋尸疰者。鬼氣也。伏而未起。故令人沉滯。石蚘者。非藥可遣。須以鬼物驅之。可散邪氣入肝。故見魍魎。亦必邪物鈎之。故皆用此也。用過仍埋故處。

吹火筒　四百六六　小兒陰被蚘蚓咬腫。令婦人以筒吹其腫處即消。



桐油傘紙　四百六七　蚘幹陰瘡。燒灰出火毒一夜傅之便結痂。

## 水部

地漿　四百六八　甘寒。解中毒煩悶。療中喝卒死。　按地漿。即掘黃土地作坎。深三尺。汲新水攪濁。取清用之。是也。羅天益云。中暑霍亂。乃暑熱內傷。七神迷亂所致。陰氣靜則神藏。躁則消亡。非至陰之氣不愈也。地漿爲陰中之陰。能瀉陽中之陽也。中楓菌毒。亦能解。

生熟湯　四百六九　甘鹹。調中消食。治嘔理脹。　按生熟湯。

以新汲水同百沸湯和勻是也。今人謂之陰陽水。最能分理二氣暢達升降使陰陽得其和平。若謂井泉水與河水合之非也。

**漿水** 四百七十

甘酸微溫。過食脾腑腊需治。嘔噦煩渴用良。

按漿水。即酸漿也。炊粟米。熟投冷水中。浸五六日。生白花色者。是也。性涼善走。故能解煩渴而化滯物。若浸至敗者害人。不可同李食。妊婦戒之。

## 火部

**艾火** 四百七一

灸百病。驅冷疾。　按艾火灸人。須用陽燧火珠。承日取太陽真火為良。若急卒難備。即用真麻油燈。或蠟燭火亦可。其餘不可用也。若灸諸風冷疾。入硫黃末少許尤妙。

**火鍼** 四百七二

治風寒筋急。療痺痛癱緩。　按火鍼即素問所謂燔鍼焠鍼也。張仲景謂之燒鍼。川蜀人謂之煨鍼。其法以麻油點燈。將鍼頻塗麻油。燈上燒令通赤用。不赤或冷。則反損人。且不能去病也。而點穴尤要明白。凡用此鍼。須要消息得中。若面上及夏月濕熱在兩脚時。皆不可用

草果一
蘭草二
薰草三
酸漿四
黃藥五
白藥六
屋遊七
蒸餅八
小麥麴九
紅麴十
墨十一
無花果十二
槿柳十三
鰾膠十四



燕井兩潮却昔不可用
東壁土 四百七十三 甘溫摩乾濕瘀癖止瀉痢痘瘡按此
乃屋之東壁上土常先見日得太陽真火生發之氣
故用之補土而勝濕若反胃嘔吐則用西壁土蓋取
太陽離火所照之氣又得西方收斂之意也
伏龍肝 四百七十四 辛熱微毒治風噤狂顛卒中惡氣療陰
冷發悶丹毒臍瘡按伏龍肝即竈中對釜月圓像月
黃土也取經十年以來竈額內火氣積久掘深一尺
色如紫瓷者研細水飛方是真伏龍耳卷十八終

草果　一名大辛氣熱陽也可升可降入足太陰陽明經
散脾胃之寒消久停之食截老瘧痰涎止嘔吐疾釋氣
脹除果積　按草果氣猛而濁專導滯逐邪治脾寒
濕寒痰之劑也瘴癘之瘧及一切冷氣膨脹果積酒
毒宿食瘧母惟此爲能驅解同砂仁溫中同青皮泄
肝邪佐常山截疫瘧然辛烈過甚大耗元陽虛人及
胃火者禁之本草載與草蔻同條不分主治然雖爲

一物。治微有不同。今特詳之。產滇廣。長大如訶子。皮黑厚而稜密。子粗而辛臭。草蔻產建寧。大如龍眼。而形微長。皮黃白薄而稜峭。其仁大如縮砂。而辛香氣和也。取仁。麪裹煨熟用。

蘭草　即省頭草　二　味辛甘。寒。利水道。浴風垢。除胸中痰癖。調血氣。養營。消渴膽癉可治。癰腫惡氣堪祛　按蘭草與澤蘭同類而種有殊。俱生水旁下濕之地。但以莖圓節長而葉光有岐者。爲蘭草。雷敩所謂大澤蘭是也。能生血調氣。與榮合。莖微方。節短而葉有毛者。爲澤蘭。炮炙論所謂小澤蘭是也。能破血通久積。可利水殺蠱而除痰癖。善解食牛馬之毒。爲醫經上品之藥。世俗所種葉如麥門冬者。謂之幽蘭。葉如菅茅者。謂之建蘭。生于深山窮谷。非古時水澤之蘭也。當與蘭葉澤蘭條參看。

薰草　即零陵香。三　辛溫。苦甘。治鼻中瘜肉鼻齆。療小兒鼻塞頭熱。薰草一兩。羊髓三兩。銚內慢火熬成膏。日摩背上三四次。去惡氣。與心腹痛滿。治頭風。併滯下返魂丹。用薰草以鹽酒浸半月炒乾。每兩入廣木香一錢半爲末。每服至一兩。即一年絕孕。益血聞香即散也。

按薰草芳香。其氣辛散上達。



国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

故心腹惡氣齒痛鼻塞及血氣腹脹皆用之脾胃喜芳香芳香可以養鼻是也然最能耗散眞氣每致作喘故亦不可多服

**酸漿** 即燈籠草四　味酸苦寒小毒治黃病熱煩瘧欬嗽多睡咽痛骨蒸俱用痰壅風熱並宜驅三焦腸胃實熱理婦人胎熱難産　按酸漿苦能除濕熱輕能治上焦故丹溪用治熱欬咽痛每効惟其除熱故清肺治欬利濕故化痰治疸然止宜于熱痰之嗽耳若寒痰嗽又宜用佛耳草矣夫治寒嗽言其標也治熱嗽言其本也東垣云大抵寒嗽多是火鬱于內而寒覆其外經驗方有三奇散治一切不問久新之嗽用佛耳草欵冬花熟地黃焙研每用二錢于爐中燒之以筒吸烟嚥下有痰吐之極妙

**黃藥** 五味苦氣涼氣薄味厚降多升少陰也入手少陰足厥陰經涼血降火消癭解毒開竇治諸惡腫瘡瘻瘵痺者皆榮氣不從逆于肉裏所致也得苦涼之氣則熱解榮和標症自平矣經曰一陰一陽結爲喉痺一陰者少陰君火也少陽者少陽相火也少陰熱

解相火自伏而嗽痺愈也。按黃藥得土中至陰之氣能消項下癭氣須選緊重者入無灰好酒一斗固口上以糠火燒一時俟冷時飲不令絕酒氣三五日後覺癭消即止否則併項亦細同忍冬夏枯草白及白斂紫花地丁甘菊茜草連翹白芷貝母白藥子之屬治一切疔腫癌疽日華以治馬之心肺熱疾亦取其苦寒之意也癌疽已潰及發時不燃腫不渴色淡脾胃作泄者均不宜服尤宜于外敷妙。忠州萬州出者爲上如輕虛者即他處產也。

白藥　六味辛苦冷入手太陰足陽明經治喉中熱塞消腫毒瘀嗽降火散血止痛生肌解心熱痛白藥根野猪尾洗去粗皮焙乾等分爲末酒服一錢効。醫爛疳眼白藥一兩甘草半兩爲末猪肝一具批開摻末五錢煮熟食之　按白藥稟天地清寒之氣而兼金水之性爲辛散之劑凡天行熱病腫毒喉痺咽中痛塞用之甚効又能解野葛生金巴豆之毒雖能治風熱血熱等症若脾胃素弱易于作泄者不可服也。

屋遊　七　味甘氣寒治浮熱在皮膚寒熱往來利小腸膀胱氣止劒消渴療小兒癇熱煩悶漱大人牙齦宣



国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

露。按屋遊自古瓦屋上青苔也。能療犬咬之毒。與雄黃研貼。其長數寸者。即瓦松也。味酸有大毒。燒灰淋汁沐髮。髮即墮落。誤入目中。令瞽。本草無毒。及生眉髮之說。謬也。又有垣衣。生于古垣城墻北陰。即書苔衣也。氣味酸冷。能療黃疸心煩。傳湯火傷蒸餅 入味甘。氣平。消食養脾胃。溫中化滯氣。止汗利三焦。和血通水道。按蒸餅。和脾之品。亦通利之劑也。故于淋症有功。營衛氣虛。風邪襲入腸胃之間。以至便痢赤白。飲食不進。用以同御米殼。蜜丸化服。若治淋病。與大蒜淡豆豉搗丸。湯下甚妙也。臘月及寒食日。用小麥麪酵 音教糟發成。蒸之至皮裂。去皮。懸之風乾。臨時以水浸脹。擂爛。濾過用。小麥麴 九味甘。氣溫。入手陽明經。止河魚之疾。除腸胃中塞。消穀止痢。破結落胎。按古人用麴。即造酒之麴也。酒非麴不生。故名之曰酒母。其性專消導。行脾胃滯氣。散藏府風冷。故主療如上所云。神麴 乃後人專造以供藥用。力倍酒麴。蓋取諸神聚會之日造之。又取各藥物以象六神之用。故得神名。又有大麥

麴下生胎破凝血。麥麴〈米麴〉消食積。酒積。糯米積。如神。惟此數種皆可入藥。其各地有入諸藥草及毒藥者。皆有毒。惟可造酒。不可入藥也。孕婦勿服。陳久者良。炒香用。

紅麴　十味甘。氣溫。消食活血。燥胃健脾。療產後惡血不盡。治濕熱泄痢腹疼。　按紅麴一種。法出近世。故本草不載。李時珍云。人之水穀入胃。受中焦濕熱薰蒸。游溢精氣。日化爲紅。散布藏府經絡。是爲營血。此造化自然之微妙也。造紅麴者。以白米飯受濕熱鬱蒸變



蒸變而爲紅。即成真色。久亦不渝。此乃人窺造化之巧者也。故紅麴有治脾胃營血之功。得同氣相求之理。若以釀酒。則辛熱有毒。發腸風痔瘻。腳氣哮喘。瘧嗽諸疾矣。心腹作痛。用此同香附乳香爲末。酒服甚效。陳久者良。

墨　十一味辛。氣溫。生肌止血。膚合金瘡。治崩中血暈。療飛絲入目。磨濃墨點之即出。　塗癰腫。利小便。卒淋不通。好墨燒一兩爲末。每服一錢。水服。　按墨烟煤所成。土之類也。上古以松烟造成。方可入藥。今人多以窑突中墨烟造之。不可用也。

年遠烟細者爲佳。粗者勿用。若非松烟。其光雖
不可治病也。

無花果　十一味甘。微辛。有小毒。葉可煎湯薰洗消五痔
之腫疼。實能開胃止洩。兼咽喉之卒痛。按無花果。
即廣中所謂優曇鉢是也。不花而實。實出枝間。狀如
木饅頭。其內虛軟。熟則紫色軟爛。甘如柿。而無核。善
治痔瘡腫痛。煎湯頻洗。極有効驗。余患此症。穀道脹
塞。百藥不應。用之貼然。外此無足取者。　産揚州及
雲南。今吳楚閩越人家。亦或有之。樹長丈餘。枝葉繁
茂。有了如蓖麻者是也。

樫柳　即西河柳。十三味甘鹹。溫。浮而升。陽也。入足陽明手太
陰少陰經。消痞積。解酒毒。利小便。祛諸風。　按樫柳。
禀陽春之氣。故其色青而葉稍帶微赤。本草用以解
驢馬血入肉發毒者。煮汁浸之。益驢馬性熱。生時汗
氣沾人。即能爲病。所以剝時。熱血入肉。多能致毒。此
藥甘得土氣。鹹得水氣。故能解血分之毒也。消痞利
便。是其本功。近世往往以治痧瘴熱毒不出。用爲發
散。不知本自何氏。特補此以備詳考。腹中痞積者以



国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

特 7
9
493



數記此以備參考　切碎螺粉拌炒

此煎湯露一宿空心飲數次能消

鰾膠　十四味甘鹹平治婦人難産除娩後擣搦強直者不可便作中風用此以螺粉炒焦去粉爲末分三服蟬蛻湯下燒存性同新綿灰童便服嘔血腫痛悉捐按鰾膠即烏賊魚腸今工匠用以粘物者也諸鰾皆可爲而海漁多以石首鰾作之不知此乃江魚之鰾耳鰾之功用備載本草諸家俱用以治嘔血散瘀血赤白崩中與夫折傷血出不止及傳陰瘡瘦瘡之屬今世每每施之腎虛腰痛遺精白濁一緊不足之症不知出于何典或別有所本

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493

ガラス使用