

趙 璽 忱
張 潤 亭

合 編

真安總省與安興隆街
宏仁診所

西 藥

實 驗 大 全

撫順笑風醫院出版

西藥實驗大全贈序

輓近醫學昌明日趨於善而有志於斯道者猶復冥心探討冀有所得公諸當世與學者以攷鏡攻錯之資仁者之用心固宜如此也惟是醫學書籍浩如淵海其體材廣蘊學理精詳者固美不勝收至其簡要而能灌輸社會民衆俾得醫業常識之著者實不多覩

友人趙于二君積學士也民國壬戌年創設撫順醫院於千金寨地當通衢市况繁盛二君本素有之經驗營業指日以騰達故求診者踵接於門士子有志於斯道者亦欲而師焉乃於癸亥春附設簡易醫學校收生徒十數人由二君分任教授三年卒業成績斐然其於藥學一門尤獨具匠心蒐集羣書會纂成帙別類分門極便研讀今擬付梓囑爲鑑定自揣學術久荒何敢妄加評議但就其所著頗適於初學間有裨於民生引學者入正途之門濟吾人於壽康之域故敢冒昧陳詞用當介紹庶不負二子一番著作之苦心也

己巳榴月

榆城 陳文斗 撰

四藥實驗大全
序

西藥實驗大全自序

西醫一科所宜學者雖屬甚繁然莫不以用藥爲本吾國有志之士已多從事西醫卽業中醫者亦每欲鑽研以資參攷然西醫藥物繁多名有東西兩洋之分國有英德法日之別學者既無名人之指示又乏達者之心傳卽有一知半解者又復視同拱壁秘不授人設欲購書則中國譯本尙有數十種之多如教會之舊版博學會之新版其餘丁氏所譯各種藥物學書籍互異名詞不同所列藥物不下千數百種致學者昧於是非難於取捨全數記憶則博而不精摘句尋章則難得要領是故略得一斑臨症棘手者比比然也本院有鑒於此積八九年之心得將歷任各科醫師之經驗揀其最適宜最應用最有力之西藥匯集成書名曰西藥實驗大全書分三編第一編曰藥物學將英法德日諸國之醫師每日所常用之藥品選擇二百餘種註明形狀功效主治用量處方中毒解法並於每藥名之下標以新名舊名及拉丁文原名以便閱者參考共分二十二類曰麻醉藥輕瀉藥重瀉藥利尿藥退熱藥收斂藥祛痰藥激心藥補血藥健胃藥變質藥防腐消毒藥清涼藥殺蟲藥催吐藥改酸藥調經藥外惹內效藥止血藥潰瘍藥藥各國新藥及注射藥第二編曰配藥學對於日常調合之藥品手續規矩無不詳細註明其分二十類曰溶液類水藥類泡水藥類注入藥類注射液類含漱藥類洗滌藥類軟膏藥類點眼藥類酒藥類酒精

類擦藥類甘油調合藥類散藥類丸藥類坐藥類膠球類糖漿類敷藥類以備醫士開方之用第三編曰處方學爲本院醫師臨床經驗之處方撰擇十五種曰血行器病消化器病呼吸器病全身病泌尿生殖器病神經病傳染病外科病眼科病齒科病皮膚病耳鼻喉科病婦人科病花柳科病小兒科病統計處方七百餘種並註明功效服法均爲效驗確實之方讀者一目了然照方用藥無不應手奏效雖不敢謂集西醫之大成竊爲初學津梁或不無小補並希世之明達西醫者擇長補短俾成完璧豈徒本院之幸抑以邦家之福也

歲次己巳年菊月朔日

撫順醫院謹識

西藥實驗大全再版序

康德二年秋拙著西醫寶典刊出付郵時承閱者諸公覆知收訖後又詢西藥實驗大全出版之日期紛紛魚雁作覆不暇兼有匯寄代價者大全原著之趙君因一版已罄盡感購者之熱誠乃銳志重刊二版面商於予爲校訂者予固拙於筆墨兼昧於醫學不敢負此重任謬承敦請又不能力却之乃於業務之暇將是書舊日之篇幅重加整理以三編目錄合成一起以便檢查又附增新藥及處方數十餘種其中藥物學及配藥學之內部亦稍加修纂遂於是年九月而付梓焉蓋人類之生存端賴衣食而衣食豐足之本源則在乎勤勞士勤於讀農勤於耕商工勤於販製官吏勤於公務則人民各有所守各盡其責其國立見富強反則必貧弱總之其所勤者不外其自有之職業耳彼無業之遊民對已可云枉生對家則爲敗子對國亦係廢民也而醫藥一項乃職業之一種大則濟世醫國小則裕己養家近世列強對於國民健康之運動煞費苦心而於醫藥一項尤不可忽也明矣此趙張二君之創製本書亦可謂順時而興大有義意者也然或有以是書之文詞淺鮮者鄙之是又不然蓋行遠必自邇登高必自卑古今定理試思人未能操刀不能驟使之宰割羽毛尙未豐滿不能遽試以高飛綾羅珍饈適體悅口不可爲常人服用布帛菽粟却一日不可離貴賤之人皆得而用之且有益於身無傷於胃然則是書雖俗白無文亦可

作布帛菽粟之等類觀也且我國土地之廣博人民之衆多醫藥至博碩學位者縱有幾人用於國家之衛生機關尤恐不足而普通作業之醫士無論城鄉都鎮總以自修考取者或醫院學醫者爲最多是此書在近世紀尙可採用無怪乎訂購者甚多確深合一般醫生之心理也惜予旣無充分醫學又未精通翰墨謬爲校訂益增慙悔尙祈海內學者對於書中錯誤之點明以教我卽時更正使不致遺誤將來終成完璧實爲我等莫大之厚幸也是爲序

康德二年十月五日

撫順李笑風 序於本城笑風醫院

西藥實驗大全總則

- 一、凡例
- 一、小兒成人服藥用量比較表
- 一、藥用權量及字碼表(英法兩國通用者)
- 一、拉丁文簡寫表
- 一、英法滿庫秤比較表
- 一、配藥禁忌表
- 一、開處方之法
- 一、目次

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j
k l m n o p q r
s t u v w x y z

凡例

一 是書爲本院各科醫師以平素之經驗與臨床之實驗揀其效力確實者並參考各種藥學書籍數十種著成是書文法句語但求簡明不事深奧閱者諒之

一 書中藥名病名均照醫家通用名詞並標明舊名新名及拉丁文原名以備讀者參考他書之用

一 書中所列之藥隨時註明產地性狀功效主治用量處方中毒解法讀者一目了然致於配藥學爲本院藥劑室審察配本調合各種藥品手續規矩無不詳明處方學爲院中各科醫師臨床經驗之方案效力確實讀者按病開方照方用藥無不應手奏效凡配藥時須照方中所列

之分量均有一定不可疏忽以免錯誤

一 西醫以英法權量爲標準其號碼以下列權量表定之須讀者熟悉胸中然後按方配製方能合算不致貽誤

一 西醫之藥品多提取藥精而用之有一厘分作數次服者如士的年莫昇汞阿刀賓等藥如服三十二份之一厘卽一厘分作三十二份每次用其一份書中某藥幾分之一厘卽仿此說餘者類推

一 如採購藥品時或恐錯誤祈照拉丁文原名購之各西藥房均可照方配製

小兒成人服藥用量比較表

以六十英厘爲比例(即法權量之四瓦)假設成人服藥分量應服六十英厘(滴與厘同)則

	(英量)	(法量)
六個月以內	應服 三厘	〇·二
半歲至一歲	應服 四厘	〇·三
一歲至二歲	應服 五厘	〇·三
二歲至三歲	應服 七厘半	〇·五
三歲至四歲	應服 十厘	〇·六
四歲至六歲	應服 十五厘	一·〇
六歲至十歲	應服 二十厘	一·三
十歲至十三歲	應服 二十五厘	一·六
十三歲至十六歲	應服 三十厘	二·〇
十六歲至十八歲	應服 四十厘	二·六
十八歲至二十歲	應服 五十厘	三·三
二十一歲以上	應服 六十厘	四·〇

藥用權量及字碼表

量藥之法有二(一)固體藥、即各種丸、塊、末藥類。均用秤平之。(二)液體藥、即油、酒、流膏及各種水藥類。均用量杯量之。此種權量。又分英國權量、法國權量兩種。列表於下。

英國天秤表

以一厘為始。六十厘為一錢。八錢為一兩。十六兩為一磅。

英國量杯表

以一滴為始。六十滴為一量錢。八量錢為一量兩。十六量兩為一量磅。八量磅為一加倫。以上權量。為英、美兩國教會各醫院通用之法。

法國天秤表

以珥為始。即千分之一瓦。或作千分之一

格欄姆)十趾爲廳。卽百分之一瓦。(或作百分之一格欄姆)十廳爲廳。卽十分之一瓦。(或作十分之一格欄姆)十廳爲一瓦。(或作一格欄姆)十瓦爲趾。卽十瓦。(或作十格欄姆)十趾爲廳。卽一百瓦。(或作一百格欄姆)十趾爲趾。卽一千瓦。(或作一千格欄姆)十趾爲廳。卽一萬瓦。(或作一萬格欄姆)

法國量杯表

以珽爲始。卽千分之一立。(或作一西西)十珽爲一喱。卽百分一立。(或作十西西)十喱爲竝。卽十分之一立。(或作一百西西)十竝爲一立。(卽一千西西)十立爲趾。(卽萬西西)十趾爲廳。(卽十萬西西)十廳爲

坪。(卽百萬西西)以上之權量。德·日醫院通用之

英國天秤字碼表

- lgr 卽一英厘
- βss 卽十英厘
- βj 卽二十英厘
- βss 卽三十英厘
- βij 卽四十英厘
- βi 卽六十英厘 卽一英錢
- βij 卽一百二十英厘
- βi 卽八英錢 卽一英兩
- llb 卽十六英兩爲一英磅

英國量杯字碼表

M 卽一量滴 (此爲極小記號)

P^3 卽一量錢 (爲六十量滴)

P^{3ss} 卽半量錢 (爲三十量滴)

P^3 卽一量兩 (爲八量錢)

O 卽一量磅 (爲十六英量兩)

C 卽一加倫 (爲八量磅)

法國天秤字碼表

𧄂 $Mgm.$ 卽千分之一瓦

𧄃 $Ggm.$ 卽百分之一瓦

𧄄 $Dgm.$ 卽十分之一瓦

瓦 $Gm.$ 卽一瓦 (又名一格爾姆)

(等於十五英厘)

𧄅 $Dkgm.$ 卽十瓦

𧄆 $Hgm.$ 卽百瓦

𧄇 $Kilom.$ 卽千瓦

𧄈 $Mgm.$ 卽萬瓦

法國量杯字碼表

𧄉 $Ml.$ 卽千分之一立 (又名

一西西等於十五量滴水)

𧄊 $Cl.$ 卽百分之一立

𧄋 $Dl.$ 卽十分之一立

立 $L.$ 卽一立

𧄌 $Dkl.$ 卽十立

𧄍 $Hl.$ 卽百立

𧄎 $Kl.$ 卽千立

𧄏 $Ml.$ 卽萬立

拉丁文簡寫表

拉丁文 漢文

Aa 各

Ad.	至
Agit.	搖
Aq.	水
Bid.	日二次
Caps.	膠囊
Div.	分
Emp.	帖
Garg.	含漱
Lin.	擦
Ol.	油
Omn Hor.	每時一次
Omn Noct.	每晚一次
P.c.	飯後
A.c.	飯前

西藥實驗大全 英法滿庫秤比較表

Pulv.	散
Pil.	丸
R.	取
Sig.	寫籤
Supp.	肛彈
Syr.	糖漿
Troc.	片
Fid.	一日三次
Tr.	酒
Ung.	軟膏
Gm.	瓦
Cong.	加倫

英法滿庫秤比較表

英 法 滿(舊制)

一厘	0.0648瓦	卽一厘七毫半
二厘	0.1296瓦	卽三厘半
四厘	0.2592瓦	卽七厘
一分	0.648瓦	卽一分七厘半
二分	1.296瓦	卽三分半
半錢	1.9440瓦	卽五分二厘半
四分	2.592瓦	卽七分
五十七厘半	3.726瓦	卽一錢
一錢	3.888瓦	卽一錢零五分
二錢	7.776瓦	卽二錢一分
一兩	31.104瓦	卽七錢六分
五百七十五厘半	36.9684瓦	卽一兩
一五·四三二厘	卽法一格欄	或作一瓦

配藥禁忌表

醫師必須明悉化學及製藥學。因各種藥物同時配合一劑。易引起化學作用。或分解、或沉澱、或爆發、或化爲有毒之性質、或成不良之變體。其藥力增減事小。而生命關係則大。故醫師開方。藥劑師配藥時。均宜特別注意。今將不合之藥物列下。

- 一 酸藥類。與鹼藥類不可合用。
- 二 強酸藥類。與酒藥類不可合用。
- 三 含有炭尼酸之藥物。與炭酸鹼類、膠質、蛋白質、石灰水、氫氣水、金屬鹽類、澱粉、白樹膠皆不可合用。
- 四 亞砒酸。與炭酸鎂、石灰水、酸化鐵、不可合用。
- 五 氯化鉀。與炭尼酸、及過錳酸鉀、不

宜相合。若合研之必能爆發。

六 蛋白質。與酒精、酸類、及炭尼酸、

昇汞不能合用。

七 氯化鉀。與氯化銻不可合用。如合研

之必致燃燒。

八 白樹膠。與氯化鐵、鉛鹽類、硼砂、

酒精、伊打製酒均不可合用。

九 植物鹽基、鹼性。與碘、及碘化鉀、炭

尼酸、甘草膏、大黃酒、海葱酒均不可

合用。

十 阿片。與炭尼酸鹼屬、炭尼酸金屬、

鹽類、碘、番木別、氯氣水、顛茄皆不

可合用。

十一 士的年。與碘化鉀不可合用。因碘

化鉀能使士的年沉澱。病者服藥至瓶底
時。盡爲士的年。必致中毒。

十二 毛地黃。與鉛糖、炭尼酸鹼屬皆不

可合用。

十三 硝酸銀。與植物酸類、礦物酸類、

青酸。杏仁水、鎳化鉀、碘、炭酸鹼屬、

硫黃均不能合用。

十四 次硝酸銻。與炭酸、硫黃不可合用。

十五 還元鐵。與植物沖藥、炭尼酸、植

物鹽基、金屬鹽類不可合用。

十六 甘汞。與石灰水、硫黃、鐵、碘、

酸性鹽基、炭酸鹼屬、水劑、植物膏類

均不可合用。

十七 昇汞。與石灰水、碘化鉀、阿片、

植物冲藥、炭尼酸、炭酸塩類不可合用。

十八 抱水哥拉。與阿摩尼亞塩類、植物酸鹼屬、炭尼酸均不可合用。

十九 石灰水。與昇汞、甘汞、亞砒酸、鉛糖、酸類、塩類、阿莫尼亞塩類、金屬塩類、炭尼酸皆不可合用。

二十 碘。與阿莫尼亞塩類、金屬鹽類、甘汞、澱粉、脂肪、揮發油、乳劑、白樹膠皆不可合用。

二十一 碘化鉀。與酸類、酸性塩類、植物塩基類、碘化鉀、硝酸銀、亞鉛華、汞類不能合用。

二十二 氯化鉀。與鹽酸類、硫黃、炭素不可合用。

二十三 過錳酸鉀。與揮發油、酒精、甘油、阿莫尼亞、及其塩類不可合用。

二十四 碳酸鈉。與酸性塩類、植物塩基類、金屬塩類、炭尼酸不可合用。

二十五 樟腦酒。與他類樹脂、酒、及水均不可合用。

二十六 流膏類。多不可與水類合用。因水能使流膏沉澱。

二十七 酸性塩類。能被鹼類分解。故不可合用。

二十八 植物酸塩類。能令礦酸類改變。且被鹼分解。

二十九 海葱糖漿。與碳酸銻不可合用。因糖漿內含醋酸之故。

三十 叩卡印。與礪砂不宜相合。如合卽成不化之硼酸。(叩卡印與硼酸相合體質不變)

三十一 甘汞、甜硝伊打酒。與安提排林不可合用。

三十二 百布聖。與胰腺梅、脛經不可合用。因百布聖於酸內行功。而胰腺梅則於鹼內行功。不但如此。胰腺梅於消化時服之。胃必損壞。

開處方之法

醫師開方時。常用拉丁文。其原因有三。(一) 尊古時之規矩。因古時西洋文士。所著各種書籍。皆用拉丁文。(二) 因植物學中各種名詞。均用拉丁文。且因俗名過多。不能通行

各地。(三) 爲使他人不明所用何藥。以免私用而受損害。

寫處方箋時。卽開藥方於診病後授之患者。患者持方向藥劑師、使之照方配藥。開方之手緒可分爲五。(一) 注明患者姓名、住址、年歲。(二) 先寫一「*R*」字(英國醫生用此字)或「*℞*」字(日德醫生用此字)卽是取拿之意。(三) 次開所用何藥。分量多少。屬何劑形。或丸或水或膏或散。(四) 註明用法。則寫「*℞*」字。卽命藥劑師將用法。以本國文字寫明瓶籤之意。如係水類。應帖於水藥瓶上。如係散類。宜裝於紙袋內。於袋上亦用本國文字標明用法。患者卽照袋上之法用藥。又日服、三次、簡寫「*T.I.D.*」字。日服、二次、簡寫「*B.I.D.*」字。

食、前、服、簡寫A.C.字。食、後、服、簡寫P.C.字。散藥方尾寫s字。即將藥調一處之意。分、作、簡寫DIV.字。袋、包、寫NO.字。以上之西文。均係開方所用。(五)方成。醫師、藥劑師必須簽字。並註明診察日期。英國醫師開方。均用I(一)II(二)III(三)IV(四)V(五)VI(六)VII(七)VIII(八)IX(九)X(十)XI(十一)XII(十二)字。寫方中之分量。日德醫師均照亞拉伯字母。即1234567890是也。開方之用藥法。宜照下列次序排列。(一)主、藥、即方中主要有效之藥。(二)佐、藥、助主藥之效力。或主藥有不良之副作用。以此防範之。(三)矯、味、藥、如主藥佐藥有不良之臭味。以此矯正消滅之。凡含有香味之藥均屬之。(四)賦、形、

第 一 式
漢 文 開 方 法

姓名	年 歲	職 業		
住 址			檸檬阿母尼亞鐵	四瓦
之	右為四日份一日三次飯後服	水	番木別酒	八西西
			甘油	一二西西
				二〇〇西西
醫師	藥劑師	康德	年	月 日

藥、乃增加藥之體積。以引之入身。如液劑之蒸溜水是也。今將藥方格式列下。

式 二 第
(式 英) 法 方 開 文 西

姓名	年歲
住址	職業
R FERRI ET AMMON CIT ʒ I TINCT NUX VOMIC ʒ I GLYCERIN ʒ II AQ DEST AD ʒ VI SIG. ʒSS T.I.D P.C.	
醫師	藥劑師 康德 年 月 日

式 三 第
(式 德) 法 方 開 文 西

姓名	年歲
住址	職業
R _p . FERRI ET AMMON CIT 4.0 TINCT NUX VOMIC 8.0 GLYCERIN 12.0 AQUAE DEST 200.0 D.S. 3 MAL TAGL IN 4 TAGEN	
醫師	藥劑師 康德 年 月 日

式 四 第
(式通普) 法 方 開 文 西

姓名	歲年
住址	職業
R _p ASPIRIN 0.5 CAFFEIN 0.4 KALII (POTASS) BROMID 0.6 右爲一包與以六包一日三次二日分服食前 (減書3×2)	
醫師	藥劑師 康德 年 月 日

以上藥方之格式。前三式爲配合之藥水。藥名一樣。書法不同。除分量服法稍有差異。餘者並無區別。第四式爲散藥方例。如欲變更格式。將方中分量字碼。彼此更換即可。讀者照式書寫。遂意選擇。

硫酸鎂

元

松節油

七

碳酸鎂

三

醋酸鉀

六

軟膜

三

加非印

元

第三章 重瀉藥

哥羅新

三

樟酸鉀

四

渣登

三

氫酸鉀

四

巴豆油

三

米替連藍

四

第四章 利尿藥

布球

三

阿斯必林

四

烏羅透品

三

安提排林

四

甜硝伊打酒

三

非那昔廷

四

華澄茄

三

阿西炭尼力

四

白檀油

三

水揚酸

四

哥拜把油

三

水揚酸鈉

四

硫酸規尼

撒斐

第六章 收斂藥

佳奴

炭尼酸

兒茶

明礬

硫酸錳

亞鉛華

硫酸銅

醋酸鉛

次硝酸銀

次沒石子酸銀

水楊酸銀

四

四

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

硝酸銀

吐根雜散

蛋白銀

白陶土

第七章 祛痰藥

吐根

海葱

安息香酸

印的印

遠志

炭酸鈣

透路糖

氯化鈣

苦杏仁

五

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

第八章 強心藥

鉅香酒

六

檸檬規尼鐵

七

甘松酒

六

過氯化鐵酒

七

樟腦

六

硫酸鐵

六

酒精

七

磷鐵規尼士的年糖

六

伯蘭地

七

魚肝油

六

葡萄酒

七

鹽酸

六

毛地黃

七

第十章 健胃藥

馬前子

七

百布聖

六

第九章 補血藥

鐵粉

六

桂皮

六

磷鐵雜糖

五

加斯大賊

六

鐵礞糖

五

丁香

六

檸檬鉍鐵

五

豆叩

六

苦味酒

六

橙皮酒

八三

石炭酸

九一

龍膽草

八四

硼酸

九三

薑

八四

過錳酸鉀

九三

第十一章 變質藥

碘

八五

黃碘

九四

碘酒

八六

幾阿蘇

九五

碘化鉀

八六

食鹽

九六

水銀軟膏

八七

漂白粉

九六

水楊酸汞

八八

昇汞

九七

黃降汞

八九

過酸化水素

九八

白降汞

八九

昇華硫黃

九八

紅降汞

八九

魚石膽

九九

亞砷酸

九〇

松瀝

九九

第十二章 防腐消毒藥

西藥實驗大全 目次

一〇〇

石灰

一〇〇

芥末

一〇五

其瑣編

一〇一

阿普莫非

一〇六

第十三章 清涼藥

一〇二

第十六章 改酸藥

一〇六

菓酸

一〇二

重碳酸鈉

一〇六

檸檬

一〇三

石灰

一〇七

薄荷冰

一〇三

第十七章 調經藥

一〇七

薄荷油

一〇三

洋斑蝥

一〇七

第十四章 殺蟲藥

一〇三

蘆薈鐵瓦

一〇八

山道年

一〇三

過錳酸鉀

一〇八

綿馬流膏

一〇四

第十八章 外惹內效藥

一〇七

洋蘇冰

一〇五

松節油

一〇七

第十五章 催吐藥

一〇五

芥末

一〇五

硫酸錳

一〇五

洋斑蝥

一〇七

硫酸銅

一〇四

第十九章 止血藥

一〇七

麥角

一〇九

鹽酸阿得列那林溶液

一〇九

第二十章 潰藥

苛性鉀

一一〇

硝酸

一一一

氯化鋅

一一一

第二十一章 潤藥

白糖

一一二

糖漿

一一三

乳糖

一一三

蒸溜水

一一三

澱粉

一一三

白樹膠

一一三

甘油

一一三

橄欖油

一一三

花士林

一一四

叩叩脂

一一四

火棉酒

一一四

巴拉粉

一一四

第二十二章 新藥(內含注射藥)

嘉色銀(梅毒注射藥)

一一六

露藍密藤(退熱藥)

一一七

蘇潑拉來寧(止血注射藥)

一一八

美盧白靈(風濕注射藥兼內服藥)

一一九

酒爾佛散(梅毒注射藥)

一二〇

新酒爾佛散(新梅毒注射藥)

一二三

酒爾佛散銷(最新梅毒注射藥)

一二三

握母納丁(免疫百病藥針能發表)

一二三

康普樂(止痛藥)	一四	表飛鳴(制酵消化藥)	一四
脫呂頓弗拉文(淋病注射兼洗滌藥)	一四	加德明(興奮鎮靜藥)	一四
育維寧(壯陽內服藥兼注射藥)	一五	嫻嫻好萌(調經藥)	一四
阿盧門奴耳(長皮藥粉)	一五	樂地儂(榮養注射藥)	一五
羅瓦而精(筋骨疼內服藥兼注射藥)	一五	奧保司太丁(止血內服藥兼注射藥)	一五
奧倫(橫痃及疥泡肌肉注射藥)	一六	巴苦諾恩(退熱利尿注射藥)	一五
酒利汞(梅毒及水臌注射藥)	一六	阿爾細林(收斂解毒藥)	一五
赫破非辛(止血催生注射藥)	一七	茂爾丁(免瘦藥針能發表)	一五
梯鳥新(利水特效藥)	一七	克療病(畢丸炎後之硬滯消散藥針)	一五
盧蜜拿(催眠內服藥兼注射藥)	一六	略維導爾(痔瘡坐藥)	一五
歐力新(消化藥)	一六	阿妥媚諾哉(制酵收斂藥)	一五
愛夫得靈(鎮咳止喘內服藥兼注射藥)	一六	奶歐密魯欣(催乳藥)	一四
雷佛奴耳(最新防腐藥或作注入藥)	一六	歐益斯他普親(止血、鎮痛內服兼注射藥)	一四
艾司摩列星(哮喘特效藥)	一六	愛太衣那克西路(化毒內服藥)	一五

可羅那金(強心藥)	一五	海泡非生(催生止喘注射藥)	一四
鹽酸喜挪美仁(筋骨痛藥針)	一六	凡拉蒙(止痛藥)	一四
希宜佐爾(止癢藥針)	一七	阿卡奴(傷風藥片)	一四
地芟他民(心臟病藥針)	一七	果乃金(淋濁藥苗)	一四
滂濁溥溥(通淋消毒藥)	一七	烏來唐(安眠寧神藥)	一四
嗎痢藥兒(解油戒嗎啡注射藥)	一八	福賜透路(鎮咳祛痰藥水)	一四
百克安兒(解熱變質專治肺結核注射藥)	一八	發多馨(鎮咳祛痰藥散)	一四
寐底拿(安眠內服兼注射藥)	一九	勞可淨(瘡毒藥苗)	一四
佑苦勞民(解癢注射藥)	一九	補爾蒙恩(變質注射藥)	一四
複方鹽酸愛民親(阿米巴痢藥針)	二〇	滅菌塩化鈣溶液(止血強壯注射藥)	一四
阿魯賴司卿(利尿殺菌、清淋藥針)	二〇	吉里那耳(癱瘓注射藥)	一四
喜那脫那賓(尿道消毒注射藥)	二一	滂篤實斯即普拉民(止痛注射藥)	一四
亞陀方耐而(風濕骨疼靜脈注射藥)	二二	嗎哪兒(戒煙注射藥)	一四
亞陀方(痛風內服藥)	二二	嗎魯達因(戒煙皮下注射藥)	一四

維他康復(強心注射藥)

一〇

樟腦水(普通強心注射藥)

一〇

安福消腫膏(消炎塗布藥)

一五〇

砒柯好司(普通消炎塗布藥)

一五〇

阿葛滿新(通經內服藥兼注射藥)

一五〇

西斯多滿新(止血內服藥兼注射藥)

一五〇

福眠錠(安眠片)

一五〇

巴畢通(安眠片)

一五〇

汞銘(消炎藥又名二百二十)

一五二

歐魯眉金(滴耳油日名オルメチン)

一五二

丹毒血清

一五二

赤痢血清

一五二

白喉血清

一五二

傷寒血清

一五二

第二篇 配藥學

第一章 溶液類

硫酸阿刀賓溶液

一五

石灰溶液

一五

鹽酸叩卡印溶液

一五

昇汞溶液

一五

鹽酸莫非溶液

一五

硫酸士的年溶液

一五

第二章 水藥類

樟腦水

一五

哥羅芳水

一五

肉桂水

一五

幾阿蘇水

一五

薄荷水

一五

十滴藥水

一五七

第三章 泡水藥類

陳皮泡水

一五七

布球泡水

一五七

丁香泡水

一五七

兒茶泡水

一五七

毛地黃泡水

一五七

龍膽草泡水

一五七

大黃泡水

一五七

第四章 注入藥類

硝酸銀注入液

一五七

硫酸銅注入液

一五七

硫酸鎂注入液

一五七

蓖麻子油注入液

一五七

軟曠注入液

一五九

松節油注入液

一五九

幾阿蘇注入液

一六〇

明礬注入液

一六〇

硫酸鋅注入液

一六〇

第五章 注射液類

阿普莫非注射液

一六〇

鹽酸莫非注射液

一六〇

硫酸士的年注射液

一六〇

硫酸阿刀賓注射液

一六〇

第六章 含漱藥類

石炭酸含漱水

一六一

明礬含漱水

一六一

硝酸銀含漱水

一六一

昇汞含漱水

一六二

第七章 洗滌藥類

硼酸洗水

一六一

石炭酸洗水

一六一

明礬洗水

一六一

硝酸銀洗水

一六一

幾阿蘇洗水

一六一

硫酸銅洗水

一六一

昇汞洗水

一六一

醋酸鉛洗水

一六一

醋酸鉛鴉片洗水

一六一

硫酸鋅洗水

一六一

來蘇洗水

一六一

過錳酸鉀洗水

一六一

第八章 軟膏藥類

硼酸軟膏

一六三

石炭酸軟膏

一六三

水楊酸軟膏

一六三

樟腦軟膏

一六三

斑蝥軟膏

一六三

其瑣編軟膏

一六四

沒石子軟膏

一六四

沒石子鴉片軟膏

一六四

水銀軟膏

一六四

氯化鋇軟膏

一六四

紅降汞軟膏

一六四

黃降汞軟膏

一六五

硝酸汞軟膏

一六五

甘汞軟膏	二五	蛋白銀點眼水	一七
魚石鹼軟膏	二五	第十章 酒藥類	
碘軟膏	二五	烏頭酒	一七
黃碘軟膏	二五	蘆薈酒	一七
硫黃軟膏	二五	陳皮酒	一六
亞鉛華軟膏	二六	顛茄酒	一六
拉沙軟膏	二六	透路酒	一六
安福消腫膏(アンチフロヂスチン)	二六	安息香雜酒	一六
土肥氏爹流膏	二六	布球酒	一六
微爾金孫氏軟膏(ウキルキンソン氏膏)	二六	印度麻酒	一六
披吉婁魯泥膏(ヒチロール軟膏)	二七	樟腦雜酒	一六
第九章 點眼藥類		鴉片酒	一六
硫酸阿刀賓點眼水	二七	豆叩雜酒	一六
厄可連點眼水	二七	丁香酒	一七

兒茶酒

一七〇

肉桂酒

一七〇

毛地黃酒

一七〇

生薑酒

一七〇

龍膽草酒

一七一

關羊花酒

一七一

碘酒

一七一

吐根酒

一七一

拉灣大雞酒

一七二

番木別酒

一七二

遠志酒

一七二

大黃酒

一七二

海葱酒

一七三

第十一章 酒精類

伊打酒精

一七三

樟腦酒精

一七三

哥羅芳酒精

一七三

薄荷酒精

一七三

第十二章 擦藥類

顛茄擦藥

一七四

樟腦擦藥

一七四

松節油擦藥

一七四

軟胰擦藥

一七四

碘擦藥

一七五

哥羅芳擦藥

一七五

石灰擦藥

一七五

第十三章 甘油調合藥類

炭尼酸甘油

一七五

樟腦甘油

一五

硼酸甘油

一五

黃磷甘油

一五

第十四章 散藥類

吐根雜散

一五

渣笠雜散

一五

番木別雜散

一五

大黃雜散

一五

水楊酸雜散

一五

次硝酸鉍鴉片雜散

一五

肉桂雜散

一五

甘草雜散

一五

甘汞雜散

一五

黃降汞雜散

一五

第十五章 丸藥類

蘆薈丸

一七

蘆薈鐵丸

一七

番木別頭茄丸

一六

樟腦頭茄丸

一六

哥羅新開羊花丸

一六

硫酸規尼丸

一六

汞藍丸

一六

吐根海葱丸

一六

大黃雜丸

一六

山道年丸

一六

第十六章 坐藥類

炭尼酸坐藥

一六

沒石子鴉片坐藥

一六

黃連坐藥

一八〇

山道年坐藥

一八〇

第十七章 膠球(又名帶藥)

白礬兒茶膠球

一八〇

鎂化鉀膠球

一八〇

碘化鉀膠球

一八〇

第十八章 糖漿類

白樹膠糖漿

一八〇

檸檬糖漿

一八一

透路糖漿

一八一

寇第印糖漿

一八一

吐根糖漿

一八一

海葱糖漿

一八一

大黃糖漿

一八一

遠志糖漿

一八二

玫瑰糖漿

一八二

陳皮糖漿

一八二

第十九章 敷藥類

木炭敷藥

一八三

芥末敷藥

一八三

明礬敷藥

一八三

第二篇 處方學

第一章 血行器病處方

心跳症

一八五

心內膜炎

一八五

急心痛

一八六

心悸亢進

一八六

心包炎

一八七

第二章 消化器病處方

口炎
口疳
舌炎
喉炎
急性胃炎
慢性胃炎
胃脹
胃瘍
胃痛
泄瀉
痢疾
便秘
蟯蟲

一八七
一八八
一八九
一九〇
一九一
一九二
一九三
一九四
一九五
一九六
一九七
一九八

總蟲

十二指腸蟲

蛔蟲

第三章 呼吸器病處方

肺炎

肺癆症

肋膜炎

氣管炎

喘息

咳血

第四章 全身病處方

貧血

虛弱

痛風

一八六

一八五

一八四

一八三

一八二

一八一

一八〇

一七九

一七八

一七七

一七六

一七五

一七四

一七三

萎黃病

二〇三

第五章 泌尿生殖器病處方

膀胱炎

二〇三

遺尿

二〇四

遺精

二〇四

腎炎

二〇五

尿血

二〇五

陽萎

二〇六

第六章 神經病處方

神經衰弱

二〇六

神經痛

二〇七

眩暈

二〇七

腦食血

二〇八

驚悸

二〇八

不眠症

二〇九

頭痛

二〇九

偏頭痛

二一〇

腦充血

二一〇

癩痢

二一一

歇斯里的

二一一

第七章 傳染病處方

流行性感胃

二一二

破傷風

二一二

腮腺炎

二一三

瘧疾

二一四

霍亂

二一四

腳氣

二一五

痘瘡

二一六

傷寒 二六
 麻疹 二六
 白喉 二七
 打傷 二七
 癰疽 二七
 凍傷 二八
 扭傷 二八
 燒燙傷 二九
 痔瘡 三〇
 天疱瘡 三〇
 刀傷 三一
 漏瘡 三一
 癰瘍 三三

第八章 外科處方

二六
 二六
 二七
 二七
 二七
 二八
 二八
 二九
 三〇
 三一
 三一
 三三

咬傷

癰疽

火眼

雲翳

爛眼邊

梅毒眼

淋毒眼

沙眼

眼疔

牙痛

眼腫

三三

三三

三三

第九章 眼科處方

第十章 齒科處方

第十一章 皮膚病處方

三三

三三

三三

三三

三三

三四

三四

三五

三五

三五

三六

三六

三六

毛虱	三六	濕疥	三六
頭虱	三六	膿疱疥	三六
手足出汗	三七	第十二章 耳鼻咽喉科處方	
禿髮症	三七	耳漏	三四
癬風	三八	耳痛	三五
面疱	三八	鼻衄	三五
腋臭	三九	鼻泗膜炎	三六
爛脚	三九	喉頭炎	三六
黃水瘡	四〇	第十三章 婦人科處方	
乾癬	三一	乳閉	三七
濕癬	三一	乳多	三七
頑癬	三一	乳腺炎	三七
雀斑	三三	經閉	三六
酒刺	三三	惡阻	三九

月經過多

經痛

產痛

產後流血不止

子宮炎

白帶

陰戶癢

第十四章 花柳科處方

淋症

軟性下疳

橫痃

梅毒入骨

梅毒落後

第十五章 小兒科處方

西藥實驗大全 目次

三九

三四〇

三四〇

三四〇

三四一

三四一

三四二

三四二

三四三

三四三

三四四

三四四

三四五

百日咳

泄瀉

痢疾

胃弱

便秘

食滯

驚風

疳症

附註忌鴉片法

三四五

三四五

三四五

三四五

三四五

三四五

三四五

三四五

三四五

西藥實驗大全 目次

第 一 篇

藥

物

學

西藥實驗大全

第一篇 藥物學

第一章 麻醉藥 *Narcotica*

凡藥嗅之。令人昏迷。不覺疼痛。全身知覺鈍失。內服鎮靜神經、止痛、安睡。外用射入皮下或敷於瘡面皮薄之處。能使患處皮肉麻木。統爲之麻醉藥。此類藥品又分爲三類。

(一)蒙藥、(二)麻藥、(三)止疼安睡藥。

蒙藥(全身麻醉)

蒙藥類品。其氣易散。人若吸之。全身失其知覺。吸入極速。消散亦速。由肺呼出之。施蒙藥者如一停止。被蒙者不久即醒。若施術以前三十分鐘。用莫非百分之二者五滴。注

射皮下。則蒙藥效力時間較長。如吸伊打時。

先服哥拉。則蒙藥之初程易過。效力時間亦

長。其大用乃爲止疼。割病之時。使病入痊

然。不致妄動。及不覺疼痛。非蒙藥不爲功

效。故此行手術者。均以蒙藥爲準。能

之可免臨產之痛。然不可多用。恐有產後血

崩之險。其他如節脫、疝氣、肌抽。吸此藥後。

肌肉鬆懈。易於醫治。能使患者恢復原狀。

哥羅芳 *Chloroform* 又名哥囉仿謨

【性狀】此藥由氯化石灰、與熟石灰、及淡酒

精。用化學之法蒸出者。爲無色透明之

流質。味甜而辛烈。嗅之略香。裝藥之

瓶口。須嚴密封閉。否則易於飛散。

放置之處。最宜冷暗。如在有光之處。

即變爲一種碳酸鹽類。不堪使用矣。

此藥用酒精七分化十分。水一百八十五分化一分。餘如冰醋酸、伊打、油類、則均易化。又能溶化膠皮。凡膠皮製做之物。一觸此藥。即成廢物。用此藥之時。須特別注意。因此藥有純者與不純者二種。不純者不能用做蒙藥。欲知此藥純否。用藍色試紙。

(此紙各西醫藥房均有出售) 蘸於藥內。如變紅色。則知藥已變爲酸性矣。如以硝酸銀少許置於其內。即變氣而有白色沈澱。即爲不純之藥。不能用爲蒙藥。總之用時。須購於著名之西藥房。無有不純之品。

【功效】敷於皮上先覺涼。繼現灼熱、潮紅、起泡。吸入時須與。口內覺甜。漸致全身肌肉鬆懈。以後全身知覺盡失矣。當蒙之時。瞳人散大。至麻醉期。瞳人縮小。如再散大。即知爲險兆。遇強壯與好酒者。蒙時必有手舞足蹈之狀。如遇此形勢之患者。可急速連續吸之。但不可過多。恐其肌力散盡。致有危險之虞。

【主治】全身麻醉、胃痛、腹瀉、霍亂、咳嗽、關節痛、神經痛、抽搐、牙痛、各種惡瘡。

【內用】爲各種止痛之藥。咳嗽、抽搐、胃痛、腹瀉、霍亂。必須以此藥製成酒類、

或水類用之。

【外用】關節疼痛、牙疼、頭疼、惡瘡、全身

麻醉。

【蒙藥方法】用此藥前半日間。務告患者不可

飲食。並服瀉藥一劑。以免蒙藥時嘔吐

或大便。蒙時當用蒙藥具一套。如無此

器。即用手巾一方作爲蒙藥器。將此

器離鼻上約二三寸。將藥漸次滴下。

若用之過猛。難保無險。此時器中之

布。漸行潮濕。必令患者仰臥床上。

鬆其鈕扣衣袋。如有假牙。更當取出。

恐入氣管。蒙藥器離鼻之高低。當以

呼吸自然爲標準。漸次受藥。不可過

猛。此爲最要。如呼吸不能自然。即

是空氣不足之故。施藥之人。暫宜停

止。待其空氣吸足。可再行之。施藥

時。醫生念一二三……。患者亦隨醫

生念一二三……。此法使患者自然呼

吸。易於受藥。至患者念字不真。及

不作聲時。即呈昏迷狀態。司蒙藥者。

以指輕極其眼球。試其有無知覺。如

無知覺。眼球即不能轉動。則知全身

已麻醉矣。急施手術剖割。漸割漸滴。

務待手術將完爲止。手術停止之後。患

者將醒時。常有悲哭之聲。此乃必須

經過之狀態。女人更甚。

【分量】哥羅芳 一至五滴。(〇〇〇之〇)

(三西西)

哥羅芳酒 二十至六十滴、(一·三至四西西)

哥羅芳水 半至二量兩、(一五至六〇西西)

哥羅芳莫非雜酒 五至十五滴、(〇·三至一西西)

哥羅芳擦藥 外用不能內服、

【忌用】心臟病、動脈瘤、肺病、貧血症、虛弱者忌用。如在呼吸氣道週圍施行手術。

更當注意。恐血流入氣管不能咯出。

致有性命之險。

【副作用】吸此藥後發生危險者。男多於女。

脈搏呼吸偶有停止。面變青色。皮出冷汗。此時宜將藥停止。急速注射

士的年六十分之一厘。或阿刀賓二百分之一厘。或地芝他民十五滴(即一西西)於皮下。並用代引呼吸法。上提其腿。下垂其頭。以手擠腹槌胸。

使血流入心臟。使呼吸復原。並以舌錯子上提其舌。亦為激呼吸之良法。

曾有患者似死。以手摩擦其胸。乃得

更甦。倘醫生遇此等情狀。當奈心待之。不可絕望。如救一點鐘後不醒。則

無望矣。蒙藥後如有嘔吐者。不為危險。

每百人中必有十五人見此狀態。

伊打 Aether 又名 以脫

【性狀】此藥由硫酸與酒精。用化學之法相合而成。為無色透明之流質。有特異之

烈味。其氣易散。隱之略有熱性。其蒸氣容易發火。故用時宜避燈火。以免燃燒之險。在割病室中之燈火。必高過手術床方可。

【功效】此藥功效短而速。若敷皮膚必覺該處甚涼。故可用為患處之麻藥。當蒙藥時。倘有呼吸被阻。面目發紅形狀。暫停片刻時。即安然無事。漸至呼吸長。脈速有力。而眼之反應仍存。此勢一過。仍必發生吵鬧、喜笑、哀哭、腦怒、尋鬪等不安之狀。此等形勢。各人不同。有時必須多人管束。方可鎮靜。越片時則知覺全失矣。至此時方可施行手術。如患者始終不安。宜特別注意。

不可過多。恐散盡肌力。發生危險。【主治】腦力脫失、眩暈、嘔吐、失眠、胆石症、腸痙痛。並能化痰、止咳。

【蒙藥方法】吸藥時最要安然從事。不可過猛。使患者生懼怕之心。對於婦女、小兒。當在自己臥床。不可移至手術室。因手術室有許多之醫療器械。見之更為驚恐。如在臥床吸藥。不但不驚。蒙時亦少作可畏之夢、施行時最要和平。以免危險。其蒙法與哥羅芳法相同。惟此必須多用方可。又哥羅芳與伊打比較。各有優劣。伊打較哥羅芳為優者危險少。因心臟病而死者亦少。蒙藥後不起惡心、嘔吐、頭暈等症。由麻

醉期至甦醒期較哥羅芳微速。然劣於哥羅芳者。用於燈下必招意外之險。

而刺激性又大。使口流涎。氣管發生粘液。與奮期長。麻醉期短。藥之祛離又速。故欲使長時間之麻醉。實屬艱難。

【內用】腸胃脹、胃疼、嘔吐、咳嗽、不眠、胆石、腸疝等症用之。

【外用】爲興奮藥。如腦力脫失、心臟虛弱。用此藥注射皮下。

【分量】伊打 五至十五滴、(〇·三至一西西)
服法、滴於白糖上、或膠囊內服之、

伊打酒 一錢至二錢、(四至八西西)

【處方】伊打五滴、(〇·三西西) 松節油三滴

(〇·二西西) 裝膠囊內服之、治胆石症、

【又方】伊打二錢(八西西)樟腦二錢(八西西)
每日一次注射皮下、治腦力脫失、心臟虛弱、每次十滴、(〇·六西西)

【忌用】氣管炎、腎炎、胃炎、動脈瘤、糖尿症、貧血均不可用。

【副作用】用此藥如有面顯紫色。此乃血內缺養之故。宜停止片刻。如顯白色。當令身高於頭。若面顯紫色。不可如此高頭。如發生危險之時。宜與哥羅芳行同樣之救急。注射士的年六十分之一厘。阿刀賓二百分之一厘。或樟腦油十五滴(一西西)等激心。

麻藥（局部麻醉）

此類藥品。能令患處麻木。而失知覺。行手術時。使患者不感痛苦。若用大量。則生異外之險。茲擇錄腰、椎、麻醉藥。及局、所、麻、醉、藥之用法。又對於淺在之手術。常用寒冷、麻、醉、法、分述於次。

忒羅怕叩卡印 Tropacocain（腰椎

麻醉藥）

【性狀】本藥特由叩卡印葉（瓜哇產）中製出。

或用化學方法製為鹽酸鹽。呈白色粉末。易溶解於水。

【功效】有麻醉神經及擴張血管之作用。其毒輕微。僅得叩卡印三分之一。

【主治】為最良之脊椎麻醉藥。

【用量】粉末以〇・〇五瓦。嚴封於小玻璃管

內。蒸氣消毒後。混合脊髓液約五西西以內用之。或製成一乃至五%水溶液。經過煮沸消毒後。每次用五或一西西。

【用法】將特製之金屬脊髓穿刺針。（內含鑽

絲之套管針）施行煮沸消毒片時。使

患者保持俯坐式。或側臥式。務令腰

部前屈。則脊狀突起間距離。自然增

加。然後按三四腰椎之間。正中刺入。

約五至六釐。（而局部嚴重消毒。固

不待言）其針由突起間韌帶。穿過硬

膜。達於脊髓膜囊內。則覺抵抗力忽

然減少。急將鑽絲拔出。使流出之脊

髓液。滴於忒羅伯叩卡印小管中。約一至五西西。將管搖動。以便溶解。成透明之液。再吸入注射管內。依原針不動而注入之。或以本藥製成之溶液。由穿刺法。既見髓液流出後。射入(五%)一西西。或(一%)五西西亦可。

倘穿刺骨上。可左右移動。或拔出至皮下。變其方向。無抵抗之處再刺之。有時脊髓液中混有血液。因刺入靜脈之故。可將針尖進退移動之。又欲以脊髓液稀釋本藥液。則混有血液者不可用之。注射時最宜徐緩。以防脊髓壓力驟增。

藥液射盡。則針與注射管同時拔出。以絆創膏貼之。再敷一大塊於其上。以免染毒。

【副作用】有時面色蒼白、惡寒戰慄。可服興奮劑。(赤酒)虛脫則施強心注射。

【禁忌】未滿七歲之小兒。及有各種神經病、敗血膿毒症、急性傳染病等。不可用之。

鹽酸叩卡印 Cocaine Hydrochlor

(局所麻醉藥)

【性狀】此藥係用化學法。由一種植物葉中製出。為無色透明之結晶小片。味苦。有麻力。水一分化藥二分。酒精二分半化藥一分。油類不能化。其溶液易於

分解。故臨用時配之。

【功效】服藥片刻間。即覺舒暢。如敷於粘膜。

先白而後紅。因其能令血管縮小。故

變白色。及効力一過。血管鬆大。仍

變紅色。服過量必有抽搐之勢。如服

毒分劑。則呼吸麻痺致死。

【主治】止疼、提神、麻醉。治眩暈。

【用量】鹽酸叩卡印 一厘四分之一、至半厘、

(〇・〇一六至〇・〇三)

【處方】鹽酸叩卡印四分之一厘(〇・一六)次

硝酸鈹三十厘(二瓦)重碳酸鈣三十厘

(二瓦)白糖四十五厘(三瓦)

右分三包、一日三次、食前服之、

(止胃痛)

【又方】鹽酸叩卡印八厘(〇・五)硼酸七厘(

〇・四)蒸溜水五百滴(三三四西)

右爲點眼用、(止疼消炎)

【中毒狀】腦力脫失。不醒人事。常用易於成

癮。中癮後身體消瘦。最難斷絕。

【解毒法】用士的年六十分之一厘注射皮下。

或服加非印等強心藥。

【內用】腦力脫失、肺癆、貧血、暈船、胃痛、

孕婦嘔吐、鴉片煙癮等用之。

【外用】爲最要之局所麻醉藥。凡小手術之

時。或眼科均可用之。最爲有效。此

藥一厘或二厘。加蒸溜水一百滴。注

射患處。或點眼內。均可迅速止疼。

若女子乳頭破裂。或小兒未食乳前。

用此藥敷之最效。如在頭部。用此藥易生危險。因離腦甚近。即在下部亦當慎用之。英·法醫士多用鹽酸叩卡印。而德·日醫士多用奴佛卡因。

【注射用量】如用百分之一者。即鹽酸叩卡印一厘。蒸溜水一百滴。百分之二者。即鹽酸叩卡印二厘。蒸溜水一百滴。如眼科·耳鼻喉科。敷於粘膜用者。以百分之四五爲宜。

【注射用法】先將患處洗淨。用碘酒消毒。再用一西酉或二西酉之空針。射麻藥於患處。待四五分鐘後。即可施行手術。
奴佛卡因 Novocain(挪復卡印)
此藥爲局所麻醉、效力確實、毒力最

小之良劑。乃德國特製之品。而日本各大醫士甚重用之。英·美醫士猶重鹽酸叩卡印。其副作用甚大。不堪多量使用。故行大手術時。不免發生意外之險。甚爲遺憾。故此近時各大醫士。均不欲全身麻醉。而用局所麻醉藥。蓋奴佛卡因爲最良之局所麻醉藥也。

【性狀】乃白色針形之結晶粉末。與鹽酸叩卡印略同。水一分化藥一分。酒精三十分化一分。

【功效】本藥無刺激性。其毒力較叩卡印小八分之一。用時無腫人散大、頭暈等之阻碍。要製成水劑。能奈煮沸消毒。

貯藏暗處。效力可經久保持。使用多量亦無危險。

【主治】為局所麻醉之注射藥。惟眼科、齒科、耳鼻喉科敷之。均不如鹽酸即卡印之效力大也。

【注射用量】如用百分之〇·五溶液。即奴佛卡因半厘、溜水一百滴。百分之一溶液。即奴佛卡因一厘、溜水一百滴。餘者類推。或用百分之二者均可。

【用法】如用鹽酸即卡印百分之一溶液。不可過五西酉。多用則生危險。而奴佛卡因百分之〇·五溶液。能用一百二十西酉。百分之一者。能用六十西酉。百分之二者。能用三十西酉。均無危

險。

氯乙完質 Chloroethyl methylinum

chloroform 又名凱林(寒冷麻醉劑)

【性狀】為無色、透明。極易揮發、及發火之液體。

【功效】對於體表淺部之小手術。如癰腫及膿瘍切開時。或神經過敏、不堪微痛之人利用之。惟對於結膜間。則不易行。

【主治】鎮痛。使局部寒冷而得麻醉之效。

【用法】此藥固封於特具栓塞之玻璃管中。用時將其栓塞以小礎碰開。遂用食指壓迫其金屬機關。則藥液成細線狀迸出。約距手術部二三十厘米之處保持之。待皮膚呈白色。即開始手術、或注射。

仍須緊縛止血帶。收效尤佳。又麻醉

前須用酒精擦去皮膚上之油脂。

止疼安睡藥

凡藥能止疼安睡。均謂之止疼安睡藥。此類藥品。有止痛而不安睡者。有安睡而不能止痛者。自己擇用之。

鴉片 Opium 又名阿片

【性狀】此藥產於波斯、印度、土耳其、中國等處。乃由一種罌粟未熟之果中。洩出白色如乳之漿。新鮮者柔軟。乾燥者則堅脆。色紅褐。有麻醇性之臭氣。味苦而芳香。製為乾燥之粉末。以其療病之用。如將此藥用化學之法分解。能由其中提出藥精十八種。最要者即

莫非、印的印、赫羅因三種是也。

【功效】令人酣睡、大便乾燥。服過分量有中
毒之患。兒童最忌此藥。

【主治】止疼、安睡、消炎、減液。

一 止疼、此藥為止痛之妙藥。無論何種疼痛。用之無不相宜。對肝腎疼痛、及經痛、抽搐為特效之藥。

二 安睡、此藥能令人安睡。但非因疼痛不能安睡者。不宜用之。如欲常服。宜以抱水格拉互用。可免成癮之患。

三 消炎、對於各種之炎症。異常有效。如潤膜炎、腹膜炎、腦膜炎、心包炎、膀胱炎服之皆效。倘有跌打損傷。以鴉片與醋酸鉛敷之最效。

四 減液、此藥對糖尿病、痢疾、水泄、尿過多、服之最效。

【用量】鴉片散 一厘四分之一、至二厘(〇·

〇一六至〇·一三)

鴉片膏 一厘四分之一、至二分之一

厘、(〇·〇一六至〇·〇三)

鴉片酒 五至十五滴、(〇·三至一西

西)

鴉片表散 五至十厘、(〇·三至〇·

六)

【處方】鴉片酒一錢(四西西) 醋酸鉛一錢(四

瓦) 水六兩(二〇〇西西)

右跌打損傷敷之、(止疼消腫) 破皮

禁用、

【又方】鴉片酒半錢(二西西) 橙皮酒半錢(二

西西) 水三兩(一〇〇西西)

右均三次用之、一日服完、食前用、

(治痢疾、止痛、止瀉)

【副作用】有人服後。一小時尙不能安睡。有

時效力已過。惡心、嘔吐者。更有非

常憂悶者。醫士如遇此種狀態。可與

鎳化鈉二十厘(一·三)服之可免。

【中毒】服此藥過量。初覺惺然。過時則困倦。

以後則沉睡、呼吸慢而長、脈遲而有

力。皮熱而乾、面色變紅、瞳人縮小。

至此形狀。人近其耳呼之。或力搖之。

雖能醒覺。而仍酣睡、漸次面變紫色、

呼吸遲慢、(每分鐘僅有四五次)肌肉

鬆懈、皮生冷汗。終則瞳人散大。以至殞命。

【解毒法】中此毒者。先用硫酸鋅三十厘（二

瓦）白水服之。令其嘔吐。如不嘔吐可

再服之。若時間太多。態度危險。不

必用吐藥。可用洗胃器。灌注過錳酸

鉀水（千分之一）六磅。因此藥在化學

之中。可敵鴉片之毒。若呼吸漸慢。

可射士的年一厘六十分之一於皮下。

能激呼吸。或射阿刀賓一厘二百分之

一均可。宜使二人扶腋而行。千萬不

可沉睡。以免血液凝滯而死。（頃近

常用鹽酸阿普莫非 Apomorphi Hyd

rosolior 溶液每次〇・〇六）注射皮

下。須臾即吐。同時仍須多飲過錳酸鉀水。以清胃中之毒。

【禁用】凡兒童之病症。不可用此藥服之。

忌鴉片法

【處方】印度麻酒一量錢（四西西）鹽酸莫非

一厘至一厘五（〇・〇六至〇・一）橙皮

酒二量錢（八西西）番木別酒一量錢

（四西西）水加至六量兩（二〇〇西

西）

右均十二次用之。一日三次。食前

用。如吸癮二錢。服此方十日可戒

除。每日減輕藥量。其減法。第二

瓶比第一瓶減去印度麻。莫非五分

之一。其他各藥仍照原數。餘者按

次減之。

【又方】關羊花酒一量錢（四西西）鴉片酒三量錢（一二西西）苦味酒一量錢（四西西）番木別酒三量錢（一二西西）蒸溜水加至六量兩（二〇〇西西）

右方均六次用、一日三次、食前服之、此方除減輕鴉片數量、與前方同一外、餘者均按原數、

鹽酸莫非 *Morphine Hydrochloru*

日 又名莫非氫鹽

【性狀】此藥由鴉片與鹽酸化合而成、爲白色細面。多團結如珠。味苦。水五百分化一分。酒精四十分化一分。

【功效】此藥能令神經麻痺。服足分量。令人

酣睡止疼。並有大便乾燥之患。用過分量。容易中毒。

【主治】安睡、止痛、解抽、平胃。及止嘔。

一 用此藥安睡。非因疼痛不能安睡者不可用之。用之日久恐有習慣性。用時可與抱水格拉、印度麻遞換用之。以免日久成癮。

二 如腹痛、月經痛、神經痛。及各種疼痛用之。

三 凡腸胃炎、嘔吐、瀉痢、抽搐。先服蓖麻油。後服此藥。

四 如各種咳嗽、肺炎、咳血、氣管炎等症用之。

【用量】鹽酸莫非 一厘八分之一至二分之一

厘、(〇・〇〇八至〇・〇三)

鹽酸莫非溶液 十至六十滴、(〇・六

至四西西)

鹽酸莫非注射液 百分之一者、每射

十滴、(〇・六)至十五滴(一西西)

於皮下、

【處方】鹽酸莫非半厘(〇・〇三)抱水格拉半

錢(二瓦)糖漿一兩(三〇西西) 水加

至三(一〇〇西西)

右方均六次服之、一日三次、食後

用、(能止疼安睡)

【又方】鹽酸莫非一厘十分之一厘(〇・〇〇

六)糖漿一量錢(四西西)

右方作一次服之、(治咳嗽)

【又方】鹽酸莫非半厘(〇・〇三)乳糖三十厘(

二瓦)

右分六包、每服一包、(治胃疼)

【中毒狀】與鴉片同。解毒方法亦同。戒除法

亦同。

哥拉 Chloralum Hydratum 又名綠

養冰 抱水格魯兒兒

【性狀】此藥由酒精與氫氣以化學法製出。結

冰成塊。色白味苦。別具一種氣息。

宜置嚴密瓶內。放於冷暗之處。免其

飛散改變。酒精：水：伊打均能化之。

【功效】此藥能平腦。如敷結膜。先變紅而微

痛。後即發炎。

【主治】不眠症。服此藥後十五分鐘至三十分

鐘。忽覺困倦安睡。與自然之安睡無異。其效約在二點鐘至四點鐘。方能醒覺。若服過量。酣睡深久。其餘如咳嗽、瘧疹、抽搐、酒狂、癩癩、牙關緊閉、哮喘、以及腦膜炎用之均效、分婉用之亦可。

【用量】哥拉 五至十厘、(〇.三至〇.六)

【處方】哥拉一錢(四瓦)鹽酸莫非一厘(〇.〇

六)糖漿一兩(三〇西西)水加至三兩(一〇〇西西)

右臨睡時、服一匙、(能止疼安睡)

【又方】哥拉一錢(四瓦)鎳化鉀二錢(八瓦)鎳

化鈉一錢(四瓦)水加至三兩(一〇〇

西西)

西藥實驗大全 藥物學

右均六次服之、一日三次、食前用、(能平曠、安睡。癩狂、癩症、神經諸病皆可用之)

【中毒】服過分量者。必困倦昏迷、不省人事。面色蒼白、手出冷汗、瞳人先縮小後則散大。

【解毒】服吐藥或洗胃法。

【副作用】服此藥有惡心、嘔吐、皮生紅點等狀。不久即行消散。

【忌用】心臟有病者禁用。

哥羅顛 Chloroform

【性狀】此藥是哥羅芳與嗎啡。及其他數種藥製成。色黑。味甜辣而清香。

【功效】為麻醉性藥品。有止疼、安睡、止瀉

之能。

【主治】爲止疼、安睡、止瀉藥。凡腹痛、下瀉、痢疾、霍亂、抽搐最效之良藥。

【用量】哥羅顛 五至十五滴、(○·三至一西)

【處方】哥羅顛半錢(二西西)蒸溜水加至三兩(一〇〇西西)

右作三次用之、(治霍亂、吐瀉、胃疼甚效、不可多用、恐有中毒之險)

鎮化鉀 *Potassium Bromidum* 又名鉀

鎳鹽 臭素加里 錫羅謨加留謨

【性狀】此藥乃鎳與毒性鉀溶液製成。爲白色透光結晶之方塊。味鹹而腥。陰雨之時。能返潮濕。乾燥不變。冷水、沸

水、酒精均能化之。

【功效】爲平腦之要藥。能令人安睡、解抽、並阻幻想。

【主治】不眠、遺精、顛狂、癲症、抽搐、神經痛、爲鎮靜之要藥。凡腦部受感太過、而起續發性之癲癇。或因施手術而起之破傷風抽搐。或婦女懷孕嘔吐。及經絕之時受驚者。或小兒急癇。及神經衰弱等症。無論成人兒童用之均效。如不眠。可與哥拉同服。小兒因膀胱抽搐而遺尿。成人之夢遺滑精。此藥乃最要之妙品。兒童出牙時。如有抽搐之狀。與酣睡之時。忽然驚醒者。用此藥小分劑大效。各種頭痛、眩暈、經

旺、經痛、或暈車船。此藥均可。如用照喉鏡之時。咽喉受惹。不能忍受。用此藥小分劑。則保安全。

【用量】鎳化鉀 十至三十厘(〇·六至二瓦)

【處分】鎳化鉀半錢(二瓦) 鎳化銻二錢(八瓦)

鍾香酒一量錢(四西西) 水加至六兩(

二〇〇西西)

右均十二次用、一日三次、食前用

(治婦女孕時受驚)

【又方】鎳化鉀半錢(二瓦) 安提排林半錢(二

瓦) 加非印十厘(〇·六)

右分六包服之、每三點鐘一次、(治

各種頭痛、眩暈)

鎳化鈉 Sodium Bromidum 又名鈉鎳

西藥實驗大全 藥物學

鹽 滴鎳 臭素那篤假護 臭素別里

【性狀】此藥自鎳鐵與炭酸鈉。用化學法製成。

色白、結晶、小粒、味鹹。水、酒均易化

之。

【功效】為平腦之良藥。其效力與鎳化鉀同。

【主治】驚悸、不眠、暈船、遺精、頭疼。凡鎳化

鉀能醫之症。此藥皆能醫之。惟無阻

心之患。

【用量】鎳化鈉 十至三十厘(〇·六至二瓦)

【處方】鎳化鈉三十厘(二瓦) 鎳化鉀三十

厘(二瓦) 水加至六兩(二〇〇西

西)

右一日三次、二日用完、食前用、

(治遺精)

【又方】鎳化鉀三錢 (一二瓦) 鎳化鉀三錢

(一二瓦) 甘松酒二錢(八西西)

水加至六兩(二〇〇西西)

右均十二次用、一日三次、食前、(治

癩癩病)

鎮化銻 Ammonii Bromidum 又名銻

鎳鹽或阿摩尼亞鎳

【性狀】此藥自鎳酸與純銻水。用化學法製成。

白色結晶小粒。味鹹而辛。遇空氣變

黃色。水、酒均易化之。

【功效】此藥對於腦病。有特別之效力。服過

分量。必覺口內發癢。

【主治】驚悸、不眠、遺精、頭痛、咳嗽、癩癩。其

效力比鎳化鉀較小。而惹胃則甚。凡

不眠症、癩癩。與鎳化鉀。鎳化鉀同

服甚效。

【用量】鎳化銻 十至三十厘、(〇六至二瓦)

【處方】鎳化銻半錢(二瓦) 鎳化鉀半錢(二瓦)

鎳化鉀半錢(二瓦)

右分三包、每服一包、(治神經衰弱

不眠症)

索弗拿 Solferino 又名斯爾份那爾

【性狀】此藥用化學法製成。無色無味結晶之

小粒。毒性甚小。易化於酒精及伊打。

【功效】此藥行於腦經。故能平腦。

【主治】能安睡而不能止疼。無論何種不眠服

之。有長久之效。其效力雖遲於哥拉。

但睡眠時間較久。能睡五至八點鐘。

【用量】索弗拿 二十至四十厘、(一·三至二·

六)

【用法】此藥不化於水。宜置膠囊內或糖漿內服之。如加熱水內。可乘熱吞服。涼時即行沉澱。宜在未睡前二三點鐘服之。如臨睡再服。恐當時不能睡。至次日方覺困倦。

【處方】索弗拿十厘(〇·六)

右用米紙包好、白水服之、(治不眠症、或神經病)

印度麻酒 *Tincti Cannabis Indica.*

B.P. 又名印度大麻丁幾

【性狀】此藥產於波斯、印度。入藥者乃其花。

用酒精取出綠色。味苦辣。

【功效】如服足分量。令人神經不能自主。覺

有可笑之事。有時心甚憂悶。自思將死。又覺呼吸過大。恐肺臟崩裂。此種狀態已過。必致沉睡十點鐘之久。方能醒覺。如服過量。不知時間長短。一分鐘常視爲一點鐘。如敷於粘膜。先有刺戟性。後有麻醉之力。然因此藥而死者太少。

【主治】安睡、止疼、解抽、祛痰、定喘。對於頭痛、胃痛、神經痛、腰痛、陽莖硬痛等症。均能止疼。如與他種止咳藥同服。治咳嗽、脫抽、不眠症用之均效。

【用量】印度麻酒 五至十五滴、(〇·三至一西西)

【處方】印度麻酒二錢（八西西）番木別酒一錢

（四西西）水加六兩（二〇〇西西）

右分六次用之，一日三次，食前用，

（治頭痛）

顛茄 *Belladonnae* 又名莨菪

【性狀】此藥產於美國、歐洲等處。入藥者用

該藥之根及葉。綠色。味苦而辣。內

含一精名阿刀賓。

【功效】服此藥過量。面現紅色。咽喉發乾而

赤。瞳人散大。或有雙視。皮生紅點。

人必昏譫。言語猛烈。敷於皮上。必

覺發麻。內服有加腸蠕動之力。減少

全身分泌液。惟尿不減。而且增多。

【主治】不眠。能止疼、發表、解抽、利尿。

或神經痛搽服。均有效力。如生液過

多、盜汗、流涎、中尿毒。並婦人血

管炎症。將此藥之帖膏或軟膏敷之。

有停止生乳之效。各種轉筋及抽搐。

搽此藥最效。如有淋症。小便不利。

若與布球同服。有止疼利尿之功。如

陽痿、遺精、遺尿、癩症、及各種咳嗽均

可用之。過用目力之頭痛。用帖膏帖

於頭上。又治各種風濕、腰腿痛、筋骨

痛。用顛茄帖膏帖之。

【用量】顛茄酒 五至十五滴、（〇三至一西

西）

顛茄流膏 一滴四分之一、至一滴、

（〇〇〇一五至〇〇六）

顛茄帖膏 外用

顛茄擦藥 外用

阿刀賓爲顛茄之精。用以救急及解鴉片中毒。注射於皮下。

硫酸阿刀賓一厘二百分之一、至一百分之一厘、(〇・〇〇〇三至〇・〇〇〇六)

【處方】顛茄酒二錢(八西西) 鎳化鉀二錢(八

瓦) 水六兩(二〇〇西西)

右一日三次、四日分服、食前、(治

遺精遺尿)

【又方】顛茄擦藥

右酌用、(治乳腺炎、停止生乳、止

疹)

止顛茄帖膏酌用

右治無名酌用腫毒、帖患處(消腫、

疼、腰腿痛亦效)

鬧羊花 *Hyoscyamus* *T. n.* 又名菲

沃斯草

【性狀】此藥產於英、美、中國等處。入藥乃該

藥之枝葉與花。製成酒與膏或丸。色

黑無味。

【功效】此藥之功效。與阿刀賓同。能令瞳人

散大。阿刀賓在眼內能存半月之久。

此藥僅存九日。內含二精。一爲臭素

亥歐辛。一爲硫酸亥歐辛。

【主治】止疹、利尿。不眠者服之。能安睡。

並有解抽之效。咳嗽、胃疼、孩童之

遺尿。此藥均能醫之。凡顛茄所治之症。此藥均能代之。

【用量】罌羊花酒 半至一錢、(二西西至四

西西)

罌羊花膏 二至十滴、(〇・一三至〇・

六)

【方處】罌羊花酒二錢(八西西)吐根酒一錢(

四西西)海葱酒二錢(八西西)水加至

六兩(二〇〇西西)

右一日三次、四日用完、食前服之、

(治一切咳嗽)

瀉藥類 *Cathartics*

凡藥能刺戟粘膜。催進腸之蠕動。能通瀉大便。逐腸內之容物者。統為之瀉藥。由其效

力大小。分輕瀉、重瀉二種、如輕瀉藥用大量、則其效等於重瀉。重瀉藥小量亦等於輕瀉。

第二章 輕瀉藥 *Aperients*

凡藥輕瀉而不猛烈者。即為之輕瀉藥。

蓖麻子油 *Oleum Ricini*

【性狀】此藥產於印度、美國、非洲、日本、中

國等處。入藥者乃該麻子榨出之油。

色黃白。略有氣味。為極厚之溶液。

【功效】令人瀉腹。因其有滑潤性。

【主治】便秘、痢疾、泄瀉、痲痛。此藥為平

和之瀉藥。與硫酸鎂相同。然其效力

較遲。如空心服硫苦。半至一時即顯

其效。而此油必經三四點鐘。方能見

泄。倘食敗肉腐果。與不消化之物。

以致胃中不安。此藥爲妙劑。若人誤

吞杏核。或金屬物品。以致腸胃受刺

戟。此藥有潤腸保護粘膜之力。較比

他類瀉藥爲妙。孩童之瀉症。或成人

痢疾。宜服此藥。瀉淨腸內之腐物後。

再用欬瀉劑。最爲有效。孕婦將產時。

服此能瀉出腸內之糞。以助分娩。習

常便秘。服之更效。

【用量】蓖麻子油 半至一兩、(一五·至三〇
西西)

【處方】蓖麻子油半兩(一五西西)

右一次服之、(治痢疾)

【又方】蓖麻子油半兩(一五西西)薄荷油二滴

(〇·一二)

右一次服之(治便秘)

大黃 *Rhei*

【性狀】此藥爲一種植物。產於中國、西藏、

俄國、美國等處。色橙黃。味苦略香。

酒水均能提出精力。

【功效】爲收斂性之瀉藥。故無重瀉之能。其

效能增膽液。故有瀉腹之效。

【主治】便秘、泄瀉、痢疾、胃弱、小兒吐瀉。

內服小量能止腸胃發酵。如泄瀉、痢

疾服之亦可。如便秘服此藥大量。經

五點鐘後。腹痛、雷鳴。即行下瀉。

但有一種斂性。先瀉而後便秘。如小

兒便秘。服他類藥。易成瀉症。此藥

有飲力。能免此患。

【用量】大黃散 健胃用一至五厘、(〇・〇六

至(〇・三)輕瀉用十至二十厘、(〇・六

至一・三)

大黃酒 半錢至二錢、(二西西至八西

西)

大黃雜散 健胃用十至十五厘、(〇・

六至一瓦) 輕瀉用二十至四十厘、(

一・三至二・六瓦)

大黃糖漿 成人服四錢、(一六西西)

小兒服一錢、(四西西)

【處方】大黃酒二錢 (八西西) 龍膽草酒二錢

(八西西) 加斯加拉流膏三錢 (一二

西西) 水加至六兩 (二〇〇西西)

右分六次服、一日三次、食前、(治
胃弱、胃痛、能輕瀉、)

【又方】大黃酒二錢 (八西西) 豆叩酒二錢 (八

西西) 水楊酸鈉一錢 (四瓦) 水加至六

兩 (二〇〇西西)

右一日三次、二日用完、食前服之、

(能消食、健胃)

甘草 *Glycyrrhiza*

【性狀】此藥產於歐洲、中國、滿洲等處。入

藥乃該草之根。色黃味甜。

【功效】此藥為潤性之調和藥。

【主治】有輕瀉之效。亦有化痰之功。常用為

佐藥。

【用量】甘草散 二錢、(八瓦) 至三錢、(一

二瓦)

甘草雜散 輕瀉用一至四錢、(四至

一六瓦)

甘草膏 五至一百二十厘、(〇·三至

八瓦)

蘆薈 Aloes 又名鹽礪

【性狀】此藥產於西洋巴貝豆、搜叩他二海島之中。入藥者乃該樹葉內之液。烘乾而成。色黑味苦。遇冷則硬。遇熱則化軟。

【功效】此藥敷舌上。苦味常存。有動膽之能。其效力行於大腸。能增腸內多生腸液之功。服藥後必過十二點鐘。方見瀉效。

【主治】健胃、便秘、調經。此藥無論新久之

大便乾燥。效力最顯。與鐵類藥同服。

可以調經。小分劑開胃。大分劑必重

瀉。瀉後即覺腹內墜脹。如身體虛弱、

及血虧、或大便秘結。以致經閉者。

此藥大有調經之效。

【用量】蘆薈酒 一錢至二錢、(四至八西西)

【處方】蘆薈酒二錢(八西西)水加至三兩(一

〇〇西西)

右分六次服之。一日三次、食後、

(婦人調經最效)

加斯加拉流膏 *Taxtrachum Cascari-*

ae Sagradae Liquidum 又名羊鼠

李流膏或加撒達流膏

【性狀】此藥是一種矮樹。產於美國舊金山等處。入藥乃該樹之皮。以酒製成流膏。

色黑味苦。

【功效】此藥為最良之輕瀉劑。久服無害。對於便秘之症為最效。

【主治】習常便秘。為緩和之輕瀉藥。如用中分量。無刺戟腸胃之患。腸胃無力、且有補助之功。故大便久燥。用此輕瀉為最妙之品。

【用量】加斯加拉流膏 半至一錢（二至四西西）

【處方】加斯加拉流膏三錢（一二西西）橙皮糖漿二錢（八西西）水加至六兩（二〇〇西西）

右分六次服之一日三次食前（治習常便秘）

甘汞 Calomel 又名錄氣弱鹽 加

路米 單綠汞 中名輕粉

【性狀】此藥由硫黃、與水銀、及食塩。用化學法製成。白色細末。體質頗重。畏光宜裝黃色瓶內。不易分解。而吸入甚速。

【功效】如敷粘膜或瘡面上。有腐蝕性。對於花柳、疳症、眼中鞏膜泡粒敷之。有刺戟、改化、生新之用。服大量則易重瀉。若與重碳酸鈉同服。其效尤速。

【主治】梅毒、便秘、痢疾、黃疸、胃腸炎、嘔吐、水腫、如須瀉下。可用五厘與

重碳酸鈉同服。因此藥至腸時。被腸內之鹼液化合。吸入極速。又治小兒梅毒亦效。再小兒常患腸胃氣脹。口出臭氣、大便味惡、其形如漿者。或赤痢等症。每半點鐘一次。每次一厘二十分之一。以四次為限。如患者服過碘類藥品。勿服此藥。因此藥遇碘質。即變水腫症。可單服之。若膽經有病。週身變黃。此藥亦效。其他大便乾燥、黃色淡黃、頭痛、口臭、厭食、舌有黃苔。宜服此藥。對於嬰兒之嘔乳。及成人之嘔吐。服此藥有平胃之功。

【用量】甘汞 二至五厘(〇・一二至〇・三)

【處方】甘汞二厘(〇・一二)乳糖十厘(〇・六)

右分六包、一日三次、(治小兒消

化不良)

【又方】甘汞五厘(〇・三)重碳酸鈉五厘(〇・

三)

右為一包、(治成人便秘)

【副作用】服用過量。口流涎沫。咽喉緊脹。

硫酸鎂

Magnes Sulphas 又名鎂黃

養 朴硝 硫苦 瀉利益 鎂硫

強礬

【性狀】此藥是一種泉水所製。今多由一種礦

物製成。白色結晶小粒。味鹹而苦。

水易溶解。

【功效】本藥為西醫通用之藥品。有下瀉之能。

其效有三。一、能吸收腸血管之滲液。

二、有激腸蠕動之效。三、本藥液在腸不易吸入。有此原因。故有瀉腹之效。

【主治】便秘、痢疾、腎炎、肋膜炎。服此藥有效。如患痢疾。先服此藥。後服斂藥爲宜。如大便乾燥。服此藥半兩。(一五瓦)有下瀉之功。

【外用】凡有發炎之處。紅腫高大。而皮未破者。用此藥製成熱溶液。用布蘸敷患處。有止疼之能。且有麻效。如學丸炎、神經痛、丹毒、新痺症敷之。俱有奇效。

【用量】硫酸鎂 半至一兩、(一五至三〇)

瓦)

【處方】硫酸鎂一兩(三〇瓦)大黃酒二錢(八西西) 橙皮糖漿三錢(一二西西) 水加至三兩(一〇〇西西)

右分三次服之、一日用完、食前、(治習常便秘)

【又方】硫酸鎂半兩(一五瓦) 龍膽草雜酒二錢(八西西) 水加至三兩(一〇〇西西)

右分三次用、一日用完、食前、(能開胃、輕瀉)

炭酸鎂 Magnesi Carb. 又名炭養鎂

煨製鎂 鎂炭強礬

【性狀】此藥以硫酸鎂、與重碳酸鎂製成。色

白細面。體質最輕。

【功效】能解酸、健胃、輕瀉。又爲工業製牙粉之原料。

【主治】健胃、輕瀉、與大黃末混合。用於小兒各種胃病。若胃存酸液而嘔吐者服之亦可。因此藥有改酸之力。

【用量】碳酸鎂 十至二十厘、(〇·六至一·三)

【處方】碳酸鎂一錢(四瓦) 硫酸鎂四錢(一六瓦) 薄荷水一錢(四西西) 水加至六兩(二〇〇西西)

右分六次服之、一日三次、食前、

(能解酸健胃)

軟胰 *Esopo Mollis* 又名軟蠟 加里石

西藥實驗大全·藥物學

鹼

【性狀】此藥性與普通胰子相同。惟軟如豬脂。質黏色黃。有一種氣味。

【功效】爲潤藥一種。

【主治】瀉藥、如大便燥結。以此藥二錢(八瓦) 加溫水一磅。射入肛門內。少時糞與藥水一同瀉出。因此藥有潤腸之功。

如肌板筋扭。常與烏頭、鴉片、顛茄等作成擦藥擦之。

【用量】軟胰 二錢(八瓦) 沸水一磅(五〇〇西西) 化勻洗大便。

【處方】烏頭酒二錢(八西西) 顛茄酒二錢(八西西) 鴉片酒二錢(八西西) 軟胰擦藥加至六兩(二〇〇西西)

右擦於患處、(如肌板筋扭、骨節疼痛等)

第三章 重瀉藥 Purges

凡藥能令大瀉如水。統爲之重瀉藥。

哥羅新 Colocynthis

【性狀】此藥產於西班牙、土耳其、法國等處。

入藥乃該瓜之瓤。

【功效】有瀉水之功。如用過量。必致腸胃發炎。故有重瀉之患。

【主治】便秘、本藥雖爲重瀉類。不可單用。如

與顛茄、馬前子、鬧羊花同服。爲最良之瀉藥。宜製成流膏或丸類。

【用量】哥羅新膏 二至五厘、(〇・一二至〇・

三)

哥羅新鬧羊花丸 每服一至二丸、

【處方】哥羅新膏二十厘(一・三)顛茄膏三厘(

〇・二)馬前子膏二厘(一・三)

右共作十丸、每服一丸、(輕瀉用)

渣笠 Jalapa 又名乍拉

【性狀】此藥產於北美洲、墨西哥。用藥乃該樹之根。製成細末。色淡黃。味香而

辣。

【功效】有激腸生液過多之能。故有重瀉之功用。

【主治】此藥爲瀉水之良藥。對於水腫、及血

液過多、或粘膜積血服之俱效。如與

大黃糖同服尤妙。如肝失功用。與甘

汞同服。若身體虛弱。不可服足分量。

恐腸胃受惹。

【用量】渣笠難散 十五至四十厘、(一至二)

·六)

巴豆油 Oleum Tiglii (Oleum Cro-

tonis)

【性狀】此藥產於印度、中國等處。入藥由其

子榨出之油。色黃味辣。

【功效】有刺戟腸中生液、發炎之力。敷於皮

上生泡。

【主治】內用作瀉水外用爲消炎劑。如神經痛、

便秘。用此油一滴。與洋橄欖油五滴。

置於舌上。過一點鐘即有水瀉之效。

如神經幹痛、氣管支炎。此藥與洋橄

欖油合劑。擦於患處。有散炎之功。

【用量】巴豆油 半至一滴(〇・〇三至〇・〇

六)

第四章 利尿藥 Diuretics

凡藥能擴張腎臟動脈。增加尿量。並能排出血內之雜質。令輸尿管通利者。皆謂之利尿藥。

布球 Buchu 又名布枯

【性狀】此藥產於阿非利加之好望角。係一種

植物。入藥用該草之葉。味苦而香。

酒·水均能提出藥力。

【功效】有激尿道粘膜之力。故爲利尿之用。

並能健胃。

【主治】利尿、凡腎炎、膀胱炎、一切淋症。用之

頗效。

【用量】布球酒 一至二錢(四至八西西)

布球冲藥 一至二兩(三〇至六〇西

西)

【處方】布球酒三錢(一二西西) 罈羊花酒二錢

(八西西) 哥拜把油一錢(四西西) 水加

至六兩(二〇〇西西)

右分六次用之、一日三次、食前、

(利水止淋)

【又方】布球酒三錢(一二西西) 烏羅透品一錢

(四西西) 罈羊花酒一錢(四西西) 檸檬

鉀一錢(四瓦) 水加至六兩(二〇〇西

西)

右分六次用之、一日三次、食前、

(治淋症利尿)

烏羅透品 Urotropin 一名猶羅妥品

【性狀】此藥乃由純鏷與猗毛。用化學之法相

合而成。白色透光。呈小顆粒。味鹹

而暖。略苦。水·酒·伊打均能溶化。

【功效】爲利尿之佳品。能滅尿道及膀胱之菌。

【主治】有利尿、殺菌之力、如尿酸含膿、膀

胱發炎、及各種淋症。均有特效。

【用量】烏羅透品 五至十厘(〇·三至〇·六)

【處方】烏羅透品二錢(八瓦) 檸檬鉀二錢(八

瓦) 罈羊花酒一錢(四西西) 罈茄酒一

錢(四西西) 水加至六兩(二〇〇西

西)

右分六次用之、一日三次、食前、

(治急性淋症)

【又方】烏羅透品二錢(八瓦) 哥拜把油一錢(

四西西) 布球酒二錢(八西西) 水加至六兩(二〇〇西西)

右一日三次、二日份、食前、(治淋症)

甜硝伊打酒 *Spiritus Aëlis Nitrosi*

又名亞硝酸伊的兒精

【性狀】此藥由濃硝酸、與濃硫酸、酒精、及銅。用化學法製成。白色、味香而甜。如伊打之氣味。遇火即燃。極易飛散。若試此藥之力是否存在。可以此藥半兩加安提排林二厘。先變紫色。後有綠色沉澱。

【功效】爲發表、利尿之良藥。多服皮變紫色。
【主治】利水、發表、止嗽、各種水臌症、及

小便不利。服此有利尿之功。故能治痰腫。凡小兒腦經受惹而發熱者。服之有發表退熱之力。

【用量】甜硝伊打酒 二十至六十滴、(一・三至四西西) 一歲小兒、五至十滴、(〇・三至〇・六)

【處方】甜硝伊打酒二錢(八西西) 海葱酒二錢(八西西) 毛地黃酒一錢(四西西) 水加至六兩(二〇〇西西)

右分六次用之、一日三次、食前、(能利水、消腫)

【又方】甜硝伊打酒一錢(四西西) 鹽酸規尼三厘(〇・二) 吐根酒半錢(二西西) 水加至二兩(六〇西西)

右一日三次、二日服完、治小兒痘疹、咳嗽、能發表)

華澄茄 *Cubebae*

【性狀】此藥產於加拉巴海島、及中國廣東等處。爲植物蔓生之一種。入藥用該草所生之菓。於未熟時摘下。剝皮晒乾。色黑無毒。

【功效】能殺菌刺戟粘膜。服過量則食道與尿道。必有發炎之患。

【主治】氣管炎、膀胱炎、慢性淋症、白帶等症。服之均有良效。且能殺菌。

【用量】華澄茄散 十至六十厘 (〇.六至四瓦)

白檀油 *Oleum Santali* 又名檀香油

【性狀】此藥產於印度著名檀香。用化學蒸出其油。色黃濃厚。味苦辣而香。凡各種化粧品。均用此藥作爲香料。

【功效】有激刺粘膜復原之力。服過量陰陽尿經受惹。並有腎炎、尿血之患。

【主治】凡急慢性淋症、及膀胱炎。此藥有殺菌之力。咳嗽亦效。

【用量】白檀油 五至十滴、(〇.三至〇.六)

【處方】白檀油半錢(二西西)烏羅透品一錢半(六西西)關羊花酒一錢(四西西)檸檬酸鉀一錢(四瓦)水加至六兩(二〇〇西西)

右每日三次、二日用完、食前服之、(治急性淋症)

哥拜把油 Oleum Copraibae

【性狀】此藥產於印度、巴西等處。爲一種樹脂。色淺黃。味辣。另有一種氣味。內含一油。名哥拜把油。爲西醫常用之品。

【功效】有激陰陽尿道結膜之力。故用於白濁、白帶等症。均有良效。

【主治】淋症、白帶。能化痰。凡腎炎、膀胱炎、急慢淋症、疥癬。均能醫之。因有利尿之功。如服過量。週身必發紅點。遇此狀時。止服即愈。

【用量】哥拜把油 十至十五滴、(〇·六至一西西)

松節油 Oleum Terebintinae

【性狀】此藥產於美國、法國、中國等處。由

松樹子內。用化學法而蒸出。爲無色之流質。味辣而苦。遇火則燃。遇空氣則易散。酒精、伊打、哥羅芳均能化之。

【功效】內服能祛風、祛痰、殺菌、利水。若服過量。能致腎炎、尿血、皮紫、腸胃發炎、瞳人散大。此藥由腎祛離。故服之者。尿內必含香味。外用亦能殺菌。如敷於皮膚。有刺戟之能。該處發紅而熱。

【主治】利尿、殺虫、祛痰、解筋抽。對於便血、尿血、婦人經旺。將此油製成藥勻服之。如慢性腎炎亦效。如須利尿。必與他種利尿藥同服方可。否則有尿

閉之患。腎炎、腸胃炎。均不可用。

腸熱症、腸瘍。內服或外敷均效。外

用如兒童氣管炎、咳嗽。以此油與洋橄

欖油各等分。搓其胸部。如胃腸氣脹、

腸瘍、腹痛、腸熱症。用此油製成熱

袱。敷於腹上。其敷法。先以手巾或

絨布。蘸沸水內擰乾後。再蘸藥內擰

乾。乘熱敷之。如熱太甚。不能忍受。

即行揭去。以防起泡。如節扭、筋抽、

關節痛。用此油製成擦藥。搓於患處

最效。

【用量】松節油 五至十五滴、(〇·三至二西

西)

【處方】松節油二十滴(一·三)

右作三次服之、(治腸胃氣脹)

醋酸鉀 *Potium Acetas* 又名醋酸鉍

【性狀】此藥自鉀·炭·養與濃醋酸。用化學法

製成。白色小粒。味鹹而平。遇空氣

即化。

【功效】服此藥多生膽液。能輕瀉。且有利尿

之功。

【主治】利尿。解酸、輕瀉。凡因腎病所得之

水腫。或尿內含酸。此藥有解酸之力。

凡一切膀胱腫病。此藥均有特效。然使

為瀉藥。不如他藥為善。

【用量】醋酸鉀 十至二十厘、(〇·六至一·

三)

【處方】醋酸鉀三錢(一二瓦) 毛地黃酒一錢

(四西西)水加至六兩(二〇〇西西)

右分六次用之、一日三次、食前、

(治膀胱水腫)

加非印 *Caffeina* 又名咖啡

【性狀】此藥產於南洋、及印度海島。入藥乃

取其精華而製出之。色白柔軟細長。

針形如絲。味苦。水易化之。

【功效】有激心、激腦、激呼吸之功。並助心

思之敏捷。能令腎微管舒鬆。有利尿

之功。其效在腎球易顯。

【主治】尿閉、心臟衰弱、神經衰弱、頭痛均

效。對於心或腎臟有病之水腫。服之

亦宜。因其能利水。急性腎炎不可服

之。如腦力過用之頭痛。與安提排林、

同氯化鉀服之大效。如有人吞服鴉片

中毒。連服此藥。有興奮神經、減輕

熱度之能。

【用量】加非印 一至五厘、(〇・〇六至〇・

三)

檸檬酸加非 二至十厘、(〇・一二至〇・

六)

【處方】加非印六厘(〇・四)氯化鈉十厘(〇・

六)安提排林十厘(〇・六)

右分三包、一日三次分服、食前、

(治頭痛、頭暈)

【副作用】如用過量。有不寐、心跳、耳鳴、

尿閉等狀。當止而不服。

檸檬酸鈉 *Natrium Citras*

【性狀】此藥以檸檬酸與碳酸鈣。用化學法製成。

白色如沙粒。味鹹而苦。涼水易溶。

遇空氣即變為細末。

【功效】有激腎之功。為利尿之良藥。

【主治】能利尿、解熱。如淋症、或小便不利、

及尿酸等症均效。如成人或孩童。有

胃病服牛乳不易消化者。加此藥少許

於其內。易於消化。

【用量】檸檬鈣 十至二十厘(○·六至一·三)

【處方】檸檬鈣二錢(八瓦) 烏羅透品一錢(

四瓦) 布球水半兩(一五西西) 開羊

花酒一錢(四西西) 水加至六兩(二〇

○西西)

右分六次用、一日三次、食前、(治

淋症利尿)

檸檬鉀 *Kalium Citras* 又名欒檸檬

【性狀】此藥以檸檬酸與碳酸鉀。用化學法製成。

白色結晶。形如沙粒。味鹹。見空氣

易潮。

【功效】為利尿之藥。

【主治】能利尿、退熱解酸。如關節痛、淋症、

以及尿中含有酸性。此藥有利尿解酸

之效。發熱服之。能解熱。對於關節

痛症。亦有卓效。

【用量】檸檬鉀 十至二十厘、(○·六至一·

三)

【處方】檸檬鉀二錢(八瓦) 布球酒三錢(一

二西西) 撒婁一錢(四瓦) 甜硝伊打

酒二錢(八西西)哥拜把油一錢(四西

西)水加至六兩(二〇〇西西)

右分十二次用之、一日三次、食前、

(治淋症、止疼、利水)

氫酸鉀 *Kali Chloras* 又**氫強鉀**

鹽劑 氫氣鹽

【性狀】此藥由碳酸鉀、石灰、錘、與鹽酸。

以化學法製成。色白結晶。亦有粉末

者。性如火硝。味鹹而涼。

【功效】雖爲利尿之藥。多不常用。常作咽喉、

口內漱藥。如於皿內研之。不可與過

錳酸鉀、及硫磺混合。若合研之。必

成炸藥。

【主治】利尿、於咽喉炎、口白瘍用之。作爲漱

藥。能殺菌、防臭、消炎。

【用量】氫酸鉀 十至二十厘、(〇・六至

一・三)

【處方】氫酸鉀二錢(八瓦)水加六兩(二〇〇

西西)

右爲漱藥、(咽喉炎、口白瘍用之)

米替連藍 *Methylthymine Chlori-*

bium

【性狀】此藥是綠色結晶之砂粒。酒・水均能

化之。

【功效】由腎却散。故尿多變藍色。

【主治】利尿、如瘴熱症。服他藥無效者。或不

能服金鷄納霜者。服之有效。小兒服

之亦可。但必發作前七點鐘或十點鐘

服之。各種淋症。此為特效藥。

【用量】米替連藍 二至四厘、(〇・一二至〇・

三)

【處方】米替連藍二厘(〇・一二)檀香油二滴(

〇・一二)哥拜把油二滴(〇・一二)肉

桂油二滴(〇・〇六)

右方裝於膠囊一枚內、空腹服之、

(治淋症)

如試人之腎臟功用。障礙與否。以此

藥一厘。加水十滴。製成藥水。注射

肌內。如無障礙。待十五分至三十分

鐘。必有藍色之尿發見。至三十六點。

始能去淨。否者為腎臟障礙之徵。

【副作用】服過量。必顯惡心、頭暈、尿道淋

滴。與豆叩散同服。則少見此副作用。

第五章 退熱藥 Antipyretics

凡藥能阻司溫中樞。少生熱力。加增皮膚放

溫之能。使之減退身熱。或發汗、利水。如

顯發疹。能令早日自皮膚透出。此種藥類。

皆為之退熱藥。

阿斯必林 *Aspirin* 又名阿匹林 醋

柳酸

【性狀】此藥以醋酸與水楊酸。用化學法製成。

白色呈針形之粉末。味酸而澀。水・酒・

哥羅芳・伊打。均能溶化。

【功效】在胃無效。至腸遇鹼性腸液。則緩緩

吸入。始生退熱之力。服時必多喝熱

水送下。否則必致腹痛。

【主治】退熱、止痛。凡一切熱症。均可用之。

如急性關節炎、各種風濕骨痛、肌肉疼痛。及一切流行性感胃、各種氣管炎、咳嗽。以及神經痛、頭痛、乳痛、時疫發熱。以上各症。均可用之。

【用量】阿斯必林 五至十五厘、(〇・三至一

瓦)

【處方】阿斯必林五厘、(〇・三)非那昔廷五

厘(〇・三)加非印三厘(〇・二)

右作一包、白水送下、(治感冒、

風寒、頭痛)

安提排林 Antipyrin 又名安知必林

【性狀】此藥由金雞納樹皮製成金納林。由金納林又提出此藥。近來用煤譜。依化學

法製成白色結晶之粉末。或為稜形之結晶。味苦。水、酒均可溶解。

【功效】服之能減少身體之熱度。如服過量。

自覺頭痛、耳鳴、惡心、嘔吐、唇

甲略變紫色、脈搏減少。初覺寒冷。

後則全身生汗。如以大量與禽獸服之。

全身肌力鬆懈。反應之力消失。若灌

以毒量。則必顯抽狀。敷於粘膜之上。

必顯應效。其效可存多日。

【主治】退熱、止痛。為最效之藥。如猩紅熱、

痘瘡、咳嗽、肺癆、傷寒症、痢症多

用之。又關節痛、頭痛、偏頭痛、月

經困難、不眠等症亦宜。外用與印卡

印同用。均有止血、止痛之功。

【用量】安提排林 二至十厘、(〇・一二至〇・

六)

【處方】安提排林五厘(〇・三)加非印五厘(

〇・三)非那昔廷四厘(〇・二四)

右爲一包、白水送下、治頭痛、退

熱)

【不符之藥】甘汞、甜硝伊打酒、水楊酸鈉、

哥拉、石炭酸。均不相宜。如和甜硝伊

打酒內。初變藍色。後有深綠色沉澱。

故不可用。如不變色。又可查知甜硝

伊打酒藥力已失。

非那昔廷 Phenacetinum 又名芬阿

錫吞 非那壽金

【性狀】此藥由煤瀝用化學法製成。呈白色帶

光之鱗片結晶。水・酒・甘油均能溶化。

此藥不純者服後。腎經必受暴力。並

顯他種副作用。藥行因其價昂。多以

安提排林或阿西炭尼力僞充。欲知此

藥真假。可將濃硝酸加此藥內。待變

黃色之時。置火上熱之。其色不改者

乃爲真藥。又法。先以哥拉五厘。置

試筒內。以火烤之。至化開爲止。再

加此藥一厘。如係純者先呈紫色。後

變紅色。再變藍色。若無此三樣變化。

則不可用。

【功效】能平腦司溫中樞。有退熱之效。如服

過量。血色變黑。尿色深黃。若驗此

尿。似有含糖之狀。

【主治】退熱、止疼。凡各種熱病、過身發燒、肺癆、傷寒。服此藥均有退熱之效。

服後過三十分鐘。其效即顯。藥力能存八點鐘之久。惟無生汗過多之弊。如偏頭痛、神經痛、及風濕骨疼、腰疼、均有效力。故爲止疼之良藥。

【用量】非那昔廷 五至十厘(○·三至○·六)

【處方】非那昔廷十厘(○·六)加非印十厘(○·六)

○·六)氯化鉀十厘(○·六)

右方分三包、一日用完、(治頭疼、神經痛)

阿西炭尼力 *Acetanilidum* 又名亞

西炭尼力 退熱冰 安知歇貌林

【性狀】此藥由冰醋酸與安尼林。用化學法製

成白色結晶。形如沙粒。味酸。水略溶化。酒精、伊打最易溶之。

【功效】退熱、較安提排林約強四倍。服過量身麻木。呼吸速而短。致腦神經衰弱而亡。

【主治】退熱、止痛。惟對於傷寒、肺癆。有

退熱之效。而無醫治之能、如神經痛、關節痛、胃痛、頭痛、肌痺症服之。

止疼、退熱。如用藥嘔吐。每三十分鐘服一厘至六厘有效。又用於外科之潰瘍。與硼酸末各等分敷之有效。

【用量】阿西炭尼力 二至十厘(○·一二至

○·六)

【處方】阿西炭尼力五厘(○·三)白糖酌用

右爲一包服之、治傷寒、關節痛症、

【副作用】服過量。唇青、面紫、額頰生汗。

後則全身生汗。脈細。呼吸短促。其

解法。服顛茄、士的年等強心藥。

水楊酸 *Acidum Salicylicum* 又名沙

利先酸 柳酸 撒里夫爾酸

【性狀】此藥由石炭酸、與氯化炭、銻、或冬

綠油。用化學法製成。亦有自柳樹皮

製出者。白色如針形之絲。味酸而苦。

酒精易溶化。水不能化。

【功效】服多。使人耳鳴、抽搐、胃炎等狀。

其大用爲退熱、止疼、殺菌、免腐。

【主治】退熱、止疼、止癢、殺菌、免腐。其

退熱之效。惟不如鹽酸規尼之偉。然

對於肺癆、肺炎、肋膜炎、腸熱症、

疹熱症。均可用之。如風濕、關節痛。

與重碳酸銲同服有效。腰痛、神經痛、

頭痛。有祛風止疼之功。用於各種皮

癢之症。如陰門癢、肛門癢、腳氣、

各類癬症。將此藥製成膏或水或散敷

之。如手臉瘡症。足生臭汗、潰瘍、

燙傷。用此水或膏敷之。有免腐殺菌

之效。市上所售之花露水、腳氣水、

癬治水。均用此藥爲主要之原料。與

酒精合成。

【用量】水楊酸 五至十厘、(○·三至○·五)

【處方】水楊酸 澱粉 各等分

右研細、(如濕疹、足生臭汗、脚氣

最效、

【又方】水楊酸三十厘(二瓦)酒精三兩(一〇〇西西)

〇西西)

右化之、(治脚氣、疥瘡、癬症、或

皮癢症)

水楊酸鈉

Natrium Salicylas 又名

沙力先靈

沙里失爾酸那篤留謨

沙里失爾酸曹達

水楊酸曹達 鈉

柳蓉 楊曹

【性狀】此藥由重碳酸鈉、與水楊酸。用化學

法製成。白色細末。亦有魚鱗狀者味

甜而鹹。略辣。水、酒均能溶化。

【功效】多服。使人耳鳴抽搐。但無惹胃之力。

爲退熱之良藥。

【主治】退熱、止疼。如腸胃炎、肺炎、關節

疼痛、流行性感胃、風寒、頭痛。有

退熱、止疼、發汗之效。

【用量】水楊酸鈉 五至十厘(〇·三至〇·六)

【處方】水楊酸鈉二錢(八瓦)鉍化鉀一錢(四

瓦)橙皮酒一錢(四西西)水加六兩(二

〇〇西西)

右分十二次用之、一日三次、食前

(治風濕關節痛)

【又方】水楊酸鈉五厘(〇·三)重碳酸鈉五厘

(〇·三)次硝酸鈹五厘(〇·三)

右方爲一包、自水服之、(治胃痛、消

化不良)

硫酸規尼 *Quinine Sulphas* 一名

貴林硫強礬 硫酸金雞納

【性狀】此藥產於南美洲。爲一種金雞納樹。今南洋印度羣島多種之。該樹計有三十種。內中含金雞納者只有數種。入藥用該樹之皮。以化學法製成。用硫酸製者爲硫酸規尼。(即硫酸金雞納)用鹽酸製者爲鹽酸規尼。(即鹽酸金雞納)此二種均白色如針。形如絲。味極苦。

【功效】如服過量。則有耳鳴、耳聾、頭痛、頭暈之狀。連服不止。腦部必有積血之患。靈性失功。對於熱症。則有退熱之功。服小分量則有補效。如中分量。紅血球必多增加。如腫起時。服

足分量。可免白血球穿毛吸管。而阻止生膿之患。此藥過胃中。由小腸能吸入。因小腸爲鹼液之故也。

【主治】退熱、滋補、解瘧。如傷寒、瘧疾、肺癆、肋膜炎。及其他熱症。均有效力。惟瘧疾其效最顯。因此藥在血內。能滅殺瘧疾病原菌。惟惡性瘧疾不能醫之。如治瘧疾。必連服數日方可。否則因瘧疾原虫。潛伏身內一處。藥力輕微。不能盡數掃除。急易復發。近來多用六零六注射。百試百驗。必在發作前二點鐘注射方可。用於貧血、虛弱、萎黃病。亦有補效。如難產服之。有增助子宮之力。孕婦忌用可免

小產。痢疾以此藥水灌腸亦可。

【用量】硫酸規尼 二至十厘、(〇·一二至

〇·一六)

【處方】硫酸規尼三十厘(二瓦)

右作三包、每日一包、(治瘧疾)

【又方】硫酸規尼十五厘(一瓦)加水九兩(三

〇〇西西)

右灌腸、(治痢疾)須用沸水製者、

【忌用】胃炎、中耳炎、腦膜炎。均不可用。

撒婁 *Solium* 又名撒魯兒

【性狀】此藥由水楊酸、與鏷、磷藥類。用化學

法製出。呈白色結晶。如砂粒。味鹹。

聞之畧香。水不溶解。酒能溶之。

【功效】有退熱之效。除發汗外。不起副作用。

如熱度上升服之。能令溫熱下降。

【主治】能退熱、利尿、止疼、殺菌。凡各種熱

症。均有減退之效。如膀胱炎、腎炎、

淋症均有利尿之用。對於急性關節炎。

有解熱、止疼、消炎、祛腫之能。如

筋痺症、喉炎、神經痛均效。又可免

大腸之醱酵。且能殺菌。

【用量】撒婁 五至七厘(〇·三至〇·四二)

【處方】撒婁一錢(四瓦) 次硝酸鏷二錢(八

瓦)水加至三兩(一〇〇西西)

右分六次用、一日三次、食後服之、

(治霍亂)

【又方】撒婁一錢(四瓦)開羊花酒一錢(四西

西)布球酒二錢(八西西)水加至六

兩(二〇〇西西)

右分六次用、一日三次、食前服之、

(治淋症、利水、殺菌)

第六章 收斂藥 *Astringents*

此類藥能令血管收縮。而止出血。使組織粘膜收縮之力堅強。且能減少或阻止腺之分泌作用。能使胃液減少。蠕動遲慢。而顯大便秘結。故有止瀉作用。如以淡薄溶液。敷於粘膜表面。則使小血管收縮。而現蒼白色之狀。如濃厚溶液敷之。使組織液。甚至潰爛。故淡薄溶液有收斂之效。濃溶液有腐蝕之功。

佳奴 *Kino*

【性状】此藥產於印度、及非洲等處生產之樹。

橫割其皮。流出之液。晒乾而成。黑

色有光。形如小塊。易碎無味而澆。

含之令涎變紅。

【功效】內含炭尼酸。服之能使粘膜收縮。腸

胃液變稠。故有收斂止瀉之功。如敷

於粘膜。令血管收縮。故能止血。

【主治】止瀉、止血。用於咽喉病作成漱藥。

【用量】佳奴酒 二錢(八西西)

佳奴雜散 五至十厘、(〇・三至〇・

六)

【處方】佳奴雜散三十厘(二瓦)

右作三包、一日服完、食前用、(治

水瀉)

炭尼酸 *Acidum Tannicum* 又名炭

匿酸 鞣酸 單寧酸

【性狀】此藥自沒石子用化學法製成。色淡黃。形如鱗片。易於粉碎。味酸而澀。甘油·水均能化之。

【功效】敷於粘膜及組織。該處血管縮小。呈收斂狀。血必減少。因有阻止生液之能。服藥後必變加澀酸而吸入。如遇出血之病。用此藥如用加澀酸。因其味入甚遲故也。

【主治】收斂、止血。用於各種痢疾。水瀉、慢性腸胃炎、慢性腎炎、咳血、吐血、或發汗過多。均可用為收斂之藥。痔瘡流血。用此藥製成肛彈。插入肛內。婦人白帶。製成溶液洗之。如癩瘡、及初產之乳頭痛、或凍傷。作膏敷之。

均可。

【用量】炭尼酸 二至十厘、(〇·一二至〇·六)

【處方】炭尼酸一錢(四瓦) 甘油一錢(四西西)

右用火化勻、(治膿漏耳)

【又方】炭尼酸三十厘(二瓦) 甘油七滴(〇·二四)

右作一丸、插入陰道、(治血崩)

【又方】炭尼酸三十厘(二瓦) 鴉片散三厘(〇·一八) 白糖三十厘(二瓦)

右分六包、一日三次、食前、(治咳血、吐血、尿血甚效)

兒茶 (Catechu 又名阿仙)

【性狀】此藥產於緬甸、印度、新加坡等處。

入藥乃該樹之枝葉。泡水濃煎晒乾而成。色深紅。味苦而澀。酒·水均能溶化。

【功效】能令粘膜收縮。阻止生液。服數均有

收斂之效。

【主治】收斂用於各種水泄痢疾。先服硫酸鎂、或蓖麻子油瀉之。後服此藥方可。如胃弱、膨脹、流血等症。服之亦效。

又喉痛、口炎、齧鬆等。常用以漱口。

【用量】兒茶散 十至三十厘（〇·六至二瓦）

兒茶雜散 二十至四十厘、（一·三至

二·六）

兒茶酒 半至一錢、（二至四西西）

【處方】兒茶酒二錢（八西西）龍膽草酒二錢（

八西西）次硝酸銀一錢（四瓦）水加至三兩（一〇〇西西）

右分六次用之、一日三次、食後、

（治腹瀉、及消化不良）

明礬 Alumen 又名礬白礬 白礬

【性狀】此藥產於中國。自礬石煉成白色透光之塊。味甜而澀。略酸。酒·甘油均易化之。

【功效】敷於粘膜上。色白有縮力。敷於皮上漸厚而硬。使傷處縮緊。故有止血之能。

【主治】能催吐、收斂。用於喉炎、扁桃腺炎、白帶、淋症、血崩、痢疾、鼻衄、子

宮出血、結合膜炎。製成水劑洗之。

如陰門作癢、凍瘡。用此藥十至二十厘。加水一兩洗之。中鉛毒服之有效。

用爲吐藥。小兒服一錢(四瓦)成人服

四錢(一六瓦)

【用量】明礬 十至二十厘(〇·六至一·三)

【處方】明礬三厘(〇·二)水加一兩(三〇西

西)

右化勻、(洗膿瘡、火眼)

【又方】明礬一錢(四瓦)水加二十兩(六六〇

西西)

右化勻(洗淋症、白帶)

硫酸鋅 *Zinc Sulphas* 又名錐黃養

錐硫強礬 硫酸亞鉛

西藥實驗大全 藥物學

【性狀】以錐(即亞鉛)與硫酸。用化學法製成、

白色結晶之小粒。味惡而澀。在乾燥

氣中漸變爲粉末。水易溶之。

【功效】外用敷於粘膜。能令該處收縮。內服

能激胃之神經。令人作吐。並有殺菌

之力。濃厚之溶液。有腐蝕性。

【主治】收斂催吐。一切淋症、白帶。作爲洗

藥。各種眼炎。與硼酸合用洗之亦可。

如服毒物。服此藥能催吐。

【用量】硫酸鋅 一至三厘(〇·〇六至〇·二)

【處方】硫酸鋅五厘(〇·三)硼酸一錢(四瓦)

水加六兩(二〇〇西西)

右化勻(洗火眼)

【又方】硫酸鋅二厘(〇·一二)兒茶酒十滴)

五三

○·六)水加一兩(三〇西西)

右化勻(洗淋症、白帶)

亞鉛華 *Zinci Oxidum* 又名錐靈

錐靈 酸化亞鉛 氯化錐

【性狀】此藥由炭酸錐與濃硫酸。用化學製成

白色之細末。無味。水、酒均易溶解。

【功效】爲阻止腺組織生液之要藥。內服外敷。

均有收斂之性。

【主治】瀉下、消腫、解抽、祛濕。對於各種

潰瘡、黃水瘡。作膏或散敷之。能免

腐、祛濕。凡出水之瘡。均可用之。

又小兒水瀉。與鈹類、百布聖同服有

效。癆症之盜汗。亦有用者。如炎腫

之症。以水混合外敷之。功能消腫。

癩症服之甚少。乾皮症忌用。

【用量】亞鉛華 二至十厘、(〇·一二至〇·

六)

【處方】亞鉛華二錢(八瓦)花士林八錢(三二

瓦)

右作膏敷之、(治黃水瘡、各種皮濕

之症)

【又方】亞鉛華一厘(〇·〇六)次硝酸鈹半厘

(〇·〇三)百布聖半厘(〇·〇三)

右爲一包、(治小兒腹瀉)

硫酸銅 *Cupri Sulphas* 又名鑽強銅

藍礬 銅鑽養 銅硫強礬

【性狀】此藥由銅片與硫酸。用化學法。製成

藍色結晶之塊。味澀而烈。見空氣發

潮。體質變爲細末。水易溶解。

【功效】敷於瘡口。有腐蝕之功。敷於粘膜。

有收斂之效。如服過量。至一點鐘。

胃則作燒而痛。口有銅味。後則嘔吐。

所吐者均是藍色之粘沫。遂致腸內發

炎而水瀉。瀉出之物。除糞便之外餘皆

血與粘沫。及至週身抽搐。口中流涎、

呼吸停止而亡。如解此毒。先服洋椒

欖油。與生鷄蛋白。後用吐藥或洗胃

均可。

【主治】催吐、收斂。因本藥與血及漿液化合

之性甚強。故以淡薄溶液。敷於破處。

血液均能凝結。用以洗淋症、慢性膀

胱炎均可。各種慢性頑瘍、及惡性潰

瘡、眼中障翳、結合膜粒炎。用此製

成濃溶液點之。除腐蝕外。並有去淨

膜之功。如中磷毒。此爲解毒良藥。

育道生瘍或痢疾。與鴉片服之有效。

【用量】硫酸銅 普通用一厘四分之一至一厘、

作吐用五至七厘、(〇・三至〇・四二)

【處方】硫酸銅二厘(〇・一二)水加一兩(三

〇西西)

右化勻、(洗火眼)

【又方】硫酸銅四厘(〇・二四)水加一兩(三〇

西西)

右化勻、(洗白帶淋症)

【又方】硫酸銅十五厘(一瓦)水加至一兩(三

〇西西)

右敷於瘡面、有腐蝕性、

醋酸鉛 Plumbi Acetas 又名鉛醋礬

鉛霜 鉛糖

【性狀】此藥由密陀僧與濃醋酸。用化學法。

製成白色結晶之塊。味甜而澇。略有醋酸之味。水易溶解。

【功效】有收縮血管、及阻止組織液之用。

並且阻止化膿。為消腫散炎之良藥。

【主治】止血、收斂、消腫。用於咳嗽、吐血、瀉血。製成丸藥服之。有收縮小血管之功用。淋症、白帶、膀胱炎。用此藥一至七厘。水一兩化勻洗之。如被漆咬者。用此藥加酒精化勻洗之。因此藥有敵漆毒之效力。筋扭、跌撲、

舉丸炎。此藥與鴉片酒合勻。以手巾

蘸敷患處。能消腫止痛。可免生膿。

如傷處已破。則不可用。恐藥力吸入。

而中鉛毒。

【用量】醋酸鉛 半至一厘、(〇・〇三至〇・

〇六)

【處方】醋酸鉛一錢(四瓦)鴉片酒二錢(八西

西)水加至六兩(二〇〇西)

右化勻、以手巾蘸藥水敷患處、(治

跌打損傷、筋扭、節腫、膿瘡、翠

丸炎均效)

【又方】鉛霜鴉片丸三至五厘(〇・二至〇・三)

右一日三次、(治咳血、吐血、瀉血

甚效)

次硝酸鋁 *Bismuthi Subnitricum* 又

名下硝酸強鋁 鋁養液養五 鋁氫下

礬 次硝酸蒼鉛

【性狀】此藥由煉鋁與硝酸。用化學製成。色

白體重之粉末。水不易化。

【功效】爲收斂性最良之藥。無論服敷。均有

保護粘膜之力。並阻止外來之毒菌及

刺戟。服藥後大便必黑。

【主治】止痢、止瀉、止吐、健胃、止痛。如

痢疾、腹瀉。服之能防腐。減少腸管

之刺戟。並能阻止生液過多、酸酵之

患。如胃炎所生之嘔吐。此能避避患

處。免去局部刺戟而止嘔吐。如胃酸

積聚作痛。有收斂、止疼、消炎之功。

用於外科之膿瘡、漏瘡。與黃礬、巴拉

粉作一種射藥。由瘡口注入患處有效。

【用量】次硝酸鋁 五至十厘(〇·三至〇·六)

【處方】次硝酸鋁半錢(二瓦)重碳酸鉛半錢(

二瓦)水楊酸鉛半錢(二瓦)大黃末半

錢(二瓦)

右方分六包、每次一包、一日三次、

食前服之、(治嘔吐、噎膈、吐酸水

疼痛水瀉、痢疾、消化不良等症、)

次沒石子酸鋁 *Bismuthi Subsalis*

又名鋁加泐下礬

【性狀】此藥以純鋁與加泐酸。用化學法。製

成淡黃色之細末。水不溶解。

【功效】與次硝酸鋁同。但殺菌、防腐、祛濕

之力。較次硝酸銹爲大。故可代黃礬之用。而且價廉。市上所售之偽黃礬。多據此藥。

【主治】有收斂性。如敷各種瘡口。使之收口最速。如與氯化銻澱粉合之。上各種膿瘡。頗有收斂之力。內服之時甚少。

【處方】次沒石子酸銹二錢(八瓦) 氯化銻半錢(二瓦) 澱粉二錢(八瓦) 硼酸一錢(四瓦)

右共合一處研之(上各種瘡症)

次水楊酸銹 *Bismuthi Subsalicylas*

又名銹柳攀

【性狀】此藥由水楊酸與銹粉。用化學法製成。色白微黃最輕之末。無臭無味。水不

易溶解。

【功效】與次硝酸銹同。但至腸內。則將水楊酸排出。故防腐之力甚強。如腸內發酵。用之有效。

【主治】健胃、止瀉、免腐、殺菌。用於腸胃各病。如瀉痢、膨悶、吞酸、不消化等症。用之最效。因至腸之時。有殺菌、免腐、收斂之用。

【用量】次硝酸銹 五至十五厘、(〇.三至一瓦)

【處方】次硝酸銹半錢(二瓦) 重碳酸銹半錢(二瓦) 百布聖二十厘(一.三) 龍膽末二十厘(一.三)

右分爲三包、每次一包、一日三次、

食後用之、(治瀉痢、消化不良、吞酸等症、)

硝酸銀

Argentii Nitras 又名銀丹

銀淡養二 銀氫強礬

【性狀】此藥以足紋銀與硝酸。用化學法。製成白色透光之塊。味苦而澇。水、酒均能溶化。

【功效】敷於皮上。見光先發櫻色。復變黑色。其效力頗強。有收斂血管、減少津液、防腐、殺菌、腐蝕之效。

【主治】內用、如胃瘍、腸瘍、肛門瘍、慢性痢疾、脊髓癆。服之均可。外用、於淋症。膀胱炎、子宮頸瘍、白帶。用此藥半厘。加水三兩化勻。射入尿道有效。

如痘、瘡、(天花作膿時)用此藥五至十厘。加水一兩化勻。以針蘸此水將痘挑破。可免成痕之醜。咽喉炎、口炎、舌炎。用此藥五厘。加水一兩擦之最效。如皰丸炎、指關節炎、皮炎。敷此藥均能止疼消腫。陰、門、癢、用此藥四至六厘。加水一兩化勻。刷三四次有效。如臥、瘡、將起皮紅時。用此藥二十厘。加水一兩擦患處。可免發炎。如節、瘡、初起。頂有膿泡。週圍發硬。可用藥五厘。水一錢敷之。可免生膿。結、合、膜、粒、炎、用藥十厘。水一兩擦之有效。如以濃藥水敷於潰瘍。有免腐之性。

【用量】硝酸銀 一厘六分之一、至二分之一

厘、(〇.〇一 至 〇.〇三)

【處方】硝酸銀五厘(〇.三) 水六兩(二〇〇

西西)

右化勻、(腸瘍、痢疾等、用以灌

腸)

【中毒】服過量。先覺腸胃痛。後即吐瀉。所

吐者或白或棕黑。無一定之色。面紫

唇青。後變黑色。致有抽搐之狀。

【解毒】用食鹽水或服或洗。為敵此藥最良之

品。

吐根雜散 Pulvis Ipecacuanhae co

又名鴉片表散 衣必格雜散 托氏

散

【性狀】此藥以鴉片與吐根。製成灰白色之粉

末。易溶於水。

【功效】止瀉、止疼、發表、祛痰。

【主治】如阿米巴痢用之最效。因此藥含一精

名依米丁。專殺阿米巴菌。又瀉痢、

咳嗽、腹痛、感冒等亦服之。

【用量】吐根雜散 五厘至十五厘(〇.三至一

瓦)

【處方】吐根散十厘(〇.六) 次硝酸銀十厘(

〇.六) 甘草雜散十厘(〇.六)

右分為三包、每次一包、一日服完、

食後、(治痢疾、水瀉、能止疼)

蛋白銀 Profarsolum 又名銀腥禁

【性狀】此藥是銀與蛋白。用化學法製成淡黃

色之細末。無味。水易溶之。

【功效】有殺菌、收斂之性。

【主治】淋症、白帶、膀胱炎、尿道炎。及各

種眼炎。以此藥五厘。加水一百滴。

化勻上眼內。有殺菌收斂之效。不能

內服。

【處方】蛋白銀五厘(〇·三)水一百滴(六·六)

右化勻、(洗淋症、白帶)

白陶土 Kaolin 又名高嶺土

【性狀】此藥產於中國江西。為製磁器之原料。

色白無味。易溶於水。

【功效】能制酵防腐。各種潰瘍敷之。可以祛

濕。

【主治】外用、如皮癬、濕疹敷之。內用、如霍亂。

吐瀉服之。止瀉止吐。因此藥能吸收

水分。故服藥後便時所下之糞。如球

狀。

【用量】白陶土 半至一兩(一五至三〇瓦)

第七章 祛痰藥 Expectorants

凡藥能令肺中之痰減少。或調和乾痰而變稀

薄。易於咳出。並減輕肺臟之滲液。使之順

氣化痰者均為之祛痰藥。

吐根 Ipecacuanha 又名衣必格

【性狀】此藥產於南美洲、巴西等國。是一種

植物。入藥乃該草之根。色微黃。聞

之令人鼻嚏。味苦而澀。內含一精。

名依米丁。專治阿米巴痢。

【功效】服之令人氣管生液。口涎過多。並有

催吐之功。

【主治】化痰、催吐。無論老幼之氣管炎、肺癆、咳嗽、或痰不易咳出者。皆可用之。如小兒氣管炎不易出痰者。可服吐根糖漿。則痰易咳出。如與他種祛痰藥同服。其效尤妙。但內服多用酒類藥及糖漿。

【用量】吐根酒祛痰用、十至三十滴、(〇・六至二西西) 作吐用一至三錢、(四至一二西西)

吐根糖漿 半錢至一錢、(二西西至四西西)

吐根末祛痰用、半至二厘、(〇・〇三至〇・一二) 作吐用、十五至三十厘、)

一至二瓦)

【處方】吐根酒一錢(四西西) 橙皮酒二錢(八西西) 遠志糖漿二錢(八西西) 樟腦雜酒一錢(四西西) 水加六兩(二〇〇西西)

右分十二次用之、一日三次、食前、(治咳嗽、祛痰)

海葱 *Scilla* 又名土圭盧

【性狀】此藥產於歐洲。附近地中海等處。乃一種植物。形如葱頭。色淡黃。亦有深紅者。味苦而辣。切片曬乾。酒精與醋均能提出藥力。入藥多用海葱酒。

【功效】能令血管收縮。與毛地黃同。故有利尿之功。不可多服。多則惹胃。如與他

類咳嗽藥同服。則有祛痰之效。

【主治】化痰、利水。如氣管炎、或肺炎之咳嗽。痰多而乾。服之能令稀薄。易於咳出。如慢性腎炎。或心經有病致痰腫者。或胸膜、腹膜積液。與毛地黃同服。有利水之效。

【用量】海葱酒 五至三十滴、(〇·三至二西西)

【處方】海葱酒二錢(八西西) 炭酸鈣半錢(二瓦) 樟腦酒一錢(四西西) 透路糖漿一錢半(六西西) 水加至六兩(二〇〇西西)

右勻六次用之、一日三次、食前(治咳嗽、祛痰)

【又方】毛地黃酒一錢(四西西) 海葱酒二錢(八西西) 伊打酒二錢(八西西) 水加至六兩(二〇〇西西)

右勻六次用之、一日三次、食前、(能利水)

【中毒】服過分量。能致腎炎、尿閉、吐瀉、昏迷、抽搐。過二十點鐘。即行斃命。

安息香酸 Acid Benzoic

【性狀】此藥產於暹羅國、及蘇門大拉、加拉巴豆等處。為一種樹體。將皮割開。流出其液。晒乾成塊。外紅而內白。入藥用該藥液。製成安息香酸。色白如絲。結成片狀。體輕而薄。臭之略酸而辣。

【功效】有免腐殺菌之力。以濃厚溶液。敷於粘膜。則有刺戟性。服大量胃內作燒。

【主治】祛痰、利水。如氣管炎、肺炎服之。

有化痰之功。咽喉炎而音啞者。用安息香雜酒半兩。置於滾水內。吸其氣大效。慢性膀胱炎。與尿中含鹼。及慢性淋症。可與印度麻同服。因其有殺菌利尿之功。

【用量】安息香酸 五厘至十五厘（○ 三至一瓦）

安息香雜酒 一錢至二錢（四西西至八西西）

【處方】安息香雜酒二錢（八西西）樟腦雜酒二錢（八西西）橙皮酒一錢（四西西）

水加至六兩（二〇〇西西）

右勻六次用之、一日三次、食前、

（治咳嗽、祛痰）

叩的印 *Cottain* 又名古堍乙涅

【性狀】由鴉片中。用化學法提出。呈白色針狀之結晶。味苦。水、酒均易溶化。常用者為磷酸叩的印。或硫酸叩的印。

【功效】此藥功效與莫非同。但其麻醉性覺莫非為緩和。且無副作用。少有阻止腸胃。肺生液之力。故服後大便無乾燥之患。

【主治】止痛、安睡、祛痰。如腸胃痛、神經痛、不眠有效。又肺癆、百日咳、氣管炎。各種咳嗽。用以祛痰止咳。此

藥多用糖漿服之。糖尿症用之亦宜。

【用量】硫酸印的印 半至二厘、(〇・〇三至

〇・一二)

磷酸印的印 半至二厘、(〇・〇三至

〇・一二)

硫酸印的印糖漿 一至二錢、(四至

八西西)

【處方】硫酸印的印糖漿三錢、(一二西西)樟

腦雜酒一錢(四西西)海葱酒二錢(八

西西)水加至六兩(二〇〇西西)

右方分六次服之，一日三次，食前、

(治咳嗽、祛痰)

遠志 *Zenegera* 又名辛伊加

【性狀】此藥產於美國。入藥用該藥之根。色

微黃。味甜而辣。水・酒均能提出藥

力。用此藥製成之酒或糖漿。

【功效】有刺戟氣管吐痰之力。並能輕瀉利水。

【主治】化痰、利水。如氣管炎、肺炎、各種

咳嗽有效。此藥能刺戟氣管。將痰吐

出。心腎二經之水腫。能有利水之功。

【用量】遠志酒 一至二錢、(四至八西西)

遠志糖漿 一至二錢、(四至八西西)

【處方】遠志糖三錢(一二西西)橙皮酒二錢(

八西西)安息香雜酒二錢(八西西)水

加至六兩(二〇〇西西)

右勻六次用之，一日三次，食前服、

(治咳嗽、祛痰)

炭酸鈣 *Ammonii Carbonas* 又名炭

養阿摩尼亞 錳炭強礬

【性狀】此藥由碳酸錳與硫酸錳。用化學法製成白色無光之塊。體重而硬。見空氣體質變輕。遂成細粉。嚼之味辣。嗅之有惡味甚重。功能激腦。水·酒·甘油均能化之。

【功效】有激腦之功。如人昏倒。不醒人事。

以此藥置鼻處。令其嗅之能快甦醒。

【主治】祛痰、用於氣管炎、及各種咳嗽。與他種祛痰藥同服。其效甚大。如痰乾不易咳出服之。能令痰變稀。易於吐出矣。

【用量】碳酸錳 三至十厘(〇·二至〇·六)

【處方】碳酸錳半錢(二瓦)樟腦雜酒一錢(四

西(吐根酒半錢(二西)水加至六兩(二〇〇西)

右分六次服之、一日三次、食前、

(祛痰、止嗽)

透路糖 Sympus Tolutannu

【性狀】此藥以透路脂與白糖製成。色白味甜。

產於南非洲。

【功效】有清痰之功用。

【主治】止嗽、祛痰、用於肺癆、肺炎、氣管炎、肋膜炎、各種咳嗽。如與他種祛痰藥同服。有甜香之氣味。用為佐藥。

【用量】透路糖 一至二錢、(四至八西)

【處方】透路糖二錢(八西)碳酸錳半錢(二瓦)安息香雜酒一錢(四西)水加至

六兩(二〇〇西西)

有分六次用之、一日三次、食前、

(止咳、祛痰)

氯化銻 Ammonii Chloridum 又名阿

摩尼亞氣

【性狀】此藥由稀鹽酸與純銻。用化學法製成

白色結晶之小粒。味鹹而辣。水、酒均

能溶解。

【功效】激粘膜生液甚大。

【主治】有祛痰之功。用於各種咳嗽、肺炎、

氣管炎均效。如肝炎肝膿腫服之。能

生膽汁。胃炎、及胃內多存酸液、或作

痛者亦效。中漆毒者。以藥一兩。加

水二磅洗之。水腫病有利尿之功。神

西藥實驗大全 藥物學

經痛有鎮靜之能。

【用量】氯化銻 五至二十厘(〇.三至一.三)

【處方】氯化銻一錢(四瓦)樟腦雜酒一錢(四

西西)遠志糖二錢(八西西)水加至六

兩(二〇〇西西)

有分六次用之、一日三次、食前服、

(祛痰、止咳)

苦杏仁 Amygdala Amara 又名苦扁

桃

【性狀】此藥產於中國各處。外國亦有之。入

藥用該仁製成之水。為無色之流質。

嗅之有異味。

【功效】有激胃之能。並有祛痰之力。

【主治】用於各種咳嗽、肺癆、肺炎、氣管炎

六七

均效。胃弱能健胃。

【用量】杏仁水 十至二十滴(〇·六至一·三)

【處方】杏仁水一錢(四西西)吐根酒二錢(八

西西)透路糖二錢(八西西)開羊花

酒一錢(四西西)水加至六兩(二〇〇

西西)

右分六次服之、一日三次、食前、

(治咳嗽、祛痰)

第八章 強心藥 Heartstimu-

Jants

凡藥能刺戟腦髓及神經。使精神興奮、呼吸充足心力強大、血液循環迅速者。俱謂之強心藥。

鍾香酒 Spiritus Ammoniac Arom-

Jants 阿摩尼亞茴香酒 鍾香淡酒

【性狀】此藥以炭酸鍾、與純鍾溶液、豆蔻油、

檸檬油、酒·水等製成。為無色之流

質。味香而辣。聞之略有激腦之力。

【功效】強心、激腦。使心臟發血堅強。脈快

而有力。並有激呼吸之能。

【主治】心臟虛弱。各種熱症。或用蒙癩劑心

將停止之時。有興奮心臟循環之力。

外用如蜂蟻等螫傷。用此塗之有效。

如胃中食滯而醱酵。致患胃酸症用之

亦可。如與哥羅芳同服。能治頭痛。

【用量】鍾香酒 五至十五滴 (〇·三至一西

西)

【處方】鍾香酒半錢(二西西)阿魏酒半錢(

二西西)水加至三兩(一〇〇西西)

右分六次用之、一日三次、食前、

(治神經衰弱、及腦貧血)

甘松酒 Tinctura Valerianae 東名巔

草丁幾

【性狀】此藥產於美國、及中國、四川、陝西

等處。入藥用該草之根。色棕黃。味

香甜而略苦。

【功效】有平腦之功。並使脈快而速。服過量

有吐瀉之患。

【主治】有提起精神之功。用於婦女腦部受激。

致患不眠之症。服之有效。婦人歇斯

的里、酒狂症。與莫非同服有效。並

有解抽之能。

【用量】甘松酒 一至二錢(四至八西西)

【處方】甘松酒二錢(八西西)鎳化鉀二錢(八

瓦) 鎳化鎂一錢(四瓦) 水加至三兩

(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前、

(能解抽、平腦、安睡)

樟腦 Camphor 又名療樟腦 潮腦

精製樟腦

【性狀】此藥產於中國、日本、台灣等處。其

製法。先將樟木作為小塊。以水蒸出。

呈白色透光結晶之塊。其質柔軟。有

特異之臭氣。味略苦如灼。後則清涼。

易燃易散。熱之則飛無渣。酒精、伊

打、哥羅芳均能溶化。入藥乃該藥作

成之酒。或製成油。名曰樟腦油。

【功效】有激心激呼吸之能。使脈快而有力。並能激腦。使腦部精明。全身暢快。

激陰陽之力頗強。且有舒血管之功。爲解抽、發表、止瀉之良藥。如服過量。必致頭痛、頭暈、譫語、耳鳴、抽搐如癇症。脈速而微、全身出汗、皮冷而紫、腸內燒痛、腎必發炎。小便閉塞等狀。解此毒法。先服吐藥後服銻香酒。或加非印均可。

【主治】用於小兒、婦女。有平腦、解抽之功。婦女經痛、或有悸症。與安提排林或阿西炭尼力同服最效。如霍亂、吐瀉、惡心、傷風服之均效。如陽莖舉硬而

痛。與鎳化鉀同服特效。各種熱症能發表。並有殺菌之效。置於衣箱內。可免衣服蟲蝕。

【用量】樟腦 一至三厘、(〇〇〇六至〇・一八)

樟腦油 五至十五滴、(〇・三至一西西)此油自己製造、必完全消毒、方可用之、總不如購買成藥爲妙、每一管裝十五滴、(一西西)用於心力虛脫呼吸困難、麻藥中毒均可、射於皮下能救急、

樟腦雜酒 半錢至一錢、(二西西至四西西)

樟腦酒 十五至三十滴、(一至二西

西)

樟腦藥 不可內服、外用如磨瘰、筋扭、跌打損傷、關節痛、風濕痛、凍傷、皮膚各種腫症。均可擦之。

【處方】樟腦雜酒一錢(四西西) 碳酸鈣半錢(二瓦) 吐根酒半錢(二瓦) 水加至三兩(一〇〇西西)

右分六次用之、一日三次、食前、

(止嗽、祛痰、定喘)

酒精 Alcohol 又名醇酒

【性状】此藥由糖或澱粉類加熱。使之發酵而成。爲無色透明揮發性之液。其氣易散。有特異之香氣。水·伊打、哥羅芳均能溶化。遇火即燃。呈藍色之光。

用者慎之。

【功效】有激腦之能。服過量。全身失其自主。脈快而有力。血壓增加。服小量。有激呼吸之能。且有消化之力。對於身之熱度。無增加之力。而身體覺暖者。乃因血液催至四肢之故。多飲之熱力反減。因血至四肢之後。體失其熱度也。多服胃則被阻。常爲配製藥酒之原料。【主治】能激心如腦力脫失、心臟衰弱、流血過多、急性熱病、脈細而弱、肺炎、肺炎、肺葉炎、肺癆、蛇咬、或遠年之膿瘡。用之均效。外用、止血、殺菌、防腐。以淡酒精塗之。如關節痛、神經痛、麻痺、筋扭、損傷均爲塗擦藥。無論

皮膚或械器塗之。有消毒殺菌之力。

【忌用】凡患脊腦炎、腦膜炎、急性熱症、譫語、動脈硬化、腸中生瘍。均忌用之。以免中毒。

【用量】以此酒配出之酒類。每次應服分量。例述於次。

伯蘭地酒 一錢至二錢、(四西西至

八西西)

葡萄酒 半至一兩、(一五至三〇西

西)

淡酒精 二至四錢、(八至一六西西

)以酒精七分、水三分合之即成、

毛地黃 *Digitalis* 又名實斐他利斯

【性狀】此藥產於歐洲、美國等處。入藥用該草

之葉。色綠而有毛。味甚苦。

【功效】能激心之收縮力。令血管壓力增加。使脈和緩。脈浪增高。並有利尿之功。因其能將腎內之血液。催出使腎臟之功。如服過量。心跳不勻、嘔吐、結合膜見有藍色、頭疼甚重。解法、炭尼酸、或吐藥。

【主治】利尿強心。用於心臟衰弱、血運不週、心跳煩悶。而於心鬆大亦效。又肺炎有積血之患、呼吸困難者。此藥有催血之能。腦力脫失或受傷。此藥能激之。以防心臟麻痺。中烏頭毒亦服之。如心力不足、致腎臟積血尿閉者。用之能利尿。

【用量】毛地黃酒 五至十五滴、(〇.三至一

西西)

毛地黃葉 一至四厘、(〇.〇六至〇.

二四)

【處方】毛地黃酒一錢(四西西)醋酸鉀二錢(

八瓦)水加至六兩(二〇〇西西)

右分六次用之、一日三次、食前、

(治膀胱、尿閉)

【忌用】脈變壞、脈囊、中風症。禁用之。

馬前子 *Nux Vomica* (*strychnin*)

又名番木別

【性狀】此藥產於印度安南等處。是一類樹果。

色黑黃而硬。內含二精。一名士的年。

一名布魯先。常用者乃士的年。

【功效】有激腦、激呼吸、及血壓之力、服用

過量。全身抽搐。熱度加增。呼吸速

而肺臟舒展。

【主治】激心、補腦、健胃。用於過用力之

人。有增加視力之能。如心臟虛弱、

呼吸困難服之有效。中鴉片毒、或蒙

哥羅芳、致肺臟不能呼吸者。用士的

年一厘三十分之一厘救之。或腦力脫

失。因受傷所致者亦效。中鉛毒之難

療。及氣管炎、氣喘。或年邁咳嗽用

之均可。大便久燥。可與瀉藥同服。

因其有激動大小腸蠕動之能。並有健

胃之功。

【用量】馬前子酒 五至十五滴、(〇.三至一

【西西】

硫酸士的年 一厘三十分之一、至二

十分之一厘、(〇・〇〇二至〇・〇〇

三)

硝酸士的年 一厘三十分之一、至二

十分之一厘、(〇・〇〇二至〇・〇〇

三)

以上二藥、均是白色針狀之結晶、味

苦、腦力突衰者射於皮下。

【處方】馬前子酒一錢(四西西)加斯加拉流膏

三錢(一二西西)橙皮酒二錢(八西西)

水加至六兩(二〇〇西西)

右分六次用之、一日三次、食前、

(能輕瀉、健胃)

【中毒】全身抽搐、頭項強直、二目直視。此

時脊必反張如弓。呼吸軟弱。終致呼

吸麻痺而死。

【解毒】內服硫酸銅、鎳化鉀、炭尼酸。或行

洗胃法。

第九章 補血藥 Tonics

此藥能令血中赤血球增加、血液充足。使身

體強壯。即為補血藥。此類藥品。如貧血症、

萎黃病、各種瘡瘍、癩癧、婦女經閉、及經

血不調等症服之。能使身體健壯。血液增加。

鐵粉 Ferrum Redustum 又名輕鐵粉

還元鐵

【性狀】此藥為純淨之鐵粉。呈灰色之末。撒

於火上。則必燃燒。

【功效】服一次無甚功效。必連日服之。方可使血液與赤血球加增。令血中含有鐵素。故此藥爲人體內必須之品。

【主治】無斂力。能生血而不能止血。故於貧血。萎黃病、經閉。爲最效之藥。

【用量】鐵粉 三至六厘(〇・二至〇・三六)

【處方】鐵粉三厘(〇・二)甘草一厘(〇・〇六)糖漿酌用。

右製一丸、與六丸、一日三次、每次一丸、食後、(補血調經)

磷鐵雜糖 Sympus Ferri Phosphas

〇 又名磷酸鐵製糖

【性狀】此藥由硫酸鐵與濃磷酸、及糖漿等製成。爲微紅色之流質。有鐵銹味。

【功效】補血、健腦。

【主治】凡各種貧血症。如瘰癧、痔症、神經衰弱、月經不調、產婦無乳。用之均效。

【用量】磷鐵雜糖 一至二錢、(四西西至八西西)

【處方】磷鐵雜糖半兩(一五西西)哥倫布酒二錢(八西西)水加至六兩(二〇〇西西)

右分十二次用之、一日三次、食後、(補血、調經、生乳、健腦)

鐵碘糖 Sympus Ferri Iodini 又名鐵碘糖漿

【性狀】此藥以細鐵粉、及碘・糖而成。呈微

黃之漿。味甜有鐵銹味。若加澱粉於內。其色不變者為純藥。如變色則不宜用。

宜用。

【功效】有止血、補血之能。

【主治】貧血症、梅毒貧血症、小兒癩症。以及瘰癧、惡瘡均效。

【用量】鐵礮糖 二十至六十滴、(一·三至四西) 服法、以玻璃管吸之、防牙受傷、

【處方】鐵礮糖一錢半 (六西) 橙皮糖四錢

(一六西) 水加至六兩 (二〇〇西)

西)

右勻六次用之、一日三次、食後、

(治貧血)

檸檬銹鐵 Ferric Ammonii Citras

又名鐵銹檸檬 枸橼酸阿母尼亞鐵

【性狀】此藥由檸檬酸與硫酸鐵、及阿摩尼亞水製成。為深紅色透明之薄片。味甜而清。水易溶化。

【功效】為生血、健胃之藥。略有斂力。

【主治】各種貧血、及惡瘡、瘰癧、虛弱、乳汁不足。均可用之。

【用量】檸檬銹鐵 三至五厘(〇·二至〇·三)

【處方】檸檬銹鐵一錢(四五)馬前子酒半錢(

二西) 甘油一錢(四西) 水加至六

兩(二〇〇西)

右勻十二次用之、一日三次、食前、

(治貧血症、或乳汁不足)

檸檬規尼鐵 Ferric Quinine

Qiras 又名鐵貴林檸檬 (貴林即金雞納)

【性狀】此藥以硫酸鐵、與硫酸規尼、檸檬阿

摩尼亞水製成。為深黃色結晶之薄片。

味若有鐵銹味。水易化。

【功效】為補血、生血之藥。並能收斂。

【主治】貧血、虛弱、瘰癧、惡瘡、經血不調

等症。

【用量】檸檬規尼鐵 五至十厘、(〇.三至〇.

六)

【處方】檸檬規尼鐵半錢 (二瓦) 水加至六兩

(二〇〇西西)

右分六次用之、一日三次、食後、

(補血劑類)

過氯化鐵酒 Tinct Ferric Perchlor-

id 又名鐵氫酒 鐵氫強塩酒

【性狀】此藥以過氯化鐵、與酒精製成。為紅

黑色之流質。有鐵銹味而澆。

【功效】去毒、止血、補血、利尿。

【主治】內、各種虛弱、貧血、經閉、內部出

血、慢性腎炎之水腫、丹毒。外用、作

收斂之劑。如割症後小血管出血。敷

此藥能止血。白喉、與喉炎敷之亦可。

【用量】過氯化鐵酒 五至十五滴、(〇.三至

一西西)

【處方】過氯化鐵酒半錢 (二西西) 水加至六兩

(二〇〇西西)

右勻六次用之、一日三次、食前、
(能補血、愈澁)

硫酸鐵 *Ferri Sulphas* 又名青礬

鐵強鐵 鐵硫強礬

【性狀】此藥以鐵與硫酸製成。亦有由黑礬煉出者。為淺綠色帶光稜形之塊。有鐵銹味。水能溶解。

【功效】為補血、收斂之補藥。

【主治】此藥內服。必與他藥同服。否者有惹胃之患。用於貧血、虛弱。或調經均可。

【用量】硫酸鐵 一至五厘、(〇.〇六至〇.三)

【處方】硫酸鐵一錢(四瓦) 硫酸鎂半兩(一五

瓦) 硫酸規尼半錢(二瓦) 稀硫酸十五滴(一西西)(化規尼用)、水加至六兩(1100西西)

右勻十二次用之、一日三次、四日份、食後、(能補血、去熱、健胃)

磷鐵規尼士的年糖 *Syrupus Ferri Phosphor. Cum Quinin et Styr-*

chinin 又名伊是吞

【性狀】此藥以鐵·磷·規尼·士的年·白糖製成。呈黃色透光之漿。味甜而苦。

【功效】有健胃、補血之功。

【主治】各種虛弱、貧血、神經衰弱、癩癧、惡瘡、月經不調、經閉、無乳症、胃弱。服之亦可。

【用量】鱒鐵規尼士的年糖 半至一錢、(一至

四西西)

【處方】鱒鐵規尼士的年糖半兩(一五西西)水

加至六兩(二〇〇西西)

右勻六次用之、一日三次、食後、

(能健腦、補血、生乳)

魚肝油 *Oleum Morrhuae*

【性狀】此藥自美國、歐洲所產鱒魚之肝製出。

其色有淺黃、純白二種。純白者爲常

用之品。淺黃色不常服用。因其味腥

如魚。故人厭之。

【功效】此藥內含碘與磷及鱒等之要質。故服

之者。有生赤血球之用。而能補血。

且爲強壯補虛之要品。

【主治】爲滋補強壯之藥。如肺癆、身體虛弱、

咳嗽、風濕骨痛、關節痛、貧血、瘰

癧、神經痛、小兒骨軟症。服之均效。

小兒水瀉忌服。

【用量】魚肝油 一至二錢(四至八西西)

硫酸 *Acidum Sulphuricum* 又名鑽

強酸 硫酸水 鑽強水 硫酸

【性狀】此藥由硫黃所發之氣。以化學法製成。

爲黑色之流質。性猛味酸。以紙或布

帛沾之。立時腐壞。淡者可內服。濃

者不宜。

【功效】爲最有效力之腐蝕劑。能將肉內水氣

攝取。而留炭質。使肉變黑、除此酸

之斂力甚強外。且有凝泊之功。

【主治】補藥，與規尼合服並有解熱、發表之力。

霍亂症、泄瀉。與他植物欬藥同服亦可。肺癆症之盜汗。與顛茄服之。中鉛毒服之。能與鉛化合。不能佈散。

以免中毒之患。疝症作腐蝕劑用之。

【用量】淡硫酸 五至二十滴、(〇・三至一。

三)

鹽酸 Acidum Hydrochloricum 又名

塩強酸 塩強水 氫氯酸

【性狀】此藥由食塩與硫酸製成。爲無色透光

之流質。性烈而酸。嗅之其味刺鼻。

內服用稀塩酸。濃者不宜內服。

【功效】胃液中每千分含此藥二分。如無此藥。

即無消化能力。但腐蝕性甚大。無欬

力。且能退熱。

【主治】補藥、各種虛弱服之。有健胃之力。用

於熱症、及胃疸、胃瘍、食滯等症。

能助消化。

【用量】稀塩酸 五至二十滴、(〇・三至一。

三)

【處方】稀塩酸一錢(四西西)稀青酸半錢(二

西西)水加至三兩(一〇〇西西)

右勻六次用之、一日三次、食前、

(治胃痛、胃弱症)

【又方】稀塩酸一錢(四西西)百布聖一錢(四

瓦)水加至三兩(一〇〇西西)

右勻六次用之、一日三次、食前、

(治消化不良)

第十章 健胃藥 Digestants

凡藥能刺戟腸胃粘膜。增加官能之活動者。俱謂之健胃藥。

百布聖 Pepsinum 又名胃酸 怡比

辛 辟先 倍辛 胃液素 胃化脛
梅

【性狀】此藥由小牛或豬羊之胃液製出。爲黃白色之細末。如加白糖。卽爲純白色。易潮濕。味鹹。

【功效】爲最良消化藥。如與稀鹽酸混合。與胃消化力無異。

【主治】如胃中生液不足。而消化不良。或食滯及病後之胃弱。無論成人小兒。服之均宜。

【用量】百布聖 七至十厘、(〇・四二至〇・六)

桂皮 Cinnamon 又名洋肉桂 錫
蘭肉桂

【性狀】此藥產於中國及錫蘭島等處。入藥用該樹之皮。色紅味香而甜。

【功效】此藥內含炭尼酸。故有收斂之性。並能激腸祛風。又能佐他藥同服。取其香味。

【主治】有開胃、緩胃、祛風之力。且能止瀉。如子宮流血不止者。服此油有效。因其內含炭尼酸之故。肺炎之咳嗽亦效。淋症射尿管內洗之。

【用量】桂皮油 一至五滴、(〇・〇六至〇・

三)

桂皮香散 十至三十厘 (〇・六至二

瓦)

【處方】桂皮油十滴 (〇・六) 樟腦雜酒一錢

(四西西) 伊打酒一錢 (四西西) 水加至

三兩 (一〇〇西西)

右勻六次用之、一日三次、食前、

(治咳嗽、肺炎)

加斯大賊 *Dioscorea* 又名化糖素

檫梅

【性狀】此藥由酒酵取出。為黃白色之粉末。

【功效】凡不能消化澱粉類之食品者。每食後

須服此藥。

【主治】用於各種消化不良、胃弱等症。成人

小兒服之均宜。

【用量】加斯大賊 二至五厘 (〇・一二至〇・

三)

【處方】加斯大賊十五厘 (一瓦) 百布聖十五厘

(一瓦) 重碳酸鈉十厘 (〇・六)

右為三包、勻三次用之、一日三次、

食後半點鐘服之、(治消化不良)

丁香 *Chryophyllum*

【性狀】此藥產於中國及印度等處。入藥用該

樹之花蕾。色棕黑而辣。味香。

【功效】有止瀉、健胃、祛風之功效。

【主治】用於食滯。有消化之功。用於呃逆。

有止吐之功。牙疼者用此油。擦患處

能止痛。並能殺死陰虱。

【用量】丁香油 一至五滴、(〇・〇六至〇・

三)

丁香末 五至十厘、(〇・三至〇・六)

【處方】丁香末十厘(〇・六)大黃末十厘(〇・

六)龍膽草末十五厘(一瓦)

右方分三包、一次一包、一日用完、

食前、(消化不良服之)

豆叩 Cardamomi Semen 又名肉豆

叩 肉蔻

【性狀】此藥產於印度。入藥用該樹所結之果。

去外皮用子。味香而辣。

【功效】有健胃之功。

【主治】祛風、健胃、泄瀉。服之有效。

【用量】豆叩酒 一至二錢、(四至八西西)

西藥實驗大全 藥物學

苦味酒 Tinctura Amara

【性狀】此藥用龍膽草、陳皮、及酒精製成。

呈深黃色。味苦而香。

【功效】胃弱。不能消化用之。

【主治】能健胃。治消化不良。

【用量】苦味酒 十至二十滴(〇・六至一・三)

【處方】苦味酒二錢(八西西)甘草末一錢(

四瓦)加斯加拉流膏二錢(八西西)水

加三兩(一〇〇西西)

右勻六次用之、一日三次、食前、

(治腸胃消化不良)

橙皮酒 Tinct. Aurant 又名陳皮酒

橘皮酒

【性狀】此藥由陳皮與酒精製出。爲淺黃色之

流質。味苦而香。

【功效】佐他藥同服。作香味用之。

【主治】能健胃、止嘔、祛痰。

【用量】橙皮酒 一至二錢(四至八西西)

【處方】橙皮酒二錢(八西西)龍膽草雜酒二錢

(八西西)甘草末一錢(四瓦)水加至三

兩(一〇〇西西)

右勻六次用之、一日三次、食前服、

(能健胃)

龍膽草 Gentiana

【性狀】此藥為一種草根。產於中華歐洲等處。

入藥用其根。色黃味苦。

【功效】能健胃。

【主治】如急性熱病之厭食。或胃無緊張力。

消化不良服之均效。小兒腸胃粘膜炎。

與重碳酸鈉同服。其效尤大。

【用量】龍膽草酒 半至一錢(二至四西西)

龍膽草流膏 半至一錢(二至四西

西)

龍膽草膏 一至八厘(〇・〇六至〇・

五)

【處方】龍膽草酒二錢(八西西)甘草末一錢

(四瓦)加斯加拉流膏二錢(八西西)

水加至六兩(二〇〇西西)

右勻六次用之、一日三次、食前、

(治消化不良、便秘)

薑 Zingiber

【性狀】此藥為一種草根。產於中華、印度、

及乍美隆、海島等處。色黃白。味辣。

【功效】補胃、祛風。

【主治】加於止瀉藥內。能止瀉。且免痙痛。

因其能使大便秘結。如婦女受寒經閉者。服之大效。胃弱服之能健胃。

【用量】薑酒 二十至一百二十滴（一·三至

八西西）

薑末 三至二十厘（〇·二至一·三）

薑流膏 十至三十滴（〇·六至二瓦）

薑糖漿 半至二錢（二至八西西）

【處方】阿片酒一錢（四西西）苦味酒二錢（八

西西）薑酒一錢（四西西）水加六兩（二

〇〇西西）

右勻六次用之，一日三次，食前服。

西藥實驗大全 藥物學

（健胃、祛風、止痛）

第十一章 變質藥 Alterati-

ves

凡藥能變化血液。調和組織。能溶解消除血中所生之毒菌。如梅毒、瘡毒而使之痊癒。恢復全身之原狀者。俱謂之變質藥。

碘 Iodidum 又名海碘 沃度

【性狀】此藥由海草灰。用化學法製出。為黑

色結晶之鱗片。有金屬之光澤。味苦

而辣。水·酒·甘油·伊打均能溶解。

【功效】有改變病體之效。敷於皮上先黃後黑。

敷之瘡多則色愈深。皮必生泡而脫落。

外用、為最有力殺菌之藥。內服、則起

劇烈之胃炎、及嘔吐。該藥祛離。乃

由皮涎腺而去。婦人服之。乳內必含此質。如小兒服此乳久之。必患胃腸炎症。無論內用外用。以此藥製成碘酒用之。如服過量。腸胃必致發炎而吐瀉。生涎最多。口有金味。尿閉致死。解毒法、先服澱粉。後再洗胃爲妙。

【主治】瘰癧、腫瘍不可單服。必製成他種碘類藥。方可用之。

【用量】碘溶液 五至十滴（○.三至○.六）

碘酒 *Tinctura Iodidum* 又名海碘酒

沃度丁幾 氣酒

【性狀】此藥以碘、與碘化鉀、及酒精製成。爲黑紫色之流質。味如碘。

【功效】敷於皮上必現黃色或黑色。如敷過多

必起泡。若再敷之。痛不可忍。多用於外科。內科少用。

【主治】用於各樣炎腫、瘰癧、骨節炎、助膜炎、氣管炎、乾嗽、肺癆、各種疥癬症、丹毒。每日一二次敷患處。有消炎之效。又陰囊水腫、卵巢墮腫。有以套針將水放出後。射此藥於患處內者。但疼痛難忍。近世多不用此法。

如皮膚病、梅毒、潰瘍。作成藥水洗之。亦宜。又用於蒙藥後之嘔吐、孕吐。則與伯蘭地酒同服。

【用量】碘酒 五至十五滴（○.三至一西西）

碘化鉀 *Kalium Iodidum* 又名鉀碘

鉀碘鹽 沃度加里 沃度加留謨

【性狀】此藥以鉀與碘用化學法製成。呈白色

方形結晶之塊。味苦而鹹。水能化之。

【功效】與碘功效相同。但無刺激性。吸收性極速。服後一刻鐘。於尿內用化學即得。用於梅毒必連次服之。漸增其量。

因該藥僅能祛除十分之八。尚有二分積於身內。

【主治】此藥之用法有三。(1)如第一期梅毒、第二期梅毒。宜用汞類藥。三期可用碘化鉀。如與汞同服。其效尤妙。如子宮內膜炎、白帶、疔毒、惡瘡。亦可服之。(2)能解鉛毒、鋅毒、砒毒、汞毒。以上各種中毒。服此藥將身內之毒化合。變為易化之塩。由身內祛

之。(3)如膿性關節症、久痺症、坐骨神經痛、腰痺症、肋膜炎、心膜炎、胸膜炎、陰囊腫、動脈瘤、脈變硬慢性腎炎、肺癆、肺變硬、氣管炎用之。均有奇效。

【用量】碘化鉀 二至十厘(〇·一二至〇·六)

【處方】碘化鉀一錢(四瓦)昇汞半厘(〇·〇

三)麝香酒一錢(四西西)水加至六兩

(二〇〇西西)

分十二次用之、一日三次、食前服、

(治第三期各種梅毒)

【副作用】服過量。能致眼險緣炎、曠緊、喉

乾、身出紅點等狀。止服即癒。

水銀軟膏

Unguentum Hydrargyri

舊名錄油膏 錄藍膏

【性狀】此藥以汞及煉豬脂製成。爲灰色軟膏。

【功效】各期梅毒。不能服藥者。以此藥塗擦。

【主治】用於腦膜炎、肋膜炎、肝炎、陰囊炎、組織炎、硬性下疳、橫痃。爲局部消腫之要藥。頭虱、毛虱。擦之亦可。如用藥日久。當用碘化鉀嗽口。以防中毒。

【用量】水銀軟膏 每用十五厘爲限（一瓦）不可內服。

【用法】第一日擦於右腿根內。第二日擦於左腿根內。第三日擦於左腋窩內。第四日擦於右腋窩內。隨擦隨搓。如此返覆行之。以病勢之輕重。定日期之多

少。搓時先取藥置手掌中。以平等之壓力。徐徐塗擦。以一點鐘爲限。

水揚酸汞 *Hydrargyri Salicylas* 又

名錄柳攀 撒里失爾酸錄

【性狀】此藥以水揚酸、與水銀、用化學法製成。爲白色之粉末。水、酒不易溶化。

【功效】爲梅毒內用、外用之特效藥。

【主治】梅毒如內服。必在飯後。因其惹胃之力最甚。外用、以藥二十厘。軟巴拉粉三錢。每三四日。注射臂大肌內一次。注射時將瓶搖動。以免沉澱。所用之針及患處。均宜消毒完善爲要。

【用量】水揚酸汞一厘十二分之一、製丸服之最妙（〇・〇〇五）

黃降汞 Hydrargyri Oxidum Fla-

rum 又名黃汞養 黃錄強養

【性狀】此藥以昇汞與純錘水製成。爲黃色細末。水不化。淡酸易化。有成團之性。

【功效】外用殺菌。內服治梅毒。不可過量。

如服多則腸胃發炎。

【主治】雖能內用。但服之者甚少。外用製成

軟膏。治爛眼邊、梅毒瘍等症。

【用量】一厘六十分之一(〇・〇〇一)

【處方】黃降汞二分 華士林九十八分

右配成軟膏用之(治爛眼邊)

白降汞 Hydrargyri Ammoniatum

Chlorum 舊名阿摩尼錘錄 錄錘

氣藍

西藥實驗大全 藥物學

【性狀】此藥以昇汞與阿摩尼亞水。用化學法

製成。呈白色塊。無味。水、酒不化。

淡酸易化。

【功效】不可內服。有殺菌之力。用此藥製成

軟膏。爲皮膚科常用之藥。

【主治】用於梅毒性之潰瘍、禿瘡、膿泡、癬

疥、陰虱。用此膏敷之最效。

【處方】白降汞二分 華士林九十八分

右調合爲膏、(治禿瘡、癬疥)

紅降汞 Hydrargyri Oxidi Rubrum

又名紅錄養 三仙丹 東名赤降汞

紅錄強養

【性狀】此藥以汞與硝酸製成。爲黃赤色細末。

微成小團。

八九

【功效】有殺菌之力。不能內服。外用製成紅降汞軟膏。為皮膚科常用之藥。無痛而腐蝕力甚強。

【主治】乾癬、乾癬、陰虱、膿泡、禿瘡、及梅毒性之潰瘍、下疳。製膏敷之。

【處方】紅降汞二分 凡士林九十八分
右調合成膏、(治爛眼邊)

亞砒酸 *Acidi Arseniosi* 又名紅礬

白砒 砒弱酸 砒酸

【性狀】此藥由砒與酸。用化學法製出。為白色之粉末。無臭。水略溶解。以火烤之。則有蒜味。(砒即紅礬)

【功效】敷於傷處或潰瘍之上。則有潰力。如敷不破之處。即無潰力。內服過量。腸

胃起劇烈之疼痛。上吐下瀉。所瀉之物。如米湯。形似雀亂。亦有帶血少許者。待三四日即見癒。皮見發疹。然非真癒。約在五六日。既行死亡。服食日久。必生積毒。而發氣管炎。腎臟炎。皮變紫色。末稍神經受傷。全身麻木。亦有麻在指或足趾者。亦有癱者。解此毒法。先洗胃。後服炭酸鎂。或過氯化鐵酒。此藥祛離。由腎汗。涎腺祛離。但必過十六點鐘方顯。乳婦服之。乳內必含砒少許。小兒食其乳。易瀉痢、腹痛。

【主治】貧血、肌跳、瘧症、血多白血球、糖尿症、癩症、陰門癢、麻瘋、脾大症、

傷風、氣管炎等。又用於久痺症。口

白瘍、嚔炎、癆症、胃瘍、胃疽、胃

弱、孕吐、久瀉、梅毒各症。外用爲

潰藥。如以濃厚溶液。擦鷄眼皮疽、

或瘰子均可。

【用量】亞砒酸 一厘四十分之一至二十之一

(〇.〇〇一六至〇.〇〇三二瓦)

亞砒酸溶液、每百分含此藥一分、

【處方】亞砒酸溶液十五滴(一西西)金鷄納酒一

錢半(六西西)糖漿三錢(一二西西)水

加至三兩(一〇〇西西)

右分六次用之、一日三次、食前、(治

皮膚病、及瘰疾)

第十二章 防腐消毒藥

西藥實驗大全 藥物學

Disinfectants

凡藥能預防腐化。制止發酵。或內用或外服。

而能殺滅各種病原菌者。皆謂之防腐消毒藥。

石炭酸 *Acidum Carbolicum* 又名卡

波力酸 加波匿酸

【性狀】此藥由煤瀝用蒸法而成。爲白色透光

之結晶塊。宜裝於有色瓶中。嚴密封

口。置於暗處。遇空氣即變爲流質。

有特異之臭味。酒精·伊打·哥羅方·

甘油·水。均能溶解。

【功效】如敷於皮膚或粘膜上。發白而痛。後

則皮脫麻木。而失知覺。且有潰性。因

其凝泊性强。故潰爛不能深入。如服毒

量。神經受阻。尿閉尿血。或尿帶黑

色。腸胃被刺。以致昏迷。神經麻痺。

心臟停止而死。

【主治】內服、制止胃神經被刺戟之嘔吐。每服

半至二滴。多加水沖服。如腸失功用。

食物發酵而致泄瀉者。以此藥二滴。

每次硝酸鉍十厘。同服甚效。糖尿病、

霍亂症。服之亦可。外用、殺菌力甚大。

用於外科手術、各種潰瘍。以其淡溶

液清洗患處。如口白瘍、喉炎、喉瘍用

此藥二分水一百分漱之。又燙傷以藥

一錢。加洋橄欖油一兩敷之。膿泡癬疥

皮癢。製成軟膏敷之。淋巴腺大、滑

膜炎、癰疽。用此藥二分。加水九十

八分。每次用五至十五滴。注射腺內

可免生膿之患。

【用量】石炭酸 一至二滴(〇・〇六至〇・一

二)

【處方】石炭酸半錢(二西西)水十兩(三〇〇

西西)

右化勻、(洗滌用)

【中毒】服此藥之毒量。腸胃發炎、腹痛、吐

瀉、全身生汗、呼吸短促。於肝、脾、

腎俱有黑血聚積。以致腦力脫失而死。

【解毒】先服硫酸鎂、硫酸鈉以瀉之、因此二

藥與石炭酸混合。成爲不化之鹽。並

射士的年、毛的黃於皮下。激其心臟

與呼吸。如在皮膚沾染此毒。以酒精

擦之立癒。

硼酸 Acid Borici 又名硼強酸

【性狀】此藥以硼砂與硫酸強酸製成。爲白色帶光之鱗片與細末。味酸。水·甘油·酒精均能化之。

【功效】爲防腐、消毒之要藥。無毒力。且無刺戟性。內服外用均可。

【主治】內服、若膀胱炎之尿內含鹹。能使變酸。白帶症能殺菌。腸胃酸酵服之能免腐。■用於外科、眼科、淋病、耳漏各種潰瘍。用此藥製成藥水洗之。如凍傷、燒燙傷、各種瘡症。製成軟膏敷之甚效。

【用量】硼酸 五至三十厘(〇·三至二瓦)

【處方】硼酸一錢(四瓦) 水六兩(二〇〇西)

(西)

右化勻、(洗眼、洗瘡用)

【又方】硼酸二分·凡士林九十八分

右調和爲軟膏、(治燒燙傷、瘡等)

過錳酸鉀 Kali Permanganas

又名錳強酸 鉞錳上礬 東名過滿

俺酸加留謨

【性狀】此藥以苛性鉀、與酸化錳、及氯化鉀、濃硫酸製成。爲紅紫色針形之粒。有光。味甜而澇。水易溶化。如與硫黃或氯化鉀相合。則爲爆發之炸藥。

【功效】有防腐、消毒敗臭、殺菌之力。但無刺戟性。內外俱用。

【主治】如婦人經閉服之有調經之效。腸胃氣

脹、及食滯。有制止醱酵之力。中鴉

片毒、燐毒。此藥爲其敵藥。服法、每

次三至五厘。多加水液服後能催吐。

外、用各種淺瘍、白喉炎、鼻臭炎、中

耳炎、婦人尿道炎、蛇咬傷。用此藥

■之。但不可用爲器械消毒。恐其生

銹。

【用量】過錳酸鉀 三至五厘（〇・一八至〇・

三瓦）

【處方】過錳酸鉀一厘（〇・〇六瓦）水一百滴（

七西西）

右化勻、（洗陰門瘻及毒瘡）

來蘇 *Lysol* 又名列曹兒

【性狀】此藥由煤瀝中得之、爲紅紫色透光似

油之流質。溶於水中。則成白色透光。

與臙子水同。

【功效】爲防腐、殺菌、消毒之用。但不可用

器具消毒。因其滑而難拿。

【主治】不可內服。用於各種外科。如潰瘍、

膿瘡、下疳、尿道炎。用百分之二者

洗之。

【處方】來蘇一分水一百分

右化勻、（各種膿瘡、皆可洗之）

黃碘 *Iodoform* 又名海碘方 黃氯

沃度仿謨

【性狀】此藥以碘與酒精及 碳酸鉀。用化學

法製成。爲黃色有光之小片。或結晶

之粉末。有特別之氣味。酒精・甘油・

哥羅芳均能化之。

【功效】爲最良之防腐藥。有阻止化膿之功。

毫無刺激性。且無潰亂之作用。雖無殺菌之力。而有阻止生菌之能。敷於瘡上。使瘡口變乾。

【主治】用於各種潰瘍、火傷、橫痃、下疳、

乳頭潰爛、陰門炎、痔瘡、肛裂、癰癤、膿疱瘡。用此藥散或軟膏貼之。如骨

節癰癤、或胸膜癰癤、與白腫。以此藥十分、橄欖油九十分、水加至一錢。調勻射入核內有效。

【用量】黃碘 一至五厘(〇・〇六至〇・三)

【處方】黃碘二分 華士林九十八分

右合勻、爲黃碘軟膏、(治各種瘡症)

【中毒】惡心、嘔吐、頭痛、厭食、抽搐。

【解毒】服重碳酸鈣、或葡萄酒。均可解之。

幾阿蘇 *Iodosolun* 又名結麗阿曹篤

【性狀】此藥由椎木蒸出之。爲淺黃色油狀之流質。味辣如燒。水略溶解。

【功效】敷於皮上。先必變白而痛。後則麻木

而感覺。如敷於粘膜。則有潰力。爲殺菌防腐之藥。

【主治】內用於食滯、腸胃氣脹、肺癆。每次

服二滴。如小兒肋膜炎、氣管炎。用此藥搓其前胸有效。但不可多搓。每次以一二滴爲限。入血有殺菌之力。

並有解熱之能。如牙痛。以棉花球蘸

此藥塞牙穴內。功能止痛。

【用量】幾阿蘇 一至三滴(〇・〇六至〇・一八)

【處方】幾阿蘇十滴(〇・六西西)龍膽草酒一

錢(四西西)加斯加拉流膏二錢(八西

西)水三兩(一〇〇西西)

右均六次用之，一日三次，食前、

(治食滯、不消化)

食鹽 *Natrium Chloridum* 一名鈉氯

鹽即鹹鹽

【性狀】此藥由海水製出。為白色結晶之小粒。

味鹹。

【功效】亦為殺菌之要藥。並能殺蟲。

【主治】能補血。如血流過多。用此藥製成水

劑。射入靜脈內以補血。並有助消化

之功。多服能吐。能解酸。如肛門內

有蟻蟲。以此藥水射於肛內洗之。

【用量】食鹽 十至六十厘(〇・六至四瓦)

【處方】食鹽八厘(〇・五瓦)汽水三兩(一〇〇

西西)

右每次用十兩，射於靜脈內，(有補

血之功)

漂白粉 *Calc Chlorinata* 又名氯氣灰

晒粉 銻氯粉

【性狀】此藥乃熟石灰與氯氣。製成白色細末。

水・酒均能溶解。

【功效】不可內服。為祛臭殺菌劑。亦能漂白。

【主治】凡廁所陰溝之污穢地。以此藥撒之。

能消毒殺菌。又大便器痰盒內。亦可

撒之。又製成水劑。可宜菜蔬之消毒。

近來醫院多用此藥與硼強酸製成猶少魯藥水。爲洗瘡最要之藥。

【處方】漂白粉二錢(八瓦) 硼酸二錢(八瓦) 水四十兩(一一〇〇西西)

右待二十四點鐘、過淋卽妥、名爲猶少魯、(治各種膿瘡、潰瘍)爲洗滌劑、

昇汞 Hydrargyri Perchloridum 又名

雙降汞一名白降丹 過格魯兒汞

銻氟強塩

【性狀】此藥以硫化汞、與氯化鈉。依化學法製成。爲白色針形之小粒。體重而無味。水酒伊打均能溶化。

【功效】爲最有力之消毒藥。用於梅毒。頗有

效力。如服過量則中毒。先則胃痛、嘔吐、泄瀉。後則帶血。終致神經麻痺而死。解毒法、用鷄蛋白服後。再行洗胃。

【主治】濃溶液有腐蝕之能。淡溶液有收斂之功。可用於第二期梅毒。如潰瘡、及產婦之陰部狼瘡、贅肉、梅毒、潰瘍、陰虱、梅毒之眼疾。均可用之。但不可爲器械消毒。因其有腐蝕性。剝去外鍍之鏽。

【用量】昇汞 一厘十六分之一、至三十二分之一、

【處方】昇汞一厘、水五千滴、洗瘡用之、

【又方】昇汞一厘、水八千滴、洗眼用之、

過酸化水素 Hydrogen Peroxidum

又名氫上氧 氫二養二 氫養強治

【性狀】此藥是氫養二氣所成。爲無色之流質。

聞之無味。陰之略苦。

【功效】爲最優之殺菌免腐藥。但不可加熱、及

晒、或搖動。恐失其效力。如氫已

失。效力即失。與水無異。如試其力

存在否。可將試管置此藥一二錢。再

加過錳酸鉀少許。如自沸之方大。藥

力即存。否者已失。

【主治】消毒、免腐。如患膿瘡或瘰內生膿。

可將此藥射入穴內。當時放氫。有沫

噴出。將腐敗之物盡行除淨。如各種

瘡症、或整傷、耳炎、喉炎。洗之均

可。

【處方】過酸化水素三分、水七分。

右洗瘡、漱口。均可用之。

昇華硫黃 Sulphur Sublimatum 又名

昇硫舊名硫黃粉

【性狀】此藥以硫黃升煉而成。爲黃色之粉末。

有一種特味。遇火即燃。水不能化。

【功效】外用有殺菌之力。內服有輕瀉之功。

但大便常有臭味。不可與氯化鉀及硝

酸鉀混合。恐有崩炸之患。

【主治】內用、輕瀉。能令腸內之糞易過患處。

故能使糞軟。他類瀉藥不能治之乾燥。

此藥則可。如痔瘡刺癢、氣管炎之咳

嗽、與坐骨神經疼。服之均可。外用、製

成軟膏擦疥。使病者入浴後擦之。因疥疾乃一種寄生之蟲。分雌雄二種。雄在皮外易滅。雌在皮內難殺。故洗後用乾布擦乾塗之。則此膏深入患處矣。

【用量】昇華硫黃十至二十厘(〇.六至一.三)

【處方】昇華硫黃五分 華士林九十五分

右調爲軟膏。(治疥、或皮膚癢症)

魚石瀝 Ichthyolum 又名伊克度

依必知阿兒

【性狀】此藥由煤內蒸出。形如煤脂。爲黑色

黏性之流質。味如煤油。分爲二種。

一、鎗魚石瀝。一、鏗魚石瀝。水、酒

均能溶化。

【功效】能防腐、殺菌、消腫、收縮血管、止

痛、止癢。

【主治】用於淋巴腺炎、丹毒、橫痃、陽囊腫、

皮膚腫。及其他種腫痛。攤布上貼之

均效。對於各種風濕骨痛。及神經痛。

稀薄敷之。又癩泡、瘤、或癬、潰瘍、

及腸胃炎、腎炎、膀胱炎。服一至十

厘。婦人白帶下。製成帶藥插入之。

【用量】魚石瀝 一至十厘(〇.〇六至〇.六)

【處方】魚石瀝一錢(四瓦)酒精三兩(一〇〇

西西)

右調勻敷之。(能止痛、消腫、止癢)

松瀝 Pix Tigolia 又名木參兒

【性狀】爲黑赤色之流動體。

【功效】有防腐、消毒之效。與石炭酸相等。

【用量】合華士林配成軟膏。對於小兒白皮膚特效。其他瘡、癬等。亦可合他藥並用。

納透 (Zaplanol) 又名納夫魯

【性狀】此藥由納他連與硫酸強酸製成、爲白色結晶之末。無味。水·酒·哥羅方、伊打。均能溶解。

【功效】外用能殺菌。內用有免腐收斂之效。

【主治】如腸胃氣脹、或痢疾水泄、裝膠囊內服之。外用如癬疥、各種皮膚癢、寄生之症。皆可製成軟膏貼之。

【用量】納透 五至十五厘 (〇·三至一瓦)

【處方】納透十厘 (〇·六瓦) 華士林九十厘 (

六瓦) 調爲軟膏。

【又方】納透十厘 (〇·六瓦) 加斯大賊十五厘 (

一瓦) 吐根雜散十厘 (〇·六瓦)

右方分三包、一日服完、食前、(治

痢疾、水泄、能健胃)

石灰 (Lime) 又名錯弱藥

【性狀】此藥爲一種白石。以火煉成。未見水者爲白色之塊。見水者即鬆漲。

【功效】能殺菌、作腐蝕劑。

【主治】內服必用此藥。製成石灰水。胃中生酸者服之。有收斂之能。如腹痛作瀉。嘔吐不止。或孕婦惡阻服之均可。乳婦服之能長小兒之骨。外用、治疥。與硫黃合搽之。皮膚癢症、燒燙傷。與橄欖油混合敷之。

【用量】石灰水 半至一兩（一五至三〇西

西）

【處方】石灰水二分 橄欖油一分合之、

右合勻（上燒燙傷）

其瑣編 *Chrysarobin* 又名可利撒羅

並

【性狀】此藥產於南美洲、巴西國等處、所產

之樹。入藥用該樹之皮縫中所存之末。

與哥羅方加熱而得。爲黃色結晶之細

末。無味。水·酒·伊打均能化之。

【功效】不可內服。外用殺菌。

【主治】各種癬症。如金錢癬、牛皮癬。以此

藥製成軟膏。或水搽之均效。

【處方】其瑣編半錢（二瓦）水揚酸半錢（二瓦）

酒精三兩（一〇〇西西）

右合勻、（卽爲癬治水）

第十三章 清涼藥 *Temperantia*

凡藥能鎮靜血液之循環。減退體內熱度。而

使精神興奮者。均謂之清涼藥。

菓酸 *Acidi Tartaricum* 又名酒石酸

葡萄酸

【性狀】此藥由果實中取出。爲白色之塊。或

白色之末。味酸而涼。水·酒均能化

之。

【功效】用於各種熱病。有清涼止渴之功。

【主治】凡人染患各種熱病。服用此藥能解渴

清熱。與重碳酸鈉同服。有自沸力。

多服則吐。

【用量】菓酸 十至三十厘（〇・六〇至二瓦）

【處方】菓酸二錢（八瓦）重碳酸鈣二錢（八

瓦）水六兩（二〇〇西西）

右化勻、（能止渴、退熱）

檸檬酸 *Acidum Citricum* 又名檸檬酸

枸橼酸

【性狀】此藥由檸檬汁取出。爲白色之塊。味

酸。水・酒均能溶化。

【功效】有退熱、消渴之功。不助胃之消化。

【主治】用於（慢性癩麻質斯）肝變壞、及腸粘

膜炎。外用洗滌能止痛。

【用量】檸檬酸 十至三十厘（〇・六至二瓦）

【處方】檸檬酸十五厘（一瓦）重碳酸鈣三十厘

（二瓦）橙皮糖漿一兩（三〇西西）餽水

十二兩（三六〇西西）

右合勻飲之、（解渴退熱）

薄荷冰 *Mentha* 又名薄荷腦

【性狀】此藥產於日本、中國廣東等處。是由

薄荷油內取出。爲白色針形三稜之條

塊。味香而辣。如有涼風。酒精、伊

打均能溶解。

【功效】有祛風止痛之功。亦能殺蟲。

【主治】如腸胃痛、鉤蟲、孕吐。及各種熱症

服之。能定痛、祛風。牙疼患處。

頭痛以此藥搽之。日本所製之仁丹、

寶丹。多合此藥爲原料。

【用量】薄荷冰 一至二厘（〇・〇六至〇・一二）

【處方】薄荷冰三厘（〇・一八瓦）重碳酸鈣十

五厘(一瓦)次硝酸銀十厘(〇・六瓦)
大黃末十五厘(一瓦)

右調合爲散藥、分三包、一日三次、
一次一包、食後、(能健胃、止痛)

薄荷油 *Oleum Menthae*

【性狀】此藥產於日本國、中國等處。入藥爲
該草之枝葉。用化學法蒸出。爲黃白
色之油。味香而辣。酒精能溶解。

【功效】有祛風、殺蟲、止痛之功。

【主治】腸胃疼痛。嘔吐服之止痛。牙痛以棉
花球蘸此油塞患處。頭痛搽之亦可。

【用量】薄荷油 一至四滴 (〇・〇六至〇・二
四)

【處方】硫酸鎂半兩(一五瓦)碳酸鎂一錢(四

瓦)薄荷油二滴(〇・一二西)水六
兩(二〇〇西)

右均六次用之、一日三次、食前、
(健胃止痛、改酸輕瀉)

第十四章 殺蟲藥 *Anthelm-*

intics

凡藥能殺腸胃寄生蟲類。如絲虫、蟯虫、
蛔虫、鈎虫等或麻痺之。均謂之殺蟲藥。

山道年 *Santoninum* 又名珊瑚簞

【性狀】此藥產於亞細亞、西域等處。由一種
花蕾製出。爲白色有光、結晶長方小
片。味苦。如見日光即變黃色。水、
酒、伊打·哥羅芳。均能溶解。

【功效】爲殺蟲之要藥。如服過量。視物黃色。

因將眼房水染黃之故。服毒量、肌肉顫動。昏迷、筋抽。小便先黃。後則紫紅如血。實非血也。因被藥所染之故。

【主治】專殺蛔蟲。無殺絲蟲之功。宜空心服之。遺尿症服此藥亦效。普通分劑有增目力之功。又與甘汞或乳糖同服。其效甚速。

【用量】山道年 三至五厘（〇・一八至〇・三）

【處方】山道年二厘（〇・一二瓦） 甘汞五厘（〇・三瓦）

右作一包服之、（空腹服）

【又方】山道年半厘（〇・〇三瓦）乳糖五厘（

〇・三瓦）共作一包、小兒服之、

右爲一包（小兒用）

【注意】本藥見光變黃。宜裝於黑色瓶中。

綿馬流膏 *Extractum Feltis Tigridum*

Idum 又名非利馬流膏

【性狀】此藥產於英國、亞非利加等處。入藥用該草之根。製成流膏。呈深綠色。味苦而辣。

【功效】爲殺絲蟲之要藥。

【主治】專殺絲蟲。其服法在末服之先。必禁食半日或一日。使蟲在腹中無食物之助。早晨服一次。過半點鐘再服一次。再服瀉藥一劑。則虫必由大便瀉下。當看其有頭否。如無頭可再服之。否者恐其再生。其頭微細而尖如線。一閱便知。

【用量】綿馬流音 十五至六十滴（一西西至

四西西）

洋蘇冰 *Thymol* 又名知母兒

【性狀】此藥由洋蘇油製出。爲白色結晶透光之塊。味辣而澆。酒精·伊打俱能溶之。

水不能化。

【功效】有殺蟲免腐之效力。

【主治】能殺鉤蟲（又名十二指腸蟲）及疥蟲

（又名袋蟲）如皮膚痒、或燙傷。製成百

分之二軟膏敷之。瘡症用此藥洗之。

【用量】洋蘇冰 三十厘至四十五厘（二瓦至

三瓦）

【用法】在晚臨睡時。先服蓖麻油半兩。（一

五西西）次日早晨。服洋蘇冰三十厘。

（二瓦）後六點鐘。再服硫酸鎂半兩。

（一五瓦）三時後蟲即瀉出。病者或

醫士即時檢查便出之虫體。視其有無

虫頭在內。如無虫頭。再服洋蘇冰三十

厘。（二瓦）待五六點鐘。再服硫酸鎂

一劑。至見虫頭爲止。

第十五章 催吐藥 *Emetics*

吐根末 見祛痰藥

硫酸銻 見收斂藥

硫酸銅 見收斂藥

明礬 見收斂藥

芥末 *Sinapis Alba*

【性狀】此藥產於中外各國。是一種芥菜之子

作成。有黑白二種。爲黃色細末。味

辣。

【功效】有感冒嘔吐之功並有消炎之效。

【主治】用於吐藥。服此藥一兩。能惹胃。令人嘔吐。

人嘔吐。

【用量】芥末 半至一兩(一五瓦至二〇瓦)

鹽酸阿普莫非 *Apomorphinae Hy*

drochlor 又名阿普莫非氫鹽或鹽酸亞

剝莫非。

【性狀】此藥以莫非與鹽酸製成。為灰白色之

細末。見光即變為綠色。水・酒均可

溶解。

【功效】有催吐之功。如服過量。則神識不清。

全身麻木。四肢抽搐。因此藥有感延

腦之功。故能作嘔。

【主治】為吐藥、無論服何種毒物。用此藥或內服、或注射皮下。均能救治。

【用量】鹽酸阿普莫非一厘十分之一、(〇・〇

〇六)或一厘五分之一、(〇・〇一二

瓦)

第十六章 改酸藥 *Antacids*

凡藥能解胃與膀胱之酸性者。俱謂之改酸藥。

重碳酸鈉 *Natrium Bicarbonas* 又名

双炭養儲 蘇打 重碳酸那篤個謨

重碳酸曹達

【性狀】此藥由碳酸鎂與炭養氣製成。為白色

之細末。味鹹。

【功效】為改酸之上品。

【主治】凡腸胃酸酵與甘汞同服。又關節痺症、

尿酸、膀胱炎、及消化不良亦服之。
而口炎、喉炎。則製成水劑漱之爲宜。

【用量】重碳酸鈉 十至三十厘（〇・六至一瓦）

【處方】重碳酸鈉二十厘（一・三瓦）水揚酸鈉十五厘（二瓦）甘草散三十厘（二瓦）

右方均三包、一次一包、一日三次、食後、（能改酸健胃）

石灰 見防腐篇

第十七章 調經藥 *Emmenagogics*

凡藥能令婦女月經調和。經期如常者。皆謂之調經藥。

洋斑蝥 *Cantharides* 又名堪他利斯

西藥實驗大全 藥物學

【性狀】此藥產於西班牙、意大利、俄羅斯、中國等處。是一種黑色虫。有黃橫紋。味臭而惡。內含一精。名斑蝥精。

【功效】敷於皮膚。刺戟力甚強。該處必生小泡。服中分量。胃經覺暖。卵巢子宮受激最大。故能調經。服毒分量。膀胱尿管作痛。陽莖強直。以致膀胱及腎發炎。或尿血。小便少或閉止。再重者尿道陽莖有生瘡之患。

【主治】利尿調經。有激子宮之力。如處女經閉服之有效。膀胱能利尿。陽莖舉硬而痛。服此酒半滴。久白濁亦效。外用各種積液之症。敷之能生泡。

【用量】洋斑蝥酒 半至五滴（〇・〇三至〇・

三)

洋斑蝥粘膏 帖之外惹、有生泡之力、

【處方】斑蝥酒五滴(〇·三西西) 龍膽草酒二

錢(八西西) 關羊花酒一錢(四西西) 水

三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、(能調經

利水)

蘆薈鐵丸 *Pilula Aloes et Ferri* 舊

名阿羅鐵丸

【性狀】此藥以阿羅與鐵。製成黑色丸。每丸

五厘。

【功效】輕瀉調經。

【主治】貧血、萎黃病、消化不良、經閉、月

經不調。

【用量】蘆薈鐵丸。每飯後一九。一日三次。

過錳酸鉀 見防腐篇

第十八章 外惹內效藥

Counterirritants

凡藥使皮膚發紅而起水泡。或潰蝕。或解散發炎及充血之處。或排除或吸收炎處之滲液。俱謂之外惹內效藥。

松節油 見利水藥

芥末 見催吐藥

洋斑蝥 見調經藥

第十九章 止血藥 *Hæmost-*

ypica

凡藥能使小血管收縮。而免出血者。謂之止血藥。

麥角 *ergot* 又名麥奴 耳聾達 了葛

【性狀】此藥產於西洋各處。爲一種黑色麥穗之寄菌。味苦略辣。入藥用其製成麥角流膏(東名麥角越護斯)

【功效】爲止血之良藥。如服中量。有增血壓之效。因其能激心臟。使尿管縮小。心力充足。且有激子宮肌絲之力。使子宮縮小。

【主治】用於各種咳血、吐血、子宮出血、經旺、血崩、鼻衄、瀉血、痢疾、尿血、肛門出血、痔瘡流血。及其他一切流血之症。均可用之。如孕婦臨產之際。胎頭將過會陰處。服此流膏半至一錢。

(二至四西西)能縮子宮。使胎易出。

並免流血及產後血崩之患。如已流血。服半至一錢。待一點鐘即癒。如胎頭未至會陰部用之。子宮縮小。胎不易出。母子俱有危險。其他如子宮未開、陰道狹窄、或宮內積有血塊、胎膜未下、孕婦等。均不可用。

【用量】麥角流膏 半至一錢(二至四西西)

麥角射藥 五至十滴(〇·三至〇·六)

【處方】麥角流膏二錢(八西西)過氫化鐵酒半錢(二西西)水三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食後用、(能止血)

鹽酸阿得列那林溶液 Tiquor

Adrenalin Hydrochloricum 又名

腎上腺精氣鹽液

【性狀】此藥由羊副腎或他畜類之副腎製出。

亦有人造者。究莫如天然之效。呈灰

黃色之細末。如化爲溶液。則成白色

無味之水。

【功效】爲最效之止血藥。如敷於皮膚之粘膜。

能使小血管縮小。血不能入。使粘膜

發白。如藥之效力已過。則血運如常。

而血管仍不鬆大。故爲止血之妙藥。

【主治】止血、用於小脈管流血。或受傷之輕微

流血。耳鼻喉之割症。結合膜炎。結

合膜粒炎敷之均可。割症後腦力衰弱

射之。有強心之力。

【用量】阿得列那林溶液 五至十滴(○·三至

○·六)

【處方】阿得列那林溶液一錢(四西西)鴉片酒

半錢(二西西)水三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前、

(治各種流血)

第二十章 潰藥 (Caustics)

凡藥能毀傷皮肉。侵蝕一切之腐質者。統謂之腐蝕藥。

苛性鉀 Kalium Hydroxidum

【性狀】此藥是鉀類之原質。爲白色結晶條塊。

易收水氣。

【功效】腐蝕性頗大。

【主治】潰瘍、瘰癧、膚疽敷之均效。惟不可

內服。

硝酸 Acid Nitricum 又名硝強酸

硝強水 氫強酸

【性狀】此藥以硝酸鉀與硫酸製成。爲無色之流質。味酸。宜裝於黑色瓶內爲要。

【功效】如以此酸之濃者。接觸皮膚或粘膜上。大有潰力。多加水敷之。則有刺激性。內用小量。有激腸胃生液之能。如服毒量。腎大受惹、腸胃發炎、便尿帶血、口喉與腹發劇烈之疼痛。遂至死亡。解毒、用鹼類藥服之。

【主治】內、用於消化不良。因能激膽多生膽液之故。外用、如梅毒、下疳、贅肉。用淡者敷之。又痔瘡流血。有用此藥半

至一錢、加水一磅、敷於患處者。

【用量】稀硝酸 三至十五滴(〇·一八至一兩西(內服多用此藥))

氯化鋅 Zinc Chloridum 又名鋅綠

鉍氯鹽

【性狀】此藥乃由氯化鋅水中。製成白色似針之結晶。透空氣則變潮濕。味辣。

【功效】有殺菌之力。潰性甚強。毒力亦大。不可內服。

【主治】用此藥一厘加水一厘洗眼。或洗淋症。膚疽症敷之亦佳。但不能內服。

【處方】氯化鋅一錢(四瓦)澱粉三錢(一二瓦) 鹽酸叩卡因半錢(二瓦)水二錢(八〇) 右作成糊藥、(治皮疽症、甚效)

第二十一章 潤藥 Demulco-

ants

凡藥能阻止物質之刺激及保護粘膜者。謂之潤藥。

白糖 Saccharum

【性狀】乃由甘蔗或糖蘿蔔製出。為白色之小粒。或白色細末。味甜。用之能解他藥之惡味。且免腸胃之酸酵。

糖漿 Sympus Simplex

【性狀】用白糖與水煉成濃厚之漿。為佐他藥調味之用。

乳糖 Saccherum Lactis

【性狀】此藥由牛乳中製出。為白色細末。味甜。水·酒均能溶之。

【功效】有利尿之功。兼助他藥調味用之。亦能輕瀉。

【主治】能利尿輕瀉。如小兒消化不良者服之。能顯輕瀉。服由道年可用此藥合之。

能視大其分量。

【用量】乳糖 六十至一百二十厘（四瓦至八瓦）

蒸溜水 Aqua Destillata 又名汽水

【性狀】此水以蒸氣製成。為最純之水。無他雜質。以為溶化各種藥品。免其體質改變。

澱粉 Amylum 又名小粉 或稱澱粉

【性狀】以麥粉、包米粉、小豆粉、精米粉製成。其分別雖異。而功效均同。

【功效】有刺激性之藥。用此藥佐之。有收斂及滑潤之效。

【主治】配製各種外用之藥散。爲攪合料。用於濕皮症。與亞鉛華、硼酸合之。中藥毒服之。能解毒。

【用量】澱粉 一至二錢(四至八瓦)

白樹膠 *Acaciae Gummi* 又名亞拉伯

樹膠 亞拉昆謹謨

【性狀】此藥產於亞非利加、亞拉伯、印度等處。入藥用該樹流出之汁。凝結成塊。黃白色透光。水能化之。

【功效】能潤皮。

【主治】滋潤皮膚。能作調和藥又能作洋漿糊。

甘油 *Glycerinum* 東名偏里設林

【性狀】此藥由脂類蒸出。狀如青油。味甜。水、酒均能化之。

【功效】有免腐潤皮之功用。

【主治】大便乾燥。服一至二錢能輕瀉。耳聾、疔滴之。能使柔軟。各種熱症。舌乾、口燥。或口舌炎。敷之均宜。

【用量】甘油 一至二錢(四至八西西)

【處方】甘油二錢半(一〇西西)

右射大便內。(治便秘)五分鐘糞即瀉出。

橄欖油 *Oleum Olivae* 又名阿列布油

【性狀】此藥產於歐洲、南方。自洋橄欖製出。爲淡黃色之油。

【功效】有輕瀉及潤皮之力。

【主治】外用與石炭水混合。治燒燙傷。內服、

能輕瀉。

【用量】橄欖油 半至一兩（一五西西至三〇

西西）

華士林 Vaselineum

【性狀】此藥由煤油製出。分黃白二種。

【功效】專配各種藥膏。且有潤皮之效。

叩叩脂 Oleum Cacao

【性狀】此藥為淡黃堅硬之脂肪。為配藥之機

合料。製成肛彈或軟膏用之。

火棉酒 Colloidum 又名關老殿安 古

魯胃膜

【性狀】此藥以火棉與伊打及酒精製成。為白

色透光流質。味如伊打。

【功效】有收縮力。能保護傷口。

【主治】用於各種傷口敷之。有斂澀力。並使

皮膚收縮。以免空氣侵入傷口。

巴拉粉 Paraffinum 又名煤油蠟

【性狀】此藥自煤油中化出之。

【功效】為潤皮之藥。或與他種藥製成軟膏用

之。

第二十二章 新藥類（內含

注射藥類）

新藥者。近世紀以來。新創製之藥種也。其

藥種之配製。有用化學法者。有由動物體內

各腺質配成者。有由植物體中抽出有效之成

分製出者。種類繁多。不暇枚舉。茲將常用

有效之劑。記載若干。其中有供注射用者。

有供內服或外用者。有供注射而兼內服者。若詳細披錄。大費紙墨。亦無關於事實。故簡錄該藥之性狀功效、及主治病症。而其用法。則附註於用量格內。茲先將注射法之大要簡述於次。

注射法大意

普通注射手續 靜脈注射針常用二〇西

西。皮下注射針常用二西西。用時先將注射器及針頭。置消毒鍋內。加冷水煮沸消毒後。將針管取出。裝上藥液。務必將管內空氣泡完全頂出。然後注射。而注射六〇六方法。比較詳細。先將藥瓶用酒精綿揩拭後。再以試筒裝蒸溜水。（亦必煮沸消毒）內加食鹽少許。待溫度

相宜時。將針頭安於注射器上。後裝蒸溜水一〇西西、或一五西西。再將六〇六藥瓶頂尖拉斷。將針管之水射於瓶內。藥即溶化。連續吸入注射器內。如有未化盡者。復將注射器之水。再射入瓶內。反復吸入注射器內。以藥化盡為止。而備施行。注射除六〇六、一二〇六、九一四外。其他注射藥。均是配成之水。盛瓶裝之。用時先將注射器消毒後。即將瓶頂割斷。以注射針吸入。遂即施行注射。倘藥液因氣候寒冷而凝結。可以溫水溶解而後注入之。

皮下注射

其部位在肘節上部外側。或胸前大腿內面均可。先以酒精或海鹽酒擦

淨注射處。然後將藥裝注射器內。頂盡空氣後再向皮下射之。射畢以絆創膏帖之。

筋內注射

在大胳膊外側或臀部肌肉。以酒精或海碘酒擦淨後。向肌肉內射之。

須避神經及血管。針眼用絆創膏帖之。

靜脈注射

注射靜脈須特別注意。其位置在肘節屈曲處。先用酒精。或海碘酒擦

淨。然後用橡皮帶將肘節上部束緊。令

靜脈脹起。同時令患者手掌中握物。盡

力緊握。俾脈管更行膨脹。使不移動。

然後手持裝藥之針。向脹起之靜脈。徐

徐刺入。必須不偏不斜。恰好穿入脈管

內。如見血入針筒。則知針頭已入血管內

矣。此時當放開皮帶。緩緩注射。或者針頭未到血管之內。不見回血。醫師當不慌不忙。酌量刺扎。必須見有回血。方能注射。有時初學注射。將血管雙層刺

透。雖見回血。不可放鬆。必將針拔出。另行射入。並宜注意患者面容。如有面

白、眩暈、出汗等不安狀態。即時停止注射。注射完畢時。針眼以絆創膏帖之。

嘉色鈹 *Caspi's*

【性狀】為用特別方法。所造之鈹化合物。其

形狀同於他類鈹製劑。係一種含鈹油

液。

【功效】初期梅毒注射二三次即癒。下疳橫痃等症。或第一二期梅毒。亦不過多注射

幾次。十餘針後必可收效也。

【主治】各期梅毒。凡用砒汞劑不收效者。可
以此藥代之。

【用法】此注射液每管分一五·〇及五〇·〇二
種。用時將瓶搖勻後。注入肌肉內。

緊避血管。以免中毒。成人初次〇·

五。每隔二三日一次約一〇。總量約

達一四·〇至一五·〇。幼童按其年齡

遞減。總量不過一〇至二〇爲要。

霹藍密藤 Pyramidon

【性狀】此藥乃由安替非林依化學法。製出白

色結晶之小粒。味苦。水八十分酒精

四分。俱能溶藥一分。

【功效】爲退熱之良藥。因其退熱力。與生理

天然退熱力相同。功效迅速。性質和
平。且能止痛。無異外危險。並不能
損傷血液。及心·腎·腸·胃等臟腑。凡
一切熱症。均可用之。或各種疼痛。
均有特效。

【主治】頭痛、牙痛、神經痛、腰痛、骨節痛、

皮肉痛、婦人經痛、癱瘓、麻痺作痛、

胃腸氣痛、膽石痛、刀傷痛、肺癆潮

熱、關節不利、肋膜炎。及一切傷

寒、感冒、惡寒發熱等症。均可用之。

【用量】每日三次、每次五厘、(〇·三瓦)茶水

送下、治各種疼痛、

【處方】霹藍密藤二十厘(一·三瓦)大黃糖漿

四錢(一六西西)餾水四兩(一二〇西西)

右方混合、每二點鐘服一次、每次

一匙、(治四肢痛、頭疼等症)

【又方】霹藍密籐五厘(〇·三瓦)加非精半厘

(〇·〇三瓦)

右作一包、每頭痛時服一包、

蘇潑拉來寧 Syprarenin

【性狀】此藥乃由副腎內分泌液製成。呈結晶

白色之小粒。水不易化。故用時特購

製成之溶液。或用易化之片均可。

【功效】有收縮血管、增加血壓、及強心、止

血之用。比阿得列那林高出萬倍。為

防虛脫、養精血最良之藥。如用此藥

粉。極易受潮變腐。故多用此藥製成

千分之一溶液。內服注射均可。

【主治】內服、治腸胃出血、痢疾、傷寒、便血、

肺病、吐血、產婦嘔吐。皮下注射。

能治風疹、哮喘、血虛、靜脈注射。

可以強心、止血、防虛脫。為救急之

要藥。又能為局部止血之用。使一部

分之血管。完全收縮。該處皮肉。全

然無血。用力時可免失血。如眼發紅。

用淡溶液點之。能立刻使紅退盡。眼

白如常。但此不過一時之局部止血作

用。對於一切虛脫沉陷之症。雖脈絕

肢冷。用此溶液注射於心包內。能令

復活。

【用量】蘇潑拉來寧溶液 千分之一者、每次

用十滴、(〇·六西西)注射皮下、或靜

脈內、

【處方】蘇潑拉來寧溶液七十五滴（五西西）糖

漿五錢（二〇西西）餾水三兩（九〇・〇）

右方均六次用之，一日三次，食前、

（治各種出血症）

【又方】蘇潑拉來寧千分之一者七十五滴（五

西西）食鹽水百分之一者五錢（二〇

西西）

右混合後、內服或外用均可、

美盧白靈 Meclurin

【性狀】此藥是白色結晶之粉末。酒不化。水易

溶解。又製成黃色溶液爲注射用。

【功效】性極平穩。雖用大量。亦無危險。有

心臟病者亦不禁用。不防胃之功用。

西藥實驗大全 藥物學

專治一切風濕之症。比水揚酸、水揚

酸鈉、沙婁等祛風藥。較強萬倍。

【主治】風濕疼痛、全身骨節肌肉疼痛、腰腿

酸痛、腿脚不利、頭痛、各種神經痛、

傷風、肺炎、濕疹、肺癆。均有特效。

兼可退熱。

【用法】用於關節痛、肌肉痛、各種痛風等症。

每日三次，每次十五厘。（一瓦）如肺

癆、肋膜炎。可用小分量。每次服七

厘半。（半瓦）能退熱止痛。以靜脈注

射最爲有力。其注射分量。每一日或

三日注射一次。每次十五厘（一瓦）或

三十厘。（二瓦）皮下、肌肉注射均可。

最好用製成之溶液盛於小玻璃管內。

每管十五滴。(一西西)

洒爾佛散 Salvarsan 又名六〇六

【性狀】此藥爲砒質製成。乃德國醫學博士艾利士同彼得亨兩博士所發明者。而哈太博士施行動物試驗。因爲試驗到六百零六次。方得完全效果。故此名六〇六。爲黃色細末。有特別之味。水易溶解。

【功效】殺菌免腐。及治各期梅毒。

【主治】爲治梅毒之聖藥。無論一期、二期、三期梅毒。以及梅毒變症。用之無不立癒。如梅毒性脊髓瘻、梅毒癰瘻、梅毒性癩癩、或孕婦乳婦梅毒、遺傳性梅毒、回復熱、瘧疾、天疱瘡、猩

紅熱、天花、梅毒癩。凡一切螺旋之菌所致之症。皆可用之。

【包裝】有一號(即〇·一)二號(即〇·二)三號(即〇·三)四號(即〇·四)五號(即〇·五)六號(即〇·六)六種、均裝於玻璃管內、

【用量】女用 一瓦之十分之三(〇·三)
男用 一瓦之十分之四(〇·四)

每次至多不能過半瓦。即(〇·五)如身弱、或心病、或神經中樞病者勿用。或用最小之量。一瓦之十分之二。或一瓦十分之三。倘能擔負小量。數日後再行第二次注射。或七日亦可。此爲老六〇六用法。不及新六〇六(即

九一四) 簡便。故老六〇六。已無發售處。

【外用】如遇身上潰亂。可作敷藥。或和華士林。以一與十之比較。作成膏藥敷之。如喉頭潰爛用之亦效。

【防患】注射後。患者因之頭痛。宜服蘇藍密簾五厘。倘血壓低降。宜用蘇潑拉來寧半瓦或一瓦。行筋肉或皮下注射。

【禁用】如有腎臟炎、血尿、心臟炎、腦膜炎、及烈性黃膽病等。均不宜注射。

新洒爾佛散 Neosalvarsan (新六〇

六) 又名(九百一十四)

【性狀】此藥爲草黃色細末。分德製·法製兩種內含砒質百分之二十。有特別之味。

屬中性。易溶於水。遇空氣即起養化作用。而增加其毒性。隨製隨用。不宜久置。故此藥裝於真空玻璃管內。週圍嚴密封固。恐其與養化合。故開瓶即用。不可耽擱。如破管或餘剩之藥。立即棄之。勿用爲要。

【功效】殺菌、免腐、各期梅毒。

【主治】無論一期、二期、三期梅毒。以及梅毒之變症用之。均能藥到病除。此外如瘰癧、回復熱、天疱瘡。均可注射。

【用法】靜脈注射。每於七日注射一次。

【包裝】分一號(即〇·一五)二號(即〇·三)三號(即〇·四五)四號(即〇·六)五號(即〇·七五)六號(即〇·九)六種。均裝

於玻璃管內。

【用量】按年齡而論。

- (1) 成人用一瓦十分之六(〇·六)或一瓦十分之七五、(〇·七五)
- (2) 婦人用一瓦十分之四五、(〇·四五) 或一瓦十分之六、(〇·六)
- (3) 兒童用一瓦十分之一五、(〇·一五) 或一瓦十分之四五、(〇·四五)
- (4) 嬰兒用一瓦百分之三、(〇·〇〇三) 或一瓦百分之七、(〇·〇七)

【禁用】與六〇六同、

洒爾佛散鈉 *Salvarsan Sodium* 又

名一千二百〇六

【性狀】此藥爲老六〇六與鎂。化合之改良製

品。是金黃色細末。有特別之味。水

易溶化。鹼性。內含砒二十。

【功效】同前。比老洒爾佛散、或新洒爾佛散。

功效均佳。

【主治】一期梅毒、二期梅毒、三期梅毒。及

回復熱、爛喉、楊梅癬、瘡疾等用之。

無不立癒。

【用法】靜脈注射。

【包裝】分一號(〇·一五)二號(〇·三)三號(

即〇·四五)四號(即〇·六)五號(即

〇·七五)六號(即〇·九)六種。均裝於

玻璃管內。

【用量】男人用一瓦十分之四五、(〇·四五)

至一瓦十分之六、(〇·六)

女人用一瓦十分之三(〇·三)至一瓦十分之四五、(〇·四五)

小兒用一瓦十分之一、(〇·一)至一瓦十分之三、(〇·三)

注射日期。約每距八日或十日注射一次。先以小量起。漸次加重。

【禁用】與六〇六同、

握母納丁 Omadin

【性狀】此藥乃德國摩西醫師。經數十餘年

經驗。始發明一種普徧免疫性注射藥。

能統治一切危險傳染病。為醫家不可

須臾暫離之萬應良藥也。內含三大刺

激要素。(一)為蛋白質。乃從各種非

致病之分裂菌體中提出。經各種動物

西藥實驗大全 藥物學

試驗証明。其防病免疫功效。靈速非常。且毫無弊病。(二)為類脂肪。乃從獸類膽液中取出。按脂肪治療。已有普徧免疫之功力。(三)為獸類脂肪。最富於感應性。能使身中生相當之免疫素。

【功效】本藥有統治百病之能。尙能喚起體中之普徧免疫素。使之抵抗力立增。元氣立旺。一切病患自然退却。如有危急之病。來勢凶惡。而診察一時未能確定者。用此藥注射。病勢立止。然後徐待病情判明。再施對症療法。

【主治】一切急性傳染症。如猩紅熱、感冒、肺炎、腦膜炎、傷風、傷寒、丹毒、

giraäphexamin

2 1 7511 7531

西藥實驗大全 藥物學

赤遊風、大頭瘟、疔瘡、走黃、血中毒、敗血症、產褥熱、小產、腐血、寒熱、麻痧、喉蛾、各種癰腫、無名腫毒、中耳炎、腹膜炎、胆囊炎等症。凡一切由鍊狀作膿球菌。所引起之惡症。無不能治。此外如眼疾、神經痛、坐骨神經痛。及其他各種疼痛。亦有奇效。

【包裝】每管三十滴（二西西）

【用法】肌肉注射。每日一次或二次。每次一管。成人小孩用量相同。可繼續注射。以愈為度。

康普樂 Comprat

【性狀】為靛藍密藤一分、與復倫泰一分化合

1117

而成之結晶體。有一定熔融點。

【功效】為止痛之特效藥。無副作用。

【主治】內外科、婦科、齒科、各種痛症。無不奏效。

【用量】每片（〇.五瓦）每次一、二片。茶水吞服。

脫呂帕弗拉文 Trypalavin

【性狀】為酸性化合物。呈紫紅色粉末。溶於水則成黃色。而煮沸而不變性。惟性畏光。故宜裝在不通光氣之帶色瓶中為宜。

【功效】殺一切病原菌。雖極稀薄之溶液。亦不失其殺菌能力。對於人體組織。無刺激性。亦無腐蝕性。故於注射消毒外。且能防腐。生肌。以促新肌之生

長。

【主治】各種急性傳染病。凡一切膿泡、濕疹、腫物、瘡癤、糜爛、毒瘤、膿漏眼、下疳等症。無不奏效。而特效者。爲男女之淋濁。確有藥到病除之效。又腦膜炎症。亦可用此藥注射之。

【用量】洗滌淋濁用二分之一、子宮頸撒粉用百分之五、洗尿道用千分之一、

靜脈注 用百分之一。每次五至十西。隔日注射一次。後有頭暈、舌熱情勢。須臾即散。故宜緩緩注射爲佳。

育維寧 *Juvenin*

【性狀】爲砒、與士的年、及精製育亨賓三藥。

合劑而成。

【功效】補腦、固精。爲壯陽種子之良藥。

【主治】情慾不振、陽痿、遺精、宮冷不孕、

月經不調、精神恍惚、腰酸腳軟諸症。

【用量】內服每日三片。在午後晚間。注射每

次一支。

阿盧門奴耳 *Alumol*

【性狀】白色細末。能溶解於水及甘油。不溶於酒精。

【功效】有收斂、清毒、殺菌之力、（專能長

皮）

【主治】外科用洗滌。婦科用作帶藥（子宮內

膜炎）又男女白濁亦效。

【用量】粉末、溶液、或油膏。隨症而異。

羅瓦而精 *Novalsin*

【性狀】此為水楊酸最新之製劑。呈白色結晶

粉末。易溶解為溶液。微黃色。性質

和平。無副作用。

【功效】有極大之鎮痛力。並能退潮熱。

【主治】急性關節炎、風濕、骨痛、神經痛、

頭痛、腰背痛、感冒、肺炎。以及結

核病之潮熱。忌煙時之腰腿疼俱效。

【用量】內服〇·五至一·〇。小兒減半、又皮

下或肌肉注射。每次一支。(一西西)又

靜脈內注射。(急性關節炎兼高熱者)

每次注射(五〇%)之溶液。一至二西

西。每日一二次。

奧倫 Aolan

【性狀】本品以乳漿製成。純白無味。成流動

體。容易發酵。故宜置於冷暗之處。

【功用】有喚起全身杭毒素。消散潰瘍、膿腫

之功。

【主治】橫痃、(一二針即可消散)疥癩、天疱

瘡、及其他形成膿疱癢癢之症。均可

奏效如神。

【用量】有二西西、五西西、及一〇西西三種。

二西西者注射真皮表皮之間。務噴起

一泡。方不失藥之效力。五至一〇西

西者。注射肌肉內。(皮下無效)以臀

部左右及大腿內側為良。

洒利汞 Salyrgan

【性狀】色白無臭。呈細結晶粉末。易溶於水。

其溶液為鹼性。現製有已經消毒之製

成藥液。(百分之十)每次一西西或二西西。乃專供靜脈注射用之水銀劑也。

【功效】除能搜滅菌毒外。並有利尿之效。

【主治】與六〇六混合注射。除治第三期梅毒

外。又治水臟症。

【用量】行靜脈注射。每星期二次。

【禁忌】有腎病或心臟炎者。不可用之。

赫破弗辛 Hypophysin

【性狀】由腦下垂體中製出原質。溶合十倍食

塩水中而成。乃無色透明之液體。

【功效】爲最效之催生藥。有喚起陣痛、增進

子宮收縮之力。並於強心救急時。亦

常用之。

【主治】催進分娩。(產道開張已久。而不下胎

用之)並預防失血。並制止產後血崩。

此外並治一切崩漏。及月經不調之婦

女。

【用量】皮下或肌肉注射用。每次〇·五至一

瓦。若以本劑〇·二加蘇潑拉來寧溶

液〇·八合用。可止血救急。

梯烏新 Theocin

【性狀】此藥又名醋酸化茶精鈉。呈白色粉末。

反應鹼性。內含茶精六十五成。

【功用】利尿逐水。增加排泄量。而無損於腎

臟。並有強心功效。

【主治】各種水腫臃症。無論爲心腎疾病。均

可治愈。

【用量】每日一至二片。每片〇·一。飯後飽

腹時服之。以免嘔吐。

盧密拿 Urominal

【性狀】係尿素製品。在水中全不溶解。惟在淡鹼性溶液中。極易溶之。此藥粉之還潮性甚大。故封置不密。則易起變化。

【功效】有鎮靜安眠、平腦、止痛之功。

【主治】失眠、癲癇、抽搐、偏頭風。及一切神經病。較溴素製劑為優。

【用量】每次〇・〇五、至〇・一、至〇・四〇
注射用每日一次。

歐力新 Orelin

【性狀】本品為白色粉末。無臭無味。久貯不變。惟不宜熱。故宜貯於冷室。

【功效】在胃液中。大發展其能力。能增進食慾。完成消化作用。

【主治】消化不良。食慾缺乏。對於孕吐特效。

愛夫得靈 Eplhedrin

【性狀】本品有德國製及英國、日本製者。又稱麻黃素。為純白砂粒形結晶。亦有呈粉末狀者。

【功效】本品有舒解氣管枝筋肉痙攣之作用。故能使鬱痰易咯。

【主治】哮喘。

【用量】內服每〇・〇三、至〇・〇五。一日三四次。皮下注射用〇・〇三。(有製成之藥液)

雷佛奴耳 Iryanol

【性狀】爲鮮黃色結晶粉末。無臭氣。易溶於熱水。經煮沸不失效力。惟久受光線。則顏色變紫。

【功用】能殺各種化膿細菌。一切外科諸症。爲他種消毒藥所不能及者。即因其防腐力大。而無腐蝕性。不傷肌肉臟腑也。故行開腹手術時。常依賴之。

【主治】凡一切傳染汚毒之膿瘍、腫瘍、癰瘡、大癰、無名腫痛之類。皆能根本治癒。而婦科之乳癰。花柳科之淋濁。眼科之膿漏。亦得滴入或清洗之。要作軟膏。用百分之一。凡有腫、有痛、有膿之惡物。無不可以試用。洵爲外科

之聖藥也。

艾司摩列星 Asthmolytin

【性狀】爲一種脾質的精粒。與黏液質化合物成。

【功效】其效用以似愛菲特靈。能擴張及補助心臟與血管。

【主治】哮喘症。注射之立效。其他如心力猝衰。胸隔作痛、呼吸短促、及感冒、肺炎等。均可奏效。(止哮喘強於愛夫特靈)

【用量】每次一支。亦可連續注射二三次。小兒老人減半。行肌肉注射。緊避血管。恐有副作用也。

表飛明 Biofermin

【性狀】爲白色細末。含有多量之乳酸菌、及糖化菌。

【功效】能制止腸內異常發酵。兼有消化之功。惟逾一定菌類生活（通常爲一年）期間。則失其效力。

【主治】急慢性腸炎、瀉痢、便秘、鼓腸、消化不良、及赤痢、虎列拉、腸傷寒。又小兒消化不良、綠便等。

【用量】粉末每次五至十五厘。（○·三至一瓦）飯後服。本品與他藥配合。概無禁忌。誠佳品也。

加德明 Gadamin

【性狀】爲無色澄名之液體。稍有粘性。溶解天然樟腦而製出者。

【功效】有興奮、鎮靜之效。與普通樟腦之功效相同。

【主治】呼吸困難、肺炎、虛脫。並能咯痰、鎮靜。

【用量】注入皮下深程。或靜脈內。每次十五滴。（一西西）

喇爛好萌 Ovalonin

【性狀】由動物之卵巢中製出。其卵巢之濾泡液中。含有濃厚刺戟素。

【功效】此刺戟素。有促進子宮發育。及調整性的可能。

【主治】無月經、不妊娠、月經不調、月經痛、四肢冷感、月經閉止、乳汁減退、習慣流產、憂鬱、失眠等。

【用量】水溶注射液。可行皮下、或靜脈注射。

油溶注射液、可行肌肉內注射。

片劑、每次一至二片、

粉劑、每次可服〇·五至一瓦、

樂地儂 Iodion

【性狀】爲白色砂粒狀之粉末。易溶於水。

【功效】營養、強心、利尿、解毒。

【主治】腦病、尿毒、急性傳染病。凡病前或

病後營養不足。血液減少之人。皆可

用之。

【用量】製成五%溶液。每次用一〇西西。至

五〇·一〇〇·五〇〇·或一〇〇〇西

西。注射靜脈。又較濃之溶液。如注

入皮下。亦無疼痛或變壞之事。

本藥注射液。名號不等。細參其說明

施行可也。

奧保司太丁 Opostatin

【性狀】由動物之新鮮脾臟中。所抽出之內分

泌物而成。

【功效】止血。

【主治】臟器出血。(胃·腸·肺·子宮·膀胱出血

等)外科、耳鼻喉科之流血。產婦科之實

質性出血。及有習慣性出血等。

【用量】注射筋肉或皮下。每次二西西。內服

粉末〇·五至一瓦。片劑每次三至五

片。一日三次。冷水或溫湯送服。

巴苦諾恩 Pagin

【性狀】爲無色之注射液。呈中性反應。中含

塩規、咖啡印、及烏來唐等各成分。

【功效】有退熱、強心、利尿之作用。

【主治】流行性感胃、肺炎、瘧疾、扁桃腺炎。

及其他各種高熱性疾患。

【用量】大人用五西西一支者。行靜脈注射。

小兒或老人用二西西一支者。行靜脈

或筋肉注射。

阿爾細林 Alsin

【性狀】銀炭末一分、與塩化銀硅酸配合而成。

呈灰黑細末。無臭。

【功效】有強大之吸着作用。既制止細菌繁殖。

又能殺菌。

【主治】下痢、腸內異常發酵、及腐敗、鼓腸、

及其急慢性腸加答兒、赤痢、霍亂、

藥物中毒、胃酸過多等症。

【用量】一次量〇·五至一瓦。一日三次。多服

能至三瓦。又有與瀉劑(硫酸)連用之

時。小兒與碳酸鎂連用。

茂爾丁 Mytilin

【性狀】無色透明之液。由體內非病原菌中。

用特別操作之下抽出之。

【功效】認有顯大防禦力之蛋白質、及有同樣

機能之膽汁中的Lipoid。均含有抗毒

素。以利用之也。

【主治】急慢性高熱症、感冒、肺炎、麻疹、

產褥熱、子宮炎、敗血症、丹毒、赤

痢、膀胱炎、淋毒性副睪丸炎。及其

他原因不明之高熱性疾患。

【用量】每次一支二兩西

克療病 Kriobin

【性狀】爲松節油注射液。

【功效】對於全身組織。及體內各部細胞。有

極好影響。能促進抗毒素之發生。

【主治】睪丸炎後之硬結。（淋疾愈後睪丸變

硬者）有特效焉。此外對於橫痃、下

疳、癰腫、潰瘍、天庖瘡、子宮炎等。

均可用之。

咯維導爾 Kavidol

【性狀】此藥乃碘·鎂·與鈣·脂所製成。爲赤

色。分軟膏與坐藥兩種。坐藥形如子

彈。外包銀衣。

【功效】有止血殺菌之力。並有斂澁之效。毫

無刺激性。並能減去劇烈之疼痛、

【主治】一般痔疾。如痔核、痔出血、痔漏、

脫肛、或肛門破裂、肛門週圍炎、肛

門腫痛、及各種肛門之病症。均可用

之。

【用法】肛門外之痔瘡、用軟管敷之。每日一

次。肛門內痔瘡。可用本藥之坐藥。

先去銀衣、然後插入肛內。每日二三

次。每次一個。

阿妥媚諾哉 Atominose

【性狀】此藥乃由影牛草製出。爲黃褐色之細

末。無臭無味。

【功效】有收斂之力。且能制止發酵。免去腸

之蠕動。

【主治】急性慢性下痢、傷寒下痢、神經性下

痢、結核性下痢、腸出血、腸炎、消

化不良等症。

【用法】先服蓖麻子油或甘汞等瀉藥一劑。將

腸內之廢物排出後。服此以澀之。每

日三次、每次十五厘。(一瓦)

奶歐密魯欣 *Neomilchin*

【性狀】此藥是由植物中、用化學法製出、為

暗灰色之粉末。水·酒均不能溶解。如

遇鹼性液。則徐徐化之。

【功效】刺戟乳腺。而使乳汁分泌旺盛。不但

乳汁增加。即蛋白質及脂肪所含之量。

亦同時增加。

【主治】產婦無乳。

【用法】每日三次。每次四十五厘。(三瓦)食

後一小時服之。

歐益斯他普親 *Eristapin*

【性狀】此藥由鹽酸印達兒寧製出。為淡色之

粉末。並有製成之藥片。與注射液三

種。味苦。水·酒均能溶解。

【功效】有收縮血管之作用。故能止血、鎮靜、

鎮痛。

【主治】子宮出血、月經過多、膀胱出血、流

產後之出血、或月經閉止期之出血、

或咯血、衄血、腫瘍之出血。均可用

之。

【用法】對於月經過多。一日服三片至六片。

每片含量一厘。(〇·〇六)止血、用注射

液。每管內裝百分之十(即一〇%)的
溶液十五滴。(一西西)一次注射。外
用,以純品敷患處亦可。

【處方】歐益斯也普親十五厘(一瓦)肉桂散半

錢(二瓦)

右共爲九包,一日三次,一次一包、

食前,白糖水送下、(流血者用之)

愛太衣那克西路 Etainoxyl

【性狀】此藥乃由最純之錫製出。爲灰色之細
末。體重而無毒性。

【功效】專殺葡萄菌。頗有卓效。對於疼痛腫
脹之膿瘡。初腫者服藥後。自然消散。

化膿者則膿栓易出。並可減輕患處之

炎狀。

【主治】癰腫膿瘍、化膿性骨髓炎、化膿性中
耳炎。凡各種有葡萄狀球菌之瘡。均
可用之。

【用法】每日三次。每次七厘。(〇·五)加乳
糖服之。多少均可。

可羅那金 Calonasin

【性狀】此藥乃樟腦與食鹽水。製成白色滅菌
之溶液。盛於玻璃管內。

【功效】行血強心。

【主治】虛脫、肺炎、肺水腫、心臟虛弱、不
省人事。

【用量】凡一切緊急病症。均以此藥救急。行
皮下或靜脈注射。無論何種。每次注
射一管。

【包裝】第一號 $\%$ 、每管內裝三十滴、(二西西)

每匣十管、

第二號 $\%$ 、每管內裝七十五滴、(五西

西) 每匣五管、

第三號 $\%$ 、每管內裝二錢半、(一〇西

西) 每匣五管、

第四號 $\%$ 、每管內裝二錢半、(一〇西

西) 每匣十管、

鹽酸喜挪美仁 *Shinomenin Hydro-*

chlor

【性狀】此藥爲日本醫學博士石割仁三郎氏所

製。呈淺黃色。有粉末·片·藥水三種。

玻璃管裝之。

【功效】能殺菌、解熱、擴張血管。

【主治】急慢性癱瘓質斯、關節癱瘓質斯、筋

肉癱瘓質、神經痛、及肩痺、腰痛。

注射後立見奇效。

【用法】皮下注射。每日一至二次。每次十五

滴。(一西西)

【包裝】注射用 $\%$ 、每管十五滴、(一西西)每

匣五管、

$\%$ 、每管十五滴、(二西西)每匣五十

管、

【內服】粉末一瓶、內裝十五匣、(一瓦)每

次成人用量半匣、(〇·〇三)一日三

次、

片劑一瓶二十五片、或五十片、每片

含量半匣、(〇·〇三)每日三次、每

次二片、食間服。

希宜佐爾 *Chinisol*

【性狀】此藥以鹽酸規尼。作成白色之水。以玻璃管裝之。

【功效】殺菌、退熱。

【主治】流行性感胃、肺炎、結核熱、瘧疾、傷寒病、回復期之微熱。凡一切熱病。俱可用之。

【用法】用於流行性感胃、或瘧疾。在發熱前半點鐘。行靜脈注射。每日一次。每次一管。內裝溶液二錢半。(一〇西或二〇西)

【副作用】耳鳴、重聽、皮膚發疹。但此等病

狀。毫無危險。

【包裝】每匣五管、每管二錢半。(一〇西西)

地支他民 *Dithiamin*

【性狀】此藥由地支他民葉製出其精。爲白色之液體。

【功效】強心。

【主治】對於各種心臟障礙、心囊炎、心內膜炎、心筋病、急性肺水腫、氣管支炎。一切心臟病。皆可用之。

【用法】皮下注射內服。如遇緊急之時。可行靜脈注射。

【用量】每日三次。每次十五滴。(一西西)或(半西西)

滂濁溥清 *Pansepin*

【性狀】赤褐色粉末。有苦味。易溶於酒精或

蒸溜水。則呈黃綠色。

【功效】對於組織。有強大之滲透性。制止病

原菌之發育。殺菌防腐力亦強。

【主治】急性性淋疾。及各種傳染病毒。如腦

膜炎、敗血症、丹毒、肺炎、腦脊髓

膜炎、腎盂炎、膀胱炎、膽中疾患等。

【用量】注射靜脈用(○·五%)五至一〇西西

最多能用二〇至三〇西西、每日或隔

日一次、

【外用】防腐○·一%至○·一五%。洗滌用○·

○三%至○·○四%之溶液。本品與

武田牌伊斯拉文功效相同。

【外用】於發膿性之皮膚疾患。為塗布劑。濕

布劑、軟膏或洗滌劑。

嗎痲樂兒 Magrol

【性狀】以(一〇%)與(二五%)硫酸鎂溶液。

消毒製成之。

【功效】制止痙攣。消散浮腫。利尿排毒。

【主治】嗎啡中毒、(戒癮)子痲、(妊娠)子痲、

分娩子痲、產褥子痲(妊娠、浮腫、破

傷風、痙攣等。

【用量】嗎啡中毒。一日早晚二次。一次二〇

西西。(一〇%溶液)最初與莫非並

用。以後單注射本劑於靜脈內。最後

一日一次。連續注射。至癱斷為止。

其他症均注射靜脈內。亦有注射皮下

或筋肉時者。惟不免疼痛耳。

百克(安兒) Pectol

【性狀】無臭澄明。且帶微黃之溶液。呈中性或弱鹼性之反應。本液中含有3%水楊酸鈣、0.02%之規尼、及0.01%之碘。絕對無菌之注射液。

【功效】有解熱、利尿、消炎、止血、變化組織之作用。

【主治】肺結核、肋(腹)膜炎、急性性癆瘵質斯、鈣及水楊酸之適應症。

【用量】每次二〇西西。每日或隔一二日一次。有熱者多用。無熱者少用。

又本藥概無禁忌。同時與他種藥類用之。亦無不可。

寐底拿 Medinal

西藥實驗大全 藥物學

【性狀】爲白色結晶之粉末。微苦。易溶解於冷水中。

【功效】能安眠。

【主治】失眠症。因怔忡、神經衰弱、心悸、煩躁、譫妄、顛狂、以及各種頑瘡、或戒煙時之失眠。

【用量】內服一次0.3至1瓦或一至二片。直腸注射每次0.5加水一〇西西。射入肛內。皮下注射用製成溶液。(每管五西西) 每次一管。

佑苦勞民 Jukromin

【性狀】內含(2%)氯化鈣、及(5%至10%)氯化鈉之溶液。

【功效】有鎮靜、及消炎作用。

【主治】皮膚癢痒症、濕疹、蕁麻疹。及其他

癢痒之各種疾患。

【用量】專行靜脈注射。自(五%)五西西至一

〇西西起。至(一〇%)一〇西西止。

依症狀如何。每日或隔日注射之。

複方鹽酸愛梅親 *Emetin Hydro-*

chlor (即依米丁)

【性狀】此藥乃由衣必格有效成分。用化學法

製出依米汀。爲白色之細末。又以細

末製成溶液。裝以玻璃管內。施嚴重

的殺菌法。而製成之注射藥。

【功效】殺阿米巴菌。

【主治】阿米巴痢疾。

【用量】行皮下或靜脈注射。每一日一次。每

次一管。(含量十五滴)即一西西。

【包裝】每匣五管、每管一西西、含量有百分

之四、及百分之二兩種、

阿魯賴司卿 *Allisin*

【性狀】此藥用水楊酸、珈琲、碘、碘素等製

成之白色注射液。無副作用。誠理想

中治淋之聖藥也。

【功效】強心、利尿、殺菌、鎮痛、解熱。

【主治】淋毒性副睪丸炎、攝護腺炎、急性慢性

尿道炎、精系炎、膀胱炎、子宮炎、

卵巢炎、喇叭管炎、關節僵麻質斯。

其他如肺結核、肋膜炎、神經痛、喘

息、蕁麻疹等症。用之均效。

【用量】施以靜脈注射。切忌皮下注射。一次

一管。每管二十五西西。每日或隔日注射一次。但注射後二晝夜。不可用水銀劑。或酒爾佛散之靜脈注射。又於體弱、並年老血管硬化者禁用。

喜那脫那賓 (Cytotropin)

【性狀】爲透明鮮黃色溶液。內含烏羅特羅屏四十成、水楊酸鈉十六成、水楊酸鈉化咖啡素四成。其對於肌肉注射用者。每管加入(〇・八%)奴佛客因以止痛。

【功效】爲小便消毒之聖藥。統治泌尿器一切傳染病。如腎炎、膀胱炎之類。有強大利尿、殺菌、消炎之效。

【主治】一切尿道傳染病症。腎盂炎、膀胱炎、

攝護腺炎、男女急慢性白濁、肝膽炎症。

【用量】有靜脈注射及肌肉注射二種。注射時宜緩。普通每日或二日注射一管。(每一管五西西)直至尿液純清。及現酸性反應爲止。毫無不快副作用。小兒每次一西西。

亞陀方耐而 (Atoplantyl)

【性狀】注射用者。係紫黃色透明溶液。如因冷凝結。加溫即溶。而後用之。靜脈注射用者。每次一〇西西中。含亞陀方耐〇・五、水楊酸鈉〇・五。其肌肉注射用者。每次五西西中。除含上列二藥等量成分外。另加奴佛客因〇・

○四以止痛。

【功效】有止痛、消炎、退熱三大作用。

【主治】痛風、(關節僵麻質斯)最多每日二次。

立見功效。至慢者一星期可愈。其止痛功可存二十小時之久。此外各種神經痛、頭痛、牙痛、腰背痛、坐骨神經痛、三叉神經痛。皆見大效。此外各種傷風、感冒、咳嗽、咽喉諸症。亦可醫治。又能治慢性濕癢瘡癬。奏效亦速。

亞陀方 Atophan

【性狀】有藥粉藥片二種。其味苦。在水中不溶。但溶於鹼或酸中。

【功效】甚有溶解尿酸之性。能督促身中尿酸

之排出。故能理一切關節痛。有止痛、消炎、退熱、消腫之奇效。

【主治】尿酸性關節炎、關節僵麻質斯、淋毒關節炎。及其他各種神經痛。又眼耳鼻喉之炎性疾患。及皮膚癢者。亦可治之。

【用量】粉末每次一瓦。一日三次。最多者一日可服四至五瓦。片劑每個含量〇·五瓦。

海泡非生 Hypophysen

【性狀】透明無色液體。內含腦下垂腺後辦之有效成分。

【功效】有興奮及收縮平滑筋之作用。

【主治】催胎、起痛。並預防產後子宮流血之

症。此外兼治婦女平時一切崩漏、膀胱筋弛緩、(小便閉塞)並肥胖病、消渴病、(小便過多)遺尿、哮喘諸症。

【用量】行皮下或靜脈注射。每次一二管。(半至一西西)

凡拉蒙 Veranon

【性狀】此藥由佛羅拿耳及露藍密簾。用化學法製成。有粉末與片兩種。易溶於熱水中。冷水不化。

【功效】止痛安睡。

【主治】一切神經痛。如枕骨神經痛、三叉神經痛、坐骨神經痛、偏頭痛、各種骨痛、膽石、腎石痛、癰疽痛、外科手術後疼痛、創傷、骨痛。婦科及產科

之病。如經期疼痛、輸卵管及卵巢炎疼痛、生產時陣痛、小產疼痛。均有奇效。又如耳痛、喉痛、牙痛、皮膚濕疹癢等甚效。

【用量】每服一片至二片。(每片含量〇·四)粉劑每服五至十厘。(〇·三至〇·六)

阿卡奴 Arcanol

【性狀】此藥乃亞陀方及阿斯必林。用化學法製成。為鮮黃色粉末。製成藥片用之。名阿卡奴傷風片。不化於水。但投水中。即鬆散成糊。

【功效】退熱殺菌。

【主治】傷風、感冒、鼻流清涕、咽喉疼痛、咳嗽、喘息、惡寒、發熱、頭痛、神

昏、雙單乳蛾、耳痛、麻疹、猩紅熱、風濕骨痛、及一切感冒。均有特效。

【用量】每次一片。一日三次或四五次。每片

含量十五厘。(一瓦)

果乃金 (Gonarsin) 又名白濁漿苗

【性狀】此藥乃係白濁菌製成。將已死之白濁菌。化於消毒液內。

【功效】殺白濁之菌。

【主治】一切新舊白濁。(即淋)或白濁毒傳入筋骨。而骨節疼痛者有效。婦人白濁亦佳。

【用法】此藥係一種注射液。裝於玻璃管內。

用時搖勻。射於肌肉內。初次用時以小量。約十兆或二十五兆細菌。(漿苗

含菌多少、皆註明盒上)射入後二三日。再用大量。如係慢性白濁病。初次即可用二十五兆細菌射之。注射後略有寒熱。可以無慮。因身之毒菌將危之故。待三五日。再行注射。此藥與人完全無害。每次可注射一千兆菌或五千兆菌。又可行靜脈注射。但分量須小。可由二兆菌起始。

【包裝漿苗】每盒十管。每管內裝溶液十五滴。(一西西)管中含量。細菌十兆、二十五兆、五十兆、一百兆、二百兆、五百兆、一千兆。

烏來唐 Dreiban

【性狀】此藥可化水中。製成糖漿。無色無臭

結晶之粉片。味清涼而微鹹。水易溶

之。

【功效】能平腦、安眠。功效迅速而無毒害。

凡他種安眠禁服之藥。此藥能服之。

【主治】失眠不寐。或精神病症。無論老幼。

均可服之。能令失眠中安睡。精神平

穩。

【用量】將烏來唐 十五厘至半錢（一至二瓦）

化成溶液。每晚臨睡前服一大匙。一

小時後即能安眠。與天然無異。

【處方】烏來唐二錢半（一〇瓦） 橙皮糖五錢

（二〇西西） 溜水三兩（九〇西西）

右方混合，在臨睡前服一匙，（治不

眠症）

西藥實驗大全 藥物學

福賜透路 Instol

【性狀】此藥乃由遠志、桔梗、辛伊加等根製

出。爲黑色之流膏。味苦甜。

【功效】能潤肺、鎮咳、祛痰。使痰易於吐出。

【主治】凡氣管炎、肺炎、肺癆、痰喘。凡一

切成人及小兒咳嗽等症。皆可用之。

【處方】每日三次。每次十五滴。（一西西）如

與他藥同服。其效尤妙。

發多馨 Fucosin

【性狀】此藥爲日本醫學博士田口勝太氏。由

一種植物。依化學方法。抽出有效成

分。呈灰色粉末。水不溶化。有散末與

液劑兩種。

【功效】祛痰、鎮咳。

【主治】肺炎、肺結核、喉頭結核、喘息、百日咳等。

【用量】粉末一日三次。每次五厘。(〇・三)

液劑一日三次。每次十五滴(一西西)

【處方】發多馨一錢(四瓦) 福賜透路二錢(八

西西) 地麥他民一錢(四西西) 水加至

三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前、

(止喘、祛痰)

勞可淨 Leukogon

【性狀】此藥乃各種葡萄狀球菌漿苗。和以生

理食塩水。並加石炭酸於內。以資久

貯。

【功效】殺菌消毒。能使身內生抵抗素。以抵

抗葡萄狀球菌之發生。

【主治】各種瘡癤、疔毒、癰疽。及一切膿瘡。均有功效。

【用法】肌肉或皮下注射。皮下注射以肩胛骨下爲宜。肌肉注射以大股及上膊粗筋處爲宜。注射分量。皆註明管上。射時須將玻璃管搖動。使漿苗合勻。初時注射二十五兆至五十兆。乳嬰照此量十分之一。每星期注射二次。每次二十五兆。如針眼紅腫及寒熱。可停藥一星期。但此種病狀。乃身內病毒外出之佳兆。

【包裝漿苗】分A・B・C三種

A 每匣中十支。每支內裝溶液十五滴。

(一西西) 每支含菌有十兆、二十五兆、五十兆、一百兆、二百兆、五百兆、一千兆各種。

B 每匣中十支。每支皆含菌一百兆。

C 每匣中十支。每支皆含菌五百兆。

以上皆盛玻璃管。每管內裝十五滴。

(一西西) 一次用。

補爾蒙恩 *Plumon Comet*

【性狀】此藥是日本橋本博士所製。爲白色之液體。以玻璃管裝之。

【功效】滋補殺菌。

【主治】肺結核、肺炎、骨結核、淋巴腺結核、肋膜炎(濕性乾性)氣管炎、流行性感冒、肺膿瘍、肺壞疽、關節癱瘓質斯、

神經痛、紫斑病、尋麻疹、丹毒、腎炎等症。

【用法】靜脈注射。每日一次。每次二錢半。

(一〇西西或二〇西西均可)

【包裝】十西西一管、每匣五管、

二十西西一管、每匣五管、

滅菌鹽化鈣溶液 *Solutio Calcii*

Chlorati

【性狀】此藥以鹽化鈣加溜水而得。爲白色澄明之液。

【功效】有凝固血液之作用。且能使癥痕組織生成。使身體強壯。

【主治】肺結核內出血、丹毒、喘息、骨軟症、破傷風、及一切皮膚各症。

【用量】行靜脈注射。初用百分之一、或百分之二。每隔二日注射一次。若無有副作用。可用分量較多。百分之三、百分之四、百分之五者。注射當時。週身覺熱。不必介意。

【包裝】每匣五管。每管內裝溶液二〇西西。內中所含之藥力。有1% 2% 3% 4% 5%五種。

吉里那爾 *Sinal*

【性狀】此藥乃以精製無水硅酸鈉。製成百分之一透明溶液。無味無臭。

【功效】因人體內。均含此硅酸鈉。如老人動脈硬化。即因體內硅酸鈉減少之故。

【主治】動脈硬化症、腦溢血、心狹症、慢性腎臟炎、及血壓亢進等用之。減去頭

痛、頭暈、倦怠之苦。

【用量】一星期注射二次。每次十五滴。(一西)行靜脈注射。

滂篤賈斯叩普拉民 *Pantopon* *Scopolamin*

【性狀】此藥係羅氏由鴉片製出。為黃色之水。以玻璃管裝之。

【功效】能鎮靜止疼。

【主治】用於外科手術。作麻醉之藥。

【用量】在施手術前半點鐘。用二瓦十分之四。射於皮下或肌肉內。待半點鐘。已入麻醉暈眩之時。方可注射麻醉藥於患處。施行手術。如麻醉小。或麻醉效將過時。可再射一瓦十分之六即可。

(包裝)每盒五管。每管內裝溶液十五滴。(

一西西)勻二次用之。先用一西西十

分之四。後再用一西西十分之六。

嗎哪兒 Moral

【性狀】由一種植物中。抽出有效成分以製成者。爲微黃色透明之液。呈中性反應。有特異臭氣與刺戟性。味苦。

【功效】有鎮靜、鎮咳、強心、利尿之效。

【主治】嗎啡中毒、及屬於鴉片鹼基類誘導體之慢性中毒症。

【用量】用嗎啡一日〇・三以下者。每日注射

本藥一二次。使用嗎啡〇・三以上者。

以本品與嗎啡交互注射。漸至嗎啡脫

除。而仍不斷注射本品。注射部位。

以肘靜脈及上膊皮下均可。靜脈用五

西西。皮下常用二西西者。

嗎魯達因 Mordyne

【性狀】以化學法配成新藥。

【功效】有鎮靜、止痛、止嗽之功效。

【主治】爲嗎啡之代用藥。能治內外科各種疼痛。若欲戒除嗎啡者。代以本品注射。逐日遞減。即可安然斷癮。

【用量】每次注射一支。(〇・〇一)射入皮膚之內。不見效時。繼續注射之。亦無大碍。

維他康復 Vitcampher (最良樟腦

強心劑)

樟腦水 Aycampher (普通強心劑)

右二劑作用相同。惟普通樟腦水劑。先有少許麻醉。再現其強心作用。而維他康復。注射皮下後。直現其強心作用。並無麻醉性。統治血行器官各種之急性障礙。如虛脫、肺炎、肺水腫等。惟二者之價值相差懸殊。故並利用之。

安福消腫膏

Antiphlogistine (消

炎、鎮痛)

碍侖好司

Exilos (消炎、鎮痛)

右二劑之作用相同。均爲消炎、止痛之塗布劑。其法將藥盒用蒸氣蒸之。以後將盒蓋揭開。塗布一切炎症。如肺炎、肋膜炎、丹毒、淋

巴腺炎。各種腫物等。又對於熱性腫症。不加熱塗布亦可。此二劑藥價之差頗甚。故並錄之。

阿葛滿新

Asomenin (專治月經

不調、或無月經、注射五六次、即能大效)

西斯多滿新

Sisdomenin (能止血、

治月經過多症)

右二劑各有片劑與注射劑二種。每單用或二者並用。但每日服片劑二片。其注射次數爲五至十次。每二三日注射一次。

福眠錠

Phanokonn (安眠養神之妙

品)

巴畢通 Barbitone Sodium (全上而

價較廉)

右二劑爲安眠聖藥。每次半至一錠。

睡前服。最有效者爲福眠錠。而巴

畢通價值甚廉。其功效亦強於他種。

故醫院常喜用之。

汞銘 (即二百二十) 消炎(滲透性)

歐魯眉金 (オルメヂン) 消炎鎮痛

(碘、甘油製品)

右爲急性中耳炎之滴入劑。均有消

炎鎮痛之效。

血清療法

對於各種危篤而迅速之傳染症。最適用

血清、有不可思議起死回生之效。故近

時血清療法。已爲一般醫者所贊成。惟

血清注射時之注意事項。及保存方法。

不可不知。茲將一般常用之血清。恭錄

於次。

「注射時之注意」注射器以酒精或二百倍

石炭酸水。嚴重洗滌。再以百倍石炭酸

水、或滅菌食鹽水洗之。注射後嚴密封針

孔。以火棉酒或貼以大塊絆創膏。

「血清之保存法」(一)血清見日光則變

質。故應放於冷暗處。(二)各種血清如

上法保存之。其效力可保持一年。

「注意」注射一星期後。有時發生血清病。

(如尋麻疹)過二三日即散。預防以鈣劑

內服。(鹽化鈣)・○苦味酒四・○水一

〇〇・〇一日三次服之)或以乳酸鈣、碳酸鈣、次亞磷酸鈣、作為散劑。自注射日起。連服五至七日可也。

各種血清。多為德日兩國製造者。皆有相當之效。在德國者。有天德及先靈製。在日本者。有大版血清藥院、及大版細菌研究所。在滿洲者。有大連滿鐵衛生試驗所出品。各地大藥房均有出售。

丹毒血清 *Erysipelas Serum*

【主治】丹毒之治療、及預防。

【用量】通常用滿鐵衛生試驗所或大版細菌研究所製者。每次二十至四十西西。

赤痢血清 *Dysenterie Serum*

【主治】赤痢之治療、及預防。通常用大版血

清藥院、及滿鐵衛生試驗所製品。

【用量】輕症用第一號之全量。較重用第二號之全量。為一時注射。或反復注射。

惟一日量不得超過二〇・〇毫升以上。注射部位。以左右胸側、大腿內側之皮下為宜。

預防用〇・五毫升注入皮下。

白喉血清 *Anti-Diphtherie Serum*

(實扶的利亞血清)

【主治】白喉之治療、及預防。通常用大版血清藥院、及滿鐵衛生試驗所製品。

【用量】輕症用一號。重症用二或三號之全量。若症至危篤。可超用三號以上。注射部位。以左右大腿內之皮下。或臀部

肌肉爲宜。

預防用注射 〇・五瓩於皮下。

【包裝】免疫單位一號六〇〇一・二瓩、二號一〇〇〇二・〇瓩、三號一五〇〇三・〇瓩。

傷寒血清

Typhus Abdominalis
Serum (腸室扶斯血清)

【主治】腸傷寒之治療、及預防。

【用量】一回二〇・〇瓩注射後。若無減退模樣。第三日間再行注射。如是隔日反復而注射。三四次即愈。注射部位。以胸側或大腿內側皮下。
預防用一〇・〇瓩。

【包裝】每瓶二〇・〇瓩

西藥實驗大全 藥物學

除上列四種血清之外。尙有猩紅熱血清、破傷風血清、肺炎血清、虎列拉血清、百斯篤血清等。臨機採用可也。

第 二 篇

配

藥

學

西藥實驗大全

第二篇 配藥學

第一章 溶液類 *Liquores*

【硫酸阿刀賓溶液】 *Liquor Atropin Sulphur*

硫酸阿刀賓九厘(〇·六瓦)樟腦水十六兩半(四九五西西)化勻。每服一至四滴。(〇·〇六至〇·二六西西)或注射皮下亦可。能安睡止疼、解鴉片毒。

【石灰溶液】 *Liquor Calx*

石灰粉一兩(三〇瓦)水八十兩(二四〇〇西西)化勻。澄清去渣。每服半至二兩。(一五至六〇西西)治嘔吐、吞酸、孕婦惡阻。與橄欖油調合。治

燒燙傷。

【鹽酸叩卡因溶液】 *Liquor Cocain Hydrochloridum*

鹽酸叩卡因二厘(〇·一二瓦)水一百滴(六·六西西)化勻。止痛。如用照喉鏡時搽之。可免嘔吐。

【昇汞溶液】 *Liquor Hydrarg Perchloridum*

昇汞十厘(〇·六瓦)氯化銻十厘(〇·六瓦)水二十兩(六〇〇西西)化勻。每服三十滴至六十滴(二至四西西)功能消毒。治梅毒。

【鹽酸莫非溶液】 *Liquor Morphine Hydrochloridum*

鹽酸莫非九厘(〇·六)稀鹽酸十八滴(

一·二(西西)酒精半兩(一五西西)水一兩半(四五西西)化勻。每服十至六十滴。(〇·六至四西西)每一百零九滴。含莫非一厘。功能止疼安睡。

【硫酸士的年溶液】Liquor Strychnin Sulphur

硫酸士的年九厘(〇·六瓦)稀酒精二錢(八西西)水十二錢(四八西西)先將士的年用水化勻後。再加酒精、每服四至十滴。(〇·二六至〇·六西西)能調經、補腦。治難瘵、陽痿。

第二章 水藥類 Aquea

【樟腦水】Aquea Janiphur

樟腦二錢(八瓦)溜水四百八十兩(三

〇磅)將樟腦裝入布袋。以玻璃條壓在水內。浸二日爲度。每服半至一兩。(一五至三〇西西)止疼、解抽、治嘔吐。

【哥羅芳水】Aquea Chloroformi

哥羅芳一錢(四西西)溜水二十五兩(七五〇西西)共入瓶搖之。化勻。每服半至一兩。(一五至三〇西西)解抽。止疼。治嘔吐。

【肉桂水】Aquea Cinnamoniforum

肉桂油半錢(二西西)炭酸鎂一錢(四瓦)溜水三十二兩(二磅)先將炭酸鎂與肉桂油攪勻。漸加溜水研勻調和。每服一至二兩。(三〇至六〇西西)開

胃、祛風、止瀉。

【幾阿蘇水】 *Aquae Kreosotum*

幾阿蘇一錢(四西西)溜水九十九錢(三九六西西)共入瓶搖勻。每服一至四錢。(四至一六西西)治霍亂、吐瀉、孕婦惡心。

【薄荷水】 *Aquae Menthol*

薄荷油三十滴(二西西)碳酸鎂二十厘(一·三五)溜水四十兩(一二〇〇西西)先將薄荷油、碳酸鎂研勻。再加溜水過淋。每服一至二兩。(三〇至六〇西西)治肚疼、嘔吐。能祛風。

【十滴藥水】

鴉片酒 樟腦酒 辣椒酒 大黃酒

西藥實驗大全 配藥學

薄荷酒各等量混合。每服十滴。(〇·

六)專治霍亂、吐瀉。

第三章 泡藥類 又名沖藥

類或名浸劑 *Infus*

【陳皮泡藥】 *Infus Aurant*

陳皮一兩(三〇瓦)沸水二十兩(六〇〇西西)浸十五分鐘過淋。每服一至二兩。(三至六西西)開胃、祛風、去痰、

【布球泡藥】 *Infus Buchu*

布球葉一兩(三〇瓦)沸水二十兩(六〇〇西西)浸半點鐘過淋。每服一至四兩。(三〇至一二〇西西)治淋症。利尿、消腫。

【丁香泡藥】 *Infus Chryophylli*

丁香一兩(三〇瓦)沸水二十兩(六〇〇西西) 泡半點鐘過淋。每服一至二兩。(三〇至六〇西西)治腹疼、嘔吐。消食。

【兒茶泡水】 Infus. Catechin

兒茶一百六十厘(一〇·六瓦)肉桂油三十滴(二西西)沸水十兩(三〇〇西西) 浸半點鐘過淋。每服一至二兩。(三〇至六〇西西)治瀉肚、痢疾。

【毛地黃泡水】 Infus. Digitalis

毛地黃葉三十厘(二瓦)沸水十兩(三〇〇西西) 浸一刻鐘過淋。每服二至四錢。(八至一六西西)利水、補心、平脈。

【龍膽草泡水】 Infus. Gentian

龍膽草一兩(三〇瓦)陳皮一兩(三〇瓦)沸水八十兩(五磅)泡半點鐘過淋。每服一至二兩。(三〇至六〇西西)開胃、調經、補虛。

【大黃泡水】 Infus. Rhei

大黃一兩(三〇瓦)沸水四十兩(一二〇〇西西) 泡半點鐘過淋。每服一至二兩。(三〇至六〇西西)治便秘、痢疾、食滯。

第四章 注入藥類 又名灌腸

劑 Enemata

【硝酸銀注入液】 Enemata Argenti Nitroci

硝酸銀三厘(〇·二瓦)溜水六兩(一八

○西西)化勻。一次射入大便內。治痢疾腸瘍。

【硫酸銅注入液】 *Enemata Cupri Sulphur*

硫酸銅五厘(○·三瓦)水一兩(三〇西西)化勻。一次射入大便內。治脫肛。

【又方】硫酸銅十厘(○·六瓦)溜水二十兩(六〇〇西西)化勻。射入肛內。治慢性痢疾。

【硫酸鎂注入液】 *Enemata Magnis Sulphur*

硫酸鎂一兩(三〇瓦)橄欖油一兩(三〇瓦)澱粉八錢半(三四瓦)溫水十五兩(四五〇西西)先將澱粉與水。入鍋熬成漿液。再加硫酸鎂、橄欖油化勻。一次射大便內。治便秘。

【蓖麻子油注入液】 *Enemata Oleum Ricini*

蓖麻油一兩(三〇西西)鷄蛋黃一枚和勻再加溫水十兩(三〇〇西西)一次射大便內。治乾燥。

【軟胰注入液】 *Enemata Sopa*

軟胰末半兩(一五瓦)溫水十五兩(四五〇西西)化勻。射大便內。治大便乾燥。

【松節油注入液】 *Enemata Oleum Terabinthi*

松節油一兩(三〇西西)澱粉八錢半(三四瓦)水十五兩(四五〇西西)先將澱粉·水。入鍋內熬成漿液。再加松節油和勻。射大便內。治痢疾、腸內氣脹。

【幾阿蘇注入液】 *Enemata Kreosotum*

幾阿蘇一箇(〇・〇六西西)水一兩(三

〇西西)入瓶搖勻。射入尿道。治尿

道有臭味。

【明礬注入液】 *Enemata Alum*

明礬三十厘(二瓦)水二十兩(六〇〇

西西)化勻。射入尿道。治白帶淋症。

【硫酸鋅注入液】 *Enemata Zinci Sulphur*

硫酸鋅二厘(〇・一二瓦)水一兩(三

〇西西)化勻。射入尿道。治淋症白帶。

第五章 注射液類 *Injection*

【阿普莫非注射液】 *Injection Apomorphinae*

鹽酸阿普莫非二厘(〇・一二瓦)樟腦

溜水一百滴(六・六西西)化勻過淋。

每次射入皮下二至八滴。(〇・一二至

〇・五西西)中毒者用之。令人嘔吐。

【鹽酸莫非注射液】 *Injection Morphinae Hy-*

drochlor

鹽酸莫非十六厘(一・〇六瓦)溜水一

兩(三〇西西)化勻。每次射四至八滴

(・三至・五西西)於皮下。能止疼安睡。

【硫酸士的年注射液】 *Injection Strychnin*

Sulphur

硫酸士的年一厘(〇六瓦)溜水五錢(

二〇西西)化勻。每次用五至十五滴。

(・三至一西西)射入皮下。治腦力脫

失。解鴉片毒。激心最妙。

【硫酸阿刀賓注射液】 *Injection Atropin Sul-*

phur

硫酸阿刀賓一厘(・〇六瓦) 溜水一兩

(三〇西西)化勻。每次用五滴。(〇・

三西西)射入皮下。解鴉片毒。激呼吸。

第六章 含漱藥類 Garg

【石炭酸含漱水】 Garg Acid Carbolie

石炭酸二厘(・一二西西)水一兩(三〇

西西)化勻。治口臭。咽喉病。

【明礬含漱水】 Garg Alum

明礬六十厘(四瓦)蜂蜜半錢(二瓦)水

六兩(一八〇西西)化勻。治口炎、咽

喉炎。

【硝酸銀含漱水】 Garg Argent Nitroc

硝酸銀十厘(・六瓦) 水一兩(三〇西

西)化勻。治口炎、舌炎、咽喉炎。

【昇汞含漱水】 Garg Hydragri Perchlor

昇汞四厘(・二四瓦)稀鹽酸水八滴(・五

西西)水十兩(三〇西西)化勻。治楊梅

咽喉炎。

【又方昇汞含漱水】

昇汞六十厘(四瓦)水八兩(二四〇西

西)化勻。治牙齦潰爛咽喉炎。

第七章 洗滌藥類 Lotiones

【硼酸洗水】 Lotiones Acid Boric

硼酸十二厘(・八瓦)水六兩(一八〇西

西)化勻。洗火眼及各種惡瘡。

【石炭酸洗水】 Lotiones Acid Carbolie

石炭酸三十厘(二西西)水八兩(二四

○西(西)化勻。洗各種膿瘡。

【明礬洗水】 *Lotiones Alum*

明礬四厘(・二四瓦)水一兩(三〇西

西)化勻。洗火眼膿漏眼。

【硝酸銀洗水】 *Lotiones Argent Nitroc*

硝酸銀二厘(・一二瓦)水一兩(三〇西

西)化勻。洗爛眼邊。口舌生瘍。

【幾阿蘇洗水】 *Lotiones Kreosotum*

幾阿蘇一滴(・〇六西)水一百滴(六・

六西)治凍傷、燒燙傷、皮膚科病。

【硫酸銅洗水】 *Lotiones Cupr Sulphur*

硫酸銅二厘(・一二瓦)水一兩(三〇西

西)化勻。洗火眼用。

【昇汞洗水】 *Lotiones Hydrargi Perchlor*

昇汞一厘(・〇六瓦)水一千滴(六六・六

西)化勻。洗瘡用。

【又方】昇汞一厘(・〇六瓦)水八兩(二四〇

西)化勻。洗淋毒眼用。

【醋酸鉛洗水】 *Lotiones Plumbi Acet*

醋酸鉛二厘(・一二瓦稀醋酸二滴(・一

二西)水一兩(三〇西)化勻。洗火

眼。爛眼邊。但不常用。

【醋酸鉛鴉片洗水】 *Lotiones Plumbi Acet Opii*

醋酸鉛半兩(一五瓦)鴉片酒一兩(三

〇西)水二十兩(六〇〇西)化勻。

以手巾蘸此水敷患處。治跌打損傷、膿

瘡、紅腫。均可用之。有傷口者忌用。

恐受其毒。

【硫酸銻洗水】 Lotiones Zinc Sulphur

硫酸銻三厘(二瓦)水一兩(三〇西西)
化勻。洗火眼用。

【來蘇洗水】 Lotioes Lysol

來蘇二滴(〇六西西)水一百滴(六
六西西)化勻。洗膿瘡用之。

【過錳酸鉀洗水】 Lotiones Kali Permang

過錳酸鉀二厘(一二瓦)水六兩(一八
〇西西)化勻。洗瘡用之。

第八章 軟膏藥類 又名抹膏

油膏 Unguentum

【硼酸軟膏】 Unguentum Acid Boric

硼酸末一兩(三〇瓦)華士林九兩(二
七〇瓦)調和化勻。治燒燙傷、凍傷、

西藥實驗大全 配藥學

各種膿瘡。

【石炭酸軟膏】 Unguentum Acid Carboic

石炭酸一兩(三〇西西)華士林九兩(
二七〇瓦)調和。治各種膿臭瘡症。

【水楊酸軟膏】 Unguentum Acid Salicyli

水楊酸二兩(六〇瓦)華士林二十兩(
六〇〇瓦)調勻。治各種疥癬及腳氣
症。

【樟腦軟膏】 Unguentum Camphur

樟腦一兩(三〇瓦)華士林九兩(二七
〇瓦)調和。治凍傷。止疼止癢。

【班蝥軟膏】 Unguentum Cantharis

班蝥一兩(三〇瓦)香油六兩(一八〇
瓦)黃蠟一兩(三〇瓦)先將香油在暖

處放置一天。後入鍋煎熬一刻鐘。過

淋榨渣。再將黃蠟溶化。共調為膏敷

之。能去炎。令水泡變膿。

【其瑣編軟膏】 Unguentum Chlorobin

其瑣編一錢(四瓦)華士林九十九錢(

三九六瓦)調勻。能殺菌。治各種癬症。

【沒石子軟膏】 Unguentum Gallae

沒石子二十厘(一·三瓦)華士林八十

厘(五·三瓦)調勻。治痔瘡。

【沒石子鴉片軟膏】 Unguentum Gallae Chan

Opii

沒石子軟膏一兩(三〇瓦)鴉片末三十

二厘(二·一瓦)調勻。治痔瘡、痛瘡。

【水銀軟膏】 Unguentum Hydrargyri China-

reum

水銀四十八厘(三·二瓦)煉豬脂四十

八厘(三·二瓦)煉羊脂四厘(二四瓦)

共和調為一處。直至水銀珠散盡為止。

治各種惡瘡、疔毒、下疳、梅毒。

【氯化錳軟膏】 Unguentum Hydrargyri Am-

mon Chlori

氯化錳一兩(三〇瓦)華士林九兩(

二七〇瓦)調勻。治楊梅各種瘡症。爛

眼邊。

【紅降汞軟膏】 Unguentum Hydrarg Oxid

Rubrum

紅降汞二厘(一·二瓦)華士林九十八

厘(六·五瓦)調勻。治爛眼邊。楊梅瘡。

【黃降汞軟膏】 Unguentum Hydrargyri Oxida

Plav

黃降汞二厘（・一二瓦）華士林九十八厘（六・五瓦）調勻。治各種瘡爛眼邊。

【硝酸汞軟膏】 Unguentum Hydrargyri Nitras

水銀四厘（・二四瓦）硝酸十二滴（・八西西）煉豬脂十五厘（一瓦）先將水銀及硝酸入瓶。加火消化後。再加煉豬脂十五厘。（一瓦）橄欖油調勻。治禿瘡、頑癬、惡瘡。

【甘汞軟膏】 Unguentum Hydrargyri Sublimor

甘汞八十厘（五・三瓦）華士林一兩（三

〇瓦）調勻。治皮膚症。

【魚石諸軟膏】 Unguentum Icthyoi

魚石諸一兩（三〇瓦）華士林九兩（二七〇瓦）調勻。治一切瘡症。

【碘軟膏】 Unguentum Iodol

碘三十二厘（二・一二瓦）碘化鉀三十二厘（二・一二瓦）甘油一錢（四西西）煉豬脂二兩（六〇瓦）先將碘、及碘化鉀、甘油、入皿研勻。再加豬脂、調勻治瘰癧、凍瘡、皮膚等症。

【黃碘軟膏】 Unguentum Iodoform

黃碘一兩（三〇瓦）華士林九兩（二七〇瓦）調勻。治一切瘡症。

【硫黃軟膏】 Unguentum Sulphur Sublim

硫黃一兩(三〇瓦)華士林九兩(二七

〇瓦)調勻。治乾濕疥。

【亞鉛華軟膏】 Unguentum Zinc Oxid

亞鉛華一兩半(四五瓦)華士林八兩半

(二五五瓦)調勻。治黃水瘡、胎毒。

【拉沙軟膏】 Unguentum Lassar

亞鉛華三錢(一二瓦)水楊酸一錢(四

瓦)澱粉二錢(八瓦)硼酸一錢(四瓦)

華士林九十錢(二六〇瓦)調勻。治黃

水瘡、胎毒、惡瘡、一切濕性皮膚症。

【安福消腫膏】 Antiphlogistine

白陶土十九兩(五七〇瓦)甘油十二兩

(三六〇西西)硼酸一兩半(四五瓦)台

茂魯八厘(〇·五)薄荷油三十滴(二西

西)冬綠油八滴(〇·五)

「製法」預置一皿。先將台茂魯、及硼

酸末研合。混於白陶土中。傾入皿內。

加入甘油後。用木棒十分攪拌。再加

入薄荷油及冬綠油。仍行攪勻即成。

「用法」將膏用蒸氣溶解。塗絨布上。

或冷塗之。其作用。消炎、鎮痛、與

砒礪好司相同。

【土肥氏參硫膏】 Theripasta Dohi

亞鉛華 硫黃華 木參兒各一〇·〇

豚脂三〇·〇混合為軟膏。專治刺癢、

疥癬等。

【微爾金孫氏軟膏】 Unguentum Wilkinsoni

樺參兒油 沉降硫黃各一〇·〇加里

石鹼 美國製黃色華士林各二〇・〇
混合爲軟膏(消炎止疼)

【披吉婁魯泥膏】 Unguentum Pityloii

披吉婁魯二・〇 澱粉或滑石二・〇

亞鉛華二・〇 豚脂四・〇 調和爲軟

膏。(止癢、去毒。專治黃水瘡、胎毒等。)

第九章 點眼藥類 (Guttae)

【硫酸阿刀賓點眼水】 Guttae Atropin Sulphur

hur

硫酸阿刀賓二厘(一二瓦)溜水九十

八滴(六・五西西)化勻。上眼內。令

瞳人散大。

【厄司連點眼水】 Guttae Eosin

厄司連半厘(〇三瓦)溜水一百滴(六・

六西西)化勻。上眼內。令瞳孔縮小。

【蛋白銀點眼水】 Guttae Protargol

蛋白銀五厘(三瓦)溜水九十五滴(

六・三西西)化勻。治一切火眼症。

第十章 酒藥類 (Tinctura)

【烏頭酒】 Tinct Aconit

烏頭根細末一兩(三〇瓦)百分之七十

酒精八兩(二四〇西西) (即酒精七十分)

浸二十四小時。過淋爲度。每服五至十

五滴。(三至一西西)治痛風、解熱。

【蘆薈酒】 Tinct Aloes

蘆薈根細末一兩(三〇瓦)甘草膏三兩(

九〇瓦)百分之四十五酒精九十六兩

(六磅) (即酒精四十五分) 下列照此計算。

先用酒精三十兩。浸藥二日過淋。再加其餘酒精。共足一百兩。每服一至二錢。(四至八西西)調經輕瀉。

【陳皮酒】 Tinct Aurant

陳皮二十五兩(七五〇瓦)百分之四十五酒精七十五兩(二二五〇西西)浸藥七日過淋。再加酒精。仍足一百兩。(二〇〇〇西西)每服一至二錢。(四至八西西)開胃、祛痰、助甜香之味。

【顛茄酒】 Tinct Belladon

顛茄葉一兩(三〇瓦)百分之四十五酒精二十兩(六〇〇西西)浸二日過淋。再加酒精。仍足二十兩。(六〇〇西西)每服五至二十滴。(三至一·三

西西)止疼、安睡、利尿。

【透路酒】 Tinct Tolu

透路脂一兩(三〇西西)百分之四十五酒精八兩(二四〇西西)用酒浸透路脂化勻後。再加酒仍足八兩。(二四〇西西)每服十五至三十滴。(一至二西西)治咳嗽、祛痰。

【安息香雜酒】 Tinct Benzoin co

安息香八兩(二四〇瓦)蘇合香六兩(一八〇瓦)透路脂二兩(六〇西西)蘆薈一兩半(四五瓦)百分之四十五酒精八十兩(二四〇西西)浸七日過淋。再加酒精仍足八十兩。(二四〇西西)每服半至一錢。(二至四西西)治咳嗽祛痰。

【布球酒】 Tinct. Buchu

布球葉一兩(三〇瓦)百分之四十五酒
精八兩(二四〇西西)浸二日過淋。再
加酒仍足八兩。(二四〇西西)每服一
至四錢。(四至一六西西)利尿、治淋。

【印度麻酒】 Tinct. Cannabis Indica

印度麻膏五錢(二〇西西)百分之四十
五酒精九十五錢(三八〇西西)化勻過
淋。每服五至十五滴。(〇・三至一西
西)止疼、安睡、定喘、祛痰。

【樟腦雜酒】 Tinct. Camphur et

樟腦五十一錢(二〇四瓦)安息香酸六
十九錢(二七六瓦)鴉片酒一百〇三錢
(四一二西西)八角香油四十五錢(一

八〇西西)百分之六十酒精一百錢(四
〇〇西西)化勻過淋。每服半至一錢。
(一至四西西)治咳嗽、腹痛、水瀉、
痢疾。

【鴉片酒】 Tinct. Opii

鴉片末一錢半(六瓦)百分之六十酒精
二十錢(八〇西西)浸七日過淋。再加
酒精仍足二十錢。(八〇西西)每服五
至十五滴。(〇・三至一西西)止疼安睡。

【豆叩雜酒】 Tinct. Cardamomi et

豆叩一兩(三〇瓦)胡椒一兩(三〇瓦)
葡萄乾八兩(二四〇瓦)肉桂二兩(六
〇瓦)呀蘭米半兩(一五瓦)百分之六
十酒精八十兩(三四〇〇西西)浸二日

過淋。再加酒精仍足八十兩。(二四〇
〇 西西) 每服半至二錢。(二至八西西)
開胃助消化。

【丁香酒】 Tinct. Chrysothyl

丁香末四兩(一二〇瓦)百分之六十酒
精二十兩(六〇〇西西)浸七日過淋。
再加酒精仍足二十兩。(六〇〇西西)
每服半至一錢。(二至四西西)助消化、
止疼、止嘔。

【兒茶酒】 Tinct. Catechin

兒茶末二兩半(七五瓦)肉桂一兩(三
〇瓦)百分之六十酒精二十兩(六〇
〇西西)浸七日過淋再加酒精。仍足
二十兩。(六〇〇西西)每服半至一錢。

(二至四西西)治腹痛、痢疾、止瀉。

【肉桂酒】 Tinct. Cinnamonii

肉桂一兩(三〇瓦)百分之六十酒精八
兩(二四〇西西)浸二日過淋。再加酒
精仍足八兩。(二四西西)每服半至一
錢。(二至四西西)助消化止疼。

【毛地黃酒】 Tinct. Digitales

毛地黃葉一兩(三〇瓦)百分之六十酒
精八兩(二四〇西西)浸二日過淋。再
加酒精仍足八兩。(二四〇西西)每服
五至十五滴。(〇·三至一西西)利尿
激心。

【生薑酒】 Tinct. Zingiber

生薑末一兩(三〇瓦)百分之六十酒精

九兩(二七〇西西)浸二日過淋。再加酒精仍足九兩。(二七〇西西)每服十至六十滴。(〇·六至四西西)助消化、去風。

【龍膽草酒】 Tinct. Gentian

龍膽末三兩(九〇瓦)陳皮一兩半(四五瓦)砂仁半兩(一五瓦)百分之六十五酒精四十兩(一二〇〇西西)浸二日過淋。再加酒精仍足四十兩(一二〇〇西西)每服半至二錢(二至八西西)健胃調經。

【關羊花酒】 Tinct. Hyoscyam

關羊花葉一兩(三〇瓦)百分之四十五酒精九兩(二七〇西西)浸二日過淋。

再加酒精仍足九兩。(二七〇西西)每服十五至六十滴(一至四西西)止咳、利尿、安睡、止嘔。

【海碘酒】 Tinct. Iodinum

純碘半兩(一五瓦)碘化鉀半兩(一五瓦)酒精十二兩(三六〇西西)蒸溜水足用。先將碘化鉀用蒸溜水化開。再投入純碘。待純碘化開。再加酒精。振盪數次即成。內服止吐。外用消腫散炎。

【吐根酒】 Tinct. Ipecac

吐根末一兩(三〇瓦)百分之六十酒精十兩(三〇〇西西)浸七日過淋再加酒精仍足十兩(三〇〇西西)每服十至三十

滴。(六至二西西)祛痰、發表。多服令人嘔吐。

【拉灣大雜酒】Tinct. Lavandula Co.

拉灣大油九十滴(六西西)迷迭油十滴(六西西)肉桂一百五十厘(一〇瓦)肉豆叩二百五十厘(一六·六瓦)赤檀三百厘(二〇瓦)酒精四十兩(一二〇〇西西)先將肉桂、豆叩、赤檀浸酒內七日。再加拉灣大油、迷迭油。酒仍足四十兩。(一二〇〇西西)每服半至二錢。(二至八西西)行氣、祛風。治胃腸不安。

【番木鱉酒】Tinct. Nux. Yomic.

番木鱉膏一百三十五厘(九瓦)溜水四

兩(一二〇西西)酒精十六兩(一磅)浸四日過淋。每服二十至三十滴。(一至二西西)治消化不良。

【遠志酒】Tinct. Senegale

遠志五兩(一五〇瓦)葡萄乾四兩(一二〇瓦)胡妥一兩(三〇瓦)薈羅子油一兩(三〇西西)百分之六十酒精四十兩(一二〇〇西西)浸二日過淋。再加酒精仍足四十兩。(一二〇〇西西)每服一至二錢。(四至八西西)止嗽、祛痰、開胃。

【大黃酒】Tinct. Rhai

大黃末四兩(一二〇瓦)豆叩半兩(一五瓦)胡妥半兩(一五瓦)番紅花半兩

(一五瓦)百分之六十酒精四十兩(一
二〇〇西西)浸二日過淋。再加酒精
仍足四十兩。(一二二〇〇西西)每服一
至二錢。(四至八西西)健胃輕瀉。

【海葱酒】 *Thick Scilla*

海葱二兩(六〇瓦)百分之六十酒精十
兩。(三〇〇西西)浸二日過淋。再加
酒精仍足十兩。(三〇〇西西)每服十
至二十滴。(〇·六至一·三西西)利水。
治咳嗽。

第十一章 酒精類 *Spiritus*

【伊打酒精】 *Spiritus Aether*

伊打一兩(三〇西西)酒精二兩(六〇
西西)化勻。每服三十至六十滴。(二

至四西西)解抽、止胃疼、止吐、激
心、化痰。

【樟腦酒精】 *Spiritus Camphur*

樟腦一兩(三〇瓦)酒精九兩(二七〇
西西)化勻。每服十至三十滴。(〇·六
至二西西)止疼、發表、止嗽、祛痰、
止吐瀉。

【哥羅芳酒精】 *Spiritus Chloroform*

哥羅芳一兩(三〇西西)酒精十九兩(一
五七〇西西)化勻。每服十至六十滴。
(〇·六至四西西)止胃疼、解抽、祛
痰。

【薄荷酒精】 *Spiritus Menthol*

薄荷油一兩(三〇西西)酒精四十九兩

(一四七〇西西)化勻。每服三十至六十滴。(二至四西西)治嘔吐、胃痛、霍亂、吐瀉。

第十一章 擦藥類 *Linimenta*

【顛茄擦藥】 *Linimenta Belladonnae*

顛茄流膏五十兩(一五〇〇西西)樟腦一兩(三〇瓦)溜水十兩(三〇〇西西)酒精四十兩(一二〇〇西西)化勻搽之。能消腫、止疼。抽筋、硬傷亦用之。

【樟腦擦藥】 *Linimenta Camphur*

樟腦一兩(三〇瓦)橄欖油四兩(一二〇〇西西)化勻搽之。止疼、消腫。

【松節油擦藥】 *Linimenta Terobinthi*

石鹼二兩(六〇瓦)溜水二兩(六〇西西)樟腦一兩(三〇瓦)松節油十六兩(四八〇西西)先用水一兩。將石鹼化開。令松節油與樟腦溶和。將石鹼入臼研之。漸加松節油。旋添旋研。直至變稠。再加水一兩爲止。治腰腿疼、抽筋。能消腫、止痛。

【軟胰擦藥】 *Linimenta Sopya*

軟胰二兩(六〇瓦)樟腦一兩(三〇瓦)迷迭油三錢(一二西西)酒精十六兩(四八〇西西)溜水四兩(一二〇西西)先將酒精、樟腦、用迷迭油化之。再加軟胰及水。力搖之。存七日過淋。治筋扭、疼痛。能消腫。

【雄擦藥】 *Linimenta Iodii*

碘五錢(二〇瓦) 碘化鉀二錢(八瓦) 甘

油一錢(四西西) 酒精四十錢 (一六〇

西西) 化勻。治無名腫毒、癰疽。

【哥羅芳擦藥】 *Linimenta Chloroformi*

哥羅芳一兩(三〇西西) 樟腦擦藥(三

〇西西) 化勻。治風濕骨痛。消腫。

【石灰擦藥】 *Linimenta Calx*

石灰一兩(三〇瓦) 橄欖油一兩 (三〇

瓦) 調勻。治燒燙傷。

第十三章 甘油調和藥類

Glycerin Mistura

【炭尼酸甘油】 *Glycerin Tannic*

炭尼酸一兩(三〇瓦) 甘油四兩 (一二

西藥實驗大全 配藥學

〇西西) 入臼研勻，加熱。每服十至

四十滴。(〇·六至二·六西西) 止血、

治痢疾。外用收斂。

【樟腦甘油】 *Glycerin Camphor*

樟腦一兩(三〇瓦) 酒精一兩 (三〇西

西) 甘油二兩(六〇西西) 化勻。治皮

膚皸裂。

【硼酸甘油】 *Glycerin Acid Boric*

硼酸末一兩(三〇瓦) 甘油四兩 (一二

〇西西) 溜水三兩(九〇西西) 化勻。

治耳鼻瘡症。殺菌。有潤性。

【黃碘甘油】 *Glycerin Iodoform*

黃碘三十厘(二瓦) 甘油六錢 (二四西

西) 酒精二錢(八西西) 化勻。治火傷。

殺菌。

第十四章 散藥類 Pulv

【吐根雜散】 Pulv Ipecuan co.

吐根末一兩(三〇瓦)鴉片末一兩(三〇瓦)硫酸鉀八兩(二四〇瓦)合勻研細。每服五至十厘。(·三至·六瓦)治痢疾、腹痛、水瀉。

【渣笠雜散】 Pulv Jalapa co.

渣笠末五錢(二〇瓦)檸檬鉀九錢(三六瓦)乾薑末一錢(四瓦)合勻研細。每服二十至六十厘。(一·三至四瓦)治膀胱。能瀉水。

【番木鱉雜散】 Pulv Nux Vomica co.

番木鱉一錢(四瓦)重碳酸銨二錢(八

瓦)大黃末三錢(一二瓦)合勻研細。每服五至十五厘。(〇·三至一瓦)消化不良、胃弱用之。

【大黃雜散】 Pulv Rhei co.

大黃二錢(八瓦)碳酸鎂六錢(二四瓦)生薑末一錢(四瓦)合勻研細。每服十至十五厘。(·六至一瓦)能健胃。

【水楊酸雜散】 Pulv Acid Salicyli co.

水楊酸三錢(一二瓦)硼酸十錢(四〇瓦)滑石八十七錢(三四八瓦)研勻。上足生臭汗。濕爛腳氣。

【次硝酸鉍雜散】 Pulv Bismuth Subnitri co.

次硝酸鉍二十厘(一·三瓦)托佛氏散

三厘(・二瓦)炭尼酸五厘(・三瓦)合勻
研細。作一次服之。治狀瀉痢疾。

【肉桂雜散】 Pulv. Cinnamomi co.

肉桂五錢(二〇瓦)砂仁二錢(八瓦)乾
薑末二錢(八瓦)丁香一錢(四瓦)豆叩
二錢(八瓦)合勻研細。每服五至十厘。
(〇・三至〇・六瓦)治胃弱吐酸。

【甘草雜散】 Pulv. Glycyrrhi co.

甘草末二錢(八瓦)辛那末二錢(八瓦)
茴香末一錢(四瓦)硫黃末一錢(四瓦)
白糖六錢(二四瓦)研勻。每服一至二
錢。(四至八瓦)能輕瀉。

【甘汞雜散】 Pulv. Calomel co.

甘汞一錢(四瓦)白糖六錢(二四瓦)合

勻。點眼。治雲翳。

【黃降汞雜散】 Pulv. Hydrargyri Oxid. Fla-

vum co

黃降汞一錢(四瓦)白糖九錢(三六瓦)
研細末。用少許點眼。治雲翳。

第十五章 丸藥類 *Pilula*

【蘆薈丸】 *Pilula Aloes*

蘆薈末二十二錢(八八瓦)硫酸鐵十二
錢(四八瓦)桂皮末三十三錢(一三二
瓦)糖漿作丸每服十厘(・六瓦)治大便
燥結。血虧能調經。

【蘆薈鐵丸】 *Pilula Aloes et Ferri*

蘆薈末八錢(三二瓦)石鹼末四錢(一
六瓦)豆叩油三錢(一二西)玫瑰膏

四錢(一六瓦)合勻作丸。每服五至十

厘。(〇·三至〇·六瓦)治大便乾燥。

【番木鱉頭茄丸】 *Pilula Nux Vomice et Bell-*

adonna

頭茄一厘(〇·〇六瓦)番木別一厘(〇·

六瓦)大黃雜散十二厘(〇·八瓦)合勻

作四丸。每服一丸。治大便秘結。

【樟腦頭茄丸】 *Pilula Camphur et Bellado-*

nna

樟腦六厘(〇·四瓦)頭茄膏一厘半(

〇·一瓦)闊羊花膏四厘半(〇·三瓦)

鹽酸莫非半厘(〇·三瓦)合勻作五丸。

每服二丸。治肛門疹。令人安睡。

【哥羅新闊羊花丸】 *Pilula Colocynthin et*

Hyoscyamini

哥羅新二錢(八瓦)蘆薈四錢(一六瓦)

藍文尼脂末四錢(一六瓦)黃強鈹半錢

(二瓦)丁香油半錢(二西西)闊羊花膏

六錢(二四瓦)溜水酌用作丸。每服五

至十厘。(〇·三至〇·六瓦)能輕瀉。

【硫酸規尼丸】 *Pilula Quinine Sulphur*

硫酸規尼六十厘(四瓦)玫瑰膏二十厘

(一·三瓦)合勻作丸。每次服五至十

厘。(〇·三至〇·六瓦)治瘧疾、補血、

退熱。

【錄藍丸】 *Pilula Hydrargyri*

水銀二錢(八瓦)甘草一錢(四瓦)玫瑰

膏三錢(一二瓦)合勻作丸。先將玫瑰

膏與水銀。入臼研勻。不見水銀珠。

再加甘草爲度。每服五至十厘。(○。

三至○·六瓦)能輕瀉。

【吐根海葱丸】 *Pihula, Ipecacur et Scilla*

吐根雜散三錢(一二瓦)海葱末一錢(

四瓦)阿麼隱一錢(四瓦)鴉片末三錢

(一二瓦)糖漿酌用。作丸。每服五至

十厘。(○三至·六瓦)止嗽祛痰。

【大黃雜丸】 *Pihula Rhei co.*

大黃三兩(九○瓦)蘆薈二兩三(七二

瓦)沒藥末二兩半(四五瓦)石鹼末一

兩半(四五瓦)薄荷油一錢半(六西西)

甘油一兩(三○西西)糖漿三兩(九○

西西)合勻作丸。每服五至十厘。(○。

三至○·六瓦)治消化不良、便秘。

【山道年丸】 *Pihula Santonin*

山道年二厘(○·一二瓦)甘草末四厘。

(○·二四瓦)蜜爲一丸。殺虫服之。

第十六章 坐藥類 *Suppositoria*

【炭尼酸坐藥】 *Suppositoria Tannic*

炭尼酸三十六厘(二·四瓦)得波麻油

一百五十滴(一○西西)先用此油四十

四滴。加炭尼酸入臼研勻。再加其餘

之油。用微火化之。作十二丸。每用

一丸。插入肛內。治出血。一切痔瘡。

【沒食子鴉片坐藥】 *Suppositoria Gallicae Opii*

Opii

沒食子五厘(·三瓦)鴉片膏一厘(·○

六瓦)得波麻油一滴(〇六西西)研勻
作一丸插入肛內治痔瘡止疼。

【黃蠟坐藥】Suppositoria Iodoform

黃蠟三十六厘(二・四瓦)得波麻油一
百五十滴(一〇西西)合勻作十二丸。
每用一丸。插入肛內。治腸炎痔瘡。

【山道年坐藥】Suppositoria Santonin

山道年三厘(・二瓦)得波麻油十二滴
(・七西西)化勻。作一丸。插入肛內。殺
蛔蟲。

第十七章 陰球 又名帶藥

Pessus

【白礬兒茶膠球】Pessus Alun

白礬末十五厘(一瓦)兒茶末十五厘

(一瓦)得波麻油酌用。作一丸。插入
陰道。治白帶。

【碘化鉀陰球】Pessus Kali Bromid

碘化鉀十厘(・六瓦)得波麻油五十滴(
三・三西西)合勻研細。作一丸。插入
陰道。治子宮生瘤。

【碘化鉀陰球】Pessus Kali Iodid

碘化鉀十厘(〇・六瓦)得波麻油五十
滴(三・三西西)合勻研細。作一丸。
插入陰道。治子宮內膜炎。

第十八章 糖漿類 Syrupus

【白樹膠糖漿】Syrupus Gummi Acaciae

白樹膠十兩(三〇〇瓦)溜水四十三兩
(一二九〇西西)白糖六十七兩(二〇

一〇瓦) 先將白樹膠入溜水化開。再入鍋內熬之。加白糖過淋。配藥時作甜香之助藥。

【檸檬糖漿】Syrupus Limonis

檸檬酸三十錢(一二〇瓦)白糖一百二十兩(三六〇〇瓦)溜水二十錢(八〇西西)檸檬酒一錢(四西西)調勻。配藥時作甜香助藥。

【透路糖漿】Syrupus Toht

透路脂二錢半(一〇瓦)白糖六十四錢(二五六瓦)溜水四十錢(一六〇西西)先將透路脂、及水入鍋煮之。化勻過淋。再加白糖。每服一至二錢。(四至八西西)治咳嗽祛痰。

西藥實驗大全 配藥學

【寇第印糖漿】Syrupus Codein

寇的印八厘(〇·五瓦)溜水一兩(三〇西西)白糖七兩(二一〇瓦)先將寇的印·溜水入臼研勻。加白糖入鍋化合。每服一至二錢。(四至八西西)治咳嗽、安睡。

【吐根糖漿】Syrupus Ipeacan

吐根末一兩(三〇瓦)酒精五兩(一五〇西西)溜水四十兩(一二〇〇西西)白糖六十兩(一八〇〇瓦)先將酒·水合勻。浸吐根二日過淋。再加白糖入鍋化勻。每服十五至六十滴。(一至四西西)治咳嗽祛痰。

【海葱糖漿】Syrupus Scilla

海葱醋酸二十兩(六〇〇西西)白糖四十兩(二二〇〇瓦)入鍋化勻。每服半至一錢。(二至四西西)治咳嗽祛痰。

【大黃糖漿】*Syrupus Rhei*

大黃末二兩(六〇瓦)胡妥二兩(六〇瓦)酒精六兩(一八〇西西)白糖二十四兩(七二〇瓦)溜水二十四兩(七二〇西西)先將酒精、溜水化勻。浸大黃。胡妥半小時過淋。入鍋。加白糖化勻。每服一至四錢。(四至一六西西)治便秘、助消化。

【遠志糖漿】*Syrupus Senegae*

遠志末四兩(一二〇瓦)百分之六十酒精三十二兩(二磅)白糖十五兩(四五

〇瓦)先用酒浸遠志末。二日過淋。再加白糖。入鍋化勻。每服一至二錢。(四至八西西)治咳嗽、祛痰、輕瀉。

【玫瑰糖漿】*Syrupus Rosa*

玫瑰花一兩(三〇瓦)白糖十五兩(四五〇瓦)溜水十兩(三〇〇西西)先將玫瑰花用水浸二點鐘。用布擰乾入鍋。加熱至沸過淋。再加白糖化勻。每服一至二錢。(四至八西西)配藥時作甜香之助藥。

【陳皮糖漿】*Syrupus Aurant*

陳皮酒一兩(三〇西西)白糖七兩(二一〇瓦)化勻。每服一至二錢。(四至八西西)亦作甜香助藥。

第十九章 敷藥類 *Cataplasma*

mata

【木炭敷藥】 *Cataplasmata Carbo Ligni*

木炭一兩(三〇瓦)饅頭屑四兩(一二〇瓦)胡麻子面三兩(九〇瓦)沸水二十兩(六〇〇西西)調勻爲糊藥。攤布上敷患處。治惡瘡。

【芥末敷藥】 *Cataplasmata Sempis*

芥末酌用。鷄蛋青一個。調爲濃漿。敷患處。治腹疼。

【明礬敷藥】 *Cataplasmata Alumi*

明礬六十厘(四瓦)鷄蛋青二個。調濃漿敷皮上。治火眼。亦治凍傷。

第 三 篇

處

方

學

西藥實驗大全

第二篇 處方學

第一章 血行器病

心跳症 心動不安。紊亂脈弱。

【處方一】阿斯必林六厘(○·三六瓦)加非印

十厘(○·六瓦)

右分作三包、每日三次、每次一

包、食前用。(治心跳、心熱)

【處方二】樟腦二厘(○·一二瓦)鎳化鉀十五

厘(一瓦)乳糖二十厘(一·三瓦)

右分三包、一日份、食前。(治心

弱心跳)

【處方三】毛地黃酒一錢(四西西)烏頭酒半錢

西藥實驗大全 處方學

(二西西)水三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(治心跳不均)

【處方四】地芟他民一錢(四西西)水三兩(一

〇〇西西)

右均六次用之、一日三次。(治心

臟衰弱)

【處方五】地芟他民注射液

右皮下注射、每次一西西、

心內膜炎 心動增速。熱度增高。

【處方一】阿斯必林十厘(○·六瓦)

右分作三包、每次一包、一日用

完。(治心熱)

【處方二】毛地黃酒一錢(四西西)甘油一錢(

四西西)水三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(呼吸促進、脈弱用之)

【處方三】加非印十二厘(〇·八瓦)乳糖半錢

(二瓦)

右分作六包、一日三次、二日用

完、食前。(能激心、利尿)

【處方四】蘇潑拉來寧半錢(二西西)水三兩(

一〇〇西西)

右均三次用之、一日份、食前、

(激心、止血)每次用十滴、(六

西西)注射皮下亦可。

急心痛 心內絞痛。

【處方一】鴉片酒半錢(二西西)苦味酒半錢(

二西西)水三兩(一〇〇西西)

右均三次用之、一日份、食前。

(止痛)

【處方二】阿斯必林一錢(四瓦)水二錢半(一

〇西西)

右化勻、爲皮下注射、二次用之、

一日一次。(止痛、退熱、消炎)

【處方三】塩酸莫非一厘六分之一(〇·〇一)

蒸溜水二錢半(一〇西西)

右皮下注射、每次半至一西西、

心悸亢進 脈動甚弱。遲速不均。

【處方一】地芟他民十五滴(一西西)

右注射皮下或靜脈內、一日二次。

(激心)

【處方二】樟腦酒半錢(二西西)毛地黃酒一錢

(四西西)水三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(能激心)

【處方三】伊打性纈草酒四十五滴(三西西)斯

篤番斯酒四十五滴(三西西)龍膽草

酒半錢(二西西)溜水六兩(二〇

〇西西)

右一日三次、二日用完。(強心)

心包炎 脈弱無力。痛狀甚重。稍微

發熱。

【處方一】地支他民十五滴(一西西)

右注射皮下、或靜脈內。(能激心、

利尿)

【處方二】水揚酸鎂半錢(二瓦)毛地黃酒十五

滴(一西西)水三兩(一〇〇西西)

右均三次用之、一日份、食前。

(止痛、退熱)

【處方三】鹽酸莫非八厘(〇·五)毛地黃膏七

十五厘(五瓦)單軟膏十二錢半(

五〇瓦)

右塗擦心臟部、(止痛)

第二章 消化器病

口炎 口乾生泡。發熱陣痛。

【處方一】氯化鉀一錢(四瓦)水六兩(二〇〇

西西)

右含漱料每小時數次(消炎、止痛)

【處方二】硼酸一錢(四瓦)水六兩(二〇〇西

西)

右漱口用隨時漱之。(消炎、殺菌)

【處方三】明礬一錢(四瓦)水六兩(三〇〇西

西)

右含漱用、每時數次。(止痛消炎)

【處方四】硝酸銀二厘(〇·一二瓦)水九十八

滴(六·五西西)

右塗搽患處、每日二次。(消炎、

止痛)

口疳 唇黑肉亂。

【處方一】硼酸一錢(四瓦)水六兩(二〇〇西

西)

右漱口用、每時數次。(殺菌、止痛)

【處方二】硝酸銀二厘(〇·一二瓦)水九十八

滴(六·五西西)

右塗搽患處。(殺菌、止癢、消腫)

【處方三】硼砂一錢(四瓦)甘油一錢(四西西)

水六兩(二〇〇西西)

右漱口用。(殺菌、消炎、斂澀)

舌炎 舌生白點。運轉乾痛。

【處方一】硼酸一錢(四瓦)水六兩(二〇〇西

西)

右漱口用、每日三四次。(止痛消炎)

【處方二】氯化鉀一錢(四瓦)水六兩(二〇〇

西西)

右含漱用、每時數次。(消炎、殺菌)

【處方三】石炭酸一滴(〇·六西西)水一百滴

六·六西西)

右含漱用、每時數次。(殺菌消炎)

【處方四】硝酸銀二厘(〇・一二瓦)水一百滴

(六・六西西)

右搽患處。(消炎、收斂、止疼)

喉炎 飲食難進。呼吸迫促。患處腫

痛。

【處方一】氫化鉀一錢(四瓦)水六兩(二〇〇

西西)

右含漱用、每時數次。(消炎止痛)

【處方二】硼酸一錢(四瓦)水六兩(二〇〇西

西)

右含漱用、隨時漱之。能收斂、

(止疼、殺菌)

【處方三】硝酸銀二厘(〇・一二瓦)水一百滴

(六西西)

右塗搽患處。(止疼、消腫)

【處方四】明礬四十五厘(三瓦) 薄荷水二錢

(八西西)溜水三兩(一〇〇西西)

右含漱水、(止疼殺菌)

急性胃炎 膨悶、脹飽、噯氣、吞

酸。頭眩。身熱。嘔吐、腹痛。

【處方一】次硝酸銻五厘(〇・三瓦)重碳酸鈉

五厘(〇・三瓦)加斯大賊五厘(〇・

三瓦)水揚酸銻三厘(〇・二瓦)

右作一包、連作三包、每次一包、

一日三次、食後半小時用之。(治

嘔吐、瀉痢、消化不良)

【處方二】鴉片酒半錢(二西西)豆叩酒一錢(

【處方二】硫酸鎂半兩(一五瓦)水三兩(一〇〇西西)

右均六次用之，一日三次，食前。

(治心口疼、助消化)

【處方三】甘草末半錢(二瓦)重碳酸鈉半錢(

二瓦)丁香末十五厘(一瓦)水揚酸

銀十五厘(一瓦)

右作六包，一日三次，一次一包、

食後用之。(治嘔吐、祛膨悶)

【處方四】稀鹽酸半錢(二西西)苦味酒一錢(

四西西)百布聖一錢(四瓦)陳皮糖漿

五錢(二〇西西)水三兩(一〇〇西西)

右均六次用之，一日三次，食前。

(治胃痛、消化不良)

【處方五】水揚酸銀一錢(四瓦)兒茶酒二錢(

八西西)鴉片酒一錢(四西西)水三

兩(一〇〇西西)

右均六次用之，一日三次，食前。

(治消化不良、膨悶脹飽、止痛)

【處方六】重碳酸鈉一錢(四瓦)煨製鎂一錢

(四瓦)

右一日三次，二日分服、

【處方七】鹽酸莫非一厘(〇・〇六)鹽酸叩卡

印一厘半(〇・一)杏仁水一錢半(六

西西)溜水六兩(二〇〇西西)

右一日三次，二日份、(止痛)

【處方八】滂篤賁斯叩普拉民一厘十分之三至

十分之六(〇・〇二至〇・〇四)

右注射用、(用製成之液亦可)

慢性胃炎 噎隔、脹飽、吞酸、餽

雜、腹痛、消化不良。

【處方一】番木鱉酒一錢(四西西)龍膽草雜酒

一錢(四西西)加斯加拉流膏三錢(

一二西西)水三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(治便秘、胃弱、脹飽、腹痛)

【處方二】重碳酸鈉半錢(二瓦)水揚酸鈉二十

厘(一・三瓦)大黃雜散半錢(二瓦)

右作六包、一日三次、食後。(治

噎隔、脹飽、吞酸、胃痛)

【處方三】加斯加拉流膏三錢(一二瓦)番木別

酒一錢(四西西)豆叩雜酒二酒(八

西西)水三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(治胃弱、胃痛、脹飽)

【處方四】加斯大賊半錢(二瓦)龍膽末半錢(

二瓦)薑末十厘(〇・六瓦)乳糖十五

厘(一瓦)

右分三包、一日用完、食前。(治

消化不良。能健胃)

【處方五】重碳酸鈉四十五厘(三瓦)煨製鎂八

厘(〇・五)荳蔻膏一厘十分之八(

〇・五)

右分三包、一日三次、食後(治

胃痛)

胃脹 胸部膨脹。噎隔餽雜。不能飲

食。氣促嘔吐。口有臭味。

【處方一】重碳酸鈉一錢(四瓦)水揚酸鈉半錢

(二瓦)大黃末半錢(二瓦)

右作六包、一日三次、二日用完、

食後半小時服之。(健胃、消化、

治脹飽)

【處方二】番木別酒半錢(二西西)幾阿蘇十五

滴(二西西)硫酸鎂一兩(三〇瓦)水

三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(治消化不良、吐酸、打隔)

【處方三】水揚酸三十厘(二瓦)

右作三包、一次一包、一日份。(治

胃脹)

【處方四】薄荷冰一厘半(〇·一)若扁挑油三

滴(〇·一八)

右爲一包、裝膠塞內、一日六包、

胃瘍 腹痛。食物不進。嘔吐代血。

色黑。

【處方一】鴉片末一厘(〇·六瓦)次硝酸鉍三

十厘(二瓦)加斯大賊三十厘(二瓦)

右分六包、一日三次、每次一包、

食後用之。(止疼、止吐、止血)

【處方二】炭尼酸二十厘(一·三瓦)次硝酸鉍

三十厘(二瓦)大黃末三十厘(二瓦)

右作六包、一日三次、一次一包、

食後用之。(止血、止吐)

【處方三】麥角流膏二錢(八西西)加斯加拉流

膏三錢(一二西西)橙皮酒一錢(四

西西)水三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(止血、輕瀉)

【處方四】次硝酸鋁半錢(二瓦)鹽酸莫非一厘

二(〇・〇八)白糖半錢(二瓦)

右分六包、一日三包、

胃痛 惡心嘔吐。痛狀如刺。

【處方一】鴉片酒一錢(四西西)伊打酒一錢(

四西西)水三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(止疼、止嘔)

【處方二】次硝酸鋁三十厘(二瓦)托氏散三十

厘(二瓦)甘草雜散二十厘(一・三瓦)

右分六包、一日三次、每次一包、

食後用之。(止疼、止瀉、健胃)

【處方三】稀青酸半錢(二西西)稀鹽酸一錢半

(六西西)水三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(助消化、健胃、止痛)

【處方四】鹽酸黑羅印一厘十分之九(〇・〇

五)溜水二錢半(一〇西西)

右半至一西西、注射皮下、

泄瀉 飲食過飽。或腸胃受寒。初覺

腹部不安。後覺刺痛下瀉。

【處方一】甘秉五厘(〇・三瓦)乳糖十厘(〇・

六瓦)

右作一包、一次用之、(能輕瀉)

瀉後再服止瀉劑。

【處方二】次硝酸銨半錢(二瓦)鴉片末半厘(

〇・〇三瓦)甘草雜散半錢(二瓦)

右分三包、一次一包、一日用完、

食後。(止痛、止瀉、止痢)

【處方三】哥羅顛半錢(二西西)水三兩(一〇

〇西西)

右作三次用之、一日用完、食前。

(治吐瀉、止疼)

【處方四】阿爾細林八至十五厘(〇・五至一

瓦)

右用白糖送下、一次服、

痢疾 先覺腹痛便頻。次下粘液。雜

血或膿。

【處方一】蓖麻子油半兩(一五西西)鴉片酒五

滴(〇・三西西)

右作一次用。能瀉腸內之滲液。並

(止劇疼)先服此劑。後服收斂藥。

【處方二】硫酸鎂半兩(一五瓦)

右一次用。能瀉腹。先服此藥。能

將腹內雜物瀉出)然後再用補劑。

【處方三】托佛氏散一錢(四瓦)甘草雜散半錢

(二瓦)大黃末半錢(二瓦)

右作六包、一日三包、二日用完、

食前。(止瀉、止疼)服前方四點

鐘後。再服此方爲宜。

【處方四】衣米汀液十五滴(一西西)

右注射皮下一日一次(止痢疾專

殺阿米巴之菌。此藥用製成之水。

以管盛之爲妙。

【處方五】表飛鳴五厘(○·三)阿爾細林八厘

(○·五)

右爲一包、一日三次、(止痛)

便秘 下腹壓痛。呼吸促迫。腹內膨

脹。大便艱難。

【處方一】硫酸鎂半兩(一五瓦)

右作一次用之。(能下瀉)

【處方二】蓖麻子油半兩(一五西西)

右作一次用之。(能下瀉)

【處方三】加斯加拉流膏四錢(一六西西)硫酸

鎂半兩(一五瓦)水三兩(一〇〇西西)

右均三次用之、一日用完、食前。

(治腹脹、便秘)

【處方四】甘油五錢(二〇西西)

右用注射器、射入肛內、即時大便、

【處方五】軟胰子一錢(四瓦)水十二兩(三六

〇西西)

右用大便水節。射入肛內。(即時

大便)

【處方六】煨製鎂四十五厘(三瓦)大黃末十五

厘(一瓦)生薑末八厘(○·五)

右爲散藥、一日三次、二日份、

【處方七】大黃膏十五厘(一瓦)蘆薈膏十五厘

(一瓦)大黃末十五厘(一瓦)

右作丸子十粒、以甘草末爲衣、

每晚一粒。

蟻蟲 肛門刺癢。遂見有小白蟲由肛

內外出。

【處方一】食鹽十厘（六瓦）水一兩（三〇西

西）

右化勻、射入大便、內一日一次、

（治肛門內生線蟲）

【處方二】甘汞五厘（〇・三瓦）重碳酸銻五厘

（〇・三瓦）

右作一包、一次用之、（能將蟲物

瀉出）

【處方三】昇汞一厘十分之三（〇・〇二）塩化

銻八厘（〇・五）溜水三兩（一〇〇

西西）右爲灌腸料、

【處方四】水銀軟膏酌用。

右塗肛門（止癢）

縲蟲 精力衰弱。四肢痲麻。而微刺

痛。有時阻碍視力。大便時有片節

碎蟲體瀉出。

【處方一】洋蘇水十五厘（一瓦）

右作一次空腹服。死蟲瀉出治法。

與下列十二指腸蟲處方二相同。

【處方二】綿馬流膏一錢（四西西）

右作一次、用之、能殺縲蟲。（用

法與下列十二指腸蟲處方相同）

十二指腸蟲 面黃肌瘦。身體倦怠。

發育障礙。水腫腹瀉。

【處方一】綿馬流膏一錢（四西西）

右作一次用之、（殺蟲）

服法、先禁食一日。使蟲在腹中無食物之助。先服綿馬流膏一劑。過半點鐘。再服一劑。再服大量瀉藥。該虫即由大便瀉出。當看其有無虫頭。可再服之。否者恐其再生。其頭微細而尖。一看便知。

【處方二】洋蘇冰三十厘(二瓦)

右作一次用之、(殺蟲)

用法、在晚臨睡時。先服蓖麻油半兩。

(一五西西)次早服洋蘇冰三十厘。

(二瓦)後六個鐘頭。服硫酸鎂半兩。

(一五瓦)三點鐘後。虫即瀉出。即

時查看其有頭否。如無頭再服洋蘇

冰三十厘。(二瓦)待五六點鐘。再

服硫酸鎂半兩。(一五瓦)至見虫頭爲止。

蛔蟲 生於腹內則腹痛便秘。生於胃內則食物嘔吐、精神不快、鼻孔癢癢。

【處方一】山道年二厘(〇・一二瓦)乳糖五厘(〇・三瓦)

右作一次服、食前。(殺蛔虫)

第三章 呼吸器病

肺炎 胸部刺痛。呼吸迫促。咳嗽有痰。初爲血色。漸次色黑。惡寒。

【處方一】樟腦酒一錢(四西西)硫酸規尼半錢

(二瓦)吐根酒一錢(四西西)水三兩

(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(體熱、咳嗽有痰用之)

【處方二】肉桂油十五滴(一西西)樟腦雜酒一

錢(四西西)伊打酒一錢(四西西)水

三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(治咳嗽、身熱、痰中代血)

【處方三】阿斯必林五厘(〇·三五)

右作一服用之。(能退熱)

【處方四】發多馨半錢(二瓦)吐根酒一錢(四

西西) 塩酸莫非水一錢(四西西)水

三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(治咳嗽胸痛)

【處方五】安福消腫膏(或碍何好司)

右加熱塗胸部、(消炎)

肺癆症 咳嗽吐痰。呼吸困難。體弱

盜汗。

【處方一】幾阿蘇十滴(〇·六)樟腦雜酒一錢(

四西西)透路糖漿二錢(八西西)炭酸

錘半錢(二瓦)水三兩(一〇〇西西)

右分六次用之、一日三、次食前。

(治咳嗽祛痰)用此方最妙。

【處方二】海葱酒二錢(八西西)安息香雜酒一

錢(四西西)地支他民一錢(四西西)

水三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(呼吸衰弱。咳嗽有痰用之)

【處方三】發多聲十五厘(一瓦)法過路七厘(

○·五瓦)托佛氏散九厘(○·六瓦)

右均三包、一日用完、食前。(祛痰止咳)

【處方四】補爾蒙恩一管

右每日注射一次、(止咳祛痰)

【處方五】遠志浸(六%)六兩(二〇〇西西)滂

篤賁一厘十分之六(○·〇四)杏仁

水七十五滴(五西西)糖精半兩(一

五西西)

右一日三次、二日份、(止咳)

【處方六】麥角膏十五厘(一瓦)鹽酸莫非一厘

(○·〇六)橙皮糖漿四錢(一二西

西)溜水六兩(二〇〇西西)

西藥實驗大全 處方學

右二日份、(止血)

肋膜炎 惡寒、發熱、胸側劇痛、呼吸困難。

【處方二】硫酸規尼十五厘(一瓦)鴉片酒一錢

(四西西)樟腦雜酒一錢(四西西)水

三兩(一〇〇西西)

右分六次用之、一日三次、食

前。(止疼、退熱、止咳)

【處方二】阿斯必林五厘(○·三瓦)

右作一次用之。(能退熱、止疼)

【處方三】補爾蒙恩一管。

右作一次注射、(化痰、鎮咳)

【處方四】安福消腫膏(或碍柯好司)

右加熱塗胸部、(消炎、止痛)

【處方五】薄荷八厘(○·五)鹽酸叩卡印 鹽酸

莫非各一厘半(〇·一)單軟膏十二

錢半(五〇瓦)

右爲軟膏塗布、(止痛)

氣管炎 因感冒、風寒而發之、乾咳、

稍有白色粘液之痰。

【處方一】樟腦酒一錢(四西西)吐根酒一錢(

四西西)抱水哥拉半錢(二瓦)關羊花

酒一錢(四西西)水三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(止咳祛痰)

【處方二】遠志糖漿二錢(八西西)吐根酒一錢

(四西西)樟腦雜酒一錢(四西西)水

三兩(一〇〇西西)

右作六次用之、二日份(祛痰、止

嗽)

喘息 呼吸短促。倦怠疲勞。顏面青

紫。胸內苦悶。

【處方一】地支他民一錢(四西西)福賜透路二

錢(八西西)水三兩(一〇〇西西)

右作六次用之、一日三次、食前。

(定喘消痰)

【處方二】樟腦酒一錢(四西西)地支他民一錢

(四西西)海葱酒二錢(八西西)水三

兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(定喘止咳)

咳血 胸部灼熱、作痛。咽喉癢咳

嗽。同時痰中代血。顏面現蒼白色。

【處方一】樟腦雜酒一錢(四西西)麥角流膏一

錢(四西西)陳皮酒一錢(四西西)水

三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(止血止嘔)

【處方二】次加渤酸鏹十五厘(一瓦)桂皮末十

五厘(一瓦)

右作三包、一次一包、一日份。(止

血收斂)

【處方三】蘇潑拉來寧十五滴(一西西)

右作一次射入皮下。(能止血)

【處方四】愛斯摩列星

右每日注射一支、(止喘)

【處方五】愛非特靈

右每日注射一支、

【處方六】愛非特靈一厘十分之三(〇・〇二)

鹽酸印的印一厘十分之五(〇・〇三)

右一次量、一日三次、(止嘔)

第四章 全身病

貧血 皮膚粘膜現蒼白狀。行走困難。

倦怠、眩暈、耳鳴、虛弱。

【處方一】磷鐵糖漿半兩(一五西西)哥倫布酒

一錢(四西西)水三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食後。

(補血補虛)

【處方二】磷鐵規尼士的年糖半兩(一五西西)

水三兩(一〇〇西西)

右作六次用之、一日三次、食後。

(補血補弱)

【處方三】魚肝油

右一次服、一日三次、食後。(補

虛生血)

虛弱 呼吸迫促。心悸亢進。自汗過

多。神經過敏。頭痛失眠。

【處方一】檸檬銻鐵半錢(二瓦)番木別酒一錢

(四西西)水三兩(一〇〇西西)

右作六次用之、一日三次、食後。

(補血、健胃)婦人用此方下奶。

【處方二】鱒鐵糖漿半兩(一五西西)水三兩(

一〇〇西西)

右作六次用之、一日三次、食後。

(補血、補虛)

【處方三】魚肝油

右一次服、一日三次、飯後。(補

虛生血)

痛風 皮膚色青。週身疼痛。患處灼

熱。晝輕夜重。

【處方一】鎳化鉀一錢(四瓦)水揚酸銻二錢(

八瓦)陳皮酒一錢(四西西)水三兩(

一〇〇西西)

右分六次用之、一日三次、食前。

(止疼、消腫、散炎)

【處方二】阿斯必林十五厘(一瓦)撒婁十厘(

〇·六瓦)

右作三包、一日用完、食前。(止

疼消炎)

【處方三】阿卡奴片

右每日三次、每次一片、食前。(止痛)

【處方四】亞陀方耐而二錢半(一〇西西)

右一次注入靜脈、

【處方五】鹽酸喜挪美人十五滴(一西西)

右一次注入患處、

萎黃病 顏面微腫、呈蒼白色。心悸

亢進。大便秘結。

【處方一】鐵碘糖漿半兩(一五西西)水三兩)

一〇〇西西)

右分六次用之、一日三次、食後。

(補血、補虛)

【處方二】魚肝油一匙

右一次服、一日三次、飯後。(補

虛養血)

第五章 泌尿生殖器病

膀胱炎 惡寒戰慄。週身發熱。腹部

壓痛。尿頻減少。

【處方一】烏羅多賓一錢(四瓦)檸檬鉀一錢(

四瓦) 關羊花酒二錢(八西西)水三

兩(一〇〇西西)

右分六次用之、一日三次、食前。

(能利尿、止疼)

【處方二】哥羅方酒一錢半(六西西)檸檬鎂一

錢(四瓦)烏羅多賓一錢(四瓦)顛茄

酒一錢(四西西)水三兩(一〇〇西西)

右作六次用之、一日三次、食前。

(利尿止痛)

【處方三】硼酸末二錢半(一〇瓦)水一磅(五

〇〇西西)

右化勻、洗膀胱用。(消炎止痛)

【處方四】單寧酸十五厘(一瓦)水製蘆薈膏八

厘(〇·五)白糖半錢(二瓦)

右分六包、一日三包、(收斂)

遺尿 多在就寢後二三小時間。或熟

睡中夢想小便。即時放尿。

【處方一】顯茄酒一錢(四西西)麥角流膏一錢

(四西西)水三兩(一〇〇西西)

右分六次用之、一日三次、食前。

(治遺尿)

【處方二】安息香酸三十厘(二瓦)桂皮末二十

厘(一·三瓦)

右作三包、一次一包、食前。(治

遺尿)

遺精 常於睡眠中夢與人交。醒而遺

精。日久漸次身體衰弱。消化障礙。

頭痛眩暈。

【處方一】鎳化鉀二錢(八瓦)鎳化鎘一錢(四

瓦)甘松酒一錢半(六西西)水三兩(

一〇〇西西)

右分六次用之、一日三次、食前。

(治腦病、遺精)。

【處方二】樟腦酒一錢(四西西)麥角流膏一錢

(四西西)路卑利酒二錢(八西西)水

三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(平腦。助消化)

腎炎 週身寒顫。下肢勝腫。小便不

利。腰痛劇甚。

【處方一】毛地黃酒二錢(八西西)烏羅多賓一

錢(四西西)海葱酒二錢(八西西)水

三兩(一〇〇西西)

右均六次用之，一日三次，食前。

(利尿消腫)

【處方二】醋酸鉀二錢(八瓦)毛地黃酒二錢(

八西西)水三兩(一〇〇西西)

右分六次服之，一日三次，食前。

(利尿。治勝腫)

【處方三】伊打酒二錢(八西西)地支他民一錢

(四西西)布球酒二錢(八西西)水三

兩(一〇〇西西)

右分六次，一日三次，二日用完，

食前。(激心，利尿。治勝腫)

【處方四】硫酸鎂半兩(一五瓦)

右作一次用之，(能消腫，利水)

【處方五】水揚酸鎂加非印三厘(〇・二)白糖

五厘(〇・三)

右一包。與六包。一日三次。

【處方六】醋酸化茶精鎂(即梯烏新)

右每次服〇・二，至〇・三，或一

至二片，(利水大效)

血尿 尿液內帶有鮮紅色，或黃褐色

之血液。

【處方一】炭尼酸十厘(〇・六瓦)桂皮末十厘

(〇·六瓦)

右作三包、一日用、食前。(止血)

【處方二】明礬末六厘(〇·四瓦)烏羅透品一

錢(四瓦)布球 泡水三錢半(一四西

西)水三兩(一〇〇西西)

右作六次用之、一日三次、食前。

(殺菌、止血)

陽萎 陽莖不起。不能營完全生殖之

能。

【處方一】番木別酒一錢半(六西西)樟腦酒一

錢(四西西)水三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(治陽萎)

【處方二】班駁酒十滴(〇·六西西)番木別酒

一錢(四西西)水三兩(一〇〇西西)

右作六次用之、一日三次、食前。(

能激動生殖器)

第六章 神經器病

神經衰弱 頭痛眩暈。腦力衰弱。呈

嗜眠狀。飲食缺乏。陰萎遺精。

【處方一】鎮化鉀一錢(四瓦)鎮化鎂半錢(二

瓦)甘松油一錢半(六西西)水三兩(

一〇〇西西)

右作六次服、一日三次、二日用

完、食前。(補腦、止頭痛、催眠)

【處方二】索弗拿十五厘(一瓦)

右作三包、一日用完、食前。(補

腦、安神、催眠)

【處方三】麟鐵糖漿半兩(一五西西)水三兩(

一〇〇西西)

右作六次用之、一日三次、食後。

(補腦、補虛)

【處方四】烏來唐五厘(〇・三瓦)

右作一次服之。(平腦安眠)

神經痛 四肢初發蟻走狀感覺。次即

週身。微痛。局部現紅色。神經過

敏。

【處方一】安提排林五厘(〇・三瓦)

右作一次用之、食前。(止痛)

【處方二】鹽酸喜那美仁 一管

右每次一支射於皮下、一日二

次。(止痛)

【處方三】霹藍密籐五厘(〇・三瓦)

右作一次服之(治神經疼痛)

【處方四】聖得龍六厘至九厘(〇・四至〇・

六)

右一次服、(止疼)

【處方五】加當(或康普樂)一至二片。

右一次服、(止疼)

眩暈 為卒然發生之神經病。覺身外

諸物。振盪旋轉。婦女易患之。

【處方一】鎮化鉀一錢半(六瓦)甘松酒二錢(

八西西)水三兩(一〇〇西西)

右一日三次、二日用完、食前服。

(能平腦。治眩暈)

【處方二】加非印十厘(〇・六瓦)阿斯必林十

五厘(一瓦)鎳化鉀二十厘(一·三二)

右均三次用之、一日三次。(平腦、

安神)

腦貧血 初則火眼閃發。頭重耳鳴。

四肢厥冷。脊流冷汗。頭痛眩暈。

【處方一】薄荷油

右以少許含口內。(能激腦、興奮)

【處方二】硫酸阿刀賓一厘(〇·六瓦)溜水九

錢(三·六西西)

右化勻射於皮下、每次十滴。(〇·

六西西)(能激腦、興奮)

【處方三】錳香酒十滴(〇·六西西)

右作一次服。(能激腦)

驚悸 突然醒覺現驚怖之狀。舉動異

常。夢中見鬼。

【處方一】鎳化鉀二錢(八瓦)鎳化鈉一錢(四

瓦)鎳化錳一錢(四瓦)水三兩(一〇

〇西西)

右作六次用之、一日三次、食前。

(平腦安睡)

【處方二】甘松酒二錢(八西西)開洋花酒一錢

(四西西)印度麻酒一錢(四西西)水

三兩(一〇〇西西)

右作六次用之、一日三次、食前。

(平腦止驚悸)

不眠症 多由神經系之疾患過甚。或

因他種疾病。煩悶。晝夜不眠。

【處方一】抱水格拉五厘(〇·三瓦)水半兩(

一五四西)

右作一次服之。(能安睡)

【處方二】索弗拿十厘(○·六瓦)

右爲一包、於臨睡三小時前服之。

(能安睡)

【處方三】鎮化鉀十五厘(一瓦)

右作一次、臨睡時服之。(能安睡)

【處方四】烏來唐五厘(○·三瓦)

右同前、

頭痛 頭部眩暈。疼痛異常。狀如破

碎。又如刺衝。

【處方一】安提排林五厘(○·三瓦)

右作一包、與以三包、每日三次

用之。(治頭痛)

西藥實驗大全 處方學

【處方二】阿斯必林十五厘(一瓦)鎮化鉀半錢

(二瓦)

右作三包、分三次用。(止頭痛)

【處方三】阿西炭尼力十厘(○·六瓦)非乃普

廷十五厘(一瓦)阿斯必林十五厘(

一瓦)

右作三包、分三次用。(止頭疼)

【處方四】霹籃密簾十五厘(一瓦)

右爲一包、作一次用。(治頭疼)

【處方五】阿卡奴片二片

右作一次用之。(止頭痛)

【處方六】非乃普廷十厘(○·六瓦)加非印十

厘(○·六瓦)鎮化鉀十厘(○·六瓦)

右作三包、分三次用之、一日份。

(治頭疼特效)

【處方七】福眠錠(或巴畢通)

右每次半至一片、睡前服。

偏頭痛 全身不安。惡心、頭眩、畏

光、惡寒。頭痛偏於一面。左右不

定。

【處方一】加非印十五厘(一瓦)阿斯必林十厘

(〇·六瓦)鎳化鉀三十厘(二瓦)

右作三包、一次一包、一日三次、

食前。(止頭疼)

【處方二】霹藍密籐五厘(〇·三瓦)

右爲一包、作一次用之。(止頭痛)

【處方三】加非印二十厘(一·三瓦)非乃昔廷

二十厘(一·三瓦)鎳化鉀二十厘(一·

三瓦)

右作六包、均六次服用、一日三

次、二日份。(治頭痛)

【處方四】阿卡奴片二片

右作一次用之。(能止頭痛)

【處方五】米古列寧八厘至十五厘(〇·五至

一瓦)

右爲一包、發作時服、

【處方六】水揚酸鈉六十八厘(四·五)

右分九包、三日份、

腦充血 發於猝然。顏面潮紅。頭痛

眩暈。惡心嘔吐。

【處方一】鎳化鉀十厘(〇·六瓦)

右作一次服之。(能健腦)

【處方二】地支他民十五滴(一西西)

右一次射於皮下。(激心活血)

顛痛 突然跌倒。全身筋肉抽搐。軀

幹反張。二目直視。口吐白沫。

【處方一】鎳化鉀一錢(四瓦) 鎳化鈉一錢(四

瓦) 甘松酒一錢半(六西西) 水三

兩(二〇〇西西)

右作六次用之，一日三次，食前。

(能健腦、安睡)

【處方二】抱水格拉一錢(四瓦) 鎳化鉀一錢(

四瓦) 水三兩(一〇〇西西)

右分六次用之，一日三次，食前。

(能健腦、安睡)

【處方三】烏來唐五厘(〇·三瓦)

右爲一包，作一次服之。(能安睡

平腦)

【處方四】碘化鈉十五至四十五厘(一至三瓦)

鎳化鈉三十至六十厘(二至四瓦)

重碳酸鈉三十厘(二瓦) 溜水六兩

(二〇〇西西)

右二十四小時以內服之、

歇斯的里 (婦人腦系不安) 身體疲

勞、忽發眩暈、全身現蒼白色、多出冷汗。

【處方一】抱水格拉十厘(〇·六瓦) 水一兩(三

〇西西)

右作二次用之。(安睡平腦)

【處方二】鹽酸莫非液五滴(〇·三西西)

右一次注入皮下，早晚各一次。

(能平腦)

【處方三】鎮化鉀十厘(〇・六瓦)

右作一次服之。多加水服。(能健

腦安睡)

【處方四】烏來唐五厘(〇・三瓦)

右爲一包、一次服。(安睡、平腦)

【處方五】鎮化鉀九十厘(六瓦) 鎮化銻三十厘

(二瓦) 苦味酒三十滴(二西西) 繡草

酒三十滴(二西西) 溜水六兩(二〇

〇西西)

右一日三次、二日份、

第七章 傳染症

流行性感胃 惡寒戰慄、頭痛咳嗽。

全身骨節痛。四肢倦怠。體熱增高。

【處方一】阿斯必林五厘(〇・三瓦) 澱粉五厘)

〇・三瓦)

右爲一包、作一次用之。(能退熱、

發汗)

【處方二】加非印五厘(〇・三瓦) 阿斯必林五

厘(〇・三瓦)

右爲一包、一次服之。(退熱、止

痛、出汗)

【處方三】硫酸規尼三厘(〇・二瓦) 阿斯必林

五厘(〇・三瓦) 非那昔廷五厘(〇・

三瓦)

右爲一包、一次服之。(退熱、出

汗、止頭疼)

【處方四】阿卡奴片二片

右爲一次服。(止痛、發表、退熱)

【處方五】阿斯必林五匣(○·三瓦)硫酸規尼

一匣(○·〇六)甘草末二匣(○·一

二瓦)

右作一包服之。(能出汗、退熱)

破傷風 毒菌先侵入傷處。漸次蔓延

週身。全身強直狀如木棒。倒臥床

上。

【處方一】氯化鉀半錢(二瓦)

右分三包、每次一包(平腦、解抽)

【處方二】石炭酸

右沾少許點患處。(殺菌)

【處方三】魚石諸酌用

右敷傷處。(消腫、殺菌)

【處方四】鹽酸莫非水五滴(○·三四西)

右射於皮下。(解抽)

【處方五】海鹽酒酌用

右擦患處。

【處方六】破傷風血清

右注射劑。

腮腺炎 領下生有硬核。漸次腫疼。

週身發熱。開口困難。

【處方一】石鹼擦藥酌用

右塗患處。(消腫止痛)

【處方二】錄軟膏(水銀軟膏)

右塗患處。(消毒殺菌)

【處方三】硫酸規尼五匣(○·三瓦)阿斯必林

五匣(○·三瓦)

右作一服用之。(消炎、退熱)

【處方四】硫酸規尼五厘(〇·三瓦) 硫酸鎂半

兩(一五瓦)

右作一次用之、用水沖服。(退熱、

止頭痛)

【處方五】安福消腫膏(碍碍好司)

右塗布劑

瘧疾 發作時身體先冷後熱。頭痛口

渴。有一日一回、二日一回、三日一

回者。

【處方一】鹽酸規尼十厘(〇·三瓦)

右發作前一點鐘服之。(解瘧、退

熱。

【處方二】九一四·二號(〇·三)

右一次注射靜脈

【處方三】希宜佐爾一管

右一次注入靜脈、

【處方四】巴苦諾恩五西西

右一次注射靜脈內

霍亂 惡心嘔吐。腹內雷鳴。口渴抽

筋。四肢厥冷。遂即下瀉。眼窩下陷。

【處方一】哥羅顯十五滴(一西西)

右加水作一次服。(止吐瀉止痛)

【處方二】白陶土一兩(三〇瓦)

右作一次服。其糞下如球。(專止

吐瀉霍亂)

【處方三】鹽酸莫非水十滴(〇·六西西)

右射於皮下。(止吐瀉、止痛)

【處方四】熱水布敷於腹上

【處方五】可羅那金一管

右一次注射靜脈內。(能激心、四

肢反熱)

【處方六】十滴藥水十滴(〇・六)

右一次量、一日數次、

脚氣 其腫。初發於足腫或脛骨。漸

延全身。脈數而弱。知覺麻痺。北

方此症最少。中國南省及日本多有

此病。北方所稱之脚氣。乃是爛脚

症。

【處方一】魚石詣一錢(四瓦)華士林二錢(八

瓦)

右混合塗布貼患處。(消腫止疼)

【處方二】龍膽草散十五厘(一瓦)大黃散十五

厘(一瓦)硫酸鎂一錢(四瓦)

右爲三包。作三次用之。(止嘔吐、

健胃)

【處方三】礬鐵糖半兩(一五西西)水三兩(一

〇〇西西)

右作六次用之、一日三次、食後。

(補血補虛)

【處方四】醋酸鉛一錢(四瓦)鴉片酒一錢(四

西西)水六兩(二〇〇西西)

右化勻、以布蘸此水敷之。(消炎、

消腫、止痛。)

【處方五】巴拉努安林四十五至九十滴(三至

六西西)

右一日量、皮下注射一次量。(一至二西西)

痘瘡 出痘後日久變瘡。多流膿水。

而發痛癢、蔓延各處。

【處方一】硼酸半錢(二瓦)水三兩(一〇〇西西)

右化勻洗之。(能殺菌)

【處方二】亞鉛華軟膏 酌用

右塗患處。(去毒、生肌除濕)

【處方三】拉沙軟膏

右塗患處

傷寒、頭痛、惡寒、體熱、倦怠、

【處方一】阿斯必林五厘(〇·三瓦)鹽酸規尼

四厘(〇·二四瓦)

右作一服用之。(退熱、止頭痛、發表)

【處方二】安和必林五厘(〇·三瓦)非乃西廷

五厘(〇·三瓦)

右作一次服之。(能發表、出汗、退熱)

【處方三】阿卡奴片二片

右作一次服之。(能退熱、止痛)

麻疹 流淚流涕。面赤氣粗。結合膜

色紅。體熱。初於皮膚生赤色小斑

點、或結節。

【處方一】阿斯必林五厘(〇·三瓦)

右作一次服之(發表、退熱)

【處方二】阿西炭尼力五厘(〇·三瓦)加非印

五厘(〇・三瓦)

右作一次服之。(退熱、利尿。)

【處方三】阿卡奴片二片

右作一次服之。(退熱、發表)

白喉 喉部浮腫。生有假膜。呈灰白

色。飲食艱難。發熱頭疼。

【處方一】硝酸銀酌用

右塗患處。(殺菌、斂澁)

【處方二】昇汞水二〇〇〇倍酌用

右擦患處。(殺菌、去假膜)

【處方三】安提排林五厘(〇・三瓦) 鹽酸規尼

五厘(〇・三瓦)

右爲一包、作一次用之。(退熱、

止頭痛)

西藥實驗大全 處方學

第八章 外科處方

打傷 疼痛、紅腫。

【處方一】海碘酒酌用

右擦患處。(消腫、止痛)

【處方二】魚石醋酌用

右擦患處、或外敷用。(能消腫止痛)

【處方三】松節油搽藥酌用

右擦患處。(消腫、止痛)

【處方四】醋酸鉛一錢(四瓦) 鴉片酒一錢(四

西瓦) 水六兩(二〇〇西瓦)

右化勻。以手巾蘸敷患處。(消

腫、止疼) 皮未破者用之。

癰疽 色赤而腫。硬疼體熱。漸生小

膿疹如節狀。後即變膿。

【處方一】魚石脂酌用

右作外用藥。(消腫、散炎)

【處方三】硫酸鎂一兩(三〇瓦)

右用沸水一磅化勻。以熱手巾把。

蘸此水敷之。未破頭以前用。(能

消腫、止疼)

【處方四】萊蘇半錢(二西西)水三兩(九〇西

西)

右化勻。洗瘡用。(殺菌)

【處方五】黃碘軟膏

右外用。(生肌)

【處方六】赤降汞軟膏

右塗布劑。

凍傷 重者色紅黑而疼。輕者皮破流

膿。知覺麻痺。

【處方一】流動巴拉粉四十五厘(三西西)樟腦

三厘(〇・二瓦)

右混合塗患處。(止疼、消腫)

【處方二】硼酸軟膏酌用

右敷於患處(消腫、止疼)

【處方三】亞鉛華軟膏酌用

右塗於破處(止疼、殺菌消腫)

【處方四】粗製明礬七十五厘(五瓦)醋酸鉛六

錢(二四瓦)溜水一磅(五〇〇西西)

右審法料。(壞疽之劑)

【處方五】碘酒五倍子酒各二錢半(一〇西西)

右塗布劑、

扭傷 骨節被扭。不能動作。紅腫而

疹。

【處方一】松節油搽藥酌用

右塗搽患處。(舒筋)

【處方二】樟腦搽藥酌用

右塗搽患處。(舒筋)

【處方三】海鹽酒酌用

右塗搽患處。(消腫)

【處方四】醋酸鉛一錢(四瓦)鴉片酒一錢(四

西瓦)水六兩(二〇〇西瓦)

右化勻敷之。(消腫、止疹)皮末

破者用之。

【處方五】硫酸鎂一兩(三〇瓦)鹽酸規尼半錢

(二瓦)苦味酒一錢(四西瓦)水六兩

(二〇〇西瓦)

右均十二次用之、一日三次、食

前。(退熱)

燒燙傷 被火或沸水燒燙。起有水疱。

皮破潰爛。疼痛流膿。

【處方一】硼酸軟膏酌用

右塗患處。(止痛、殺菌)

【處方二】沒食子酸耆鉛六十厘(四瓦)華士林

十錢(四〇瓦)

右合勻敷患處。(生肌、防腐、殺菌)

【處方三】石炭酸一錢(四瓦)華士林一百錢(

四〇〇瓦)

右合勻敷之。(殺菌、止疹、防腐)

【處方四】大黃末半錢(二瓦)龍膽末半錢(二

瓦)百布聖四十五厘(三瓦)水揚酸銀

二十厘(一·三瓦)

右均六包、一日三次、食後。(健

胃、去毒)

【處方五】石灰水一兩(三〇西西)羊毛脂二錢

半(一〇瓦)豚脂五錢(二〇瓦)

右外用。

痔瘡 乃在肛門內外所生之瘡。常覺

癢痛。便時異常疼痛。淋漓出血。

厥腫癢爛。

【處方一】硫酸鎂半兩(一五瓦)

右作一次服。(利便。可免疼痛)

【處方二】咯維導爾坐藥一個

右剝去銀皮插肛內。一日一二次

換之。(治內痔。止痛)

【處方三】咯維導爾軟膏酌用

【處方四】沒石子鴉片軟膏酌用

右各塗患處。(治外痔)

【處方五】加斯加拉流膏三錢(一二西西)苦味

酒半錢(二西西)水三兩(一〇〇·〇)

右化勻、一日三次、食前。(能利

便。治痔瘡、便秘)

天庖瘡 在皮膚生水庖。內有透明之

漿液。漸變爲膿。

【處方一】硼酸軟膏酌用

右外用(止痛)

【處方二】水揚酸十厘(〇·六瓦)澱粉(二〇瓦)

右撒於患處。(祛濕)

【處方三】石炭酸軟膏酌用

右塗糜爛處。(殺菌)

【處方四】亞鉛華軟膏

右塗患處。(祛濕)

【處方五】磷鐵糖漿半兩(一五西西)水六兩(

二〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食後、

(能清毒、養血)

【處方六】奧倫(一〇西西)

右一次注入筋肉、(臀部)

刀傷 流血不止。患處疼痛。

【處方一】黃碘酌用

右敷患處。(止痛生肌)

【處方二】次沒石子酸蒼鉛酌用

右敷患處。(止血、生肌)

【處方三】磷鐵糖漿半兩(一五西西)水六兩(

二〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食後。

(養血、補虛)

【處方四】亞鉛華一錢(四瓦)澱粉二錢(八瓦)

硼酸半錢(二瓦)

右研勻、敷刀口處。(能生肌)

漏瘡 多生骨上。瘡口日久不癒。常

流白色如米湯狀稀膿汁。

【處方一】黃碘酌用

右外用撒布之。

【處方二】黃碘二錢半(一〇瓦)甘油酌用、

叩叩脂五錢(二〇瓦)

右作細條十個。每用一個插孔中。

【處方三】赤降汞軟膏

右塗患處(提毒)

癰瘍 如豆大之結。先疼痛而硬。後

發黃點化膿。

【處方一】海碘酒酌用

右塗患處周圍。

【處方二】水銀軟膏酌用

右塗布之。(去毒化硬)

【處方三】硼酸膏酌用

二右敷患處。(止痛消炎)

【處方四】燐鐵糖漿半兩(一五西西)水六兩

(二〇〇西西)

右均十二次用之、一日三次、食後。(補血、清毒)

咬傷(蛇咬、狗咬、蜂螫、及各種獸類

咬)患處皮破。週圍紅腫。

【處方一】黃碘酌用

右外用。(止痛)

【處方二】過錳酸鉀二厘(〇・一二瓦)水六兩

(二〇〇西西)

右洗患處。(殺菌、生肌。)後敷黃碘或膏藥。

【處方三】硼酸軟膏酌用

右外用。(止痛)

【處方四】碘酒酌用

右外用(消腫)

【處方五】柯母尼亞水

右濕布劑(止痛、去毒)

癩疽 爲手指上常患之病。因該皮膚

較他處硬而厚。舉動甚疼。

【處方二】黃蠟軟膏酌用

右貼患處。(漸次柔軟)

【處方三】石炭酸軟膏酌用

右貼患處。(漸次軟化)

第九章 眼科處方

火眼 結膜充血。痛腫畏光。多生泗

液。動轉障礙。

【處方一】硼酸末半錢(二瓦)沸水三兩(一〇

〇西西)

右化勻洗之、每日三四次。(消炎。

止疼)

【處方二】蛋白銀點眼水(三至五%)

右點眼用。(消炎)

【處方三】硝酸銀點眼水(一至二%)

右點眼用。(收斂)

【處方四】硫酸銻五厘(〇·三瓦)水一百滴(六

·六西西)

右化勻點眼。

【處方五】硫酸鎂半兩(一五瓦)硫酸鐵半錢(

二瓦)水六兩(二〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食後。

(退熱)

【處方六】錄銘(即二百二十)

右作百分之一·二溶液。點眼。(消

炎、止痛)

雲翳 乃角膜上有不明。或半明之白

膜。不能視物。

【處方一】硫酸銻五厘(〇·三瓦)硼酸一錢(四

瓦)沸水六兩(二〇〇西西)

右化勻洗之。(雲翳漸化)

【處方二】硝酸銀點眼水(一%至二%)

右點眼用。(磨雲翳)

【處方三】蒸氣製甘汞

右以毛筆蘸少許。點患處。

爛眼邊 眼邊發赤。糜爛濕潤。

【處方一】黃降汞軟膏酌用

右擦患處、

【處方二】硼酸軟膏酌用

右擦患處、

【處方三】紅降汞軟膏酌用

右擦患處、

【處方四】昇汞一厘(〇·〇六瓦)水二千滴(一

三〇瓦)

右化勻洗之、

梅毒眼 畏光流淚。瞳孔不圓。而現

紅色。

【處方一】昇汞一厘(〇·〇六瓦)水二十二兩

(六六〇西西)

右化勻，每日洗二次。(殺菌、清

毒)洗梅毒眼最效。

【處方二】九一四藥針三號

右每四五日注射一次。

【處方三】昇汞半厘(〇·〇三瓦)碘化鉀一錢(四

瓦)銻香酒半錢(二西西)水六兩(二

〇〇西四)

右均十二次用之。一日三次、食前。(治梅毒)

淋毒眼 忽然紅腫而痛。流淚不止。

泗液甚多如膿。畏光。

【處方一】昇汞一厘半(〇·一〇瓦)水六兩(二

〇〇西四)

右一日三次洗之。

【處方二】硝酸銀水酌用(1%)

右點眼內。一日一次。

【處方三】黃降汞軟膏酌用

右塗眼皮內。(殺菌、消炎)

沙眼 眼皮之結膜腫脹。潮紅。泌液

較多。上有小尖粒。

西藥實驗大全 處方學

【處方一】硫酸銅塊酌用

右塗擦上下眼皮內。一日一次。

【處方二】硫酸鋅一日上二次收斂磨粒

【處方三】行手術。以小刀將粒割破。

【處方四】硝酸銀

右以探針捲棉花少許令濕、然後

蘸此藥擦顆粒上、立時變白、遂

用食鹽水洗之、能斂滲散炎剷除

顆粒。

眼疔 角膜紅腫痛如針刺、畏光流淚。

角膜上有微細小白點。

【處方一】海碘酒

右以少許點疔。

【處方二】甘汞

右以少許點患處

【處方三】硼酸水

右一日三次洗眼。(消炎)

第十章 齒科處方

牙痛 飲食難進。睡臥不安。疼痛異常。

常。

【處方一】幾阿蘇

右以棉球。蘸藥少許。塞患處。

【處方二】哥羅芳

右以棉球。蘸藥少許。塞患處。

【處方三】耶卡因水一錢(四西西) 酒精五滴

(〇·三西西)

右以棉球蘸藥少許。塞患處即癒。

【處方四】幾阿蘇五滴(〇·三西西) 薄荷油十

滴(〇·六西西) 酒精半錢(二西西)

右化勻以棉球蘸之。塞患處(止疼)

【處方五】硫酸鎂半兩(一五瓦)

右作一次服(能去火、消炎、止疼)

眼腫 灼熱疼痛。嚼物甚難。

【處方一】氯化鉀一錢(四瓦) 沸水六兩(二〇〇

〇西西)

右化勻漱之(消炎、止痛)

【處方二】硝酸銀水酌用

右擦患處收斂(止疼、防腐)

【處方三】硫酸鎂半兩(一五瓦)

右作一次服(能瀉火、消炎、止痛)

第十一章 皮膚病處方

毛虱 形扁平。為淡褐色之虱。多棲

於陰毛中。漸延他處。異常癢痒。

【處方一】水銀軟膏酌用

右擦患處、當日即死。

【處方二】昇汞一厘半(〇・一〇瓦)水六兩(二

〇〇西西)

右化勻洗之。(殺陰虱)當日全癒。

【處方三】濃酒精一錢(四西西)石炭酸十五滴

(一西西)

右合勻擦患處。

【處方四】除虫菊(即臭虫藥粉)

右撒布劑。

頭虱 常棲於髮內。易起不快癢痒。

因爬癢易起濕疹。

【處方一】酒精酌用

西藥實驗大全 處方學

右每日擦二次。

【處方二】昇汞一厘半(〇・一〇瓦)水六兩(二

〇〇西西)

右一日洗二次。

【處方三】水銀軟膏酌用

右擦患處。

手足出汗 患處皮呈白色。糜爛輝

裂。疼痛異常。

【處方一】炭尼酸一錢(四瓦)酒精十錢(四〇

西西)

右化合塗布上裹之。(治手足出汗)

【處方二】明礬一錢(四瓦)沸水三兩(二〇〇

西西)

右化勻洗之。

【處方二】亞鉛華酌用

右敷患處。

【處方四】亞鉛華一錢(四瓦)水揚酸十五厘(

一瓦)澱粉一錢半(六瓦)白礬二錢

(八瓦)

右研勻撒布上。

禿髮症 多因急性傳染病癒後。或梅

毒、或火傷、或毛囊炎等症。

【處方一】石炭酸十五滴(一西西)酒精七錢(

二八西西)蓖麻油一錢(四西西)

右合勻。搓搽患處。(能生髮)

【處方二】班駁酒三錢(一二西西)辣椒酒三錢

(一二西西)蓖麻油半錢(二西西)酒

精二錢(八西西)

右調合搽患處。(能生髮)

【處方三】礬鐵糖漿半錢(一五西西)水六兩(

二〇〇西西)

右均十二次用之，一日三次，食

後。(能補血、生髮)

癩風 多發於頸及上肢各處。大如桃

實。色黃褐。異常癢症。

【處方一】其瑣編五錢(二〇瓦)華士林二兩(

六〇瓦)

右合勻塗患處。

【處方二】碳酸鉀半錢(二瓦)水三兩(一〇〇

西西)

右化勻搽之。(解痒消炎)

【處方三】抱水格拉十五厘(一瓦)樟腦十五厘

(一瓦)華士林四錢(一六瓦)

右調膏搽之。(散炎、解癢)

【處方四】石炭酸十五滴(一西西)甘油二錢半

(一〇西西)水三兩(一〇〇西西)

右合勻搽之。(止癢)

【處方五】阿斯必林五厘(〇・三瓦)加非印五

厘(〇・三瓦)

右作一服用之。(發表、出汗)

面疱 如針尖狀之點多發於前額、鼻

尖、口・唇・胸部。

【處方一】亞鉛華一錢(四瓦)硼酸半錢(二瓦)

甘油二錢(八西西)水三兩(二〇〇

西西)

右化勻搽之。

【處方二】昇汞一厘(〇・〇六瓦)水四兩(二二

〇西西)

右化勻洗患處。

【處方三】水揚酸半錢(二瓦)亞鉛華二錢(八

瓦)澱粉二錢(八瓦)酒精一兩(三〇

西西)水二兩(六〇西西)

右化勻搽之。

腋臭 腋窩之分泌汗液過甚。致接觸

之皮膚浸濕糜爛。

【處方一】水揚酸半錢(二瓦)澱粉半錢(二瓦)

右調合撒之。

【處方二】水揚酸四十五厘(三瓦)亞鉛華一錢

(四瓦)明礬一錢(四瓦)

右調勻。撒患處。(止汗、解臭)

【處方三】拉灣大雜酒一錢(四西西) 顯茄酒二

錢(八西西) 樟腦酒二錢(八西西) 亞

鉛華二錢(八瓦) 澱粉一錢半(六瓦)

酒精三兩(一〇〇西西)

右化勻搽之。(止臭、止汗)

【處方四】達萊蘭

右敷擦劑。

爛脚 (俗名脚氣) 多因出汗所侵。糜

爛、潮濕、癢痒。漸至皮破流膿。

【處方一】拉沙軟膏酌用

右敷患處。

【處方二】澱粉一錢(四瓦) 亞鉛華一錢(四瓦)

水揚酸十五厘(一瓦)

右研勻搽患處。一日一次。(能祛

濕解痒、殺菌)

【處方三】水揚酸半錢(二瓦) 酒精三兩(一〇〇

〇西西)

右溶化。搽患處。(治爛脚) (市上

所賣之脚氣水即此方)

黃水瘡 初生紅色小粒。異常癢痒。

搗破而流黃水。蔓延各處。

【處方一】拉沙軟膏酌用

右一日敷二次。(祛濕解痒)

【處方二】亞鉛華軟膏

右一日敷二次。(祛水除濕)

【處方三】硼酸洗水酌用

右一日洗二次(殺菌)洗後再塗水

揚酸軟膏。或亞鉛華軟膏即愈。

【處方四】大黃末半錢(二瓦)龍膽末半錢(二

瓦)水揚酸鎔二十厘(一・三瓦)重炭

酸鎔三十厘(二瓦)

右均爲六包、一日三次、食前用。

(健胃消毒)

【處方五】樺油七十五滴(五西西)亞鉛華

滑石各半兩(一五瓦)花士林六錢半

(二六瓦)

右塗布料、

乾癬 爲銀白色重疊之鱗片。甚易剝

脫。異常癢。

【處方一】水揚酸軟膏

右一日擦二次。(殺菌、解痒)

【處方二】其瑣編十五厘(一瓦)水揚酸五厘(

○・三瓦)花士林二兩(六〇瓦)

右調勻、一日敷二次。(治癬、

解痒、殺菌)

【處方三】水揚酸半錢(二瓦)其瑣編十厘(六

瓦)海鹽酒一錢(四西西)酒精一兩(

三〇西西)

右化勻。(治癬、殺菌、解痒)(

癬治水即此方也)

濕癬 起癢痒之刺戟。由爬搔而生之

小粒。患處濕潤。

【處方一】硫黃軟膏

右擦之(解痒)

【處方二】硫黃一錢(四瓦)水揚酸十五厘(一瓦)

豬脂一兩半(四五瓦)

右調膏搽之。(解痒殺菌)

(三〇西西)

右調膏搽之。(解痒、殺菌)

【處方三】水揚酸半錢(二瓦)亞鉛華一錢(四瓦)甘油二錢(八西西)酒精二兩(六〇西西)

【處方四】水揚酸一錢(四瓦)酒精一兩(三〇西西)

右化勻塗之。(殺菌)

右化勻塗搽。(治癬、殺菌、止癢)

頑癬 患處色赤。隆起而落屑。漸次蔓延。非常癢痒。

【處方五】石炭酸一錢(四西西)酒精二十錢(八〇西西)

【處方一】水揚酸軟膏酌用

右化勻每日搽二次。(解痒、殺菌、治癬)

右一日二次塗之。(解痒、殺菌)

【處方二】亞鉛華一錢(四瓦)水揚酸五厘(〇·三瓦)其瑣編半錢(二瓦)華士林一兩(四五瓦)

雀斑 多生於面部。如米粒大之褐色、或黑色之點多數。並生無單生者。

兩(四五瓦)

【處方一】海鹽酒酌用

右調膏塗之。(殺菌、解痒)

右塗擦患處。皮脫爲止。

【處方三】石炭酸二錢半(一〇西西)甘油一兩

【處方二】昇汞一厘半(〇·一〇瓦)水六兩(二

○西西)

右合勻洗之。皮脫爲止。

酒刺 多生於胸部或面部。大如豆。小

如針蒂之疙疸。色紅癢痒。

【處方一】硼砂一錢(四瓦)甘油半錢(二西西)

右調膏擦之。

【處方二】亞鉛華一錢(四瓦)硼酸半錢(二瓦)

水揚酸五厘(○·三瓦)花士林三兩(

九○瓦)

右作膏擦之。(解痒、殺菌)

【處方三】水揚酸半錢(二瓦)亞鉛華一錢(四

瓦)甘油一錢(四西西)酒精二兩(六

○西西)

右化勻擦之。

西藥試驗大全 處方學

濕疥 先在指縫起本色尖形之點。癢

痒異常。漸延全身。

【處方一】硫黃軟膏酌用

右每日擦患處二次。(殺菌解痒)

【處方二】昇華硫黃二錢(八瓦)

右沐浴出汗時將藥擦之。待片時

藥力透入。再用水沖去。治濕疥。

此藥無油性而不沾衣。

膿疱疥 全身皮膚生豆大之白疱。內

含膿漿。

【處方一】氯化銻汞軟膏酌用

右每日擦患處二次。(殺菌)

【處方二】拉沙軟膏酌用

右每日擦患處二次。(殺菌、消炎)

【處方三】石炭酸洗水酌用

右每日洗患處二次。(殺菌)然後

再敷軟膏類藥品。

【處方四】石炭酸軟膏酌用

右每日敷患處二次。(解痒殺菌)

【處方五】礐鐵糖漿半兩(一五西西)水六兩(

二〇〇西西)

右均十二次用之，一日三次，食

後用。(養血、清毒)

第十二章 耳鼻喉科處方

耳漏 爲耳道之膿炎。漏出膿形之分

泌物。味臭難聞。

【處方一】石炭酸一錢(四西西)甘油一錢(四

西西)水二十兩(六〇〇西西)

右化勻爲洗滌料。(能殺菌。治耳
內出膿)

【處方二】黃碘軟膏酌用

右每日塗紗布。塞耳內。(殺菌)

【處方三】硼酸軟膏酌用

右每日塗紗布。塞耳內。(殺菌)

【處方四】明礬末酌用

右每日吹入耳內。(收斂、除濕)

【處方五】黃碘二錢半(一〇瓦)甘油三兩(一

〇〇西西)

右化勻滴耳內。(殺菌、消炎)

【處方六】過錳酸鉀二厘(〇·一二瓦)水一兩

(二〇〇西西)

右化勻洗聽耳。(殺菌、解毒)然後

再上他種藥品。

耳痛 因耳道發炎之故。色赤而腫。

漸流膿液。阻碍聽覺。

【處方一】阿得列那林溶液酌用

右滴入耳內三四滴。(消炎止痛)

【處方二】鹽酸叩卡因一厘(〇・〇六瓦)硼酸

末二厘(〇・一二瓦)酒精二滴(〇・

一二西西)水二錢半(一〇西西)

右化勻滴入耳內。(止疼、消炎、

殺菌)

【處方三】硼酸末二厘(〇・一二瓦)橄欖油四

錢(一六西西)

右化勻滴耳內。(消炎、止痛)

【處方四】硼酸十五厘(一瓦)甘油一錢(四西

西)薄荷油一滴(〇・〇六西西)

右化勻滴耳內。(止痛、殺菌)

【處方五】歐魯眉金(藥・甘油合劑)

右滴入藥。

鼻衄 (即鼻出血)有因頭痛耳鳴而發

作者。有因婦人月經閉止而發作者。

【處方一】阿得列那林溶液

右蘸布條插鼻孔內。(止血)

【處方二】過氯化鐵酒

右蘸布條。插鼻內。(止血)

【處方三】松節油十滴(〇・六西西)

右蘸布條。塞鼻孔內。止血、收斂

【處方四】檸檬銻鐵半錢(二瓦)水三兩(二〇

〇西西)

右均六次用之、一日三次、食後用。(歛滯止血)

【處方五】烏頭酒半錢(二西西)水三兩(一〇〇西西)

右方均六次用、每十五分鐘服一次。(治鼻出血)

鼻泗膜炎 鼻內乾燥。閉塞微痛。頻發噴嚏。漸致鼻泗流出。

發噴嚏。漸致鼻泗流出。

【處方一】薄荷油十滴(〇·六瓦)

右用噴霧具噴之。(消炎、止痛)

【處方二】硼酸軟膏酌用

右蘸布條。塞鼻孔內。(消炎、止痛)

【處方三】樟腦塊少許

右以鼻聞之。(能散炎)

【處方四】樟腦十厘(〇·六瓦)鎮茄膏二厘(〇

·一二瓦)硫酸規尼二十厘(二·三瓦)

右共成二十九丸、每小時服一丸、

每日四五次。(治傷風)

【處方五】阿卡奴片二片

右作一次服之、每日二次、食後。

(治傷風)

喉頭炎 初覺喉頭癢、即現咳嗽狀

態。咯出白色泡沫之痰。言語失音。

【處方一】明礬半錢(二瓦)薄荷水二厘(〇·一

二瓦)水三兩(一〇〇西西)

右化勻含漱用。(消炎、散腫。)

【處方二】氯化鉀半錢(二瓦)水三兩(一〇〇

西西)

右作含漱用。(消炎)

【處方三】硝酸銀水酌用

右擦患處。一日二次。(收斂)

【處方四】氯化鉀一錢(四瓦)薄荷油二滴(〇。

一二西西)水六兩(二〇〇西西)

右化勻漱喉。(消炎、止痛)

第十三章 婦人科處方

乳閉 身體榮養不良。神經受感刺戟。

【處方一】檸檬亞鐵一錢(四瓦)番木別酒一錢

半(六西西)甘油二錢(八西西)水六

兩(二〇〇西西)

右化勻一日三次、四日用完、食

後。(補血生乳)

【處方二】磷酸鐵糖二錢(八西西)水三兩(一

〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食後

用。(補虛、養血、生乳)

乳多 產後乳汁分泌過多。乳中雜有

水樣之汁。

【處方一】碘化鉀一錢(四瓦)糖漿一兩(三〇

西西)水三兩(一〇〇西西)

右作六次用之、一日三次、食前。

(止泌乳)

【處方二】顯茄酒一錢半(六西西)烏頭酒半錢

(二西西)鴉片酒半錢(二西西)水三

兩(一〇〇西西)

右作六次服之、一日三次、食前。

乳腺炎 內有硬核。惡寒戰慄。身體發

熱。患處色赤。壓之痛甚。

【處方二】魚石滯半兩（一五瓦）華士林半兩
（一五瓦）

右調勻塗患處，一日二次。（消腫止痛）

【處方二】醋酸鉛一錢（四瓦）鴉片酒一錢（四西西）水六兩（二〇〇西西）

右以布蘸此水敷患處。

【處方三】顯茄硬膏或帖膏酌用

右敷患處。一日一次。（止痛生乳）

【處方四】蓋酸尼規半錢（二瓦）顯茄酒一錢（四西西）甜硝伊打酒一錢（四西西）

水六兩（二〇〇西西）

右分六次服之，一日三次，食前。

（消炎止痛）

經閉 多因生殖之病。全身衰弱。精神受感。驚怖悲哀之故。

【處方一】龍膽草酒二錢（八西西）磷酸鐵糖半兩（一五西西）番木鱉酒一錢（四西西）水六兩（二〇〇西西）

右勻六次用之，一日三次，食後。（補血調經）

【處方二】蘆薈鐵丸

右每日三次，每次一・二丸（調經）

【處方三】檸檬鉍鐵一錢（四瓦）水六兩（二〇〇西西）

右作十二次用之，一日三次，食後用。（調經、補血）

【處方四】阿葛滿新一支

右隔一日注射一次。約十餘次即

來月經。或用片劑。每日兩片。

惡阻 爲婦人妊娠後常有之症。頻發

惡心嘔吐。

【處方一】次硝酸鈹半錢(二瓦)重碳酸鈉半錢

(二瓦)白糖一錢(四瓦)

右作六包、二日用完、一日三次、

食後用。(止嘔、止吐)

【處方二】阿妥嫻諾哉三十厘(二瓦)水揚酸鈹

十五厘(一瓦)甘草雜散十厘(〇·六)

右作三包、一日用完、食後用。(

止嘔吐)

【處方三】鴉片酒一錢(四西西)顛茄酒一錢

西藥實驗大全 處方學

(四西西)豆叩酒半錢(二西西)水三

兩(一〇〇西西)

右分六次用之、一日三次、食前。

(止嘔吐)

月經過多 在月經時期以外之出血。

是爲子宮出血。

【處方一】麥角流膏一錢(四西西)顛茄酒一錢

半(六西西)水三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前

用。(止血)

【處方二】過氫酸鐵一錢(四西西)水三兩(一

〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食後

用。(補血、止血)

二三五

【處方三】蘇潑拉來寧十五滴(一西西)

右射於皮下。(止血)

【處方四】西斯多滿新一支

右注射劑

經痛 疼痛有輕、有重、有嘔吐、及

偏頭痛者。

【處方二】烏羅透品一錢(四瓦) 顯茄酒一錢

(四西西) 鴉片酒一錢(四西西) 水三

兩(一〇〇西西)

右分六次用之、一日三次、食前。

(止痛)

【處方二】開羊花酒一錢(四西西) 亞硝酸伊打

精一錢(四西西) 龍膽草酒一錢半(

六西西) 鴉片酒一錢(四西西) 水三

兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(止痛)

【處方三】聖得龍八厘(〇·五)

右一次量、

產痛 多因初產、或陰道破裂、疼痛

異常。

【處方二】鹽酸莫非水五滴(〇·三西西)

右注射皮下。(止痛、平腦)

【處方二】哥羅芳酌用

右臨盆時令其吸之。(能麻醉、止

痛、鬆肌)

產後流血不止 因子宮破裂之故。

【處方一】蘇潑拉來寧十滴(〇·六西西)

右射於皮下。(止血)

【處方二】麥角流膏十五滴(一西西)

右每日一次。射入肌肉內(止血)

子宮炎 小腹疼痛。時流血液。或白

色味臭粘液。

【處方一】烏羅透品一錢(四瓦)哥羅芳酒二錢

(八西西)顛茄酒一錢(四西西)鴉片酒

一錢(四西西)水三兩(一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前

用。(消炎止痛)

【處方二】樟酸鉀一錢(四瓦)鴉片酒一錢(四

西西)關羊花酒一錢(四西西)亞硝

酸伊打精一錢半(六西西)水三兩(

一〇〇西西)

右均六次用之、一日三次、食前。

(止痛消炎)

【處方三】阿魯賴斯卿(二〇西西)

右一次注射靜脈內、

白帶 陰道發炎。現有白色或黃色之

粘液。味惡。

【處方一】白檀油半錢(二西西)樟酸鉀一錢(

四瓦)布球酒二錢(八西西)水三兩(

一〇〇西西)

右分六次用之、一日三次、食前。

(利水殺菌)

【處方二】果乃金十兆菌一管者

右每次射一管於靜脈內。(殺菌)

【處方三】硝酸銀半錢(二瓦)水三兩(一〇〇

西西)

右洗之。(收斂、殺菌)

【處方四】醋酸鉛半錢(二瓦)水三兩(一〇〇

西西)

右洗之。(收斂、殺菌)

【處方五】白檀油五滴(〇・三西西)撒婁五厘(

〇・三瓦)

右裝膠囊內服之。(殺菌、止白帶)

【處方六】滂濁薄清

右作十分之三溶液。洗滌陰道。

陰戶癢 內外癢痒異常。色赤而腫。

【處方一】石炭酸半錢(二西西)水三兩(一〇

〇西西)

右化勻洗之。(解痒、散炎)

【處方二】昇汞洗水酌用(千分之一溶液)

右每日洗二次。(解痒、消炎)

【處方三】硼酸末半錢(二瓦)水三兩(一〇〇

西西)

右化勻洗之收斂(止痒、消炎)

【處方四】石炭酸一錢(四西西)酒精三兩(一

〇〇西西)

右化勻擦之(解痒)

【處方五】明礬二十厘(一・三瓦)水一兩(三〇

西西)

右化勻每日二次、洗患處(止痒)

第十四章 花柳病處方

淋症 初染尿道刺痒。五六日後即流

白色粘液。疼痛異常。

【處方一】果乃金二十兆菌一管

右每次用一管。注射靜脈內。二

三日一次。(殺菌、止淋)

【處方二】白檀油一錢(四西西)糖漿二錢(八

西西)水三兩(一〇〇西西)

右作六次用之、一日三次、食前。

(止淋殺菌)

【處方三】哥拜把油一錢(四西西)撒婁一錢(

四瓦)開羊花酒一錢半(六西西)布球

酒二錢(八西西)水三兩(一〇〇西西)

右六次用、二日份、食前。(殺菌

止淋)

【處方四】過錳酸鉀一厘(〇・〇六瓦)水十六

兩(一磅)

右化勻。洗尿道。(殺菌)

【處方五】樟酸鎂一錢(四瓦)顯茄酒一錢半(

六西西)哥拜把油半錢(二西西)水

三兩(一〇〇西西)

右分六次服之、一日三次、食前、

【處方六】托呂帕弗登文

右作百分之一溶液、每次注入靜

脈一〇西西。

軟性下疳 陽莖初生一泡。內有漿

液。週圍紅而硬。泡破變瘡。

【處方一】黃磷半錢(二瓦)次硝酸鎂十五厘(

一瓦)

右研勻撒患處、一日二次。(殺菌

生肌)

【處方二】甘汞一錢(四瓦) 澱粉一錢半(六瓦)

右研勻一日二次。(殺菌、生肌)

【處方三】九一四藥針三號(○·四五瓦)一管

右七日注射一次。(殺菌、清毒)

【處方四】昇汞半厘(○·○三瓦) 碘化鉀一錢

(四瓦) 麝香酒一錢(四西西) 水六兩

(二〇〇西西)

右均十二次用之、一日三次、食

前用。(殺菌、清毒)

【處方五】水銀軟膏酌用

右塗患處。

橫痃 (俗名魚口便毒) 在陰毛之上。

初起硬疙疸。紅腫疼痛。漸即變膿。

【處方一】魚石詣半兩(一五瓦) 華士林半兩

(一五瓦)

右敷患處、每日二次。(消腫、止痛)

【處方二】九一四藥針三號(○·四五瓦)一管

右七日注射一次。

【處方三】海碘酒酌用

右擦患處。(消腫、止痛)

【處方四】過錳酸鉀洗水(千分之二溶液)

右如破先洗後用黃碘軟膏敷之。

(去腐、生肌)

【處方五】奧倫(一〇西西)

右注射臀部肌肉。約三四次可愈。

梅毒入骨 第二期梅毒。週身骨痛

動轉艱難。

(處方一) 九一四藥針三號(○·四五瓦)

右七日注射一次

【處方二】碘化鉀一錢（四瓦）水揚酸鎂二錢

（八瓦）陳皮酒一錢（四西西）水六

兩（二〇〇西西）

右分十二次用之、一日三次、食

前。（消炎止痛）

梅毒落後 肛門週圍隆起。有粘液

流出。疼痛異常。

【處方一】九一四藥針三號（〇・四五瓦）

右七日注射一次、

【處方二】氫化銻汞軟膏

右每日敷患處二次。（殺菌、消炎。

止痛）

【處方三】昇汞二厘（〇・一二瓦）水四兩（一二

〇西西）

右化勻洗之、每日二次。（殺菌）

【處方四】水銀軟膏酌用

右塗擦肛門

第十六章 小兒科處方

百日咳 一二歲小兒易得此症。晝輕

夜重。連咳不止。

【處方一】福賜透路半錢（二西西）遠志糖一錢

（四西西）吐根糖半錢（二西西）水一

兩（三〇西西）

右分六次用之、一日三次。（止咳

祛痰）

【處方二】發多馨半錢（二瓦）福賜透路半錢

（二西西）吐根酒十五滴（一西西）水

一兩(三〇西西)

右分六次用之、一日三次、(止嗽

祛痰) 四歲以下服之。

【處方三】地支他民十五滴(一西西)叩第印糖

漿半錢(二西西)福賜透路半錢(二

西西) 水一兩(三〇西西)

右均六次用之、一日三次。(止嗽、

定喘、祛痰)

【處方四】地支他民十五滴(一西西)發多馨半

錢(二瓦)透路糖漿十五滴(一西西)

水一兩(三〇西西)

右均六次用之、一日三次。(止嗽、

定喘、祛痰) 四歲以下用之。

瀉腹 小兒在夏季易得瀉腹之病。瀉

水內含雜物乳塊。

【處方一】次硝酸鏹十五厘(一瓦)重碳酸鈉十

厘(〇·六瓦)加斯大賊十五厘(一瓦)

右作九包、一日三包、三日用完。

(止瀉助消化) 三歲以下用之。

【處方二】蓖麻子油半錢(二西西)

右作一次服之。(能瀉腹內腐物。

助消化) 三歲以下用之。

【處方三】甘汞半厘(〇·〇三)乳糖五厘(〇·

三瓦)

右作三次用之。一日用完。(能瀉

出腐物) 三歲以下用之。

【處方四】阿妥媚諾戡五厘(〇·三瓦) 百布斐

五厘(〇·三瓦)

右作三包、一日服完。(能止寒、

助消化)四歲以下用之。

【處方五】水揚酸鈉十厘(○・六瓦)吐根雜散

三厘(○・二瓦)龍膽末五厘(○・三

瓦)乳糖五厘(○・三瓦)

右均六次用之、一日三次、二日

份。(止瀉助消化)四歲以下用之。

【處方六】阿妥媚諾戠十五厘(一瓦)水揚酸鈉

十厘(○・六瓦)大黃末五厘(○

三瓦)

右均六次用之、一日三次、(止瀉、

助消化)八歲以下用之。

【處方七】鴉片酒五滴(○・三西西)次硝酸

銹十厘(○・六瓦)甘油五滴(○・三

西西)水一兩(三〇西西)

右均六次用之、一日三次、食後。

(止瀉)五歲以下用之。

【處方八】單那爾寶一厘半(○・一)阿爾細林

三厘(○・二)

右均作三次服。(止滯)

痢疾 腹痛下瀉。後即泄痢。瀉下之

物。混有血液粘膜。

【處方一】蓖麻油一錢(四西西)

右作一次服之、能瀉出腹中之腐

物。五歲以下用之。

【處方二】阿妥媚諾戠六厘(○・四瓦)龍膽草

末五厘(○・三瓦)水揚酸銹五厘(○

・三瓦)

木香 蒼朮

右作三包，一日用完。(止瀉、健

胃)

胃)八歲以下用之。

為未受

【處方三】鹽酸愛梅親一支

右射於皮下，一日一次。(專殺阿

米巴痢疾菌)

【處方四】法過路五厘(〇・三瓦)次硝酸銀六

厘(〇・四瓦)大黃末二厘(〇・一二

瓦)吐根雜散一厘(〇・〇六瓦)

右均六包，一日三次。(止瀉、止

痢)四歲以下用之。

【處方五】阿爾細林八厘(〇・五)表飛鳴五厘

(〇・三)

右均六次服之。

胃弱 精神鬱悶。頭痛眩暈。全身倦

怠，食慾不振。胸飽膨悶。腹痛嘔

吐。

【處方二】加斯加拉流膏一錢(四西西)苦味酒

半錢(二西西)水一兩(三〇西西)

右勻六次用之，一日三次。(健胃)

五歲以下用之。

【處方二】水揚酸鎳三厘(〇・二瓦)大黃末三

厘(〇・二瓦)重碳酸鎳二厘(〇・一

二瓦)

右作三包，一日服完。(助消化。

止嘔，祛膨悶)四歲以下用之。

【處方三】含糖百布聖十厘(〇・六瓦)加斯大

賊五厘(〇・三瓦)

右作三包，一日服完。(助消化)三

歲以下用之。

【處方四】稀鹽酸半錢（二西西）百布聖半錢

（二瓦）白糖二錢（八瓦）水一兩（三

〇西西）

右均六次用之、一日三次。（助消

化健胃）八歲以下用之。

便秘 呼吸促迫。腹部膨滿。食慾障

碍。吞酸暖氣。

【處方一】蓖麻油一錢（四西西）

右作一次服之。五歲以下用之。

【處方二】甘汞二厘（〇・一二瓦）乳糖五厘（

〇・三瓦）

右作三包、一日二次、一次一包。

（能防腐）六歲以下用之。

【處方三】軟胰子一錢（四瓦）水三兩（二〇〇

西西）

右化勻。用大便秘器灌腸內。（能瀉

大便）四歲以下用之。

【處方四】大黃末十五厘（一瓦）煨製錳 薄荷

油糖各十五厘（一瓦）

右調和分六包、右一日三包。

食滯 腹部膨脹。吞酸體雜。嘔吐噎

隔。頭痛目眩。心悸便秘。

【處方一】甘汞一厘（〇・〇三瓦）乳糖五厘（〇・

三瓦）

右作一包服之、（祛膨脹）五歲以

下服之。

【處方二】蓖麻油一錢（四西西）

右作一次服之。五歲以下用之。

【處方三】百布聖十厘(〇・六瓦)重碳酸鈉五

厘(〇・三瓦)大黃末三厘(〇・二瓦)

右作三包、一日服完。(治吞酸、

嘈雜、膨脹)四歲以下用之。

【處方四】水揚酸鈉三厘(〇・二瓦)百布聖五

厘(〇・三瓦)大黃末二厘(〇・二瓦)

瓦(龍膽末三厘(〇・二瓦)

右均六次用之、一日三次。(助消

化、祛脹飽)二歲以下用之。

驚風 突然失神。二目直視。四肢強

直。全身痙攣。口吐白沫。

【處方一】鎮化鉀二厘(〇・一二瓦)

右加水作一次服之。(平腦鎮、靜、

解抽)四歲以下用之。

【處方二】蓖麻油半錢(二西西)

右作一次服之。(能瀉下)三歲以

下小兒用之。

疳症 營養不足腹部膨脹。面黃肌瘦。

【處方一】次硝酸鈹五厘(〇・三瓦)乳糖五厘(

〇・三瓦)

右作三包、一日用完。(助消化、健

胃)三歲以下用之。

【處方二】甘汞一厘(〇・〇六瓦)乳糖三厘(

〇・二瓦)

右作一次用之。(能防腐、祛脹)四

歲以下用之。

【處方三】水揚酸鈹五厘(〇・三瓦)重碳酸鈉

二厘(〇・一二瓦)甘草散三厘(〇・二瓦)

右作三包、三次服之。(助消化、補胃)三歲以下用之。

【處方四】水揚酸鈉三厘(〇・二瓦)阿妥媚諾
散六厘(〇・四瓦)大黃散三厘(〇・二瓦)龍膽散二厘(〇・一二瓦)

右均六次用之、一日三次。(健胃、助消化、祛脹飽)三歲以下用之。

忌鴉片法

【處方一】鴉片酒三錢(一二西)蘭羊花酒二錢(八西)番木別酒二錢(八西)顛茄酒二錢(八西)蕃菽酒一錢(四西)水六兩(二〇〇西)

右均六次用之、一日二次。服第二瓶時分量。照第一瓶均行減輕。服第三瓶時較第二瓶減輕。(餘瓶類推)

【處方二】鹽酸莫非(〇・一至二瓦)硫酸阿刀賓(〇・〇〇五瓦)蒸餾水一〇西
右化勻。每次注射皮下半至一西。一日數次。三日後遞減用量。以至斷絕注射。以不犯癮爲止。

【處方三】硫酸阿刀賓一厘(〇・〇六瓦)龍膽草散二錢(八瓦)大黃散一錢(四瓦)甘草散一錢(四瓦)
右酌用白樹膠水爲丸。共爲一百粒。照下烈日期服用。

服法	一日	二日	三日	四日	五日	六日	七日	八日	九日	十日	十一日
朝服	一丸	一丸	一丸	二丸	二丸	三丸	三丸	三丸	二丸	二丸	一丸
午服	一丸	一丸	二丸	二丸	三丸	三丸	三丸	三丸	三丸	二丸	二丸
晚服	一丸	二丸	二丸	二丸	三丸	三丸	四丸	三丸	三丸	二丸	二丸

▲服法 十二日 十三日

朝服	一丸	一丸
午服	一丸	一丸
晚服	二丸	一丸

右方屢試屢驗。神效無比。

Streptomycin
 鏈黴素
 penicillin
 青霉素
 阿司匹靈
 阿司匹靈

一、斑毛 老醋 榆樹根皮 五錢的
 昆水 苧末 散 川芎 三錢的
 黃瓜子 三錢的

中西醫士人人必備之實用各科全書

西醫寶典

定價國幣叁元五角外加郵費貳角

趙璽忱·李笑風·編

奉天撫順城

笑風醫院
總代理處
民醫金院
出版

內容要目簡述

上編各科要症分內科(神經病、傳染病、消化器病、血行器病、呼吸器病、泌尿生殖器病、血液病及新陳代謝病)外科(打撲、切創、火傷等)皮膚科(花柳、濕疹、疥癬等)眼科(淋毒眼、沙眼、膿漏眼等)耳科(外耳炎、中耳炎、鼓膜炎等)齒科(齒痛、齒石、齒齦息肉等)婦人科(子宮內膜炎、子宮出血等)產科(流產、妊婦嘔吐等)小兒科(急癩、百日咳等)

中編藥品中毒分急性中毒(各種藥物中毒)慢性中毒(鴉片、嗎啡、海洛英中毒、及其治療方法、忌煙)

下編醫師須知內分療法擇要、(失神及假死救急法、及各器官檢查法、各種細菌檢查及染色法等)各種表圖(各年歲用藥概表、藥品極量表、各種熱型、各項法規等)並插圖八十餘幅、附加新藥數百種、應有盡有、不遑枚舉

告 預 版 出

編 新 方 驗 藥 西

內 容

對於各科之症，簡述其原因、病狀、治法、後詳列各種新舊處方。特別增多。以供臨時選用。

特 點

從來處方學多用單純式。（如屬於鎮痛劑者。為鴉片及披拉米頓等）惟此書則先述某症如何。再列某症之處方。並附註西文藥名。以備參考。

裝 璜

用潔白洋紙。精工印刷。布面金字。裝訂一厚冊。其製法堅固。奈久使用。

價 格

為謀人羣了解健康之幸福。及作業醫士人人之愛用。故定價特別低廉。

書 考 參 新 之 方 處 醫 西 用 試

學 方 處 之 備 必 人 人 士 醫 大 各

目 價

每冊定價國幣貳元
郵費貳角伍分

所 行 發

順 撫

院 醫 風 笑

者 纂 編

忱 璽 趙

民國十八年十月一日初版
 康德二年十二月廿五日再版發行

版權所有

代售所

奉天鼓樓北 章福記書局
 奉天省撫順縣西四條通六二番地 德茂東絲房
 奉天省復縣復東鎮 慈會醫院
 吉林 裕興書莊
 哈爾濱道外 承文信書局
 總代理處奉天千金藥 惠民醫院
 信仁堂

全國各書局均有代售

定價國幣貳元五角

外埠加郵費貳角

編纂者 趙璽 張潤 忱

校訂者 李笑風 撫順城南門外

發行者 趙璽 忱 撫順縣西四條通六一番地

印刷者 飯河道雄 奉天商埠地十一緯路第三十五號

印刷所 東方印書館 奉天商埠地十一緯路第三十五號

發行所 笑風醫院 撫順城南門外

石

~~49~~

~~200~~

49

610867
107