

欽定四庫全書

普濟方卷二百九十二

明 周王 朱 楠 撰

瘰癧門

瘰癧結核

附論

論曰瘰癧結核者由風熱毒氣蘊積肝經攻注筋脉鬱而不散故項腋之間結聚成核或如梅棗或如珠顆累累相連其症令人乍寒乍熱頭項強痛四肢不安心神

煩燥蓋毒氣與血氣相搏則榮衛不和使之然也其浮於皮膚之中未著肌肉可以藥內消之若腫硬堅甚不可消之則以藥外化為膿及血令其潰散則易愈也

方

五香散 出聖惠方

治心膈久積熱毒肝氣留滯致項生瘰

瘰結核

沈香 木香 薰陸香 各一 麝香 一分細研 丁香 羚羊

羊角屑 子芩 赤芍藥 玄參 當歸 犀角

屑 甘草 地骨皮 各三分 連翹 升麻 麥門冬

去心 大黃 微炒 黃耆 剉各一兩

右為散入麝香研令勻每服三錢水一盞入蘆根五寸生薑半分煎至六分去滓不計時溫服

治療瘰結核

黃耆 七分 玄參 八分 連翹 人參 升麻 青木香

茯苓 蒼耳子 甘草 炙 朴硝 桂心 各四兩 麥門

冬 去心五分 大黃 羚羊角屑 鼠粘子 苦參 各九分

右為末搗蜜丸如桐子大酒下十九日夜三四漸加至二三十丸以愈為度忌生冷猪肉海藻菘菜鮓生葱蒜陳臭等物

連翹湯 聖濟總錄

治男女長少癰瘰結核在項腋下項強

背痛

連翹 玄參 木香 昆布 去鹹焙乾 枳殼 去穰炒 犀角

兩半 柴胡 去苗 甘草 炙 黃芩 去心 沈香 剉 當歸 切焙

木通 剉 芍藥 升麻

右為搗篩每服五錢以水二盞入生薑一片棗一枚拍碎柳枝二寸長一握細剉煎至一盞去滓溫服空心日午夜卧各一服

琥珀膏 出聖惠方 治頸項癰瘰初起如梅子腫結硬強漸

若連珠或穿穴膿潰肌汁不絕經久難瘥漸成癭疾並治之

琥珀 一兩細研 丁香 木香 各三分 桂心 兩半 珠砂 細研 木

鼈子 去殼一兩 當歸 白芷 防風 去蘆 木通 各半 黃丹

七垂柳枝 松脂二兩 麻油二兩

右先用琥珀丁香桂心硃砂木香五味為末其餘藥並細剉以油浸一宿於鐺中以慢火煎候白芷焦黃漉出次下松脂末瀝去滓再澄清油却安鐺中慢火熬下黃丹以柳木枝不住手攪令黑色滴水成珠不散看硬軟得所入琥珀等末攪勻於甕器內盛用時看大小用白綿紙上勻灘貼不上數箇立効永不發

烏蛇丸

出聖方

治癰瘰結成顆核腫疼痛不散或破為

膿水不絕此方立効

烏蛇

三兩酒浸去皮炙微黃

犀角屑

玄參

昆布

洗去鹹味

甘

草

炙微赤

枳殼

麩炒微黃

天麻

郁李仁

湯浸去皮微炒去油各三分

炒

連翹

牛蒡子

微炒搗

大黃

微炒

黃耆

剉漏蘆

各一兩

斑

貓

一分以糯米拌炒去頭足翅

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以清米飲下二十九不過數次効

五香湯

一名香連翹湯
出醫方大成

治一切結毒積熱結核瘰癧

癰疽瘡癤等症立見大効

沈香一分連翹

射干

寄生

無以升
麻代

獨活

一作木
羌活

木

通升麻

大黃

蒸各
三分

乳香

一分

麝香

一錢
半

丁香二分

甘草二分青木香一分

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心熱服以利惡

毒為度本方有竹瀝芒硝隨熱輕重當日添減

丹參膏

出聖
惠方

療惡肉惡核瘰癧風結諸腫

丹參

葫蘆

各二
兩

秦艽

獨活

烏頭

白芨

牛膝

菊花

防風

各一
兩

草葉

躑躅花

川

椒各半
兩

白朮

一
兩

右切以苦酒二升浸之一宿猪膏四斤俱煎之令酒竭勿過焦去滓以塗諸疾上日五度塗故布上塗貼之此膏亦可服得大行即須少服一方有漢防已無

防風

升麻散

治瘰癧結聚顆塊成瘡上攻頭項疼痛

升麻 玄參 敗醬 犀角屑 虎爪 紫葛

桑根白皮 甘草 炙微赤各一兩 連翹 大黃 微炒各二兩等用

紅雪 每服一錢湯成下

右為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓不計時候溫服

犀角丸 治瘰癧結核

犀角屑 吳藍 黃芩 去黑心 山梔子仁 巴豆 去心
皮炒研出 升麻 黃耆 剉 防風 去叉 甘草 炙各三分 大黃

生剉一兩半 連珠草 一兩

右為末煉蜜和丸如桐子大每服三九米飲下未利加至六七丸取利為度

三黃丸 治瘰癧腫毒結成惡核

大黃 剉炒 當歸 切焙各一兩 梔子仁 一分 柴胡 去苗三分 黃連 去鬚 黃芩 去黑心 赤茯苓 去黑皮 桂皮 去粗皮 乾薑 炮 芍藥 各兩

右為末煉蜜丸如小豆大每服十九空心溫酒日三

取微利更以意增減

犀角丸 治惡核癰瘰

犀角 鎊 木香 各一分 硃砂 研水飛 白茯苓 去黑皮 皂角

去皮子 乾薄荷 大黃 剉炒各一兩 原蠶蛾 何首烏

天麻 各一兩

右為細末用生羊肉精者細切研成膏和丸如黍米大每服七丸茶清下不拘時

丹參膏 治惡肉惡核癰瘰初腫

丹參 剉 白芨 各三兩 升麻 蒴藿根 各一兩 獨活 去蘆頭

防己 連翹 白欬 玄參 杏仁 去皮尖雙仁各一兩

右為細切以生地黄汁一升淹浸一宿鐺內微煎十沸入猪膏四升微煎一炊久膏成滓用塗病處日二

三度

班貓丸 治癰瘰結核腫硬相連如珠顆頭項肩背煩疼

班貓 一分 赤黑斑點者佳 猪牙皂角 一分 去黑蛇

脫皮微炙兩烏蛇皮一兩半酒浸去天南星製半兩炮露

蜂房燒灰兩大黃三分微炒麝香一分研葳靈仙兩半

右為末入麝香研勻煉蜜和丸如梧桐子大空心以

粥飲下十九至辰巳間病下如蝦蟇衣及諸惡物

丹參湯 治惡肉核癰癥諸風氣結聚腫氣諸病並治

之

蒟櫨 丹參各二兩甘草炙秦艽 獨活 烏頭炮

牛膝各一兩躑躅花 川椒各半兩

右切以水八升煮取三升溫服一升忌海藻菘菜猪

肉泠水

連翹丸出危氏方 治癰癥結核未破或破者

薄荷二斤裂取汁新者好皂角一挺水浸去皮裂取汁已

成膏次之青皮一兩不去白連翹兩半陳皮一兩不去白黑牽牛一兩

半半生 半炒

右為末用前膏子丸如梧桐子每服三十九煎連翹

湯下食後服服之十日見効一方黃連煎湯下

白斂散

出聖方

治瘰癧結核根源深固腫硬疼痛

白斂

三分

黃連

去鬚

大黃

黃芩

莽草

赤石脂

赤芍藥

各三分

右為末以鷄子白旋調塗于故帛上貼之燥即易之

一方有吳茱萸

五香湯

出宣明論

治一切惡瘡瘰癧結核無首尾及諸瘡

腫用之

沈香

木香

鷄舌香

各一兩

薰陸香

麝香

各三錢

連翹

一兩半

右為末細研每服二錢水一盞煎至六分不計時候

玄參湯

治惡核瘰癧風結

玄參

升麻

獨活

連翹子

各三兩

木防已

菊

花

各一兩

右切以水八升煮取三升分服一升日三

內消丸

出聖濟總錄

治瘰癧初結累累如梅李核日漸不

消則破壞頸腋

人參 玄參 丹參 何首烏 網對 苦參 各一兩

右為末別用皂角一十挺以麻繩接續穿留索子頭盛在缸內掘地埋餅子留口用童子小便浸三七日如值雨下即蓋勿令着水候日足取出以水洗掛陰處令乾用薄荷四兩酒一升童子小便半升共前皂角同浸一宿取出煎五七沸傾出以手按取汁細布濾去滓入藥末一分在汁內用文武文熬成膏末二分入龍腦麝香各半錢同研勻丸如梧桐子大每服

二十九空心日午臨卧時薄荷茶湯下

白歛膏 出聖濟總錄 治療癰熱毒結硬

白歛 莽草 外臺別要作甘草 玄參 木香 芍藥 大

黃 生各一兩

右為末旋取以醋和如膏塗帛上貼之乾即易之

內消丸 出瘡科精要 治療癰結核熱毒鬱滯服之內消

青皮 陳皮 各二兩 牽牛 半斤取頭末二兩 薄荷 半斤 皂角 半斤

不蛀者去粒皮槌碎仁末水一斗煮軟搽汁去滓熬成膏

右將青皮陳皮末并牽牛末和勻用煎膏子和丸如

菘豆大每服三十九食後荆芥茶清溫水皆可下

紫威散

出聖濟總錄

治頂上瘰癧如棗李核大者先服

紫威

凌霄花是

海藻

洗去醎焙

瞿麥穗

牡蠣

煨研成粉左邊者真

甘

草

炙各一兩

右為細末每服一錢半食後白湯調下日三

神妙散

出聖濟總錄

治瘰癧腫痛成瘡

牽牛子

炒半生半熟

青橘皮

湯浸去白焙

梔子仁

地骨皮

玄參

右等分為散每服二錢以空心糯米飲調下次日服

後牛犀丸

牛犀丸

出聖濟總錄

清毒化結聚

犀角

鎊半錢

龍腦

研半分

麝香

研半分

紅娘子

二十枚

班貓

二十一枚去頭足翅同紅娘子豆麵炒焦

右為細末用豆麵糊丸如菘豆大每服一九空心日
午夜卧臘茶放溫下服至十日加至二九除淡飯燒

鹽外餘并一月肉食切忌

治療癰結核腫硬疼痛出聖方

班貓十四枚去頭足翅糯米拌炒令米黃色為度 雄鼠糞二十枚微炒

右同研令細入膩粉二錢更研以菘豆麵入新汲水和丸如菘豆大每服空心以麝香酒下三丸覺腹內痛便以硝石末一錢用酒一小盞煎一沸溫服投約一炊久大小便當有如雀卵汁一合以來下者是効宜服藥補之雄黃丸

雄黃丸

雄黃研細 硃砂研細 麝香研細 細辛 人參去蘆各半兩

右為細末入研了藥令勻煉蜜和丸如菘豆大每服于食前以酒溫下三丸

螺子丸出聖方 治療癰結核腫硬

小螺子一十八枚去尖微炒 班貓二十一枚去頭足翅炒令黃 雀兒糞六

三枚白色者微炒 麝香一錢研細

右為末入麝香研令勻以好鼓一合爛搗研和丸如

菘豆大每日空腹以葱茶下五丸
治療癰結核不散

膩粉一錢 精羊肉二兩 乾薑一錢 凌霜花取白微

右為散入膩粉都拌勻以濕紙裹三五九重火煨熟
取出作一服喫了以溫酒下仍含生薑一片恐吐沒
時服至二更取下惡物五日一般服

治療癰結核外貼令自出方出聖

膩粉 粉霜 砒霜 燕山糞一分 斑貓一分

右研細末用臙月猪脂調勻每用小豆大安癰子上
用麵糊紙封定至六七日有膿水下至半月日自出
速用生肌藥貼之

麝香散出御藥 治療癰結核腫硬不消疼痛

麝香半錢 枳殼二錢 白丁香二兩

右為細末每服二錢用溫酒半盞調勻食後日進一
服

皂角丸 治療癰滿頂不破及結核腫者

好皂角子一 立參 連翹各一

右用水五升砂鍋內慢火煎水盡為度每服揀取好皂角子軟者三粒食後臨卧時細嚼津下硬者搗爛蜜和丸如榛子大含化半月必瘥忌酒麵熱毒物

治癰瘰結核

人參 甘草炙 乾薑 白欵各四

右搗篩酒服日三次忌海藻菘菜

治癰瘰結核腫痛令毒內消方

硃砂研細 膩粉 粉霜細研各二兩

右同研令勻用鷄子白和丸如梧桐子大於五更初煎葱湯下三丸良久當利如未利再服之

治癰瘰結核不散出聖惠方

雄鼠糞小者 皂角針剉炒黃 榭白皮十兩水八升煎取三升

右為末每服用藥末一錢五更初煖藥汁一盞調服服後便卧良久當有大吐如未吐更進一服至吐出病如蝦蟆相似吐盡為効與温粥食之

消毒塗方

出聖濟總錄

治風熱結硬腫赤疼痛及腮項下

腫結成核

大黃

二兩

景天 五兩 護火草是也

右同搗爛塗於患處乾即再傳

大蒜膏

出聖濟總錄

治療癰結聚

大蒜

三枚

搗爛麝香

研半錢

右和勻傅於帛上貼一日二易旋搗最好

又方

出聖惠方

麝香

一錢

細鯽魚兒

二十枚長一寸者去腹肚每魚一枚腹內入和皮巴豆一粒

右入餅子中以泥封漸漸以火烧令通赤候冷取出入麝香同研為散每日空心以温酒調下半錢良久以熱酒投之逐下惡物每日常服下盡惡物其病自消

治項上結核

出海上方

地骨地

榆白皮

右不以多少挫碎煎湯洗之

大効丸 出聖濟總錄 治癰瘰一切結核

斑貓 一枚 黑豆 七粒生

右同破為丸如菘豆大每服五丸茶清下小兒一九此方用之大効

又方 出聖濟總錄

鎮肝丸 治癰瘰結核腫硬令內消

用皂角六挺去皮弦二挺塗酥炙黃二挺用陳皮末二兩水調塗皂角上炙二挺用青皮末一兩水調塗

皂角上炙令黃為細末用精羊肉縷為丸如梧桐子大每服三十九丸漸加至六十九丸溫水下食後卧時服

治結核癰瘰 一名文武膏出普濟生拔粹方

用桑椹二斗極熟黑色者以布袋取自然汁不犯銅鐵以文武火慢熬成薄膏子每日自沸湯點一匙食後日三服

治頰下結核不消經効

用大肚蜘蛛不以多少用好酒浸了研爛同酒去滓

溫服臨卧服之

治項上結核出上方

用牡蠣厚白者燒紅為末每服二錢米湯飲調下日三服半月除根

又方出上方

用乾白鱈魚頭燒灰研細入膩粉油調貼

治領下瘰癧如梅核出聖惠方

用海藻一斤昆布一斤酒浸數日服之效一方蜜和

用蝸牛殼不拘多少搗為細末每服二錢以空心米飲調下日再至四十九日自消

又方

用榭白皮切三合以水四盞煎至一盞去滓頓服當吐惡物

治瘰癧發腫結核痛不可忍及癰未潰

用莽草一兩搗末和鷄子白塗貼之一日二易

心勝丸 治瘰癧不以年深日久日近腦後兩邊有小

結核連數箇傷內有塊兼勞瘵

用鯽魚一箇去腸肚并入雄黃一粒鷄子大礪砂一錢於腹內仰魚於灰上燒烟盡取以全蜈蚣一條蓬朮半兩梔子五箇皂角二挺並燒葦麻五個去皮燈上燒黃明膠三寸皂角二挺去皮酥炙為末別用皂角二挺去皮槌碎以水三碗揉去滓取汁精羊肉四兩爛軟入輕粉五匣男子乳汁半兩同研成膏和藥末丸如菉豆大硃砂為末溫酒清

晨十九旦服至晚下肉疙疸子若有五箇則以五丸服之視其所生多少以為服數既可更浸數服如熱毒瘡癰未有頭頂者亦可消散一方加巴豆三七粒燒存性入

治療癰結核令內消方 出聖惠方

取䟽蟲隨多少微炒搗為末煉蜜和丸如梧桐子大空心以酒下三丸

散毒膏 出楊氏家藏方 治血氣凝滯結核不消欲作癰瘰者

大黃一兩 天南星一枚 當歸洗培半兩 防風去蘆頭半兩 麝香一兩
別研

右為細末每用三錢以烏鷄子清作膏子於患處傅之

連翹散出楊氏家藏方

治療癰結核不消

連翹

鬼箭羽

瞿麥

甘草

炙四味各等分

右為細末每服二錢米泔水調臨卧一服

治一切丈夫小兒癰氣腫結連綴結痛項瘕強不可反

側方

出護命方

黃耆

牽牛

炒各一兩

大黃

當歸

牛蒡子

炒各半兩 枳

殼只使青

旋覆花

木香

各一分

麻黃

去根一分

右為細末每服一錢半食後葱湯調下

治療癰生瘡結核

用莖菜乾為末細油和煎成膏結糜核上三五度莖菜

野地生非人所重一名莖菜其結子如米花紫色

治療癰已結成

次定四庫

普濟方

二十

用鴿子一雙置籠中以菘豆飼之三日去糞不用後
旋收糞晒乾研細二錢麝香酒調下食後服

諸毒瘰癧

附論

夫瘰癧之候大槩有三一曰風毒得之於風二曰氣毒
得之于氣三曰熱毒得之于熱蓋風熱氣蘊蓄經脉否
溢皆能結于頭項胸腋成瘰癧梗核狀如連珠腫潰生
瘡不瘳則變為瘰癧之證令人寒熱羸瘦

方

木香丸

出聖濟
總錄

治熱風毒氣結為瘰癧惡寒狀熱勞

即更甚將成瘰

木香

犀角

鎊

芍藥

連翹

各一兩半

白欵

一分

射干

海藻

洗去鹹
味焙乾

烏蛇

酒浸一宿
去皮骨炙

玄參

各二兩

大黃

剉

炒三兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十九空心温酒下
至夜再服

五香湯 療毒腫瘰癧

次建四庫全書

普濟方

三一

麝香研二分 青木香 雞香香 蘆香 薰陸香

當歸 黃芩 升麻 芒硝各二分 大黃五分

右咬咀以水六升煮取二升去滓分服相去如人行七八里再服諸卒尸注惡氣亦療

沈香湯出聖濟總錄

沈香 丁香 木香 麝香各一分 連翹去黑心 黃芩

各半 升麻一兩

右麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓温

服空心日午夜卧各一服

薄荷丹出仁齋直指 治解癰癧風熱之毒自小便宣毒後

須常服

薄荷 皂角不蛀者去弦皮 連翹 蔓荆子 何首烏泔米

浸一宿 荆三稜煨 荆芥各一兩

右為末好豉二兩半以米醋煎令沸洒豉淹令軟研如糊和丸如梧桐子大每服三十九食後熱水日一

服送下病雖愈常服

連翹丸 出聖濟總錄

治熱毒氣結成瘰癧

連翹 芍藥 玄參 大黃剉炒 犀角鎊 防己 羌

活去蘆 木香 山梔子仁各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大食後米飲下二十九日

再服

蜂房膏 出聖濟總錄

治熱毒氣毒結成瘰癧

露蜂房炙 蛇蛻皮炙 玄參 黃耆剉細 蛇床子各三分

杏仁一兩半 亂髮雞子許大 鉛丹三兩 蠟二兩

右先將前五味剉細綿裹用酒少許浸一宿勿令酒

多用油半斤入杏仁亂髮煎十五沸待髮消盡即用

綿濾更下鐺中再下鉛丹蠟又煎五六沸即瀉出于

瓷盆中盛取貼瘡上一日一換

木通丸 出聖濟總錄

治風熱氣毒瘰癧

木通剉 車前子酒浸炒 大黃剉炒 連翹去蘆 玄參 知母各一兩

兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十九丸臘茶下

赤小豆散 出聖濟總錄

治熱毒風毒氣毒癩瘰

赤小豆 炒 黃藥子 硝石 研如粉 大黃 生各一兩 木鱉子

三枚 去殼 猪牙皂角 五挺 酥炙

右為散以不語津調塗之乾即易

射干湯 治惡毒身強痛癩瘰

射干 桂心 各二兩 麻黃 去節 生姜 甘草 炙各二兩 杏仁

四十箇 去皮尖

右切以水四升煮取三升去滓分三服忌海藻菘菜

班貓散 出聖濟總錄

治項下并腋下熱毒氣結成癩瘰

班貓 去頭翅足糯 豆黃末 糯米末 炒各一兩 大米 生半

兩膩粉一分

右為散一處研勻空心米飲調下二錢當吐瀉下惡物即煮糯米粥補之如吐不止以炒豆黃末煎湯止之甚不止磨少許雄黃麝香止之將息後再服取吐瀉惡物盡為度

大黃散 出聖濟總錄

治風毒氣毒熱毒癩瘰不破者

分
大黃 濕紙畏煨 微焦色 甘草 炮 白殭蚕 去虫焙乾 檳榔 煨

右為散每服二錢匕蜜和熱水調下日可三五服取
下惡物如魚腦即愈

雞鳴散 出聖濟 總錄

治氣癰疼痛及熱毒結核或多煩悶

熱而不寒者

牽牛子 一兩 胡粉 一錢 大黃 蒸二錢 朴硝 鍊成米者三錢

右為散時以甘葉水調服三錢以利為度不利再服

胡粉丸 出聖濟 總錄

治風毒氣毒癰瘡

胡粉 一錢 雄黃 研一錢 雌黃 研一錢

右研令勻用烏雞子三枚取白調藥入淨瓷盆內於
飯上炊令軟得廝丸如桐子大每服三十九至四十
丸溫熱水下以取下惡物為驗

內消浸酒方 出聖濟 總錄

治風熱毒氣結成癰瘡

仙人放杖草根并苗 二斤 羌活 去蘆頭一斤 杏仁 去皮尖炒一兩

右將前三味細剉研杏仁以醇酒一斗於瓶內封七

日後取開空心暖服一盞臨卧時再服

羌活散 出聖濟總錄 治風熱毒氣結癰瘰

羌活 去蘆頭 白殭 炙一兩

右為散每日空心以蜜酒調下四錢匕夜再服

凝米散 出聖濟總錄 治風熱毒氣項下結核及欲作癰疽

癰發背等

菽豆粉 四 乳香 研各一兩

右合研為散實人分作四服虛人分作八服食後米

飲調下就有核處一邊卧盡劑必瘥大消腫痛

內消膏 出聖濟錄 治風毒氣毒不散結聚成癰或破或不

破

用蝟皮生剉一枚用瓷瓶盛泥固外用木炭燒為末

酒調服

白梅丸 出聖濟方 治風毒氣毒癰瘰

用白殭蚕直者不拘多少炒令黃色搗為末用陳白

梅肉和為丸桐子大每服三十九丸熱水下空心午後

各一服

內消丸 出聖濟總錄

治風熱毒氣結成瘰癧

用小麥淘淨煮三五升頻喫即愈

風毒瘰癧

夫風毒瘰癧者由風邪之氣在于經脉經脉否澁結聚所成也此皆由臟腑風有風熱不得宣通邪氣客于肌肉搏於血氣故留滯結為瘰癧也

方

昆布散 出聖惠方

治風毒瘰癧腫結內消

昆布

洗去鹹味

海藻

洗去鹹味

枳殼

麩炒去黃

何首烏

微白

蔓荊

子 各一兩

牛蒡子

微炒

連翹

防風

去蘆頭

玄參

牽牛

子 微炒

甘草

赤剉

大黃

剉微炒各半兩

白芫仁

五十枚

微炒令黃色

右為散每服食後煎葱湯調下一錢

犀角散 出聖惠方

治風毒瘰癧筋脉拘縮煩急疼痛

犀角屑

羚羊角

薏苡仁

黃芩

酸棗仁

微炒

桂心

羌活

甘草

各三分

防風

去蘆頭

枳壳

麩炒黃

升

麻 檳榔 各一兩

右為散每服四錢以水一鍾煎至六分去滓每服於食後溫服

烏蛇丸 出聖方 治風毒留滯臟腑攻注肌肉於項腋生

瘰癧疼痛

烏蛇 酒浸去皮骨 黃耆 剉 枳殼 微炒 牛蒡子 微炒 木通

一對各一兩 微炒 犀角 連翹 昆布 洗去鹹味 漏

蘆 三分 甘草 炙微赤 班貓 一分以糯米拌炒米

右為末煉蜜和丸如桐子大食後以牛蒡子湯下三十九

皂莢丸 出聖方 治風毒氣盛項邊生瘰結梗或赤腫痛

皂莢 去黑皮塗酥 乾薄荷 各四兩 乾蝎 微炒 白殭 微炒 升

麻 牛黃 細研各半兩 夜明砂 微炒 蓬茂木 各一兩 鷓鴣 二兩

微炒 麝香 一分細研

右為末入麝香牛黃同研令勻煉蜜和丸如桐子大每日空心及夜臨卧時以薄荷湯下三十九

皂莢丸 出聖方 治風毒瘰癧項下生如梅李棗核腫痛

令內消

皂莢 三十枚去黑皮塗酥炙令焦黃去子十枚生搗爛水一升括絞內熬成膏 何首

烏 乾薄荷 各半 蝸牛 炒令微黃四兩 精羊肉 去脂四兩切炙令黃

礪砂 通白散 附子 燒烈去皮臍 天麻 天南星 炮 半夏 洗湯

七次去油滑各一兩

右為末入皂莢膏和丸如梧桐子大每日空心及晚食前浸牛膝酒下十九漸加至二十九

大聖散 治瘰癧消風毒腫上癰內熱多生癧疹風毒證氣壯人食煎燂多以致此疾

羌活 荆芥 升麻 防風 薄荷 甘草 大

黃 玄參 黃芩

右等分為末每服一錢水一盞煎至六分溫服

班貓丸 出聖方 治風毒瘰癧生于項間腫硬磊落相連

疼痛

班貓 二十枚去頭足翅糯米拌炒令米黃色 麝香 半分水 水蛭 一分炒

普濟方

三九

甘草半兩炙 黑豆黃三分 芫青二十枚去頭足翅糯米拌炒令米黃
色 大黃半兩 青蛇二兩醋浸一宿
微炒 去皮骨炙微黃

右為末研入麝香令勻煉蜜和丸菘豆大每日空心以米飲下三九如未有效加至五九當小便出如爛筋如小便澁以滑石二錢水五合煎至三合溫服即利

榆白皮散

出聖惠方

治風熱腫毒項生瘰癧

榆白皮

剉

槐白皮

剉

赤小豆

大麥麵

桑白皮

剉 朴砂

皂莢

去黑皮塗酥炙微黃已上各半兩

右為散用鷄子青和為膏以舊布上攤可腫大小貼之乾即易之

牛蒡丸

出聖惠方

治風毒結核瘰癧腫硬疼痛令內消

牛蒡子

微炒

何首烏

各二兩

乾薄荷

一兩

麝香

牛黃

各二

錢 皂角

七挺水半升搥汁熬成膏和藥丸

右為細末以皂角膏為丸如桐子大每服三十九煎黃耆湯下

祛風丸 一名何首烏丸 出聖惠方

治風毒癩瘰

何首烏 蒸 乾薄荷葉 玄參 各四兩 為末 精羊肉 半斤 皂

莢 數三十枚 十挺 火燒存性 十挺 塗酥炙去皮 俱以水絞汁去滓

右以皂莢水煮肉使爛 細研和丸 為梧桐子大 每服二十九 空心溫酒服 或薄荷湯亦可 一方煉蜜丸 食後溫水下 無羊肉

升麻湯 治風毒咽水不下及癩瘰腫

升麻 芍藥 各四兩 射干 三兩 杏仁 去皮尖 炒三兩 麻黃 去節 二兩

甘草 炙二兩 楓香 葛根 各三兩

右切以水八升 煎取半分 二服 忌海藻菘菜

秦艽湯 出聖濟方 治風毒久不痒搏於筋脉 因成癩瘰結

核生項腋

秦艽 去苗土 連翹 青橘皮 去白 焙 檳榔 煨各半兩 犀角 三鎊

分

右麤搗篩 每服三錢水一盞 入木通少許 同煎七分 去滓溫服

皂莢丸 出聖方

治肝肺風毒項生結核痒痛徧身頑痺

皂莢

十兩去黑皮塗酥炙令黃去子

獨活

五兩

防風

三兩去蘆

天麻 五兩薄

荷

五兩乾的

右為末煉蜜和丸如桐子大食後煎槐白皮湯下三

十九

麝香散 出聖方

治癩癧夾風毒壅熱咽喉腫滿胸膈不

利

麝香

一分研細

白莢子

四兩炒黃研

膩粉

鉛霜

各半兩

右同研為散不計時候以薄荷湯調下一錢

治風毒癩癧結核硬腫痛

出聖方

玄參

二兩

夜明砂

微炒二兩

皂角

五挺去黑皮塗酥炙微黃

右為末煉蜜丸如桐子大食後以薄荷湯下二十九

又方 出聖方

烏蛇

二兩酒浸去皮骨炙令微黃

牛蒡子

一兩炒微黃

何首烏

二兩

右為末煉蜜和丸如桐子大食後以溫水下二十九

治癩癧令內消

出聖方

何首烏十兩九蒸皂莢十挺五挺去黑皮塗酥炙

浸一宿揉絞取水一升二合

右為精羊肉一斤細切與前皂莢水同煎熬如膏入

何首烏末及皂莢末九如桐子大空心以米飲下三

十九

治風毒癩癧赤腫痛硬出聖惠方

鼠粘子一升微炒荆芥穗四兩

右為散每服三錢以水一盞煎至五分去滓入竹瀝

半合攪勻服之日三

治風毒攻繞項生癩癧如連珠宜服浸酒方出聖惠方

海藻五兩洗去鹹味烏蛇酒浸去皮骨炙令微黃五兩

右為散以酒七升浸五日每取酒半盞飲之日再服

治癩癧消風毒腫上壅內熱

牡蠣二兩火煨為末玄參一兩甘草半兩炙

右為末每服二錢同臘茶清調下

又方

用白鴿糞不以多少陳米飯拌和為丸如梧桐子大米飲下五十丸

治癰瘰赤腫

出聖惠方

用地松一斤搗如泥傅癰上乾即易之以痒為度

治癰瘰風熱結毒腫硬痛未破方

出聖惠方

用五月內大榭子葉一秤剉令細入大釜竈內以水五斗煎至一斗濾去滓却入鍋中熬成膏每服空心以溫酒調半兩服之良久當吐以吐出癰子根為度

治風毒癰瘰

出聖惠方

用牛蒡子三升微炒為散用絹袋盛以無灰酒五升漬二七日空心溫服一盞

治風毒癰瘰子

用黃花蛇一條酒浸一宿去皮骨炙令黃搗為散空心以粥飲調下一錢服盡即歇十日若未消滅即更作服之如已損即止

治風毒癰瘰赤腫

用生栗子肉生嚼傳之

氣毒癰瘰 附論

夫氣毒癰瘰者由風熱氣毒攻于肺故也肺主通行諸臟之氣若經絡壅塞則衛氣凝滯不得宣行邪熱與氣相搏結聚于皮膚肌肉之間而生癰瘰也又有愁憂不足思慮干情恚怒傷于心肺肝氣毒滯於胸膈致臟腑否澁氣血凝留亦因茲而成氣癰也

方

檳榔散

出聖惠方

治氣毒癰瘰心膈壅悶不下飲食

檳榔

前胡

赤茯苓

牛蒡子

人參

去蘆枳

殼

麩炒黃去白

防風

去蘆

沈香

各半兩

甘草

炙微赤剉一分

右為散每服四錢水一盞入生姜半分煎至六分去

滓空心及晚食前溫服

治氣毒癰瘰結腫疼痛服之令內消方

出聖惠方

豆豉

一合以湯浸一宿研如粘膏以布絞汁去滓

水蛭

一分炒令微黃

鵝鴿糞

一兩 夜明砂

二兩 當歸

半兩 赤芍藥

半兩 薰陸香

半兩 白

兩

礬灰一分雞子二枚
去殼

右為末入豉汁和勻以油單裹炊飯上蒸候飯熟取出和蜜為丸如桐子大食前以溫酒下十九

皂莢丸出聖方 治風毒癩瘡腫硬疼痛時發寒熱不思

飲食日漸羸瘦

皂莢五挺去黑皮塗酥炙微黃去子 蝸牛子五十枚炒微黃 雄黃十兩 何

首烏 陳軟棗 連翹各一兩 麝香一分 龍腦一錢

芫青七枚以糯米拌炒米黃為度去頭翅

右為細末入研了藥令勻煉蜜和丸如桐子大食前立參湯下七丸

治風毒結聚生癩瘡漸多腫硬宜用此藥貼之令消爛

能自出膿出聖方

燕糞 斑貓 芫青 砒黃各一兩 青黛 麝香各

錢水銀一皂角子大 猪脂半兩

右以猪脂先研水銀令星盡後入諸藥同研令細每用小豆大安在瘰子上以醋麵糊紙花子其瘰蓋之

或先炙破亦得經五七日看瘰子爛潰紅絲脚斷即
漸漸揭紙其瘰子隨藥自出後用煮猪蹄温湯洗却
別貼膏藥止痛生肌

海金花丸

出聖方

治氣毒瘰癧結硬不消日夜疼痛

海金花

丁香

琥珀

細研各一分

敗龜

塗酥炙黃

甜葶藶

隔紙炒紫麝香

細研

錢一

皂莢

二十枚炒為末

右為末同研令勻煉蜜和丸如桐子大每服於食前
温湯下五十九其病當從大小便出

班貓丸

出聖方

治氣毒瘰癧服之令内消

班貓

一兩去頭足翅以糯米拌炒令米黃為度

麝香

半兩細研

硃砂

半兩細研

甘

草

半兩生剉

犀角屑

半兩

粟米

二合微炒

右為末入研了藥令勻以蜀葵根白皮杵自然汁和
丸如梧桐子大每服以蜀葵根湯下五丸空心臨卧
服

何首烏丸

出聖方

治氣毒心膈壅滯頸生瘰癧咽喉不

利

何首烏

昆布

洗去鹹味各二兩

雀兒糞

一兩

雄黃

半兩

麝香

一分

皂莢

十枚去黑皮塗酥炙黃去子

右為末入前研了藥一處同研令勻用精白羊肉一

斤細切更研相和為丸如桐子大食後以荊芥湯下

五十九

薄荷丸

出聖惠方

治氣毒癰癥心胸寒壅悶頸項腫發脇

疼痛不欲飲食

薄荷

乾者一兩

木香

一兩

連翹

一兩

青橘皮

湯浸去白焙一兩

麝香

一分

皂莢

十挺長一尺不蛀者以漿水二升浸三日取出取汁為膏

右為以皂莢煎和丸梧子大空心及晚食前以荊芥

湯下十九

膩粉丸

出聖惠方

治氣毒癰癥硬結疼痛不能消者宜服

膩粉

錢一定粉半兩

夜明砂

一兩

桂心

半兩

犀角屑

三分

班貓

一分以糯米炒米黃為度去頭足與翅

右為同研勻用飯和丸菘豆大每于食前以酒下五

九

硫黃丸出聖方 治風毒瘰癧腫硬如石疼痛難當

硫黃一分 麝香一分 鷄子一枚 皂角一分 班貓一分

二十七枚糯米拌炒以黃為度去頭足翅 牽牛子一分

右同研以軟飯和丸如小豆大食前人參湯下五丸

又方出聖方

木香兩半 烏蛇三兩 乾蝟一兩 皂針十三兩

啄木鳥一隻 燒為灰

右為末煉蜜丸如桐子大每服以薄荷湯下十五丸

日三

又方出聖方

治氣毒瘰癧結腫疼痛

班貓半兩 牽牛子一兩 雄雀糞三分 枳殼半兩

糯米拌炒黃色 牽牛子生用

右為散每服一錢五更初用粥飲調下或有吐逆即

服枳殼湯投之日午後當取惡物

蝸牛散出聖方 治風毒瘰癧生于頸腋累累如桃李大

小不定腫硬疼痛

蝸牛殼錢一 皂角子煨去皮取末一錢 乳香 膩粉錢二

右為末用鷄子一枚開取清去黃調藥末却入殼內以濕紙二五重裹以飯甑內蒸候飯熟取出空心以五味內汁嚼下後以暖水漱口良久瀉出青物少年者只作一服年老者分為二服臨時以意加減之

皂莢子丸出聖方 治氣毒瘰癧結硬疼痛

皂莢子二十枚炒熟 巴豆一枚去皮細研 乳香二錢 班貓一枚以糯米拌炒米黃為度去頭足翅

右為末用軟飯和丸如桐子大空心以溫酒下二丸氣毒瘰癧結腫未潰者治令內消方出聖方

槲白皮剉三斤 丁香一兩末 麝香細研半兩

右以水五斗於大釜中先煮爛槲皮至一斗去滓更以慢火熬成膏後入丁香等二味攪令勻收于瓷器內食前以溫酒調下半匙

天靈散出聖方 治氣毒瘰癧徧項及流注脇腋下頭

疼痛

天靈蓋

一兩帶血色者須用香水洗五七次塗酥炙令黃

虎脰骨

一兩塗酥炙黃

右為散以空心葱酒調下三錢晚食前再服

又方

出聖惠方

蝸牛子

二十枚生去殼微炒黃

薄荷

一兩乾者

丁香

兩半

右為末煉蜜丸如桐子大食前荆芥湯下三十九

治療癰腫硬如石疼痛

五靈脂

二兩醋成

皂莢

十枚不蛀者去黑皮塗酥炙去子

右搗皂角末以五靈脂膏和丸如桐子大早晨以薄

荷湯下九九夜臨卧以温酒下十九

又方

出聖惠方

皂角針

一兩燒灰

榭白皮

末一兩

右同研令細食前以温酒調下二錢

治氣癰

用赤脚馬蘭搗細敷患處

治氣癰瘰

出聖惠方

用皂角一斤不蛀者去皮子塗酥炙令黃色搗羅為

末以精羊肉半斤細切研如糊下藥末相和丸如梧
桐子大每於食前以皂莢刺搗碎煎湯下十五丸服
此藥一月即有大驗

熱毒瘰癧 附論

夫熱毒瘰癧者由人臟腑俱實氣血充盛內有積熱不
得宣通熱毒之氣流于項腋之間搏于肌肉而生故謂
之熱毒瘰癧也

方

玄參散 出聖惠方

治熱毒瘰癧癰腫疼痛宜服此散熱毒

除根

玄參 連翹 知母 當歸 雄黃 細研 牽牛 微炒

炒黃芩 犀角 赤芍藥 空青 荏子 礬石

泥裹燒半白地膽 一分以糯米拌炒 斑貓 一分以糯米拌

炒米黃為度去翅足

右為散入研了藥令勻空心以溫酒下一服一錢三
五服後小便出爛穢為度

連翹散出聖惠方

治肝膈熱毒氣盛攻項腋生瘰癧腫痛

心神煩悶背挾急疼四肢不利

連翹 漏蘆 知母 桂心 黃芩 玄參 甘

草炙微赤各三分 木通剉 柴胡去苗 大黃微炒 朴硝各一兩

右為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓每服於

食前溫服以利為度

紫參丸出聖惠方

治熱毒瘰癧腫痛未成者內消已破者

行膿

紫參 苦參 丹參 連翹各二兩 膩粉 麝香別研

錢各三 滑石二兩半

右為末用玄參一斤搗碎以酒三碗浸三日去滓皂

角子三伯枚煨熟搗末用玄參酒熬皂子末成膏和

前藥丸如桐子大每服一九黃耆湯下日加一九至

患人歲數止日減一九瘡自乾自能內消

治熱毒結成瘰癧日夜疼痛出聖惠方

甘草炙微赤一兩 犀角屑一兩半 黑豆炒熟一兩 麝香半兩 斑

貓半兩以糯米拌炒米黃為度去頭足翅

右為末煉蜜和丸如桐子大空心以米飲下七丸服後覺瘡痛即住藥其病當從小便出却於盆子內看之若小便澁即服木通散

木通散出聖惠官効方

木通一分 葵子一分 滑石兩一

右為散以葱白湯調下一錢日三四

又方出聖惠方

班貓一分以糯米拌炒米黃為度去頭足翅 預知子兩一 犀角屑一分 水

蛭一分微炒黃色 黑豆一百粒炒熟 麈蟲一分炒令微黃去頭足翅

右為末以酒煮麵糊和丸如黍米大大人每日空心以酒下五丸小兒二丸

雄鼠糞丸出聖惠方 治熱毒瘰癧結硬不消

雄鼠糞二十一枚研 菜豆粉一錢 膩粉一錢 班貓二十一枚去頭足翅

以糯米拌炒米黃為度

右為研末令勻以冷水和丸如小豆大空心以溫酒

下二十九兩日後再服即病根並除

地膽散 出聖 惠方

治熱毒瘰癧內消

地膽 一分去頭足翅以糯米拌炒米黃為度 滑石 半錢 朴硝 一分熬令汁盡

右為散空心以米飲調下半錢服後覺小便中瀉下

惡物即減地膽少許十日見効

又方 出聖 惠方

鷄子 一枚去黃留白 班貓 二十一枚去頭足翅以糯米拌炒米黃為度 膩粉 一錢

右將鷄子開孔入二味藥在內以紙蓋蒸兩炊久取

出丸如小豆大每日五更初以溫酒下五丸當瀉出病根如服未効即日更服

治熱毒瘰癧瘡腫疼痛宜服此方 出聖 惠方

顆鹽 一分 黃丹 半兩 白礬 一分 黃蘗 一分 白欬

分一

右為散每先用溫鹽漿水洗瘡令盡淨拭乾以鷄子清調塗於帛上貼之

山豆根方 出仁齋 直指方 治咽喉上膈熱毒患瘰癧者常含

汁嚙下仍服之

山豆根 紫蘇葉

右用細剉煎湯臨卧服之

解熱方 治瘰癧四畔紅腫多結為熱證

小黑豆 二合 紫蘇 一兩 薑七片

右用細剉煎湯食後服

治熱毒瘰癧內消方

班貓 十枚 去頭翅足糯 大無 一兩 剉 微炒

右為散食前溫酒調一錢

又方

皂莢 二百粒 不蛀者 湯浸 杏仁 一百粒 湯洗去皮

末搗膏糊為丸 用蜜和

右同研令勻煉蜜和丸如桐子大食前以粥飲下三十丸

班貓散 治熱毒瘰癧

班貓 三枚 拌糯米炒令黃色 去頭翅足 滑石 一分

右為散分為兩服空心糯米飲調下俟如人行十里
久再服如覺小便澁即煎黑豆湯服須臾小便內取
下爛肉片子即差未愈隔日再服

大蘇根散 治熱結瘰癧

用大薊根一斤搗為散每服用三錢食後酒湯調下
日再服

瘰癧有膿

附論

夫瘰癧者結風於內積熱在肝榮衛不和胃膈壅滯毒

熱相搏流注於筋脉結聚所成也初得即覺項邊磊落
狀若連珠面色萎黃皮膚狀熱久而不療俾熱上蒸則
成膿也按內經謂榮氣不從逆於肉理乃生壅腫蓋榮
氣逆則血鬱則熱氣聚而為腫瘰癧之疾亦猶是也熱
氣內結搏聚在肝肝主筋肝藏血久不差故熱聚于血
血腐而為膿在于頸腋腫結相連有如梅李實者是也

方

神應膏 治瘰癧已破瘡口浸引膿水不絕及治一切

惡瘡貼之去惡肉好肉自生

白芨 白欵 當歸 桂去粗皮 附子一枚半兩者去皮臍

乳香纏兩半 東南槐枝 柳枝各二條各長七寸對 鉛丹三兩 巴

豆三分去皮 清油六兩

右各剉細於石器內先下油與白芨等煎令焦黃以白棉濾去滓入鉛丹巴豆慢火熬藥成膏先以水一碗投藥入水其藥直入水中如珠為度後刮下入瓷器內收貯每用少許量核大小塗貼

黃耆丸 治癰癥結腫生膿

黃耆剉 木香 漏蘆 玄參 枳殼麩炒微黃去白 犀角

屑 桔梗去蘆頭 牛蒡子微炒 大黃微炒各一兩

右為末煉蜜和丸如桐子大空心及晚食前以米飲下二十九

鱉甲散 治癰癥出膿血不止宜服此消死肉散毒氣

使癰子轉動寬軟

鱉甲一兩塗酥炙微炒黃去裙襖 桑螵蛸五枚微炒 狼毒三兩醋炒 麩

蟲五枚 磁石三兩 雄黃一兩 雌黃一兩 麝香一兩

細研

右為散入研了藥再研勻每日空心日午近夜各一服米飲調下一錢

枳殼丸 治療癰結腫穿穴生膿

枳殼麩炒微黃去白 玄參 漏蘆 大黃微炒 實 牛蒡

子微炒各一兩 黃耆 露蜂房半兩

右為末煉蜜和丸如桐子大每服不計時候米飲下

三十九

連翹丸 治療癰結核於頸腋下外生癰膿方見本門寒熱類

白飲丸 治療癰結腫有頭膿水不止

白飲 黃耆剉 木香 枳殼微炒 玄參 烏蛇酒浸去皮

骨炙令黃 色各一兩 班貓十四枚 去頭足翅以糯米拌炒令米黃為度

右為末煉蜜和丸如桐子大每服空心逐日及晚食

前米飲下十九

蜂房膏 治療癰生頭膿水不絕疼痛

露蜂房一兩蛇蛻皮兩半玄參兩半黃耆兩杏仁一兩湯

尖雙亂髮如雞黃丹五

右細剉用麻油一斤先煎髮及杏仁候髮消盡即以綿濾去滓下黃丹以柳木篦不住手攪候熬成膏即傾于瓷盒中盛臨時旋取塗于帛上貼之

連翹散 治療癰熱腫肉敗生膿

連翹 犀角屑 黃耆剉各木通剉半漏蘆分杏

仁一兩湯浸去皮尖玄參兩半

右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓食前溫服

紫金膏 出聖濟 治療癰已破膿水不止

柳枝三十條槐枝全麻黃六兩乳香別沒藥

研栝脂各一

右為末先熬油令沸入槐柳枝煎令黑色去枝不用次入麻黃等熬成膏每用油紙攤塗之

地膽丸 出聖濟方 治療癰成瘡有膿貼藥後服此

地膽去頭足翅糯米拌炒米黃為度斑貓去頭足翅糯米拌炒以米色黃為度芫青

十枚糯米炒牛黃別研生豆黃三十枚

右為末牛黃共研勻煉蜜為丸如桐子大每服一九

空心茶下後更服尋常補益丸藥

去毒散出聖濟總錄

治癰瘡毒氣鬱結成膿發泄不止

巴豆一兩去皮薄荷末二兩皂莢末二兩麝香研二錢鯽魚一個

去腸肝

右研勻四味入在魚腸內用泥固濟以炭火五七斤

燒存性候冷取出細研每服一錢用荊芥臘茶調下

日三服

蜂房散出聖濟總錄

治癰瘡貼瘡

露蜂房蜜塗文火炙令青色半兩羊屎四十九枚燒白色皂莢一挺燒

右同研和勻洗瘡口乾用此藥貼之後可服血竭散

血竭散出聖濟總錄

治癰瘡已破膿水不止者

血竭炒研一分大棗二十枚青州者燒為灰生乾地黄焙半兩別研為末

右同研如麵別取枳殼末三錢用水一盞煎至四分

去滓調下散子半錢五更時服良久覺腸痛但只以枳殼煎水飲之即自止有惡物從小腸出為効

豆牛子散

出聖惠方

治療癰結成顆塊頭多經久不差膿

血不止疼痛

豆牛子

製麝香

半錢細研

右都細研如粉以津唾調貼之

薄荷丸

出聖惠方

治療癰結成顆塊疼腫穿潰膿水不絕

不計遠近皆差

薄荷

一束如碗大陰乾

皂莢

十挺長一尺二寸不蛀者去黑皮塗酥炙令黃

右搗碎以酒一斗浸經三宿取出曝乾更浸三宿如此取酒盡為度乾為散以軟飯為丸如桐子大每服食前黃耆湯下十九小兒酌減服之

鼠灰散

出聖惠方

治療癰膿水不絕宜貼

蛇腹中鼠

一枚燒灰

蝦蟇

一枚燒灰

右為末用生油調攤於帛上貼之日一度換之

罐灰散

出聖濟總錄

治療癰瘡口膿血不止

用糞堆裏破瓦罐兒洗淨於竈掘次安在坑中燒二日令捻得碎細研乾摻瘡上

紫金散

出聖濟總錄

治療癰方破

用檳榔不拘多少端正者為細末先以溫漿水洗瘡以軟帛拭乾油調塗日三上用時看多少

治療癰穿破作膿宜貼此方

出聖惠方

用五月六月麥麩上生者茵子七枚熟搗先以米泔洗瘡淨拭乾貼日二度換之

治有瘡口膿血出者

用狸肉作羹如法食之

水紅花飲

出聖濟錄方

治療癰腫核結梗不消及腫汁旁

牽穿不差

用水紅花不拘多少一半炒用一半生用麤搗篩每服二錢水一盞煎七分去滓溫服食後臨卧日三好酒調亦可服

單方 治療癰破與未破及膿血淋漓其効如神

牡蠣

不拘多少甲灰深培上以三斤米一煨候盡取八兩為細末

甘草二兩

右將藥勻拌每服二錢食後以建茗同煎日二服忌魚酒酢醬油鹽海味等此病多有人父子相傳至如服此藥定並不疼痛亦無吐痢

又方

右用牡蠣不拘多少火煨為丸以糊丸如桐子大每服二十九連翹煎湯吞下

生肉方

臘月猪脂

松脂

煮過取水
上白者

黃蠟

煮過取
淨潔者

右各二兩用清麻油五六兩慢火熬成膏先將溫水洗去舊藥拭乾用紙剪一大團子塗藥在上貼瘡瘡如痒不得動此生肉故也一日一次換藥切忌毒物輕肌散出鮑氏方 治療癰止痛化惡膿血寒熱煩燥肢筋無力困倦虛渴飲食少進

山茨菰

即塗燈花

何首烏

蝦蟆螂

甘草

各三分

生地

黃獨行竹

半兩
去莖

右為散每二錢薄荷七葉煎服

活膿散出鮑氏方 治療癰腫膿不快肢節煩疼寒熱口乾

防風 當歸 人參 川芎各半 金星草五葉 羌活

甘草三錢

右為末每一錢酒下日三服若痛甚麥門冬湯下若

紫赤色以羽刷癰癰上如赤腫刷四圍

內托散出鮑氏方 治療癰未出膿服內托裏止痛催破

川烏炮一兩 茯苓 苦梗 白蒺藜炒半兩 大腹五箇 獨

活 白芷 甘草各半兩

右為散以酒下二錢日二服

秦皮散出鮑氏方 治療癰洗之

秦皮三兩 茵草二兩 細辛 苦參半兩 連翹半兩 黃連 黃

芩一兩 當歸 大黃三分

右為釐末每一兩水煎去滓日一洗之

碧油五枝膏出鮑氏方 治療癰發毒出膿血瘀血止痛

桃枝 柳枝 桑枝 槐枝 皂角枝

右前件各一握剉細麻油十兩煎至八分再入明礬半錢血結半兩黃丹四兩共用慢火熬成膏地上上火一宿用時取藥攤帛上大人小兒貼之點硬白破皆用未破不用

癰癤寒熱 附論

夫癰癤者由風熱毒氣壅滯於胸膈之間不得宣通而搏于肝肝主筋故令筋搐結而腫多生于頸腋之間浮于筋皮之中有結核累累相連大小無定其初發之時

熱毒腫結故令寒熱也

方

曾青散 出千金方 治寒熱癰癤及鼠瘻

曾青 附子 礬石 荏子 各半兩 括蕒根 露蜂

房 當歸 防風 芎藭 黃耆 黃芩 狸骨

甘草 各半兩 細辛 乾薑 各一兩 班貓 芫青 各五枚

右治末篩以酒服一錢日再

連翹丸 出聖惠方 治癰癤結腫不散欲成膿致寒熱不退

連翹 大黃炒 沈香 薰陸香 牛蒡子炒 黃耆

枳殼麩炒黃 各一兩 玄參 羌活 赤芍藥 升麻

芎藭 黃芩 占斯各三分 紅鹽一分 波斯者 皂角子仁

四十九粒 炒微黃

右為末煉蜜和丸如桐子大每於食後溫水下

射干連翹湯出聖方 治療癰寒熱

射干 連翹 玄參 赤芍藥 木香 升麻

山梔子 前胡去蘆 當歸焙切 甘草炙剉各一兩 大黃剉炙二兩

右為麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓入芒硝少許食後溫服日再服

曾青散出聖濟總錄 治寒熱癰癧

曾青研 附子炮製去皮臍 礬石熬令枯研細 荏子各半錢 當歸

切 狸骨炙 甘草炙各二兩 細辛去苗 乾薑 露蜂房炙各

一 班貓同芫青炒 芫青各五枚去頭足翅用糯米拌炒去米不用

右研為散每服一錢空心溫酒下

栝蒌子散出聖方 治療癰初腫疼痛寒熱四肢不寧

栝蒌子微炒 皂子仁微炒 牛蒡子微炒 連翹 牽牛子微炒

何首烏 大黃炒 梔子仁 甘草生剉 白螺殼 漏

蘆各一兩

右為散每服食前溫酒調下二錢

木通丸出聖方 治癰瘕結腫身體寒熱心胃壅滯

敗醬三分 大麻仁一兩 大黃二兩炒 赤芍藥三分 犀角屑三分

黑豆一兩炒熟去皮 昆布一兩洗去鹹味 木通一兩剉 玄參一兩 連翹

一兩 升麻一兩

右為末煉蜜和丸如桐子大食後漿水下二十九

沈香散出聖方 治癰瘕寒熱結腫疼痛心胃壅滯

沈香 桑寄生 射干 升麻 連翹各三兩 大黃

一兩半炒 防風 薰陸香 藿香各三分 麝香一分研細

右為散入麝香研勻每服四錢水一盞煎至六分去

滓溫服日三四

漏蘆湯出聖濟總錄 治癰瘕結腫初成寒熱

漏蘆去蘆 連翹 木通剉 桂去粗皮 犀角屑 黃芩去黑

栝蒌子微炒 皂子仁微炒 牛蒡子微炒 連翹 牽牛子微炒

何首烏 大黃炒 梔子仁 甘草生剉 白螺殼 漏

蘆各一兩

右為散每服食前温酒調下二錢

木通丸出聖惠方 治療癰結腫身體寒熱心胃壅滯

敗醬三分 大麻仁一兩 大黃二兩炒 赤芍藥三分 犀角屑三分

黑豆一兩熟去皮 昆布一兩洗去鹹味 木通一兩剉 玄參一兩 連翹

一兩 升麻一兩

右為末煉蜜和丸如桐子大食後漿水下二十九

沈香散出聖惠方 治療癰寒熱結腫疼痛心胃壅滯

沈香 桑寄生 射干 升麻 連翹各三兩 大黃

防風 薰陸香 藿香各三分 麝香一分研細

右為散入麝香研勻每服四錢水一盞煎至六分去

滓温服日三四

漏蘆湯出聖濟總錄 治療癰結腫初成寒熱

漏蘆去蘆 連翹 木通剉 桂皮去粗 犀角屑 黃芩去黑

皮柴胡去苗 玄參 大黃劉知母炒

右龕搗篩每服三錢水一盞煎至八分去滓下朴硝半錢匕攪勻空心臨卧服以快為度

土瓜根散出聖濟總錄 治寒熱瘰癧

土瓜根去土 連翹 龍膽 黃連去鬚 苦參 栝蒌實

微炒 大黃微炒 芍藥 木香

右等分搗散食後臨卧温酒下一錢匕日三服

石燕丸出聖惠方 治瘰癧結腫寒熱疼痛心腹煩壅

石燕一枚細研 真珠一錢 麩金石三分細研 木香 井泉石

續隨去皮各三分 檳榔一兩 郁李仁一兩湯浸去皮微炒

右為末同研勻煉蜜和丸如桐子大每於食後以米飲下十九

早蓮子丸出危氏方 治少長臟氣不平憂思驚恐抑鬱結

聚及外傷風寒燥飲食結成百毒瘰癧發作寒熱徧

于項腋凡久近委主之

早蓮子 連翹子 葳靈仙 何首烏 蔓荊子

三稜醋浸濕紙裹煨赤芍藥各一兩木香二兩大皂角二挺刮去

外皮酥微炙

右為末糊丸桐子大建茶清下三十九或五十九日三服小兒量與之食後服

玄參散出聖惠方 治療癰初生結腫發渴寒熱

玄參 枳殼麩炒微黃去白 木通 獨活各一兩 犀角屑半兩

大黃一兩微炒 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒黃

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服日三

木香消毒湯出聖惠總錄 治療癰寒熱煩悶

木香 大黃生各半兩 竹葉乾者一分 連翹一兩 獨活去蘆半兩 梔

子仁十分

右麤搗篩每服三錢水酒童子小便共一盞煎七分去滓溫服

狸頭散出千金方 治療寒熱癰瘰

連翹 土瓜根 龍膽 苦參 黃連 栝萎

芍藥 常山皮各一兩 狸頭骨一枚

右共搗篩酒服五分匕日三忌猪肉冷水一方無狸頭

連翹丸

出聖濟總錄

治癰瘰寒熱結核在頸腋之下堅頭

連翹

玄參

木香

升麻

各一兩

大黃

蒸半兩

昆布

去鹹味焙二兩

枳殼

去穰炒兩半

大麻仁

微炒別研一兩

右搗篩為末煉蜜和丸如桐子大每服十五丸食前

米飲下加至二九一方作散空心米飲調下一錢

射干丸

出聖濟總錄

治癰瘰惡熱狀熱久則必成癰瘰

見方

本門癰瘰久不差類

白斂散

出聖惠方

治癰瘰生於頸腋結腫寒熱宜貼此藥

白斂

兩半

甘草

玄參

木香

赤芍藥

各半

兩

右為散以醋調為膏貼於患上乾即易之

治癰瘰初起未破作寒熱

出危氏方

木鱉子

二分去殼磨

草烏

半兩磨

葱白

連根

蚯蚓糞

如木鱉子

等分

右用真米醋磨木鱉子草烏二味入蚯蚓糞葱白調勻傅癰上扯紙條貼之欲令通氣孔

療寒熱癰瘰散

狸骨五分 烏頭七分 黃連七分

右搗篩為末食前以酒服一錢匕日三忌猪肉冷水

玄參湯出聖濟總錄 治癰瘰寒熱先從頸腋諸處起者

玄參三斤 磁石三斤 燒令赤醋淬七遍 細研水飛過

右以生絹袋盛酒三斗浸六七日每服一盞空心臨

卧温服

治寒熱癰瘰方出聖濟總錄

用狸頭一枚酥炙搗為散每服一錢空心米飲調下

烏犀湯出聖濟總錄 治初患癰瘰皮肉寒熱赤腫

犀角一錢 惡實三兩 沈香三分 麝香研半 丁香兩半 玄參

三分 大黃剉 木通剉 射干 連翹

右麤搗篩每服五錢匕水一鍾半煎至八分去滓空

心温服

瘰癧久不差 附論

夫風熱毒氣蘊積臟腑攻於筋脉則結為瘰癧其疾毒氣所感深者則衝發肌肉不得消散或成瘡孔膿水不絕或飲食觸犯或外因風冷所傷日久月深醫藥無效遂令久不差也此疾又忌憂思恚怒氣血勞傷飲食寒冷

方

貫衆湯 出聖濟總錄

治頸生瘰癧已鍼瘡尚不差者

貫衆 一兩 烏蛇 酒浸炙去皮骨一兩 連翹 生乾地黄 焙各二兩

鶴虱 炒一兩 杏仁 湯浸炙去皮尖雙仁 桑根白皮 剉各二兩 白欬 一兩

葳靈仙 去苗土一兩半 白芨 一兩 大腹皮 二兩 延胡索 一兩

黃耆 剉一兩半 黃連 去蘆一兩 甘草 炙一兩 木占斯 二兩

右為麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎

至八分去滓食後溫服

狼毒散 出聖惠方 治瘰癧久經年月膿水不時發

狼毒 剉醋拌 鼠李根皮 沈香 連翹 薰陸香

鷄舌香 詹糖香 丁香各一兩 薇三枚 班貓二十枚

米拌炒黃色 去頭足翅 玄參三分 昆布三分 洗去鹹味

右為散食前以荊芥湯調下一錢

麝香膏出聖惠方 治療瘰久經年月成瘻瘡者

麝香 雄黃半兩 連翹 山 側子 昆布

狼毒 黃耆 敗醬各半兩 班貓三十枚 蝦蟇灰一兩

右細剉以臘月猪脂一斤半於淨鍋中煮十餘沸去

滓下諸藥以慢火煎攪候黃耆黑色以綿濾去滓收

以瓦盒中後下麝香雄黃蝦蟇灰調令勻每用故帛
上塗貼日三兩度換之

立應散 治瘰久不愈者方見本門 諸瘰類

射干丸出聖濟總錄 治風熱毒瘰久不差惡寒狀熱勞動

轉甚漸成瘻

射干 昆布去鹹味 海藻洗去鹹味 各一兩 木香 黃芩去黑

犀角屑各三分 芍藥 連翹 白斂各半兩 大黃剉二兩 玄

參一兩 烏蛇酒浸去皮 骨二兩

右為末煉蜜九如桐子大食後温酒下十五丸

班貓丸 出聖惠方 治瘧久不差沈注項腋衝破皮肉膿血

不止

班貓 一分糯米拌炒令麝香細研水蛭一分微荒

青 一分糯米拌炒米黃為度去頭足 甘草 半兩炙對 黑豆 一兩炒熟 大黃

一兩微炒 烏蛇 二兩酒浸去皮骨炙令微黃

右為末入麝研令勻煉蜜和丸如菽豆大空心以米

飲下三丸如未覺加至五丸小便中當出爛肉為効

如小便較澁以温水調滑石末一錢服之

丁香丸 出聖錄 治瘧久不差或已破膿血甚者

母丁香 生半兩 蒼耳苗 炒一兩 青箱子 生 皂角仁 各半兩

甜葶藶 生半兩 厚朴 去粗皮薑製一兩 丹砂 研半兩零一分入

藥

右為末棗肉為丸如菽豆大丹砂為衣每服十九至

十五丸粟米飲下日三服

漏蘆湯 出聖濟總錄 治瘧久不差將欲破者

漏蘆洗焙海藻洗焙連翹一兩沈香剉半山梔子一仁

分一兩丹參各一兩玄參各一兩

右麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去滓温

服

何首烏丸出聖濟總錄

治療瘧久不差

何首烏去黑皮黃耆細剉皂莢酥炙去薄荷各一兩

蛇蛻皮煨灰龍腦研一錢麝香研一錢

右為末煉蜜如桐子大每服十九薄荷茶下不拘時

犀角散出聖濟總錄

治療瘧久不差

犀角鎊屑蕪荑生班貓炒各一兩牽牛子炒黑豆各一兩

麝香研龍腦研各一兩

右除龍腦麝香外為細散再入研藥拌勻每服一錢

匕熱酒調下空心服藥後再飲酒一盞投之下惡物

為度

七神丸出聖惠方治療瘧數年不差根株漸大流注四肢

班貓三十枚去頭足翅糯露蜂房燒灰蛇蛻皮一條

燒灰 蝟皮 燒灰 麝香 三分 雄黃 半兩 珠砂 三分 細研 水飛過

右為末入研了藥令勻煮棗肉和丸如桐子大空心糯米飲下七九如腹內覺有小痛及增寒即減兩丸百日之內差

硃砂散 惠方 治癰經久不差

硃砂 兩 一班 貓 三十枚 糯米 拌炒 米 黃為度 去頭足翅 海藻 一兩 搗碎 炒令黃色

水馬 三七枚 去 白芨 兩半 滑石 兩 桂心 兩半

右為散空心以米飲調下一錢晚食前再服

麒麟竭膏 出聖方 治癰癰久穿穴傷風冷膿水不住宜

用煖肌生肉

麒麟竭 一分 白欬 黃連 檳榔 丁香 龍骨 各

分 麝香 一錢 細研

右為末入孟鉢內細研令勻用野駝脂調如膏塗於帛上貼之日二用之

六神散 出聖濟 治癰癰久不差

皂莢刺 薄荷 昆布 洗去鹹味 海藻 洗去鹹味 連翹 各半

白莢子五十枚 燒灰

右為細末每服二錢匕茶湯調下食後臨卧服

地栢散出聖惠方 治療癩經數年不差

地栢半兩 煨 玄參三分 升麻一分 牛蒡子炒 一分 犀角一分

右為散食前溫水調下一錢

治療癩經年不差諸藥無効者宜服此方出聖惠方

蛇蛻皮一條 燒灰 露蜂房一分 燒灰 蝟皮一分 細研 班貓二十枚 糯米拌

炒米黃為度 去頭足翅 麝香一分 細研

右令細末煉蜜和丸如桐子大每食前皂角子仁湯

下七丸

必効散出瘡科 精要 治久患癩癧不効

班貓四十個 翅頭去 巴豆十個 去皮心膜 白栢榔一個 麝香半錢 南礪

砂二錢 半 輕粉一錢

右同研極細取鷄子清二箇去黃調藥勻却傾在鷄

子殼內濕紙數重糊定無令透氣生飯甑內與飯一

處蒸熟取藥曝乾研細末用時相度虛實虛人每服

半錢實人每服一錢並用炒生薑酒下五更初服藥至平明取下惡物如覺小腸內疼痛更用蘇麻子燒灰入沒藥等分同研細用茶調下一錢便如大腸其取下惡物如爛肉老鼠兒及新成卵內雀兒是藥効婦人有胎不可服

紫金散

出瘡科精要

治癰瘰久不痊者

枯白礬

半兩 砒霜

一錢 石膽

半兩 黃丹

二錢

右為細末糯米飲粥和丸如桐子大捏作餅子爆乾

如瘡破者研為末搽於瘡上如不破者灸三倍炷如麥大安藥餅子於灸盤上後用水沈香蓋之去根平復

勝令膏

出聖濟總錄

治癰瘰久不差

黃連

去鬚

蛀粟子

去殼

甘草根

剉

黃蜀葵花

龍骨

各半

兩分 白芨

右為細末取榆窠上紅蟲秤三兩半候乾同為末更入粉霜三錢同研勻每用藥三錢匕入膩粉少許取

鷄子清調攤帛上先以口濕漿水洗淨拭乾貼之隔日易

連翹湯

出聖濟總錄

治療癰諸方不差

連翹

犀角

鎊

青箱子

蔓荊實

黃耆

剉各等分

右麓搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服空心食前服

破毒雄黃丸

出危氏方

治療久作不愈寒熱往來項筋攣急已破未破可服之惡物自小便中來

通明雄黃

顛塊大硃砂

各二錢

班貓

二十八個皮翅去淨用糯

米三錢炒水銀

右先以班貓為末續以雄黃硃砂為末再入水銀細研和勻用鷄子清同糯米稠糊為丸菘豆大每服二七丸米飲或溫酒下如惡物未見半朝再一服聖惠方有膩粉無班貓

治療癰積年惡瘡疔瘡軟癰膿出及多年瘡根蝕肉腫痛不可醫者俱用此方聖惠方有

青黛 砒霜 硃砂 麝香 粉霜
各一兩 錢一

右入孟鉢內細研以麵糊丸如小麥粒大若瘡有頭即安於瘡口中以麵糊紙蓋頭須臾藥發痛後至五七日出却瘡根使用生肌膏藥封之甚效

桃紅散 出聖濟總錄

用血竭須真實者如無以深色臘脂代之為細末以自津唾調日夜頻塗瘡成靨即用浴毒湯洗之

紫紅散 出聖濟總錄 治療瘰已成漏瘡歲久不愈

信砒 錢一 礬石 錢二 鉛丹 錢三

右用瓷罐子先入砒次入礬次入鉛丹蓋之藍泥固濟炭火煨燒薰如紫色取出以紙襯於地上一時辰出火毒研細先以溫水洗淨瘡拭乾取藥少許以生蜜調塗日夜五六次塗至五七日瘡漸斂紫黑色即用前桃紅散傳之

浴毒湯 出聖濟總錄

黃栢 去粗皮 黃連 去鬚 甘草 剉 黃芩 去黑心 大豆 一合 栢

枝一把

右龕搗篩每用三四匙以水二升煎至一升乘熱淋洗日三四次候洗下瘤子即用平肌散傅之

平肌散 出聖濟總錄

黃狗頭骨 燒灰 鮫鯉甲 燒灰各一錢 亂髮 一團如指大燒灰

右研勻如瘡口已乾用自津唾調濕傅之日三四次瘡即平愈一方無鮫鯉甲

治癩經年不差常出膿血疼痛不止宜服此方 出聖惠方

班貓 一分糯米拌炒米黃為度去頭足翅 羚羊角屑 一兩 麝香 一分細研 甘

草 一兩炙微赤

右為末用軟飴和丸如棗豆大空心以荆芥湯下七丸

蜥蜴丸 治癩癧久不差出膿水腫痛日夜不已 方見本門

赤癩癧

治癩癧腫硬疼痛經時不差宜用此 出聖惠方

硃砂 蜜陀僧 班貓 雄雀糞 各一兩

右為末用軟飯和丸如麥粒大曝乾納入瘡孔中用粘麵糊帛貼之五六日自落

烏鷄丸 出聖濟總錄

治瘰久不差

烏鷄卵 一枚 錦具子 兩半

右將錦具子入鷄卵內用濕紙蓋頭七重再用泥固濟火煨過後入地坑內出火毒一宿取出研細入黃柏半兩麝香一錢同細研煉蜜丸菴豆大空心蜜水下五丸不過五服效

異効散 出聖濟總錄

治瘰結核久不差

芫青 四十枚 麒麟竭 一兩

右同藏於餅中燒過存性地上出火毒研細每半錢匕米飲調下加至一錢匕

內消方 一名必捷丸 仁齋直指方

治瘰久不瘥及治大人小兒瘰

瘰內消

斑貓 一分糯米炒 薄荷葉 三分

右為末烏鷄子清和丸桐子大空心茶清下二丸午

時候下三九臨卧服四九次日空心服五九臍下痛小便取下惡物為効如小便秘喫葱茶少許

花葉散

出仁存方

治癰漏瘡惡瘡婦人孀癰痛與不痛多年不瘥並治之

黃蜀葵

十五朶去蒂

桑葉

二十片

右陰乾為末入乳香半分研勻每用少許瘡乾麻油調塗瘡濕乾摻

治久年癰但未定交合頃者皆可服

出百選方

用鯽魚兩箇三寸大者開去腸肚不去鱗巴豆不拘多少填魚腸內滿為度麻皮纏定用鍊熟黃泥裹了曝乾用三二斤炭火煨過魚藥同研極細陳米飲和丸菘豆大每服兩粒或三粒陳米飲下日二三服加少麝香一方忌羊肉動火物

治療癰久不差者

出肘後方

用生玄參搗碎傅之日三次易之

木鱉膏

出仁齋直指方

治療癰經年發歇無已及膿血淋漓

並皆服之

用木鱉仁二箇用紙捍去油研碎以烏鷄子調和磁
盞盛之甑內蒸孰每日食後喫一次服之半月自然
消靡

治癰腫痛時久不差

用狸頭啼骨塗酥炙令黃搗為散每日空心米飲調
下一錢匕

治癰經久不瘥

用斑貓一枚去翅足微炙以漿水一盞空心服之或
用蜜水下重者不過七度瘥

治癰癰腫硬疼痛時久不差

出聖
惠方

用蝙蝠端午日收之燒灰細研如是翁癰無頭母癰
即有頭夫含水洗之以紙絃子絃藥於瘡孔中不過
三五度即差若是翁即密陀僧末少許以麵糊調之
即內消

治療癰年深日久不瘥潰爛膿血作臭穢者

用五丁草俗名貓兒眼睛連根採取不計多少亦不切碎盛入砂石鍋內澆滿冷水煎熬極爛順手不住攪轉乾則再添水至熬化成稠膏入全蝎數箇再熬撈去筋祖如膏藥馨香為度傾入磁罐埋土中留口出火氣為度以紅帛攤貼患處兩三日自落不過三兩次即愈比及上藥先以艾炷於瘡四圍密排灸之痛極至不痛為度膿血流出用軟物搵乾淨然後以前膏貼之

治療癰久不差

用猪臙膏塗之



普濟方卷二百九十二

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官編修臣馮敏昌

謄錄監生臣馮克鞏