



## Philosophical Transactions

Please note: Due to an error in the print volume, the page numbering in this article may contain either page numbering skips, or page numbering repetitions, or both. However, the article content is presented in its entirety and in correct reading order.

**Please click on "Next Page" (at the top of the screen) to begin viewing the article.**

IV. *Dissectio Puerperæ, Communicata a Petro Silvestre, M. D. Soc. Reg. Socio.*

**M**. Duchesne quadraginta Circiter annos nata, plethorica, & quæ sæpius etiam gravida menstruum patiebatur fluxum, cæterum optimè valens & obesa, jamque Vigefimum prægnans, urgente legitimo partus tempore, Circa quartam pomeridianam die Novembris 12. Anno 1697. Horrenda Uteri Hæmorrhagia Corripitur Vocatus post horam nonam *Jacobus Arnandin* Obstetriciæ non minus Artis quam Chirurgicæ peritus, & de Gravissimo illo Sanguinis profluvio certior factus, nullo prorsus remedio urgenti adeo sanguinis jacturæ Occurri posse putabat, nisi quamprimum sarcina sua Uterus levaretur. Sed, ut plerumque fit, adstantes nihil temere moliendum, & rem totam naturæ permittendam clamabant. Exinde Viribus prorsus exhaustis, Circa Mediam noctem iterum accersitur prædictus *Arnandin*, qui nulla interposita mora operi se accingens intra dimidium horæ *Puellam* mortuam extrahit, secundinis integris & illæsis absque labore subsequenter. Uteri tamen Hæmorrhagia usque perseveravit; hancque summa jactatio, Pulsus debilitas, Lipothymicæ frequentes, sudor frigidus, motus Convulsivi subsequabantur. Tandem Cæra Sextam horam matutinam vitam cum morte Commutavit.

Die sequenti Cadaver sequimus: Aperto Abdomine, & remotis tum pingui admodum Omento, tum intestinis tenuibus, uterus in Conspectum venit, instar majoris Cucurbitulæ, Crassus ac fatis distentus. In dextro ligamento lato Ecchymosis ingens erat, quæ ex latere uteri, illic ubi Vasa *Spermatice* & *Hypogastrice* per Anastomosis uniantur, descendebat, & in inferiori parte Colli Matricis, ubi sci-

licet intestino recto incumbit, maxime conspicua erat. Ut autem omnia facilius examini subicerentur, Uterum cum annexis resectum, & e pelvi extractum tabulæ imposuimus. *Vagina* admodum laxa erat: Orificium internum adeo Apertum, ut dimidium pugnum facile exceperit. Utero secundum longitudinem secto, hæc Conspiciebantur: fundum grumis aliquot sanguinis scatens, cæterum integrum & sanum: in hoc autem *Placenta Uterine* adhæsiō nobis facile Conspicua; quo loco etiam interna Uteri substantia inæqualis, Crassior, & quasi Carnosior Observabatur. In inferiori parte Colli uteri Causa mortis Apparuit, Laceratio nempe duorum digitorum Capax, quæ etiam extrinsecus, ubi scilicet ea Ecchymosis, Conspici poterat. An a Causa aliqua externa uterus disruptus fuerit, an potius a vehementiori Calcitratiōe Infantis, ut aliquando accidisse memorant Observatiōum Medicarum Scriptores, ignoro: Sed exinde aperta fuisse majora Vasa, quæ enormem illam sanguinis Copiam effudere, Certum est. Diductis tunicis, & tubulo inter duplicaturam immisso, flatus ex plurimis angustis foraminibus, cum ex ea fundi parte cui *Placenta* jungebatur, tum præcipue ex lacera Colli parte, undique erumpebat:

In dextro *Ovario* Vestigium seu Cicatriculam manifeste Notavi, ex qu *Ovulum* deciduum, a tubæ Cavitate exceptum, ejusdemque Motu Peristaltico ad Uterum delatum fuisse mihi dubium non erat. *Ovarium* sinistrum flaccidum & quasi exuccum: *Tuba* ex utroque latere Aperta, ligamenta rotunda Valida; reliqua omnia Sana Observabantur.

Licet Uterus subito post Puerperium Contrahatur & Coarctetur, adeo ut, quod modo Dixi, in hac fœmina sex Circiter horis a partu Mortua, Cucurbitulæ Majoris Capacitatem vix Superaret; Attamen illum instar Marsupii, vel sacci digitis extendere facile potui. Et revera fibras Carneas in graviditate sensim adeo elongatas, & tanto intervallo a se mutuo discretas, non nisi post aliquod  
tem.

tempus pristinum tonum & robur acquirere posse, quis non videt ?

Obiter hic notabo ferme de nihilo esse hanc quaestionem, quae Vulgo ab Anatomicis agitari solet, an scilicet *Uteri tunica in Praegnantibus multo Crassiores sint, quam in statu Naturali* ? Fateor equidem substantiam Uteri in non praegnantibus firmiorem, Compactiorem, & revera Crassiorem esse, cum fibrae Carneae tunc breves sint & summe Contractae : in Gravidis autem, quod hic Autopsia me docuit, uterum esse multo laxiorem ob fibras extensas, & majori intervallo a se discretas. Praeterea cum vasa Sanguifera, quorum flexuosa, & quasi Serpentinae ramificationes, pampinos vitium in statu Naturali imitantes, Uteri fundum & latera perreptant, in gravidis cum utero extensae sint, & a se invicem divisa ; hinc fit ut tunicae graciliores, & multo minus densae appareant. Verum, quod Ventriculo, vesicae Urinariae, aliisque partibus Membranosis Accidit, quae dum extenduntur multo Graciliores evadunt ; Cur eadem prorsus ratione illud ipsum utero non contingat, causa evidens est ; si quidem qua proportione extenduntur illius tunicae, eadem Augentur, ac pro fetus nutritione & accretione dilatantur Vasa omnis Generis in illas confertissime distributa. Adde quod interna Uteri substantia quamplurimis propriis ductibus pervia tunc Crassior evadit, & praecipue in fundo ubi *Placenta* adnascitur, densior est ; quod etiam in Animalibus *Cotyledoniferis* seu *Glanduliferis* Manifesteprehenditur. Occasionem autem errandi hinc Natam credo, quod cum nonnulli paulo post Puerperium Cadavera secuerint, quo tempore Uterus statim Coactatur, Vasaque adhuc dum varicosa sunt & sanguine distenta, facile hoc Anatomicis imponere potuit, ut in Gravidis uteri tunicas duplo quam in Naturali Constitutione Crassiores censuerint : Sed haec non adeo magni sunt momenti, ut in diversas ire sententias necesse sit.

Cæterum Observatione digna est singularis illa, quam supra indigitavi, Vasorum Sanguiferorum in Uterum dif-  
 feminatio. Arteriæ nempe ac Venæ *Spermaticæ* ac *Hypo-  
 gastricæ* in fundo & ad latera Matricis Capreolorum Viti-  
 um instar, eleganter intortæ sunt: Hinc non Modo ad  
 prægnantis Uteri modum extendi possunt, sed & postre-  
 mis gestationis Mensibus, dum ad rectam lineam propius  
 accedunt, facilius Sanguinis per illas transitus & distributio  
 succedit. Quantum autem illud conferat ad eam succi  
 Nutritii quantitatem suppeditandam, quæ *Fœtui* jam gran-  
 diori sufficiat, pluribus hic explicare superfluum efflet.

---