

16.65

13.12

獸醫常識



綏遠省人民政府農林廳畜牧局編印

目 錄

一、養活牲畜應有的常識

對牲畜怎樣餵養，管理，使用	(一)
為什麼要重視預防牲畜疫病	(二)
怎樣預防牲畜的疫病	(二)
怎樣識別牲畜的疾病	(三)

二、傳染病(傳症)

一、牛瘟(俗名傳牛)	(附圖一)	(四)
二、口蹄疫(口蹄病)	(附圖二)	(五)
三、鼻疽(吊鼻)	(附圖三)	(七)
四、炭疽病(血灌腸)	(附圖四)	(八)
五、氣腫疽(黑腿病)	(附圖五)	(一〇)
六、豬瘟(爛腸瘟)		(一一)

- 七、猪丹毒(傳猪) (附圖六) (一一)
- 八、羊痘(附圖七) (一二)
- 九、鷄新城疫(傳鷄) (附圖八) (一四)
- 十、鷄瘟 (一五)
- 十一、狂犬病(瘋狗) (一六)
- 附傳染病(傳症) 一般預防法 (一七)

- 三、寄生虫病(俗名虫症)
- 一、馬虻(俗名跳馬蜂) (附圖九) (附圖十) (一八)
- 二、牛虻(跳牛蜂) (附圖十一) (附圖十二) (一九)
- 三、羊虻(羊蠅) (附圖十三) (附圖十四) (一九)
- 四、肝蛭(柳葉虫) (附圖十五) (二〇)
- 五、胃虫(紅虫) (二一)
- 六、腸結節虫(附圖十六) (二二)
- 七、疥癬病(附圖十七) (附圖十八) (二三)
- 附寄生虫(虫症) 一般預防法 (二六)

四、普通病

一、慢性消化不良（慢草，不好好吃）	（二七）
二、便秘疝（結症）	（二七）
三、瘰癧疝（水冲）	（二八）
四、風氣疝（臌脹）	（二九）
五、癩麻質斯	（二九）
附普通病一般預防法	（三〇）
附：綏遠省獸疫防治暫行辦法	（三一）
綏遠省獸疫防治委員會組織辦法	（三六）
專署、盟、市獸疫防治委員會組織辦法	（三七）
縣、旗獸疫防治委員會組織辦法	（三八）
區、行政村、自然村防疫組織辦法	（四〇）
綏遠省家畜及畜產品檢疫暫行辦法	（四〇）

一、養活牲畜應有的常識

(一) 對牲畜怎樣餵養、管理、使用。

怎樣餵養牲畜？俗話說的好：「餵牲畜沒有巧，飲清水餵淨草」這是說明不論那種牲畜，飲的水必須清涼、乾淨，髒水、臭水決不能飲牲畜，餵的也要乾淨，不要有砂土，又說：「一寸草鋤三刀，不吃料也上膘」就是說明草鋤的越短越好，既愛吃，又好消化，又說「草膘料力水精神」，「交九不餵料，明春不能套」由以上更證明了：工作不論咋忙，對牲畜除餵飽必須還要飲好，生活咋困難，牲畜的草料一定要有充分的準備，每隔三、四天應餵點鹽吃，既能幫助消化，又能增加體力，（給羊經常餵點鹽吃也很好）。

怎樣管理牲畜？蓋棚搭圈、刷掃、拉糞、清除棚圈，是養活牲畜最重要的幾件事情。牲畜沒有棚圈，不但得不到充分休息，夏季遇天雨，冬季遇風雪，肥壯的牲畜容易得病，影響健康，瘦弱的牲畜就要死亡，例如過去武川一帶凍死羊數百隻，今年臨河縣下大雨時劈死牲畜十多頭，都是沒棚圈的緣故。刷掃和拉糞牲畜（大家畜）更是一件重要的事情，刷洗牲畜和人洗澡一樣，不但能使血行暢流，且能增加皮膚的抵抗力，工作後能使得很快的恢復疲勞，在秋天又能剷除寄生蟲的卵（虫症的蛋），棚圈最好每天清除

，以免病毒在糞尿裡生存，減少牲畜感染疾病的機會。

- 一 怎樣使用牲畜？牲畜（大家畜）使用也要注意，工作前裝套的時候，一定要把牲畜身上的砂土刷淨（尤其背和膀），以免打梁打膀（鞍傷拉傷）。幹活後一定要休息一個時間，馬、騾、驢，以停止咋鼻（喘）為合適，牛以開始反芻（倒嚼）為宜，餵飽後頂少要休息吃兩碗飯的時間，再作營生，一開始要輕要慢。

（一一）為什麼要重視預防牲畜疾病。

俗話說的好「防病勝於治病」這句話很有道理，因為牲畜得了病，不一定都能治好，尤其是傳染病，就說治好的話，在牲畜的本身要損害牠的健康，在生產上，也要遭受到一定的損失，就如一九五一年的春天，我省發生口蹄疫（口蹄病）：因為沒有作好隔離、封鎖的預防工作，結果傳染到全省，在春耕上受到了很大的影響，因為這個緣故，我們一定要做好牲畜疾病預防工作，才能減少損失和死亡。

（一二）怎樣預防牲畜的疫病？

牲畜發生疫病的主要原因，是因為餵養、管理、使用上的注意不夠，使牲畜的健康受到損失，減低了牠對疫病的抵抗力，碰到疫病的流行及環境的變化，就容易發生和感染疫病。為了避免牲畜發生疫病，就必須經常注意到生活，和衛生，一定教牠吃的好吃的飽，住的合適，才能保持牠一定的健康，碰到疫病流行的時候，才能發揮牠一定的抵

抗力，例如現在咱們政府號召蓋棚搭圈，貯藏冬草、打井、打各種防疫藥針，都是保護牲畜、預防疫病的主要條件，我們一定要響應政府號召，作好這些工作，保護我們自己很寶貴的牲畜。

(四) 怎樣識別牲畜的疾病？

牲畜的疾病，大概可分為三大類：傳染病（傳症）、普通病（個別病）、寄生虫病（虫症）

什麼樣的病才叫傳染病呢？就是一個牲畜在一個地方得了病，同時這個地方牲畜也得了和牠一樣的病，就叫傳染病（老鄉們叫傳症），就拿牛瘋來說吧，李家營子老王的牛得了流眼淚，不吃草，嘴痛，拉黑稀屎的病，老李與老王是鄰居，老李的牛隔了一兩天，也得了這樣的病，這就叫傳染病。

什麼叫普通病呢？比如說老王有三條牛，有一條得了肚脹症，死了，（學名風氣疝）另外那兩條牛却沒有得肚脹症，同時他左右鄰居的牛，也沒有得這病，這就是普通病的一種，也就是個別病的一種。

什麼是寄生虫病（虫症）呢？就是一種大小不同的虫子，生活在牲畜的身體外面或皮膚下面，或肚內、腸子裡，肝裡，胃（肚子）裡，或腦袋裡，吸食牲畜的血液，並產生毒素，使牲畜害病，造成瘦弱或死亡，如牛犛虫（牛虻）、馬瘦虫（馬虻）、羊柳葉虫（肝蛭）等都叫寄生虫病（虫症）。

一、傳染病（傳症）

（一）牛瘟（俗名傳牛）

牛瘟俗名叫傳牛，這種病傳播的非常快，病勢也非常厲害，死亡也多，不但妨礙了畜牧事業的發展，並且嚴重的影響了農民生產，把這個病的各點寫在下面。

【病原】牛瘟的病原，不但是一種用眼睛看不見的東西，就是拿科學使用的顯微鏡也是看不見的，所以在科學上把牠叫做「病毒」或「濾過性病原微生物」，牠是生存在病牛身上的各部份，及病牛的糞尿、鼻涕、口涎、眼淚、並且會沾染到病牛用具和草料上邊去，如果好牛與病牛接觸或用病牛的用具或用病牛剩餘的草料，或在同一草場放牧，都可以傳染牛瘟，此外凡得牛瘟病死的牛，牠的皮肉、骨頭、內臟等物都有病毒，若是混在土壤中，二年以內也會把牛瘟傳染給好牛。

【病狀】好牛在已經傳染上牛瘟病的時候，在表面上看來，還未發現，病的前一兩天，他的身上，已經發熱了，漸次精神不好，不肯吃，有時光想喝點水，倒嚼也停止了，糞便減少，變成了乾黑色的糞蛋，到了發病的第二天，病牛就要咳嗽，呼吸也較困難，口裡的粘膜就發紅了。以後漸次白眼角也紅了，眼皮子也發了腫，流眼淚，流鼻涕，口很臭，鼻鏡乾燥、口流涎沫，口裡的粘膜和牙齦發生大小不同的潰爛斑點，爛斑上

蓋有麩皮樣的物質，拉黑色或深棕色稀糞，氣味很臭，還帶着一條一條的血塊，最後體溫下降，拉稀不止，死亡，死後苦胆腫大，第三胃（百葉）乾燥，大小腸內有紅斑（出血）點，全身淋巴腺（肉核）也腫大了。母牛的陰戶（水門）也發紅腫。（見第一圖）

【治療】這種病無論是在病初、病中、病末，中西藥品治療，都是沒有特效的，惟有在初得病的時候，用「牛瘟血清」注射才能好，若病到四五天後，就是注射血清也難以治好。

【預防】好牛一定要接受牛瘟預防注射（打針），才能使好牛在有效期間內不傳染牛瘟，如有病牛發生，首先要注意到自己的牛，不要和有病牛的人家往來，以免傳染牛瘟，病死的牛，絕不剝皮吃肉，一定要深埋起來，並立時報告當地政府，以便派防治人員，趕往防治，撲滅牛瘟。

（二）口蹄疫（口蹄病）

口蹄疫是牛的主要傳染病的一種，豬、綿羊、山羊也能被傳染上，人也有被傳染的，傳染性很大，流行也很快，只要一發現，所有的牛很難避免，使牛的健康遭到損失，或致死亡。

【病原】口蹄疫的病原，是一種「濾過性病毒」，病的自然傳染，常是因爲接觸了病牛，如果厩舍距離很近，也有傳染的可能，間接傳染的機會也很多，如病牛的唾液，和蹄部水泡的液體，病畜剩餘的草料、飲水、牧場、用具等，都能傳染口蹄疫。

【病狀】口蹄疫的潛伏期（就是牛已得了病，我們看不出來的時期），二日到七日，病初體溫增高（發燒），這時食慾不好，待水泡發生後，體溫就下降到平常一樣，口粘膜感覺過敏，所以咀嚼及吞嚥緩慢，不吃草料時口也常關閉，有時或張開，還發一種劈拍的聲音，漸漸就不能吃東西了，病畜站立不動，精神不好，口角流涎，如綫狀，喜把口浸入水中，或顯口渴狀態，口粘膜乾紅而熱，水泡發生在唇內面，牙齦、舌旁及頰內面，泡內含有清色或黃色液體，漸變為混濁或灰白色，一至三日水泡破裂，液體外流，成紅色疼痛糜爛區，在短期內有黃棕色痂痕，不久就恢復常態，同時蹄部也發生了同樣水泡，行動困難，這是與牛瘟不同的主要點，有時鼻部及角根，亦有水泡發生，有的病畜快要到好的時候，忽然飲食停止，倒地而死，那叫「惡性口蹄疫」，單純口蹄疫死亡很少或無死亡，「惡性口蹄疫」死亡為百分之五十至七十（一百頭病牛死五〇至七〇頭）如果得口蹄疫的牛，又害了肺炎，或破爛處染上其他細菌，那就死亡較多了。（見第二圖）

【治療法】1、用開水一百兩加「來蘇爾」二兩，混和起來晾冷洗牛口和蹄子，每日上下午各一次，病輕的洗一天，重的洗二天，有特效。（「來蘇爾」西葯房賣，每瓶十二兩價洋一萬五千元上下，每瓶可配水六百兩，平均可治牛一百頭）

2、用開水一百兩，加「結晶硼酸」二兩，溶化後，晾冷洗牛口和蹄子，每日上下午各一次，病重的洗二天，輕的洗一天，有特效。（「結晶硼酸」西葯房賣，每瓶十二兩，價洋一萬五千元左右，可配水六百兩，平均可洗牛一百頭）

3、用開水一百兩加食鹽（大鹽）五兩，再加白礬二兩（如沒有白礬，可以用吃的醋代替）溶化後，晾冷，洗牛口和蹄子，每日上下午各洗一次，病輕的洗一天，重的洗二天，和以上兩方法效力一樣。

4、配葯水多少，根據病牛多少，按照以上三個方法，所寫葯和水的比例，隨便加減，洗時用小木棒，一頭裹上新棉花，蘸上水洗（先洗口後洗蹄）。

5、用以上各方洗後，如蹄子生瘡地方流黃水時，可將白礬用鍋炒乾後，研成細末，撒在瘡面上，包上洗淨的布子（新白布更好）。

6、病牛餵養：每日應餵柔軟和容易消化的食物。如稀粥、麩皮、柔軟的乾青草，以免將牛餓死，病牛面前可放一盆冷水，以便病牛隨便喝水。

【預防】1、好牛不要接觸病牛，和病牛的飼具、草料，或同處飲水。

2、不要買死牛肉，不買死牛皮，不買病牛。

3、死牛屍體，和生前糞尿等，都要埋入深坑，剩餘的草料，和病牛的所在地用柴火燒過。

（三）鼻疽（吊鼻）

鼻疽（老鄉和中獸醫叫它吊鼻）馬、驢、騾最容易發生，也是一種很厲害的傳染病，這種病的經過在馬是很慢的，騾驢得了這個病，急性的不過一個月就死了，一般老鄉都知道，他們說：毛驢和騾子吃上馬鼻子，和吃了毒葯一樣，這就是說明鼻疽病（吊鼻）

() 對馬、騾、驢的危害是多麼重大，人也能感染這種病。

【病原】鼻疽病是由於鼻疽菌（也是人眼不能看見的病菌）侵入馬、騾、驢的體內傳染上的，這種病菌，大多數是存在病馬的鼻涕內或牠的肺內，有的馬、騾、驢、是吃上了病馬的鼻涕，有的是用病馬所用過的用具，如飼槽、水槽等都是傳染這個病的主要原因，尤其是跑運輸的馬、騾、驢，傳染這個病的機會更多。

【病狀】一般患病的馬、騾、驢，身體瘦弱，結膜蒼白，由一個鼻孔或兩個鼻孔流出鼻漏（因此叫吊鼻），鼻漏初為灰色水樣，以後像黃色蛋清一樣，聞見很臭，他的顎下（俗稱槽口）淋巴腺（俗稱肉棗）腫脹，慢慢變硬，沒有疼痛，鼻孔張開時，看見中間的鼻隔膜上，有稍腫起的小結節（俗名疙疸），慢慢的增大軟化，後來變成破爛，臨死的時期呼吸困難，有拉鋸的聲音。（見第三圖）

【治療法】一般中西藥品治療無效，如果能治好的那就不是真性鼻疽，是因其他原因所發生的鼻漏（吊鼻），例如流行性感胃，（俗名風氣，又叫傷風）等。

【預防法】現在對鼻疽（吊鼻）這個病，還沒有想出很好的辦法，只是在預防上注意，就是把害鼻疽（吊鼻）馬、騾、驢撲殺了，深埋起來，滅絕這個病原，以後就再不會發生這病。

(四) 炭疽病（血灌腸）

炭疽病（老鄉叫他血灌腸，中獸醫叫他腫毒）一般牲畜全都得這種病，如馬、驢、

、騾、牛、駱駝、山羊、豬、狗，就是人也傳染這種病，只有家禽雞、鴨、鵝，不得這種病，牲畜要是得了這種病很快的就死了，得這病的差不多全都要死了，所以炭疽病是一種很厲害很可怕的傳染病。

【病原】炭疽病是由於炭疽菌（是一種很小的微生物體，用眼是看不見的，用科學方法在顯微鏡下能夠看見）侵入牲畜體內傳染上的，這個病菌，在病畜的皮、骨、肉、血液、內臟全都存在很多，一般是由於破傷部進入。因吃上帶有病毒的飼料和飲水也能感染，因為炭疽菌，他的生活力很強，土壤裡能夠活到十二、三年不死，所以傳染的機會也就很多。

【病狀】炭疽菌進入牲畜體內，要經過四天至十天才能現出有病的樣子，這幾天叫潛伏期，因為此病經過快慢不同，所以病狀也就不同了。大概分爲三種病狀：

（一）——最急性病狀：得病後，突然倒在地下，呼吸困難，由屁股內、口內、鼻內流出血來，在一、二小時內就死去。

（二）——急性病狀：比前一種稍慢，得病後身體發燒，起初興奮不安，用前腿亂踏，後腿踢腹，漸次顯着迷糊，或呼吸困難，打圈子，就死了，多半在得病後半天內就死，很少有到一天的。

（三）——次急性病狀：是比較最慢的，起初的病症，身體發燒，漸次忽冷忽熱，精神不好，常顯出肚痛，呼吸困難，平常一、二天就死，除這個症狀以外，還有一種叫炭疽癰（中醫叫腫毒），就是在頸下部或前胸部的皮膚上現出局部腫脹，開始是硬固，有

熱痛，後來無熱也不痛了，但經過三、四天就死了。（見第四圖）

【治療】炭疽病因爲是一種細菌性的急性傳染病，普通中西藥品是沒有效力的，若慢性的打「抗炭疽血清」有治好的希望。

【預防】因爲這種病在治療上是沒有很好的效果，最好按期打炭疽疫苗針，在一定日期決不會得這病，是最好的預防法，以後防疫隊給牲口打防疫針時，要踴躍接受。

（五）氣腫疽（黑腿病）

氣腫疽又名叫「黑腿病」，在我們綏遠有的地方也常發現，得此病的牲口，如綏西武川等地主要是牛，其他羊、豬也有得的，不過很少見。

【病原】是氣腫疽桿狀菌，此菌在平時藏在低濕的土裡面，由於牛的鼻子，由於吃草和破皮的地方傳進牛體，半歲至四歲的小牛最容易害此病。

【病狀】潛伏期（在病菌侵入身體及至發病前的時期）約三天到五天，在肉肥厚的地方，腰、背、肩膀上、後大腿、脖子等處忽然腫一大塊疙疸，這時已經就不吃草了，用手摸着，好像皮和肉離開一樣，裡面有許多泡沫，若大腿上起了疙疸，牛就要拉騾，這樣不到一天半，就要死去，死的最快也最多，平均一百個病牛，就要死去九十五個。死了腫脹的地方肉都爛了，割開皮裡成黑藍色，有氣泡，帶酸臭氣，挺難聞，一般老鄉們用迷信的說法叫「殃打啦」，就是因爲這個緣故。（見第五圖）

【治療法】病初期在腿沒有拉騾的時候，打「抗氣腫疽血清」是可以治好的。

【預防法】1、死牛堅決不能剝皮吃肉。

2、好牛要打上「氣腫疽疫苗」針，在一定期間內，就可以不得這個病了。

(六) 豬瘟 (爛腸瘟)

豬瘟又名叫「爛腸瘟」，得這個病的豬，死得非常快，如果一個豬有了病，不注意隔離（好豬與病豬分開），那麼其他的豬都可以傳染上，對老鄉們的副業生產上，有很大的損失。

【病原】這個病的毒，也是存在糞、尿和吃剩下的豬食裡面，好豬接觸了這些東西，就惹上這種病。

【病狀】得了病的豬，身上發燒、不吃食、沒精神、拱腰、低着頭躲在一邊打冷戰，好閉眼，起初拉不出糞來，後來就拉稀糊糊，裡頭有時帶血。後腿裡面，有大小不同的紫紅點，病七、八天就死了。（見第六圖（一））

【治療法】吃藥是不頂事，在剛得的時候，打「抗豬瘟血清」藥針，可以治好。

【預防法】1、病豬死了以後，不要剝皮吃肉，要深深的埋起來，因為剝了皮，會把許多病毒散播出來，傳染更多好豬。

2、餵病豬的槽子要用石灰水泡上兩天再用。

(七) 猪丹毒 (傳猪)

猪丹毒，老鄉們也叫傳猪，它是和猪瘟不一樣，夏季發生最多，春天、秋天、冬天很少發生，三個月以上，一年以內的猪，容易感染，大猪不多得這個病。

【原因】病原是猪丹毒桿菌，用眼睛是看不見的，存在病猪的血肉裡邊，好猪誤食上因病死的猪肉，或病猪弄髒了的飼料，就發生這種病。

【病狀】初病發燒，昏迷瞌睡，行走不穩，先拉乾糞，後變拉稀，數日後，腹部胸前腿內側 (裡邊) 耳根脖頸等地方發生淡紅色斑，開始如手大，(猪瘟是不隆起的小紅點) 最後背部或腿上部稍腫，後半節麻木，漸次瘦弱而死。(見第六圖 (二))

【療法】普通藥品治療無效，初期打猪丹毒血清可治好。

【預防法】病猪要和好猪隔離，病死的猪不要吃，要深埋起來，病猪剩下的東西，不要給好猪吃。

(八) 羊痘

羊痘俗名叫「害痘子」，春天最多，這個病我們綏遠的羊害得很多，每年因害痘子死的羊可也多了，就是不死毛也掉一半，皮子也賣不上價錢，是老鄉們養羊的一個大損失。

【病原】是一種羊痘病毒，它存在害痘子羊的痘子裡面的漿水裡，和痘子的痂痂裡

頭，尿糞、唾沫等處都有病毒，由於害痘子羊的痘子或痂皮乾燥飛散在空氣中，好羊一吸氣，把這種東西吸進肺裡，就會感染這種病。

病狀：羊害痘子有兩種：一種是定型的，一種是不定型的。

1、「定型」的分爲四期（四個階段）

(1) 前病期：就是發病的前兩天，身上發燒，不愛吃草，沒精神，鼻子裡、口裡、眼皮裡面都發紅，腮裡面也是這樣，同時流眼淚流鼻涕，這樣表現約有一兩天。

(2) 出痘期：在身上毛少的地方（眼、唇、鼻、奶頭、及奶盤上）先發出挺多的小紅點，最顯著的（容易看見）就是後腮裡面，到第二天，小紅點的中間，變成疙瘩，以後就變成青白色之泡，裡頭有黃色清水，慢慢的變大，像豌豆，這時候身上就不發燒了。

(3) 化膿期：羊身上又發燒了，痘子裡面的水變成膿水，鼻子裡流出膿水，這時候東西也嚙不下去，咳嗽、出氣吸氣也很難受，有時拉稀糊糊，就這樣要經過二至三天。

(4) 定痂期：化膿以後，病羊身上就不燒了，全身的痘也沒啦！痘子也乾了（定成疙瘩），以後疙瘩跌了，就落下了疤。

以上三種是定型的痘子，當病到好了，要經過二十多天，也有因病重死了的。

2、「不定型」的，分爲五種：

(1) 不全出痘子：病羊不出痘子，只是身上發燒，或者就出一、兩個痘子。

(2) 石痘子：身上出的痘子，不變膿，慢慢長大成硬疙瘡。

(3) 黑痘子：又叫「出血痘」。因痘子裡出血，所以有的把它叫「出血痘」。

(4) 臭痘子：又叫「隔合痘」。由很多的痘子混在一起，變成大膿泡，有臭味。

(5) 死肉痘子：因痘子化膿後，變成爛瘡，慢慢的變成死肉皮。

以上說的「黑痘子」、「死肉痘子」，最厲害，死羊特別多。(見第七圖)

【治療】

1、出痘子羊要給軟草或粥吃，把病羊圈到一個乾淨地方，不能讓痘瘡沾染了髒的東西。

2、給得痘子的羊打上「抗羊痘血清」可以治好。

【預防】

1、害痘子的羊，和沒害痘子的羊，要分開來餵養，病羊不要出去放。

2、死了的羊，不要剝皮吃肉，要埋在深坑裡，以免傳染。

3、要打羊痘預防藥針，可以在一定期間內，不生痘子。

(九) 雞新城疫 (傳雞)

雞新城疫俗名叫「傳雞」，這個病在我們綏遠每年也是不斷的流行着，死的實在厲害，一百隻雞得新城疫，就要死掉九十五隻，甚至病一隻死一隻。

【原因】也是一種雞新城疫病毒，這種毒不僅是我們的眼睛看不見，就說科學上用

的顯微鏡（類似放大鏡）也看不見。好鷄一沾染上它，馬上就會得這種病。

【病狀】一發現了病，就不想吃食，或一下就連一點也不吃了，全身發燒，沒精神，毛炸起，肉冠及肉髯（肉髯）變成黑紅色，懶怠睜眼，來回搖頭，將頸伸直，常作咯咯的叫聲，出氣時半張嘴，喘氣，（鷄瘟沒有這樣病狀），膝子腫大，拉下來的糞，是黃綠色又挺臭，腿和翅膀麻木，經一至三日死亡，還有的腿麻的不能站或者是拐的不能走，一個翅膀搭拉，有時兩個翅膀都搭拉，頭向後彎，漸漸瘦弱而死。（見第八圖（一））

【療法】一般中西藥品無效。

【預防】這種病現在沒有好的治法，所以預防是頂重要的。

除按時給雞打雞新城疫預防藥針（雞新城疫疫苗）外，其他與雞瘟病預防法一樣。雞新城疫疫苗省畜牧局能大量供應，不收費，按照使用說明，老鄉自己也能打。

（十）鷄 瘟

鷄瘟又叫「搖頭瘟」或「軟腳瘟」。這個病在綏遠各地普遍的流行着，每年死的簡直不知有多少，因它傳的又快，死的也非常厲害，有的時候，甚至把一個地區的鷄要死的連一個不留，所以說此病對副業生產上損失很大。

【病原】是一種病毒，存在病鷄的血裡、腦脊髓裡、胆裡、糞及吐沫中，好鷄沾染上這些東西，就會得這病。

【病狀】得急性鷄瘟的鷄，平時頭一天還沒病，第二天早晨就死在鷄窩裡；但一般

得了雞瘟病的雞，病初不大愛吃食，沒精神、懶怠動、後來一口食也不吃了，好閉眼，雞冠變成黑紅色。脖子縮起來，翅膀拖下，嘴裡吐粘水，糞便為灰白色或綠色的稀糊，最後兩腿麻了不能走動，普通兩天至四天就死，得了雞瘟的雞好了的很少，得一百隻就要死到九十九，甚至就死到一百隻。（見第八圖（二））

【療法】一般的中西葯無效。

【預防】病死的雞不要亂扔，更不要吃死雞肉，把死雞用火燒掉或深深的埋起來，以防傳染。

（十一）狂犬病（瘋狗）

狂犬病（瘋狗）大家都知道這種病非常厲害，不但是牲畜被瘋狗咬着不容易好了，就是人被瘋狗咬着，也難以療治，所以我們不能不加以注意。

【原因】是由「狂犬病毒」（瘋狗病毒）傳染才發生的，這種病毒，常存在瘋狗的腦子裡、脊髓裡，尤其是涎水裡，所以叫瘋狗咬着的牲畜或人，都會得這種病。

【病狀】瘋狗咬着的牲畜，當時不咋些，經過兩禮拜到六禮拜，甚至經過幾個月，啥也看不出來，但症狀一發現，看見好像瘋啦似的，亂跳亂咬，連主人也不認，見啥咬啥，啃木頭、石地泥土等等，經過一至二日後，狂瘋更厲害，隨着病勢發展，變成呆傻，步行不穩，搭拉尾巴，嚙下困難，臨死前不能起立就死了。

【療法】發病後沒法治療。

【預防】1、發現瘋狗，馬上打死。

2、被瘋狗咬着後，趕快用消毒藥（「石炭酸」、「來蘇爾」、「過錳酸鉀」等）把傷口好好的洗一洗，也能頂事，然後報告區鄉政府或防疫隊。

附傳染病（傳症）一般預防法。

1、要時常接受政府派來的獸醫人員給牲畜打針，打了那種藥針就能防止那種傳染病。

2、傳染病流行的時候（鬧傳症）自己的牲畜不到有傳染病的地方去，從有傳染病地方來的牲畜，不要讓他進入自己的村莊。

3、傳染病流行的時候，絕對不買和不接收別人送來的死牲畜皮和肉。

4、靠河的上流地方，鬧牲畜傳染病的時候，絕對不讓自己的牲畜到那道河喝水。

5、自己的村莊裏發現了有傳染病的牲畜，大家一定讓畜主（牲畜的主人）將有病的牲畜關閉起來，大家要很好的看着他，不讓他把有病牲畜出去放牧或在公共井上飲水。

6、因害傳染病死了的牲畜，一定要深埋起來，或用火燒掉，絕不讓任何人剝皮吃肉，病牲畜住的棚圈要清除（糞、尿、糞土一定深埋）還要撒佈石灰消毒。

7、因害傳染病死的牲畜，生前剩下的食物，絕對不讓好牲畜吃，一定要深埋起來。

8、發現傳染病後，一定要把病狀鬧清楚，趕快報告政府派人防治。

三、寄生虫病（俗名虫症）

（一）馬虻（俗名跳馬蜂）

馬虻俗名叫跳馬蜂，幼虫的俗名叫瘦虫，在我們綏遠各地非常普遍，馬、騾、驢受牠的害很大，甚至因害這種病，也能叫牲畜死亡。

【原因】馬虻（跳馬蜂）在夏末秋初的時候，把牠的卵下在馬、騾、驢，容易啃舔的部位（前腿上部或肚子的後部），由馬、騾、驢因發癢而啃舔的時候，吃到胃（肚子）裡，發育生長，取食馬、騾、驢的血液，致使發生疾病。（見第九圖）

【病狀】患馬虻病的牲畜，常發現不好好吃草，有的還肚疼，常有紅色小虫（瘦虫）隨糞拉出，嘴上和肛門（屁股）上常有紅色小虫吸着，身體非常瘦弱。（見第十圖）

【療法】病馬內服大麥芽（草麥），每日二、三斤連吃五、六日，再灌大蘇子油五至六兩有效。二硫化碳素（化學藥品）也可治療，但因這種藥有毒性，稍不小心，容易中毒而死，老鄉不容易使用。

【預防】秋天對馬、騾、驢多刮刷，將刮下的毛用火燒了，或用濃厚煙草水（烟梗熬成的水）洗馬虻下卵的地方，破壞牠的卵，叫牠不能變瘦虫，就可不得馬虻症了。

(二) 牛虻 (跳牛蜂)

牛虻俗名叫跳牛蜂，牠的幼虫叫牛犛虫，得這個虫病的牛，不但身體受到很大影響，而且牛皮也要遭到破壞。

【原因】牛虻(跳牛蜂)牠把卵下在牛的毛上，孵化後順着牛毛爬下去，鑽在牛皮的下邊，慢慢的竄到牛脊樑上生活起來，吸食牛的血液。(見第十一圖)

【病狀】得牛虻幼虫病(犛虫)的牛，背上起大小不同的疙瘩，上邊有小孔，漸漸的化膿、潰爛、使牛發癢，不肯吃草，形成瘦弱。(見第十二圖)

【療法】把疙瘩割開擠出寄生虫(犛虫)，用二錢「過錳酸鉀」(灰錳氧)洗滌患部，如無此葯，用鹽水洗也行，此法最好冬天和春天使用。要詳細檢查，一個疙瘩也不要留。

【預防】預防和防馬虻(跳馬蜂)一樣。

(三) 羊虻 (羊蠅)

羊虻俗名叫羊蠅，牠的幼虫俗名叫「羊腦蛆」，專危害羴羊，山羊少見，每年因害這個病死的羊很多，是養活羊的一個大害。

【原因】羊虻(羊蠅)在夏天和秋天把卵下在潮濕地方的牧草上或羊的鼻孔周圍，因羊吃草進入嘴裡，鑽進顎竇內(牙床縫)，或由鼻孔進入角竇(長角地方)，吸食羊

的血液。(見第十三圖)(第十四圖)

【病狀】患羊常常搖頭、磕牙、打噴嚏、轉圈子、不好好吃草，漸漸瘦弱死亡。

【療法】因為羊虻的幼虫(腦蛆)，生活在羊頭的深部，葯力不容易達到，現在還沒有好的辦法治療。

【預防】最好在夏秋的時候，不要在潮濕地方放牧，並將桉油或煤油時常給羊在鼻上塗擦，防備羊虻(羊蠅)在上邊下卵，也可免去這個病。

(四) 肝蛭(柳葉虫)

肝蛭俗名叫「柳葉虫」，它是在牲畜的肝內生活着，羊最容易得這個病，我省伊盟的羊患此病最多，每年死亡的也挺厲害。

【原因】由於肝蛭(柳葉虫)寄生在羊的肝臟裡，吸食羊的血液，使羊肝臟發腫或潰爛，引起消化不良，體力漸漸瘦弱而死。(見第十五圖)

【病狀】羊初病時候，身體發燒，有的肚疼、皮膚沒有血色，身體漸漸瘦弱，同時在腿前頸下發生浮腫(俗名叫水腫)，結果死亡。

【療法】從前沒有什麼好的治法，近來有的用「四氯化碳素」(西葯)灌羊，每次一克(二分七厘)反復灌上有效。

【預防】絕對禁止在污水坑內飲羊，和下濕地帶放牧。夏秋時每隔幾天給羊吃上一點鹽，也能預防這病。

(五) 胃虫 (紅虫)

胃虫是反芻(倒嚼)牲畜最可怕的一種病，危害綿羊最厲害，牛和山羊比較好點，是養活羊的最大敵人。

【原因】夏季在下濕牧草繁茂地區放羊，胃虫的幼虫常在牧草葉柄上附着，因吃草時進入胃內(肚子裡)，成長發育，使得羊營養不良(瘦弱)、並發生下痢(拉稀)等症。

【病狀】在秋天牧草好的時候，羊營養也好，病狀不甚顯著。在秋末冬初由牧草將虫卵吃到肚裡感染這病，可是並不顯明病狀。但在來年春末夏初就顯出病狀了，懷胎的母羊更顯著，最初是皮色蒼白，(貧血)，身體瘦弱，食慾減少，精神不好，漸漸下痢(拉稀)，因在綿羊的頸部及前胸有水樣浮腫，老鄉們叫水腫，有時會漸漸瘦弱死亡。

【療法】「硫酸銅」「四硫化碳」(二種西藥)，在灌藥前，先餓牠一天一夜不要餓，灌藥時，要注意防止藥液流入呼吸器(氣管)內，懷胎羊可以不用。

1、硫酸銅一兩、水二〇〇兩配成藥水，大羊每次用二兩七錢，中羊二兩，小羊一兩二錢，每月灌一次連灌有效。

2、烟草(烟葉)一斤、水一〇〇斤，泡一日(二十四小時)撈出，烟草水五〇兩，再配上「硫酸鈉」水五〇兩，混和起來，大羊每次灌二兩七錢，中羊二兩，小羊一兩三錢，效力更大。

【預防】應在高處和乾燥的地方放牧，潮濕茂草的地方禁止放牧。

(六) 腸結節虫病

腸結節虫病是寄生虫病的一種，它是寄生在牲畜的腸子裡邊，對綿羊最爲厲害，山羊和牛稍次，這病能使羊營養不良，遭到死亡，也是養羊的最大損失。

【原因】腸結節虫

發育及傳染——成虫在腸內產卵糞中，數量很多，隨糞拉出外面，變成虫，抵抗力很大，能自由生活，一年不死，住在有少量水的牧地的草莖上，羊吃草時嚙下，到腸子內生活，作成結節，吸食羊的血液，發生各種症狀。

【病狀】腸結節虫寄生在腸內，少的時候，症狀不顯，寄生多的時候就漸次瘦弱，營養不良，皮色蒼白，羊毛粗硬，局部脫毛，顎下部或前胸部浮腫（水腫），糞便在開始不變，後來拉稀，味挺臭，冬期及春初最厲害，死亡也很多。（見第十六圖）

【治療法】在初期（幼虫時期）沒有適當療法，中期在腸內的成虫，可用汽油灌腸，百分之一硫酸銅（西葯）溶液（一兩硫酸銅百兩水配合）每天或隔一天灌一次，大羊每次二兩半，中羊二兩，小羊一兩至一兩五錢，連灌五次到七次，很有效。

【預防】病羊治療後要變換放牧地區，最好在高燥的草地放牧，陰濕和水坑附近，絕對禁止放牧牲畜。

(七) 疥癬病

疥癬俗名叫癩病，又叫疥瘡，是牲口的接觸傳染病，這個病對於健康的牲口，危害雖然不大，但在畜產品的毛、皮上要受到相當的損失。同時對因營養不良而瘦弱的牲口却遭受到相當的死亡。

【病原】由於蜘蛛形的疥癬虫，寄生在牲口的皮膚上，或皮裡頭，這種疥癬虫的身體很微小，人的肉眼是看不見的，因為管理不週，病牲口與好牲口互相接觸，就容易感染上，甚至有的因不注意，由一個有疥癬的病牲口，傳染到全群。（見第十七圖）

【種類】疥癬虫分三種，現在把這三種疥癬分述於下：

1、穿孔疥癬虫：這種疥癬病，是疥癬裡最嚴重的一種，寄生在牲畜體上無毛或毛稀的地方，如口的週圍、腿的內側等處，穿孔寄生在皮膚內，吸取牲口的血液，或破壞新生皮膚，牛、馬、駱駝、犬、豬，多害此病，羊比較少。

2、吸吮疥癬虫：羊害此病最多，牛、馬、駱駝、較少，因疥癬虫吸吮病畜的血液，引起皮膚腫脹破裂，終於脫毛結痂。

3、食皮疥癬虫：這是疥癬病的一種，綿羊患此病的最多，馬、牛也有，綿羊每當春秋兩季在陰濕地方，最容易發生，死亡率很大。

【病狀】因疥癬虫的種類不同，所表現的症狀也不一樣，一般的說來，他的潛伏期（由感染到發病時期）四到六禮拜，先發刺癢，後皮膚發生輕微紅腫，起大小不同的顆

粒狀腫脹，漸漸形成水泡，或膿泡，水泡及膿泡最後破裂結痂，發生堅硬肥厚的痂皮。
(見第十八圖)

【療法】現把各種療法分說在下面，根據實際情況，參照當地條件，可任意選擇一法或二法，實行治療都能收效。

1、洗滌法：

甲、煙葉或煙草桿五斤，水一百斤，煮一小時後，將清水澄出，冷到不燙手時用洗淨的破蔴袋片或毛刷子，洗滌患畜，每日一次，洗愈為止，(根據羊的多少按照葯劑配合方法增減)。

乙、硫黃三斤，生石灰一斤半，水一百斤混合後，在鍋裡煮二小時，冷到不燙手的時候，用蔴袋片或毛刷洗患畜，葯水多少可按照比例增減。

丙、煙草一斤加水一百八十斤煮一小時後，將煙草撈出，再加硫黃和胰子(洗衣服用的)，各一斤加火熱之(將胰子化完為止)，冷到不燙手時用破蔴袋片或毛刷洗羊，可洗羊三百左右，每日一次，連洗三次有效。

以上洗滌法最好行於剪毛後，選溫暖天氣洗之，洗後必須在太陽下曬乾，再放牧飲水，用上法洗滌要有耐心。

2、塗擦法：

甲、硫黃一五兩，豬油一〇〇兩(葫油也可)先將豬油煉熱後，再將硫黃研成細末，加入攪拌，冷到不燙手時塗擦患部。

乙、臭葯水（苦利奧林）（西葯房賣每瓶十二兩價錢一萬元左右），軟石鹼（沒右軟石鹼可以肥皂代替）各一兩，精酒八兩混合後塗擦患部。

丙、石油（煤油）二兩，「木的爾」三兩（此葯西葯房賣每瓶十二兩）蘇油五兩混合後塗擦有特效。

以上塗擦法，在未剪毛前，那裡有疥癬那裡就脫毛，在脫毛部位塗擦，剪毛後除用洗滌法洗滌後，有局部厲害的地方，再用塗擦法治療，關於以上洗滌或塗擦的方法，所用葯量及配合的比例，是以治療羊疥癬作標準，牛、駝、馬、騾等大牲口，可將葯品加倍使用。（就是將葯量加一倍或二倍，水、油的用量照舊）。

3、以上各種治療法外，給羊餵硫黃也有效，大羊每頓一分四厘（市秤），小羊七厘，每日一次，連餵五日後停五天不餵硫黃，過五天後照前法餵硫黃，要是中間發生其他毛病，就應停止。

【預防】

- 1、圈舍要經常保持乾燥、清潔，又需向陽和空氣流通。
- 2、圈舍應隔一禮拜清除一次，清除後應撒石灰或草木灰來消毒。
- 3、不要在潮濕地方放牧或休息，污染不潔的死水坑、或池水，不要飲牲口。
- 4、得疥癬病的牲口，不要和好牲口在一塊餵養或放牧。
- 5、平時要注意羊的健康，不要使牠瘦弱。

附寄生虫（虫症）一般預防法

- 1、放牲畜一定要在高燥地方，絕對不讓牲畜到低濕地方去。
- 2、飲牲畜一定要找清涼、無臭味的好水，死水坑、臭水池裡的水，寧讓牲畜渴一會，也不讓他去喝。
- 3、牲畜圈棚內一定要時常清除，並鋪墊乾土，和常撒石灰。
- 4、夏天末和秋天，一定要每天把牲畜（馬、牛、騾、驢）的全身上掃刷一遍，刷下的毛，絕對要用火燒掉。
- 5、發現害外寄生虫（疥癬）的牲畜，一定要好好的隔離開以免傳染上。
- 6、一定要相信政府發的治療法，照法去治療，並且要耐心使用。

四、普通病

(一) 慢性消化不良 (慢草不好好吃)

慢性消化不良，老鄉們叫慢草，又叫不好好吃，各種牲畜都患之，日久不治，就變成重病或致死。

【原因】勞動過度，休息不足，飼料不好，或因有虫症，都是發生這個病的原因。
【病狀】精神不好，飲食不旺盛，頭低下，耳搭拉，吊臉，毛乾，日漸消瘦，最後虛脫死亡。

【療法】初期應餵容易消化的飼料，停止使用，充分休息，如果無效，可灌茴香和大青鹽各半，用火炒過，搗成面，和在料內每日二兩，連吃七日至五十日有特效。

(二) 便秘疝 (結症)

便秘疝，一般老鄉叫結症，各種牲畜都得，馬、騾更容易發生，重症的也要遭到死亡。

【原因】誤食異物 (毛、髮、破布、麻團等等)，餵不容易消化的食物，突然變換飼料，飲水不足或胃發炎，都是本病的原因。

【病狀】初得病的時候，拉屎很乾，也非常費力，漸次費力亦拉不出來，光作大便的架子，以後漸次睜眼起來，就地打滾，起臥不安。

【療法】初期灌蓖麻子油（大蘇油）及大黃末五—六兩（兩樣各一半）有效，必要的時期，可以施行直腸檢查（掏糞），採取糞塊。掏時要注意（先將手指甲剪掉，洗淨，手和臀部塗上油類，由肛門（屁股）插入），綏西老鄉有用羊棒（羊腿骨製的烟袋），搗碎灌下，也可收效，但因烟垢刺激性大，容易引起腸胃炎，要加注意。

（三）寒癱疝（水冲）

癱癱疝一般老鄉叫水冲，又叫寒火肚疼，馬騾患的最多，其他牲畜不多見。

【原因】隔的時間太長，沒給喝水，突然飲多量冷水，服重苦後，沒叫休息，就喝了水，或吃了刺激性食物，使的腸胃收縮起來，發生肚疼。

【病狀】得病牲畜初期不斷搖尾，前腿刨地，後腿踢腹，終至臥地不起，來回亂滾，回頭看腹，表示肚疼。

【療法】內灌茴香二兩（炒過研面），生薑一兩（搗爛）加水一—二兩用開水潑起涼溫灌下有效。

輕病和初病時，用乾草把按摩腹部，或用熱水布罨搗腹部，都有效，重症的以上各方同時並用更好。

(四) 風氣疝 (臄脹)

風氣疝一般老鄉叫臄脹，牛、馬、騾、驢、駝、羊，都得這種病，並且也很普通，輕的沒什麼，重的也要遭到死亡，不得不加以注意。

【原因】得這個病的主要原因，不外以下幾點：吃不容易消化的飼料，將要腐敗或已生霉的剩餘食物，餵後不休息，馬上幹重活，或迎風趕上快跑，都是得這個病的原因。

【病狀】病牲畜臥地不起，或急起急臥，來回滾轉，腹部脹大，敲之有鼓音。

【療法】初得病的時候，灌食鹽水或鹼水（食鹽四兩，或鹼二兩加熱水化開，晾涼灌下），均有效。

口內給牠含一根橫木棒，按摩腹部，使氣體由口或肛門（屁股）排出，也很有效。

(五) 僂麻質斯

僂麻質斯大概可分為兩種，一種是筋肉僂麻質斯，一種是關節（骨節）僂麻質斯，多發生在腰部和四肢（腿部），所以一般老鄉叫傷風或叫寒腿或傷風腰，馬、騾、驢、牛得這種病最多，要不注意或不很快治療，時間長了，容易成了殘廢。

【原因】牲畜勞動發汗後，驟然拴在房簷底下或有寒風賊風的地方，發汗後立刻休息，勞動後不拉上蹩，都是發生本病的重要原因。

【病狀】病重的四肢及腰部強硬不隨和，疼痛緊張，行走不便，有時發生部份浮腫

，病輕的一肢或二肢發生跛行（拐腿），腰部有病，拐彎不方便。有時由一處轉到他處，由前肢轉到後腿，日久不治，就成了殘廢。

療法：全身發生這種病時，灌服柳酸鈉（西葯），馬牛每次灌五錢至八錢，每日一次，病重兩次，連灌三日有效。

如係局部的，用松節油（西葯）塗患部有效，用黃芥末（人吃的芥黃）用水調成稀糊糊，塗在患部再用布包裹，每日更換一次，也有效。

附普通病一般預防法

1、牲畜一定要有棚圈，使得牠冬暖夏涼，並要打井、存草，叫牠吃飽喝好。

2、棚圈要向南、通風、透光，裡邊要時常清除鋪墊乾土。

3、草料要篩簸乾淨，絕不要帶一點砂土。

4、發了熱的青草，和人剩下的飯，時間過長發了酸，不要餵牲畜。

5、餵飽的牲畜（牛、馬、驢、騾）不要馬上使役（使喚），一定要休息吃一兩頓飯的時間。

6、使喚完的牲畜（馬、牛、驢、騾）不要馬上就餵，也要休息一定的時間，牛以開始反芻（倒嚼）馬、驢、騾、以鼻孔不擴張（炸鼻）後，再餵為最好。

7、久渴的牲畜，不要叫牠暴飲多量的水，應先吃一點再飲，或遲一會少飲一點水（喝一口拉一下頭），隔一個時間，再飲。

8、牲畜每天掃刷一次，能使血液流暢，增加皮膚的抵抗力。

綏遠省獸疫防治暫行辦法

第一章 總 則

第一條 為加強獸疫防治，確保現有牲畜起見，特制定綏遠省獸疫防治辦法（以下簡稱本辦法。）

第二條 本辦法所稱獸疫為牛瘟、炭疽、牛傳染性胸膜肺炎、口蹄疫、鼻疽、羊痘、山羊傳染性胸膜肺炎、豬瘟、豬肺疫、雞瘟、狂犬病、氣腫疽及疥癬（目前因條件所限，防治牛瘟列為中心工作，炭疽、羊痘、疥癬等為次要工作）。

第二章 防疫措施

第三條 省、盟、專署、市、縣、旗各級人民政府，組織獸疫防治委員會，區暫不成立，行政村在生產委員會內增設防疫委員三人；自然村組織防疫小組，實施行政、群眾、及技術等防疫事項。

第四條 獸疫人員和行政幹部，應隨時向群眾宣傳（採取講演、談話、演劇、牆報、漫畫等方式）科學防治獸疫之好處，並說明獸疫危害情形，迅速報告疫情、封鎖疫區，隔離病畜、掩埋疫畜屍體之重要。在實施普遍預防注射時，動員

第五條

群衆踴躍接受預防注射工作。

各級人民政府應動員群衆注意畜舍衛生，使畜舍空氣流通、陽光充足，每日清除糞尿，飲水、飼料應保持清潔，防止獸疫發生。

第六條

獸疫情報務求正確、迅速逐層轉報，其報告及處理分述如下：

一、如發現獸疫或疑似獸疫時，應立即報告村政府、區公所或獸醫機關。當地中西獸醫師，有檢查獸疫或指導處理及督促報告之責，設有隱匿不報或報告延誤者，應受嚴格之批評或處罰。

二、區村政府或獸醫工作站接到獸疫情報，應立即派員至疫區調查，經調查確屬獸疫時，即行轉報盟、市、縣、旗人民政府（獸疫調查項目附後）。

三、各盟、市、縣、旗人民政府得到獸疫情報，經調查確屬嚴重獸疫時，應立即轉報省農林廳或畜牧局，並報該管盟府或專署備查，同時即發佈禁令，封鎖疫區（封鎖禁令項目附後）。

四、省農林廳畜牧局接到各盟、專署、市、縣、旗獸疫情報，應立即派遣獸疫防治人員，攜帶應用各種藥品器械趕赴疫區，協同行政幹部進行調查防治；俟獸疫撲滅後通知各該市縣旗人民政府解除禁令。

第七條

各級人民政府封鎖疫區，除派軍公人員担任封鎖外，並動員群衆參加封鎖工作，以資澈底。

第八條

各級人民政府封鎖疫區後，應即通告鄰接之地方政府，其鄰接之地方政府亦

應切實監視，禁止牲畜出入疫境。

第九條

疫畜與健畜應由畜主或管理人嚴格執行隔離，並實行禁閉疫畜之飼養管理，獸醫人員及行政人員有指導及監督之責。

第十條

畜主或管理人應將疫畜糞尿及剩餘飼料，施以焚燒或掩埋，疫畜畜舍及用具撒以石灰粉或塗石灰水消毒。

第十一條

家畜在運輸中，如發現獸疫或疑似獸疫，應由車船主託運人或管理人及時報告當地行政機關或獸醫機關。聽候處理。

第十二條

患嚴重傳染病之牲畜，必要時可說服畜主或管理人，自動撲殺，以免疫勢擴大。

第十三條

患狂犬病（瘋狗病）之畜疫畜，應隨時撲殺並掩埋，畜主或管理人不得拒絕。

第十四條

凡撲殺死亡的疫畜屍體、糞尿及血土等，一併選擇僻靜地方深埋，（挖坑的面積大小依照家畜屍體大小決定，而深需八尺，深埋後再敷蓋三尺高之土，並在土面撒以石灰粉，以示標記）埋後不得發掘，並禁止人畜接近埋處。

第十五條

防疫人員認為有鑑定疫畜病名之必要時，得剖檢疫畜之屍體，畜主或管理人不得拒絕。

第十六條

省人民政府所規定每年定期防疫注射，畜主或管理人應誠懇接受。

第十七條

在防疫期間，畜主或管理人應受政府所派之獸醫及行政人員之指揮，並協助

防疫上一切措施。

第十八條 獸疫流行期間，或實施普遍預防注射時，地方政府應配備幹部參加獸疫防治工作。

第十九條 縣旗級以上人民政府，必要時得動員地方開業中西獸醫師，協助防疫工作，並應給以適當之報酬（由畜牧局開支）

第二章 檢 疫

第二十條 省盟、專署、市、縣、旗人民政府對家畜傳染病預防上認為有必要時，可令屠宰場及家畜市場，暫時停止營業。

第二十一條 家畜及其產品類等，因預防傳染病，得受檢驗員之檢驗，經檢驗確無傳染病者，發給檢疫證，准其輸入或輸出，否則得禁止之，並予以深埋或焚燒之處理，但檢疫員不得有遷延勒索等情事。

第二十二條 在檢疫期間，當地出售的乳肉經檢疫後方准出售。

第四章 附 則

第二十三條 本辦法自省人民政府公佈之日施行，修改時亦同。

附件一「獸疫調查項目」

- 1、最初發病日期及地點。
- 2、疫區範圍及交通情形。
- 3、疫區牲畜種類及數目。
- 4、病畜種類及數目。
- 5、死亡牲畜種類及數目。
- 6、獸疫來源及傳染途徑。
- 7、疫病名稱、並記載病狀。
- 8、本地人對疫畜醫治方法及其效果。

「附件二」封鎖禁令項目

- 1、宣告疫區封鎖範圍，禁止牲畜出入疫區。
- 2、疫區內禁止牲畜集市及買賣。
- 3、實行與健畜隔離。
- 4、禁止疫畜至河流或公共井池飲水及牧場放牧。
- 5、禁止出售疫畜之皮毛及骨髒等。
- 6、疫畜死後必須禁止剝皮吃肉要挖坑深埋。

綏遠省獸疫防治委員會組織辦法

一、目的：爲防止獸疫流行，保健家畜，遵照中財委三月十日電示第一項規定特組織綏遠省獸疫防治委員會。

二、任務：1、平時宣傳家畜衛生管理方法，協助定期預防注射及檢查家畜健康情形。
2、如遇獸疫流行，應採取緊急處理，發動群衆封鎖隔離消毒及報告疫情等工作。

三、組織：1、本會設主任委員一人，由省委担任，副主任委員二人，由省人民政府正副主席担任，委員九人，由省財委、農林廳、文教廳、民政廳、公安廳、軍區司令部、農會、畜牧局担任之。

2、本會設總幹事一人，副總幹事二人，遵照委員會議決，經常辦理有關獸疫防治事項。

3、本會設左列各組：

(一) 防治組：担任預防注射，診療及檢疫等工作。

(二) 宣傳組：担任教育群衆並講解家畜衛生，及防疫常識。

(三) 動員組：担任發動群衆，接受預防注射，執行封鎖隔離消毒及報告疫情等工作。

(四) 檢查組：担任檢查防疫工作，執行情況及效果。

四、會期：1、平時每月召開一次。

2、遇有疫情得由主任委員隨時召開。

五、本辦法自公佈之日施行。

專署、盟、市獸疫防治委員會組織辦法

一、目的：爲防止獸疫流行，保健家畜，特組織專署、盟、市獸疫防治委員會。

二、任務：1、平時宣傳家畜衛生管理方法，協助定期預防注射及檢查家畜健康情形。

2、如遇獸疫流行，應採取緊急處理，發動群眾封鎖隔離消毒及報告疫情等工作。

三、組織：1、本會設主任委員一人，由地委、盟委、或市委担任，副主任委員一人，由專員或副專員、盟長或副盟長、市長或副市長担任，委員五至七人，由軍分區、民政、建設、文教、公安、農會、婦聯等有關部門担任。
2、本會設總幹事一人，由主任委員指定。
3、本會設左列各組：

(一) 防疫組：由建設部門担任，負責協助預防注射掌握疫情報告。

(二) 宣傳組：由文教、婦聯部門担任，負責教育群眾，並講解家畜衛生及防疫常識。

(三) 動員組：由民政、公安部門担任，負責發動群眾接受預防注射，執行封鎖隔離、消毒等工作事項。

(四) 檢查組：由建設部門及農會担任，負責檢查防疫佈置執行情況及工作效果。

四、會期：1、平時每月召開一次。

2、遇有疫情得由主任委員隨時召開。
五、本辦法自公佈之日施行。

縣旗獸疫防治委員會組織辦法

一、目的：

為防止獸疫流行，保健家畜，特組織縣旗獸疫防治委員會。

二、任務：1、平時宣傳家畜衛生管理方法，協助定期預防注射，及檢查家畜健康情形。

2、如遇獸疫流行，應採取緊急處理，發動群眾封鎖隔離消毒及報告疫情等工作。

三、組織：

1、本會設主任委員一人，由縣委或旗委擔任，副主任委員一人，由縣長或副縣長，旗長或副旗長擔任，委員十一人至十五人，由民政、文教、建設、公安、農會、婦聯、及各區長擔任。

2、本會設總幹事一人，由主任委員指定。

3、本會設左列各組。

(一) 防疫組：由建設部門擔任，負責協助預防注射掌握疫情報告。

(二) 宣傳動員組：由文教、婦聯、民政、公安部門擔任，負責教育講解家畜衛生及防疫常識，並發動群眾接受預防注射，執行封鎖隔離消毒等事項。

(三) 檢查組：由建設部門及農會擔任，負責檢查防疫佈置，執行情況及工作效果。

四、會期：1、平時每月召開一次。

2、遇有疫情得由主任委員隨時召開。

五、本辦法自公佈之日施行。

區行政村自然村防疫組織辦法

- 一、區長担任縣防治委員會，區政府不另設委員會，但區長應負責督促檢查所屬行政村及自然村的防疫工作。
- 二、行政村不另設委員會，在生產委員內增添防疫委員三人由農會主任，民兵隊長及縣代表，勞模等積極份子担任，負責監督指導防疫工作。
- 三、自然村設防疫小組，組員在大自然村爲三人至五人，小自然村二人至三人均由村中積極份子組成之，並應舉出小組長一人，負責執行防疫任務。

綏遠省家畜及畜產品檢疫暫行辦法

- 一、爲了防止本省現正流行的口蹄疫及牛瘟，因交通運輸，傳播，蔓延，在交通重點要道各大牲畜市場派遣獸醫人員，由行政機關領導，設立檢疫站，進行檢疫工作。
- 二、遵照中財委三月十日的指示第四、五兩項之規定，特製定檢疫辦法。
- 三、在設檢疫站的地區稅收公安衛生交通以及有關部門，均應依照檢疫辦法協助檢疫。
- 四、凡交易，輸出，屠宰，各種家畜，必須事先經過檢疫人員檢查證明無傳染病者，得

發給檢疫證。

- 五、如有請求運輸買賣及屠宰者，須先交驗檢疫證，否則承辦機關不予辦理。
- 六、口蹄疫及牛瘟流行期間，凡畜產品（如毛肉，皮革，骨骼，蹄角等）未經過消毒處理者，一概不准運出，至一切處理用費由貿易部門担負。
- 七、凡經檢疫檢出有傳染病或潛伏傳染病的各種家畜時，畜主管理人或託運人，得聽從檢疫人員的指揮，到指定地點（地點由當地行政機關決定）隔離飼養，管理飼養，費用由畜主負擔。
- 八、檢疫人員除負檢疫責任外，經檢出之有傳染病的各種家畜得隨時治療，並予以飼養管理消毒隔離上的指揮。
- 九、在檢疫期間如有不遵守檢疫辦法，或逃避檢疫情事者，經發覺後按情節輕重，予以教育或處分。
- 十、本辦法自公佈之日施行。

編這本小冊的時間過於倉促，唯恐內容有的地方不夠完善及遇到，希望同志們批評與指導並交換意見為盼。