

本草綱要

醫學始內經雖品始于本經藥性之于醫特其一端耳而生殺反掌而細故也桐晝而下放其性止其用廣其數詳其義麗敷于百家真亦無餘蘊矣然首偏有所長求其詞句雅鍊意旨該明不簡不繁體裁合節剪削末之數見也王子訓荀子之至名也少長宮牆跡止厭情制舉遂自逸以老然經史百家靡不確究而子岐黃之書爲尤嗜蓋以刀圭素妙能探詮而養生首又不可以不知也王文訥變久尊酒論文之暇輒及醫旨殆于其間有立解平近以本草一帙示予蓋會叢諸家而手自裁定者也名自備要徵敘于予予知非以文字爲重以予稍解此中意冒大本草大者莫如綱目謂其類多而難窮也小本莫如湯液又未免失之稍略卽余小

刻醫學五種其一爲本草十劑蓋推徐氏之說而擴充之但與方角相表裏而于嬰兒湯科與則未之及茲本精于搜逸嚴于樹裁于湯液則神其闢昭于綱目則汰其繁無益以堅既得書傳義頌詔者文約而指博以云備要實然平是書行世間凡衣者亦列皆可廢覽矣嗟乎使訥養得行其志將躋民生于仁壽其見諸事功者島止如是今伏處衡茅僅著方書以寄意然其惓惓博濟之心則一出是訥養之爲訥養也夫

高學弟陳豐拜誤

原自敘

醫蠶之要莫先于切脉脉候不真則虛實莫辨攻補妄施鮮不夫人壽命者其次則當明藥性如病在其經當用其藥或有因此經而旁達他經者是以補母寫子扶弱抑強義有多端指不定自非兼貫博通精微洞與不但呼應不靈或反致邪矣正先正云用藥如用药誠不可以不慎也古今若本草者無慮數百家其中精且詳者莫如李氏綱目考究淵博指示周明所以嘉惠斯人之心良云切至第谷帙浩繁卒難究殫舟車之玉攜取爲艱備則備矣而未能要也他如王治指掌藥性歌賦聊以便初學之誦習要則要矣而未能備也近如蒙筌經疏世稱善本蒙筌附類頗著精義欲究拘對偶辭太繁縟而闕畧尚多經疏發明主迨之理制方參互之

義又葛闇誤以究其失可謂盡善然未暇詳地道明與辨真贗解處偶有傳會常品時多妄黜均爲子虛之二矣余非岐黃家而嘗讀其書三餘之暇特貳諸家本草由博返約取適用者四百品彙爲小帙某藥八某經治某病必爲明其氣味形色所以主治之由間附古人良惡兼施制防互濟用藥深遠之意而以土產修治長惡附于後以十劑宣通補瀉冠于前既若其功亦明具過使人閱知瞭然庶幾用之不致舛誤以云備則已備矣以云要則文要矣通鑑之工由此而究圖焉醫學之精微可以思過半矣題曰本草備要用以就止于宗焉

休陽動菴汪昂題于延禪堂


增補本草備要敘

言之可貴而足以垂後者必性命之文也其則經濟之文也余於祖學既無所窺之六經四子之書爍如星同自濂疏宋註且有遺譏况余患嘗凡民安敢以管蠡測溟深也哉性命之文吾無及矣若經濟之文必須見諸實事方能較諸簡編余少困棘闈壯謝制舉長達賴終鮮通鑑經濟之文吾無望焉耳至于詞章詩賦月露風雲縱橫精工無裨實用場學所謂雕虫篆刻壯夫不爲不其然乎獨謂贊襄之書雖無當於文章饑饉之觀然能起人沉疴益人神智弱可令壯鬱可使寬無閼道脈而能有助剛正之形軀不係政刑而實有裨生成之大德言不墮綺語之障用有當施濟之仁羣居飽食之餘或可以愧小慧而勝猶賢也乎是用寄意此中

思以蠹初則謂醫學與堪輿不同堪輿當有秘與天幾不欲輕泄若醫藥所以濟生收疾自應無微不顧無隱不彰蓋意極言不遺餘蘊之泛覽諸書惟靈素難經仲景叔和與衍宏深不易究辨自唐宋而下名家百代方書非不繁陳而義總殊少詮釋如本草第言治某病某病而不明所以主治之由醫方第云用某藥某藥而不明所以當用之理于書一律闕卷茫如卽間有辨析病源訓解既乏卓見本說焉而不詳諸焉而不暢醫理雖云深浩文字多冗道明難以詭覩者之心良用憮然不揣固陋爰採諸家之長輯爲本草備要賢方集解一編理法全宗古人體裁更爲創制本草則字箋句釋倣傳註之詳明醫療則註症釋方兼百家之論辨書分兩帙用實相資要令不知醫之人讀之瞭然庶裨實用兩書甫出幸海內名

賢頤鑒許今李草原刻已漫滅特用所藏訂用酬世好抑世尚有圖  
余藥味之簡者余惟歌賦湯液藥僅二百四十種地集廣至四百種不爲  
少矣如食物僅可充口腹而藥非治所常服者安能盡錄蓋既取其便又  
資其應知是止也茲因重梓更增備而可用者約六十品聊以厭嘗者  
之口仍不礙採者之艱苟小道之可觀倘不至致遠之怨泥也乎

康熙甲戌歲陽月休寧八十老人訥菴汪昂畫于延禧堂



增訂本草摘要凡例

一註本草者當先註病症不然病之未明藥於何有從前作者率明註第云某藥入某經治某病而已淺術視之蓋茫如也惟李氏納目良集諸家附著論說間及病源經疏因之釋藥而兼釋病補前人之未備在後學之指南茲集祖述一書更加增訂藥性病情互相闡發以便初學若每處皆釋則重複煩瑣反生厭瀆故前衛見或因藥論辨讀者彙觀而統會之可也

一藥品主治諸家析言者少統言者多如治痰之藥有治燥痰者有治濕痰者諸畫第以除痰概之頭痛之藥有治內傷頭痛者有治外感頭痛者諸書唯言治頭痛而已此皆相反之症未可混施舉此二端其餘可

不言何要  
以類推矣又每藥之下止某病宜用而不言某病忌用均屬闕略茲集並加詳註庶無貽誤

一每藥先辨其氣味形色次第其所入經絡乃爲發明其功用而以主治之症具列于後其所以主治之理卽在前功用之中不能逐款細註讀者詳之

一徐之子曰藥有宜上升下通補瀉滑潤燥濕即輕重二種是藥之大體而不經不言後人未述凡用藥者詳而詳之則雖所遺失矣今爲分開以冠于諸藥之首此十劑也陶弘景加寒熱二劑茲不具述然本集燥劑卽陶氏之熱劑通劑乃徐氏之燥劑而寒劑則多寓于瀉劑也

一藥品主治已請入某藏某府署則不更言八某經絡以重複無用也

一藥品稍近遐僻者必詳其道道形色如習知習見之藥則不加詳註

一陰陽升降浮沉已詳藥性總義中故每品之下不加重註

一主治要義及諸家名論用。病症用。藥名湯劑用

一藥內間附古方便人施用如方藥俱著則方名加列如有方無藥者則方名不用

一藥目次第每藥稍從其類以便查閱

一先哲名言有言以人重者有以言重者須當其名氏庶乎後學知所稟承或是或非有可裁斷秦何醫集之中率掠古人之言混入已作使讀者蒼黃莫辨涇渭難分習俗移人賢者不免甚有合數人之言

砌掇成篇首尾次貫詞意多乖以故醫學每鮮佳編良深慨息本集採用諸家叢存原名使可考據間有側節數行數句者以限于尺幅也有增改數句數字者務暢其文義也亦有錄其言而未悉其名氏者以藏書既寡自力不充難于盡考也或時附入鄙見必加昂按一字以聽時賢之論其間旁搜遠討審圖貫通取要刪繁詞歸雅飭庶幾懿觀者忘口耳

一是書篇章雖約多有補綱員經疏之所未備者故曰備也

一藥有氣味形色經絡主治功用禁忌數端藥性人賦雖便記誦然限于字句又須用韻是以不能詳括茲集文無一定藥名者語簡藥大者詞繁然皆爲杼軸煅煉成章使人可以誦讀若以本文另騰光便誦省

一本章一書讀之率多睡欲卧以每藥之下所註者不過藏府經絡甘酸苦澀寒熱溫平升降浮沉病候主治而已未嘗闡發其理使讀之者有義味可追嚼也即如證類諸本採集頗廣又以眾說繁雜觀者固折衷也是編主治之理務令詳明取用之窮于確切言暢意晰字義多作者頗費匠心讀者幸毋忽視


一舉之作不耑爲醫林而設益以疾疢人所時有脫或處僻小之區遇康劣之爭脉候大審用藥乖方而無簡便方書與之較證鮮有不受其憚者是以特著此編兼輯醫方集解一書相輔而行篇章雖約詞旨詳明攜帶不難簡閱甚便尙能人置一本附之篋笥以備緩急衛生之一助有識之士當不以愚言爲狂謬也

一昂首壯立之年便棄制舉蹟迹已懲念著書在詩無嘗人意祇獲復音  
難以垂遠然南麗視是無所表見竊用焚心故瘦精粹神著輯方書數  
種以爲省當于民生日用之實且集諸家大成貫穿笑釋或有功前  
賢若來世是世之後倘有嗜喜書補爲重梓者庶能傳之久遠此區  
區立言之意也

一是詩之作因聞過伯齡園根四子詣而其師意蓋園根之譜自唐宋至  
今千有餘載然必如伯齡之譜有議論有變換而後園根之妙顯本草  
自不經而不啻數百千家然卒章其氣味主治而無義味可尋必須  
爲之字箋苟釋明體辨用而後藥性之功全蓋主生平載之稿貢能取  
前之章寸衡銖稱抉鑑輪精庶幾有集成之亦無缺略之譏也故拙

著內經本草方解湯頭歌旨以爲體裁別開徑路以發前賢未竟之  
旨啟後人便易之門編謂于醫道頗有微傳清之方讀着猶覺別  
斯不虛美人之苦心焉可

一拙著醫方集解卷帙稍繁不便攜帶故取要錄括于本章之末使  
行旅可以輕資攬覽便于取用



增訂本草綱要

藥性總義

凡藥酸屬木入肝屬火人心屬土入脾屬金入肺屬水入腎此五味之義也

凡藥青屬木入肝屬火人心屬土入脾屬金入肺屬水入腎此五色之義也

凡藥酸者能澀能收苦者能瀉能燥能堅甘者能補能和能緩辛者能散能潤能橫行鹹者能下能堅淡者能利竅能滌泄此五味之用也

凡藥寒熱溫涼氣也酸苦甘辛鹹味也氣爲陽味爲陰氣厚者陽中之陽薄者陽中之陰味厚者陰中之陰薄者陰中之陽氣薄則發泄表厚則發

軟音慘  
軟音慘  
去聲

熱溫味厚則泄降薄則通利

利根

辛甘發散爲陽酸苦涌泄爲陰酸味涌泄

爲陰淡味滲泄爲陽輕清升浮爲陽重濁沉降爲陰陽氣出上發陰味出

下發清陽發腠理濁陰走五藏清陽實四肢濁陰歸六腑此陰陽之義也

凡藥輕虛者浮而升重實者沉而降味薄者升而生象氣薄者降而收象

氣厚者浮而長夏以月者沉而藏冬味平者化而成象氣厚味薄者浮而

升味厚氣薄者沉而降氣味俱厚者能浮能沉氣味俱薄者可升可降酸  
鹹無升甘無降寒無浮熱無沉此升降浮沉之義也

李時珍曰升者引之以氣則升沉者引之以氣則沉而

直達下焦沉者引之以酒則浮而上至頸項一物之中有升有降者是升降在物亦在人也小柴根之在土中者

半身以上則上升半身以下則下降以生苗者爲根以入土者爲梢上焦用根下焦用梢半身以上用頭中焦

用身半身以下用稍雖一藥而根梢各別用之或差服亦罔効藥之爲枝者達四肢爲皮者達皮膚爲心

爲陰者內行藏府質之輕者大心肺重者下入肝腎中空者發義內實者收裏枯燥者入氣分潤澤者入血分此上下內外各以其類相從也

凡紫色青味酸氣躁性屬木者皆入足厥陰肝足少陽膽經肝與膽相表胆爲乙木色赤味苦氣急性屬火者皆入手少陰心手太陽小腸經心與小腸相表裏肝爲丙火色黃味甘氣和性屬土者皆入足太陰肺足陽明胃經肺與胃相表裏大腸爲丁火色白味辛氣腥性屬金者皆入手太陰肺手陽明大腸經肺與大腸相表裏

脾爲己土色黃味甘氣平性屬土者皆入足太陰肺手太陽明大腸經脾與胃相表裏

庚金肺爲辛金色黑味咸氣屬水者皆入足少陰腎手太陽膀胱經腎與膀胱相表裏膀胱爲壬水腎爲癸水凡一藏配一府府皆屬陽故爲甲丙戊庚壬藏皆屬陰故爲乙丁己辛癸也

十二經中惟手厥陰心包手少陽三焦經無所主其經通于足厥陰少陽厥陰主諸藥入肝經血分者併入心包膽主氣諸藥入膽經氣分者併入三焦合

本草綱目  
門相火故行于膽三焦心包經入命門并入三焦此諸藥入諸經之部分也

藥有相須者同類而不可離也如黃柏知母梔子故紙川桃之類相使者我之佐也相惡者奪我之能也相畏者受彼之制也相反者兩不可合也相殺者制彼之毒也此四高之義也

肝苦急食甘以緩之肝欲散水喜條達急食辛以散之以辛補之以酸瀉之以酸爲補心苦緩急急食酸以收之心欲急食鹹以要之以鹹補之以鹹爲補取既濟之義也以甘緩之肝苦濕急食苦以燥之肝欲緩和養甘以緩之以甘補之以苦瀉之肺喜上逆火旺急食苦以瀉之肺欲散養酸以散之以酸補之以辛泄之腎苦寒急食辛以潤之肾欲

堅固則無狂濁之患，此五藏補鴻之義也。

風淫于內治以辛，涼佐以苦，甘以甘以甘緩之以辛散之。風屬木，辛屬金，金能

辛恐傷直氣，故佐以苦；甘苦勝辛，甘益氣也。木性急，故以甘緩之；木喜條達，故以辛散之。勝木故治以辛涼通

甘以酸收之，以苦發之。水勝火，故治以鹹寒；甘勝鹹，佐之所以防其過，必以酸收之，執結而以酸收之。火勝土，故治以苦熱；甘苦者，防鹹之過，而又以鹹熱氣作實也。熱淫，故

故以苦發之。濕淫于內治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之以淡泄之。濕爲

苦熱皆能燥濕，故能利竅。滲濕用酸者，本能制土也。

火淫于內治以鹹，涼佐以苦，辛以酸收之，以苦發之。相火畏水也，故治以鹹；辛能滋潤，酸能泄之。收斂苦能泄熱，或從其性而升發之也。

燥淫于內治以苦溫，佐以甘能緩，辛能潤，苦能下，故以爲佐也。

寒淫于內治以甘，辛以苦下之。燥屬金，苦屬火，火能勝金，故治以苦溫。

甘能緩，辛能潤，苦能下，故以爲佐也。

土能制水，熱能勝寒，故治以

熱佐以苦，辛以鹹，濕之以辛潤，之以苦堅之。土熱苦而辛亦熱品也。一寒之苦能瀉熱，而堅腎葛中有補也。此六淫主治各有所宜，古藥性宣明而

施用貴審也

人之五藏應五行金木水火土子母相經曰虛則補其母實則瀉其子  
又曰子能令母實如腎爲肝母心爲肝子故八肝者併入腎與心肝爲心  
母肺爲心子故八心者併入肝與脾心爲脾母肺爲脾子故八脾者併入  
心與肺肝爲肺腎爲肺子故入肺者併入脾與腎肺爲腎母肝爲腎子  
故入腎者併入肺與肝此五行相生子母相應之義也

酸傷筋筋則辛發散發散則肝復表表能勝脾苦能咸勝苦日傷肉酸勝甘辛傷皮毛疏散勝理

苦勝辛鹹復復能甘能鹹此五行相克之義也

酸走筋筋病母多食酸筋得酸則拘繩收引甚也苦走骨骨病母多食  
苦得苦則陰益甚重而難舉也甘走肉肉病母多食甘肉得甘則

臘腫益甚也辛走氣氣病毋多食辛氣得辛則散而益虛也鹹走命  
毋多食鹹血得鹹則凝滯而曰渴也鹹能滲泄溥液此五病之所禁也

多食鹹則尿凝滯

清

而變色

脉卽血也心合脈水尅火

多食苦則皮槁而毛拔

肺火尅

多食辛則筋急而爪枯

肝合筋爪者筋之餘爲金尅水

多食鹹則筋

木肝喜散故辛能補肝惟多則爲害

多食鹹則

金多食辛則筋急而爪枯

肝合筋爪者筋之餘爲金尅水

多食辛則筋急而爪枯

肝喜散故辛能補肝惟多則爲害

多食鹹則筋急而爪枯

肝合筋爪者筋之餘爲金尅水

多食鹹則筋急而爪枯

肝合筋爪者筋之餘爲金尅水

多食鹹則筋急而爪枯

肝合筋爪者筋之餘爲金尅水

多食鹹則筋急而爪枯

肝合筋爪者筋之餘爲金尅水

五味之所傷也

藥之爲物各有形性質其八諸經有因形相類者

如連翹似心而入心

荔枝核似睾丸而入

腎之有因形相從者

如屬水者入肝屬木者入腎潤者走血分燥

如氣香入脾氣

臭入心之類

如氣香入脾氣

臭入心之類

如氣香入脾氣

臭入心之類

如氣香入脾氣

臭入心之類

如氣香入脾氣

臭入心之類

類血之自然之理可以意得也

藥有以形名者人參而參之類是也有以色名者黃連黑參之類是也有  
以氣名者稀欒者需之類是也有以味名者甘草苦參之類是也有以質  
名者石膏石脂歸身歸尾之類是也有以時名者夏枯秋冬之類是也有  
以能名者何首烏骨碎補之類是也

凡藥火製四根煨炙炒生製浸泡洗也水火共製蒸煮也酒製升  
提薑製溫散八鹽走腎而收斂角醋注肝而收斂蜜製除劣性而降下  
米泔製去燥性而和中乳製潤枯生血蜜製甘緩益元陳壁土製藉土氣  
以補中州麵煨麪製印醋性勿傷上膈烏豆目草湯漬並解毒致命平和  
羊酥者脂塗燒成膠膏容易脆斷去穰者免脹去心者除煩此製治各有  
所宜也

一藥之爲用或地道不真則羗惡或市肆偽則氣味全乖或收抵  
非則良苦異質或頭尾誤用則呼吸不靈或製治不精則功力大減用  
者不察顧歸咎于藥之固功譬之兵不精猶以鴻寇克敵適以覆眾興  
亂也治療之家其可忽諸

二王金云凡藥須治擇熬泡畢然後秤量不得生秤濕潤藥量先增分兩  
燙，秤之

卷之三

七

增訂本草綱目錄

卷一

草部

一百九十品

附華草角蒿二種

黃耆

甘草

稍屬

參

丹參

玄參

白朮

蒼朮

藜

蘆精

狗脊

青

石斛

蒲蒲

牛膝

葛

五味子

膏

天門冬

膏

麥門冬

旋覆花

根

百部

桔梗

桔梗

蕷蕷

鴟鴞鈴

白前

半夏

鱗

南星

胆星

具母

桔梗

桔梗

天花粉

海帶

昆布

獨活

善活

防風

藁本

海藻

升麻

白芷

細辛

紫蘇

前胡

麻黃

根節

荆芥

連翹

紫蘇

子梗葉

薄荷

雞蘇

木賊

浮萍

蒼耳子

葉根

天麻

秦艽

赤芍葉

威靈仙

鉤簾鈎

莢蒾

莖葉頭身

青芻

白芍

赤芍

地黃

生乾熟

何首烏

鈎簾鈎

莢蒾

莖葉頭身

葛根

秦艽

赤芍葉

細辛

生乾熟

威靈仙

鉤簾鈎

莢蒾

莖葉頭身

增訂本草綱目卷之

休寧汪

易訂本草綱目

男汪

端其嗣

弟汪

桓殿武恭訂

姪江惟龍子錫

學鄭會廣寶良同訂

姪婿仇 澄天 同較

黃耆

補氣固

表瀉火

朱震亨

號丹溪

若本草

補遺古

汪機號

石山著



曰血非體內托瘡癰

生而排膿內托瘡癰  
固實補中卽所以固表也

脾胃緩和則肺氣旺而肌表  
生金則肺氣先絕

氣用補中益元氣溫焦壯脾胃

脾胃一虛上不能  
補陽虛自汗若者服此又能自汗

溫肉質腠理瀉陰火解肌至

日溫生用固表無汗能發有汗能止

丹溪云寅晉大  
補陽虛自汗若

草部

王好古

號海藏

著湯液

本草

甄權著

藥性論

日華著

大明本草

李東垣著用藥法篆

陳嘉謨著本草

著法篆

著本草

著本草

著本草

痘症不起陽虛無熱者宜之

新安汪機治痘症虛寒不起用四君子湯

加黃耆然草多効間有枯萎而死者自咎

用藥之不精思之至忘寢食忽悟曰白朮燥濕茯苓滲水宜痘藥之不行也仍減去二味加官桂糯米以助其力因名保元湯人參白朮茯苓

甘草名四君子湯王好古曰黃耆實衛氣是表藥益脾胃是中州藥治傷寒尺脉不至補腎元是裏藥甄權謂具補腎苦氣爲水母也曰築謂

其止崩帶者氣盛則無陷下之憂也蒙筌曰補氣藥多補血藥亦從而

補氣補血藥多補氣藥亦從而補血益氣湯雖加當歸因勢寡功破參

耆所據補血湯數倍于當歸亦從當歸所引而補血黃耆一兩當歸二

錢名補血湯氣藥多而云補血者氣能生血又有當歸爲引也○表旺

者不宜用陰虛者宜少用恐升氣于表而裏愈虛矣

爲補藥之長故名耆

俗作

皮黃肉白等

耆人補中藥追羸弱遠表生目或曰補腎及治崩帶淋漏宜臨水

非欲抑黃耆使入腎也取其補中升氣則腎受蔭而帶濁崩淋自宜卽

日華氣盛自無陷下之憂也有上病而下取有下病而上取補彼經而

益及此經者此類是也

伏苓爲健惡龜甲白鮮皮畏防風功益大乃相畏而更以

相使

上章

有補有  
瀉能表  
升可降  
能裏可

陶宏景  
註明醫  
別錄發  
明藥性



味甘生用氣平利川不紅而瀉心火以此緩之

大急長者必

氣用氣溫補三焦元氣而散表寒入中利口舌

丹溪治勞瘵連心飲與芫花同行非妙達精微者不知

汗劑則解肌退風熱人涼劑則瀉熱白虎湯瀉八

丹溪治勞瘵連心飲與芫花同行非妙達精微者不知

峻劑則緩正氣

薑附加之恐其潛上硝黃如之恐其峻下皆緩之之意

人潤劑則養陰血湯之類

能協和諸藥使之不爭

生肌止痛生肌肉通行十二經解百藥毒凡

毒藥並須冷飲熱則不郊小兒初生或久去口中惡血綿漬汗合咽之能解胎毒故有國老之稱中滿症是之甘人滿亦有生用爲瀉者以其能引諸藥至于滿所經云以甘補之以甘瀉之是已故別錄甄權並云除滿脾健運則滿除也仲景治痞滿有甘草鳴心湯又甘草得茯苓則不貢渴而反泄滿

大而紅者良補中多用瀉火生用達壅中

賢

用稍止壅中痛白木苦參乾漆爲便惡遺志反大戟芫花甘遂海藻不漱獨症用之

丹溪治勞瘵連心飲與芫花同行非妙達精微者不知

然亦有直用者

明治治痰癖十棗湯加甘草東垣治結核與海藻同用

人參

大補元氣瀉火



生薑微甘微熱大補肺中元氣

東垣曰肺主氣肺氣旺則四藏之氣皆旺清自生而形自盛十劑曰補可去弱人參羊肉之屬是也人參

補氣羊毫火得升麻補上焦鴻脣火得茯苓補下焦  
兩補形瀉火瀉腎火得夢火瀉火而生脉得黃耆甘

草乃甘溫退大熱東垣曰參者甘草瀉火之聖藥合用名黃耆湯益上按煩勞則虛而生熱得甘溫以益元氣而邪熱自退故亦謂之瀉益

健脾生金肺明目開心益智添精神定驚悸邪火退正氣旺則心肝寧而驚悸定除煩渴瀉

此理十枣湯芫花甘遂大戟等分枣十枚仲景治傷寒表已解心下有水氣喘咳之劑時珍曰甘草外赤中黃色兼坤離味濃氣薄資全土德協和羣品有元老之功普治百邪得王道之化贊帝力而人不知參神功而已不與可謂藥中之良相也昂接甘草之功用如是故仲景有言草湯汗草芍藥湯甘草茯苓湯炙甘草湯以及桂枝麻黃葛根青龍理中四逆調胃建中柴胡白虎等湯無不重用甘草贊助成功即好後人益氣補中瀉火解毒諸劑皆倚甘草爲君必須重用方能建効此古法也奈何時師每用甘草不過二三分而止不知治自何人相習成風牢不可破殊屬可笑

附記以正其失

故除煩生津故止渴通血脉氣行則血行質潤而生脉散用之皆以其通經活

津故止渴通血脉則脈自生也古方解散藥行表藥多用之皆取其

通經而安平責氣運則當矣

氣旺則痰白這

傷于七情六欲走表也不至不積化

洋水行水消滯之候飲食作勞爲內

傷傷于風寒暑濕爲外感如內傷發熱時熱時止外感發熱熱甚無休

內傷惡寒得暖便解外感惡寒架火不除內傷頭痛乍痛乍歇外感頭

痛連痛無停內傷則手心熱外感則手背熱內傷則口淡無味外感則

鼻塞不通內傷則氣口脉盛多屬不足宜溫宜補宜和外感則人迎脈

盛多屬有餘宜汗宜吐宜下然左人迎主表右氣口主裏也昂按東垣

辨內傷外感最詳恐人以治外感者治內傷也今人緣東垣之言凡外

傷風寒發熱咳嗽者槩不輕易表散每用潤肺退熱藥間附秦艽蘇梗

柴胡前胡一二味而羌活防風等絕不敢用不思秦艽陽明藥柴胡少

陽藥于太陽有何涉乎

以致風寒久鬱不散熱不止變發丸自汗自

成虛損殺人多矣此又以內傷治外感之悞也附此正之考證自汗

屬陽虛盜汗屬陰虛亦有過服參耆而汗反盛者以陽

盛陰虛陽愈補而陰愈虧也又宜清熱養血而汗自止多夢分云虛

若不用參耆若久病虛而滑瀉始痢宜下久痢宜補治瘧意同丹溪曰葉

虛痛何當忌此耶

疚病滑瀉先生患痢後甚逼迫正合承氣症予曰氣

## 反胃虛欬喘促

蒙筌曰歌有肺熱還傷肺之句惟言寒熱不辨虛實若

不用參耆若久病

虛而滑瀉始痢宜下久痢宜補治瘧意同丹溪曰葉

星甫嵩  
暑本草  
發明  
乳音樞

口脉虛形雖實而面黃白必過飽傷胃與參水陳芍十餘帖三日後胃氣稍寬再與承氣湯一帖而安又曰補未至而不則病者不能當補已至而弗下則築反添病匪急症徐其間間不容髮噫微哉昂按此先補後下法之變者也非胸有定見者不可輕用然後學亦宜知之大承氣湯大黃芒硝朴消長時發明云胸腸逆滿由中氣不足則脹者宜補之枳實厚朴汗濶月治而脹自除經所謂塞因塞用也俗醫泥于作飽不敢用不知少服反滋壅多服則宜通補之正所以導之也 中暑中風及一切血症六吐血脉乳洪者並用人參脫血者先益其氣益血不自生須得生陽氣之藥乃生陽生則陰長之義也若單用補血藥血無出而生矣凡虛勞吐血能受補者易治不能受補者難治

黃潤繩實似人形膏去膚用不齊用熟火用生金

膏川能回元氣于無何有之鄉有大者天膏對服參生時背陽尚陰不喜風曰宜焙用忌鐵伏苓爲使畏五靈脂堅硬黑豆紫石英人溲鹹鹵反藜蘆言聞曰東垣匪肺胃瀉陰火交泰丸內用人參皂莢是忘而不惡也古方療月閉四物湯加入參五靈脂是畏而不畏也又療痰在胸膈人參藜蘆同用而取其涌越是以怒生也非洞奧達權者不能知

人參蘆能消吐痰延體虛人用之

以代人參

丹溪曰人參入手太陰補陽中之陰蘆反能瀉太陰之陽亦猶麻黃根梢不同痰在上膈在經終二吐不可吐中就有發

散之義一婦性躁味厚暑月因怒而病呢作則舉身跳動昏不知人其人形氣俱實乃痰因怒鬱氣不得降非吐不可以參蘆半兩逆流水煎服吐頭瘡數碗

大汗昏睡而妄

## 沙參

補陰寫肺

## 丹參

補心生血去瘀



而體輕鬆白實者良生沙地首長大生黃土者瘦小畏防已反藜蘆

真者難得鄭莫一曰能療胸脾心腹痛邪  
熱結去皮膚游風疥癬惡瘡疝氣崩帶

氣平而峯本經微寒弘景曰性應熱味苦色赤入心與包絡破宿

血生新血後新生瘡去然養生胎血墮死胎調經風寒濕熱

襲傷常血則經水不調先期屬熱後期屬寒又有血虛血瘀氣深痰阻之不同大抵婦人之病首重調經經調則百病散除煩熱功

兼四物

一味丹參散

爲妇科要藥治冷熱勞骨節痛風痺不隨手足緩

人用紅白足受血而能步掌受血而能握月鳴腹痛導瘕瘕音征加癥者有塊可癥瘕昔能步掌受血而能握月鳴腹痛導瘕瘕假也移動聚散無常皆血病

血虛血瘀之候又治目赤疝瘕冷腫腫毒排膿生肌

鄭真一曰丹參養神定志通利血脉

畏鹹水忌醋反藜蘆

實有神驗



### 玄參

硝水瀉  
無根之火

此與黃  
耆能治  
下焦帶  
濁崩淋

溫瘡酒喉痳咽

本腎藥而治上焦火症壯本以制火也腎脉貫肝來也朝熱骨蒸亦木于此瘡癰結核寒散火熱

苦咸微寒色黑入腎能止水以制火散無根浮游之火  
腎水受寒道陰失守孤陽無根發爲火病益精明目利咽喉通二便治骨蒸傳屍傷寒陽毒發<sup>王</sup><sub>班</sub>亦有陰症慢農<sup>鬱</sup>謂不舒煩渴

同義

扁蒸過焙用勿犯銅器忌黃耆山茱萸辰桂膚

白术

苦燥濕

經曰脾生津液

土和脾溫和中在而補血在

出濕去

平同枳實則消痞一消一補名枳木口口則能已嘔吐定痛安胎

同黃

利肺燥

氣補氣同血藥則補血

無汗能發有汗能止濕從汗

煩發汗加辛散之味

燥濕則能利小便生津液

濕而燥

汪機著本草會編水火相激測腸鳴

又生溼何也汪機曰脾惡濕濕勝則氣不得施化津  
利則爲邪熱不殺穀也久瀉名脾泄腎虛而命火衰不能生土也有積  
炎壅帶肺氣不能下降大腸虛而作瀉者宜豁痰有傷風泄陽  
瀉者宜散風如脾虛濕瀉者首白术九治瀉九散優于湯劑消痰水腫

滿黃疸濕療補脾則能進飲食去勞倦則四肢倦怠止筋熱肌肉仁癥

平同枳實則消痞一消一補名枳木口口則能已嘔吐定痛安胎

同黃

安胎黃芩除胃熱白术補脾亦除胃熱利腰脅間血益胎氣繁于血燥

脾虛則帶無所附故易落利腰脅血者濕除則血氣流行也

血燥



汗止止汗同首芍之寒濕則能利小便生津液

濕而燥

利則爲邪熱不殺穀也久瀉名脾泄腎虛而命火衰不能生土也有積  
炎壅帶肺氣不能下降大腸虛而作瀉者宜豁痰有傷風泄陽  
瀉者宜散風如脾虛濕瀉者首白术九治瀉九散優于湯劑消痰水腫

滿黃疸濕療補脾則能進飲食去勞倦則四肢倦怠止筋熱肌肉仁癥

平同枳實則消痞一消一補名枳木口口則能已嘔吐定痛安胎

同黃

安胎黃芩除胃熱白术補脾亦除胃熱利腰脅間血益胎氣繁于血燥

脾虛則帶無所附故易落利腰脅血者濕除則血氣流行也

血燥

無濕氣用能生脾作病潰瘍忌之

補氣故也凡脹滿者忌用白肥  
木明氣然亦有塞因塞用者

白者出浙地名頭木燥白者出宣歙名狗頭木藤子折用糯米滑

浸借穀氣東陳王沙藉土氣以助脾或蜜水炒入乳拌用

潤以制其燥干金方  
云有人病牙齒長出

白艷子飲食者名

髓溢單用白朮愈

## 蒼朮

補脾燥  
濕宜升  
陽散鬱



甘溫辛烈燥質強脾發汗除濕能升發胃中陽氣東垣

曰補壯上行能除濕下安

止

止瀉逐痰水

許叔微云蒼朮能治

太陰便邪氣不傳入脾

水

飲之辟囊益燥脾以去濕素上以填科因用蒼朮

一助大棗五十枚去皮烏豆明半兩水二四研爐汁

和丸名神术丸丹溪曰實脾治

上燥脾濕潤是治痰之本

治童滿辛苦氣辟一切

惡鬼氣暑溫月焚之桂夷堅志云有士人遊西湖遇一女子明艷動人重幣求之不得又五年重建賈遊悵然空反忽遇女子上慨然並行過旅館留半歲將議偕逝女曰向是君去憶念之苦感疾而亡今非人也但君浸陰氣深當暴爲宜服平胃散以補安精血土驚惋曰藥味皆平

何得取効女曰中有蒼文風寒濕爲治要藥脈不引故發楚蒼木陽明虛則宗筋縱弛

未除邪氣乃爲上品也背風寒濕爲治要藥

又

能總角火氣血濕食之

參丹溪

相爲二妙散加牛膝名三妙散

又

能總角火氣血濕食之

參丹溪

鬱者因傳化失常氣不得升降病在中焦將欲升之必先降之將欲降之必先升之越鞠丸用蒼术香附蒼通能徑入諸經陳泄陽明之濕通行散溫香附乃陰中快氣之

方川湯

流川風帶潤分從心小腸來曰

者濕傷氣分從肺大腸來並有寒熱二症

南陽文氏

亦有因痰而帶濁者宜二陳加二术升柴燥結多汗者忌用

南陽文氏

山飢因有人致倒木遂不飢數十年後歸家顏色更少氣力轉健木一

名山精一名山蠶尊仙錄曰子欲長生當服山精予欲輕翔當服山蠶

昂按蒼术善發汗安能長遠服食文氏仙錄之說要亦方書誇張之言也

又

山堅小有硃砂點者良需

米泔浸宿乾同芝麻炒以制其燥二术皆防風地榆爲便主治略同弟

有此發汗之異妄本早不分蒼白陶隱君卽安言有兩種始各施

用

萎蕤

牛乳而潤去風



甘平補中益氣潤心肺悅顏色除煩渴治風淫濕毒

头痛皆爛

風寒熱店詩廉切

中風暴熱不能動

搗頭痛腰痛

凡頭痛不止者屬內傷宜補虛又有偏頭痛者左

屬風與血虛右屬痰熱與氣虛腰痛亦有腎虛氣滯痰

積血瘀風寒濕熱之不同凡挾虛寒風濕者宜萎蕤

卒寒目汗一切

不足之症用代參耆不寒不燥大有殊功

昂按萎蕤溫潤甘平中和之品若蜜製作丸服之數斤自

有殊功與服何首烏地黃者同一理也若僅加數分于煎劑以爲可代

參耆則失之遠矣大抵此藥性緩火服方能見功而所主者多風濕虛

勞之緩症故曥仙以之服食南陽用治風濕千金外臺亦間用之未嘗

恃之爲重劑也皆急虛之症必須參耆方能復脉回陽斯時卽用萎蕤

斤許亦不能敵參耆數分也時醫因李時珍有可代參耆之語凡遇虛

症極加用之曾何益于病者之分毫哉壯者方解欲採萎蕤古方可

以大補劑者終不可得則古入之罕用亦可見矣

似黃精而差小黃白多鬚二藥功用相近今

刀刮去皮節窠水或酒浸蒸用

成化御醫卷云景曰本經有女萎無萎蕤別錄有萎蕤無女蕤功用正同

卷之三

精

補而



平甘補中益氣安五臟潤肺胃潤心肺血精髓助筋

骨除風濕下三焦以其得坤土之精氣服不飢氣滿

則不飢積用有人虐使婢婢逃入山拔草根食之甚美久食不飢夜宿樹下見草動疑爲虎上樹避之及曉而下凌空苦飛鳥家人採薪見之告其主設網捕不得或曰此豈有仙骨不過服食靈藥耳遂設酒饌于路果來食之食訖遂不能去禽而詢之指所食之草乃黃精也

仙家以爲芝草

俗山人常采啖所用

之類服之長生

葛根甘苦而能通

津養氣涼火溺不節

腎脚弱腰

痛癥爲肝病

經日內不在藏府而外未發于皮獨居分肉之間真氣不能周命日周痺

除風寒強筋骨而免仰

滋腎益肝則健骨而筋強

有黃毛如狗形

故貞金毛參去毛潤其根解爲便羹食



補肝

謂

脊

解

丁補肝

同

急

補心腎



甘淡而除虛火入腎而清氣益精強陰  
煙水藏平胃氣而虛勞之病發熱自

汗濱滑精藥治餘熱

雷駒曰石斛生之草體瘦無味淡難出置之煎劑降難見功必須熬膏用

之爲良

七味如金錢狀而有白石者

名名金錢石斛長而順者

名水斛不唯用去根酒浸用冠巴頭異類并細

水浸養膏更良

苦寒溫壯氣子散修至少陰能通腎氣土達

心經

子心經益智精神陽聰耳明目利九竅長肌肉

志人足少陰腎經非

助筋骨治迷惑忘驚悸夢魂

能交心腎時珍曰遠

心經藥也強志益精故治健忘益精與志皆藏于腎

腎精不足則志氣衰不能上通于心故健忘夢魂也腎積奔豚一切癲

癲酒煎服經疏曰癲疽皆屬七情憂鬱惱怒而得遠志辛能散夢

升昂安辛能散鬱者多矣可獨遠志三因云益亦補腎之力耳

修希雍

片本

經疏

卷之三

宣通鑑

補  
遺

古漢集

來一  
切

風

李士林

著乘性

解本草

通玄

牛膝

補肝腎  
瀉惡血



珠黎膚得於答龍實

珍迈齋得於答龍嘗

辛苦而溫芳香而散補肝益心開心利九竅開目發聲去濕逐風除痰消積開胃寬中療噤口

揚土羸巨勞  
病乘失之則唯發

**腫止痛解毒散** 李士材曰仙經稱爲水草之精神仙之靈藥用汨浸飯上蒸之

殺氣向臻于中和  
佐地黃天冬之屬

真有殊嘗之効又曰芳香利膈心脾良藥能  
周資其宣導若多用獨用亦耗氣血而爲殃

角密  
十九節

食良去皮微炒用秦椒爲鹽惡麻黃忌飴糖羊肉鐵

**葛根**味甘性平，足厥陰少陰經藥。能引諸藥下行，酒

則其酸而溫益肝腎強筋骨

卷之三

**痠筋** 行下行故理足補肝則筋舒血行則痛止 **陰瘻** 溢膀胱則失

久瘧不癒傷少氣

以上皆補肝腎之功

生用則散惡血破瘀結

血行則散

治心腹

諸膚淋病

熱畜膀胱便濁而痛曰淋氣淋便濁餘瀝勞淋房勞即

發冷淋寒戰後洩膏淋便出如膏石淋精結成石尿血

即血淋也色鮮者心與小二實熱色瘀者腎與膀胱虛冷張子和曰石

淋乃丹經移熱于胞中日久熬煎成石非腎與小腸病也大法治淋宜通氣清心平火利濕不宜用補恐濕熱得補增劇也牛膝淋症要報血

經所謂氣化則能出焉此下行之妙藥腎齒痛引大便通惡血之功是也忌用淋藥通之終閉更莫悞用墮胎則病重

瘡傷折

以上皆散山竹木刺鴉蠅之即出竄

口合刺酒自出然性下行而涓滴夢遺

火精又脾虛下陷因而腰膝腫痛者

引大便通之

山竹木刺鴉蠅口合刺酒自出然性下行而涓滴夢遺

潤者下行生用入滋補藥酒浸蒸熏甲畏白前忌

火精又脾虛下陷因而腰膝腫痛者

山竹木刺鴉蠅口合刺酒自出然性下行而涓滴夢遺

# 目菊花

味兼甘苦性稟平和備受四氣

冬苗春葉包經霜露夏蕊秋花有經霜露得金水之精居多能益金水

溫補肺

宣祛風

肺火升則風火降則熱火在胃者血虛身少服永無口疾治

小味苦者名苦藥  
輕花小味苦者名苦藥

頭目眩運風熱驚癲癲以單瓣味甘者入之非真菊也牧署間談

云真菊延齡野菊瀉火人野菊瀉火人

名藥可飲可枕經之

# 五味

補肺腎  
清精氣



性溫五味俱備皮甘肉酸核中發咸爲多故專收斂

肺氣而營水苦辛都冇鹹味酉鹹爲水母經曰肺欲收急食酸以收

分益氣生津津夏月宜常服以瀉火而益金補腎

目聾陰清仲景八味丸加之補腎退熱欬汗止嘔佳溫寧嗽定喘

寒而喘嗽者當表散宜羌防蘇桔痰壅氣逆而喘嗽者當清降宜二陳

及蘇子降氣湯水氣逆而喘嗽者宜小青龍半夏茯苓湯氣虛病久而

喘嗽者宜人參五味除煩渴消水腫解酒毒收耗散之氣瞳子散大嗽初起承數

本草綱目

丹溪曰五味收肺氣非除熱乎補腎非緩火藏乎乃火

熱嗽必用之藥寇氏所謂食之多虛熱者收納之藥也

閔守東每晨吞北五味

三十粒固精氣益五臟

藥生川桂枝碎末南星色紅稻若風寒在肺質南若壅者壅者爲便惡寒  
驚驚食

其大參入大陰肺氣分清降火益水之正源

肺爲火通足陰子腎能去腎之火而爲腎母一通足陰子腎家濕熱故亦治骨蒸滋腎潤燥

止渴涼火蒙筌曰腎主津液燥則凝而爲渴得潤濕則痰化所謂治痰之本也津用膚

瀉肺火  
補腎水  
潤燥痰

天門冬

利二便治肺癰腫癰有寒接熱廢二症肺癰者熱毒蘊結咳嗽吐膿血胸中隱痛痰重而癰稍輕治瘻宜養血補氣保肺清火治癰宜瀉熱豁痰開提升散癰爲邪實瘻爲正虛不可誤治血滯甘益元氣久服可止口渴引飲多食金剛上火下熱通

寃莫心皮濃猶是爲使攝魚不盡當通良

天冬滋陰助  
元消腎瘀藥

冬清心降

火止上禁



甘露潤心潤肺清

東頓曰入王

彌陰益精湯

微其能濫則火人出  
水生陰得水養則

清金火降心寧而

則消炎止嗽

補肺清  
心瀉熱

—  
—  
—  
—  
—

**救多屬胃火宜  
日輕夜重者多  
腫火降則腎氣  
騰故又治消渴**

上  
火  
因寒  
因食  
因情  
屬陰虛宜五味麥冬知母  
連翹相知母石膏午後

少噏及行水生津肺清則水道  
母四物下行故治浮腫宜麥冬又有瘦脈手足緩縱  
癥因虛之不同瘦脈曰痿陰陽

明溫熱上蒸于肺故肺熱葉焦發爲瘧  
歷經疏曰麥冬實足陽明胃經之正藥  
散益心主肺朝百脈補肺清心則氣血

同人參五  
元而脉復又有脉絕將死者服

此能復生之夏月火旺灼金服之尤宜

東垣曰人參甘寒瀉火熱而益

丙火小  
腸庚金

— 1 —

大腸並  
主津液

明目悅顏益水

清火

但性寒而泄氣弱質寒人宜

肥者良去心火

滋補藥酒制其

地黃車前使藥多花麥門冬柏木耳

欬冬花

潤肺瀉熱止嗽



辛溫純陽薄潤肺消陰煩定驚明目治咳嗽上

氣喘

肺虛挾火 痰肺癆肺癆吐膿血爲治嗽要藥

淡燈以筒吸之亦良百合欬冬等分蜜丸名百合膏

沙參生地麥冬五味知柏芩芍如內熱骨蒸加舟皮地骨若啜而復瀉

者爲肺移熱天大腸臟府俱病啜而發熱不止者爲陰虛火炎皆難治

寒熱虛實同施用

本草源曰隆冬潤房先春開敷得腎之體先用之

入肺爲逆欬冬非肺家耑藥

乃使肺邪從腎順流而出也

十二月開化如黃菊微見花未全著

貞

生河北閏中世多極寒以批杷蕊爲之

極淨花甘草浸一窠用得蕊貞杏仁爲核

肺惡寒

郭佩蘭著本草

淮

禹貞

十一月開化如黃菊微見花未全著

支離貝母

粵音

声亦

卷之三

肺瀉

都膀也

復七

名金

草

下氣

瘞



辛溫潤肺涼下氣補虛調中消痰止渴治寒嗽結

氣管 氣吐膜

專治血勞

卷之三

亦虛而能開喉咽

取患滋然卒散性滑不寡

用獨用

本草綱目

李士材曰：人多氣化，則上齋雖能達下，幸可益金，故吐血保肺，收爲上齋。

辛而不  
金王君

燥潤而不  
子非多用

**根節紫潤軟者良**人多以車前旋覆根獨用不能速効

僞之誤

卷之三

水浸燒用款多爲便惡人雄瞿鑒本遠志異茵陳

自序

卷之三

田紫人

咸能軟堅，苦能下氣，行水溫能追血，入肺大肅

**經消炎結** 痘吐如膠漆 噆氣不除噫於介切俗作噏 噁胸中氣不暢

故嘔以通之屬不足亦有挾痰挾火者屬有餘  
仲景治汗吐下後痞鞕噫氣有代顏旋覆湯

音梗

梗  
通氣  
瀉火  
寒載  
上浮



部  
肺殺  
金

葉 小



水腫去頭風然止散之藥冷利之腸虛者慎用 類金錢菊去皮帶  
莖根燒角根能續筋筋斷者湯汁滴傷處淬敷其上半月不開筋目續矣

成百故名取脂者竹子劈去心皮酒浸焙用

上微溫能潤肺治肺寒咳嗽苦能瀉熱有小毒殺蠅蛆  
一切樹木蛀虫觸烟即死治骨蒸傳尸疰皆有瘧疾皆有瘧時珍曰百部亦天冬之類故皆治肺而殺出但天冬寒熱嗽宜之百部溫寒嗽宜之

根多

苦而平色白屬金入肺分瀉熱兼入手少陰定  
隣月經開提氣血散寒邪清利頭目咽喉開胸  
膈氣止痰喘促鼻塞不利目赤喉痺咽痛兩少  
病陽明以燄肺煙火肺氣火肺內隔如雨火火下利

腹痛腹滿腸鳴

肺火鬱  
計大陽

並宜苦梗以開之爲諸藥之主載之上涼能

除熱下氣而又能下氣何也肺之盛

瘧症峻下之劑至一毫之分成功

既上行而又能下行耳

排膿補內漏

故治肺癰時珍曰枳桔湯治胸中痞滿不痛取其通肺利

平除熱也宋仁宗加荆芥防

風連翹遂名如聖湯主好古如味甘情湯

失音加诃子聲不出加半夏

上氣加陳皮延敝加知母貝母款渴如五

味酒毒加葛根少氣加入參

腫加半夏生薑吐膿血加紫菀肺痿加阿

膠胸膈不利枳殼痞滿加枳實目赤加梔子大黃不得眠加

加黃耆發斑加荆防疫毒加牛蒡大黃不可識矣

用畏龍膽白及猪肉

寒利肺甘蟹

能解百藥及蛇蟲毒口中有上喉清

解毒  
和中

渴強中

渴症下消虛長興盛不支精出  
名強中消渴之後發爲癰疽

好賈多用以亂入參時

解毒

和中

似參而體虛無心似桔梗而栗口不苦

珍曰營虧卽甜桔梗

兜鈴

肺下



體輕而虛則以明象肺散入肺氣能清而化安  
能降氣

時珍曰錢人補肺阿膠散用之并取其補  
肺乃補肺之正藥昂按涼熱降氣寫之卽  
所以補之皆專于補氣以助火而益嗽人治咳  
喘米乃補肺之正藥昂按涼熱降氣寫之卽  
治咳

喘促症癆瘍肺火腸

熱則府熱亦清矣于金單服  
治水腫以能瀉肺行水也

不可吐鹽

湯劑中用

蔓生實如鈴去筋

膜取子

前

肺峰

下瘀



苦葉長子降氣下炎止嗽治癆瘍實胸膈  
滿極聚胃牛膝粗長堅直易斷首前也短小  
柔軟彎者首微也

近道多有形色  
類同以此別之去頭葉者

浸一伏時卽一焙用

書夜

肉

藥類

微見



俗以半夏專爲涂瘀而半夏之功用不復見知于世矣。小柴胡湯半夏瀉心湯皆用半夏。夏宜爲除瘀等。

外感外風外火之火炎於半夏辛散行水氣而潤腎燥又局方半硫凡治老人虛秘皆取其門滑也俗以半夏南星爲性燥誤矣濕去則上燥痰涎不生非二物之性燥也古方用治咽痛喉痙吐血下血非禁劑也二物亦能散血故破傷寒打皆主之惟陰虛勞損則非濕熱之邪而用利竅行濕之藥是重竭其津液醫之罪也豈藥之咎哉甲乙經用治不眠是胸長仲景小陷手足性燥者乎半夏硫黃等分生薑補丸名半硫丸胸腹湯用之復美素問曰胃不和則臥不安半夏能和胃氣而寒熱故小柴胡之炒僵不眠通陰陽盡樞曰陽氣滿不得入於陰氣虛故目不得瞑飲以半夏湯陰陽既通其臥立至又有喘嗽不得眠者左不得眠屬肝脹宜清肝右不得眠屬肺脹宜清肺膈首病喉嚨屬脾消腫止渴之勝王好古曰腎主五液化爲五膾膾入肺爲涕入脾爲痰痰者因咳而動脾之濕也半夏泄痰之標不能治痰之本治本者治腎也欬無形痰有形無形則潤有形則燥所以爲流脾濕而潤腎燥之劑也俗以半夏爲肺藥非也止嘔爲足陽明除痰爲足大陰柴胡爲之使故柴胡湯用之雖云止嘔亦助柴芩主寒熱往來是又爲足少陽也時珍曰脾無濕不生痰故脾爲生痰之源肺爲貯痰之器按有聲無痰曰欬益傷于肺氣有痰無聲曰嘔益動于脾溫

方結爲

痰氣順則  
火降而  
痰消

也有聲有痰曰咳嗽或因火因風因寒因濕因虛勞因食積宜分症論治大法治嗽當以治痰爲先而治痰又以順氣爲主宜以半夏南星燥其濕枳殼橘紅利其氣肺虛加溫敎之味肺熱加涼瀉之劑趙繼宗曰二陳治痰世醫執之內有半夏其性燥烈若風寒濕食諸痰則相宜至于勞痰夫血諸痰用之反能燥血液而加病按古有三禁血家汗家渴家忌之然亦間有用之者

### 圓白而大陳者

長浸七日逐日換水去滓切片生薑汁半性畏生薑用之以制月射子芩甘草各一陳陽爲治痰之總劑寒痰佐以乾薑芥子熟痰佐以黃芩括裏濕痰佐以蒼米血芩引痰佐以南星前胡桔梗佐以枳實白术更看痰之所在加導引藥半夏痰佐以半夏所司也真元靈芝麴十一法一薑汁浸造名生薑麴治淺惟燥痰非半夏所司也真元靈芝麴十一法近諸痰一磬水煮透兼薑糊造名磬迦磬最能却水治清水痰一者皂角汁鍊膏和半夏末爲麴或加南星或加麝香名皂角麴治風痰開經絡一用白芥子等分或三分之一竹瀝和成畧加麴糊名竹瀝麴治皮裏膜外結核隱顯之痰二麻油浸半夏三五日炒乾爲末麴糊造成油以潤燥名麻油麴治虛熱勞嗽之痰一用臘月黃牛胆汁畧加熱蜜和造名牛胆麴治癲癩風痰一用香附蒼朮撫芎等分熬膏和半夏末作麴名開鬱麴治鬱痰一用芒

草附蒼朮撫芎等分熬膏和半夏末作麴名開鬱麴治鬱痰一用芒

硝居半夏十分之三煮透爲末煎大黃膏和成名硝黃廻治中風卒厥

傷寒宜下由于痰者一用海粉一兩雄黃一兩半夏二兩爲末煉蜜和

造名海粉廻治積痰沉痼一用黃牛肉煎汁煉膏卽霞天膏秋半夏未爲廻各霞天廻治沉痼痼功効最烈以上並照造

天膏秋半夏未爲廻各霞天廻治沉痼痼功効最烈以上並照造

## 瘡瘍七日待生黃衣晒乾貼風處愈久愈良

天南星

燥濕宜



味辛而苦能治風散口是藥方南星防風等分爲末

五真散破傷風者葛根瘡口治破傷風刀傷撲傷如神名

治破傷風刀傷撲傷如神名

打傷至死童便調灌三錢連進三服必活

氣溫而

燥能勝濕除痰性緊而毒能發積拔腫補肝風虛

凡味辛而散者皆能

補肝風虛補肝風虛

丹溪曰無身強口裝喉腫毒結核

爲肝肺脾三經之藥治驚風眩

丹溪曰無身強口裝喉腫毒結核

不作眩身強口裝喉腫毒結核

瘡瘍癰疥瘻蛇虫傷

調末皮結上氣利水墮胎性更烈半夏

與

夏皆燥而毒故瘡瘍半夏辛而能守南星辛而不守然古安胎方中亦有用半夏者

喻瘡瘍禁用根似半夏

半夏

而大有知毒故一名瘧藥以鴉片角角浸酒或臘丸

人間  
昇

宜散結  
瀉熱潤  
肺清火



微寒去心火辛散肺鬱

人肺經氣分心火降則肺氣寧詩曰言采其蘂雖卽君母也取其解鬱

貝母也取其解鬱

潤心肺清虛治虛勞煩熱咳嗽上氣吐

血咯血肺癰

瘧疾寒瘲之火

目眩火熱木滯小腸邪

小腸相表裏肺爲氣化之源

瘡瘍乳門產難

力弱故結余几

傳瘡瘍唐時有八搏

而能飲酒食物亦無他苦遍投諸藥悉受欠敷之至貝母瘡乃輒眉灌之數日收痂而愈久瘡口非貝母性收斂也○

俗以半夏燥毒代以貝母不知貝母寒潤主肺家濕痰脫或誤用貽誤匪淺故凡風寒濕食諸痰貝母非所宜也宜用

半夏

南星 川壅開辨者良獨顯無辨者不堪用去心糯米拌炒黃鴉膠

售附子乾薑防風牛胆則不燥且胆有益肝膽之功得防風則不麻火炮則毒性緩得

本草 卷之三

櫻仁

作瓜

火潤

滑腸

血治  
痰

治小便  
不通

通乳消腫治癰肉腫

仲景小陷胸湯用之

又能除熱中鬱蒸

丹溪曰消子之令故生痰作嗽

又能除肺中鬱蒸

膩津止渴

丹溪曰消子之令故生痰作嗽

又能利腸

丹溪曰消子之令故生痰作嗽

甘草

本草

甘潤下能清上焦之火使痰氣下降爲

治喉藥

肺受火逼天下降之令故生痰作嗽

又能除熱中鬱蒸

丹溪曰消子之令故生痰作嗽

熟劑一便不通炒香酒服止一切血

寒降火

瀉心用

實圓長如熟柿

子扁核去核用枸杞爲蜜牛膝乾漆熬蜜反烏頭

酸能生津甘不傷胃微苦微寒降火潤燥滑痰解渴

古方多用

生肌肥脣腫行水通經止小便利

膀胱熱解

則水行而小便利

不數日即愈

花粉

火潤



則水行而小便利

不數日即愈

生肌肥脣腫行水通經止小便利

膀胱熱解

則水行而小便利

背氣癰瘍毒腫者痛

卽木根根同治粉食火宜燒

人

## 夏枯草

補陽散  
結消癰



辛甘微寒氣稟純陽補肝血緩肝火解內熱散鬱氣

全善曰目珠連目本卽日

治癰瘍毒腫單用朱夜痛

二全善曰目珠連目本卽日者夜與寒苦陰也夏枯氣稟純陽補厥陰血脉故治

此如神以陽和陰也按目白珠屬陽故晝痛點苦寒


藥卽効黑珠屬陰故  
夜痛點苦寒葉反劇

## 冬至枯故名用莖葉

## 藻

烏熟軟  
生痰消

發瘤



鹹潤而帶寒行水以泄熱故消癰瘍結核腫脹  
之堅

腹痛日病九

痛曰癧音頸燄欬脚氣水腫之濕熱消癰

## 治五膈

東海有大葉馬尾一種亦作海菜食澆

## 去鹹水屑

昂按其用在鹹似不宜過洗

## 反革

帶

希

木樓風  
云濕

獨活



下水消癰勝同海藻似海藻而粗柔弱而長

功同海藻而清性雄治水腫癰癧瘍膿血  
汗少  
斑汁  
出蒙者搓如繩索出閩越者大葉如葵洗去鹹

嘴

善微溫緩搜足少陰氣分

胃

以埋伏風

本經傷風頭痛體冒眩冒項背強直手足反張曰痙攣濕注與細辛同用

文潞公  
藥準用

獨活地黃等分

痘癰濕注宜項背強直手足反張曰痙攣濕流閉卽痛

爲末每服二錢

痘癰濕注而煩曰濕寒風勝濕故二活兼能去濕

痘癰腎積曰奔豚風寒濕客

痘癰于醫家所致痘癰亦然

故治

本經獨活一名活方確用獨後人云是二類二種遂分用以

形屬火有白如冠眼赤如色黑如漆而有活

並出蜀漢又云自西遙來者名痘痘子故又名胡王使者今抹諸家所分經絡主治各証以便施用

活

搜風  
表勝



辛甘性溫氣雄而散疏上升入足太陽膀胱以理逆

風兼入足陰厥陰氣上歸肝氣搜肝風小無不

入人無不通風濕相搏本經頭痛

同川芎治太陽少陰頭痛凡頭

痛多用風藥者以巔頂督脈爲病者取之

可到也

督脈並可治頭痛而厥亦

太陽經岡瘻采症春強而少陰頭痛凡頭

症也傷寒無汗爲剛痙傷風有汗爲柔痙亦

少陰頭痛凡頭

有血虛發痙者大約風症宜二活血虛症

即

少陽經岡瘻采症春強而少陰頭痛凡頭

續命愈風等湯以發表用三化湯麻仁丸裏至河間出始云中風

按古人治中風多主外感卒用

非外來之風良由心火暴甚腎水虛衰東垣則以爲本氣自病丹溪以

爲濕生痰痰生熱熱生風世人復分北方風勁質厚爲真中南方地卑

質弱爲類中不思岐伯云中風太法有四一偏枯半身不遂也二風痱

四肢不收也三風瘧奄忽不知人也四風痳諸風類痳狀也風症盡矣

何嘗有真中類中之說乎此皆由氣血虧虛醫者不知養血益氣以

人安

外感

河間

中單

內傷

皆

盡舍

人而

治南

乎

風  
發表  
風勝

固本徒用烏附羌獨以驅貞是目赤虛風之邪利周身而

風命曰虛虛誤人多矣

更宜亦要藥散川葵八風之邪利周身

節之痛爲寒反正之主藥若血虛頭痛遍身痛者此屬二活血散



辛甘微溫升浮爲陽擾肝陽而散頭目帶氣經絡留

濕主上部見血用之爲使上焦風邪頭痛目眩有痛

亦能治崩

項強周身盡痛人陽經症膀胱徐之才曰得又行脾

氣白能行周身

又行脾

門一經爲去風勝濕之要藥

凡風藥皆能勝濕東垣曰卒伍甲兵之職隨所引而止乃風藥中潤劑若補脾胃非

此引用以首赤瘡癰血虛寒頭痛因風寒

不能行散者此藥指

內傷

火升發噦陰虛盜汗陽虛自汗者此指

同黃耆芍藥又能實表止汗

合黃耆白朮名玉屏風散固

表聖藥黃耆得防風而功

益大取其相畏而相使也

膏潤者食上部用身下部用稍畏辛醇忌

乾薑白朮羌花殺附子毒

卷之三

宣去風  
寒濕

**葛根**

輕宣解  
升陽肌



急病皆

太陽

風潤滿  
和白芷

夏英公家  
胃也飲

病泄醫  
以藁本保

以虛治  
湯而愈甚

不効霍公  
益藁本外

易曰此風能除風潤

風客千  
漏耳

**瀉雜上爲太陽經**

正統 治本

長李本源  
大德不疑

卷之三

之用者  
脉督次經

皆性平，揚升發入陽明經，能鼓胃氣上行生津止渴。風熱多燥，葛根獨能止渴者，兼入脾經開腠發汗，解肌退熱，爲治脾胃虛弱泄瀉之聖藥。清氣經曰：

在下則庄瘞鴻鳥瘞傷寒中風陽明頭痛張元素曰頭痛如破乃陽明中風可用葛根葱白湯若太陽初痛未入陽明而頭痛者不可便服升葛湯發之反引邪氣入陽明也仲景治太陽陽明合痛桂枝湯加葛根麻黃又有葛根黃芩黃連解

升麻  
輕宣升  
陽解毒

肌湯是用以治太陽入血而溫瘡丹溪曰凡治瘡無汗要有升散邪爲陽明之路非太陽藥也血癆溫瘡主帶補有汗要無汗扶正爲主帶散者陽瘡有汗加參耆曰未以散易發之無汗加芩葛根大以發之能發瘡疹丹溪曰凡斑疹已之無汗加芩葛根大以發之風瘡痘兒紅點不可更服升葛陽恐表虛反增斑爛也又能起陰氣散鬱火解酒毒葛花引一便殺口瘡毒用侵

僵氣

升散

生葛汁大寒解溫病火熱吐血諸血



甘辛微苦足陽明太陰引經藥

胃脾參耆上行須此引之

亦入手

陽明太陰

太陰肺

表散風邪

引葱白散手陽明風邪同滿氣上行故補中湯用爲佐使

葛根能發陽明之汗引石

羔止陽明十發火能升陽氣於至陰之不引自溫頭痛齒痛牙發火能升陽氣於至陰之不引自溫

之藥上行以補衛氣之散而實其表

柴胡引少陽清氣上行升麻引陽明清氣上行故補中湯用爲佐使

若下元虛者用此升之治時氣毒瘡頭痛齒痛連頰等症用葛根能發陽明之汗引石

引火能升陽氣於至陰之不引自溫頭痛齒痛牙發火能升陽氣於至陰之不引自溫

瘡後遺

後重者氣滯也氣滯于中必上行而後能下降有病大小便秘者用通利藥而固効重加升麻而反通丹溪曰氣升則水自降

經中地氣上爲雲天氣下爲雨天地不交則萬物不通也

人則生飧泄崩漏之帶一脉之縮

能縮帶

# 足寒瘲瘻

升葛湯初發熱時可用痘出後氣弱或泄

其解斑疹成朵如錦紋者爲斑隱隱見紅點者爲疹益胃熱失下衝

散也斑入少陽則叨相火而成斑衝人少陰則助君火而成疹

# 熱瘻瘻瘻

升葛湯初發熱時可用痘出後氣弱或泄

瘀血入裏吐衄血者犀角地黃湯乃陽明聖藥如無犀角代以升麻二

桑味相遠何以爲代益以升麻能引諸藥同人陽明也朱二允曰升

麻性升二角性降用犀角止血乃借其下降之氣清心肝之火使血下

行歸經耳倘誤用升麻血隨氣升不愈湧出不止乎古方未可盡泥也

# 裏外瘻瘻

升麻去鬚根而表汗行手足陽明

太陽

升麻柴胡用蜜火炒之別有一種

綠升麻繆仲醇用治滯下每每有驗

# 白芷

辛散風濕除濕芳香通竅而表汗行手足陽明

太陽

宜發表  
待風散



八手太陰

肺色白味辛故入肺

而陽明主藥陽明之脈營于面故治頭面諸

濕

吉老名

介治王

定國病

時在都

梁因以

名丸

魚尾目  
之上角

細辛

宜散風  
濕偏頭

疾

治

陽頭目

痛

各

都

梁

丸

每服一丸

制外貼

臍

茶嚼下

酒浸

上

頭

足陽明

經

熱

之病

目

頭

目

頭

目

頭

目

頭

目

頭

目

頭

目

病

各

都

梁

丸

每服一丸

制外貼

臍

茶嚼下

酒浸

上

頭

足陽明

經

熱

之病

目

頭

目

頭

目

頭

目

頭

目

頭

目

頭

病

各

都

梁

丸

每服一丸

制外貼

臍

茶嚼下

酒浸

上

頭

足陽明

經

熱

之病

目

頭

目

頭

目

頭

目

頭

目

頭

目

病

各

都

梁

丸

每服一丸

制外貼

臍

茶嚼下

酒浸

上

頭

足陽明

經

熱

之病

目

頭

目

頭

目

頭

目

頭

目

頭

病

各

都

梁

丸

每服一丸

制外貼

臍

茶嚼下

酒浸

上

頭

足陽明

經

熱

之病

目

頭

目

頭

目

頭

目

頭

目

病

各

都

梁

丸

每服一丸

制外貼

臍

茶嚼下

酒浸

上

頭

足陽明

經

熱

之病

目

頭

目

頭

目

頭

目

頭

病

各

都

梁

丸

每服一丸

制外貼

臍

茶嚼下

酒浸

上

頭

足陽明

經

熱

之病

目

頭

目

頭

目

頭

目

病

各

都

梁

丸

每服一丸

制外貼

臍

茶嚼下

酒浸

上

頭

足陽明

經

熱

之病

目

頭

目

頭

目

頭

病

各

都

梁

丸

每服一丸

制外貼

臍

茶嚼下

酒浸

上

頭

足陽明

經

熱

之病

目

頭

目

頭

目

病

各

都

梁

丸

每服一丸

制外貼

臍

茶嚼下

酒浸

上

頭

足陽明

經

熱

之病

目

頭

目

頭

病

各

都

梁

丸

每服一丸

制外貼

臍

茶嚼下

酒浸

上

頭

足陽明

經

熱

之病

目

頭

目

頭

病

各

都

梁

丸

每服一丸

制外貼

臍

茶嚼下

酒浸

上

頭

足陽明

經

熱

之病

目

頭

目

頭

病

各

都

梁

丸

每服一丸

制外貼

臍

茶嚼下

酒浸

上

頭

足陽明

經

熱

之病

目

頭

目

頭

病

各

都

梁

丸

每服一丸

制外貼

臍

茶嚼下

酒浸

上

頭

足陽明

經

熱

之病

目

頭

目

頭

病

各

都

梁

丸

每服一丸

制外貼

臍

茶嚼下

酒浸

上

頭

足陽明

經

熱

之病</p

問旨

薯蕷

重膚  
辰鬪

宜之辛益肝胆故能禦癰漏風眼淚下者宜之水停心下則

腎燥者心亦燥火屈于水故躁急也經曰腎苦燥急食辛以潤之虽

三

腎燥細辛之辛能行水氣以潤之

腎燥者心亦燥火屈于水故躁急也經曰腎苦燥急食辛以潤之虽

三

少陰引經不足少陰本弱能通精氣利九竅故耳聾鼻塞音壅鼻

香臭也風寒入腦故氣不宜通寒則聰便濁者宜之散結溫經破瘀下

三

宜表熱宜清有癰肉者爲末吹鼻任曉便濁者宜之散結溫經破瘀下

乳行血瘀汗能發少陰之汗仲景治少陰症反發熱麻黃附子細辛湯乃治邪在裏之表劑然味厚性烈奇

三

過用不可過一錢多則氣不通悶絕而死雖

鬼督郵徐長卿皆可亂之死無傷可驗閉平獄喜治此不可不知

三

揀去雙柴者用惡耆山茱異硝石滑石反藜蘆

苦不徵氣味薄氣升爲陽主陽氣下陷能引清氣上行而生少陽厥陰之邪

肝胆心包三焦相火時珍

日行少陽黃芩爲佐行厥

爲佐

宣陽氣散綺調經表而不知柴胡最能和

迎黃連延昂按人第知柴胡能發

三

柴胡

宜發表

和裏退

熱升陽

葉竹



陰黃連

宣陽氣散綺調經表而不知柴胡最能和

熱升陽

和裏退

宜發表

宜之水停心下則

補中益氣道

散皆用

柴胡取

其和中

皆非解

表也

藥性論

甄權著

辨音圖

裏故勞葉血爲足少陽經之藥

胆爲清淨之府無出無入其經在半表

半裏法當和解小柴胡湯之屬是也若

病在太陽服之太早則引貳入門若病人

陰經復服柴胡則重虛其表最宜詳慎

病在少陽則宜柴胡等湯

半結實半浮沉其寇宗奭曰柴胡本經並無一字治勞葉性論曰華子

皆言補勞傷醫家熱而用之貽誤無窮時參曰勞有

五君勞在肝脾心心包有熱則柴胡乃手足厥陰少陽必用之藥勞在

肺胃有熱或陽氣下陷則柴胡爲升清退熱必用之者矣

不可用耳寇氏一槩擯斥殊非通論昂按楊氏秦凡扶羸湯治肺虛

痿成勞咳嗽聲嗄體虛自汗用柴胡爲君則肺勞亦有用之者矣

心煩

邪在半表半裏

東垣曰諸煩以柴胡爲君佐以引經之藥

更則發嘔吐計此寒

李上材曰瘧非少陽經慎用俞嘉言曰瘧

發必有寒有熱蓋外邪伏于半表半裏適在少陽所主之界入與陰爭

陽勝則熱出與陽爭陰勝則寒卽純熱無寒爲

牝瘧要皆自少陽而造其極偏補偏收弊亦必返還少陽之界使陰陽

協和而後愈也謂少陽而兼他經則有之謂他經而不涉少陽則不成

欬之不離于肺也談數云張知閣久病瘧熱時如火年餘骨立醫用葛

附諸藥熟益甚孫叔授以小柴胡湯三服脫然琳曰此名勞瘧熱從體

出加以剛柔氣血愈虧熱有在皮膚在臟腑在骨髓者非柴胡

不可若得柴胡以須一服南人者力病之良也此則得用藥之妙的矣昂按據孫氏之說曰柴胡亦能退骨蒸也

**眩目赤胸脇痛**者凡脇痛多是肝木有餘首小柴胡湯加青皮川芎

**皆嘔吐**者皆肝膽之邪

婦人熱入血室

衝爲血海卽血室也男女皆有胎前產

後諸熱小兒痘瘡五羸熱散十二經瘡溫血凝氣聚功同連翹

連翹治血

熱柴胡治氣  
熱爲少異

陰虛火發者荆芥

銀州者根長尺餘微白治瘧

良北產者如前而軟並夏南產者強硬不曉用外感生用內傷生氣

酒炒用根中及下降用稍有洋芩者蜜水燜胡半夏爲使昇胃角

**辛以暢肺解風寒甘以悅脾理胸腹苦瀉厥呻**之

**熟棗散太陽**勝之邪

微寒一生雲微溫性陰

而峰功耑下氣

下則火降而痰消氣有餘便是能除實熱治痰熱

止風癩

止解表  
偏下氣

## 附胡



喘咳嗽嘔逆膈霍亂小兒疝氣有推陳致新之續明目安胎無外感

者忌用

按柴胡前胡均是風藥但柴胡性升前胡性降爲不同肝胆經風痰非前胡不能除

皮白肉黑味氣

看者真牛真爲後患最忌火

黃

發汗

立溫微苦

僧繼洪云中半產麻黃地冬不積雪性熱故過服泄真氣

入足太陽膀胱

兼辛少陰陽明

心大

而爲肺家諸藥能發汗解肌

去營中寒邪衛中風熱調血脉通九竅開毛孔治中

風傷寒

中猶傷也

頭痛溫瘧逆上氣

風寒鬱于肺經經日諸氣肺鬱皆屬

干痰喘氣端

哮症宜鳩肺氣雖用麻黃而不

不出汗本草未載赤黑斑毒得再汗非便閉亦不可

下只宜清解其熱

毒風癰瘍皮肉不仁赤腫痛水腫風腫過劑則汗多亡陽

夏月禁用

汗者心之液過汗則心血爲之動搖乃驕悍之劑丹溪以人參黃同用亦攻補法也東垣曰十劑曰輕可去實葛根麻

諸家皆

以麻黃

桂枝爲

肺經藥

謂陽寒

傳手者

傳足不

誤也

肝桂能平

黃之屬是也邪客皮毛腠理閉拒營衛不行故謂之實二藥輕清故可去之時珍曰麻黃太陽經藥兼入肺經肺主皮毛葛根陽明經藥兼入脾經脾主肌肉二藥皆輕揚發散而所入不同王好古曰麻黃治衛實桂枝治衛虛雖皆太陽經藥其實營衛藥也心主營爲而肺主衛爲氣故麻黃爲手太陰肺之劑桂枝爲手少陰心之劑時珍曰仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝未有究其精微者津液爲汗汗卽血也在營則爲而在衛則爲汗寒傷營營血內滯不能外通于衛衛氣閉固津液不行故無汗發熱而惡寒風傷衛衛氣外滯不能內護于營營氣虛弱津液不固故有汗發熱而惡風然風寒皆由皮毛而入皮毛肺之合也蓋皮毛外閉則邪熱內攻故用麻黃甘草同桂枝引出營分之邪達之肌表佐以杏仁潤肺而和氣汗後煎大熟而瑞者加石膏活人書夏至後加石膏知母皆泄肺火之藥是麻黃湯雖太陽發汗重劑實散肺輕火鬱之藥腠理不密則津液外泄而肺氣虛虛則補其母故用桂枝同甘草外散風邪以救表內伐肝木以防肺佐以芍藥泄木而固肺使以薑棗行脾之津液而和營衛下後微喘者加厚朴杏仁以利肺氣也汗後脉沉遲者加人參以益肺氣也活人書加黃芩爲陽旦陽以瀉肺熱也是桂枝湯雖太陽解肌輕劑口爲理肺改肺之藥也

發汗用莖葉節煮一升沸取去浮沫或用醋湯略泡晒乾備用亦有用蜜炒者

庶免

止汗用根節

無時出汗爲

自汗屬陽虛

夢中出汗爲盜汗屬陰虛用麻黃根蛤粉粟米等分爲末袋盛撲之佳

時珍曰麻黃發汗駛不能禦根節止汗效如影嚮物理不可測如此自

汗有風濕傷風風溫氣虛血虛脾虛陰虛冒熱痰飲中暑亡陽柔痓等症皆可加用蓋其性能行周身肌表引諸藥至衛分而固腠理○汗雖爲心液然五臟亦各有汗經曰飲食飽甚汗出于胃驚而奪精汗出于心持重遠行汗出于賁疾走恐懼汗出于肝搖體勞苦汗出于脾厚于心持重遠行汗出于賁疾走恐懼汗出于肝搖體勞苦汗出于脾厚

## 朴白微爲復宗夷薑



辛苦而溫芳香而散入肝經氣分兼行血分其性升

浮能發

又云止冷汗虛汗

散風濕清頭目利咽喉治癰瘍

頭痛風口噤身強項道口面喎邪目中黑花其氣

氣香入肺

通利血脉治吐衄腸風崩中血痢瘧風血運

濕散能助脾消食

人迎脉氣香

利血脉治吐衄腸風崩中血痢瘧風血運

去血過多腹內空虛則自生風故常有崩漏之患不待外風襲之也間

芥最能散血中之風寒咤愈風散荆芥三錢微煖爲末豆淋酒調服或

章便服諸家云甚妙

寒瘞瘡腫清熱散瘀破結解毒

結散熱清則

爲風病血病瘡

李士材曰風在皮裏膜外刑外主之非若防風能入骨肉也。治癲癇在于頭而藥用山梔乾薑地榆櫻殼五味脂等貨應炒黑者以黑勝紅也。反

魚鱗肉

**通鑑**



貴似萬石房有辨賀人心故入于小吟

心心包氣分瀉火兼除手足陽明一魚主陽明平大系陽

四  
集

大陽明平陽

氣分濕熱者半血心氣又營氣壅遏衛氣引水通經絡止痛消腫排膿者皆結者收之凡腫而痛者爲實邪腫而不痛爲虛邪腫而赤者爲結熱種而不赤爲留氣停淤

爲十二經卷之三

經曰諸病痛  
瘧皆屬心火

— 7 —

紫蘇

官發表



**味辛入氣分**色紫入血分  
**香溫散寒通心利肺開竅**  
**益脾入胃發汗解肌和血下氣寬中消痰祛風定喘**

**益脾氣香薷解肌和血下氣寬中消痰祛風定驚**

**益脾氣香薷解肌和血下氣寬中消痰祛風定驚**

止癩安胎利大小腸解氣多服洪大氣

時珍曰同陳皮砂仁行氣安胎清熱香烏藥溫

中止癩回音附麻黃發熱解脫同芍藥當歸和血散血同桔梗枳殼利

膈實腸同橘子杏仁消戾定喘同木瓜厚朴散溫解暑治霍亂脚弱

氣管良宜橘皮忌魚魚子與葉同功潤心肺尤能下氣定喘

止嗽消痰利肺宣腸同川芎芩有蘇子順氣安胎子降氣

順氣安胎子降氣開鬱消瘀定喘表弱少火研用

氣虛者忌用葉腸滑氣虛者忌用子

治風散寒能清本經溫益休

溫而川涼也

汗能發汗搜肝氣而

即能散寒能清利頭目治頭痛頭風中風卷舌

燉喉口氣諸毒舌苔

含水

耳咽喉口齒諸病而散

辛香通

風寒瘧瘧癰瘍瘻瘍疥癬凡小兒治驚癇俱宜薄荷湯調

薰蒸破血止痢能治血利

血痢病在

凝滯辛能通人不寢多服能發汗疎表夏月

除瘧氣之首是薄荷茶

蒿  
性宜散  
熱



即能散寒能清利頭目治頭痛頭風中風卷舌

含水

耳咽喉口齒諸病而散

辛香通

風寒瘧瘧癰瘍瘻瘍疥癬凡小兒治驚癇俱宜薄荷湯調

薰蒸破血止痢能治血利

血痢病在

凝滯辛能通人不寢多服能發汗疎表夏月

除瘧氣之首是薄荷茶

芥

佳末一  
每丸各

水蘇二名

龍腦薄荷

輕宣散

熱理血

木贼

輕發汗

退自翳

浮萍

輕發汗

利濕

## 崩諸血病

辛而微溫清肺下氣理血辟惡而消穀治頭風冒眩  
肺癆盜痢吐衄崩淋臘口鼻利熱諸病局方有龍  
舌草根蘇葉而微長密齒面皴氣甚辛烈  
濕甚中寒經揚麻黃同形性亦能發汗解肌  
升散輕浮入肺經達皮膚能發揚邪汗發汗甚于麻  
黃生瘡潰瘍服揚汗生于水又能下水氣利小便治  
退翳膜乃肝邪鬱遏不能止通于目益痛脫肛腸風痔瘻  
瘀



一切風濕癱瘓浮沫一味蜜丸酒服治三十六種 燻辟蚊 蘑者

風膿煮汁浴治惡疾瘡癰遍身

良

聾子

一名莫  
耳卽詩  
卷耳

輕發汗  
散風濕



甘苦生溫善發汗散風濕上通腦項下行足膝外達

皮膚治頭痛目暗齒痛頭痛腰痙攣瘧瘧采根

葉熟名萬應膏遍身癩癬作浴去刺酒拌蒸猪肉聖醫方云

葉搗汁治  
產後病

大麻

且祛風



辛溫入肝經分益氣強陰通血脉強筋力疎瘀氣  
治諸風眩豆方頭旋眼黑語言不流風濕頭瘡者車兒

者風眩掉舌屬用木用肝不能榮筋故見則症  
惟知天麻人厥陰而治諸疾用氣和平諸疾自瘳

風葉能燥血故也帛按風葉中真兼養血

血夜長少之草風

血血行風自滅

相對方名亦有風不動無風反推符定

# 風寒明證清音在涼紙包煨熟切片酒浸一宿精神

龜

且去寒



去燥濕散風寒腸胃之熱益肝胆之氣養血榮筋

風藥中潤劑治風寒濕證經曰風寒濕三氣雜至合散藥中補劑治風寒濕而爲痺風勝爲行痺寒勝

爲痛痺濕勝爲着痺寒在于骨則體重在脉則

血澗在筋則拘攣在肉則不仁在皮則寒通身攣

急築筋筋勞煩熱時珍曰手足陽明經藥兼入肝胆陽明有濕則手足

熱秦艽柴胡各一兩甘草五錢爲末每服三錢治小兒骨蒸潮熱

食減瘦弱秦艽炙甘草各一兩每服一二錢錢乙加薄荷五錢

癭

酒毒腸風瘍口噤牙痛齒下龈屬手陽明大腸經張潔古經風濕濕勝風溼

之症利大小便平乳點服兼治形作雞紋相交長大黃白芷蓼蕷

葛蘋爲健乳

薑

去風



薑辛生寒熟溫治肝腎風氣四肢麻痺筋骨冷痛腰  
膝無力風濕瘡瘍若疼痛由脾胃兩虛陰血不足不  
由風濕而得者忌服風藥能燥血江東人呼薑爲豨莶

草似薑

唐成訥有進豨莶表宋張詠進豨莶表云其草金陵銀練素華紫蕤對節而生頗同薑耳臣嘗百服眼目

清明卽至下服翳髮烏黑筋力輕健効驗多端以五月五日六月六日七月七日九月九日採

蕘佳去粗葉

不計多少花蜜酒拌蒸晒九次蜜丸甚益元氣豨莶辛苦氣寒故必

蒸晒九次加以酒蜜則苦寒之陰濁盡去而清香之美味見矣數不至九陰濁未盡則不能透骨搜風而却病也

搗汁熬膏以

甘草生地黃白蜜三味收之酒調服尤妙

辛溫氣微泄水本草苦元素甘氣溫屬其性善走能宣疏

行氣

靈石



生藏苗于十二月至正月或取根頭切片用甘草蜜煎流

之間腫屬濕痛屬熱汗多屬風麻屬氣虛水屬寒死血十指脉木亦

是胃中有濕痰死血脾主四肢故也痛風當分新久新痛屬寒宜辛溫藥久痛屬熱宜清涼藥河間所謂暴病非熱久病非寒是也大法宜順氣清痰搜風散濕養而去瘀爲要威靈仙傳曰一人手足不遂數十年遇新羅僧曰得一藥可治人山後復求之乃威靈仙也服之而愈

瘡瘍積聚痰水宿膿黃疽浮腫大小腸秘風濕痰氣一切冷痛性極快利積痔不瘻者服之有捷效然疏泄二氣弱者慎用和砂仁砂糖蘸煎治諸骨硬根鬚數百條長者二尺餘色深黑名鐵脚威靈仙是茗酒湯

### 釣藤鈎

宜除風  
熱驚



口胆三焦心包  
余相火散行于

有利類釣藤細多鈎者良功加倍純用鈎其斧刃  
胎風發癰瘍主肝風相火之病風靜火息則諸瘍皆  
微苦寒除熱平肝風治大人頭旋目眩小兒驚  
帝憲症音熾縱筋急而縮爲之筋緩而弛爲癰  
呻吟痛伸三不已爲瘛從俗謂之搐搦是也

學宜去風

溼

歸

補血潤燥滑腸



權曰不  
入湯



葉如石榴而短厚莖

辛苦微溫有小毒治風溫拘攣痙攣時珍曰古方治治風痙有茵芋酒治瘧後風有茵芋膏風濕諸症多用之茵芋石南莽草皆治風妙品近世罕知莽草辛寒有毒治頭風癲腫乳癰癩瘕蘇頌曰古方風濕諸病多用之今人取葉煎湯熱含治牙蟲疾庫甚効甄

甘溫和血辛溫散內寒苦溫助心散寒

諸血屬心  
凡通脈者

必先補心當歸苦溫助心八心肝脾心生血肝藏爲血中之氣藥治虛寒熱欬逆上氣血和則氣降

溫瘧肝邪澼痢

頭痛腰痛心腹諸痛

散寒  
和血

風痙無汗

痙音擎上聲身  
強項直角弓反

張口瘡無汗爲剛痙有汗爲柔痙當歸辛散風溫和血萎瘦筋骨

產後亦有發痙者以脫血無以養筋也宜十全大補湯瘀痙瘀緩緩足不任地曰痿風寒濕客于肌肉血脉曰痹血凝氣聚推筋骨按之堅硬曰癥雖堅硬而聚散無常曰瘕尚未至癥也癥瘕瘡瘍衛脈

爲病氣逆裏急帶脉爲病腹痛腰溶溶如坐水中

衝脉起于腎下出于氣街挾脐上行至胸

中上頸頸滲諸陽灌諸經下行入足三陰灌諸絡爲之十二經脈之海主血帶脈橫圍于腰如束帶總約諸脉及婦人諸不足

一切血症陰虛而陽無所附者潤腸潤皮膚養血生肌

血旺則非

止痛止血和則然滑大川瀉者是用當歸爲君白芍爲臣地黃爲佐芎芍

以人參黃耆血熱佐以條芩梔連而積佐以大黃牽牛是按血屬陰四物能養陰降得其養則血自生非四物能生血也若氣虛血弱之人當

用人參取陽旺主陰之義多有過服四物陰滯之藥而反致害者

伏氣血各有所歸故名

血滯能通血虛能補

血枯能潤血亂能撫蓋其辛溫能行氣分使氣調而血和也東垣曰頭止血而上行身養血而中守尾破血而下流全活血而不起雷敷海藏並云頭破血時珍曰治上用頭治中用川芎方剛善攻秦產力柔善補身治下用尾通治全用一定之理也

川芎

剛善攻秦產力柔善補

以秦產頭圓尾多肥潤氣香者良名馬尾當尾粗堅枯者名鐵頭當

歸只宜發散用治血酒製有炮製昂按當歸非治瘀藥姜製亦驗說耳良薑清海藻生

本草綱目

卷

高第

補血潤燥宜行氣搜風

薑懶濕麪



苦溫升浮爲少陽引經

至胆

入手足厥陰氣分

肝

心包

血中氣藥助清陽而開

平丹溪曰氣升則鬱自降

潤肝燥而補肝虛

肝以鳴爲補所謂辛

以散之辛以補之

上行頭目下

行血海

衝

搜風散瘀止痛

調經治風溼在頭血虛頭

痛

能引血下行頭痛必用之加各引經藥太陽羌活陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮少陰細辛麻陰吳茱萸丹溪曰諸經氣鬱亦能頭痛

皆屬

及瘡瘍瘡瘍

愚從六府生疽從五臟生皆陰陽相滯而成氣爲陽

肝木

此爲陰血行脈中氣行脈外相並周流寒濕搏之則

疑滯而行遲爲不及火熱搏之則沸騰而行速爲太過氣鬱邪人血中

爲陰滯于陽血鬱邪人氣中爲陽滯于陰致生惡毒然百病皆由此起

也芎歸能和血

行氣而通陰陽

男婦

一切血症然香蜜辛散能起泄寒氣單服令

川椒勝風氣營濕濡血痢寒瘲角癩目淚多涕熱風水爲病血鬱眩掉

行氣而通陰陽

也芎歸能和血

及瘡瘍瘍瘍

此從六府生疽從五臟生皆陰陽相滯而成氣爲陽

肝木

此爲陰血行脈中氣行脈外相並周流寒濕搏之則

疑滯而行遲爲不及火熱搏之則沸騰而行速爲太過氣鬱邪人血中

爲陰滯于陽血鬱邪人氣中爲陽滯于陰致生惡毒然百病皆由此起

也芎歸能和血

人參

單服則臟有偏勝久服則過虧生羽故有此失皆有配合節制

柏濟以行血藥之滯日川芎辛散

竈能生血者平治法云驗胎法婦人過經三月用川芎米空心熱湯調一匙服腹中微動者是胎不動者是

閉經

畢產爲川芎秦產爲西芎江南爲無芎以川芎大塊裏白不油辛

甘者勝白芷爲使畏黃連硝石消石惡草着山茱萸

烏

補血鴉  
肝適效



桂枝收寒入肝脾血分爲手足太陰之經藥牌酒川

火

酸斂肝以斂安脾肺固腠理肺主皮至脾主肌肉安上旺能主金則肺安

脾和肺安則腠理固矣

收火

散惡血利小便

斂陰生津小便自緩中止痛

東垣

曰經

曰損其肝者緩

其中卽調血也

益氣除煩斂汗安胎補勞

退熱治癰瘍後重

能除胃寒

月中溼熱月

虛病

瀉痢但太陰病不可缺此寒瀉冷痛忌用虞

天民曰白芍不惟

能行氣古方治腹痛用白芍四錢甘艸三錢名芍藥

天民名  
白芍

本草

芍藥 白芍

卷二十八

連枯血

虛腹痛

餘痛不

治以其

酸寒收

斂無溫

散之功

甘草湯益腹痛因營氣不從逆于內裏白芍能行營氣  
甘草能欬逆氣又痛爲肝木克脾土白芍能伐肝故也 心癢腸痛肝胆  
二經往來之道其火上冲則胃脘痛 横行則兩脇痛白芍能理中寫肝 脾長喘噫嗳同痘瘡痘瘡其收除之  
體又能入血海 血脈爲血海男女皆有之而至厥陰肝經治鼻血目衄 目澁肝血  
不足退火滋陰培人胎產及一切血病又曰產後急用 丹溪曰以其酸  
肝血自足女人胎產及一切血病又曰產後急用 寒伐生發之氣  
也必不得已酒炒用之可耳時珍曰產後肝血已虛不可更瀉也寇氏  
曰減芍藥以避中寒微寒如芍藥古人猶諱諱吉戒况大苦大寒可肆  
行而草之忌耶○同白朮補脾同參耆補氣同歸地補血同芎藭寫  
肝同甘草止腹痛同黃連止瀉利同防風發痘症同薑棗溫經散濕

大芍藥去治略同尤能瀉肝火散惡血治腹痛堅積血痞瘕痕引聚外  
腹內經閉腸風瘡腫目赤皆散瀉白朮而收亦散而瀉白益脾能于土  
爲假經閉腸風瘡腫目赤之功

入藥酉炒用制其婦人血分醋炒下廁後重不炒恐性硝石斛根醋用  
入藥酉炒用制其婦人血分醋炒下廁後重不炒恐性硝石斛根醋用

# 小兒反藜膚

生地黃  
大瀉火



甘苦大寒入心腎瀉內火不服爲內火心與小腸相表裏導赤散與木通同用  
清燥金胃大腸火消瘀通經平者血逆治吐血鼻血者血  
隨唾出咯血者隨痰咯出或帶血絲出腎經及肺經  
目兩脣逆上吐山者屬肝經動血者血益于腦從鼻  
而出咳血者咳出痰內有血兼屬肺經吐出衄出成盆成碗者屬胃經  
經漏不止曰崩血熱則妄行宜以此涼之虛人忌用用乾地黃可也  
傷寒陽強症大熱症用之甚多服損胃 生掘鮮者搗汁飲之或  
用酒製則不傷胃生則寒乾則辛熟則溫故分爲三條

甘苦而寒沉陰而降入手足少陰心包腎厥陰心包

太陽經腸小陰退陽生血涼血治血虛發熱經曰陰

勞傷咳嗽咳嗽陰虛者地黃丸爲要藥亦能除痰  
丹溪曰久病陰火上升津液生痰不生

乾地黃  
補陰涼  
血



血宜補血以制

有觸而心動曰驚無驚而自動曰悸卽怔忡

相火其疾自除

症

驚悸也有因心虛火動者有因肝虛胆怯者有因

水停心下者火畏水故悸也

地黃能止

火

尿

交心腎而益肝脾亦能行水故治之

血

由心腎氣結或憂思房

勞所致多屬虛寒

不可耑竹熱治

血運月中搏謂之崩

足下熱痛折跌絕筋

生地一斤

槽一斤生薑四兩炒熟罨傷折處冷則易之

又生地汁三升酒升半煮服下撲損瘀血

填骨髓長肌肉利大小便

調經安胎又能殺虫忌用鹽本草綱目丹溪云氣病補

血雖不中病亦無害也不知血藥屬陰其性疑滯若冒虛氣弱之人過

服歸地等劑反到痞悶飲食減少變症百出至死不悟豈不惜哉大抵

血虛固不可耑補其氣而氣虛亦不可徒補其血也凡勞病陽虛

宜四君補氣陰虛以四物補血陰陽俱虛者宜合用名八珍湯

浙生者南方陽氣力微北方生者純陰力大以懷慶肥大菊花心者良

酒製則上行外行蔓製則不泥膈惡食無羨氣涼根銅鐵器

得酒門冬內皮當歸良

江

得酒門冬內皮當歸良

# 熟地黃

平補肝腎  
養血滋陰



甘而微溫入手足陰經，益水補氣陰，治目  
翳生精血，聰耳明目。耳爲腎竅，目爲肝竅。目得血而能視，耳得血而能聽。

引丹溪曰：熟地黃，前當產後火補氣血一語，誠至當不易之論。後人不善用之，以是風寒未解，瘀血未盡，妄施峻補，反致大害。首不可不察。王穎云：男子多陰虛宜熟地黃，女子多血熱宜生地。

以好酒拌砂仁末浸

熟地黃九次用

地黃性寒，消火與火，則溫性泥得砂仁，則和氣具能引人丹田六味丸用之，爲君。尺脉弱者，加桂附所謂辛水之原，以消陰弱也。尺脉旺者，加知柏，所謂壯水之主，以制陽光也。

# 何首烏

平補肝腎  
濡精



苦堅腎溫補肝，甘益血，濟收斂，精氣添精益髓，養血

治風先治血，血活則風散。強筋骨，烏髮，故名。令人有子。

滋補真氣，血太和則勞瘦，風虛崩帶，瘡瘍，癩瘻。

腫者病自己

營血調則隨腫消亦止惡瘧益陰補肝膽疾要藥而本草者外科呻爲瘡毒

功在此黃天一不言治瘡時珍曰不寒不燥

冬諸藥之上一

有赤白二種夜則藤交一名交棘有陰陽文合之象赤

雖入血分白雖入氣分以大如拳五瓣者長三百李者大如桔核服之

成也懷風使赤白管牛泔浸竹刀刮皮切片用黑豆與首烏拌勻鋪柳

紙入砂鍋九蒸九晒用茯苓爲使忌諸血無鱗鰭來煎赤鐵告

唐時名有何

首烏者祖名能嗣父名延秀能嗣

五十八尚無妻子服此藥七日而思人道娶妻連生數子延秀服之壽百六十歲

髮猶烏黑李邦爲立可首烏傳然流傳雖久服者尚少明嘉靖初方士

邵應節進七寶美髯丹世宗服之連生皇子遂盛行十世方用赤白首

烏各一斤黑豆并九蒸酒洗茶半斤乳拌當歸枸杞菟絲各半動俱酒

室九並忌鐵器忌按地黃何首烏皆君藥也故六味凡以地黃爲君七

寶丹以何首烏爲君各有配合味可同類而其施也卽有加減當各依

本方暗病而施損益今人多以何首烏加入地黃丸中合兩

方而爲一方是一弊二君安所適從乎失製方之本義也