



景岳全書卷之六十四春集

外科鈐古方

會稽 張介賓 曾卿著  
會稽 魯超 謙菴訂

# 外科

仙方活命飲一 治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者卽潰此止痛消毒之聖藥也

川山甲

蛤粉炒黃

白芷

防風

天花粉

赤芍藥

歸尾

乳香

沒藥

貝母

皂刺

甘草

蜜炙一錢金銀花

陳皮 各二錢

酒一碗煎數沸溫服

托裏消毒散 二錢

治瘡疽元氣虛弱或行攻伐不能潰散服之

未成卽消已成卽潰腐肉卽去新肉卽生若腐肉旣潰而新肉不能收斂屬氣虛者四君子湯爲主屬血虛者四物湯爲主氣血俱虛者十全大補湯爲主並忌寒涼消毒之劑

人參

隨證增減

黃芪

鹽水拌炒

當歸

川芎

芍藥

炒

白朮

炒

茯苓

錢各一

金銀花

白芷

各七分

甘草

連翹

各五分

右水煎服○陳氏托裏消毒散內多陳皮方在痘瘡○  
秘方托裏散三治一切瘡毒始終常服不致內陷

瓜蔞

大者一固朴

當歸

酒拌

黃芪

鹽水炒

白芍藥

甘草

各一兩半

熟地

天花粉

金銀花

皂刺

炒各一兩

右每用藥五兩以無灰酒五茶鍾入磁器內厚紙封口再用油紙重封置湯鍋內蓋煮至藥香取出分服直至瘡愈○立

齊曰此方藥品平易消毒之功甚大且不動臟腑不傷血氣  
不問陰陽腫潰屢用屢效真仙方也常治發背腦疽勢盛者  
更用隔蔬灸之若脈沉實大小便秘者先用疎通而後用此  
其功甚捷若火毒已退不作膿或不潰者更宜托裏潰而不  
欬及膿清者用峻補

神功托裏散

四

一名金銀花散○治癰疽發背腸癰乳癰及

一切腫毒或欬痛憎寒壯熱

金銀花

黃芪

當歸

甘草等分

右用酒水各一鐘煎至一鍾分病上下食前食後服之少項  
再服一劑相敷患處不間老少虛實皆可服若爲末酒調服  
尤妙

參芪托裏散

五

治瘡瘍氣血俱虛不能起發或腐潰不能收

欬及惡寒發熱者

人參

氣虛多用之

黃芪

炒

白术

炒

當歸

熟地

芍藥

酒炒

茯苓

陳皮

各一錢

右水煎服

參芪內托散六方在痘疹七

治癰疽膿毒不化及潰後作痛

托裏養營湯

七錢

治瘰疬沉注及一切癰疽不足之證不作膿

或不潰或潰後發熱或惡寒肌肉消瘦飲食不思睡臥不寧

盜汗不止

人參

黃芪

炙

當歸

酒拌

川芎

芍藥

炒

白术

炒各一錢

熟地

二錢

五味子

炒研

麥冬

甘草

分各五

水二鍾薑三片棗一枚煎七分食遠服

托裏黃芪湯八

治癰疽氣虛作渴甚效

黃芪蜜炒六錢

甘草

天花粉各一錢

水二鐘煎八分頻服之○加人參一錢亦可○若氣血俱虛  
膿血大泄而作渴或兼發熱者宜用托裏養營湯

內補黃芪湯九 治癰毒內虛毒不起化及潰後諸虛迭見

黃芪炙

麥冬兩

人參

熟地

茯苓

甘草炙各七分

白芍藥

當歸

川芎

遠志

官桂各五分

右每服一兩薑棗水煎服

托裏當歸湯十

治潰瘍氣血俱虛或晡熱內熱寒熱往來或

婦人諸瘡經候不調小便頻數大便不實等證但瘡瘍氣血  
虛而發熱者皆宜服之久服亦收欵瘡口

人參

黃芪

當歸

熟地

川芎

芍藥各一錢

柴胡

甘草各五分

右水煎服

托裏健中湯十一 治瘡瘍元氣素虛或因涼藥傷胃飲食少  
思或作嘔瀉等證

人參 白术

茯苓各二錢

半夏

炮薑

各一錢

黃芪半錢

炙甘草五分

肉桂三分

右薑棗水煎服

托裏溫中湯十二 治瘡瘍膿竇元氣虛寒或因討伐胃氣脫

陷腸鳴腹痛大便溏泄神思昏憤此寒變內陷緩則不治

附子

炮去皮二錢

乾薑炒三錢

益志

丁香

羌活

沉香

木香

茴香

陳皮

各一錢

炙甘草二錢

右薑水煎服

托裏益中湯十三

治中氣虛弱飲食少或瘡不消散或潰

或瘡不消散或潰

而不歛

人參

白朮

茯苓

炮薑

陳皮

半夏

各一錢

木香

炙甘草

各五分

右薑棗水煎服

托裏溫經湯

十四

治瘡瘍寒癟皮毛鬱遏經絡不得伸越熱

伏營中聚結赤腫作痛惡寒發熱或痛引肢體若頭面腫痛

焮甚仍宜砭之

麻黃

升麻

防風

乾葛

白芷

人參

當歸

芍藥

甘草

蒼朮

各一錢

右水二鍾煎一鍾服臥煖處得汗乃散○或加柴胡

托裏益黃湯

十五

治脾土虛寒水反侮土以致飲食少思或

嘔吐泄瀉等證

人參

白术

茯苓

陳皮

半夏錢一

炮薑

丁香

炙甘草各五分

右薑棗水煎服

托裏清中湯十六

治脾胃虛弱痰氣不清飲食少思等證

人參

白术

茯苓

陳皮錢一

半夏八分

桔梗七分

甘草五分

右薑棗水煎服

托裏抑青湯十七

治肝木侮脾脾土虛弱以致飲食少思或  
胸膈不利等證

人參

白术

茯苓

半夏

陳皮錢一

芍藥

柴胡

甘草錢五分

右薑棗水煎服

托裏營衛湯十八

治瘡瘍外無欬壅內便調和乃邪在經絡

也宜用此藥

人參

黃芪

當歸

甘草

紅花

柴胡

連翹

蒼朮

米泔  
煎炒

羌活

防風

黃芩

各一錢

桂枝

七分

右酒水煎服

托裏越鞠湯十九

治六鬱所傷脾胃虛弱飲食少思等證

人參

白朮

各二錢

陳皮

半夏

各一錢

山梔

川芎

香附

蒼朮

各七分

炙甘草五分

右葛棗水煎服

定痛托裏散二十

治瘡瘍血虛疼痛之聖藥也

粟殼

去蒂炒二錢

當歸

酒拌

白芍藥

炒一錢

川芎

錢半

乳香

沒藥

肉桂

各一錢

右薑棗水煎服

內托復煎散 二治瘡瘍在外其脉多浮邪勝必侵於  
內宜用此托之

人參

白术炒

當歸

黃芪鹽水炒

芍藥炒

茯苓

甘草炙

地骨皮

肉桂

防已酒炒

黃芩各一錢

防風二錢

右先以蒼术一斤水五升煎去

水入藥再煎至二升終日飲

之

內托羌活湯 二治臂癱堅硬

腫痛兩尺脉緊無力

羌活

黃柏各一錢

防風

當歸尾

藁本

肉桂各一錢

連翹

白术米泔浸炒

陳皮各五分

黃芪監水炒

錢半

水酒各一鍾煎八分食前服

內寒散二三 治陰虛陽邪湊襲患腫或潰而不斂或風寒驚  
於患處血氣不能運行久不能愈遂成漏證

附子童便  
浸炮

肉桂去皮

赤小豆

炙甘草

黃芪鹽水  
炒

當歸酒拌

茯苓

白芷

桔梗炒

川芎

人參

遠志去骨

厚樸制各  
一兩

防風四錢

丸亦可

沖和湯二四 治瘡屬半陰半陽似潰非潰似腫非腫此因元  
氣虛弱失於補托所致

人參

陳皮各二  
錢

黃芪

白朮

當歸

白芷各一  
錢半

茯苓

川芎

皂角刺炒

乳香

沒藥

金銀花

甘草節錢一

右水酒各半煎服

神效酒煎散二五

治一切瘡瘍能托毒散毒其效如神

人參

沒藥

另研

當歸尾

各一

甘草三錢

括蔞

生半個半炒

右以酒三碗煎二碗分四服○或以爲末酒糊丸桐子大每服五十丸用酒下善消毒活血

人參黃芪湯二六

治潰瘍飲食少思無睡發熱

人參

白朮

芥子

麥冬

陳皮

當歸

升麻

各五

黃芪一錢

黃柏

炒四分

右火前服

黃芪人參湯二七

治潰瘍虛熱無睡少食或穢氣所觸作痛

黃芪

鹽水炒  
二錢

人參

白术

蒼术

米泔水浸炒

當歸

酒拌

麥門冬

五味子

炒敲各一錢

甘草

炙

升麻

神曲

炒

陳皮

各五分

黃柏

酒炒三分

水二鐘薑三片棗一枚煎服

炙建中湯

二八

內托癰疽諸毒

黃芪

蜜炙

肉桂

各三兩

甘草

二兩

白芍藥

六兩

右每服一兩薑棗水煎服

參术補脾湯

二九

治肺疽脾氣虧損久欬吐膿或中滿不食

必服此藥補脾土以生肺金否則不治

人參

白术

各二錢

黃芪

二錢半

茯苓

桔梗

八分

炙甘草

五分

右薑棗水煎服

參芪補肺湯三十

治肺證欬喘短氣或腎水不足虛火上炎

痰涎壅盛或吐膿血發熱作渴小便短澁

人參

黃芪

白朮

當歸

陳皮

茯苓錢各一

山藥

山茱萸錢二

五味子

炙甘草錢各一

熟地

黃半錢

麥門冬

牡丹皮分八

右薑棗水煎服

益氣養營湯三一

治懷抱抑鬱或氣血損傷四肢頸項等處

患腫不問軟硬赤白腫痛或日晡發熱或潰而不斂

人參

黃芪鹽水炒

當歸

川芎

熟地

芍藥炒

貝母

香附

茯苓

陳皮錢各一

白朮二錢

柴胡六分

甘草

桔梗分五

右薑水煎服○口乾加五味子麥門冬、往來寒熱加軟柴胡  
地骨皮、膿清加人參黃芪、膿多加川芎當歸、膿不止加人參  
黃芪當歸、肌肉遲生加白芍官桂

補陰八珍湯

三二

治癩瘻等瘡足

三陰虛者

人參

白术

茯苓

甘草

當歸

川芎

熟地

芍藥

黃柏

知母

酒炒各七分

右水煎服

參术薑附湯

三三

治瘡瘻真陽虧損或誤行汗下或膿血出

多失於補托以致上氣喘急自汗溢汗氣短頭暉泄瀉

人參

附子

炮去皮臍一兩

乾薑

炮

白术

各五錢

右作二劑水煎服

附子理中湯

三四

治瘡瘻脾胃虛寒或誤行攻伐手足厥冷

飲食不入或腸鳴腹痛嘔逆吐瀉

附子

人參

芍藥

炒

白芍藥

二錢

白术四錢

右水煎服

六物附子湯三五

治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利或手足浮腫

附子制

防已

桂枝

各四錢

炙甘草二錢

白术

茯苓

各三錢

桂枝

各四錢

炙甘草二錢

右作二劑水一鍾半薑三片煎一鍾食遠服

附子八物湯三八

治瘡瘍陽氣脫陷嘔吐畏寒泄瀉厥逆

附子炮

乾薑炒

白茯苓

人參

炙甘草

茯苓

肉桂一錢

白术二錢

右水煎食遠服

四物湯 三七

治脾腎虛寒瘡屬純陰或藥損元氣不腫痛不

腐潰或腹痛泄瀉嘔吐厥逆及陽氣脫陷等證

人參

白朮

黃芪

各三

乾薑

炮

附子

炮

甘草

炙各五分

陳皮

當歸

各二

柴胡

升麻

各五分

右酒水煎服如不應倍加薑附

薜加減八味丸

三八

治瘡瘍痊後及將瘡口乾渴甚或舌上

生黃或未患先渴此皆腎水枯竭不能上潤以致心火上炎  
水火不能相濟故煩躁作渴小便煩數或自濁陰痿飲食不  
多肌膚漸消或腿腫脚先瘦服此以降心火滋腎水則諸證  
頓止及治口舌生瘡不絕

熟地

八兩酒

攜膏山茱萸

各三兩

澤鴻

蒸

各四

桂心

一兩

北五味

四兩

半炒

白茯苓

牡丹皮

八兩

桂心

三兩

北五味

四兩

半炒

右爲細末入二膏加煉蜜少許丸桐子大每服六七十丸五更初言語前或空心用鹽湯送下此卽陳氏加減八味丸也

方在補陣一二三

加味地黃丸三九 治肝腎陰虛瘡毒或耳內痒癢出水或眼昏痰氣喘嗽或作渴發熱小便赤澁等證

熟地

山藥

山茱萸

白茯苓

澤瀉

牡丹皮

柴胡

北五味

各爲末等分

右將地黃搗碎酒拌濕蒸爛杵膏入諸藥和勻加煉蜜爲丸桐子大每服百丸空心白湯送下如不應用加減八味丸當歸川芎散四十 治手足少陽經血虛瘡證或風熱耳內痒痛生瘡出水或頭目不清寒熱少食或婦女經水不調胸膈不利脇腹疼痛

當歸

川芎

柴胡

白朮

芍藥

山梔

炒一錢

牡丹皮

茯苓

各八分

各八分

蔓荆子

甘草

各五分

右水煎服

加味敗毒散

四一

治足二陽經執毒流於脚根，燙赤腫痛，寒

熱如瘡，自汗，短氣大，小便不利，或無汗，惡寒，表裏邪實者，宜

之

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

人參

茯苓

枳殼

甘草

川芎

大黃

蒼朮

各一錢

水二鍾，薑三片，煎服

九味羌活湯

四二方

在散陣四四

治瘡瘍風熱鬱遏，焮腫作痛，或遍身作痛，或拘急不利及頭  
痛，惡寒，春強脈浮緊。

加味羌活湯 四三

卽前湯加金銀花 連翹用解瘡毒

白芷 胃風湯 四四

治手足陽明經氣虛風熱目麻木或牙

關緊急眼目瞤動

白芷

升麻

各二半

葛根

蒼朮

米泔炒各八分

炙甘草

當歸

各二半

草豆蔻

黃柏

去節各四分

柴胡

藁本

各二分

羌活

麻黃

去節各四分

蔓荆子

殼桑

各二分

右水煎服

葛根牛蒡湯 四五

治時毒腫痛而便利調和者

葛根

管仲

甘草

豆豉

牛蒡子

半生半炒各二錢

右水煎服

犀角地黃湯 四大

治胃火血熱妄行 吐衄或大便下血

犀角銚爲末

生地

牡丹皮

芍藥各一錢半

黃芩炒

升麻各一錢

右水前熟入犀角末服

犀角升麻湯

四七

治時毒或風熱頭面瘡痛或咽喉不利或

鬚疽痄腮等證

犀角銚爲末

升麻

防風

羌活各半錢

白芷

白附子

黃芩各一錢

甘草六分

右水前服入犀角末服

玄參升麻湯

四八

治心脾壅熱舌上生瘡或木舌重舌或連

頰兩邊腫痛或咽痛發斑並治之

元參

升麻

赤芍藥

犀角

桔梗炒

管仲

黃芩各一錢

甘草五分

水二錘煎八分入犀角末食後服

升麻黃連湯四九

治胃經熱毒腮腫作痛或發寒熱

升麻

川芎

當歸各一錢半

連翹

黃連

牛蒡子

白芷各一錢

連翹湯五十

治癰疽時毒腫痛焮腫

連翹

升麻

樸硝各一兩

玄參

芍藥

白芍

防風

射干各三錢

大黃

二錢

甘草

灸五錢

杏仁

八十個去皮尖同麪炒黃另研

右每服五七錢水煎服下惡物後服內托之類

五香連翹湯五

治腦疽癰疽時毒邪氣鬱滯不行者

乳香

木香

沉香

丁香

香附

黃芪

射干

連翹

升麻

甘草

各一

木通

獨活

桑寄生

右水煎服

復元通氣散

五二

治乳癰便毒腫痛及一切氣滯腫毒或打

撲損傷閃跌作痛及瘀氣尤效

木香

舶

上茴香 炒青皮

甘草

陳皮

白芷

貝母

去心

川山甲

各一錢

漏蘆

等分

一方有玄胡索白牽牛用炒無白芷漏蘆

右爲末每服二三錢溫酒調下

當歸散

五二

通經絡行血滯

當歸

少許

川山甲

灰炒

蒲黃

炒各半兩

辰砂

一錢

右爲末每服三錢熟酒調下如不飲酒薄荷醋湯亦可

方脉流氣飲 五四

治療癰瘍流注鬱結腫塊或走注疼痛或心

胸痞悶咽塞不利 腸腹膨脹嘔吐不食上氣喘急欬嗽痰盛

面目四肢浮腫大小便秘

當歸

川芎

芍藥炒

茯苓

黃芪灸

炙甘草

紫蘇

青皮

烏藥

半夏制

桔梗炒

枳實楚炒

枳殼楚炒

陳皮各一錢  
分五

木香

大腹皮

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

瘡科流氣飲 五五

治流注及一切恚怒氣結腫痛或胸膈痞

悶或風寒濕毒搏於經絡致成腫塊肉色不變或漫腫木悶

無頭

人參

當歸

酒拌

黃芪鹽水

炒

芍藥

官桂

厚朴制

甘草

防風

紫蘇

枳殼

烏藥

桔梗

檳榔

木香

川芎

白芷

右水煎服

陳氏獨聖散

五六錢

凡患瘡瘍皆因氣血凝滯宜服香劑蓋香能行氣通血也如瘡初作便宜以此入茶飲之

香附子 薑汁浸一宿焙乾研末

右無時以白湯調服二錢○潰後以局方小烏沉湯爲尤妙  
乳香定痛散

五七錢

治瘡毒損傷血凝氣滯壅腫拘攣筋骨疼痛

痛

乳香

沒藥

各另研

羌活

五靈脂

獨活

各三分

川芎

當歸

真綠荳粉

肉桂

白芷

白膠香

各半兩

白芷

各五分

桔梗

各七分

右爲末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼薄荷湯或酒送下  
手足損痛不能舉動加草烏五錢鹽湯送下

消毒散

五八

治乳癰吹乳並便毒如憎寒壯熱或頭痛者宜先服人參敗毒一二劑方可服此藥如無前證卽服此藥三二劑或腫不消宜服托裏散

金銀花

青皮

天花粉

柴胡

僵蚕

貝母

當歸

酒拌

白芷

各二錢

服

水二鍾煎一鍾食遠服如治便毒加大黃一二錢煨用空心

清熱消毒散

五九

治一切癰疽陽證腫痛發熱作渴

黃連

炒

山梔

炒

連翹

當歸

甘草

各一錢

川芎

各一錢

芍藥

生地

各一錢半

金銀花

二錢

右水煎服

桔黃連消毒散

六十

治腦疽背疽癰腫疼痛或麻木

黃連

炒

羌活

各一

黃芩

各五

黃柏

桔梗

藁本

防已

各五

歸尾

連翹

防風

獨活

各三

知母

生地

各四分

人參

甘草

各三分

黃芪

蘇木

陳皮

澤鴻

各二

右水煎服

連翹消毒散

六一

治癰疽實熱諸證○亦名清涼飲亦卽局

方涼膈散

連翹

一兩

梔子

大黃

錢

蒲荷葉

黃芩

各五

甘草

半兩

朴硝

二錢

右每服一兩水煎溫服

加味解毒湯 六二 治癰疽實熱大痛不止

黃芪  
鹽水炒

黃連  
炒酒

黃芩  
炒

黃柏  
炒

連翹

當歸  
酒拌各七分

甘草  
炙

白芍藥

梔子  
炒各一錢

水二鍾煎服痛即止

解毒防風湯 六三

治斑疹或痒或痛

防風

一錢

黃芪

各二錢

芍藥

地骨皮

枳殼  
炒

荆芥  
各二錢

芍藥

升麻

水煎徐徐服

陳氏解毒防風湯 六四

方在痘疹五六

治痘疹毒氣熾盛

散腫潰堅湯 六五

治療癰瘡堅硬氣血無虧宜用之

柴胡

黃芩  
各四分

白芍藥  
炒

升麻

連翹

黃柏

酒炒

蓬木

三棱

酒炒

乾葛

歸尾

各二分

知母

酒炒

龍膽草

酒炒

天花粉

桔梗

昆布

各五分

炙甘草

二分

右水煎服

瓜蔞托裏散

六分

治療瘡瘍毒盛者未成則易消已成則易潰

既潰則生肌

黃瓜蔞

一個碎

忍冬藤

乳香

各一分

蘇木

五錢

沒藥

三錢碎

甘草

二錢

右用酒三碗煎二碗空心日午臨睡分三服○或以此爲末  
酒糊丸彈子大硃砂爲衣細嚼用當歸酒送下治打撲損傷  
尤妙

萬金散

六七

一名內托散○治癰疽已潰未潰者有消毒破  
血之功

景岳全書

卷之二

大甘草節二錢

括囊

一個

沒藥研一錢

右用酒二碗煎一碗去粗後八沒藥服

製甘草湯六八

治懸癰不拘腫潰亦治癰疽

用大甘草一兩切三十長用澗水一碗浸透以慢火炙乾仍  
投前水浸透再炙至水乾爲度却挫細用無灰酒二鐘煎七  
分空心服嘗有人患此已破服而劑瘡卽合○一國老膏方  
用大甘草二斤以河水浸取漿汁去粗用銀石器熬成膏磁  
罐收貯每服一二匙酒調服或水亦可尤解丹藥之毒○一  
方治癰疽用生甘草爲末酒調服二錢連進數服自消  
梅花飲子六九 瘰疽初起服之可防毒氣內攻

川芎

乾葛

天花粉

黃芪

烏梅

甘草

蘇木略一

忍冬藤四兩

右作四劑水煎服

牛膠散七十

牛皮膠

廣中明者四兩

右用酒一碗重湯煮化加酒服至醉不能飲者加白湯

明膠飲子七

治一切癰疽瘍毒

明廣膠

蛤粉炒珠

粉甘草各二兩

橘紅五錢

右作二劑水煎服

護心散七

解金石砒硫發疽之毒

綠豆末一

兩明乳香

半兩研細

右以生甘草煎湯調時時與哩務使藥氣常在膈間

清心內固金粉散七

三

一名金花散○解毒清

心流行氣血

散滯清火丸煖腫熱痛飲食如常者大宜用之

綠豆

四兩研末

硃砂

另研

人參

甘草

白茯苓

各三兩研末

朴硝

另研

白豆蔻

各五分研

麝香

另研

雄黃各一錢

冰片五分

右爲末每服一二錢蜜湯調下

蠶礬丸七十四

名黃礬丸○治金石發疽一切癰疽托裏止

疼痛護臟腑神妙不問老少皆可服之  
黃蠶 一兩黃色佳者溶開離火入礬末○一方止用七  
錢

白礬 一兩明亮淨者研末

右二味和勻衆手急丸桐子大每服二三十九漸加至四五十丸熟水或鹽湯送下口進二三服服至三四兩之上愈見其功矣○加服金石發疽別用白礬末一兩作三五服溫酒調下尤效○有人遍身生瘡狀如蛇頭名曰蛇頭瘡危宜服之○治蛇蠍毒虫咬傷熔化熱塗傷處痛止毒出仍服兩許○此方不惟止痛生肌而已其護膜止瀉消毒化膿及肉癰

排膿托裏之功甚大

千金化毒丸七五

治諸惡毒

用白礬三錢糊丸以葱頭七莖煎湯送下則腫痛俱退再用仙方活命飲一劑以去其餘毒此本方原用礬末以葱湯調服因湯難服故易爲丸○一方土治瘡疽不問腫潰先用此藥二三服後用消毒藥甚效常治瘡疽之人用此卽退不用托裏藥亦愈若金石毒藥發疽者尤效蓋礬能解金石之毒也○一方用礬末五錢硃砂五分熟酒下亦效此藥托裏固內止瀉解毒排膿不動臟腑不傷氣血有益無損其藥易得其功甚大偏僻之處不可不知此方或重尤所傷溶化熱塗患處更以熱酒調末服皆效

五福化毒丹

七六

治咽喉牙口瘡毒腫痛並小兒一切熱毒

瘡癤驚惕煩躁口舌生瘡夜臥不寧等證

立參

桔梗

兩半

茯苓半兩

人參

牙硝

青黛

兩半

甘草七錢

麝香少許

金箔

二十片

右爲末煉蜜丸芡實大每服一丸薄荷湯化下○若痘毒上攻口齒生瘡以生地黃汁化服及用鷄翎掃付患處奪命丹七七 治疔瘡 癰背等證或麻木或嘔吐重者昏憒此藥服之不起者卽起不痛者卽痛痛甚者卽止昏憒者卽甦嘔吐者卽解未成者卽消已成者卽潰有奪命之功乃惡證中之至寶也

蟬酥

酒化

輕粉

麝香各五

枯礬

寒水石

火炮

銅線

乳香

沒藥各一錢

硃砂

三錢

蠅牛

研無亦可  
二十個另

右爲末用蠅牛或酒

糊搗丸綠豆大每服二三丸溫酒煎湯

下或用葱白三四寸病者自嚼爛吐於手心包藥在內用熱酒和葱送下如人行五七里汗出爲效重者再服一二丸或外用一丸入瘡孔內以膏藥貼之

飛龍奪命丹

七八

治一切疔瘡毒瘡出汗則愈神效

乾蟾酥

二錢乳化

沒藥

硼砂

寒水石

雄黃

各二錢

乳香

硃砂

血竭

嚼成飄者真

枯礬

各一錢

輕粉

冰片

各五分

蜈蚣

一條去頭酒浸

蠍牛

四十九個研膏或無亦可

爲

右各研爲細末取蠍牛蟾酥研勻大諸末熟杵丸綠豆大硃砂爲衣每服四五丸噙葱白一口吐在手心將藥包葱內用溫酒吞下須臾汗出或少吐瀉毒即解

立齋曰前回生丹乃慄悍攻毒之劑也蓋無經不至無氣不動者後奪命丹尚緩若食一切禽畜毒物及瘡脈浮緊細數

毒蓄在內並惡毒證凡宜汗吐者當用前丹有神效若老弱之人或瘡毒稍輕者宜用後丹或更以隔蒜灸之爲良

回生丹

七九

李願顏先生口授非泛常之藥萬寶之秘專治

一切疔毒並有神效

金脚信

明礬砂

明乳香

半夏

上紅丹

各五分

巴豆肉

油不去

明雄黃

大南星

南硼砂

各一錢

大班貓

十五個去頭足翅

右爲細末旋取蟾酥和凡麻子大研砂爲衣每服十五丸好酒下看瘡生上下食前後服能飲者至醉爲佳凡腫毒失治毒氣八腹用此藥能起死回生服藥後吐瀉俱作乃甦通氣散八十 治時毒瘡甚咽喉不利取嚏以泄其毒

玄參

半錢

牙皂

川芎

各一錢

藜蘆

五分方無此

右爲末用紙撲蘸少許入鼻內取嚏爲度。按此方止用皂角川芎北細辛三味即可亦不必藜蘆躑躅之毒品也。總不若通關散爲妙方在困陣九十八

梔子仁湯八一 方在寒陣十九

治發熱狂躁咽喉腫痛

六味梔子仁湯八二 治時毒腫痛大便秘結脉沉數

山梔炒

枳殼

大黃煨

升麻

牛蒡子炒

鬱金等分

右水煎服或爲細末每服三錢蜜水調下

清肝益營湯八三 治肝膽小腸經風熱血燥筋攣結核或耳項胸乳膀胱作痛並一切肝火之證

山梔

當歸

木瓜鐵不犯

蒺藜錢一

柴胡

芍藥炒

川芎各七

龍膽草八分

白朮二錢 熟地半錢

炙甘草五分

右薑水煎服

清心湯八四

治瘡瘍腫痛

發熱飲冷脉沉實睡語不寧右方

卽防風通聖散每料加黃連五錢

每劑用一兩水煎服方在

攻陣十六

濟陰湯八五

治瘡毒純陽 腫痛發熱

連翹二錢

山梔炒

黃芩炒

黃連炒

甘草各一錢

芍藥半錢

牡丹皮一錢

金銀花三分

水煎服○大便若秘量加大黃

地骨皮散八六 治瘡瘍氣虛內熱煩渴不寧

人參

黃芪

生地黃

地骨皮

柴胡各一錢半

白茯苓

石膏煅

知母各一錢

水薑煎服

一味苦參丸八七 治一切癰疽毒瘍瘍瘍作痛或煩躁

苦參 不拘多少爲末

右用水糊丸桐子大每服二三錢溫酒下

陳氏苦參丸

八八

治遍身搔痒癬疥瘡瘍

苦參

四兩

玄參

黃連

獨活

枳殼

防風

各二兩

大黃

梔子

菊花

各一兩

右爲末煉蜜丸桐子大食後茶酒任下三四十丸日三服

五利大黃湯

八九

治時毒癰腫赤痛煩渴便秘脈實而數

大黃

煨

黃芩

升麻

各二錢

芒硝

梔子

各一錢半

水一鍾半煎六分空心熱服

清涼飲

五十

治癰瘍熱毒熾盛大便秘結○此節前速翹消

毒散

連翹

一兩

大黃

山梔子

薄葉

黃芩

各五錢

甘草

一兩半

朴硝

二錢

右每服一兩水煎服

宣毒散

九一

治一切癰毒其功不可盡述

大黃

煨

白芷

各五錢

水二鐘煎一鐘食前服

王齋曰此方乃宣通攻毒之劑若脈沉實便秘者毒在臟也宜服之其功甚大若臟腑調和脈不實者不可用醫林集要方用大黃一斤白芷六兩爲末每服三錢執酒調下更用茶清調搽患處名曰萬金散蓋因其功而珍之也或用水跌爲丸以便於服亦可吳江申金憲兄患背疽堅硬脉沉實乃毒在內凡一服大小便下污物再服而消恐患者忽此一藥收

以此嘗驗者告之

拔毒散九二 治一切癰疽腫毒其功不可盡述

乳香

沒藥

當歸

川山甲炒

木蟹子

連翹各一錢

甘草各五分

瓜夢仁八分

牙皂炒

貝母各七分

忍冬藤二錢

大黃生熟各一錢半

右水酒各一鍾 煎一鍾食前服○此方攻毒止痛化膿之良劑也屢用屢驗 若膿成或已潰者大黃可不用恐泄其真氣則膿者難潰潰者難欬也亦有膿雖潰脉仍洪數或沉實翕冷者火邪尚在又所宜用

內疎黃連湯九三

治瘡瘍發熱而嘔大便秘結脉洪而實

黃連

芍藥

當歸

檳榔

木香

黃芩

梔子

薄荷

桔梗

甘草各一錢

連翹

大黃各一錢半

薑水煎仍量虛  
貢治之

桃仁湯

九四

逐

瘀血

桃仁

五分  
熟木

生地黃

五錢

蜜炙

去足  
炒

水蛭

炒略  
十個

右每服三錢水

一盞煎六分空心服

漏蘆湯

九五

治

胸疽癰疽毒盛實者

漏蘆

五分  
熟木

甘草

連翹

沉香

錢略  
五

大黃

微  
兩

右每服四五錢

薑棗水煎服

王金漏蘆湯

九六

治癰疽發背丹疹時行熱毒赤腫焮痛

漏蘆

黃芩

白芍

連翹

枳壳

炒

升麻

粉草

麻黃

去節

大黃

裹

朴硝

一

右每服五六

薑水煎去粗空心服下惡物爲妙

漏蘆升麻湯

九十七

治時毒頭面紅腫咽喉堵塞寒水藥不下者

臟腑素有精熱

發爲腫毒疙瘩一切紅腫惡毒

漏蘆

二錢

升麻

一錢半

黃芩

酒洗

生甘草

玄參

牛蒡子

炒研

苦梗

連翹

各一錢

藍葉

如無用青黛

大黃

酒五量輕重用之

水煎服大利之

結者加芒硝

潤腸丸

九十八

治

脾胃伏火大腸乾燥或風熱血結宜用此丸

通之若結在直腸宜用猪膽汁導之蓋腎主五液開竅於二陰若津液滋潤則大便通調若津液不足脾氣虧損必當培補乃忌此藥

桃仁

十八粒尖皮

麻子仁

各六兩

羌活

歸尾

大黃

炒

皂刺

秦艽

各五錢

右各另研爲末。燥蜜或猪膽汁丸桐子大每服三四十九丸。

湯下若用猪膽汁導而糞不結燥者須急補元氣。

沒藥丸九丸

善逐滯血

當歸一兩

桂心

芍藥各半兩

桃仁

去皮尖研

沒藥錢

生虫去足切

水蛭

炒各三十個

右爲末醋糊丸

桐子大每服三五丸空心醋湯下。

當歸丸百

行血利水通大便

當歸半兩

大黃

桂心各半兩

赤芍藥

帶蘆錢各二

人參

甘遂麥芽各半錢

煉蜜丸如彈子大空心米飲化下一丸

破桔丹百

治瘧癆熱極汗多大渴便秘膽語發狂

大黃

二兩生半錢

芒硝

甘草各二兩

右爲末煉蜜丸如彈子大每服一丸鹽酒化下白湯亦可

忍冬酒

百二

解諸癰毒

忍冬藤 鮮者四五兩若乾者止用一兩搗

大甘草節 一兩生用

二味入砂鍋內以水二鍾煎至一鍒再入無灰酒一鍒又煎不  
數沸去粗分二服病重者晝夜兩劑至大小便通利爲度另  
用忍冬藤研爛入酒少許罨患處

金銀花酒

百三

治一切癰疽發背疔瘡喉痺等證

用金銀花藤葉搗爛取汁半鍒和熟酒半鍒溫服甚者不過  
三五服可保無虞

槐花酒

百四

治癰瘍熱毒最妙

用槐花四五兩炒微黃乘熱入酒一鍒煎十餘滾去粗熟服  
未成者二三服已成者一二服但察其有熱毒未清者皆可  
用槐花治濕熱之功最爲神速惟胃寒者不宜服大抵腫毒

非用蒜灸及槐花酒先去其勢雖用托裏諸藥其效未必甚速

蒲公英酒百五

治乳癰吹乳不問已成未成皆可用

用蒲公英一握搗爛入酒半鍾取酒溫服相貼患處甚者不過三五服卽愈

遠志酒百六

能托散諸毒治女人乳癰尤效

遠志 不拘多少用米泔浸洗槌去心

右爲末每服三錢用好酒一鍾調遲少頃澄清飲之以滓敷

患處

牛膝酒

百七

治楊梅風毒腰痛

牛膝

川芎

羌活

五加皮

杜仲

甘草

地骨皮

黃仁略

生地黃

二兩

海桐皮

二兩

右咬咀用帛裹入無灰酒浸二七日夏月二十五日每服一盃  
月二五次

消瘦酒

百八

昆布

二錢

海藻

五錢

沉香

雄黃

各一錢研末

海螵蛸

二兩

右爲咀用好酒一升湯煮任意每服一二鍾或浸十餘日亦可飲

桑枝煎

百九

大治口渴

取嫩桑枝細切一升炒以水三升煎一升日服三五劑更多尤妙抱樸子云療風痺乾燥臂痛腳氣四肢拘攣上氣眩暈久服補肺消食利小便輕身耳目聰明令人光澤其功不能盡述

神仙截法

百十

治癰疽發背一切惡瘡預服則毒氣不入內

真麻油

一斤銀器內熬十數沸候冷

右用酒兩碗入油五盞通口熱服一日用盡綏則數日服之  
○吳安世云昔冢三世用之無有不效又聞獵者云凡中藥  
箭恙飲麻油藥毒卽消屢用甚驗○按右方凡大便秘結而  
毒蓄於內者最宜用之以疏通其毒若陰毒及大便不實者  
乃非所宜

砭法百一

治丹毒疔瘡紅絲走散或時毒瘀血壅盛用細磁器擊碎取  
有鋒鋸者一塊以筋一根劈開頭尖夾之用線縛定兩手指  
輕撮筋尾令磁鋸正對患處約懸寸許再另用筋一根頻擊  
筋頭令毒血遇刺皆出毒自減退若毒氣入腹膨脹者難治  
刺少商穴百十二、治咽喉急痛

穴在手大指內側去爪甲角如韭葉刺入二分許以手自臂

勤至刺處出血卽消若重而膿成者必須鉗患處否則難治

洪丞相頤鍼法

百十三

凡癰瘍勢燃毒盛血凝不散者宜用

此法以殺其勢

治癰初作先以筆管一箇人大鴟頭一條以管口對瘡頭使  
鴟吮惡血得去其毒卽散如瘡大須換三四條若吮正穴頤  
必死矣屢試屢效若血不止以藕節上泥塗之卽止若瘡頭  
未明以井邊泥塗上先乾處卽是

騎竹馬灸法

百十四

治一切瘡瘍無有不愈

其法令病人以手肘凭几而坐男左女右將手臂豎起要直  
乃用竹篾一條自臂腕中曲處橫紋間量起貼肉直上至中  
指尖盡處截斷爲則不量指甲另用竹杠一條令病人脫衣  
正身騎定前後用兩人扛起令病者脚不着地仍使人扶定  
勿令偃僂却將前量臂篾從竹杠上尾骱骨坐處直貼脊背

量至箋盡處記之此取中之處非灸穴也又用薄箋量男左  
女右手中指節兩橫紋處截爲同身寸法將此寸箋卽安前  
脊中點記處兩邊各開一寸盡處卽是灸穴各灸五七壯疽  
發於左則灸右疽發於右則灸左兩邊俱甚則左右皆灸蓋  
此穴乃心脉所過之處凡癰疽皆心火之留滯灸此則心火  
流通而毒自散矣有起死回生之功屢試屢驗

神仙隔蒜灸法

百十五

治一切癰疽瘡毒大痛或不痛或麻

木及治一疔毒氣熾盛使諸痘不能起發已起發者不能貫  
膿已貫膿者不能收鑿等證如痛者灸至不痛不痛者灸至  
痛其毒隨火而散此攻散鬱毒從治之法也大有回生之功  
其法用大蒜頭去皮切三分厚安瘡頭上用艾壯於蒜上灸  
之五壯換蒜復灸或三五十壯或一二百壯愈多愈妙未成  
者卽消已成者亦殺其大勢不十爲害如瘡大用蒜搗爛攏

患處將艾鋪上燒之蒜敗再換或陰毒紫白色不起發不痛  
不作膿者尤宜多灸仍服托裏之劑如灸後仍不痛或不作  
膿不起發者不治此氣血虛極也

附子餅百十六

治潰瘍氣血俱虛不能收斂或風寒襲之以致血氣不能運行皆令不斂用炮附子去皮臍研末以唾津和爲餅置瘍口上將艾壯於餅上灸之每曰灸數壯但令微熱勿令痛如餅乾再用唾津調和務以瘍口活潤爲度

豆豉餅百十七

治瘍瘍腫毒硬而不潰及潰而不斂並一切  
頑瘍惡瘍用江西豆豉餅爲末唾津和作餅子如錢大厚如  
三文錢置患處以及壯於餅上灸之乾則再易如灸背瘍用  
漱口水調餅覆患處以艾鋪餅上灸之如未成者卽消已成  
者亦殺其大毒如有不效必氣血虛敗也

木香餅百十八

治一切氣滯結腫或痛或閃肭及風寒所傷

作痛並效

木香 五錢 生地黃 一兩

右以木香爲末生地黃杵膏和勻量患處大小作餅置腫處以熱熨斗熨之

香附餅

百十九

治瘍瘻流注腫塊或風寒襲於經絡結腫或

痛

用香附爲末酒和量瘡毒大小作餅覆患處以熱熨斗熨之未成者內消已成者自潰若風寒濕毒宜用薑汁作餅

神效桑枝灸

百二十

治發背不起或瘀肉不潰此陽氣虛弱用桑枝燃着吹熄共焰用火炙患處片時日三五次以助腫潰若腐肉已去新肉生遲宜灸四畔其陰瘡瘻瘻流注瞞瘡惡瘡久不愈者亦宜用之大抵此法未潰則解熱毒止疼痛消瘀腫已潰則補陽

氣散餘毒生肌肉若陽證腫痛甚或重如負石初起用此法  
出毒水即內消其日久者用之雖潰亦淺且無苦楚惜患者  
不知有此治者亦不肯用此也

神效葱熨法 一二一 治流注結核骨癰鶴膝肢體腫塊或痛  
或不痛或風寒襲於經絡流注肢體筋攣骨痛或跌撲損傷  
止痛散血消腫之良法或先用隔蒜灸法而餘腫未消最宜  
用熨以助氣血而行壅滯其功甚大用葱頭細切杵爛炒熟  
敷患處冷即易之再或熱熨數次師痛即止其效如神○或  
用葱煎湯薰洗傷處亦妙○或用葱一大把取其數節切爲  
薄餅置患處用熱物熨之或鋪艾條之亦可必易餅多熨爲  
妙

神仙薰照方 一二二

一二二

雄黃

硃砂

血竭

沒藥各一

右五味研細末用綿紙捲爲粗撲約長尺許每撲中入藥三分裹定以真麻油潤透點灼瘡上須離瘡半寸許自紅暈外圈周圍徐徐照之以漸將燃收入瘡口上所謂自外而內也更須將撲猛向外提以外毒氣此是手法此藥氣從火頭上出內透瘡中則毒隨氣散自不內侵臟腑初用三條漸加至五七條瘡勢漸消可漸減之薰罷墮用後敷藥

廣陵李柱云背瘡所患惟內攻與外潰耳證屬火毒醞釀斯成不能外散勢必內攻不能中出勢必傷潰醫者往往以涼藥圍解多懼此一患又陰瘡不起發者止有隔蒜灸一治然亦未見鑿鑿取效此方初用藥撲薰以火引火毒氣外散後用藥敷圍追膿止痛毒從孔敷及瘡頂中出可免傷潰矣陰瘡一照即走紅暈狀加蒸餅變爲陽證可保無虞此其奇

中大畧也照法日每一次初次用燙一根或四根次日用四根或五根再欠漸至六七根止大率看瘡輕重酌燙多寡重者不過六七日瘡肉盡化爲膿從瘡口中陸續湧出新肉如石榴子纏繫而生此時不必再照圍藥終始如一隨瘡勢大小漸漸收入照圍後不可聽醫用膏藥貼蓋以致毒氣怫鬱止割葱葉量瘡口貼之凡照時先須用猪蹄煎湯溫清洗去圍藥如法薰照待瘡勢大愈肉生將滿始可用生肌散或護以太乙膏平復後膏藥猶不可離此其始末細微也內服者大要不出十宣散護心散等方最忌寒涼恐傷胃氣此瘡由惱怒鬱結厚味所致受病以年計愈久則愈甚也調攝之法非懲忿窒慾清散托裏治以前方卽虛扁復生有望而走耳又前方初止治背疽其後一切腫毒無不收功蓋法無定則醫貴變通神而明之存乎其人耳余不佞善病故留心方術

景由及范中翰舍初其他證亦會用以推牘皆應手取效軒  
贊其詳於此其傳則道人孫氏今大播廣陵余先慈賴以保  
安者廿年云

池陽來陽伯云王孝廉良甫爲余言廣陵人有善神燈照者  
療瘻發背神良已求得其禁方矣余識之日酉歲余客廣陵  
偶得腫比于股招所謂善療者照之不曬得愈又舘友胡舍  
素患發背大如覆盆神懵懵憤矣延瘍醫至束手待肉腐靡  
方可用膏徐長肌肉問其術曰至此間其候曰百日果如其  
說則舍素將成烏有矣遂急同弟輩求得前方刻本按法治  
之一日痛止二三日神清如脫桎梏釋重負肉腫如瓦者日  
縮而小並未嘗腐糜也不月餘膿盡爽然起矣奇矣哉不外  
而汗不針而潰不灸而陷聚不補而貢不下而毒盡凡醫人

之鉅刺不必用也至理歸於易簡大道本在目前所謂不可不思議者也古今道術入妙者皆如此類茲重刻之故爲此敘

曲梁聳雲翰云戊戌春暮余病疽東臍據背中前與心對初發微若黍粒搔之痛痒關心寒熱變作甫十日大若升再十日大若斗食逆便結匝月目不一瞬醫方所載諸死候業已十犯八九兩絕復甦自分無生手條後事偶從楊楚璞得李肖衡所傳異人指授仙方如法薰敷越二日毒漸解迺有起色不易方而竟就痊距初發凥甘旬歸家出以試人輕僅輸月重亦不出百日靡不起者蓋余所感毒極重勢極大爻治極遲卽二三內外科名家皆束手失色以爲從所未聞未見然試人則取驗更捷蓋感有輕重治有遲蚤也顧念非此異方不能起余必死異證非余起死回生不能自此方之神

異余以此方活安忍天下人以此證危因慮此方莫獲廣浦  
於天下又慮天下忽視此方而不加篤信或曾於耻功不已  
出之醫口疑似轉盼間致悞大事而每無及也因贅數語以  
爲此方之引

咸林王維英云丙午端陽日余左臂患疽其大如拳用騎竹  
馬法灸之百十壯疮起如鉢錢四圍腫覺退笥中蓄此仙方  
命製藥料欲俟破後薰之不識其初亦可薰也客有傳言可  
薰者因於當口卽薰十條瘡頂高收四圍色晝夜問毒肉從  
邊化爲爛膿徐徐內潰粘同膠鯨每日如法薰照洗貼五六  
日中尖毒肉脫落一條共有一十三孔瘡外一指許傍串三孔  
且痛且痒卽極力照之初出黃水次出爛膿後流清漿瞬息  
口收並未再串其原載敷藥長安中若不產希錢五龍二草  
止用金銀花三色敷之乾則覺痛卽去之不敷並未用生肌

散惟護以太乙膏月餘盡痊當此瘡將愈左臂又患一疽正對無二卽昭燃十條敷以麸炒醋調文蛤膏一日數更次日五條三日項破膿出不痛不痒其毒盡散同時有患別瘡者余付此藥薰之略薰卽散並未成形迺知是方也真仙方哉真仙方哉持此療瘡天下無瘡矣余恐世人但知瘡破後可照不識照初發者尤易散及恐因敷藥不全並棄前方不識敷藥不用亦可也故備述系始以神此方之用

洗藥神效散 一二三 洗陰濕諸瘡

蛇床子二兩 朴硝一兩

右每用一兩水二碗煎沸洗瘡拭乾修生肌藥

雄黃解毒散 一四 治一切癰腫潰爛毒勢甚者先用肌藥

二三次以後用猪蹄湯

雄黃一兩

白簪四兩

寒水石一兩半

右俱爲末用滾湯二三碗乘熱入藥末一兩洗患處以太乙膏或神異膏貼之

猪蹄湯一二五治一切癰疽杖瘡潰爛去惡肉潤瘡口止痛

白芷

黃芩

當歸

赤芍藥

獨活

生甘草

露蜂房

連子者佳各五錢

用猪蹄一隻水四五碗煮熟去油相取清湯入前藥一兩許煎十數沸去相溫洗惡肉隨洗而隨用膏藥貼之○按此湯不必用黃芩或以白芷易之更佳

集香散

一二六

洗癰疽潰爛

白芷

藿香

芸香

香附

防風

各三錢

木香

甘草

各一錢

右用水三碗煎數沸去粗淋洗患處

王齋曰此乃殺毒之劑也血氣聞香則行得臭則远也凡瘡

毒將盡未盡宜用之若有瘀肉宜先用雄黃解毒散解之後用此方沫後須卽用膏藥貼護勿使風入肌肉易生直至收口爲度最忌用生肌之藥

### 敷藥方

一二七

車前草

豨莶草

金銀花

五爪龍草

右四味鮮草一處搗爛加多年陳米粉卽常用搘衣者初起時仍加飛鹽少許共調爲稠糊敷瘡上中留一頂拔膿出若冬時無鮮者用乾葉爲末陳醋調敷亦可或五龍草一時難得卽單用四味亦能奏功不必拘執也○陽伯曰瘡毒初起毒盛者須內服敗毒藥敷劑其有氣血薄弱者亦須用托裏藥數劑則萬全之計耳

### 秘傳圍藥鐵井欄

一二八

敷一切惡毒卽收欵消腫神效

牛糞灰

晒乾燒灰用新磁罐盛之乾處加倍用

鐵線草

草烏

文蛤

白芨

白斂

貝母心

陳小粉

炒

各等分

極黃色

右爲末用高醋熬熱調藥如糊敷瘡凹圍中留錢孔以出毒氣乾則易之瘡勢惡甚者用飛龍奪命丹等藥出汗無不效  
大黃揭毒散一二九 敷熱壅腫毒

大黃

半兩

白芨

兩

朴硝

二兩

右爲末井水調擦乾則潤之

草烏揭毒散百三十 治一切癰疽腫毒

芙蓉葉

草烏

貝母

天花粉

南星等分

右爲末用醋調擦四圍中留頭出毒如乾用醋潤之

抑陰散

一三一

治瘡瘍元氣虛寒膿腫不消或不潰斂或筋

攀骨痛一切冷證

草烏二兩

南星

煨

赤芍藥炒

白芷

各一兩

肉桂五錢

右爲末葱湯調塗熱酒亦可

抑陽散

一三二

一名洪寶丹○治瘡屬

補陽腫痛發熱

天花粉

三兩

菖黃

白芷

赤芍藥

名一

右爲末茶湯調擦患處

陰陽散

一三三

治瘡屬半陰半陽

紫荆皮

五兩

獨活

去節炒三兩

赤芍藥

炒

白芷

石菖蒲

各二兩

右爲末葱酒調擦

神功散

一三四

諸發背癰疽及諸瘡不問腫潰皆效

黃柏

炒

草烏

炒各一兩

右爲末用漱口水調入香油少許搽患處如乾仍用水潤之

清涼救苦散

一三五

治大頭瘟腫甚者 以此藥敷之

芙蓉葉

霜桑葉

白飲

白芨

大黃

黃連

黃芩

黃柏

白芷

雄黃

芒硝

山茱萸

赤小豆

南星

金線重樓

右等分爲末蜜水調敷腫處以翎拂掃之

二黃膏

一三六

敷一切腫毒熱浮在外或時氣熱壅者

黃柏

大黃各等

右爲末用醋調傅如乾用水潤之

廻陽玉龍膏

一三七

治陰疽發背寒邪流注風濕冷痺諸脚

氣冷痛無紅赤者及跌撲所傷爲敷涼藥或人元氣虛寒腫  
不消散或不潰歎及癰腫堅硬肉色不變久而不潰潰而不  
歎或鼓雄風筋攀骨痛一切陰寒冷證第一藥也

草烏

肉桂

各五錢

薑黃

炒

有星

燶

白芷

赤芍藥

炒各一兩

右爲末葱湯或熱酒調塗

冲和膏

二三八

治一切瘡腫不甚焮熱積日不消

紫荆皮

炒二兩

獨活

去節炒三兩

赤芍藥

炒二兩

白芷

菖蒲

各二兩

右爲末葱頭煎湯調搽

麥飯石膏

二三九

治瘡疽初起先以麥飯石膏塗之俟瘡根

漸收卽敷神異膏歛之但麥飯石膏難於脩合用神異膏亦

效

白麥飯石

炭火煅醋淬數次研極細二兩○據本草所

載丸石如飯團粒粒粘結成塊者即是皆可用也

鹿角

生取帶腦骨者斷之用炭火燒烟盡研極細四兩

石用米醋調和入砂器煎以竹片不住手攪熬成膏先用猪蹄湯洗患處以鵝羽拂塗四圍乾則以醋潤之若腐爛者用布帛攤貼之○李氏曰麥飯石膏治發背癰疽神妙惜世罕知有患癰不潰而危者全用此膏一夕頓潰凡疽得膿其毒始解或有不潰者須用此膏故錄之俾精擇修合以取十全之功也嘗見世間醫者每有妙方秘而不傳或更改以惑人誠可惡也余思西華麥飯石膏守死不傳其立心私刻君子鄙之矣

黑末子

百四十

治癩毒

用羊角連內骨燒存性爲末酒調三錢分上下服之瘡可散○立齋曰此方未嘗用蓋秘方也嘗治面上或身卒得癩疽或痒或癰毒此而不治亦乃殺人以致羊角燒存性硬爲極細末以雞子清調塗之甚效水草亦云然

乳香定痛散

(一四一)

治瘡瘍潰爛拔痛不可忍諸藥不效者

乳香

沒藥

(各二錢)

寒水石

煅

滑石

(各四錢)

水片

(一分)

爲細末搽敷患處痛即止此方乳沒性溫佐以寒劑制之妙  
寒熱之痛皆妙

烏金膏

(四二)

治發背中央肉死塗之即腐未死塗之即生若初起腫痛用  
黑敷處則解毒頓消若瘀肉腐黑塗之即潰若惡瘡頑瘍元  
氣無虧久不收斂者內有毒根以紙燃熏紙其內有等發背  
因元氣虛弱或因冠伐元氣虧損毒氣散漫中竈外亦不腐  
不潰須服大補之劑中塗三四寸許至五六日間赤竈之界  
目有裂紋如刀割之狀中央漸潰漸脫內用純陽之藥以接  
其元氣庶能收斂若妄用刀鍼去肉出血則陽隨陰散元氣

愈傷或塗涼藥則毒氣不解氣血愈虛非徒無益適以害之矣○其方用巴豆去殼炒黑研爲膏點腫處或塗瘀肉上則自消化或加乳香少許亦可如塗瘡內或加香油少許調稀可用若餘毒不斂者以此綑之不致成痛

透骨丹

一四三

此潰膿藥外科不可缺

蟬酥

硼砂

輕粉

巴豆

各五錢

蝸牛

二箇

麝香

一分

右先將巴豆研如泥次入蝸牛麝香再研後入各藥研極細以小磁瓶收藏每用少許以乳汁化開先用鐵輕輕撥破毒頭挑藥米粒許納於瘡口外用清涼膏貼之

針頭散

一四四

治一切頑瘡內有膿管瘀肉或癰癧結核不化瘡口不合宜此藥追蝕腐之

赤石脂

五錢

輕粉

麝香

各五分

乳香

白丁香

生砒

黃丹

各一錢

蜈蚣

灸乾

右爲末搽於肉上其肉自化若瘡口小或痔瘡用糯米糊和作細條陰臯紝入外以膏藥貼之凡瘡口久不合者內有膿管必須用此腐之內服托裏之藥

代鍼膏

一四五

治瘡瘍膿熟不潰

乳香

二分

白丁香

真者是

巴豆炒焦

碱各五

右爲末熱水調點瘡頭上常以碱水潤之勿令其乾

替鍼丸

一四六

治膿成不潰者

白丁香

礮砂另研

真沒藥

乳香各一匙

糯米

四十粒先以礮拳大一塊置磁碗內量人非

待熱氣將息以米排入灰中良久候米如水晶狀取出

用之如米未就再用灰製

右各另爲末然後和勻收貯用時以飯丸麥粒大每用一粒

水濕粘瘡頭上其膿自出○凡瘡瘍血氣壯實膿成不潰者宜用此藥以洩其毒則肌肉易生瘡口易斂若氣血虧損者須用甘溫之劑以培根本否則不惟不潰且難收斂若附骨疽反緊要之地當及時針砭出之爲善

三合散

一四七

治癰疽不肯作膿

新巴豆肉

明硝

班猫等分

右爲細末紙瘡內惡肉自化

立齋曰此方藥性大毒果有惡毒之證宜用腐之取其以毒攻毒也若以陽氣虛不能腐化成濃者宜用大補之劑及桑木炙之丹溪云氣血壯實膿自湧出大抵瘡之潰斂遲速總由血氣之盛衰使然也

藜蘆膏

一四八

治一切瘡疽胬肉突出不問大小長短用藜蘆一味爲末以

生豬脂和研如膏塗患處周日易之

生肌散

一四九

治瘍口不合法

木香

輕粉

各二錢

黃丹

枯礬

各五錢

右爲細末用猪膽汁拌勻晒乾再研細摻患處

立齋曰此方乃解毒去腐搜膿之劑非竟自生肌藥也蓋毒盡則肉自生常見患者往往用龍骨血竭之類以求生肌殊不知餘毒未盡肌肉何以得生反增腐爛耳若此方誠有見也

收口繆藥

百五十

李氏云龍遊有患背疽者大潰五臟僅隔膜耳自謂必死用鮑魚去腸實以羯羊糞烘燥爲末乾繆之瘡口自收此出洪氏方屢用有效故附於此須候膿少欲生肌肉時用之

桔梗湯

一五

治欬嗽吐膿痰中有血胸膈兩脇作痛煩悶

作渴或出臭濁已成脯癰證

桔梗

炒

貝母

當歸

酒浸

瓜蔞仁

枳殼

炒

薏仁

桑白皮

炒

百合

錢各五分

五味子

炒

知母

炒

地骨皮

甜葶藶

炒

甘草節

防己

黃芪

杏仁

各五

水二鐘煎服

桔梗湯

五一

治肺癰欬嗽膿血咽乾多渴大小便赤澁

方如前但少五味夢蘆知母地骨皮四味

用水二鐘

薑五片

煎八分食遠服大便秘者如大黃

人參五味子湯

一五一

治氣血勞傷欬嗽膿咯血寒熱往來夜出

盜汗羸瘦

困乏一切虛損肺痿之證並治

人參

五味子

炒

熟地黃

當歸

酒炒

白朮

炒

白茯苓

青

炙甘草

陳皮

桔梗炒

前胡

各一錢

黃芩

各七分

地骨皮

桑白皮炒

枳殼

柴胡

各七分

水一鍾半生薑三片

加八分食後服

四順散

一五四

治肺

吐膿五心煩熱壅悶欬嗽

貝母去心

紫苑

云苗桔梗炒各二錢半

甘草七分

水一鍾半煎七分食

遠服如欬嗽加杏仁亦可爲末白湯調服

合歡飲

一五五

治肺癰久不愈口

用合歡皮

百歛

二末同煎服 合歡皮卽槿樹皮也

亦名夜合

紫苑茸湯

一五六

治飲食過度或煎燙傷肺欬嗽咽乾吐痰

睡血喘急腸痛不得

安臥肺痿等證

紫苑茸

去苗桑葉

經霜

欬冬花

百合

蒸焙

杏仁去皮尖

阿膠

蛤粉炒各一錢

貝母去心

半夏製

蒲黃炒各一錢

人參

犀角錢末

甘草炙各五分

水一鍾半生薑三片煎七分入犀角末食後服

升麻湯一五七

治肺癰胸乳間皆痛吐膿腥臭

川升麻

桔梗

炒

薏苡仁

地榆

黃芩炒

赤芍

炒

牡丹皮

生甘草各一錢

水一鍾煎八分食遠服

如金解毒散一五八

治肺癰

桔梗一錢

甘草

半錢

黃蓮炒

黃芩炒

黃柏炒

山梔

七分

水一鍾煎八分徐徐陸續飲之不可急服○按此方乃降火解毒之劑也凡發熱煩渴脉洪大者用之卽效若脈數欬痰腥臭或唾膿瘀者宜用桔梗湯

腥臭或唾膿瘀者宜用桔梗湯

如聖柘黃丸

一五九

治肺癰欬而腥臭或唾膿瘀不問脹之

成否並效肺家之病雖有方惟此方功效甚捷不可忽之

柘黃

一兩  
爲末

百齒霜

即梳垢  
二錢

用糊爲丸如桐子大每服三五十丸米飲下○柘黃乃柘樹所生者其色黃狀如靈芝江南最多北方鮮有

葶苈散

百六十

治過食煎燙或飲酒過度致肺壅喘不能臥

及肺癰濁唾腥臭

甜葶苈

桔梗

炒

瓜萎仁

川升麻

薏苡仁

桑白皮

炒

葛根

一錢

甘草

各五分

水一鍾半生薑三片

煎八分食後服

知母茯苓湯

一六一

治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

知母

炒

茯苓

炙甘草

人參

白朮

五味子

炒

麥門冬

半夏

製

薄荷

桔梗

柴胡

款冬花

阿膠

蛤粉炒

黃芩

炒各二錢

川芎

五分

水二鍾薑三片煎一鍾食遠服

四味排膿散

一六二

治肺癰吐膿五心煩熱壅悶欬嗽

嫩黃芪

鹽水炒

白芷

五味子

人參

等分

右爲細末每服三錢

食後蜜湯調下

八味排膿散

一六三

治腸癰少腹脹痛裏急後重脉滑數或

時時下膿

黃芪

炒

當歸

酒拌

金銀花

川山甲

蛤粉炒各二錢

白芷

防風

連翹

瓜蒂

各三錢

水二鍾煎六分食煎服或爲末每服三錢食後蜜湯調下如膿將盡去川山甲連翹倍當歸加川芎

薏苡仁湯

一六四

一名瓜子仁湯○治腸癰腹中痞痛或服

蒲不食小便短澁婦人產後多有此證縱非癰服之尤效

薏苡仁炒

五瓜二仁三錢

牡丹皮

桃仁去皮尖

右水煎空心服

牡丹皮散一六五

治腸癰腹濡而痛時時下膿

牡丹皮

人參

黃芪炒

白芍茶

天麻

白芷

桃仁去皮尖

薏苡仁

當歸

川芎各一錢

官桂

甘草各五分

木香三分

右水前服

梅仁湯一六六

治腸癰壅痛大便秘澁

梅仁九個去皮尖

大黃炒

牡丹皮

芒硝

星角鏗各一錢

冬瓜仁三錢

右水煎入星角末服

大黃湯 一六七

一名牡丹皮湯○專治腸癰小腹堅腫而熱

按之則痛肉色如故或歎赤微腫小便頻數汗出憎寒其脉沉緊膿未成者急服之

牡丹皮

瓜蔞仁

銘三桃仁

去皮尖

大黃

芒硝

各二錢

水二鍾煎一鍾食前服○本方去瓜蔞卽名大黃牡丹湯○  
立齋曰此方乃行血破血之劑也如發熱自汗惡寒小腹作  
痛小便如淋脉未數者有效丹溪曰小腹腫痞按之痛小便  
如淋或自調發熱身無汗復惡寒其脉遲緊者膿未成宜下  
之當有血此結熱所成也故金匱用大黃利之卽此方也若  
無前證恐不宜用其有脉滑數腹內脹痛或時時後重而膿  
已下宜用八味排膿散驟攀丸及托裏之藥

射干湯

一六八

治胃脘癰吐膿血

射干去手

山梔仁

赤茯苓

升麻各一錢

白术五分

赤芍藥一錢半

右水煎服

槐花散一六九

治腸風臘毒下血

槐花炒

熟地黃

白术炒

荆芥穗

當歸身酒

升麻各一錢

川芎四分

右爲末每服三錢空心米飲調下水煎服亦可

除濕和血湯百七十

方在和陣二二九

治陽明虛陷濕熱便血腹痛

夏枯草湯一七一

治癰瘡馬刀已潰未潰或久漏者

夏枯草六兩

水二鐘煎七分去粗食遠服○此生血治癰瘡之聖藥虛甚者當煎濃膏服並塗患處多服益善兼十全天補湯加香附

貝母遠志尤善

必效散 一七二

治癰瘡氣血尚無虧損癰核不愈內服此藥  
外以鐵頭散腐之若氣血虛者先服益氣養營湯數劑後服  
此藥服後癰毒盡下再服前湯數劑

南硼砂

二錢牛

輕粉 一錢

麝香 五分

巴豆

五個去膜

白檳榔

一個班猫

四十個去頭同糯米炒

右同爲極細未取鷄子二個去黃用清調藥仍入殼內以濕紙數重糊口入飯飄蒸熟取出曝乾研末虛者每服半錢實者一錢用炒生薑酒或滾湯於五更調服如覺小腹痛用益元散一服其毒俱從小便出胎婦勿飢瘡毒去後多服益氣養營湯瘡口自合○此藥班猫巴豆似爲峻利然巴豆能解班猫之毒用者勿畏予於京師遇一富商頸有癰痕一片頗大詢其由彼云因怒而致困苦二年百法不應忽有方士與

藥一服卽退二三再服頓退四服而平旬日而痊以重禮來  
之乃是必效散因修合濟人無有不效丹溪亦云必效散與  
神效瓜蔓散相兼服之自有神效常以二劑兼補利用之甚  
效故錄之但此藥雖云峻利然瘧毒之深者非此不能解故  
宜用之惟血氣虛者不可用恐其有誤也○又一道人治此  
證用鷄子七個每個人班貓一枚敍上蒸熟每日空心食一  
箇求者甚多考之各書瘰癧門及本草亦有之然氣血虛者  
恐不能治也

射干連翹散

一七三

治寒熱瘰癧

射干

連翹

玄參

赤芍藥

木香

升麻

前胡

梔子仁

當歸

甘草

各一錢

大黃

一錢

水煎食後服

如意散

治癰瘡已潰爛肉不去瘡口不令合

松香末一兩白礬三錢

爲末麻油調搽乾潰亦可

遇仙無比丸

一七五

治癰瘡未成膿其人氣體如常宜服二

丸形氣覺虛者宜先服益氣養營湯待血氣少充方服此丸  
核消後仍服前湯如潰後有瘀肉者宜用針頭散更不飲亦  
宜服此丸飲後再服前湯

白木

炒

檳榔

防風

黑丑

半生半熟  
取頭末

蜜陀僧

郁李仁

炮去皮

去班蝥

法足翅用橘

皮去粗不用

甘草各五錢

爲細末水糊丸梧子大每服二十九早晚煎甘草檳榔湯下  
服至月許覺腹中微痛自小便中取下瘻毒如魚目狀已破  
者自合未膿者自消

用後治瘻方 一七六

丸頭下卒結囊欲成瘻者用海藻一斤洗去鹹浸酒飲之不可間斷須要時時飲不三盃有酒氣方妙

神效開結散 一七七

消瘻塊甚效

橘紅 四兩

沉香

木香 各二錢

珍珠

四十九粒八砂礫內以鹽

泥封固煅赤取  
出夫火毒用

猪厭肉子

四十九枚用豚  
生頭間

如棗子者

右爲末每服一錢臨臥酒調徐徐嚥下患小者一劑可愈切忌酸鹹油膩滯氣之物須用除日於靜室修合

生地黃丸 一七八

治師尼寡婦室女乍寒乍熱而患瘡瘍及

頸間結核肝脉弦長而出魚際外無寒邪內多鬱火者宜此治之

生地

一兩 酒拌杵膏

黃芩

硬柴胡

各半

赤芍藥

一兩

右爲未入地黃膏加煉蜜爲丸桐子大每服三五十九烏梅湯日進二服

鬱昆布丸一七九 治項下結囊欲成瘻者

昆布

酒洗

海藻

酒洗各等分

右爲末煉蜜丸彈子大合化噙之

玉壺散百八十

治二種毒瘻

海藻

海帶

昆布

雷丸各一

廣茂

青鹽

各半兩

昆布

雷丸各一

右爲細末老米飲爲丸桐子大不拘時噙化四

五丸

神效瓜萎散一八一

治乳癰及一切癰疽初起腫痛即消膿

成卽潰膿出卽愈治癰之方甚多獨此方神效療癰瘻毒九  
效凡一切癰疽餘毒皆宜用之

瓜萎爛研

當歸

酒炒

生粉草

各半

乳香

沒藥各

右用酒煎服良久再服如不能飲以酒水各半煎之如數劑不效宜以補氣血之藥兼服之○若肝經血虛結核不消佐以四物柴胡升麻白芍茯苓○若肝脾氣血虛弱佐以四君芎歸柴胡升麻○若憂鬱傷脾氣血虧損佐以歸脾湯

海藻散堅丸

一八二

消用經癰瘤

海藻

昆布

龍膽草

酒拌炒焦各二兩

小麥

醋煮炒乾四兩

右爲末煉蜜丸桐子大勺服二三十丸臨臥白湯送下或噙化嗽之尤好凡患瘰癧服調治之藥未應宜佐以此上方  
○一方有柴胡二兩

連翹飲子

一八三

治乳內結核服數劑如不消宜兼服八珍

湯初起有表證者宜先解散

連翹

川芎

瓜蔞仁研

皂刺炒

橘葉

青皮

甘草節

桃仁

名一  
錢牛

右水煎食遠服

橘葉

青皮

甘草節

桃仁

名一  
錢牛

清肝解鬱湯

一八四

治肝經血虛風熱或鬱火傷血乳內結

核或爲腫潰不愈凡肝膽經血氣不和之病皆宜用此藥

人參

熟地黃

芍藥炒

茯苓

山梔炒

貝母各一

柴胡

牡丹皮

川芎

陳皮各五分

當歸

白朮各半錢

甘草五分

右水煎服

羌活白芷散

一八五

治風熱血燥手掌破裂或頭面生瘡或

遍身腫瘡

或臘水淋漓

羌活

白芷

荆芥

軟柴胡

蔓荆子

防風

甘草

牙皂

黃芩

酒炒

黃連

酒炒各一錢

右水煎服

胡麻散

一八六

治風熱癰瘍搔痒

胡麻子

二錢

苦參

荆芥穗

何首烏各八錢

威靈仙

防風

石菖蒲

牛蒡子炒

甘菊花

蔓荆子

白蒺藜

炙甘草各六錢

右爲末每服一錢食後薄荷湯調服茶清亦可

四生散

一八七

治腰腿瘡澀不愈或眼目昏花名腎臟風並

治風癬疥癩血風瘡證

黃芪

獨活

白附子

真者白蒺藜等分

右爲末每服一錢用猪腰子一枚批開入藥濕紙包裹煨熟

空心連腰子細嚼鹽湯送下

檳榔散

一八八

治風濕流注脚脛酸痛或嘔吐不食

檳榔

木瓜

陳皮

炙甘草

錢

香附

紫蘇

各五分

水一鐘半

生薑三片葱白三根煎

鍾空心服

升麻和氣飲

一八九

治風癬瘡疥熱結大便不通

當歸

陳皮

各半錢

枳殼

炒  
糙炒

芍藥

消炒

乾葛

桔梗

炒

白芷

甘草

各一錢

蒼朮

米泔炒

大黃

各五分

升麻三分

右水煎服

當歸飲

百九十一

治風濕血熱癰瘡疔瘍膿水淋漓瘡疥發熱

等證

當歸

川芎

生地黃

白芍藥

白蒺藜

炒

黃芪

何首烏

不見鐵

各錢半

防風

荆芥

甘草

右水煎服

羌活當歸散一九一、治風毒血熱頭面生瘡或赤腫或成塊  
或癰疹搔痒膿水淋漓

羌活

當歸

川芎

升麻

白芷

荆芥

梔子蒸

黃連

酒炒

黃芩

酒炒

連翹

甘草

右用酒拌晒乾酒煎服

掃散

九二

治癰瘍

防風

荆芥

苦參

地骨皮

薄荷等分

甘草減牛

右爲末蜜水調服三錢不過三五服可淨○或煉蜜丸桐子  
大每服五七十九食遠茶清送下

烏金散

敷腎囊破爛下症等證

麩炭

紫蘇葉

右等分爲末香油調搽用紫蘇葉包裹之

蛇床子散

九四

治一切風癬疥癩搔痒膿水淋漓

蛇床子

獨活

告參

防風

荆芥

桔梗

銅綠

各一兩味另爲末

右爲末麻油調搽

金黃散

一九五

敷天泡濕熱等瘡

滑石

粉甘草

此當半  
用爲是

右等分爲末搽敷○此方或加綠豆末以治濕熱肥瘡更妙  
○當以此方加枯礬少半用治肥瘡大效

白粉散

一九六

治諸瘡瘍

海螵蛸

三分白芨一分

輕粉二分

右爲末先用漿水洗拭乾傅

漿水洗拭乾傅

### 滑石散

一九七

治小兒天泡瘡

### 好滑石

黃柏

右共爲末傅之○仍四服荆防敗毒散或金銀花散熱甚者宜服大連翹飲○一方名碧玉散以青靛調前二味如泥用皂刺挑破泡水次付藥神效

### 秘方仙遺糧湯

一九八

治一切楊梅瘡不拘始終虛實皆可

取效

### 土茯苓

即名仙遺根用鮮者二兩洗淨以木石柏搗碎

### 用水三

碗煎二碗去粗入後藥煎服

### 當歸

生地

防風

木通

### 薏仁

各八分

金銀花

黃連

連翹各一

### 白朮

白蘚皮各七

皂刺六分

甘草四分

加燈心二十

根用遺糧湯二碗煎一碗食遠服

土牛膝湯一九

九 治楊梅瘡及瘰癧咽喉瘻漏潰爛筋

骨狗癰疼痛

百妙○

用土萆薢

即土茯苓二三兩以水三鍾煎二鍾不拘時徐

徐服之○

有患久或服攻擊之劑致傷脾胃氣血等證以

此一味爲

外加對證之藥無不神效

五加皮飲二至

治楊梅綿花瘡百發百中亦可煮酒以治結

毒

當歸

木瓜

生地黃

熟地黃

羌活

薏仁錢一

防風

荆芥

赤芍

苦參

大楓藤各七

五加皮二錢

甘草

薑絲各五

右每服入土

俟冬四兩猪肉四兩用水一天碗煎一碗食前

每以五貼爲一料初服一貼要取微汗取汗法先以金銀丸  
一兩或忍冬藤葉尤妙防風荆芥花椒各半兩煎湯二斗於  
不透風處先薰後洗自然汗出卽患二三十年者只用此四  
料四汗之無不全愈忘牛肉燒酒真妙方也世人珍秘不傳  
徐春甫得之用以治人一一獲效故詳載之以濟人也

會膿散二百七

治惡毒便毒初起之妙方也

白芷

殼蚕

川山甲

煅

大黃

各四錢

乳香

沒藥

各一錢

右爲末以當歸四錢用酒水各一鐘煎一鐘去粗量人強弱  
或全用或一半調服之○此藥若嫌大多則咬咀爲飲大黃  
生加煎服之尤妙

牡蠣散

二百八

治便毒亦名血癥

當歸酒拌

甘草節

滑石

煅各半

牡蠣二錢

大黃三錢

木蟹子

五個杵非有大  
蟹者此味  
不可用當去之  
亦不必用

水二錘煎一錘露一宿五更頓服冬月火溫服無論已未滑  
膿血俱從大便出○此方乃鹹寒導滯之劑若久曠房室大  
小便秘發熱欣痛或交感時強固精氣以致交錯壅滯而結  
爲腫痛便秘者最宜用之若勞倦虛弱之人不甚燉痛大小  
便無熱秘者不宜輕用

牛黃雙解散

二百九

治便癰內蘊熱毒外挾風邪或交感強

忍精氣以致淫精交錯壅結瘡痛或大小便秘先用此藥通  
解更用調補之劑

肉桂

大黃炒

芍藥

牽牛杵炒

澤瀉

桃仁去皮尖刺

各二錢半

炙甘草

乾薑

各一錢

右分二劑水煎空心食前服

內托羌活湯

二百十

治督癰腫痛兩尺脉緊按之無力者

恙活

黃柏錢二

黃芪鹽水炒各一

防風

當歸尾

藁本

肉桂

連翹錢各一

炙甘草

荳朮

陳皮錢半

右水酒煎服

加味瀉肝湯

三二二

治肝經濕熱不利陰囊腫痛或潰爛皮

脫畢丸懸掛或便毒及下疳腫痛或潰爛

皆治之

龍膽草

酒炒當歸稍

車前子炒

生地黃

芍藥

炒

澤瀉

黃蓮炒

黃柏酒炒

知母

酒炒

防風錢一

甘草稍五分

水二錘煎八分食前服外敷烏金散

加味托裏散

三三三

治懸癰不消不潰

人參

黃芪

炒鹽水

當歸

川芎

麥門冬

芍藥

炒

黃柏

酒炒

知母酒炒

金銀花

製首草

柴胡錢

水二鍾煎八分食前服  
加味十全大補湯二三治懸癰潰而不斂或發熱飲食少  
思

人參

黃芪水

白朮炒

熟地黃

當歸

川芎

芍藥炒

茯苓各一

甘草

肉桂

五味子炒

麥門冬各五分

水二鍾煎一鍾食前服○茲腫加青皮○小便赤加酒炒黃

柏知母○小便澀加車前子山梔子俱炒用

五味當歸散

二二四

治婦人陰中突出一物長五寸名陰挺

挺

當歸

黃芩各二

牡蠣兩半

謂皮兩

赤芍藥五錢

右爲末每服一錢食前酒調下。滾湯亦可。如不應須以補中益氣湯倍加柴胡升麻兼服之。○又方用當歸川山甲炒蒲黃炒各半兩辰砂一錢麝香小許俱爲末每服三錢酒調下尤效。

婦人陰瘡

二二五

治婦人陰戶生瘡作痒

杏仁

炒

雄黃

各五錢

麝香

二分

右爲末敷入患處

瘍腫湯

二二六

治婦人陰戶生瘡或痒痛或膿水淋漓

甘草

乾漆

各三錢

生地黃

當歸

黃芩

川芎

各二錢

鱉甲

五錢

右用水數碗煎數沸去粗當洗患處

白芷升麻湯

二二七

治婦人陰內膿水淋漓或痒或痛

白芷

升麻

黃連

木通

當歸

川芎

白朮

茯苓

右水煎服○更用塌腫湯浴洗之

痔漏腸紅方

二十八

其效無比

黃連 去蘆毛淨 一兩好酒浸一宿撈起陰乾爲末

百草霜 用草芽 燒者松柴者不用一兩研細

烏梅肉 一兩蒸軟卽用前浸黃連酒蒸爛

右以三味同搗一處爲丸桐子大如太乾仍如前酒搗丸  
每空心用酒送下四五十九三日見效十日全愈

地榆散

二十九

治血痔

右用地榆爲細末每服二錢七食前米飲調下日三服

臭椿皮散

一百二十

治痔漏下血及癟不止

臭椿皮 微炒

酸石 捣皮

黃連去鬚

地榆

阿膠

炒珠各一兩

艾葉

三錢

右爲細末每服二錢食前粥飲調下

秦艽防風湯

治痔漏結燥大便作痛

秦艽

防風

當歸

酒拌

白朮

黃柏

陳皮

柴胡

大黃

澤瀉

各一錢

桃仁

去皮尖

紅花

升麻

右水煎空心服

豬臓丸

二二二

治大便痔漏下血

豬大臓

一條控乾

以槐花炒爲末填入臍內兩頭札定五七日內

米醋煮爛

右搗和再加糕糊爲丸桐子大每服五七十丸食前米飲或當歸酒下○此方用黃連猪臓二味亦名猪臓丸尤效○一方先用海螵蛸炙黃去殼爲末以朱葛草煎湯調下三日卽

效或後服黃連猪臘丸

痔瘡方二二三

雄黃五分

五靈脂

燒斷

五焙子一錢

炒過各

沒藥三錢半

白礬半生半熟

三錢

右爲極細末用紙托貼瘡口上

二品錠子

一三四

上品 去十八種痔

白明礬二兩

白砒五分

乳香

沒藥各三錢半

牛黃三錢

中品 去五漏及翻花瘤氣

白明礬二兩

白砒一兩

自砒

三錢

沒藥各三錢半

牛黃二錢

下品 治瘰癧氣核疔瘡發背膿疽惡證

白明礬

二兩

白砒

一兩半

乳香

沒藥

各二錢半

牛黃

三分

右將砒末入紫泥罐內次用礬末蓋之以炭火煅令烟盡取出並各藥俱研極細末用糯米糊和爲挺子狀如線香陰乾紙捲內三四次年深者五六次其根自腐如瘡露在外更用蜜水調搽乾上亦可○嘗有一老嫗用此治癰瘍索重價始肯爲治其方去乃是中品錠子紙捲內以膏藥貼之其根自腐未盡再用去盡更搽生肌藥數日卽愈人多異之凡見其治氣血不虛有果驗惟氣血虛者雖潰去亦不能愈蓋此與必效散相爲表裏皆攻毒去邪之藥也

羊膽膏

二三五

治痔漏下疳瘡

曠月取羊膽一枚入片腦末一分置風處搘乾用時以涼水化開頻敷患處內服槐子酒或加味瀉肝湯若得熊膽更佳

如眼痛者點之尤效

水銀棗子膏

二二六

治目痔痒不止

水銀

一兩

棗肉

二兩

右和研水銀不見星捻如棗核狀薄綿裹內肛門中明日重出若痛加韶粉三分丸內之

熊膽膏

二二七

治痔痛極效

熊膽

五分

冰片

一分

右研細用井花水調鷄翎掃痔上

鴆牛膏

二二八

傳痔痛極效

鴆牛

枝負殼有角者

冰片

射香

各少許

右同研爛以磁器盛次早取汁敷痔上

芫花線

二二九

繫痔漏瘤核

用芫花一握洗淨入木柏搗爛加少水绞汁於石器中慢火

煎成膏將絲線於膏內度過晾乾以線繫痔當微痛候痔乾落以紙燃蘸膏納竅內去根當永除根也○一方只搗汁浸線一夜用不得使水

枯痔水澄膏二百三十

治痔護肉

鬱金

白芨各一兩

一方加黃連

右二味爲細末如患內痔候登廁時翻出在外用溫湯洗淨側臥於床其痔卽出用蜜水調藥得中以蓖殼塗穀道四邊好肉上留痔在外以紙蓋藥上良久然後用後枯藥擦痔上仍用筆蘸溫水於紙上潤之勿令藥乾及四散

好白礬

四兩

生信石二錢

硃砂半

研

極細

右各研爲細末先將礬入紫泥罐底次將礬末蓋之用火煅令烟盡其砒盡從烟去止借砒氣於礬內耳將礬爲極細末看痔頭大小置礬末於掌中乃入硃砂少許以唾調稀用籠

篋塗痔上周遍一日三上看痔頭顏色焦黑爲效至夜有黃水出切勿他疑水盡爲妙至中夜上藥一遍來夜依然上藥三次有小痛不妨換藥時以碗盛溫湯用筆輕洗去舊藥更上新藥仍用護肉藥間用荆芥湯洗之三兩日之後黃水出將盡可於藥中增硃砂減白礬則藥力卽緩三兩日即可增減漸漸取之庶不驚人全在看色增減傳藥厚薄方是活法此藥只是借砒信之氣又有硃砂能以解之一方士將此二方在京治人多效致富一富商以百金求得之錄於予予雖未用傳人無不言效但枯藥則趙宜真煉師已刊於青囊雜纂如神千金方則未見刊傳大抵今人言能取痔者皆此方也其有氣血虛或挾內邪者還當兼治其內庶不有失如神千金方二三一治痔無有不效

好信石

黃明者三錢  
打如豆泣

明白礬

一兩  
爲末

好黃丹

飛砂五錢

鷄稍

七個沸淨瓦上燒乾爲末

草烏

光實者去皮生研五錢

右用紫泥罐先將炭火煅紅放冷拭淨先下明礬燒令沸次下信入礬內拌勻文武火煅候沸再攪勻次看罐通紅烟起爲度將罐掇下待冷取研爲末方人黃丹草烏鷄稍三味再同研極細以磁罐收貯如欲敷藥先煎甘草湯或葱椒湯洗淨患處然後用生麻油調前藥以鶯毛掃藥痔上每日敷藥三次必去黃水如膠汁則痔頭漸消其年遠者不出十日可取盡日近者俱化爲黃水連根去淨更搽生肌之藥凡五痔皆可去之此乃臨安曹五方爲高宗取痔得效後封曹官至察使

秘傳正骨丹

二三二 治跌打損傷骨折血瘀而傷之重者用

此可續筋骨

降真香

乳香

沒藥

蘇木

松節

自然銅

七欠

川烏

炮

真血竭

各一  
兩

地龍

去土酒  
浸烘乾

生龍骨

各一  
錢

土狗

十個浸油  
內丸洪乾

右十二味共重八兩八錢同爲末每服五錢隨病上下酒調  
服覺藥自頂門而至遍身搜至病所則颯颯有聲而筋骨漸  
愈病人自知之○服藥後仍服人參白朮黃芪當歸川芎肉  
桂甘草白芷厚朴以調補元氣

本事接骨方

二二三

治打折損傷

接骨木

半兩

乳香半兩

當歸

赤芍藥

川芎

自然銅

炒醋淬  
各一  
兩

右爲末用黃蠟四兩溶化入前藥攬勻衆手丸龍眼大如打  
傷筋骨及閉痛不堪忍者用一丸熱酒浸開乘熟飲之痛即  
止

沒藥降聖丹

二三四

治跌打損傷接續筋骨

鷄稍

七個洗淨  
上焙乾爲末

草烏

光實者去皮  
生研五錢

右用紫泥罐先將炭火煅紅放冷拭淨先下明礬燒令沸次  
下信入礬內拌勻文武火煅候沸再攬勻次看罐通紅烟起  
爲度將罐掇下待冷取研爲末方人黃丹草烏鷄稍三味再  
同研極細以磁罐收貯如欲敷藥先煎甘草湯或葱椒湯洗  
淨患處然後用生麻油調前藥以鴛毛掃藥痔上每日敷藥  
三次必去黃水如膠汁則痔頭漸消其年遠者不出十日可  
取盡日近者俱化爲黃水連根去淨更搽生肌之藥凡五痔  
皆可去之此乃臨安曹五方爲高宗取痔得效後封曹官至  
察使

秘傳正骨丹

二三二

治跌打損傷骨折血瘀而傷之重者用

此可續筋骨

降真香

乳香

沒藥

蘇木

松節

自然銅 醋煅 川烏 炮

真血竭 各一兩

地龍

去土酒浸烘乾

生龍骨 各一錢

錢一

土狗

十個浸油內瓦洪乾

右十二味共重八兩八錢同爲末每服五錢隨病上下酒調服覺藥自頂門而至遍身搜至病所則颯颯有聲而筋骨漸愈病人自知之○服藥後仍服人參白朮黃芪當歸川芎肉桂甘草白芷厚朴以調補元氣

本事接骨方

三三三

治打折損傷

接骨木

半兩

乳香 半兩

當歸

赤芍藥

川芎

自然銅

炒醋淬各一兩

右爲末用黃蠟四兩溶化入前藥攪勻衆手丸龍眼大如打傷筋骨及閃痛不堪忍者用一丸熱酒浸開乘熟飲之痛即止

沒藥降聖丹 二三四 治跌打損傷接續筋骨

止

當歸 酒炒

蘇木

川烏頭

炮去  
臍

骨碎補

灸

乳香

另研

生地黃

白芍藥

川芎

治打撲

損傷筋骨疼痛或氣道血暈或

瘀血內停肚腹作痛或胸脹悶

沒藥

另研

自然銅

火燬醋淬十次爲末各一兩

右爲末生薑汁其蜜和丸每二兩作四丸每服一丸用米酒各半盞煎至八分空心熱服○立齋曰脾主肉肝主筋若肝脾氣血虧損或血虛有熱而不愈者當求其本而治之十味沒藥丸二三五治打撲損傷筋骨疼痛或氣道血暈或瘀血內停肚腹作痛或胸脹悶

沒藥

乳香

川芎

川椒

當歸

芍藥

紅花

桃仁

血竭

各一兩

自然銅

四錢火燬七次醋淬

石爲末同黃蠟四兩溶化入前末速攪勻衆手丸強子大每服一丸酒化下○立齋曰按接骨散沒藥丸惟元氣無虧者

宜用若腎氣素怯或高年虛弱者必用地黃丸或補中益氣湯以固根本爲善

花蕊石散

二三十六

治打撲損傷腹中瘀血脹痛欲死服之血

化爲水其功不能盡述

硫黃

明者四兩

花蕊石 一兩

右爲末和勻先用紙筋和鹽泥固劑瓦罐一箇候乾入藥再用泥封口安在磚上虛書八卦方位用炭三十斤煅之候罐冷取出每服一錢童便調下○立齋曰前方若被傷已甚元氣虧損內有瘀血不勝疎導者用前藥一服其血內化又不動臟腑甚妙甚妙

黑丸子

二三七

一丸和血定痛散○治跌打損傷筋骨疼痛

或瘀血壅腫或外感寒肢體作痛或手足緩弱行步不前若流注膝風初結服之自消若潰後氣虛發熱與補藥兼服

自歛

百草霜

白芍藥

各一兩

川烏

南星各三錢

赤小豆

兩半

白歛

一兩六錢

白芨

骨碎補

當歸

各八錢

牛膝

六錢

右各另爲末酒糊丸桐子大每服三四十丸鹽湯溫酒任下  
孕婦忌服

封口藥

二三八

凡損傷皮肉破裂者以此封之

牡蠣殼

赤石脂

生研

紅丹

上好者等分

右爲細末香油調塗瘡口○若飲消腫散血合口加血竭乾  
摻之

當歸導滯散

二三九

治跌撲瘀血在內胸腹脹滿或大便不

通或喘咳吐血

大黃

當歸

等分

右爲末每服三錢溫酒下陽氣虛者須加肉桂

復元活血湯

二百四十

治跌打損傷瘀血流於脇下作痛或

小腹作痛或痞悶及便毒初起腫痛

柴胡

半錢

天花粉

川山甲

炒各一錢當歸酒拌

大黃

酒炒各半錢

紅花

甘草

各七分

桃仁

二十去皮尖研

右水

一鐘牛加酒半鐘煎八分食前服之以利爲度

金瘡方

二四一

凡金瘡出血不止用牛膽石灰摻之卽止其方以臘月牛膽入風化石灰懸當風候乾用一方單用三七擣爛敷之神效又方金瘡出血不止以五倍子生爲末乾貼之如不止而血熱者宜用犀角地黃湯之類○大凡金瘡出血不止若素本怯弱者當補其氣若陰虛或有熱者當補其血若因怒者當平肝若煩熱作渴昏憊者當補脾氣若筋攣搐搦者當養用平肝若煩熱作渴昏憊者當補脾氣若筋攣搐搦者當養用

血不應用地黃丸以滋腎水

金瘡降真散

二四二

降氣香

用節佳

松香

文蛤

三味等分爲末無論諸傷血出斷折摻破處夾縛定神效

金瘡灰蛋散

二四三

治金瘡出血不止及久年惡瘡

石灰

細研

雞蛋

清餅爲度

右將灰蛋餅子煖過候冷研細遇金瘡摻之若多年惡瘡以  
薑汁調敷○一方單以石灰摻傷處裹定亦血止而愈

龍骨散

二四四

治金瘡

龍骨

赤石脂

五棓子

黃丹

海螵蛸等

右各研入麝香少許共研勻摻上如乾先以鹽水洗拭乾摻

之

桃花散

二四五

治金瘡並一切惡瘡

黃丹

軟石膏

服過等分

和研勻如桃花色塗傷處甚妙

刀傷跌打經驗方

二四六

凡刀傷磕損跌撲腫痛或出血用葱白細切杵爛炒熟敷患處葱冷再易神效○一方以三七擣爛罨之神效

立齋曰醫學綱目稱前方有神效余嘗以治前證青腫不散死肉不潰佐以健脾胃之藥其功尤捷此內外所以合一也

損傷敷夾法

二四七

凡損傷骨折者先須整骨使正隨用川烏草烏等分爲末以生薑汁調貼之夾定然後服藥無有不效

罨跌閃腫痛

二四八

用生薑葱白同搗爛和麵炒熟罨之○如熱服而痛者用梔

子加麵炒熟罨之

洗損傷方

二四九

凡傷重者用此淋洗然後傅藥

荆芥

土當歸

生葱

切糊一方  
用生薑

右同煎湯溫洗或止用葱一味煎洗亦可

箭鏃竹木刺方

二百五  
廿

百一方治竹刺在肉以礱糟互研敷立效

衍義方治竹木刺入肉嚼牛膝根罨之卽出

肘後方治箭鏃入骨以巴豆肉微炒同曉鷦研勻塗傷處候

痒極拔出之

孫真人治箭鏃針刺杵頭點塗患處自出

卷跌打火棍傷

二五一

生薑

陳酒

糟醑

同搗爛炒熱罨傷處

治創傷二五二

凡創傷手指者用皂礬二兩水四五碗砂鍋內熬滾將手薰洗良久卽血活疼止不致潰爛放水忌銅鐵器其洗手水過夜卽臭惡不可聞

杖瘡四方

二五三

用川大黃一兩加上好水片三分另研俱爲末和勻涼水調如糊攤杖瘡卽時止痛一日後換膏藥貼之

又方加甘草一兩

又方攤藥

大黃

白芷

生半夏

錢七

右爲末以鮮薑汁調勻乾卽再敷以黑處血紅爲度卽換貼膏藥神效

又方

生半夏

松香

硝

右研一處蜜水調成膏貼之勿令見風如乾再換一個卽愈  
諸骨諸物鯁二五四

一治諸骨鯁用苧麻根杵爛丸彈子大將所鯁物煎湯化下  
一治魚骨鯁用細茶五棓子等分爲末吹入咽喉立愈  
一治稻芒糠穀鯁喉將鵝弔一足取涎徐徐嚥之卽消

一治吞釘鐵金銀銅錢等物但多食肥羊肺及諸肢肥肉等  
味必隨大便而下

一治吞鐵或針用錫糖半斤濃煎艾汁調和服之

一治吞髮繞喉不出者取自己亂髮燒灰白湯調服一錢

破傷風敷藥二五三 治打撲損傷風腫痛者

南星

半夏

地龍

等分

右爲末用生薑薄荷汁調擦患處

稀荳酒

二五六 治破傷風外邪初入或風入於臟者神效

凡頭面身體因破損傷風者頃刻發脹遲則不救速用稀荳  
草一二兩酒水各半煎服被蓋緩臥少頃即可消散能飲者  
純用酒煎尤妙

防風湯

二五七 治破傷風表證未傳入裏惡服此

防風

羌活

獨活

川芎

等八

右每服五錢水煎調藥略散服方在後二六四

白术防風湯

一五八

治破傷風服藥過多自汗者

白术

黃芪

各一兩

防風

二兩

右每服五七錢水煎

服臟腑已和而自汗出者可服此藥若

臟腑秘小便赤而自汗者急以後大青黃湯下之

卷活湯

二五九

治破傷風在半裏半表間宜和解之惡服此

湯稍緩則邪入於裏不可用矣

羌活

防風

細辛

前胡

蔓荆子

菊花

川芎

黃芩

石膏

白茯苓

枳殼

甘草

各一錢

薄荷

白芷

各五分

右每服五錢薑水煎日二三服

羌活防風湯

二百六十

治破傷風初傳在表脉浮緊

羌活

防風

藁本

當歸

芍藥

甘草

各四錢

地榆

細辛

各二錢

右咬咀每服五七錢水一鐘半煎八分熱服量緊慢加減用之○熟盛加黃連黃芩各二錢○大便秘加大黃二錢○自汗加防風白朮各五分

大苦黃湯

二十六

治破傷風邪傳於裏舌強口噤項背攣張

筋惕搐搦痰涎壅盛宜疎導者急服之

川芎

羌活

黃芩

大黃

各  
兩

右每服五七錢水煎服

本草玉真散

二六二

一各定風散○亦名奪命丹○治打撲金

刃破傷風重者牙關緊急腰背反張並蛇犬所傷

天南星

湯泡七次如急用以濕紙裹煨

防風

等分

右爲末每服二錢溫酒調服若牙關緊急腰背反張者每服三錢用童便調服雖內有瘀血亦愈至於昏死心腹尚溫者速進二服亦可保全若破傷瘡口及風犬咬傷須用漱口水或熱童便洗淨隨用生南星爲末摻之或以水調塗之出水爲妙

養血當歸地黃湯

二六三

治破傷風氣血俱虛發熱頭痛服

此以養氣血祛風邪不拘新舊並可治之

當歸

酒拌

熟地

各一錢

芍藥

川芎

藁本

防風

白芷

北細辛

錢

水二鐘煎一鐘食遠服甚者加酒助之

蜈蚣散

二六四

蜈蚣

一剉灸

鱠膠

三錢煅

右爲末用防風白朮煎湯調下

破傷風炙法

二六五

治跌打損傷或虫獸傷破皮膚以致風邪入內牙關緊急腰背反張或遍體麻木甚者不知人事急用蒜搗爛塗傷處將艾壯於蒜上灸之多灸爲善仍用膏藥護貼內服玉真散如毒蛇風大咬傷先刺患處去毒血如前法治之

海藏愈風丹

二六六

治癩病手足麻木眉毛脫落遍身生瘡及

癩風應疹皮膚瘙痒搔破成瘡並皆治之

皂角

一斤剉寸許無灰酒浸一宿以水一

碗按成汁去渣用砂罐文武火熬熟

苦參

一斤取末四兩

烏梢蛇 白花蛇 土花蛇

各一條去腸陰乾酒浸取淨肉曬乾爲末

右爲末入前二味和丸桐子大每服六七十丸空心煎通聖散送下乾物壓之日三服間日浴之汙出爲度

二聖散

二六七

疎風和血去癘毒

皂角刺

燒存性爲末

大黃

半兩

右用大黃半兩煎湯調下皂刺末二錢早服槿皮散午以升麻湯下瀉青丸晚服二聖散

楨槿皮散

二六

治肺壅風毒遍身癰瘍瘡痏

槿皮

枳殼

去穰各四兩俱燒性生

荆芥穗一兩

灸甘草

半兩

杏仁

二兩令咸半取

出晾乾爲研皮尖用水一碗煮

右共爲末磁器收貯每服二錢食後溫酒認服

升麻湯

二六九

治諸風熱癩肌肉極熱身如蟲行或唇反綻裂

升麻三分 人參

夾神

防風

羌活

星角

鎊

羚羊角

鎊各

內桂

五分

水二鐘薑三片入竹瀝少許煎八分不拘時服○或用下酒

青丸

寶鑑醉仙丹二百七十

治癆風遍身麻木

胡麻子炒

牛旁子炒

枸杞子

葛

荆子

炒各

白蒺藜

苦參

天花粉

防

風各半

兩

右爲細末每二兩五錢入輕粉二錢拌勻每服一錢茶清調  
晨午各一服至五七日於牙縫中出臭涎令人如醉或下膿  
血病根乃去仍量人輕重虛實以用之病重者須先以再造  
散下之後元氣將復方用此藥忌一切鹽醋灸燙厚味止可  
食淡粥時菜及諸蛇肉以淡酒蒸熟食之亦可以助藥力

浮萍散

二七一

治風癱瘓癩

和

景岳全書

卷之二十四

七

浮萍 四錢

荆芥

川芎

麻黃 去節

當歸

赤芍藥

甘草

各二錢

水二鐘葱二莖豆豉一撮前服汗出爲度

寶鑑換服散二七二

治癆風久不愈或看毛脫落鼻梁崩壞其

效如神

白花蛇

黑花蛇

各三兩酒浸

地龍

去土當歸

川芎

赤芍藥

天門冬

去心甘草

何首烏

不犯哉

沙參

胡麻子

炒天麻

紫參

苦參

白蒺藜

細辛

白芷

蔓荆子

感靈仙

荆芥穗

菊花

木賊草

不灰木

石菖蒲

定風草

即草烏莖

草烏

炮去皮臍

蒼术

木鱉

各一

右各另爲末和匀每服四五錢食後溫酒調

服加飲數杯尤妙

通天再造散

二七三

治大風實熱內壅宜此攻之

鬱金

半兩

大黃

炮

皂刺

炒各一兩

白芷

頭末半生

白芍

炒六錢

右爲細末每服五錢日未出時面東以無灰酒調下晚利下黑頭小蟲病輕者只利臭穢之物○忌葷醒厚味半年犯則再作不可救此藥服三五次卽愈

白花蛇丸

二七四

治癩風○丹陽荆上舍得癩疾一僧治而

愈以數百金求方秘不肯傳僅客袁生窺知藏衲衣領中因

醉之而竊錄焉

白花蛇

一條去頭尾連骨生用

烏梢蛇

一條去頭

蟬脫

一條去頭

防風

去苗連骨生用

金銀花

去土

防風

去苗

金銀花

去葉

枸杞子

拘杞子

槐花

苦參

生地

名二兩

全蝎

醋浸一日去鹽味

黃芩

黃連

梔子

黃柏

牛膝

川芎

牛蒡子

何首烏

不羈

牛膝

川芎

生地

全蝎

黃芩

黃柏

槐花

枸杞子

烏藥

黃連

苦參

連翹

天花粉

白蒺藜

威靈仙

荆芥穗

細辛

蔓荊子

金毛狗脊

胡麻子

炒各一兩漏蘆半斤洗淨去酒浸取四兩

右爲末米糊丸桐子大每服五六十丸茶清送下空心午前

臨臥各一服

白花蛇膏

治諸風癲疾遍身生瘡

白花蛇

肉四兩天麻七錢

荆芥

薄荷葉各三錢

右爲細末用好酒二升蜜四兩以銀磁器熬成膏每溫服一  
酒杯日三次煎餅壓下於煖處發汗效

防風天麻丸

三七六

治癲風癲病此方應是仙傳一年中常

療數人初服藥有嘔吐者不可疑服而得愈其效如神

防風

去蘆

天麻

升麻

白附子炮

定風草

細辛

去苗

川芎

人參

去蘆

丹參去蘆

苦參

玄參去蘆

紫參去蘆

蔓荆子

威靈仙

川山甲

炒何首烏另搗各二兩

蜈蚣二條

右爲細末同何首烏末拌勻外用胡麻一斤淘淨晒乾炒香熟另研爲細末乃人前藥末二兩又拌勻煉蜜和爲丸十九每服一丸細嚼溫漿水送下不拘時候日三服宜食淡白粥一百二十日大忌房勞並將息慎口

行藥方

二七七

治癩毒

大黃

五錢

白牽牛

檳榔各五

甘草

三兩

輕粉

五錢

薑汁

二匙五更時調服

右共爲細末每服二錢用白蜜三匙病勢重者七日行一次稍輕者半月一次輕者一月一次或二十日一次以三五遍爲度

皂角散

治大風

皂角刺

燒有性一錢

大黃

一錢輕粉

五分

右爲末空心酒調服取下惡物

○服藥數口齒縫出血甚臭

雷丸散

二七九

取大風虫

雷丸

貴仲

一味另研

阿魏

各一錢

麝香一分

右爲細末每服

一錢天明溫酒送下

黑虎丹

二八一

治大風諸癩惡瘡

毒蟲內蝕形骸變壞

天靈蓋

三丙

人中白

桃仁

炮去皮尖各二錢

麝香

五分去頭足燒有性

穿山甲

半兩炒各輕粉

二錢

老皂刺

燒有性

乾蝦蟆

二兩足燒去頭有性

右爲末煉蜜丸桐子大每服三十九月首五更未飲連口服

坂虫盡即愈○殺勞蟲通用

苦參酒

二八一

治癩風及瘡疹疥癬

最多者

苦參

五斤  
切片

右以好酒三十浸三十日量飲一合日服不絕覺痺卽瘥

硫黃酒

二八二

殺癟風諸蟲

明硫黃

研極細

右用酒浸空心飲清汁明日添硫黃再研人酒如前飲之

七珍

湯二八三

治洗大瘋

青蒿

艾葉

忍冬藤

蒼耳子

桑條

槐條

柳條

搗碎用  
條俱

右煎水一桶入炒鹽半斤間日一洗浴蓋室中以簾席圍之  
洗出汗爲炒不過十次愈

烏頭湯

二八四

治大風瘡癩

草烏

麻黃根

艾葉

地骨皮

朴硝

各一

右爲粗木用水一桶椒一合葱三十根同煎湯人醋一鍾於密室中日用手中圍搭四肢候湯可浴冷汗透移使而上如珠徐起或坐或二斤時汗乾着衣避風五日再浴如此三五次每浴後更服候肌丹等藥

敷癩方

二八五

雄黃

麻黃

白礬

草烏

蛇床子

味辛性  
等分

白芷

右爲末用香油或濃蜜水調敷患處

直指洗癩方

二八六

浴洗大風瘡

苦參

荆芥

防風

白芷

羌活

獨活

藁本

各一兩

洛陽花

四丙火酒  
買過一宿

白芷

言作三次煎水洗冷出汗

梅花白癩

二八七

用香油二碗入鷄蛋黃二枚熬將焦去粗熬油至一碗許  
外用雄黃一錢 白礬三分 花椒五分 上共爲細末入  
油內再熬熟收貯候用○每用猪毛湯熱洗瘡垢擦油三五  
次卽愈○愚按此方於蛋焦去粗之後入水銀五錢微火漸  
熱之然後再加硃砂細末二錢並雄黃白礬等末搗熬勻熟  
功用必妙

臘梨疣二八八

用杏仁百枚炒爲炭人葱白蜂蜜共搗爛先用花椒煎湯洗  
淨然後用此藥擦之新舊瘡瘍皆可用但勿見風方好

瘡瘍二方二八九

大楓子仁 木別仁 蛇床子各半兩 水銀三錢研散於內  
右先以刀刮去瘡痂花棗湯洗淨外用麻油熬成珠調藥敷  
之八日卽愈

又方 用猪骨髓和輕粉搗爛罨之過夜卽愈

頭面黃水肥瘍 二百九十 治小兒頭面患瘡濃汁作痒痂厚者名曰粘瘍當用此方或止用礬丹一味亦可○若作痒出水水到卽潰者名曰黃水瘍當用後一方

松香

枯礬

官粉

飛丹

右等分爲末麻油調傅或加香烟垢更效於香爐蓋上刮取用之○一方用菜豆松香等分爲末麻油調傅極效或內服荆防敗毒散等藥○又方用益元散加枯礬少半以麻油調敷大妙大妙

諸癬疥頑瘍

二九一

油核桃

大楓子

樟腦

水銀

右四色研勻擦之此治有蟲者大效○一丸無蟲而忽爾生瘡腫痛或濕爛者但以柏油擦之即可入忍

白虎丹二九二 發則頭面四肢眼目俱腫而惟額上指尖兩

耳不腫及不見赤色者方是其證

先將馬櫛洗淨用沸湯傾入蓋少傾頓出盆內浴之數次卽退○再用車前草九里香馬蹄香枸杞苗卽槿稜菜同搗爛和麻油遍身自上而下擦之○大忌鷄魚生冷炙燙日色火光燈烟湯氣極須謹慎

又方 用生香附末冷茶調服二錢卽愈

又方 捣綠荳水去渣飲三碗妙

紫白痕風歌

二九三

紫痕白瘢一般風

附子硫黃最有功

薑汁調勻茄蒂擦

若經三度永無踪

又歌

紫癩白癩兩服風

水銀輕粉最成功

名之方二四  
三  
摶取生薑自然汁

只須一擦便無踪

又方 治紫白癰汗班等風

雄黃 硫黃 黃丹

密陀僧

南星

右爲末先用葱擦患處次用薑蘸藥末擦之擦後漸黑次日再擦黑散則愈矣

又四神散

雄黃

雌黃

硫黃

明凡

各等分先浴令通身微汗以薑蘸擦之再以熱湯淋洗當日色淡五日除根

汗班四方

二十九四

大黃

二錢

枯礬

椒紅

各五

右用猪脂沙糖同搗爛俟浴起以細麻布包擦至痛而止數

目卽愈○或止目黃少入麻油研如糊浴用麻布蘸擦數次卽愈

又方

蜜陀僧

硫黃各三錢

輕粉二錢

雄黃一錢

人言五分

右爲末薑汁調用茄蒂蘸擦三日內不沐妙

又方

雌黃

雄黃各一錢

硫黃五分

麝半分

浴後薑蘸擦二三日勿洗

又方

硫黃一兩用醋煮半日海螵蛸三個共爲末浴後以生薑醃擦患處須避風少時數度卽愈

瘡瘍方二九五

瘡瘍全書

卷之六十四

三

用香油調鐵銹塗之○胃氣嘔者內服黃蓮解毒湯○胃氣弱者以漆毒侵犯中氣致虛多有作嘔不能飲食者宜用六君加砂仁藿香酒炒芍藥之類○又解漆毒法見因陣二三五

手足甲疽二九六

凡手足間或因修甲傷肉或因損足成瘡潰爛上脚用綠礬置鐵板上煅沸色赤如熔金色者爲真沸定取起研末以鹽湯洗搽

坐板瘡二九七 腫痛多膿者

蜜陀僧 生礬 大黃

等分爲極細末敷之

神效膏二九八 治臙瘡脚瘡

先看瘡形大小用綿紙裁成四

方疊十二張四角用小撲釘

仁聽用○外以好香油二兩用銅杓以文武火熬之先下花椒四十丸粒煎黑取起○次下槐炭長一寸者四十九節煎黑又取起○再次下黃柏一兩輕粉一分桔礬一分溶清却入前紙浸油內令透不可令急枝葱椒煎湯洗瘡令透拭乾乃紙蓋護乃用軟帛縛定一日取又貼之盡十二張無有不愈者

隔紙膏

二十九

治臙瘡神效

黃芪末

五錢

輕粉

乳

香

沒藥

各一錢

銀硃

一錢

血竭

五分

銅

綠

二分

右爲細末真香油調成膏搥油紙上再用油單紙一層以五刺孔數十掩膏藥上貼之一日一易其膏

二味隔紙膏

三百

治臙瘡濕毒瘡

此膏紙貼上外面再以油單

下揭去一層復用湯藥洗淨

取起聽用凡貼瘡時先將槐

下揭去一層復用湯藥洗淨

此膏紙貼上外面再以油單

下揭去一層復用湯藥洗淨

石膏

煅

枯礬

等分

右爲末用桐油調成膏作隔紙膏貼之更服荆防敗毒散如數劑不愈再服黃芪人參湯

爛腿瘡久不愈方

三百

用米糖卽膠飴也以碗盛於飯鍋內蒸化先用花椒荆芥防風等藥煎湯洗瘡爭乃將膠胎薄攤瘡上外以軟竹箬蓋定用絹縛之數日卽愈神效

凍瘡方

三百二

瀝青末

黃蠟 酒 一 麻油 二 同

右三味溶化搽患處

湯火六方

三百三

凡初被湯火所傷速用冷竈柴草夾一二升入鹽少許以涼水調如稀糊嘗味微鹹爲度用以厚攤傷處覺熱則易之連

易數次則火毒皆拔於灰中必腫消隨散結痂而愈誠神妙  
方也

又方一治潰爛腫痛者 用生桐油調人中白敷之卽愈亦  
妙方也

又方 用皂礬研細和以冷水澆傷處其疼立止其腫即消

又方 用大黃芒硝等分爲末之子清調貼之神效

又方 用石膏末香油調敷卽愈

又赤石脂散 治湯火傷肉爛赤痛

赤石脂

寒水石

大黃等分

右爲末新汲水調塗

湯火至聖膏

三百四

治湯火傷瘡用雞子黃置銀石器內放油調胡粉傅之○錦  
衣楊永興厨下夜間回祿凡睡此房已死將死者灌以生蘿

葛汁良久悉愈凡遇此患者以此治之其應如響

湯火上痛散

三百五

止痛生肌

大黃末

炒微

當歸末

等分

右用麻油調擦或乾擦亦可

小兒丹毒

三百六

此毒多生頭面四肢色赤或腫遊走不定甚者宜用前磁鋒砭法使毒血遇刺皆出更以神功散傳之內服荆防敗毒散或五福化毒丹若使毒氣入腹則不治或愈而復發皆因母食辛辣炙燭以致內熱宜於母藥中加漏蘆煎服或令自服亦愈

小兒鵝口

三百七

凡小兒口內白屑滿口者爲鵝口瘡則不能飲乳用髮或軟繩纏指蘸土水拭舌上便淨如屑不能脫濃煮粟米湯以綿

繩筋頭拭洗却用飛過黃丹擦之

加味太乙膏

三百八

一切瘡瘍並

且貼之先用隔蕊火更服

活命飲以收全功

當歸

生地黃

芍藥

玄參

大黃

各二兩

加甘草

四兩

用麻油一斤煎丹收

景岳會通膏

三百九

凡諸癰瘍疼塊風氣骨節疼痛無所不

治

人黃

木別仁

當歸

川芎

芍藥

生地

麻黃

細辛

白芷

防風

荆芥

蒼朮

羌活

川烏

甘草

烏藥

南星

半夏

香附

官桂

蒼耳

骨碎補

草烏

艾葉

皂角

枳殼

三稜

蓬朮

蘿蔔子

水紅花子

巴豆

五棓子

獨活

桃仁

蘇木

紅花

續斷

連翹

梔子

苦參

槐花

皂刺

乾薑

草麻子

透骨草

晒乾

穿山甲

全蝎

蘆薈

蜂房

各一兩

蛇退

一條

蜈蚣

十四根

蝦蟆

二隻

血餘

團

獨蒜

四頭

藥十味

二兩

阿魏

二兩

乳香

製

沒藥

製各兩

木香

右五十四味用麻油五斤浸三日先煎血餘草麻水別桃仁  
巴豆蝦蟆獨蒜待半枯然後入餘藥煎黑去滓丹收後下細  
藥十味

丁香

兒茶

五

麝香

不拘一  
二錢

雄黃

硫砂

血竭

右麝香丁香木香三味宜最後下之以上收油法凡熬成熟油一斤下飛淨好紅丹八兩若欲微嫩則止下七兩五錢神異膏三百十治癰疽瘡毒及收口甚效此瘡疽中第一方也

麻油

二斤

黃丹

十二兩

黃芪

杏仁

玄參

各兩

蛇脫

半兩

男髮

如雞子一團

蜂房

千多者佳一兩

右先以黃芪杏仁玄參入油煎至將黑乃入蛇脫蜂房亂髮再煎至黑去粗徐徐下丹慢火煎收黃丹不必拘數但以得中爲度凡膏藥用久必至老硬煎時預留嫩膏少許如便量

和之

清涼膏

三

治一切瘡瘍潰後宜用之

當歸

二兩

白芷

白芨

木別子

黃柏

五兩

白歛

十二兩

乳香

目膠香

鎔五

右用油煎前六味以槐柳枝順攪油熟丹收然後下乳香等

三味

阿魏膏

三一

治一切痞塊更服胡連丸

羌活

獨活

玄參

官桂

赤芍藥

川山甲

生地黃

兩頭尖

大黃

白芷

天麻

紅花

木鱉

十枚去殼

亂髮

一團

槐柳桃枝

各半兩

右用麻油二斤四兩煎藥黑去粗入髮再煎髮化乃去粗八上好真正黃丹煎收軟硬得中入後細藥卽成膏矣

阿魏

芒硝

蘇合油

乳香

沒藥各  
錢

五

麝香

三錢

右貼膏

藥須先用朴硝隨患處鋪半指厚以紙蓋用熱熨

斗熨良久

如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥若是肝積加

蘆薈末同

熨之

硃砂膏

三二

治一切頑瘡破瘡杖瘡癰疽發背破傷者最

妙最佳

麻油一

斤

飛母六兩

水銀一兩

硃砂

佳者一  
兩牛飛

好黃蠟

四兩

先下油熬數沸下雜子二枚敲開連殼接之熬焦櫟去子退

火俟油定

下水銀五錢再加微火攪熬飯頃即入丹漸收成

膏後下黃

占再攪候大溫下極細好硃砂一兩五錢攪勻磁

罐收貯

神效當歸膏

三二四

治一切發背瘡瘍湯火疼痛等證去腐

肉生新肉 其效如神凡洗拭換膏必須預備卽貼之新肉畏  
風故也如 用白蠟尤好此藥生肌止痛補血續筋故與新肉  
和宜

當歸

生地黃

黃蠟

各二兩

白蠟當咸牛

麻油六兩

右先將當歸地黃各一兩入油煎黑去粗又將二味各八一  
兩煎至微焦復去滓乃入蠟溶化候冷攪勻卽成膏矣用塗  
患處以紙蓋之如有死肉須用利刀剪去則生肌尤速  
三一五 亦名乾坤一炁膏○專攻瘡塊諸瘍毒  
攻堅敗毒膏

痔瘻

當歸

熟地

生地

白芍藥

赤芍藥

南星

半夏

三稜

蓬朮

木別

兩頭尖

川山甲

巴豆仁

肉桂

五靈指

桃仁

續斷

玄參

玄胡索

草麻子仁

白芷

羌活

獨活

大黃

紅花

川烏

草烏

蕪木

川芎

防風

杏仁

杏仁

右用麻油四十兩浸諸藥

三日桑柴火煎成丹收後下細藥

乳香  
製

沒藥  
製各一兩

真阿魏

半兩

麝香  
三錢

右方於細藥中加盧薑木一齊各二兩蟬酥三錢卽名消瘡大成膏

消瘡膏

三十六

三移

蓬术

川牛膝

木別仁

杏仁

水紅化子

蘿蔔子

透骨草

晒乾

大黃  
各一兩

獨頭蒜

四個

右用香油

一斤入前藥十味前油成以飛丹收之後下細藥

七十五

真阿魏

乳香

沒藥各一兩

麝香三錢

右先下乳沒阿魏三味後不麝香攢勻待冷傾水中浸數日用磁瓶收貯勿使洩氣用時以白布或堅白紙攤貼八九日一換或見大便去膿血勿以爲異亦有不去膿血而自愈者若沾瀉痢可貼臍腹忌房事生冷○凡貼癰積痞塊先用薺麥麴和作一圈圍住患處四邊其塊上放皮硝二三兩蓋厚紙以熨斗熨令熱氣內達然後去硝用膏藥貼之○右原方用白花菜同透骨草另煎膏二兩攢入膏內收用但白花菜惟西北方間有之求覓不易故余用獨蒜蘿蔔子代之其功亦不減也

琥珀膏三一七

治頸項癰瘍及腋下初結小核漸加連珠不

消不潰或潰而膿水不絕經久不瘥或成漏證

琥珀

白芷

防風

當歸

木別子

木通略一

丁香

杜心

硃砂

木香

松香各半

麻油二斤

右先將琥珀等六味爲末其餘藥入油煎黑瀝去粗徐入黃丹再煎軟硬得中入前藥成膏貼之

貼瘡琥珀膏

三一八

貼癥積痞塊

大黃朴硝各一兩爲末以大蒜同搗膏貼之

水紅花膏

三一九

貼瘡塊

用水紅花或子每一碗以水三碗用桑柴文武火熬成膏量  
瘡大小用紙攤貼以無形爲度仍將膏用酒調服忌食腥油  
膩不飲酒者白湯下

火龍膏

三百二十

治風寒濕毒所襲筋骨掣痛及濕痰流注

經絡壅痛不能行步並治歷襲風鶴膝風其效如神

生薑

八兩取汁

乳香爲末

沒藥爲末各半

五錢

麝香一錢

真牛皮廣膠二兩

右先將鹽汁並膠熔化方下乳香沒藥調勻待少溫下麝香  
卽成膏矣攤貼患處更服五積散如鶴膝風須服大防風湯

趙府膏三十二

專貼疼痛腫毒

乾蠍蕊三個

全蝎

僵蚕一錢

蜈蚣四條

班蝥四十個

商陸根一錢

花椒一錢

童子髮六分

雞內金二個

槐枝四十根

細藥

兒茶

乳香

沒藥

血竭

龍骨

黃柏

白芷各五錢

麝香一錢

右用麻油二斤煎飛丹收

蜜陀膏三十二

此膏治癰

濕諸瘡癰痛等證神效凡治疼痛

先以葱薑擦患處上後貼之

先用密器一斤打碎將童便煮之覺其濁性去而童便氣清乃可止矣用便煮過則貼瘡不痛瞭乾研極細如麯候用

用桐油不拘幾斤熬至將黑爲度每熟油一斤用附僧六兩收之於將成膏之頃取起離火候稍涼涼膏多少入冷水數碗徐攪之恐其泛出俟少定即過去其水再上火熬化復入水數碗攪逼如前或二次更妙然後熬淨其水每油一斤再入官粉二兩熬政其色方黑凡熬此者銅鍋須大方可用

八仙紅玉膏三三三 治諸瘡

龍骨

赤石脂

兒茶

血竭

沒藥

乳香洛

輕粉

五分或一錢

水片三分

右用麻油二兩大當歸五錢煎枯去滓八龍石茶竭四味再煎一二沸次入乳沒藥煎勻後入黃古五錢溶化冷定入輕

水攤貼

碧油膏 三二四

止癟排膿後宜用之

桃枝

柳枝

桑枝

槐枝 酪二

乳香

另研

血竭

錢五

黃丹

四兩淨

長肉膏 三二五

人參

黃芪

當歸

夜合樹皮

立參

各一兩

血餘

三兩

老鼠

一個

細藥

血竭

龍骨

赤石脂

白朮 各一錢

右用麻油一斤煎飛丹收

保養元氣膏 三二六

此膏助元陽補精髓通血脉鎮玉池養

龜存精百戰百勝待婦人經淨之取去膏而泄則可成孕並

治腰膝疼痛五勞七傷諸虛百損牛身不遂膀胱疝氣滯澀  
滌淋陰痿不舉無不效者此邵東人進

御方也

麻油一斤四兩入甘草二兩生熟六七滾然後下諸藥

生地黃

熟地黃

俱酒洗

麥門冬

肉蓯蓉

酒洗

遠志肉

鴆床子

酒浸

兎絲子

酒浸

牛膝

酒洗

鹿茸

川續斷

虎骨

紫稍花

木別仁

谷精草

大附子

肉桂

右熬成以煮過松香四兩飛丹半斤收之次下細藥  
次下龍骨 倭硫黃 赤石脂 鐘乳

又次下乳香

沉香

丁香

木香

錢一

又次下陽起石

三錢

麝香

五分

樟酥

又次下黃柏五兩 右煎成人苦浸三四日每用膏七八

錢紅絹擗貼臍上或腰眼間每貼五六十日再換

煮松香法

三二七

凡用松香收膏藥者必用水多煮二三遍

去其澀燥之性方可貼瘡不痛○若用貼癰瘡血塊則當加

藥如後法煮過用之方妙

大都松香三斤

用皮硝一碗

水紅花四兩

大黃

當歸

生地

三稜

蓬木

略一

右藥七味用水一桶先熬汗去滓淨用者松香徐徐添入以  
汁完爲度收用之極佳○一收油之法凡煮過松香一斤入  
熬熟藥油五兩卽成膏矣

以下通用方

四君子湯

三二八

方在補脾

治瘍瘍脾胃虛弱或因尅伐腫痛不散潰斂不能宣用此以  
補脾胃諸證自愈若誤用攻毒則七惡隨至脾胃虛弱飲食  
少思或食而難化或欲作嘔或大便不實若脾胃氣虛瘍口  
吐血便血尤宜用之蓋氣能攝血故也凡氣血俱虛之  
人此湯但加當歸脾胃既旺飲食自進陰血自生若用

劑脾胃復傷諸症辨起

卷二二九 方在補陣五

壯營氣則諸證自愈  
胃虛弱或寒涼尅伐腫痛不消或不潰斂宜服此湯以

加味四君子湯

三三三十

方在補陣二

治痔漏下血面色痿黃凡諸氣虛脾虛不能攝血等證

四物湯

二二一

方在補陣八

治瘍瘍血虛發熱或因失血或因尅伐或因潰後致晡熱內

熱煩燥不安皆宜服之蓋血生於脾脾虛不能生血者宜用四君子加當歸酒炒白朮以補脾

八珍湯 三三二 方在補陣十九

治瘡瘍脾胃損傷惡寒發熱煩躁作渴或瘡瘍潰後氣血虧損膿水清稀久不能愈

十全大補湯 三三三 方在補陣二十

治瘡瘍氣血虛弱腫痛不愈或潰瘍膿清寒熱自汗盜汗食少體倦發熱作渴頭痛眩暉似中風狀者

補中益氣湯 三三四 方在補陣二十一

治瘡瘍元氣虧損惡寒發熱或因戰伐肢體倦怠飲食少思或不能起發消散生肌收斂或兼飲食勞倦頭痛身熱煩躁作渴脉洪大弦虛或微細○軟弱

歸脾湯 三三五 方在補陣二十三

治瘍瘍憂思傷脾血虛發熱食少體倦或脾不攝血以致妄行吐下或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體腫痛大便不調或婦人經候不調或熱內熱或脣瘡流注及不能消散潰斂等症

獨參湯

二三六

方在補陣三十六

治瘍瘍一切失血或膿水出多氣血俱虛惡寒發熱作渴煩躁益血生於氣故血脫者宜補氣陽生陰長之理也用人參一兩棗十枚蜜十片水煎徐徐服

人參養營湯

二三七

方在補陣二十一

治瘍瘍脾胃虧損發熱惡寒血氣俱虛四體倦怠肌肉消瘦面色痿黃汲汲短氣食少作渴凡大病後最宜用此

五味異功散

二三八

方在補陣四

治脾胃虛弱飲食少思卽四君子湯加陳皮

生脉散三三九

方在補陣五七

治瘡瘍冒氣虧損陰火上衝口乾喘促或肢體倦怠肌肉消瘦面色瘡黃汲汲短氣汗出不止食少作渴或膿水出多氣血俱虛煩躁不安睡臥不寧或濕熱大行火土合病脾胃虛弱身重氣短或金爲火制絕寒水生化之源肢體痿軟脚歇眼黑等症

當歸補血湯三百四十

方在補陣四五

治瘡瘍脾胃虛損或服峻劑致血氣俱虛肌熱大渴引飲目赤面紅晝夜不息其脉洪大而虛重按全無此病多得於飢飽勞役者若誤服白虎湯必死

黃芪六一湯三四一

方在補

陣五十

治瘡瘍陰陽俱虛盜汗不止

參术膏三四二

方在補陣四

十

治瘡瘍中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛症  
蜂起但用此藥補其中氣諸症自愈

東垣聖愈湯

三四三

方在補陣九一

治脾胃虧損膿水不止或金瘡出血心煩不安眠睡不寧五  
心煩熱飲食少思

錢氏七味白朮湯

三四四

方在小兒七

陳氏五味子湯

三四五

方在補陣五九

治瘡瘍胃氣虛弱或因戰伐或因吐瀉口乾作渴飲食少思

參附湯

三四六

方在補陣三十八

治瘡瘍失血過多或膿瘀大泄或寒涼汗下真陽脫陷上氣  
喘急自汗盜汗氣短頭暈等證急服此湯以救元氣緩則不  
治

人參理中湯

三四七

方在熱陣一

治瘡瘍脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少思肚腹作脹或痛或脇  
膈虛痞飲食不入

六味丸

三四八

方在補陣百二

此壯水之劑夫人之生以腎爲主凡病皆由腎虛而致此方  
乃天一生水之劑無有不用者若腎虛發熱作渴小便淋  
秘痰氣壅盛欬嗽吐血頭目眩暈小便短少眼花耳聾咽喉  
燥痛口舌瘡裂齒不堅固腰腿痠軟五臟齊損肝經不足等  
症尤多用之水能生木故也若腎虛發熱自汗盜汗便血諸  
血失瘡此水泛爲痰之聖藥血虛發熱之神劑也

八味丸

三四九

方在補陣百二二

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒而患流注鶴膝等症  
不能消潰收斂或飲食少恩或食而不化腰腹疼痛夜多涎

溺

陳氏加減八味丸

三百五十

方在古補百二三

治腎水不足虛火土炎發熱作渴咽喉疼痛口舌生瘡寢汗憔悴等證

還少丹

三五二

方在補陣一三七

治足三陰經虛損致患鶴膝風等證又補脾腎進飲食之良劑也

大防風湯

三五二

方在補陣九九

治足三陰虧損外邪乘虛內患鶴膝風或附骨疽腫痛或腫而不痛不問已潰未潰用三五劑後更全用調補之劑

十宜散

三五三

方在痘疹十四

治瘡瘍脉緩澀體倦惡寒或脈浮緊細用之以散風助陽也

薛氏四神丸

三五四

方在補陣一五二

治瘡瘍脾胃虛弱大便不實飲食少思或小腹作痛或產後泄瀉肚腹作痛不思飲食

五積散

三五五

方在散陣三九

治風寒濕毒容於經絡致筋攣骨痛或腰脚痠疼或拘急或身重並皆治之

二陳湯

三五六

方在和陣一

治癰癧中脘停痰嘔吐惡心或頭目不清飲食少思等症

小柴胡湯

三五七

方在散陣十九

治肝膽經風熱癰癧結核或腫痛色赤或寒熱往來或發熱或潮熱身熱默默不欲飲食或怒火口苦耳聾欬嗽皆用此藥

小青龍湯

三五八

方在散陣八

治肝肺受寒欬嗽喘息宜服此發散表邪

人參敗毒散

三百五十九

方在散陣三六

治瘡瘍外有表邪焮痛寒熱或拘急頭痛脉緊有力

不換金正氣散

三百六十

方在和陣二二

治瘡瘍脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發寒熱服此以正  
脾氣則痰氣自消寒熱不作

加味逍遙散

三六一

方在補陣九四

治瘡瘍肝脾血虛內熱發熱或遍身搔痒寒熱或肢體作痛  
頭目昏重或怔忡頰赤口燥咽乾或發熱盜汗食少不寐或  
口舌生瘡耳內作痛或胸乳腹脹小便欠利

防風通聖散

三六二

方在攻陣十六

治時毒熱毒便秘熱燥邪實等症若非大満大實者不可輕

用此藥

消風散

三六三

方在散陣四七四九

治風熱癰瘍瘙痒及婦人血風癰痒或頭皮腫痒或諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻出清水噴嚏聲重耳作蟬鳴

犀角散三六四

方在痘疹六三

治時毒癰瘍熱盛煩躁多渴赤班等症

黃蓮解毒湯三六五

方在寒陣一

治瘡瘍焮痛煩躁飲冷脉洪數或發狂言

普濟消毒飲三六六

方在寒陣十三

治天行時毒頭面腫痛或咽喉不利若饑餓之後患此者最宜用之仍當兼固胃氣

梔子清肝散三六七

方在寒陣六十

治三焦足少陽風熱耳內作痒生瘡或出水疼痛或胸乳間作痛或寒熱往來

柴胡清肝散三六八

方在寒陣五九

治鬢疽及肝膽三焦風熱怒火之症或項脢作痛或瘡毒發

熱

加味龍膽瀉肝湯

三十六丸

方在寒陣六四

治肝經濕熱或囊癰便毒下注懸癰欣腫作痛或潰爛不愈  
或睾丸懸掛小便澁滯或婦人陰瘡痒痛或男子陰挺痔漏  
腫痛或出膿水

清心蓮子飲

三百七十

方在寒陣三二

治膀胱陰虛濕熱玉莖腫痛或莖竅澁滯口苦咽乾小便色  
赤或白濁夜安靜而書發熱

黃芩清肺飲

三七一

方在寒陣三八

治瘡瘍肺經陰虛火燥而小便不通

陳清胃散

三七二

方在寒陣五四

治膏梁積熱唇口腫痛齒齦潰爛焮痛上連頭面或惡寒發

熱

竹葉石膏湯 三七三 方在寒陣五

治癰疽胃火盛腫痛作渴

竹葉黃芪湯 二七四 方在寒陣七

治癰疽氣血虛胃火盛而作渴

滋腎丸 三七五 方在寒陣一六三

治瘡瘍腎經陰虛發熱作渴便赤足熱腿軟等證凡不渴而小便秘熱在下焦血分也最宜此藥經云無陰則陽無以化若肺脾燥熱所移此當清其化源

瀉青丸 二七六 方在寒陣百五一

治肝經實熱瘰疬腫痛寒熱或脇乳作痛大便秘結

大蘆薈丸 三七七 方在小兒百十五

治肝火下疳潰爛或膿腫作痛或治小兒疳膨食積口鼻生

瘡牙齦腫爛等瘡並虫蝕肛門痒痛

五苓散

三七八

方在和陣一八二

治瘡毒下部濕熱小便短少

五淋散

三七九

方在寒陣百十七

治膀胱有熱水道不通或尿如豆汁或如砂石或如膏油或  
熱沸便血

八陣散

三百八十

方在寒陣百十五

治下疳便毒小便淋漓脉證俱實者

清肺飲

三八一

方在和陣三五一

治瘡瘍渴而小便不利乃肺經有熱是絕寒水生化之源宜  
用此藥以清化源其水自生而便自利

益元散

三八二

方在寒陣百十二

治瘡瘍小水不利內生煩熱作渴

四順清涼飲 三八三 方在攻陣二五

治瘡瘍煩躁飲冷嗽痛脈實大便秘結小便赤澁

玉燭散 八三四

治便癰初起腫痛發熱大小便秘宜用此行散之若邪實毒甚者宜桃仁承氣湯

大參平肺散

三八五

方在寒陣三七

治火尅肺金傳爲疽瘻欬嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽喉不利

芩蘚大棗瀉肝湯

三八六

方在和陣百四十

治肺證胸膈脹痛上氣喘急或身面浮腫鼻塞聲重

枳殼散

三八七

方在寒陣百一

治煩熱便血

矢笑散

三八八

方在婦人百四