

巢氏諸病源候總論卷三十一

癰瘤等病諸候

凡一十五論

癰候

癰者由憂恚氣結所生亦曰飲沙水沙隨氣入於脈搏
頸下而成之初作與櫻核相似而當頸下也皮寬不急
垂搥搥然是也恚氣結成癰者但垂核搥搥無脈也飲
沙水成癰者有核癰癰無根浮動在皮中又云有三種
癰有血癰可破之有息肉癰可割之有氣癰可具針之
養生方云諸山水黑土中出泉流者不可久居常食令
人作癰病動氣增患

瘤候

巢氏諸病源候總論卷三十一

癰瘤等病諸候 凡一十五論

癰候

癰者由憂恚氣結所生亦曰飲沙水沙隨氣入於脈搏
頸下而成之初作與櫻核相似而當頸下也皮寬不急
垂搥搥然是也恚氣結成癰者但垂核搥搥無脈也飲
沙水成癰者有核癟癟無根浮動在皮中又云有三種
癰有血癰可破之有息肉癰可割之有氣癰可具針之
養生方云諸山水黑土中出泉流者不可久居常食令
人作癰病動氣增患

癰候

癰候

卷三十一

一

瘤者皮肉中忽腫起初梅李大漸長大不痛不痒又不
結強言留結不散謂之爲瘤不治乃至塹大則不復消
不能殺人亦慎不可輒破

腦濕候

腦濕謂頭上忽生肉如角謂之腦濕言腦濕氣蘊蒸衝
擊所生也

黑痣候

黑痣者風邪搏於血氣變化生也夫人血氣充盛則皮
膚潤悅不生疵瘕若虛損則黑痣變生然黑痣者是風
邪變其血氣所生也若生而有之者非藥可治面及體
生黑點爲黑痣亦云黑子

赤疵候

面及身體皮肉變赤與肉色不同或如手大或如錢大亦不痒痛謂之赤疵此亦是風邪搏於皮膚血氣不和所生也

白癥候

白癥者面及頸項身體皮肉色變白與肉色不同亦不痒痛謂之白癥此亦是風邪搏於皮膚血氣不和所生也

癰瘍候

癰瘍者人有頸邊胷前披下自然斑剝點相連色微白而圓亦有烏色者亦無痛痒謂之癰瘍風此亦是風邪

搏於皮膚血氣不和所生也

疣目候

疣目者人手足邊忽生如豆或如結筋或五箇或十箇相連肌裏粗強於肉謂之疣目此亦是風邪搏於肌肉而變生也

鼠乳候

鼠乳者身面忽生肉如鼠乳之狀謂之鼠乳也此亦是風邪搏於肌肉而變生也

多忘候

多忘者心虛也心主血脈而藏於神若風邪乘於血氣使陰陽不和時相并隔乍虛乍實血氣相亂致心神虛

損而多忘

養生方云丈夫頭勿北首臥神魂不安多愁忘

嗜眠候

嗜眠者由人有腸胃大皮膚澀者則令分肉不開解其氣行則於陰而遲留其陽氣不精神明爽昏塞故令嗜眠其湯熨針石別有正方補養宣導今附于後

養生方導引法云蹠交兩手內並腳中入且兩手急引之愈久寐精氣不明交脚蹠凡故言蹠以兩手從內屈腳中入左手從右趺蹠上入左足隨孔下右手從左足蹠上入右足隨孔下出抱兩脚急把兩手極引二通愈久寐精神不明久行則不睡長精明

又云一手拓頰向上極勢一手向後長舒急努四方顯手掌一時俱極勢四七左右換手皆然拓頰手兩向共頭欹側轉身二七去臂髀風眠睡尋用永吉日康

鼾眠候

鼾眠者眠裏喉咽間有聲也人喉嚨氣上下也氣血若調雖寤寐不妨宣暢氣有不和則衝擊喉咽而作聲也其有肥人眠作聲者但肥人氣血沉厚迫隘喉間澀而不利亦作聲

體臭候

人有體氣不和使精液雜穢故令身體臭也其湯熨針石別有正方補養宣導今附于後

養生方云以手掩口鼻臨目微氣久許時手中生液速
以手摩面目常行之使人體香

狐臭候

人腋下臭如葱豉之氣者亦言如狐狸之氣者故謂之
狐臭此皆血氣不和蘊積故氣臭

漏腋候

腋下常濕仍臭生瘡謂之漏腋此亦是氣血不和爲風
邪所搏津液蘊瘀故令濕臭

丹毒病諸候

凡一十三論

丹候

丹者人身體忽然焮赤如丹塗之狀故謂之丹或發手

足或發腹上如手掌大皆風熱惡毒所爲重者亦有疽之類不急治則痛不可堪久乃壞爛去膿血數升若發於節閒便流之四支毒入腸則殺人小兒得之最忌

白丹候

白丹者初發痒痛微虛腫如吹軫軫起不痛不赤而白色由挾風冷故使色白也

黑丹候

黑丹者初發亦痒痛或燔腫起微黑色由挾風冷故色黑也

赤丹候

赤丹者初發軫起大者如連錢小者如麻豆肉上粟如

雞冠肌理由風毒之重故使赤也亦名茱萸丹

丹軫候

丹軫者肉色不變又不熱但起隱軫相連而微痒故謂爲丹軫也

室火丹候

室火丹初發時必在腓腸如指大長三二寸瘦色赤而熱是也

天竈火丹候

天竈火丹發時必在於兩股裏漸引至陰頭而赤腫是也

廢竈火丹候

廢竈火丹發時必於足趺上而皮色赤者是也

尿竈火丹候

尿竈火丹發於胷腹及臍連陰頭皆赤是也

熛火丹候

熛火丹者發於背亦在於臂皮色赤是也

癟火丹候

癟火丹者發於髀而散走無常處著皮赤是也

螢火丹候

螢火丹者發於髀至脇皮赤是也

石火丹候

石火丹者發通身似纈目突如粟是也皮色青黑

腫病諸候

凡一十七論

諸腫候

腫之生也皆由風邪寒熱毒氣客於經絡使血澀不通壅結皆成腫也其風邪所作者腫無頭無根浮在皮上如吹之狀也不赤不痛或腫或散不常腫其寒氣與血相搏作者有頭有根色赤腫痛其熱毒作者亦無正頭但急腫久不消熱氣結盛壅則爲膿其候非一故謂之諸腫

風腫候

凡人忽發腫或著四支或在脅背或著頭項水牢如胖大虛腫回回如吹之狀不痛不赤著四支者乃欲不遂

令人煩滿短氣身體常冷皆由冬月遇溫風入人肌裏至春復適大寒風不得出氣壅肌閒不自覺至夏取風涼濕氣聚不散而成腫久不瘥氣結盛生熱乃化爲膿血並皆爛敗則殺人右手關上脈浮而虛者病腫

卒風腫候

人卒有腫不痛不赤移無常處而兼痒由先無患偶腠理虛而逢風所作也

風毒腫候

風毒腫者其先赤痛飈熱腫上生癰漿如火灼是也

毒腫候

毒腫之候與風腫不殊時令人壯熱其邪毒甚者入腹

殺人

毒腫入腹候

此候與前毒腫不殊但言腫熱漸盛入腹故也毒入腹之候先令人嗇嗇惡寒心煩悶而嘔逆氣急而腹滿如此者殺人

惡核腫候

惡核者肉裏忽有核累累如梅李小如豆粒皮肉燥痛左右走身中卒然而起此風邪挾毒所成其亦似射工毒初得無常處多惻惻痛不卽治毒入腹煩悶惡寒卽殺人久不瘥則變作瘻

腫核候

凡腫挾風冷則不消而結成核也

氣腫候

氣腫者其狀如癰無頭虛腫色不變皮上急痛手纔著便卽痛此風邪搏於氣所生也

氣痛候

人身忽然有一處痛如打不可堪耐亦乍走身閒發作有時痛發則小熱痛靜便如冰霜所加故云氣痛亦由體虛受風邪所侵遇寒氣而折之邪氣不出故也

惡脈候

惡脈者身裏忽有赤絡脈起龍蛇聚如死蚯蚓狀看似有水在脈中長短皆逐其絡脈所生是也由春冬受

惡風入絡脈中其血瘀結所生久不瘥緣脈結而成瘻

惡肉候

惡肉者身裏忽有肉如小豆突出細細長乃如牛馬乳亦如雞冠之狀不痒不痛久不治長不已由春冬被惡風所傷風入肌肉結瘀血積而生也

腫有膿使潰候

腫壯熟結盛則血化爲膿若不早出膿膿食筋爛骨則不可治也

腫潰後候

凡癰腫既潰訖膿汁須及時而盡若汁不盡還復結腫如初腫之候無異卽稍難治

游腫候

游腫之候青黃赤白無復定色遊走皮膚之間肉上微光是也

日遊腫候

日遊腫其候與前遊腫相似但手近之微痛如復小痒爲異世言犯觸日遊神之所作

流腫候

流腫凡有兩候有熱有冷冷腫者其痛隱隱然沉深著臂膊在背上則腫起憑憑然而急痛若手按及針灸之卽腫起是也熱腫者四支熱如火炙之狀移無常處或如平或如盤著背腹是劇則背熱如火徧身熠熠然五

心煩熱脣口乾燥如注之狀此皆風邪搏血氣所生以其移無常處故謂流腫

丁瘡病諸候

凡一十三論

丁瘡候

丁瘡者風邪毒氣於肌肉所生也凡有十種一者瘡頭烏而強凹二者瘡頭白而腫實三者瘡頭如豆塗色四者瘡似葩紅色五者瘡頭內有黑脈六者瘡頭赤紅而浮虛七者瘡頭葩而黃八者瘡頭如金薄九者瘡頭如茱萸十者瘡頭如石榴子亦有初如風軫氣搔破青黃汁出裏有赤黑脈而小腫亦有全不令人知忽以衣物觸及摸著則痛若故取便不知處亦有肉突起如魚眼

之狀赤黑慘痛徹骨久結皆變至爛成瘡瘍下深孔如
大針穿之狀初作時突起如丁蓋故謂之丁瘡令人惡
寒四支強痛兼忉忉然牽疼一二二日瘡便變焦黑色腫
大光起根鞚強全不得近酸痛皆其候也在手足頭面
骨節閒者最急其餘處則可也毒入腹則煩悶恍惚不
佳或如醉患此者三二日便死

養生方云人汗入諸食內食之作丁瘡

雄丁瘡候

雄丁瘡者大如錢孔烏麤似灸瘡四畔泡爛色赤又有
赤粟乃言瘡而不腫刺之不痛而兼熱者名爲雄丁瘡

雌丁瘡候

雌丁瘡者頭小黃向裏壓亦似灸瘡四畔泡漿外赤大如錢孔而多汁腫而不痛瘡內有十字畫而兼冷者謂之雌丁瘡

紫色火赤丁瘡候

此瘡色紫赤如火之色卽謂紫色火赤丁瘡也

牛丁瘡候

牛丁瘡皮色不異但腫而頭黑挑之黃水出四邊赤似茱萸房者名爲牛丁瘡

魚臍丁瘡候

此瘡頭黑深破之黃水出四畔浮漿起狹長似魚臍故謂之魚臍丁瘡

赤根丁瘡候

瘡形狀如赤豆或生掖下如鴨子大者世人不識但見其赤卽謂之赤根丁瘡

犯丁瘡候

犯丁瘡謂丁瘡欲瘥更犯觸之若大嗔及食猪魚麻子并狐臭人氣熏之皆能觸犯之則更劇乃甚於初更令熱焮腫先寒後熱四支沉重頭痛心驚嘔逆煩悶則不可治

丁瘡腫候

丁瘡腫謂此瘡熱氣乘之與寒毒相搏而成腫

犯丁瘡腫候

犯丁瘡腫謂瘡腫欲瘥更犯觸之瘡勢轉劇乃甚於初或腫熱疼掣或心悶恍惚或四肢沉重或嘔逆煩心此皆犯瘡之候多殺人

丁腫候

此猶是丁瘡而帶焮腫而無根者也

丁瘡久不瘥候

瘡久不瘥謂此丁瘡膿汁不止亦平陷不滿皆由過冷所作也

犯丁腫候

犯丁腫謂病丁腫而或飲食或居處觸犯之令腫增劇也

里丁醜醜

明子醜

祖爭也

叢人本無期也丁缺點也本主本不確人無點也

丁缺人不皇疑

缺者是缺缺而帶缺謂而無缺者也

丁醜分

吉爭者之財多貳人

更醜慈寡妻更少門神也更四娘清更五娘醜皖南建德
於丁醜醜醜醜醜更少醜之聲撲轉醜周氏校刊

巢氏諸病源候總論卷三十二

癰疽病諸候上 凡一十六論

癰候

癰者由六腑不和所生也六腑主表氣行經絡而浮若喜怒不測飲食不節陰陽不調則六腑不和榮衛虛者腠理則開寒客於經絡之間經絡爲寒所折則榮衛稽留於脈榮者血也衛者氣也榮血得寒則澀而不行衛氣從之與寒相搏亦壅遏不通氣者陽也陽氣蘊積則生於熱寒熱不散故聚積成癰腑氣浮行主表故癰浮淺皮薄以澤夕則熱勝於寒熱氣蘊積傷肉而敗肌故血肉腐壞化而爲膿其患在表浮淺則骨髓不焦枯腑

臟不傷敗故可治而愈也又少苦消渴年四十已外多
發癰疽所以然者體虛熱而榮衛否澀故也有鬲痰而
濕者年盛必作黃疽此由脾胃虛熱故也年衰亦發癰
疽腑臟虛熱血氣否澀故也又腫一寸至二寸癰也一

寸至五寸癰也五寸至一尺癰疽也一尺至三尺者名
曰竟體癰疽成九竅皆出諸氣憤鬱不遂志欲者血氣
畜積多發此疾診其寸口脈外結者癰腫腎脈濇甚爲
大癰脈滑而數滑卽爲實數卽爲熱滑卽爲榮數卽爲
衛榮衛相逢則結爲癰熱之所過卽爲膿也脈弱而數
者此爲戰寒必發癰腫脈浮而數身體無熱其形默默
者胃中微躁不知痛所在此主當發癰腫脈來細而沉

時直者身有癰腫若腹中有伏梁脈肺肝俱到卽發癰疽四支沉重肺脈多卽死凡癰疽脈洪龐難治脈微澀者易愈諸浮數之脈應當發熱而反洗滌惡寒若痛處當有癰也此或附骨有膿也脈弦洪相薄外內急熱故欲發癰疽凡發癰腫高者疹源淺腫下者疹源深大熱者易治小熱者難治初便大痛傷肌晚乃大痛傷骨諸癰發於節者不可治也發於陽者百日死發於陰者四十日死也尻太陽脈有腫癰在足心少陽脈八日死發膿血八十日死頭陽明脈有腫癰在尻六日死發膿血六十日死股太陽太陰脈有腫癰在足太陽七十日死發膿血百日死髀太陽太陰脈有腫癰在脛八日死發膿血四

百日死足少陽脈有腫癰在脇八日死發膿血六百日
死手陽明脈有腫癰在掖淵一歲死發膿血二歲死發
腫牢如石走皮中無根瘰癧也久久不消因得他熱乘
之時有發者亦爲癰也又手心主之脈氣發有腫癰在
股脛六日死發膿血六十日死又有癰在腓腸中九日
死也

養生方云五月勿食不成核果及桃棗發癰癧不爾發
寒熱變爲黃疸又爲泄利

又云人汗入諸食中食之則作丁瘡癰癧也

癰有膿候

此由寒氣搏於肌肉折於血氣結聚乃成癰凡癰經久

不復可消者若按之都牢聊者未有膿也按之半牢半軟者有膿也又以手掩腫上不熟者爲無膿若熟甚者爲有膿凡覺有膿宜急破之不爾侵食筋骨也

癰潰後候

此由寒氣客於肌肉折於血氣結聚乃成癰凡破癰潰之後有逆有順其眼白睛青黑而眼小者一逆也內藥而嘔二逆也傷痛渴甚者三逆也體項中不便者四逆也音嘶色脫者五逆也除此者並爲順也此五種皆死候凡發癰疽則熱流入內五藏焦燥者渴而引飲兼多取冷則腸胃受冷而變下利利則腸胃俱虛而冷搏於胃氣逆則變嘔逆氣不通遇冷折之則變曠也

石癰候

石癰者亦是寒氣客於肌肉折於血氣結聚所成其腫
結確實至牢有根核皮相親不甚熱微痛熱時自歇此
寒多熱少輒如石故謂之石癰也久久熱氣乘之乃有
膿也

附骨癰腫候

附骨癰亦由體盛熱而當風取涼風冷入於肌肉與熱
氣相搏伏結近骨成癰其狀無頭但腫痛而濶其皮薄
澤謂之附骨癰也

癰虛熱候

此由寒客於經絡使血氣否澁乃結腫成癰熱氣壅結

則血化爲膿膿潰癰之後餘熱未盡而血氣已虛其人喻喻卒熱惙惙虛乏故謂之虛熱

癰煩渴候

癰由寒搏於血血澀不通而熱歸之壅結所成熱氣不得宣泄內熏五藏故煩躁而渴凡癰腫熱渴引飲冷氣入腸胃卽變下痢并變嘔噦所以然者本內虛熱氣逆故嘔嘔而氣逆外冷乘之氣不通故噦也

發癰欬嗽候

夫肺主氣候於皮毛氣虛腠理受寒寒客經絡則血不潤熱氣乘之則結成癰也肺氣虛寒寒復乘肺感於寒則成欬嗽故發癰而嗽也

癰下利候

此由寒氣客於經絡折於氣血壅結不通結成癰腫發
癰而利者由內熱而引飲取冷太過冷入腸胃故令下
利也下利不止則變嘔噦所以然者脾與胃合俱象土
脾候身之肌肉胃爲水穀之海脾虛肌肉受邪胃虛則
變下利下利不止則變嘔噦也

發癰大小便不通候

此由寒客於經絡寒搏於血血澀不通壅結成癰藏熱
不泄熱入大小腸故大小便不通

發癰內虛心驚候

此由體虛受寒寒客於經絡血脈否澀熱氣蘊積結聚

成癰結熱不散熱氣內迫於心故心虛熱則驚不定也

癰腫久愈汁不絕候

此由寒客於經絡則血澀不通與寒相搏則結成癰腫熟氣乘之則血化爲膿膿潰之後熟腫乃散餘寒不盡肌肉未生故有惡液湧汗清而色黃不絕也

癰瘡後重發候

此由寒氣客於經絡血澀不通壅結成癰凡癰膿潰之後須著排膿藥令熱毒膿血俱散盡若有惡肉亦傳藥食之則好肉得生真氣得復若膿血未盡猶挾餘毒瘡口便合當時雖瘥而後終更發

久癰候

此由寒氣客於經絡血澀不通壅結成癰發癰之後熱毒未盡重有風冷乘之冷搏於腫蘊結不消故經久一瘥一發久則變成瘻也

疽候

疽者五臟不調所生也五臟主裏氣行經絡而沉若喜怒不測飲食不節陰陽不和則五臟不調榮衛虛者腠理則開寒客經絡之間經絡爲寒所折則榮衛稽留於脈榮者血也衛者氣也榮血得寒則澀而不行衛氣從之與寒相搏亦壅遏不通氣者陽也陽氣蘊積則生於熱寒熱不散故積聚成疽臟氣沉行主裏故疽腫深厚其上皮強如牛領之皮久則熱勝於寒熱氣滯盛蘊結

傷肉也血肉腐壞化而爲膿乃至傷骨爛筋不可治而死也又少苦消渴年至四十已上多發癰疽所以然者體虛熱而榮衛否澀故也又有鬲痰而渴者年盛必作黃疽此由脾胃虛熱故也年衰亦發癰疽藏虛血氣否澀故也又腫一寸至二寸癰也二寸至五寸癰也五寸至一尺癰疽也一尺至三尺者名曰竟體癰癰成九竅皆血諸氣憤鬱不遂志欲者血氣蓄積多發此疾診其脈絃洪相薄外急內熱欲發癰疽脈來細而沉時直者身有癰腫若腹中有伏梁脈肺肝俱到卽發癰疽四支沉重肺脈多卽死凡癰疽脈洪麗難治脈微澀者易愈諸浮數之脈應當發熱而反渙浙惡寒若痛處當有癰

也此或附骨有膿也身有五部伏菟一腓二背三五藏之俞四項五五部有疽者死又疽發於嗌中名曰猛疽猛疽不治化爲膿膿不瀉塞咽半日死其化作膿瀉之則已發於頸名曰掖疽其腫大以赤黑不急治則熱氣下入掖淵前傷任脈內熏肝肺熏肝肺十餘日而死矣陽氣大發消澀留項名曰腦鑠其色不榮項痛如刺以鍼煩心者死不可治發於髀及臑名曰疵疽其狀赤黑急治之此令人汗出至足不害五藏癰發四五日燉炳之也發於腋下赤鞠者名曰米疽也鞠而不潰者爲馬刀也發於脣名曰井疽也其狀如大豆日三四起不早治下入腹中不治十日死發於膺名曰甘疽其狀如穀

實瓠瓜常苦寒熱急治之去其寒熱不治十歲死死後出膿發於股陽名曰兌疽其狀不甚變而膿附骨不急治四十日死發於脇名曰改訾改訾者女子之病也又云癰發女子陰傍名曰改訾改訾久不治其中生息肉如赤小豆麻黍也發於尻名曰兌疽其狀赤聊大急治之不治四十日死若發尻尾名曰兌疽若不急治便通洞一身十日死發於股陰名曰赤弛不急治之六日死在兩股內者不治六十日當死發於膝名曰疵疽其狀大癰色不變寒熱而堅勿石石之則死須其色黑柔乃石之生也發於脛名曰免齧疽其狀赤至骨急治之不治害人也發於踝名曰走緩色不變數灸而止其寒熱不

死發於足上下名曰四淫不急治之百日死發於足傍
名曰癘疽其狀不大初小指發急治之其狀黑者不可
消百日死也發於足趾名曰脫疽其狀赤黑死不赤黑
不治之不衰急斬去之活也不斬者死矣 赤疽發
額不瀉十餘日死其五日可刺也其膿赤多血死未有
膿可治人年二十五三十一六十九十五百神皆在額
不可見血見血者死 赤疽發身腫牢核而身熱不可
以坐不可以行不可以屈伸成膿刺之卽已 赤疽發
胷可治赤疽發髀樞六月內可治不治出歲死 赤疽
發陰股牢者死濡者可治 赤疽發掌中可治 赤疽
發脛死不可治 白疽發髀若肘後痒目痛傷精及身

熱多汗五六處死 黑疽發腫居背大骨上八日可刺
也過時不刺爲骨疽骨疽膿出不可止者出碎骨六十
日死 黑疽發掖淵死 黑疽發耳中如米此名文疽
死黑疽發髀死 黑疽發缺盆中名曰伏癰死 黑疽
發肘上下不死可治 黑疽發腓腸死 黑疽發膝臍
牢者死濡者可治 黑疽發趺上牢者死 倉疽發身
痒後痛此故傷寒氣入臟篤發爲倉疽九日可治九十
日死 釘疽發兩髀此起有所逐惡血結留內外榮衛
不通發爲釘疽三日身腫痛甚口噤如瘡狀十一日可
刺不治二十日死疽起於肉上如丁蓋下有脚至骨名
釘疽也 鋒疽發背起心俞若髀骭二十日不瀉死其

八日可刺也其色赤黑膿見青者死不治人年六十八
二十四四十五十六六十七七十二九十八神皆在髀
不可見血見血必死 陰疽發髀若陰股如發腰強內
不能自止數飲不能多五日牢痛如此不治三歲死

刺疽發起肺俞若肝俞不瀉二十日死其八日可刺也
發而赤其上肉如椒子者死不可治人年十九二十五
三十三四十九五十七六十七十三八十一九十七神
皆在背不可見血見血者死 脈疽發環項始病身隨

而熱不欲動悄悄或不能食此有所大畏恐怖而不精
上氣嗽其發引耳不可以腫二十日可刺如不刺八十

日死 龍疽發背起胃俞若腎俞二十日不瀉死九日

可刺其上赤下黑若青黑者死發血膿者不死 首疽
發背發熱八十日大熱汗頭引身盡加嗽身熱同同如
沸者皮澤頗腫處淺刺之不刺入腹中二十日死 俠
榮疽發脇起若兩肘頭二十五日不瀉死其九日可刺
發赤白間其膿多白而無赤可治也人年一十六二十一
六三十二四十八五十八六十四八十九十六神皆在
腸不可見血見血者死 勇疽發股起太陰若伏兔二
十五日不瀉死其十日可刺勇疽發清膿赤黑死白者
尚可治人年十一十五二十三三十二四十六五
十九六十三七十五九十一神皆在尻尾不可見血見
血者死 標叔疽熱同同耳聾後六十日腫如裹水狀

如此可刺之但出水後乃有血血出卽除也人年五十
七六十五七十三八十一九十七神皆在背不可見血
見血者死 痘發足趺若足下三十日不瀉死其十
二日可刺瘡疽發赤白膿而不大多其上痒赤黑死不
可治人年十三三十九三十五六十一七十三九十三
神皆在足不可見血見血者死 衝疽發在小腹痛而
戰寒熱冒五日悄悄六日而變可刺之五十日死 韶
疽發兩指頭若五指頭十八日不瀉死其四日可刺其
發而黑癰不甚赤過節可治也 天瘡疽發腋下若臂兩
掌中振寒熱而嗌乾者飲多卽嘔煩心悄悄或卒腫者
如此可汗不汗者死 青筋疽發背俠脊兩邊大筋其色

蒼八日可刺也 陳乾疽發臂三四日痛不可動五十
日身熱而赤六十日可刺之如刺之肺無血三四日病
已癒 痈發手足五指頭起節色不變十日之內可刺
也 過時不刺後爲食癰在腋三歲死

養生方云銅器蓋食汗入食食之令人發惡瘡內疽

又云鯽魚膾合豬肝肺食之發疽 又云烏鵲肉合食

發疽 又云魚腹內有白如膏合烏鵲肉食之亦發疽

也 又云魚金鰓食發疽也 又云已醉強飽食不幸

發疽其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云正倚壁不息行氣從頭至足止愈疽
行氣者鼻內息五入方一吐爲一通滿十二通愈又云

正坐倚壁不息行氣從口輒令氣至頭而止治疽癰氣不足

疽潰後候

此由寒氣客於經絡折於氣血血澀不通乃成疽發疽潰之後有逆有順其眼白睛青黑而眼小者一逆也內藥而嘔者二逆也傷痛渴甚者三逆也髍項中不便者四逆也音嘶色脫者五逆也除此者並爲順矣此五種皆死候凡發癰疽則熱流入五藏焦燥渴而引飲兼多取冷則腸胃受冷而變下利利則腸胃俱虛而冷搏胃氣氣逆則變嘔逆氣不通遇冷折之則噦也皖南建德

巢氏諸病源候總論卷三十三

癰疽病諸候

下 凡二十九論

緩疽候

緩疽者由寒氣客於經絡致榮衛滯澁氣血壅結所成其寒盛者則腫結痛深而回回無頭尾大者如拳小者如桃李冰冰與皮肉相親著熱氣少其腫與肉相似不甚赤積日不潰久乃變紫黯色皮肉俱爛如牛領瘡漸至通體青黯不作頭而穿潰膿出是也以其結腫積久而肉腐壞遲故名緩疽亦名肉色疽也緩疽急者一年殺人緩者數年乃死

熛疽候

小裏火

小毒火

小毒火

小毒火

熛疽之狀肉生小皰皰小者如粟豆大者如梅李或赤或黑乍青乍白有實核燥痛應心或著身體其著手指者似代指人不別者呼爲代指不急治毒逐脈上入臟則殺人南方人得此疾皆截去指恐其毒上攻臟故也又云十指端忽策策痛入心不可忍向明望之晃晃黃赤或黯黯青黑是熛疽直截後節十有一愈

又云風胗痛不可忍者熛疽發五臟俞節解相應通洞熛疽也諸是熛疽皆死又齒間臭熱血出不止熛疽也七日死治所不瘥以灰掩覆其血不爾著人又云諸是熛疽皆死唯痛取利十有一活耳此皆毒氣客於經絡氣血否濫毒變所生也

痘發口齒候

寒氣客於經絡血澁不通結而成痘五臟之氣皆出於口十二經脈有入齒者有連舌本者榮衛之氣無處不行虛則受邪挾毒乘虛而入脈故也其發口齒者多血出不可禁皆死

行疽候

行疽候者發瘡小者如豆大者如錢往來而身及生面上謂之行疽此亦寒熱客於腠理與血氣相搏所生也

風疽候

腫起流之血脉而攣曲疾痛所以發瘡歷年謂之風疽此由風濕之氣客於經絡與氣相搏所成也

養生方云大解汗當以粉粉身若令自乾者成風疽也

石疽候

此由寒氣客於經絡與血氣相搏血澁結而成疽也其寒毒偏多則氣結聚而皮厚狀如瘻癧聊如石故謂之石疽也

禽疽候

禽疽發如胗者數十處其得四日腫合牢核痛其狀若變十日可刺其初發身戰寒齒如噤欲坐如是者十五日死也此是寒濕之氣客於肌肉所生也

杼疽候

杼疽者發項及兩耳下不瀉十六日死其六日可刺其

色黑見膿如癰者死不可治人年三十九二十三
十五三十九五十一五十五六十一八十七九十九神
皆在兩耳下不可見血見血者死此是寒濕之氣客於
肌肉折於血氣之所生也

水疽候

此由寒濕之氣客於皮膚搏於津液使血氣否澁濕氣
偏多則發水疽其腫狀如物裹水多發於手足此是隨
肌膚虛處而發也亦有發身體數處而壯熱遂至死

肘疽候

肘疽是疽發於肘謂之肘疽凡諸疽發節解並皆斷筋
節而發肘者尤爲重也此亦是寒濕之氣客於肌肉折

於血氣所生也

附骨疽候

附骨疽者由當風入骨解風與熱相搏復遇冷濕或秋
夏露卧爲冷所折風熱伏結壅遏附骨成疽喜著大節
解間丈夫及產婦女人喜著鼠饌髂頭胫膝間嬰孩嫩
兒亦著髀肘背脊也其大人老人著急者則先覺痛不
得轉動接之應骨痛經日便覺皮肉生急洪洪如肥狀
則是也其小兒不知字名抱之纔近其便畧喚則是支
節有痛處便是其候也大人老人著緩者則先覺如肥
洪洪耳經日便覺痺痛不隨也其小兒則覺四支偏有
不動不動搖者如不隨狀看支節解中則有肥洪洪處

其名不知是附骨疽乃至合身成瘻不潰至死皆覺身體變青黯也其大人老人皆不悟是疽乃至於死也亦有不別是附骨疽呼爲急賊風其緩者謂風腫而已

久疽候

此由寒氣客於經絡折於氣血血澁不通乃結成疽凡疽發諸節及腑臟之俞則卒急也其久疽者發於身體閑處故經久積年致膿汁不盡則瘡內生蟲而變成瘻也

疽虛熱候

此由寒搏於熱結壅血澁乃成疽疽雖潰瘻之後餘熱未盡而血已虛其人呻吟苦熱憊憊虛乏故謂虛熱

也

疽大小便不通候

此由寒氣客於經絡寒搏於血血澁不通壅結成疽腑
臟熱不泄熱入大小腸故大小便不通也

癰發背候

夫癰發於背者多發於諸腑俞也六腑不和則生癰諸
腑俞皆在背其血氣經絡於身腑氣不和腠理虛者經
絡爲寒所客寒折於血則壅不通故結成癰發其俞也
熱氣加於血則內血敗化故爲膿癰初結之狀腫而皮
薄以澤又云背上忽有赤腫而頭白搖根入應胸裏動
是癰也又發背苦熱手不可得近者內先服王不留行

散外摩背膏大黃貼若在背先破無苦良不得膿以食
肉膏散著兌頭內癰口中人體熱氣歇服术散五日後
癰欲瘥者服排膿內塞散

癰發背潰後候

此由寒氣客於經絡折於血氣血澁不通乃結成癰發
背癰膿出之後眼白睛青黑而眼小一逆也內藥而嘔
二逆也傷痛渴甚三逆也體項中不仁四逆也音嘶色
脫五逆也此等五逆者皆不可治也或熱或渴非倉卒
之急可得漸治之也凡發背則熱氣流入腑臟潰之後
血氣則虛腑臟燥熱渴而引飲飲冷入腸胃則變下利
胃虛氣逆則變嘔也嘔逆若遇冷折之氣不通則噦也

其瘡若膿汁不盡而瘡口早合雖瘥更發惡汁連滯則變成瘻也

癰發背後下利候

此是寒氣客於經絡折於血氣血澁不通乃結成癰癰發後利者由內熱而引飲取冷太過冷入腸胃故令下利不止則變嘔所以然者脾與胃合俱象土脾候身之肌肉胃爲水穀之海脾虛則肌肉受邪胃虛則變下利下利不止氣逆故變嘔嘔而遇冷折氣逆不通則噦也

癰發背渴候

此由寒氣客於經絡折於氣血血澁不通乃結成癰也癰發背五臟熱盛虛燥故渴而冷飲入腸胃則變利也

癰發背兼嗽候

肺主氣候於皮毛氣虛腠理受寒客於經絡則血否澁寒氣乘之則成癰也肺氣虛其寒復乘肺肺感於寒則成欬嗽故發癰而兼嗽也

癰發背大便不通候

此由寒氣客於經絡血氣否澁則生熱蘊結成癰氣壅在臟腑熱入腸胃故令大便不通也

癰發背惡肉不盡候

此由寒氣客於經絡折於氣血血澁不通乃結成癰發背膿潰之後外有風氣搏之變生惡肉壅塞於瘡者則毒氣內侵須傳藥以食之

痘發背候

痘發背者多發於諸臟俞也五臟不調則發痘五臟俞皆在背其血氣經絡於身腑臟不調腠理虛者經脈爲寒所客寒折於血血壅不通故乃結成痘而發臟俞也熱氣施於血則肉血敗腐爲膿也痘初結之狀皮強如牛領之皮是也痘重於癰發者多死又發起肺俞若肝俞不瀉二十日死其八日可刺也發而赤其上肉如椒子者死不可理人年十九二十五三十三四十九五十七六十七十三八十一九十七神皆在背不可見血見血者死蜂痘發背起心俞若髀骭二十日不瀉卽死其八日可刺也其色赤黑膿見青者死不治人年六歲十

八二十四四十五十六六十七八十二九十八神皆在
體不可見血見血者死

疽發背潰後候

此由寒氣客於經絡折於氣血血澀不通乃結成疽發
背疽膿出之後眼白睛青黑而眼小一逆也內藥而嘔
二逆也傷痛渴甚三逆也骨項中不便四逆也音嘶色
脫五逆也皆不可治自餘或熱渴或刺嘔非倉卒之急
也可得漸治凡發背則熱氣流入腑臟膿潰之後血氣
則虛腑臟積熱渴而引飲飲冷入於腸胃則變下利胃
瘡若膿汁不盡而瘡口早合雖瘥更發惡汗連滯則變
虛氣逆則變嘔也嘔逆若遇冷折之氣不通卽噦也其

成瘻也

疽發背熱渴候

此由寒氣客於經絡折於氣血血澁不通乃結成疽疽發背則腑臟皆熱熱則臟燥故渴也而冷飲入腸胃則變利也

腸癰候

腸癰者由寒溫不適喜怒無度使邪氣與榮衛相干在於腸內遇熱加之血氣蘊積結聚成癰熱積不散血肉腐壞化而爲膿其病之狀小腹重而微強抑之卽痛小便數似淋時時汗出復惡寒其身皮皆甲錯腹皮急如腫狀診其脈洪數者已有膿也其脈遲緊者未有膿也

甚者腹脹大轉側聞水聲或繞臍生瘡穿而膿出或膿
自臍中出或大便去膿血惟宜急治之又云大便膿血
似赤白下而寃非者是腸癰也卒得腸癰而不曉治之
錯者殺人寸脈滑而數滑則爲實數而爲熱滑則爲榮
數則爲衛衛下降榮上升遇熱榮衛相干血爲濁敗小
腹否聊小便或難汗出或復惡寒膿爲已成設脈遲緊
聚爲瘀血血下則愈膿成引日又諸浮數脈當發熱而
反洗滌惡寒若有痛處者當積有膿脈滑濇者小腸癰
出血者也

養生方云六畜卒疫死及夏病者腦不中食喜生腸癰

也

內癰候

內癰者由飲食不節冷熱不調寒氣客於內或在胸鬲或在腸胃寒折於血血氣留止與寒相搏壅結不散熱氣乘之則化爲膿故曰內癰也胸內痛少氣而發熱以手按左眼而其右眼見光者胸內結癰也若不見光煩疽內若吐膿血者不可治也急以灰掩其膿血不爾者著人腸內有結痛或在脇下或在臍左近結成塊而壯熱必作癰膿診其脈數而身無熱者內有癰也

養生方云四月勿食螺雞肉作內癰在胸腋下出瘻孔

肺癰候

肺癰者由風寒傷於肺其氣結聚所成也肺主氣候皮

毛勞傷血氣腠理則開而受風寒其氣虛者寒乘虛傷
肺寒搏於血蘊結成癰熱又加之積熱不散血敗爲膿
肺處胸間初肺傷於寒則微嗽肺癰之狀其人欬胸內
滿隱隱痛而戰寒診其肺部脈緊爲肺癰又肺癰喘而
胸滿又寸口脈數而實咽乾口內辟辟燥不渴時時出
濁唾腥臭久久吐膿如梗米粥者難治也又肺癰有膿
而嘔者不須治其嘔膿止自愈又寸口脈微而數微則
爲風數則爲熱微則汙出數則惡寒風中於衛呼氣不出
數過於榮吸而不入風傷皮毛熱傷血脈風舍於肺其
人則嘔口乾喘滿咽燥不渴唾而濁沫時時戰寒熱之所過血爲凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可救膿成

則死又欲知有膿者其脈緊數膿爲未成其脈緊去但數膿爲已成又肺病身當有熱欬嗽短氣唾出膿血其脈當短濇而反浮大其色當白而反赤者此是火之剋金大逆不治也

膈病候

膈病者由勞役肢體熱盛自取風冷而爲涼濕所折入於肌肉筋脈結聚所成也其狀赤脈起如編繩急痛壯熱其發於骭者喜從鼠鼷起至踝赤如編繩故謂膈病也發於臂者喜從腋下起至手也可卽治取消其潰去膿則筋攀也其著腳若置不治不消復不潰其熱欬氣不散變作種脈緩濇相搏腫膈已成膿也

痙癪候

痙癪者由風濕冷氣搏於血結聚所生也人運役勞動則陽氣發泄因而汗出遇風冷濕氣搏於經絡經絡之血得冷所折則結澀不通而生痙癪腫結如梅李也又云腫一寸二寸癧也其不消而潰者卽宜熟捻去膿至清血出若膿汁未盡其瘡合者則更發其著耳下領頸腋下若膿汁不盡多變成瘻也

養生方云人汗入諸食中食之作癰癧

又云五月勿食不成核果及桃棗發癰癧也

食生蘋果食不熟果多酸寒冷極難忍

至半日令人舌人苦食中食之并難忍

口有酸氣舌小盡多變如蟲也

口氣出者頭痛未盡其熱合著頭更發甚其苦且有酸酸
之氣口舌生苔綠也其不能耐者皆宜無急去頭至
此發令取神門脉不痛而半壅塞取神門脉又
無餘氣斯因而治出服鳳哥盛桑丸飲藥發利水
風濕氣矣其体质素弱之人皖南建德

巢氏諸病源候總論卷三十四

瘦病諸候 凡三十五論

諸瘦候

諸瘦者謂瘦病初發之由不同至於瘦成形狀亦異有以一方而治之者故名諸瘦非是諸病共成一瘦也而方說九瘦者是狼瘦鼠瘦蠣瘦蜂瘦蚍蜉瘦蟾蜍瘦浮疽瘦癩瘦轉脈瘦此頸之九瘦也 狼瘦者年少之時不自謹慎或大怒氣上不下之所生也始發之時在於頸項有根出缺盆上轉連耳本其根在肝 鼠瘦者飲食之時不擇蟲蛆變化所生也使人寒熱其根在肺 蟻蛄瘦者食果蔬子不避有蟲卽便噉之外絕於

綱內絕於腸有毒不去變化所生也始發之時在於頸上狀如蠅形癰胗而出也其根在大腸 蜂瘻者食飲勞倦渴乏多飲流水卽得蜂毒不去變化所生也始發之時其根在頸歷歷三四處俱腫以潰生瘡狀如癰形瘻而復移其根在脾 蝇蛭瘻者因寒腹中臚脹所得寒毒不去變化所生也始發之時在於頸項使人壯熱若傷寒有似疥癬婁婁孔出其根在肺 蟬螬瘻者恐懼愁憂思慮哭泣不止餘毒變化所生也始發之時在於頸項無頭尾如棗核或移動皮中使人寒熱心滿其根在心 浮疽瘻者因恚結馳思往反變化所生也始發之時在於頸亦在腋下如兩指無頭尾使人寒熱欲

嘔吐其根在膽

瘰癧瘻者因強力入水坐濕地或新

沐浴汗入頭中流在頸上之所生也始發之時在於頸

項恒有膿使人寒熱其根在腎

轉脈瘻者因飲酒大

醉夜卧不安驚欲嘔轉側失枕之所生也始發之時在

於頸項濯濯脈轉身如振使人寒熱其根在小腸

復

有三十六種瘻方不次第顯其名而有蜣蠅蚯蚓等諸

瘻非九瘻之名此卽應是三十六種瘻之數也但瘻病

之生或因寒暑不調故血氣壅結所作或由飲食乖節

狼鼠之精入於府藏毒流經脈變化而生皆能使血脈

結聚寒熱相交久則成膿而潰漏也其生身體皮肉者

亦有始結腫與石癰相似所可異者其腫之中按之累

累有數脈喜發於頸邊或兩邊俱起便是瘻證也亦發
兩腋下及兩顫顫間初作喜不痛不熱若失時不治卽
生寒熱所發之處而有輕重重者有兩種一則發口上
腭有結核大小無定或如桃李大此蟲之窠窟止在其
中二則發口之下無有結核而穿潰成瘻又蟲毒之居
或府藏無定故瘻發身體亦有數處其相應通者多死
其瘻形狀起發之由今辯於後

養生方云六月勿食自落地五果經宿蚍蜉螻蛄蟴
遊上喜爲九瘻

又云十二月勿食狗鼠殘肉生瘻及瘻出頸項及口裏
或生咽內

鼠瘻侯

鼠瘻者由飲食不擇蟲蛆毒變化入於府藏出於脈稽留脈內而不去使人寒熱其根在肺出於頸腋之間其浮於脈中而未內著於肌肉而外爲膿血者易去也決其生死者反其目視之其中有赤脈從上下貫瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲死赤脈而不下貫瞳子可治也

養生方云正月勿食鼠殘食作鼠瘻發於頸項或毒入腹下血不止或口生瘻如有蟲食

蜂瘻候

蜂瘻者由飲食勞倦渴乏多飲流水卽得蜂毒流入於藏其根在脾出發於頸項歷歷三四處或累累四五處蜂臺或發胸前俱腫以潰生瘡狀如癰形瘥而復移

蟻瘻候

蟻瘻者由飲食有蟻精氣毒入於五藏流出經絡多著頸項戢戢然小腫核細乃遍身體

蚍蜉瘻候

蚍蜉瘻者由飲食內有蚍蜉毒氣入於藏流於經脈使身寒似傷寒腹虛臚脹其根在肺發於頸項如疥癬裏裏孔出初生痒搔之生瘡不治一百日生蚍蜉瘻

蠅瘻候

此由飲食內有蠅窠子因誤食之入於腸胃流注入血脈變化生瘻發於頸下初生痒而如蠅窠子狀使人寒熱久其中化生蠅也

𧈧𧈧瘻候

𧈧𧈧瘻者由食果蓏子不避有蟲卽便噉之有蟲毒氣入於腹內外發於頸其根在大腸初生之時其狀如風矢亦如蠍形癰胗而痒搔之則引大如四寸更其中生孔道乃有數十中生𧈧𧈧亦有十數不治二年殺人

𧈧𧈧瘻候

此由恐懼愁憂思慮哭泣不止氣毒變化所生內動於藏外發頸項其根在心又方根在膀胱初生之時無頭

深坎蜂瘻則高而圓蟾螬瘻方五寸作坑邊有唇畔而
痒搔之則引大如六寸更疼痛日夜令人呻號三年生
孔道乃有十數中生蟾螬乃有百數不治五年殺人

鶲鳥鶴瘻候

鶲鳥鶴瘻者初腫如覆手疼痛一年生孔道數十處黃
水出二年化生鶴水鳥首而生口觜是也

尸瘻候

人皆有五尸在人腹內發動令心腹脹氣息喘急衝擊
心胸攻刺脇肋因而寒熱頸腋之下結癧癰膿潰成瘻
時還衝擊則腹內脹痛腰脊攀急是也

風瘻候

此由風邪在經脈經脈結聚所成或諸瘻得風不卽瘥變作其瘻得風者是因瘻遇冷膿汁不盡乃成也其風在經脈者初生之時其狀如腫有似覆手搔之則皮脫赤汗出乍腫乍減漸漸生根結實且附骨間不知首尾卽潰成瘻若至五十日不消不潰變成石腫名爲石癰久久不治令寒熱惡氣入腹絕悶刺心及咽項悉皆腫經一年不治者死

鞠瘻候

腫痛初生癰如大桃狀亦如瘤膿潰爲瘻不治成石瘻化生鞠作竅傍行世呼爲石鞠瘻

蟻蠅瘻候

此由飲食居處有蟻蠅毒氣入於藏府流於經脈所生也初生之時其狀如鼠竅直下腫如覆手而痒搔之疼痺至百日有十八竅深三寸中生蟻蠅乃有一百數蟻蠅成尾自覆刺人大如盂升至三年殺人

骨疽瘻候

骨疽瘻者或寒熱之氣搏經脈所成或蟲蛆之氣因飲食入人府藏所生以其膿潰侵食於骨故名骨疽瘻也初腫後乃破破而還合邊傍更生如是或六七度中有膿血至日西痛發如有針刺

蚯蚓瘻候

蚯蚓瘻者由居處飲食有蚯蚓之氣或飲食入腹內流於經脈所生其根在大腸其狀腫核潰漏

花瘻候

花瘻者風濕客於皮膚與血氣相搏因而成瘻風濕氣多其肉突出外如花開之狀世謂之反花瘻不瘥生蟲成瘻故謂之花瘻也

蠍瘻候

此由飲食居處有蝎蟲毒氣入於府藏流於經脈或生腋下或生頸邊腫起如蝎蟲之形寒熱而潰成瘻久則瘻裏生細蝎蟲也

蟅瘻候

蛭瘻者由飲食居處有蛭蟲毒氣入於府藏流於經脈
變化而生著面頰邊卽脫肉結腫初如蛭蟲之窠後潰
成瘻而蛭生是也

腦瘻候

腦瘻者頭頸逐氣上下疼痛而後腦瘻

癰瘻候

癰瘻者是癰潰瘍後久不瘥膿汁不盡因變生蟲成瘻
故爲癰瘻也

癰瘻候

癰瘻者其瘻橫闊作頭狀如杏子形亦似瘰疬出血是
也

蟲瘻候

諸瘻皆有蟲而此獨以蟲爲名者是諸瘻初本無蟲經久不瘥而變生蟲故以爲名也

石瘻候

石瘻之狀初起兩頭如梅李核聊實按之強如石而寒熱熱後潰成瘻是也

蛙瘻候

此由飲食居處有蛙之毒氣入於府藏流於經脈而成瘻因服藥隨小便出物狀似蛙形是也

蝦蟆瘻候

此由飲食有蝦蟆之毒氣入於府藏流於經脈結腫寒

熱因潰成瘻服藥有物隨小便出如蝦蟆之狀故謂之
蝦蟆瘻也

蛇瘻候

蛇瘻者由居處飲食有蛇毒氣入於府藏流於經脈寒
熱結腫出處無定因潰成瘻服藥有物隨小便出如蛇

形狀謂之蛇瘻

蟾蜍瘻候

蟾蜍瘻者由居處飲食有蟾蜍毒氣入於府藏流於經
脈所生初得之時如棗核許或契或滿百日或滿周年
走不定一處成竅而膿汁潰瘻也故謂之蟾蜍瘻

赤白瘻候

人有患瘡色赤白分明因而成瘻謂之赤白瘻

內瘻候

人有發瘡色黑有結內有膿久乃積生侵食筋骨謂之內瘻

雀瘻候

此由居處飲食有雀毒氣入於藏流於脈發無定處腫因潰成瘻服藥有物隨小便出狀如雀殼故謂之雀瘻

膿瘻候

諸瘻皆有膿汁此瘻獨以膿爲名者是諸瘻久不瘥成瘻而重爲熱毒氣停積生膿常不絕故謂之膿瘻也

冷瘻候

冷瘻者亦是謂瘻得風冷久不瘥因成瘻膿汁不絕故

爲冷瘻也

久瘻候

久瘻者是諸瘻連滯經久不瘥或暫瘥復發或移易三
兩處更相應通故爲久瘻也

瘰癧瘻候

此由風邪毒氣客於肌肉隨虛處而停結爲瘰癧或如
梅李棗核等大小兩三相連在皮間而時發寒熱是也
久則變膿潰成瘻也其湯熨針石別有正方補養宣導

今附於後

養生方導引法云蹠以兩手從曲腳入據地曲腳加

其上舉尻其可用行氣愈瘰癧乳痛

癩瘦候

癩病之狀陰核腫大有時小歇歇時終大於常勞冷陰雨便發發則脹大使人腰背攀急身體惡寒骨節沉重此病由於損腎也足少陰之經腎之脈也其氣下通於陰陰宗脈之所聚積陰之氣也勞傷舉重傷於少陰之經其氣不衛於陰氣脹不通故成癩也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云正偃卧直兩手兩足念月所在令赤如油囊丹除癩少腹重不便腹中熱但口內氣息出之數十不須小咽氣卽腸中不熱者七息已溫熱咽之十

數

痔病諸候

凡六論

諸痔候

諸痔者謂牡痔牝痔脈痔腸痔血痔也其形證各條如後竟又有酒痔肛邊生瘡亦有血出又有氣痔大便難而血出肛亦出外良久不肯入諸痔皆由傷風房室不慎醉飽合陰陽致勞擾血氣而經脈流溢滲漏腸間衝發下部有一方而治之者名爲諸痔非爲諸病共成一痔痔久不瘥變爲瘻也

養生方云忍大便不出久作氣痔其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云一足踏地一足屈膝兩手抱犢鼻下急挽向身極勢左右換易四七去痔五勞三里氣不下又云踞坐合兩膝張兩足不息兩遍治五痔

又云兩手抱足頭不動足向口受氣衆節氣散來去三七欲得捉左右側身各急挽腰不動去四支腰上下髓內冷血冷筋急悶痔

又云兩足相踏向陰端急蹙將兩手捧膝頭兩向極勢捧之二七竟身側兩向取勢二七前後努腰七去心勞痔病

牡痔候

肛邊生鼠乳出在外者時時出膿血者是也

牝痔候

肛邊腫生瘡而出血者牝痔也

脈痔候

肛邊生瘡痒而復痛出血者脈痔也

腸痔候

肛邊腫核痛發寒熱而血出者腸痔也

血痔候

因便而清血隨出者血痔也

吳云謂坐合兩脣齶兩足不息而坐者五瓣

急緩向後腰背至古與是固子之病正贊之皖南建德

養生大樞門卷之二 張祖誠一 周氏校刊

巢氏諸病源候總論卷三十五

瘡病諸候 凡六十五論

頭面身體諸瘡候

夫內熱外虛爲風濕所乘則生瘡所以然者肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開爲風濕所乘內熱則脾氣溫脾氣溫則肌肉生熱也濕熱相搏故頭面身體皆生瘡其瘡初如炮須臾生汁熱盛者則變爲膿隨瘥隨發

頭面身體諸久瘡候

諸久瘡者內熱外虛爲風濕所乘則頭面身體生瘡其藏內熱實氣盛熱結肌肉其熱留滯不歇故瘡經久不

瘡

諸惡瘡候

諸瘡生身體皆是體虛受風熱風熱與血氣相搏故發瘡若風熱挾濕毒之氣者則瘡痒痛焮腫而瘡多汁身體壯熱謂之惡瘡也

養生方云銅器蓋食汁入食發惡瘡內疽也

又云醉而交接或致惡瘡 又云飲酒熟未解以冷水洗面令惡瘡輕者戲胞 又云五月五日取棗葉三升井華水擣取汁浴永不生惡瘡 又云井華水和粉洗足不病惡瘡其湯熨針石別有正方補養宣導今附於

養生方導引法云龍行氣叩頭下視不息十二通愈風
疥惡瘡熱不能入

又云五月一日八月二日九月九日十月七月十一月
四日十二月十三日沐浴除惡瘡

久惡瘡候

夫體虛受風熱濕毒之氣則生瘡痒痛焮腫多汁壯熱
謂之惡瘡而濕毒氣盛體外虛內熱其瘡漸增經久不
瘥爲久惡瘡

瘡瘍候

瘡瘍者由膚腠虛風濕之氣折於血氣結聚所生多著
手足間遞相對如新生茱萸子痛痒搔搔成瘡黃汁出

浸淫生長拆裂時瘥時劇變化生蟲故名癧瘡

燥癧瘡候

膚腠虛風濕搏於血氣則生癧瘡若濕氣少風氣多者其癧則乾燥但痒搔之白屑出乾枯拆痛此蟲毒氣淺在皮膚故名燥癧瘡也

濕癧瘡候

膚腠虛風濕搏於血氣生癧瘡若風氣少濕氣多其瘡痛痒搔之汁出常濡濕者此蟲毒氣深在於肌肉內故也

久癧瘡候

癧瘡積久不瘥者由膚腠虛則風濕之氣停滯蟲在肌

肉之間則生長常痒痛故經久不瘥

癬候

癬病之狀皮肉隱胗如錢文漸漸增長或圓或斜痒痛有匡郭裏生蟲搔之有汁此由風濕邪氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏則血氣否澀發此疾也按九蟲論云蟻蟲在人腸內變化多端發動亦能爲癬而癬內實有蟲也

養生方云夏勿露面卧露下墮面皮厚及喜成癬
乾癬候

乾癬但有匡郭皮枯索痒搔之白屑出是也皆是風濕邪氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏所生若其風毒

氣多濕氣少則風沈入深故無汁爲乾癬也其中亦生蟲

濕癬候

濕癬者亦有匡郭如蟲行浸淫赤濕痒搔之多汁成瘡是其風毒氣淺濕多風少故爲濕癬也其裏亦有蟲

風癬候

風癬是惡風冷氣客於皮折於血氣所生亦作圓文匡郭但搔癢不知痛痒其中亦有蟲

白癬候

白癬之狀白色皚皚然而痒此亦是腠理虛受風風與氣并血澀而不能榮肌肉故也

牛癬候

俗云以盆器盛水飲牛用其餘水洗手面卽生癬名牛
癬其狀皮厚孤之輒強而痒是也其裏亦生蟲

圓癬候

圓癬之狀作圓文隱起四畔赤亦痒痛是也其裏亦生
蟲

狗癬候

俗云狗舐之水用洗手面卽生癬其狀微白點綴相連
亦微痒是也其裏亦生蟲

雀眼癬候

雀眼癬亦是風濕所生其文細似雀眼故謂之雀眼癬

搔之亦痒中亦生蟲

刀癬候

俗云以磨刀水用洗手面而生癬名爲刀癬其形無匡郭縱斜無定是也中亦生蟲

久癬候

久癬是諸癬有蟲而經久不瘥者也癬病之狀皮內隱
胗如錢文漸漸增長或圓或斜痒痛有匡郭搔之有汁
又有乾癬枯索痒搔之白屑出又有濕癬如蟲行浸淫
赤濕痒搔之多汁又有風癬搔抓頑瘞不知痛痒又有
牛癬因飲牛餘水得之其狀皮厚抓之輒強又有圓癬
作圓文隱起四面赤又有狗癬因以狗舐餘水洗手面

得之其狀微白點綴相連亦微痒又有雀眼癬作細文似雀眼搔之亦痒痛又有刀癬因以磨刀水洗手面得之其狀無匡郭縱邪無定如此之癬初得或因風濕客於肌膚折於血氣所生或因用牛狗所飲餘水洗手面得之至其病成皆有蟲侵食轉深連滯不瘥故成久癬

疥瘡候

疥者有數種有大疥有馬疥有水疥有乾疥有濕疥多生手足乃至遍體大疥者作瘡有膿汁焮赤痒痛是也馬疥者皮內隱嶙起作根塘搔之不知痛此二者則重水疥者瘡癟如小癰漿摘破有水出此一種小輕乾疥者但痒搔之皮起作乾癰濕疥者小瘡皮薄常有汁出

並皆有蟲人往往以針頭挑得狀如水內癰蟲此悉由皮膚受風邪熱氣所致也按九蟲論云蟻蟲多所變化多端或作癰疥痔瘻無所不爲其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云龍行氣叩頭下視不息十二通愈風疥惡瘡熱不能入

乾疥候

乾疥但痒搔之皮起作乾癬此風熱氣深在肌肉間故也

濕疥候

濕疥起小瘡皮薄常有水汁出此風熱氣淺在皮膚間

故也

熱瘡候

諸陽氣在表陽氣盛則表熱因運動勞役腠理則虛而開爲風邪所客風熱相搏留於皮膚則生瘡初作癰漿黃汁出風多則痒熱多則痛血氣乘之則多膿血故名熱瘡也

冷瘡候

凡身體發瘡皆是風熱所爲然血虛者亦傷於邪若重觸風寒則冷氣入於瘡令血澀不行其瘡則頑令不知痛痒亦經久難瘥名爲冷瘡

疽瘡候

此疽瘡是癟之類也非癰疽之疽世云癟疽卽是此也
多發於支節腳脛間相對而作細孔如針頭其裏有
蟲痒痛搔之黃汁出隨瘡隨發皆是風邪客於皮膚血
氣之所變生亦有因諸淺瘡經久不瘥痒痛抓搔之或
衣揩拂之其瘡則經久不瘥而變作疽瘡者裏皆有細

蟲

甲疽候

甲疽之狀瘡皮厚甲錯剝起是也其瘡亦痒痛常欲抓
搔之汁出其初皆是風邪折於血氣所生而裏亦有蟲

查疽候

查疽之狀隱胗赤起如今查樹子形是也亦是風邪客

於皮膚血氣之所變生也其瘡內有蟲亦痒痛時焮腫
汁出

頑疽候

此由風濕客於皮膚血氣所變隱形生瘡痒而不痛故
名頑疽

根疽候

根疽是諸雜瘡帶風濕苦痒數以手抓搔根觸便侵食
澗久不瘥乃變生蟲故名根疽

癰疽月食瘡候

月食瘡生於兩耳及鼻面間并下部諸孔竅側侵食乃
至筋骨月初則瘡盛月末則瘡衰以其隨月生因名之

爲月食瘡也又小兒耳下生瘡亦名月食世云小兒見月以手指指之則令病此瘡也其生諸孔竅有蟲久不瘥則變成瘻也

天上病候

天上病者人神采昏塞身體沉重下部生瘡上食五臟甚者至死世人隱避其名故云天上病也此是腑臟虛腸胃之間蟲動侵食人五臟故也

甜瘡候

甜瘡生面上不痒不痛常有肥汁出汁所溜處隨卽成瘡亦生身上小兒多患之亦是風濕搏於血氣所生以其不痒不痛故名甜瘡

浸淫瘡候

浸淫瘡是心家有風熱發於肌膚初生甚小先痒後痛而成瘡汁出侵潰肌肉浸淫漸潤乃徧體其瘡若從口出流散四肢則輕若從四肢生然後入口者則重以其漸漸增長因名浸淫也

反花瘡候

反花瘡者由風毒相搏所爲初生如飯粒其頭破則血出便生惡肉漸大有根膿汁出肉反散如花狀因名反花瘡凡諸惡瘡久不瘥者亦惡肉反出如反花形

瘡建候

人身上患諸瘡熱氣盛者腫焮痛附畔別結聚狀如瘰

癰者名爲瘡建亦名瘡根也

王爛瘡候

王音旺

王爛瘡者由腑臟實熱皮膚虛而受風濕與熱相搏故初起作癰漿漸漸王爛汁流浸漬故名王爛瘡也亦名王灼瘡其初作癰漿如湯火所灼也又名洪燭瘡初生如沸湯洒作癰漿赤爛如火燭故名洪燭也

白頭瘡候

白頭瘡者由體虛帶風熱遍身生瘡瘡似大疥痒漸白頭而有瞶四邊赤疼痛是也

無名瘡候

此瘡非癰非疽非癬非疥狀如惡瘡或瘻或劇人不能

名故名無名瘡也此亦是風熱搏於血氣所生也

猪灰瘡候

猪灰瘡者坐處生瘡赤黑有竅深如大豆許四邊青中央坼作臼陷而不甚痛狀如猪灰因以爲名此亦是風熱搏於血氣所生也

不痛瘡候

諸瘡久不瘥觸風冷有惡肉則搔針灸不覺痛因以不痛爲名

鴈瘡候

鴈瘡者其狀生於體上如濕癬癰瘍多著四肢乃遍身其瘡大而熱疼痛得此瘡者常在春秋二月八月鴈來

時則發鴈去時便瘥故以爲名亦云鴈過荆漢之域多有此病

蜂窠瘡候

其瘡如疽癰之類有小孔象於蜂窠因以爲名此亦風濕搏於血氣之所生也

斷咽瘡候

此瘡繞頸而生皮傷赤若匝頸則害人此亦是風濕搏於血氣之所生也

毒瘡候

此由風氣相搏變成熱毒而生瘡於指節或指頭初似疥甚痒經宿乃紫黑也

瓠毒瘡候

俗云人有用瓠花上露水以洗手遇毒卽作瘡因以名之

晦瘡候

其瘡生皆兩兩相對頭戴白膿俗云人有誤小便故竈處卽生此瘡小兒多患也

集瘡候

此瘡十數箇集生一處因以爲名亦是皮膚偏有虛處風濕搏於血氣變生

漏泄屋食瘡候

方云犯屋亦所爲未詳其形狀

病源候論

鳥啄瘡四畔起中央空是也此亦是風濕搏於血氣之所變生以其如鳥鳥所啄因以名之也

攝領瘡候

攝領瘡如癬之類生於頸上痒痛衣領拂着卽劇云是衣領揩所作故名攝領瘡也

雞督瘡候

雞督瘡生脇傍此瘡亦是風濕搏於血氣之所變生以其形似雞屎因以爲名也

斷耳瘡候

斷耳瘡生於耳邊久不瘥耳乃取斷此亦月食之類但

不隨月生長爲異此瘡亦是風濕搏於血氣所生以其
斷耳因以爲名也

新婦瘡候

此瘡狀繞腰生如蠻蝂屎但不痛爲異耳此瘡亦是風
濕搏於血氣所生而世人呼之爲新婦瘡也

土風瘡候

土風瘡狀如風胗而頭破乍發乍瘥此由肌腠虛疎風
塵入於皮膚故也俗呼之爲土風瘡也

逸風瘡候

逸風瘡生則遍體狀如癬疥而痒此由風氣散逸於皮
膚因名逸風瘡也

病源候詳 卷三十五
飫帶瘡候

飫帶瘡者繞腰生此亦風濕搏於血氣所生狀如飫帶因以爲名又云此瘡繞腰而則殺人

免齧瘡候

凡疽發於脰名曰免齧瘡一名血實瘡又隨月生死蓋月食之類非脰瘡也尋此瘡亦風濕搏於血氣血氣實熱所生故一名血實又名免齧者亦當以其形狀似於免齧因以爲名

血瘡候

血瘡者云諸患風濕搏於血氣而生瘡其熱氣發逸瘡但出血者名爲血瘡也

瘡中風寒水候

凡諸瘡生之初因風濕搏於血氣發於皮膚故生也若久不瘥多中風冷水氣若中風則噤瘡中冷則難瘥中水則腫也

露敗瘡候

凡患諸瘡及惡瘡初雖因風濕搏於血氣蘊結生熱蒸發皮肉成瘡若觸水露氣動經十數年不瘥其瘡瘀黑作痴如被霜瓠皮瘡內肉似斷故名露敗瘡也

瘡惡肉候

諸瘡及癰疽皆是風濕搏於血氣血氣蘊結生熱而發肌肉成瘡人不瘥者多生惡肉四邊突起而好肉不生

此由毒熱未盡經絡尙壅血氣不到故也

瘡瘻復發候

諸惡瘻皆因風濕毒所生也當時雖瘥其風毒氣猶在經絡者後小勞熱或食毒物則復更發

漆瘡候

漆有毒人有稟性畏漆但見漆便中其毒喜面痒然後脣臂腔瞼皆悉癩痒面爲起腫繞眼微赤諸所痒處以手搔之隨手輦展起赤癧癟癧消已生細粟瘻甚微有中毒輕者證候如此其有重者遍身作瘻小者如麻豆大者如棗杏膿焮疼痛摘破小定或小瘥隨次更生若火燒漆其毒氣則厲著人急重亦有性自耐者終日

燒煮竟不爲害也

凍爛腫瘡候

嚴冬之月觸冒風雪寒毒之氣傷於肌膚血氣壅滯因卽瘃凍焮赤疼腫便成凍瘡乃至皮肉爛潰重者支節墮落

夏日沸爛瘡候

盛夏之月人膚腠開易傷風熱風熱毒氣搏於皮膚則生沸瘡其狀如湯之沸輕者而已如粟粒重者熱汗浸漬成瘡因以爲名世呼爲沸子也

傷瘡病諸候

凡四論

湯火瘡候

凡被湯火燒者初慎勿以冷物及井下泥尿泥及蜜淋
搗之其熱氣得冷卽郤深搏至骨爛人筋也所以人中
湯火後喜攀縮者良由此也

灸瘡急腫痛候

夫灸瘡膿潰已後更焮腫急痛者此中風冷故也

灸瘡久不瘥候

夫灸之法中病則止病已則瘡瘥若病勢未除或中風
冷故久不瘥也

針灸瘡發洪候

夫針灸皆是節穴俞募之處若病甚則風氣衝擊於瘡
凡血與氣相隨而行故風乘於氣而動於血血從灸瘡

處出氣盛則血不止名爲發洪

皖南建德

周氏校刊

巢氏諸病源候總論卷三十六

獸毒病諸候 凡四論

馬嚙踰人候

凡人被馬嚙踰及馬骨所傷刺并馬韁靽勒所傷皆爲
毒瘡若腫痛致煩悶是毒入腹亦斃人

馬毒入瘡候

凡人先有瘡而乘馬汗并馬毛垢及馬屎尿及坐馬皮
鞚並能有毒毒氣入瘡致焮腫疼痛煩熱毒入腹亦斃
人

不獵狗嚙候

凡獵狗嚙人七日輒一發過三七日不發則無苦也要

過百日方大免耳當終身禁食犬肉及蠶蛹食此發則死不可救矣瘡未愈之間禁食生魚猪雞膩過一年禁之乃佳但於飲下飯蒸魚及於肥器中便發若人曾食落葵得犬噉者自難治若瘡瘥十數年後食落葵便發

蛇毒病諸候
凡五論

凡中蛇不應言蛇皆言蟲及云地索勿正言其名也惡

蛇之類甚多而毒有差劇時四月五月中青蛙三角蒼
虺白頸大蜴六月七月中竹狩艾蝮黑甲赤目黃口反
鉤白蛙三角此皆蛇毒之猛者中人不卽治多死又有
赤連黃領之類復有六七種而方不盡記其名水中黑
色者名公蠣山中一種亦相似不常聞蟄人又有鉤蛇
尾如鉤能倒牽人獸入水沒而食之又南方有吻蛇人
忽傷之不死終身伺覓其主不置雖百人衆中亦直來
取之惟遠去出百里乃免耳又有施蛇長七八尺如船
施狀毒人必死卽剉取船施煮汁漬之便瘥但蛇例雖
多今皆以青條矯尾白頸艾蝮其毒尤劇大者中人若
不卽治一日間舉體洪腫皮肉坼爛中者尙可得二三

日也凡被蛇蟄第一禁第二藥無此二者有全劑雄黃麝香可預辦故山居者宜令知禁法也又惡蛇蟄者人卽頭解散言此蛇名黑帝其瘡冷如凍凌此大毒惡不治一日卽死若頭不散此蛇名赤帝其毒小輕瘡上冷不治故得七日死凡蛇瘡未愈禁熱食熟食便發治之依初被蟄法也

蝮蛇蟄候

凡蝮中人不治一日死若不早治之縱不死者多殘斷人手足蝮蛇形乃長頭褊口尖頸斑身亦艾斑色青黑人犯之頸腹帖著地者是也江東諸山甚多其毒最烈草行不可不慎又有一種狀如蝮而短有四腳能跳來

嚙人名曰千歲蝮中人必死然其嚙人竟卽跳上樹作聲云斫木者但營棺具不可救若云擣菽者猶可治吳音呼藥爲菽故也

虺蟹候

虺形短而褊身亦赤黑色山草自不甚多每六七月中夕時出路上喜入車轍中令車轍腹破而子出人侵晨及冒昏行者每傾意看之其蟹人亦往往有死者

青蛙蛇蟹候

青蛙蛇者正綠色喜綠樹及竹上自掛與竹樹色一種人看不覺若入林中行有落人項背上者然自不傷齧人齧人必死此蛇無正形極大者不過四五寸世人皆

呼爲青條蛇言其與枝條同色乍看難覺其尾二三寸
色黑者名蠍尾毒最猛烈中人立死

蠍毒候

此是諸毒蛇夏日毒盛不泄皆齧草木及吐毒著草木
上人誤犯著此者其毒如被蛇螫不殊但瘡腫上有物
如蟲蛇眼狀以此別之名爲蠍毒

雜毒病諸候

凡十四論

蜂蟹候

蜂類甚多而方家不具顯其名唯地中大土蜂最有毒
一螫中人便卽倒悶舉體洪腫諸藥治之皆不能卒止
舊方都無其法雖然不肯殺人有禁術封唾亦微效又

有瓠瓢蜂抑亦其次餘者猶瘥

蠍蟻候

此蟲五月六月毒最盛云有八節九節者彌甚蟻人毒勢流行多至牽引四支皆痛過一周時始定

薑蟹候

陶隱居云薑蟲方家亦不能的辯正云是蠍蟻子或云是小烏蟲尾有兩歧者然皆恐非也疑卽是蠍蟻尾歧而曲上故周詩云彼都人士拳髮如薑兩頭皆蒲臘人

蜈蚣蟻候

此則百足蟲也雖復有毒而不甚蟻人人誤觸之者故時有中其毒

祺蜍著人候

江東及嶺南無處不有祺蜍。祺蜍乃是兩種物。祺者在草裏，名爲山祺。在水裏，名馬祺。皆長四五寸許。黑色。身滑。人行涉山水，卽著人肉，不甚痛。而痒。兩頭皆能嗍人血。血滿腹，便自脫地。無甚毒害。蜍者無不背作文理粗澀。多著龜螺殼上。若著人肉，卽於肉裏生子。乃至十數枚。經日便腫。痒隱軫起。久久亦成瘡瘻。

石蛭蟄人候

山中草木及路上石上，石蛭著人，則穿噬肌皮。行人肉中浸滯，起瘡灸。斷其道，則愈。凡行山草之中，常以膏和藥塗足脰，則蛭不得著人。

蠶噉候

蠶既是人養之物性非毒害之蟲然時有噉人者乃令人增寒壯熱經時不瘥亦有因此而致斃斯乃一時之怪異救解之方愈

甘鼠噉候

此卽鼴鼠也形小而口尖多食傷牛馬不甚痛云其口甜故名甘鼠時有噉人者

諸魚傷人候

魚類甚多其鮆鯈鯷鯔鯉之徒齧骨芒刺有毒傷人則腫痛

惡颶噉候

颶房中切

鰐無鼠齧首兩目瞼外眼

惡蠅一名滿大如毒蟬似蝗無尾前有兩角觸後則傍
後觸前則卻行生於樹皮內及屋壁間又喜在紙書內
圓似榆莢其色赤黑背橫理三月生十月蟄蟄人唯以
三時五月六月七月尤毒初如胞狀中央紫黑大如粟
粒四傍微腫焮焮色赤或有青色者痒喜搔之若飲酒
房室近不過八九日遠不過十餘日爛潰爲膿汁亦殺
人

蛆尿刺候

云是野狐尿棘刺頭有人犯之者則多中於人手指足
指腫痛焮熱有端居不出而着此毒者則不必是狐尿
刺也蓋惡毒氣耳故方亦云惡刺毒者也

蟇蟲螯候

此則樹上毛蟲耳以其毛刺能螯人故名蟇蟲此毒蓋輕不至深斃然亦甚痛螯處作軫起者是也

蟇蟆尿候

蟇蟆蟲云能尿人影卽令所尿之處慘痛如芒刺亦如蟇蟲所螯然後起細痞癧作聚如茱萸子狀其痞癧徧赤中央有白膿如粟粒亦令人皮肉拘急惡寒壯熱極者連起多着腰脇及胸若繞腰匝徧者重也

入井塚墓毒氣候

凡古井塚及深坑窯中多有毒氣不可輒入五月六月間最甚以其鬱氣盛故也若事輒必須入者先下雞鴨

毛試之若毛旋轉不下卽是有毒便不可入

金瘡病諸候

凡二十三論

金瘡初傷候

夫被金刃所傷其瘡多有變動若按瘡邊乾急肌肉不生青黃汁出瘡邊寒清肉消臭敗前出赤血後出黑血如熟爛骨及血出不止白汁隨出如是者多凶若中絡脉髀內陰股天聰眉角橫斷腓腸乳上及與鳩尾攢毛小腹尿從瘡出氣如竇脈及腦出諸瘡如是者多凶少愈診金瘡血出太多其脉虛細者生數實大者死小者生浮大者死所傷在陽處者去血四五斗脉微緩而遲者生急疾者死

金瘡血不止候

金瘡血出不斷其脉大而止者三七日死金瘡血出不可止前赤後黑或黃或白肌肉腐臭寒冷輒急者其瘡難愈亦死

金瘡內漏候

凡金瘡通內血多內漏若腹脹滿兩脇脹不能食者死瘀血在內腹脹脉牢大者生沉細者死

毒箭所傷候

夫被弓弩所傷若箭鏃有藥入人皮脉令人短氣須臾命絕口噤脣乾血爲斷絕腹滿不言其人如醉未死之間爲不可治若榮衛青瘀血應時出瘡邊溫熱口開

能言其人乃活毒箭有三種嶺南夷俚用焦銅作箭鏃
次嶺北諸處以蛇蟲毒熬物汁着管中潰箭鏃此二種
纔傷皮便洪腫沸爛而死唯射豬犬雖困得活以其噉
糞故也人若中之便卽食糞或飲糞汁并塗瘡卽愈不
爾須臾不可復救箚箭着寬處者雖困漸治不必死若
近胸腸便宜速治小緩毒入內則不可救

金瘡腸出候

此謂爲矛箭所傷若中於腹則氣激氣激則腸隨瘡孔
出也

金瘡腸斷候

夫金瘡腸斷者視病深淺各有死生腸一頭見者不可

連也若腹痛短氣不得飲食者大腸一日半死小腸三
日死腸兩頭見者可速續之先以針縷如繫連續斷腸
便取雞血塗其際勿令氣泄卽推內之腸仍出不斷者
當作大麥粥取其汁持洗腸以水漬內之當作研米粥
飲之二十餘日稍作強糜食之百日後乃可進飲耳飽
食者令人腸痛決漏常服錢屑散若腸腹珊音從瘡出
有死者有生者但視病取之各有吉凶臘出如手其下
牢核煩滿短氣發作有時不過三日必死臘下不留安
定不煩喘息如故但瘡痛者當以生絲縷繫絕其血脉
當令一宿乃可截之勿閉其口膏稍導之

金瘡筋急相引痛不得屈伸候

夫金瘡愈已後肌肉充滿不得屈伸者此由傷絕經筋榮衛不得循行也其瘡雖愈筋急不得屈伸也

金瘡傷筋斷骨候

夫金瘡始傷之時半傷其筋榮衛不通其瘡雖愈合後仍令痺不仁也若被瘡截斷諸解身軀肘中及腕膝髀若踝際亦可連續須急及熱其血氣未寒碎骨便更縫連其愈後直不屈伸若碎骨不去令人痛煩膿血不絕不絕者不得安諸中傷人神十死一生

箭鏃金刃入肉及骨不出候

箭鏃金刃中骨骨破碎者須令箭鏃出仍應除碎骨盡乃傳藥不爾瘡永不合縱合常疼痛若更犯觸損傷便

驚血沸潰有死者

金瘡中風痙候

夫金瘡瘻者此由血脉虛竭飲食未復未滿月日榮衛傷穿風氣得入五藏受寒則痙其狀口急背直搖頭馬鳴腰爲反折須臾大發氣息如絕汗出如雨不及時救者皆死凡金瘡卒無汗者中風也邊自出黃汁者中水也並欲作痙急治之又痛不在瘡處者傷經絡亦死

金瘡驚痙候

夫金瘡愈閉後忽驚腫動起糜沸跳手大者如盂小者如盃名爲盜血此由肌未定裏不滿因作勞起早故令盜血涌出在人皮中不肯自消亦不成膿反牢核又有

加血加血者盜血之滿也其血凝深不可妄破破之者
盜血前出不可禁止加血追之出卽滿瘡中便留止令
人短氣須臾命絕

金瘡因交接血驚出候

夫金瘡多傷經絡去血損氣其瘡未瘥則血氣尙虛若
因而房室致情意感動陰陽發泄驚觸於瘡故血汁重

出

金瘡驚悸候

金瘡失血多者必驚悸以其損於心故也心主血血虛
則心守不安心守不安則喜驚悸悸者心動也

金瘡煩候

金瘡損傷血氣經絡空虛則生熱熱則煩痛不安也

金瘡欬候

金瘡傷血損氣氣者肺之所主風邪中於肺故欬也

金瘡渴候

夫金瘡失血則經絡空竭津液不足腎臟虛燥故渴也

金瘡蟲出候

夫金瘡久不瘥及裏縛不如法瘡內敗壞故生蟲也

金瘡着風候

夫金瘡乾無汁亦不大腫者中風也寒氣得大深者至藏便發作瘡多凶少愈中水者則腫多汁或成膿

金瘡着風腫候

此由瘡着於風風氣相搏故腫也

金瘡成癰腫候

夫金瘡冬月之時衣厚絮溫故裏欲薄夏月之時衣單日涼故裏欲厚重寒傷榮重熱傷衛筋勞結急肉勞驚腫骨勞折沸難可屈伸血脉勞者變化作膿榮衛不通留結成癰凡始縫其瘡各有縱橫雞舌隔角橫不相當縫亦有法當次陰陽上下逆順急緩相望陽者附陰陰者附陽腠理皮脈復令復常但亦不瞬略作一行陰陽閉塞不必作膿榮衛不通留結爲癰晝夜不臥語言不同碎骨不去其人必凶雞舌隔角房不相當頭毛解脫忘失故常瘡不再縫膏不再漿

金瘡中風水候

夫金瘡裏縛不密爲風水氣所中則疼痛不止而腫痛
內生青黃汁

金瘡下血虛竭候

金刃中於經絡者下血必多腑臟空虛津液竭少無血
氣榮養故須補之

金瘡久不瘥候

夫金瘡有久不瘥者膿汁不絕肌肉不生者其瘡內有
破骨斷筋伏血腐肉缺刃竹刺久而不出令瘡不愈喜
出青汁當破出之瘡則愈

腕傷病諸候

凡九論

被打頭破腦出候

夫被打陷骨傷腦頭眩不舉戴眼直視口不能語咽中沸聲如痏子喘口急手爲妄取一日不死三日小愈

走全腕折破骨傷筋候

凡人傷折之法卽夜盜汗者此髓斷也七日死不汗者

不死

卒被損瘀血候

夫有瘀血者其人喜忘不欲聞物聲病人胸滿唇萎舌青口燥但欲漱水不欲咽無熱脉微大來遲腹不滿其人言我腹滿爲有瘀血汗當出不出內結亦爲瘀病人胸滿口乾髀痛渴無寒熱爲有瘀血腹滿口燥不渴睡

如漿狀此有留血爾從高頓仆內有血腹脹滿其脈牢
强者生小弱者死得笞掠內有結血脉實大者生虛小
者死其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云端坐生腰舉左手仰掌以右手承右
脇以鼻內氣自極七息除瘀血結氣又云鼻內氣口閉
自極七息除兩脇下積血氣又云端坐生腰舉左手

右手承右脇鼻內氣七息除瘀血又云端坐右手持

腰鼻內氣七息左右戾頭各三十止除體瘀血項頸痛

又云雙手搦腰手指相對向盡勢前後振搖二七又
將手大指向後極勢振搖二七不移手上下對與氣下

盡勢來去三七去雲門腰掖血氣閉塞

壓迮墜墮內損候

迮音責

此爲人卒被重物壓迮或從高陞下致吐下血此傷五
內故也

腕傷初繫縛候

夫腕傷重者爲斷皮肉骨髓傷筋脉皆是卒然致損故
血氣隔絕不能周榮所以須善繫縛按摩導引令其血
氣復也

被損久瘀血候

此爲被損傷仍爲風冷搏故令血瘀結在內久不瘥也

腕折中風瘡候

夫腕折傷皮肉作瘡者慎不可當風及自扇若風入瘡

內犯諸經絡卽致瘡瘻者脊背強直口噤不能言也

腕折中風腫候

此爲風入瘡內而不入經絡其搏於氣故但腫也

刺傷中風水候

此爲竹木所刺傷其瘡中風水者則腫痛乃至成膿