

醫宗必讀

九



一	二	三	四	漢書門
八	六	五	三	
一	八	二	九	
冊	架	函	號	類

庫	文	閣	內
函	一	四	漢書
架	七	八	九
冊	號	類	

內閣文庫	
番號	漢 12439
冊數	18 (15)
函號	301 48




A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak






醫宗必讀卷之九



門人董爾正季方父參
姪孫李廷芳蘅伯父訂

雲間李中梓



大便不通

經曰北方黑色入通于腎開竅于二陰腎主五

盛則大便調和若饑飽勞役損傷胃氣及過干
辛熱厚味則火邪伏下血中耗散真陰津液虧
少故大便燥結又有年老氣虛津液不足而結者腎惡燥急食辛以潤之是也

愚按內經之言則知大便秘結專責之少陰一

經證狀雖殊總之津液枯乾一言以蔽之也分
而言之則有胃實胃虛熱秘冷秘風秘氣秘之
分胃實而秘者善飲食小便赤麻仁丸七下胃虛
而秘者不能飲食小便清利厚朴湯熱秘者面赤
身熱六脈數實腸胃脹悶時欲得冷或口舌生
瘡四順清涼飲潤腸丸木香檳榔丸實者承氣湯冷秘者面白或黑六
脈沉遲小便清白喜熱惡冷藿香正氣散加官桂枳殼吞半硫丸
氣秘者氣不升降穀氣不行其人多噎蘇子降氣湯加
枳殼吞養正丹未效風秘者風搏肺藏傳于大

腸小續命湯去附子倍芍藥加竹瀝更有老年津
液乾枯婦人產後亡血及發汗利小便病後血
氣未復皆能秘結法當補養氣血使津液生則
自通誤用硝黃利藥多致不救而巴豆牽牛其
害更速八珍湯加蘇子廣橘紅杏仁茯苓倍用當歸若病證雖屬陰
寒而脈實微躁宜溫暖藥中畧加苦寒以去熱
躁躁止勿加如陰躁欲坐井中者兩尺按之必
虛或沉細而遲但煎理中湯待極冷方服或服
藥不應不敢用峻猛之藥者宜蜜煎導之用鹽五分

醫宗必讀 卷之九 二 大便不通

皂角末五分入蜜冷秘者醬生薑導之或于蜜煎中其功更捷草烏頭末有熱者猪膽汁導之久虛者如常飲食法煮猪血臟湯加酥食之血仍潤血臟仍潤臟此妙法也每見江湖方士輕用硝黃者十傷四五輕用巴丑者十傷七不可不謹也或久而愈肺痿吐膿血或飲食不進而死醫案

少宰蔣恬庵服五加皮酒遂患大便秘結四日以來腹中脹悶服大黃一錢通後復結余曰腎

氣衰少津液不充誤行疎利是助其燥矣以六味丸料煎成加入乳一鍾白蜜五錢三劑後即通十日而康復矣

文學顧以貞素有風疾大便秘結經年不愈始來求治余曰此名風秘治風須治血乃大法也用十全大補湯加葶朮麻仁杏仁防風煨皂角仁半月而效三月以後永不復患以手書謝曰不肖道力僻處窮鄉日與庸人爲伍且櫻非常之疾困苦經年靡劑不嘗反深沉痼遂不遠

百里就治神良乍聆指教肺腑快然及飲佳方如臭味之投百日以來沉痾頓釋今日幸生歸矣凡仰事俯育儔非意外之慶則儔非台翁之賜哉全家額手尸祝湛恩乞附名案之尾以誌感悰幸甚

麻仁丸 治腸胃熱燥大便秘結

厚朴 去皮薑汁浸炒芍藥

枳實 麩炒各半觔

大黃 蒸焙 麻仁 別研

杏仁 去皮炒

右為末煉蜜和丸桐子大每服二十九臨臥

溫水下大便通利即止

七宣丸 治風氣結聚實邪秘結

桃仁 去皮尖炒六兩 柴胡 訶子皮

枳實 麩炒 木香 各伍兩 甘草 炙四兩

大黃 麩炒 煨

右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九食前臨臥各一服米飲下以利為度

厚朴湯 治胃虛秘結

厚朴 薑汁浸炒透 陳皮 甘草 各三兩

白木 五兩

半夏麴

枳實 麴炒各二兩

右為籠末每服五錢水一鍾半薑三片棗一枚煎至八分食前大溫服

四順清涼飲 治血燥內熱大便不通

大黃 蒸

甘草 炙

當歸 酒洗

芍藥 各一錢

水鍾半薄荷十葉煎至七分服

潤腸凡 治風結血秘胃中伏火

羌活

歸尾

大黃 煨各五錢

麻仁

桃仁 去皮尖各一兩

右為末除麻仁桃仁另研如泥外為細末煉

蜜丸如桐子大每服伍拾丸空心白湯送下

木香檳榔丸 疎導三焦快氣化痰消食寬中

木香

檳榔

枳殼 麴炒

杏仁 去皮尖炒

青皮 去瓢各一兩 半夏麴

皂角 酥炙

郁李仁 各二兩

大右為末別以皂角四兩用漿水一碗搓揉熬

膏更入熟蜜少許和丸桐子大每服五十九

食後薑湯下ス

大承氣湯

大黃

芒硝

厚朴

去皮

枳實

各二錢

水二鍾生薑三片煎至九分內硝煎服ス

藿香正氣散

小續命湯

養正丹

八珍湯

俱見各中風

蘇子降氣湯

治氣滯妨悶痰盛便秘ス

蘇子

炒

半夏

湯泡各三錢半

前胡

甘草

炙

厚朴

薑汁浸炒

陳皮

各一錢

當歸

一錢二分

沉香

七分

水二鍾薑三片煎一鍾服虛人加桂五分黃

耆一錢

半硫丸 治老人虛人冷秘ラ

熟半夏

為細末

硫黃

研極細用柳木槌子殺過

以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和入

瓶內杵數百下丸如桐子大每服十五丸至

二十九溫酒或薑湯下婦人醋湯下俱空心

服

橘杏湯

治脉浮氣秘

若脉沉為血秘以桃仁代杏仁

杏仁

湯泡去皮尖炒黃五錢

橘紅

去白淨二錢半

水一鍾生薑三片煎七分服

益血潤腸丸

熟地黄

六兩

杏仁

去皮尖炒

麻仁

各三兩以上三味俱

枳殼

炙炒

橘紅

各二兩五錢

阿膠

炒

肉苳蓉

各一兩半

蘇子

荆芥

各一兩

當歸

三兩

為末以前三味膏同杵干餘下仍加煉蜜丸
桐子大每服六十丸空心白湯下

穿結藥 治大實大滿心胸高起便秘

蟾酥

輕粉

麝香

各一錢

巴豆

五分另研

右研極細末用孩兒茶乳汁和丸如黍米大
每服三丸薑湯送下

經曰督脉生病為遺溺又曰肝所生病為遺溺
又曰膀胱不約為遺溺又曰手太陰之別名曰
列缺其病虛則欠欬小便遺數
延孔而已三焦為決瀆之官失其常則遺溺何
也三焦之脉從缺盆布膻中下膈循屬三焦膀胱
凡三焦虛則膀胱亦虛故不約也肺從上焦通
調水道下輸膀胱而腎又上連于肺兩藏為子
母母虛子亦虛此言上中下三焦氣虛皆可以
致遺溺也

小便不禁

經曰督脉生病為遺溺又曰肝所生病為遺溺

又曰膀胱不約為遺溺又曰手太陰之別名曰

列缺其病虛則欠欬小便遺數

延孔而已三焦為決瀆之官失其常則遺溺何

也三焦之脉從缺盆布膻中下膈循屬三焦膀胱

凡三焦虛則膀胱亦虛故不約也肺從上焦通

調水道下輸膀胱而腎又上連于肺兩藏為子

母母虛子亦虛此言上中下三焦氣虛皆可以

愚按世俗之治小便不禁者但知補澀而已不知內經論肝督膀胱之病不指為何邪所于則知七情六氣皆能為病也又言手太陰虛者為子母相關之病則知所生所勝所不勝之五邪皆足以為病也總其大要而言肺者主氣以下降生水以下輸膀胱者津液藏焉氣化則能出水泉不止者膀胱不藏也此兩經者實為總司肺虛者為上虛當補氣補中益氣湯不愈當以黃蘗生地麥門冬清其熱膀胱虛者為下虛當澀脫桑螵蛸雞脬鹿之類挾寒者家韭子

左固脾丸白茯苓散兔絲子散之類滑更有疇脫者牡蠣丸挾熱者白薇散或雞腸散則遺尿皆責之虛所以嬰兒挾熱者十居七八在元不足多有此證在嬰兒挾熱者十居七八在老人挾寒者十居七八此又不可不辨也宜大子丸猪脾炙研碎煎湯送下更須審寒熱而為之活法

始尿出不知用白礬牡蠣為末酒調服二錢或雞毛灰末酒服一七或炙桑螵蛸益智仁為末米飲下薛立齋云此證若脬中有熱加味道遙散若脾肺氣虛補中益氣湯加益智若肝腎

陰虛六味丸

產後小便不禁此氣血虛不能制故也薛立齋云若因穩婆損胞者入珍湯兼進補脾飲若膀胱氣虛而小便頻數當補脾肺若膀胱陰虛者須補肺腎

醫案

方伯張七澤夫人患飲食不進小便不禁余曰六脉沉遲水泉不藏是無火也投以八味丸料兼進六君子加益智肉桂二劑戒數劑而安

文學俞玄倩憂憤經旬忽然小便不禁醫皆以固脬補腎之劑投之凡一月而轉甚余謂之曰六脉舉之則軟按之則堅此腎肝之陰有伏熱也用牡丹皮白茯苓各二錢苦參八分甘草稍六分黃連一錢煎成調黃鷄腸與服六劑而安矣適有吳門醫者云既愈當大補之數日後仍復不禁再來求治余曰肝家素有鬱熱得溫補而轉熾遂以龍膽瀉肝湯加黃雞腸服之四劑即止更以四君子加黃連山枝一月而痊

家韭子丸 治遺溺夢遺白濁

家韭子

炒陸兩

鹿茸

酥炙四兩

肉苁蓉

酒浸去甲

牛膝

酒浸

熟地黄

當歸

各二兩

兔絲子

酒浸

巴戟

各一兩五錢

杜仲

炒

石斛

去苗

桂心

乾薑

各一兩

右爲末酒糊丸桐子大每服五十九丸加至百

丸空心食前鹽湯溫酒任下

固脬丸

兔絲子

二兩製

茴香

一兩

附子

泡去皮臍

桑螵蛸

炙各五錢

戎鹽

二分五分

右爲細末酒糊丸梧子大每服三十九空心

米飲送下

白茯苓散

白茯苓

龍骨

乾薑

炮

附子

炮去皮臍

續斷

桂心

甘草

炙各一兩

熟地黄

桑螵蛸

微炒各二兩

右剉碎每服四錢水一盞煎六分食前服

鹿茸散

治小便不禁陰痿脚弱

鹿茸二兩去毛酥炙 韭子微炒 羊躑躅酒拌炒乾
附子炮 澤瀉 桂心各一兩

右爲細末每服貳錢食前粥飲調服

兔絲子散 治小便不禁或過多

兔絲子二兩酒浸三日晒乾另搗爲細末 牡蠣

附子炮去皮臍 五味子各一兩 鷄胫黃皮炒

肉苁蓉各二兩

右爲末每服二錢粥湯送下

牡蠣丸

牡蠣白者三兩入磁瓶鹽泥固濟炭伍斤煨半日取出研細

赤石脂三兩搗碎醋拌勻濕于生鐵銚內慢火炒令乾二味各研如粉

酒糊丸梧子大每服伍拾丸空心鹽湯下

白薇散

白薇 白欝 白芍藥各等分

右爲末每服二錢粥飲下

雞腸散

黃雞腸雄者四具切破洗淨炙令黃 黃連去鬚

肉苁蓉酒洗切焙 赤石脂另研 白石脂另研

苦參 各五兩

右為末每服二錢食前酒下日三夜一

大兔絲子丸 治腎虛小便不禁

兔絲子 淨洗酒浸 澤瀉 鹿茸 去毛 酥炙

石龍芮 去土 肉桂 去麤皮 附子 炮去皮 各一兩

石斛 去根 熟地黄 白茯苓 去皮

牛膝 酒浸 宿焙乾 續斷 山茱萸 去核

肉苁蓉 酒浸 切焙 防風 去蘆 杜仲 去麤皮 炒去絲

補骨脂 去衣 酒炒 萆澄茄 沉香

巴戟 去心 茴香 炒各三兩 五味子

桑螵蛸 酒浸 炒 覆盆子 去枝 葉萼 各半兩

右為細末酒煮麵糊丸如桐子大每服二十

丸空心温酒或鹽湯任下

逍遙散 治血虛小便不禁

白茯苓 白朮 土炒 當歸身

白芍藥 酒炒 柴胡 各一錢 甘草 五分

水一鍾煨薑三分煎至六分服

補中益氣湯 八珍湯 六味丸 俱見

醫宗必讀 卷之九 十三 小便不禁

補脬飲 治產時傷脬小便漏出

生黃絲絹 一尺剪碎 白牡丹 根皮用 白芨 各一錢

右為末水一碗煮至絹爛如錫空心頓服服時不得作聲作聲即不效

桑螵蛸散 治陽氣虛弱小便不禁

桑螵蛸 三十箇炒 鹿茸 酥炙 黃耆 各三兩

牡蠣 煨 人參 赤石脂 各二兩

右為末每服二錢空心粥飲調服

遺精 夢與女交為夢遺不因

經曰怵惕思慮者則傷神神傷則恐懼流淫而

不止 怵恐也惕驚也流淫謂流出淫精也思慮

懼而傷腎腎傷則精不固此又曰恐懼而不解

則傷精精傷則骨痠痠厥精時自下 即上文之意

也又曰五藏主藏精者也傷則失守 此言五藏

非腎之一藏獨有精也五藏各有其所傷則失其

藏精之職而不能自守所以精不能固時有遺

患也又曰腎者主水受五藏六府之精而藏之

食氣入胃散精于五藏又水飲自脾肺而輸之

于腎水精四布五經並行此水穀日生之精也


後天日生之精與先天生來之精互化生成
總輪于腎故曰受五藏六府之精而藏之
又曰厥氣客于陰器則夢接內陰器者宗筋之所繫也足太陰陽明少陰厥陰之筋皆結聚于陰器與衝任督三脉之所會然厥陰主筋故諸筋皆統屬于厥陰也腎為陰主藏精肝為陽主疎泄陰器乃泄精之竅是故腎之陰虛則精不藏肝之陽強則氣不固若遇陰邪客于其竅與相火強陽相感則夢寐之間精氣漏泄矣

愚按古今方論皆以遺精為腎氣衰弱之病若與他藏不相干涉不知內經言五藏六府各有精腎則受而藏之以不夢而自遺者心腎之傷居多夢而後遺者相火之強為害若乎五藏各

得其職則精藏而治苟一藏不得其正甚則必害心腎之主精者焉治之之法獨因腎病而遺者治其腎由他藏而致者則他藏與腎兩治之如心病而遺者必血脉空虛本縱不收肺病而遺者必皮革毛焦喘急不利脾病而遺者色黃肉消四肢懈惰肝病而遺者色青而筋痿腎病而遺者色黑而髓空更當以六脉參詳昭然可辨然所因更自多端有用心過度心不攝腎而失精者宜遠志丸佐以靈砂丹有色慾不遂而致精泄者

四七湯吞白丸子甚者耳聞目見其精即出名曰白淫妙香散吞玉華白丹有色慾過度精竅虛滑正元散加牡蠣粉肉苁蓉各半錢吞靈砂丹仍佐以鹿茸丸山藥丸大克絲子丸固陽丸之類有壯年久曠精滿而溢清心丸飲酒厚味痰火濕熱擾動精府蒼朮木白朮半夏升麻柴胡俾清升濁降有脾虛下陷者補中益氣湯有腎虛不固者五倍子貳兩茯苓四兩為丸服之神驗然其證狀亦復不同或小便後出多不可禁者或不小便而自出或莖中癢痛常如欲小便者或夢女交者並從前法分別施治或實有鬼魅相感其狀

不欲見人如有對晤時獨言笑時常悲泣脉息乍大乍小乍有乍無及脉來綿綿不知度數而顏色不變乃其候也宜殊砂雄黃麝香鬼箭虎頭骨之類或但服蘇合丸神效更有久曠之人或縱慾之人與女交合泄而神不止謂之走陽其女須抱定勿使陰莖出戶急呵熱氣于口中以指捻住尾間即救矣若女人驚而脫去者十有九成亟以童女接氣灌以大劑獨參湯亦有活者總其大綱言之精滑宜澀之澀而不效即瀉心火瀉而不效即以補中益



氣用升麻柴胡至一二錢舉其氣上而不下往
往有功詎可補之不效澀之無靈遂委之命也
哉

醫案

文學顧以功科試勞神南都歸即患精滑小便
後及夢寐間俱有遺失自服金櫻子膏經月不
驗問治于余余曰氣虛而神動非遠志丸不可
服十日而減半一月而全愈

武科張寧之稟質素強縱飲無度忽小便畢有

白精數點自以為有餘之疾不肯醫治經二月
以來雖不小便時有精出覺頭目眩暈醫者以
固精澀脫之劑治療兩月畧不見功迎余治之
但見六脉滑大此因酒味濕熱下干精藏遂以
白朮茯苓橘紅甘草乾葛白蔻加黃柏少許兩
劑後即效不十日而康復如常

儒者錢用賓色慾過度夢遺精滑先服清相火
之劑不效繼服固澀之劑又無效求余治之余
以玉華白丹濃煎人參湯送貳錢兩服後稍固

兼進六味地黄丸加蓮鬚茨實遠志五味子凡一月而愈

遠志丸 治心腎不足夢遺精滑

茯神去皮木 白茯苓去皮膜 人參

龍齒各一兩 遠志去木薑汁浸 石菖蒲各二兩

右為末蜜丸桐子大辰砂為衣每服七十丸

空心熱鹽湯下

靈砂丹 治上盛下虛痰涎壅盛最能鎮墜

水銀 一斤 硫黃 四兩

右二味用新銚內炒成砂子入水火鼎煨煉為末糯米糊丸如麻子大每服三丸空心棗湯米湯參湯任下忌猪羊血菜豆粉冷滑之物

茯神湯 治慾心太熾夢遺心悸

茯神去皮木 遠志去心 酸棗仁炒各一錢二分

石菖蒲 人參 白茯苓各一錢

四小黃連 生地黃各八分 當歸酒洗一錢

木甘草 四分

水二鍾蓮子七粒槌碎煎八分食前服

四七湯 治七情鬱結痰氣妨悶嘔吐惡心神情不快

半夏一錢 茯苓去皮一錢二分 紫蘇葉六分

厚朴薑製九分

水一鍾薑七片紅棗二枚煎八分服

青州白丸子 治風痰壅盛癱疾嘔吐涎沫氣不舒暢悶悶不寧

半夏生七兩 南星生三兩 白附子生二兩

川烏生半兩 去皮臍

右為末以生絹袋盛於井花水內揉出滓再

研再揉以盡為度置磁盆中日晒夜露至曉

去舊水別用井水攪又晒至來日早再換新

水攪春五日夏二日秋七日冬十日去水晒

乾以糯米粉煎粥清丸菘豆大薑湯下二十

丸

妙香散 安心神閉精氣

龍骨五色者 益智仁 人參各一兩

白茯苓去皮 遠志去心 茯神去皮木各半兩

硃砂水飛 甘草炙各貳錢五分

右爲末每服二錢空心温酒調服

玉華白丹 清上實下助養本元最治

鍾乳粉 煉成者 白石脂 淨瓦上煨通 陽起

石 磁礮中煨令通紅取出酒 左顧牡蠣 七

洗用韭葉搗汁鹽泥 固濟火煨取白者

右四味各研令極細拌和作一處研一二日

以糯米粉煮糊爲丸如芡實大入地坑出火

毒一宿每服一粒空心濃煎人參湯待冷送

下不借不燥可以久服大補真元最祛宿疾

婦人無姪者當歸地黃浸酒送下凡服藥後

以少少白粥壓之忌猪羊血菘豆粉

正元散 治下元虛臍腹脹痛泄利嘔吐陽虛

紅豆 炒 乾薑 炮 陳皮 去白各

茯苓 去皮 人參 白朮

甘草 炙各 肉桂 去麤 川芎 炮去皮

附子 炮去 山藥 薑汁 川芎

烏藥 乾葛 各一 黃耆 炙一兩

右爲細末每服三錢水一盞薑三片棗一枚

鹽少許煎七分食前温服

鹿茸益精丸 治心腎虛冷漏精白濁

鹿茸去毛 桑螵蛸焙 肉苁蓉

巴戟去心 兔絲子酒浸 杜仲去皮薑汁炒

益智仁 禹餘糧火煨 川棟子去皮

當歸各三 韭子微炒 補骨脂炒

山茱萸去核 赤石脂 龍骨另研各

滴乳香二錢五分

爲末酒煮糯米糊爲丸桐子大每服七十九

食前白茯苓煎湯送下

山藥丸 治諸虛百損夢失精滑

赤石脂煨 茯神去木 山茱萸去核

熟地黄酒浸 巴戟去心 牛膝酒浸

澤瀉各一 杜仲去皮薑汁炒 兔絲子酒浸

山藥各三 五味子六兩 肉苁蓉酒浸

右爲末蜜丸桐子大每服三錢鹽湯送下

大兔絲子丸見小便不禁

固陽丸



醫宗必讀 卷之九

附子炮三兩 川烏頭炮二兩 白龍骨一兩

補骨脂一兩 舶上茴香一兩 川棟子各一兩

右為末酒糊丸桐子大每服五十九空心酒

下山藥

補中益氣湯方見 蘇合香丸方見

秘真丸 固精安神方見

龍骨一兩 訶子皮五枚 砂仁五錢

山藥一兩 硃砂一兩 水飛

右為末麵糊丸菜豆大每服三錢空心酒下

金鎖玉關丸 治遺精白濁心虛不寧

鷄頭肉 蓮子 蓮鬚

藕節 白茯苓 白茯神

乾山藥

等分為末金櫻子煎膏為丸梧子大每服三

錢米飲送下

清心丸 治經絡熱夢遺心悸

黃蘗皮一兩 生腦子一錢

同研勻蜜丸桐子大每服十九加至十五丸

醫宗必讀 卷之九 遺精

之六七由濕熱流注與虛者十之二三其有赤
白之分者何也精者血之所化濁去太多精化
不及赤未變白故成赤濁此虛之甚也所以少
年天癸未至強力行房所泄半精半血壯年施
泄無度亦多精血雜出則知丹溪以赤屬血白
屬氣者未盡然也又以赤為心虛有熱由思慮
而得白為腎虛有寒因嗜欲而得亦非確論總
之心動于欲腎傷于色或強忍房事或多服淫
方敗精流溢乃為白濁虛滑者血不及變乃為

赤濁挾寒則脉來沉遲無力小便清白草薢分
清飲八
味丸內補鹿茸丸之類挾熱則口渴便赤脉必滑數有力
清心蓮子飲香苓散有胃中濕痰流注蒼白二陳湯
加升麻柴胡有屬
虛癆六味地黃丸加蓮鬚芡
實兔絲五味龍骨牡蠣有因伏暑四苓散
加香薷
麥門冬人參石蓮肉之類有稠粘如膠澀痛異常乃精塞竅
道香苓散送八味丸或金匱腎氣
丸有熱者草薢分清飲扶元丸有思想太過
心動煩擾則精敗下焦加味清心飲
瑞蓮丸之類如上數端
此其大畧也若夫五藏之傷六淫之變難以枚
舉臨症之頃慎無輕忽

醫宗心讀 卷之九 赤白濁

脈候 脈大而瀉按之無力或微細或沉緊而瀉為虛尺脈虛浮急疾者皆難治遲者易治

醫案

歸德郡侯李易齋患白濁服五苓散數劑無功
余診之兩尺大而瀉是龍火虛炎精闕竅道用
牛膝茯苓黃蘗麥門冬山藥遠志細生甘草十
劑而安

光祿卿吳伯玉閉精行房時有文字之勞患白
濁莖中痛如刀割自服清火疎利之劑不效改

服補腎之劑又不效商洽千余余曰敗精久蓄
已足為害况勞心之餘水火不交坎離順用也
用草薺分清飲加茯苓神遠志肉桂黃連四劑即
效兼服補中益氣六味地黃丸半月而安後因
勞復發但服補中益氣一二劑即愈

清心蓮子飲 治心虛有熱小便赤濁

黃芩 麥門冬去心 地骨皮

木車前子 甘草炙各一分 石蓮肉

白茯苓 黃耆蜜炙 人參各七分

赤白濁

遠志

石菖蒲

各一錢

水二鍾煎一鍾空心温服發熱加柴胡薄荷

草薢分清飲 治真元不固赤白濁

益智仁

川草薢

石菖蒲

烏藥

各一錢

水一鍾入鹽一捻煎七分食前服

一方加茯苓甘草

蒼白二陳湯 治濕痰下注為白濁

蒼朮

糠炒

白朮

土炒各一錢

橘紅

一錢

半夏

茯苓

一錢二分

甘草

四分

水二鍾薑三片煎一鍾服

四苓散

茯苓 去皮

猪苓 去皮

白朮

土炒

澤瀉 各等分

右為細末每服三錢空心長流水調服

玄兔丹 治三消渴利神藥禁止遺濁

兔絲子

酒浸通軟乘濕研

五味子

酒浸別焙乾別取末十兩

白茯苓

去皮

乾蓮肉

各三兩

右為末別碾乾山藥末六兩將所浸酒添酒

煮糊搜丸如桐子大每服五十九空心食前
米飲下

六味地黄丸 八味地黄丸 補中益氣湯

金匱腎氣丸

見腫

內補鹿茸丸 補益精氣善止白淫

鹿茸

酥炙

兔絲子

酒浸

茯苓

炒

沙苑蒺藜

肉蓯蓉

紫苑

蛇床子

酒浸

黃耆

桑螵蛸

陽起石

附子

炮

官桂

各等分

右為細末蜜丸桐子大每服三十九食前温

酒送下

香苓散

即五苓散與辰砂妙香散合用

山藥

薑汁炒

茯苓

去皮

茯神

去皮

遠志

去心炒

黃耆

各一兩

人參

桔梗

去蘆

甘草

炙各半兩

木香

煨二錢五分

辰砂

三錢另研

麝香

一錢另研

猪苓

去皮

白朮

土炒

澤瀉

各八錢

肉桂

二錢

右為細末每服二錢用天麥二門冬去心煎

湯空心調服日三服頓愈

茯苓治思慮太過心腎虛傷真陽不固

兔絲子酒浸五兩石蓮子去殼二兩白茯苓去皮三兩

右為細末酒糊丸如桐子大每服五十九空

心鹽湯下

加味清心飲 治心中煩熱赤濁肥脂

白茯苓去皮石蓮肉各一錢半益智仁

麥門冬去心人參去蘆遠志去心薑汁炒

石菖蒲 車前子 白朮炒

澤瀉 甘草炙各一錢

水二鍾燈心二十莖煎至一鍾食前服有熱

加薄荷少許

瑞蓮丸 治思慮傷心赤白二濁

白茯苓去皮石蓮肉去心龍骨生用

天門冬去心麥門冬去心栢子仁炒另研

紫石英火煨研細遠志甘草水去心當歸去蘆酒浸

酸棗仁炒龍齒各兩乳香半兩另研

右為細末蜜丸梧子大硃砂為衣每服七十

赤白濁

丸空心温酒或棗湯送下

遠志丸 治赤濁如神

遠志 入兩 去心 茯神 去皮 木 益智仁 各二兩

右為細末酒煮麩糊為丸梧子大每服五十

丸臨臥棗湯送下

鎖精丸 治赤白濁

補骨脂 炒 青鹽 各四兩 白茯苓

五倍子 各二兩

右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服三十

丸空心鹽湯送下

水陸二仙丹 治赤白濁

金櫻子 去子及毛淨蒸熟慢火熬成膏 芡實肉 研為細粉 各等分

右以前膏同酒糊為丸梧子大每服三十九

食前温酒下一方用乳汁丸鹽湯下

赤脚道人龍骨丸 治白濁

龍骨 牡蠣 各半兩

右研為末入鯽魚腹內濕帛裹入火內炮熟

取出去紙將藥同魚肉丸如桐子大海服三

十九空，心米，飲下，鯽魚不拘大小，只以着盡。
主件藥為度，更加茯苓，遠志各半，尤佳。

諸骨 壯腰 各半

赤根 益人 諸骨 火

合前 諸骨 下 式

或以前 諸骨 下 式

金野 平 諸骨 下 式

木野 三 諸骨 下 式

或空 諸骨 下 式

