

05078

洞天奧旨

福建中医学院图书馆

地 址：福 州 市 榆 宪

洞天奧旨卷之九

山陰陳士鐸敬之甫號遠翁著

曾孫陳鳳翔羽儀南梓

董穎陶式玉尚昌甫號存齋評

孫增方淵洞氏校

杖瘡

杖瘡受官刑而成瘡也氣血有餘易于生合氣血不足難于化消倘受刑少者血不凝滯受刑多者血必穢淤受刑輕者氣不蕭索受刑重者氣必敗殘蓋刑輕刑少忍痛而斷不叫號刑重刑多悲傷而自多涕泣此氣血所以愈虧

也倘受刑之先身體原弱而不強則惡血奔心往往有死者必湏活其血而補其氣敗其毒而消其火然後外用膏藥貼之或末藥敷之不至死亡也

調中化淤湯 巫彭真君傳內治杖瘡神效服之無性命之憂

當歸 五錢 生地 五錢 三七根末 三錢 丹皮 二錢

白芍 三錢 生黃芪 三錢 生甘草 一錢 大黃 一錢

枳殼 三分 虛極者加人參 三錢 水一碗童便一碗

同煎服二劑淤血即散外用末藥膏藥貼之即愈

仙花散 外治枕瘡

鳳仙花葉

搗汁

馬齒莧

搗汁

黃蠟

二兩

葱白

搗汁

松香

二兩

五棓子

爲末

乳香

二兩

錢將鳳仙

葱竟先搗取汁二碗將黃松香熬膏入棓子末攤

膏貼之自愈

禿瘡

禿瘡乃足太陽膀胱督脈二經受濕熱故生蟲作癢其實亦因父母生兒之前不節色慾或服熱藥浪戰頻頻泄精以致胎中受毒不能即散而小兒之首受之毒輕者癢輕

卷之九
毒重者瘡重既生之後小兒或食煎炒之味或多飲水莫
或多受暑風而頭上禿瘡因而生蟲癬高堆起白屑滿頭
終年累月而不愈矣瘡輕者外治卽痊瘡重者必湏內外
兼治庶易愈也世人多不急治所以多累竟至蟲蝕髮盡
成爲禿子耳

蝴蝶丹 外治禿瘡

蝴蝶牛十個 黃蜂窠二錢 生甘草一錢 白礬一錢 將蝴蝶牛

搗爛塗禿遍透後將下三味研爲細末猪油調敷

如用熊油調搽更妙

清首湯 內治禿瘡

玄參 三錢 生甘草 一錢 茶荳二錢 白芷 一錢

山荳根 五分 紫草 一錢 黃柏 一錢 蔓荆子 一錢

白蒺藜 不半夏 五分 水煎服四劑後以前方外治

無後患也此方以十歲爲準年小減之

魚臍瘡

魚臍瘡生于肘肚乃手少陰心經也此處屬少海靈道之穴生于小腿肚者乃足太陽膀胱經也此處屬承山飛揚之穴上下二處之瘡其疼痛皆甚初起一二日先用灸法

最易解散心經多氣少血膀胱經多血少氣者宜補血以消毒少氣者宜補氣以消毒然氣血雙補而佐之消毒之藥更佐以引經之品何瘡之不速愈乎俗名魚臍疔治法正同耳

化魚湯 巫彭真君傳治魚臍瘍疔不論肘腿俱效

金銀花

一兩當歸五錢

生甘草

二錢青黛二錢

地榆

二錢

白礬

一錢

生黃芪

五錢

水煎服

陰包瘍

陰包瘍生于大腿內臙之上乃足肝經風熱之毒也肝木

多血少氣之經若生此瘡必然疼痛治法必須補氣以解
風熱則已潰未潰尤易散也外用膏藥貼之更效如神

黃芪散陰湯 治腿內外股瘡毒症癧

生黃芪五錢 柴胡一錢 白芍五錢 炒梔子一錢

大力子一錢 甘草二錢 連翹一錢 金銀花一兩

肉桂三分 薏仁五錢 半夏一錢 水煎服

燕窩瘡羊鬚瘡

燕窩瘡生于腦後項之窩乃足太陽兼督脈之經也羊鬚
瘡生于下唇下吧骨之處乃任脈之經承漿地閣穴道也

兩處生瘡多是感犯濕氣濕久則熱熱久則毒難化矣于
是氣血不通濕熱不散而瘡有經月不愈者在小兒尤多
倘內服除濕清熱之味以消太陽在督之毒外用藥搽之
或搽之則瘡卽結癧而愈矣

除濕清熱散 家傳內治燕窩瘡羊鬚瘡神妙

茯苓 二錢 炙甘草 一錢 白术 一錢 白芷 五分

蒲公英 二錢 澤瀉 一錢 猪苓 一錢 蒼朮 一錢

羌活 五分 天花粉 一錢 水煎服

神異丹 巫真君傳外治燕窩羊鬚瘡最妙

輕粉一錢 兒茶三錢 黃丹二錢 炒黃柏三錢

枯礬五分 水片三分 各爲末濕則乾摻乾則用麻

油調敷數日卽愈

胎毒瘡戀眉瘡

瘡生于頭上眉上終年終月而不愈皆受母胎之毒也似與禿瘡相同然而禿瘡止生于頭而不生于眉也今頭與眉俱生尤胎毒之重者也故禿瘡可以外治而戀眉之瘡必須內外兼治倘瘡止生頭上用清首湯妙矣或兒畏湯劑不肯吞服亦可止用蝴蝶丹外治無不愈者若頭眉俱

生必湏先服清首湯另用釋眉丹外擦不至晦癆歲月也

清首湯 治胎毒瘡

載禿瘡門

釋眉丹 治戀眉瘡

黃連

五分油調塗盃
內炭烟熏過入

皂礬

一分爲末

輕粉

一分末

冰片

半分末

麻油少許

再調塗之數次全愈或用膠

髓膏亦神效載在奇驗方門

肺風瘡鼻瘡

肺風瘡鼻瘡生于鼻而之間乃肺經之病也夫肺開竅于

鼻肺氣不清而鼻乃受害矣。鼻既受害，遂沿及于面。世人不知肺經有病，或冷水洗面，使熱血凝滯，因結于面而生瘡矣。治之法必湏清肺氣而兼消其風，活肺血而再祛其火。然後用搽藥外治，未有不速痊者也。

加味甘桔湯 治肺風膿鼻瘡

桔梗三錢 甘草一錢 甘菊二錢 青黛二錢

茯苓三錢 白附子分八錢 天花粉二錢 白芷五分 水煎服

杏黃散 載後

粉花瘡裙邊瘡

粉花瘡生于人面窠瘻生瘡乃肺受風熱也此瘡婦女居多蓋絞面感胃寒風以致血熱不活遂生粉刺濕熱兩停也裙邊瘡者亦婦女生于內外足踝之骨或裙短而不能遮風又不慎房帷乃致足寒而濕熱不行凝滯而生瘡也粉花瘡輕于裙邊以上濕易散上熱易化而下之濕熱未易消也故粉花瘡止消外治若裙邊瘡必兼內治始妙也

二粉散 載後

大風膏 載後

五色湯 巫彭真君傳內治裙邊瘡

茯苓一錢 意仁三錢 黃柏一錢 黃芪三錢

荆芥一錢 紅花一錢 烏柏根三錢 白礬一錢 水煎服

服數劑外用大風膏調搽自愈

臟毒痔漏瘡

痔瘡生于谷道肛門之邊乃五臟七腑受濕熱之毒而生者也故瘡亦甚多形亦不一有狀似菱角者有狀似蓮花者有狀似穿腸者有狀似鼠奶者有狀似花瓣者有狀似蜂窠者有狀似懸珠者有狀似鈎腸者有狀似核桃者有狀似栗子者有狀似雞冠者有狀似珊瑚者有狀似擔腸

者有狀似垂珠者有狀似雞心者有狀似牛妳者有狀似羊妳者有狀似串醫者有狀似翻花者有狀似氣突者有狀似血射者更有外無形而內苦者有內外俱無形而齊苦者揔之初生之時形小久則形大矣初有形之時痛尚可忍久則痛不可忍矣雖痔之形狀甚多而犯濕熱則一也夫濕熱亦易消之病何愈消而愈痛乎皆因不守禁忌貪色慾而不止鑿食味而無窮遂至痔變爲漏矣痔易治而漏難治也蓋痔有諸形之異而各無孔竅之破服藥尚無漏卮之虞一至成漏服飲食則泄氣矣吞藥餌則損血

矣血損氣泄何能成功哉况好色者多斷慾者少欲奏異
績實非易事且肛門糞口上通大小之腸前達任脈後達
督脈其皮肉橫中有直正中有斜一經破損難于生合且
成漏卮損傷皮肉尾閭不閉其何能合乎人肯節慾則漏
猶未甚而無如明知故犯者又甚多乎所以漏病之輕重
專分于慾事之多寡大約漏病有八一曰氣漏二曰風漏
三曰陰漏四曰冷漏五曰色漏俗名痔漏六曰血漏俗名
熱漏七曰偏漏俗名瘻漏八曰痿漏俗名痿腮漏氣漏
者時腫時消疼脹難忍也風漏者孔竅作瘻也陰漏者男

婦陰內疼痛出水也冷漏者孔內出自膿也色漏者犯色
流膿流精也血漏者時流鮮血也偏漏者肛門之外生孔
竅出膿血也瘻漏者瘻口黑爛出黃黑水也世人治法多
用刀鍼掛線益增疼痛反耗氣血若不節食斷色未有能
生之者或用薰洗點搽之藥多有愈者然內無藥餌療之
亦虛歲月矣人能絕嗜慾慎氣惱澹滋味內服丸散外用
洗敷雖老人尚易奏績矧中年者哉漏瘻多生于肛門谷
道然亦有生于身上面上手足之上者此皆生他疽他毒
久已收口不慎色慾泄精以傷化氣血一泄不已又泄又

不已于三泄而瘡乃成管終年流水流膿變成漏矣此等漏瘡較谷道肛門者少輕惟生于胸鬲者頗重必湏大補氣血斷慾半載加之補漏神丹服之則愈

榆羊丸 仲景張真君傳治痔瘡各痔無不神效

地榆

二兩當歸

三兩

羊蹄後壳

三副共炒

爲末飯爲

丸日三服于末飲食飯前服之每服三錢一月卽

愈不再發地榆出臓之濕熱也當歸補新血也羊

蹄殼直達于直腸故用此爲使且此物亦去濕熱

故相濟成功

牆苔散

秦真人傳治痔漏久不愈者神效不測

綵苔

要牆上生者刮下五錢

火焙乾爲細末不用前爪

炒白术

一兩

茯苓二兩

槐花五錢

白芷一兩

共爲細

末米飯爲丸每日臨臥先服一錢後歷之美膳二

月即內消管化烏有矣

參龜丸

鬼眞君傳治各痔漏神效

人參一兩

瓦菘三錢

乾者此物最不肯乾佩身半月即

乾妙在取人之氣茯苓五兩活龜一個將前藥名

爲末以綿紙同龜包之十餘層則龜不能出微火

焙之龜死則用武火焙之龜死則將藥末取出另
包惟焙龜乾搗碎再焙乾全身用之同藥熬爲丸
每日只消服三十丸不必服一料半料而漏管俱
消而愈此方至神至聖但服此方至湏忌房事三
月龜肉則終身忌之犯則痛生急以瓦菘數條加
皮硝數錢煎湯熱熏溫洗可救前方不可妄自加
減一加減則不效矣用紙包龜者取龜聞藥而死
也尤善消痔漏也否則功減半矣

補漏神丹

南陽張真君傳治胸膈漏瘡并頭面手

足漏瘡俱神效

人參五兩

白术三兩

灸黃芪八兩

金銀花四兩

當歸二兩

人指甲三錢

各爲細末蜜爲丸每日服三

次每服五錢一料必愈忌鵝肉一載房事三月如

面漏加白芷四錢

頭上加川芎一兩

重塗法

醫方摘要治痔瘡腫痛

皂角三挺

火燒烟先熏之後以鵝膽汁調白芷末

塗之卽消用鬱金末水調塗亦消也

墨汁散

保壽堂方治痔漏瘡發

旱蓮草一把根鬚洗淨
用石膏搗如泥以極熱酒一盞衝入取汁
飲之滓敷患處重者不過三服卽安

傳家秘方 治腸風痔漏

草薢貫衆去土等分爲末每服三錢溫酒空心服之

四聖丹 治痔漏如神

蜂房一個淨全用去蟲將食鹽填于孔內陰陽瓦
焙乾爲末

地龍去泥淨陰陽瓦 取米頭者佳陰陽瓦
焙乾爲末五錢 蟊螂 火焰乾爲末三錢

廣木香末三錢象牙三錢乳香去油三錢

瓜兒血竭淨末五錢飛蠶末三錢槐子炒黃爲末三錢

沒藥 三錢 提淨黃蠟 八兩 滾化入前藥和勺爲丸

每日清晨酒服三錢如不能飲清湯下

狗腸丸 治漏瘡神效

黑狗腸 一副 炙
爛加 象牙末 四兩
細茶末 四兩

倍子末 四兩
連腸爲末如梧子每服淡鹽湯飢服
三錢如不能丸少加煎蜜爲丸一料必愈忌煎炒
熱物尤忌房事狗腸乃直也象牙脫管也

陰囊之外破裂漏水此非痔漏之漏也乃楊梅毒氣未散

陰囊之外破裂漏水此非痔漏之漏也乃楊梅毒氣未散

結于囊中也然而楊梅瘡生于身上旣已全愈何外囊獨
留毒乎蓋服敗毒之藥過多必傷元氣則膀胱之氣難化
而毒尚存于囊中矣所以破裂漏水也治之法必湏補氣
以健膀胱益之分消之藥爲妙斷不可更服祛毒之味重
傷元氣也胞漏者囊中起窠子作癢乃搔抓破損而水遂
外滴尚不至破裂而漏水此乃肝經濕熱非膀胱受毒也
分消肝經之濕熱亦易奏功耳

土茯苓散 家傳內治陰囊破裂漏瘡

土茯苓一兩 白茯苓三錢 慧仁五錢 肉桂三分

金銀花

一兩人參

二錢白朮

二錢車前子

二錢水煎服

數劑外用炒黃柏

一錢輕粉

三分兒茶

三錢

數劑外用炒黃柏

一錢輕粉

三分兒茶

三錢

冰片

一分各爲末

摻之卽愈

逐濕湯

治胞漏

牽牛

一錢

大黃

一錢

木通

一錢

黃柏

一錢

芍藥

五錢

牛蒡子

一錢

茯苓

三錢

茵陳

一錢

水煎服

二劑漸愈再用前末

摻之卽痊

雌雄狐刺瘡

狐刺瘡生于手上有雄有雌者單而雌者偶前人謂雄

者止生一個雌者生有五七個誤也瘡內生有亂絲瘡外
生有小刺雌雄無異正不必過分也大約生雌雄瘡者無
不疼痛無非受竹木簽傷破皮破肉而成之也治法先用
生甘草枸杞根等物煎湯洗之後用桑粉丹敷之卽愈

桑粉丹 治雄雌狐刺瘡神效

桑條燒灰存性三錢輕粉 一錢 雄黃一錢 貝母一錢各爲末

先以甘草枸杞各三錢煎湯一碗洗瘡口淨多浸
一會後以此四味研人米醋少許調稀人瘡口滿
頻頻換之待刺去自生肌矣

水流麻根瘡

名之曰水流麻根瘡

三

麻根瘡生于足後跟之下色赤皮爛內有肉絲縷縷狀似
麻根故以麻根名之足跟本屬足太陽之經多血少氣而
人又好色者多節慾者少必至氣亦傷矣不止血之不足
也况房事不節則精既耗散血不更損乎是氣血兩虧尤
難醫療也治法必須用十全大補湯補其陰陽更用腎氣
丸以填其精髓則氣血齊足而瘡毒易散然後用外治末
藥敷之始得奏功更宜絕慾爲妙否則毒不能去肌不能
生亦可畏也

十全大補湯 載後

腎氣丸

輕粉 三分 生甘草 五分 黃柏 一錢 銅綠 三分

乳香 五分 水片 一分 黃丹 五分 没藥 三分 各研絕

細末先用苧麻根 一把 苦參 二錢 煎湯一碗洗瘡
臭腐後用此方藥末摻之而愈

肥粘瘡

肥粘瘡多生于小兒頭上俗名肥瘡頭上乃太陽經也身
感風熱不散而毒乃浮于頭上遂生此瘡初生之時多黃

膿暴出流粘髮根與禿瘡無異然禿瘡乃胎毒而肥粘非
胎毒也以小兒好飲水菓濕氣畱中一遇風熱聚而外出
或油手抓頭或剃刀傳染初生一二久則遍頭皆是蓋濕
熱生蟲也治法先用槐條煎湯洗淨後用末藥外治不數
日即愈也

菊粉散 巫真君傳治肥粘瘡

黃菊花五錢燒灰 烟膠二錢輕粉一錢枯礬一錢

黃丹二錢各爲末濕則乾擦乾則用猪油熬熟擦

之神效

十日瘡

千日瘡生于人之手足上一名疣瘡一名瘊子一名悔氣瘡狀如魚鱗排集層疊不已不痛不癢生千日自落故又以千日瘡名之或用雞脰皮擦之自愈初生時艾灸第一個卽落不再生或用蜘蛛絲採來纏于根下不數日亦落也

齒垢散 治疣子神效

用人齒上垢不拘多少先用手將疣子扒損後以人齒上垢敷之口數次數日自落

時毒暑癤

身生癤毒乃夏天感暑熱之氣而又多飲涼水冷湯或好食生菓寒物以致氣不流通血不疏泄乃生毒癤矣雖癰疽瘡癤多是相同而感生瘡癤則少輕也小兒多生此瘡然重者身必發寒發熱作膿而痛盡是陽瘡半發于頭上間發于身體手足不若癰疽之症有七惡之險內用清暑解火外用活血生肌膏藥末藥審而治之何難速效哉

解暑敗毒飲

晉茹 二錢

蒲公英 二錢

青蒿 二錢

芩芩 二錢

甘草一錢歸尾一錢黃芩五分黃連五分

大黃八分天花粉一錢水煎服十歲小兒如此大人增半小兒五歲者減半服後用膏藥可也

齒踞

齒踞者齒斷上長出如雞足踞長一二寸者有之初生之時微痛後則痛漸重矣往往有癒之而痛難忍者夫齒之上斷本屬足陽明胃經也胃經有毒故長齒斷也齒之下斷又手陽明大腸經也倘斷下長出屬大腸經矣總用芫花二錢煮絲線繫之二日卽落更用分經之藥以泄其毒

則踞落不再長也

曰殼瘡

白殼瘡生于兩手臂居多或有生于身上者亦頑癬之類也如風癬花癬牛皮癬楊梅癬皆因毛竅受風濕之邪而皮膚無氣血之潤毒乃附之而生癬矣此等之瘡非一二劑補氣補血可以速愈也故必湏外治爲妙更有一種小兒食母之濕乳流落唇吻積于兩領間亦生癬瘡名曰濕奶癬與前瘡少異蓋風花牛皮楊梅癬多是風燥之瘡而奶濕瘡實濕症也惟瘡皆白殼無他異耳故皆以白殼名

之大約白殼瘡似用治頑癬方多效獨溫奶瘡用粉霜散而效速不必用頑癬之方耳

頑癬方

天師

張真君傳方載後治白殼瘡癬

粉霜散

治溫奶白殼瘡

羊蹄根

三錢輕粉一錢白礬一錢

天花粉二錢

二錢

冰片

一分兒茶一錢各爲末醋調搽之一二次即

效

金子

文政

力

洞天奧旨卷之十

陰陳志敬之甫號遠公著
會孫陳鳳輝儀甫輯

會稽陶式玉尚白甫號存齋評
慈增方湖潤校

鼻瘻鼻痔

鼻瘻者生于鼻孔之内其形塞滿竅門而難于取息故名曰鼻瘻也鼻痔者亦生鼻內畧小于鼻瘻狀如櫻桃枸杞皆肺經受毒氣不能消濕熱壅滯而生此二病也內治必湏清肺爲主而佐之除濕降火之味外用藥點搽亦易愈

也

分消湯 內治鼻癰 鼻痔

黃芩 一錢 炙甘草 一錢 青黛 二錢 枯梗 三錢

天花粉 二錢 麥冬 二錢 天冬 二錢 連翹 三錢

苦丁香 五分 水煎服 四劑

硇砂散 外治鼻癰 鼻痔

硇砂 一錢 輕粉 二分 水片 五厘 雄黃 三分 共爲細

末用枯梗咬毛蘸勤點癰痔上目五六次自然漸

化爲水然必須戒色慾始愈

千金方 治鼻中息肉

明礬一兩
蓖麻仁一個
鹽梅肉一個
麝香一字
杵丸綿

墨塞之化水自下也
聖濟總錄用青蒿灰石灰各等分
淋汁熬膏點之亦效

嵌指

嵌指者雖生脚指甲上此蓋因踢感傷損或靴鞋短窄屈其甲而不得伸以致躊躇不安致甲長于肉內內無可容破而流水未免步履更艱已傷益傷而作痛甚至于不忍也百治不痊者誤認指疳妄用敗毒之藥反耗氣血而

不能愈耳湏令脩脚人輕輕脩去肉內之甲然後以生肌散敷之未有不愈者矣

附後方 治足趾甲入肉作瘡不可履靴

礬石燒灰細細割去甲角用礬石末傳之蝕惡肉生好肉旬日卽愈神效

二黃礬香散 醫方摘要治婦人趾甲生瘡惡肉突山久不愈

皂礬日曬夜露每以一兩煎湯浸洗仍以礬末一
兩加雄黃二錢硫黃一錢乳香沒藥各一錢研勻

搽之

鵝掌風

鵝掌風生于手掌之上古書云人生楊梅瘡時貪食鵝肉因生鵝掌之風然亦有不慎房事泄精之後或手洗涼水或足犯雨露皆能感生此瘡不獨犯于手掌而兼能患于足面白屑堆起皮破血出或疼或癢者有之乃心腎二經乘虛而受毒也內治用六味地黃湯加柴胡麥冬白芍菖蒲之類治其心腎最神外用熊脂膏塗而烘之不一二次

卽愈

加味地黃湯 祖傳內治鵝掌風足癬

熟地 八兩 山茱萸 四兩 山藥 四兩 丹皮 三兩

澤瀉 三兩 柴胡 一兩 麥冬 三兩 當歸 三兩

白芍 三兩 肉桂 一兩 菖蒲 五錢 茯苓 三兩 各爲末

蜜爲丸每日早晚空腹滾水送下各五錢一料卽

愈

熊脂膏 治數十年鵝掌風

熊油 一兩 玄蔴 三錢 輕粉 一錢 樟腦 一錢 各爲末

先以甘草 三錢 桂枝 二錢 煎湯洗之烘乾以熊油

調各末擦而烘之一日三次一連三日卽愈

疥瘡附膿窠瘡

疥與膿窠瘡多生于兩手兩足然亦有遍身俱生者膿窠瘡癢多于痛若疥瘡但癢而不痛者也故疥之病輕而膿窠之病重大約疥瘡風熱也膿窠血熱也風熱者濕少血熱者濕多二症俱有濕故皆有蟲也使氣血兩旺斷不生蟲故治此等之瘡必湏補氣補血佐之去風去濕則蟲且自亡安能作祟乎正不必妄用薰藥也洗法尚無太害倘氣血大衰之人輕用薰藥必傷肺矣外瘡雖愈而火

毒內攻往往有生肺癰者不可不慎也

加減八珍湯 治瘀瘡膿窠

人參一錢 當歸三錢 白芍二錢 生甘草一錢

茯苓三錢 白术五錢 黃芪三錢 熟地五錢

生地五錢 柴胡一錢 川芎八分 天花粉二錢 水煎服

先用六劑去柴胡加北五味子十粒再服六劑無不盡愈如有火者加黃芩二錢

輕桃丸 岐天師傳治瘀瘡

輕粉一錢 白微二錢 防風一錢 蘇葉一錢 各爲細

未用油胡桃肉

三錢

搗碎研絕細同猪板油再搗

成圓彈子大擦瘡處一二日卽愈

坐板瘡

坐板瘡生于兩鬚之上鬚乃脾經之所屬也脾屬至陰而
鬚又至陰之地脾經血少血少則易生熱矣血少而熱又
加濕氣侵之則濕熱兩停鬚久不宜鬚乃生瘡矣此瘡最
癢而兼痛治宜健脾以生氣使氣旺則血易生氣血漸生
則濕自下行從膀胱而分散水濕既利而熱又何存毒又
何在乎外用藥治之奏效更速倘氣血不甚虛者不須內

治惟外治可也

加味五苓散 内治坐板瘡

白术 五錢 茯苓 三錢 潤瀉 二錢 猪苓 一錢

肉桂 二分 黃柏 一錢 水煎服

濕熱兩治散 外治坐板瘡

蘿蔔種 一兩 火煅存性爲末 敷于新瓦上 煙微熱

坐于其上數次自愈 或以灰覓燒爲末 摻于瘡上

數天即愈

松黃散

治坐板瘡

松香

五錢

研細雄黃

一錢

研細濕瘻加荅木

三錢

各爲末綿紙撫成條蠟指油浸透燒取油擦上立
愈

喉閉蛾瘻

此生于咽之上也其瘻有二一雙蛾一單蛾也雙蛾單蛾之症亦有二一陰症一陽症也二症雖異而火則一也然而火有陽火陰火之分陽火者實火也陰火者虛火也咽喉乃至命之關此處生蛾瘻俱是危症然陽火勢若重而實輕陰火勢少輕而反重蓋實火可以寒散而虛火必湏

溫散也倘治之得其道效應如禡

破嗌湯 治陽症雙蛾單蛾喉痺等症如神

桔梗三錢 甘草二錢 柴胡一錢 白芍五錢

玄參三錢 麻黃一錢 天花粉三錢 山豆根一錢 水煎服

一劑咽喉寬再劑盡消

引火湯 治陰症雙蛾單蛾喉痺等症

熟地三兩 巴戟天一兩 茯苓五錢 藜冬一兩

北味子二錢 水煎服 一劑火下歸二劑至愈二方已

破未破俱可用不必用針吹藥點治之也

雨地湯 伯高太師真君傳治喉腫大作吐痰如湯
口渴求水雙蛾纏喉風瘡

熟地一兩 生地一兩 玄參一兩 肉桂三分

黃連三錢 天花粉三錢 水煎服下喉即愈

再生丹 治雙蛾單蛾初起久患以及喉痺等症

桔梗一分 硼砂一分 山豆根一分 生甘草一分

牛黃一分 荆芥一分 研絕細末用鵝翎搣藥五厘

吹入蛾處日六次痰涎出淨即愈神方也

治單蛾雙蛾

雄黃明礬各等分研絕細末吹入喉中俟痰涎流淨不必吹藥矣

大麻風

大麻風感受火毒殺物之風氣而結成之者也初生之時頭面身體先見紅點後變紅斑漸漸皮破汗流而成瘡矣鬚眉盡落手足指脫眼瞎鼻崩毛脫身紫遍體腐爛流膿流血臭穢難聞最可憐之病也此病南粵最多以地近炎荒蛇蟲蟠結濕熱之毒一犯則裹結于皮膚濕蒸之氣侵則藏過于肌骨終年不散內外交迫遂生麻風之瘡然

而此瘡亦有不在南粵而生者別感火邪酒濕之毒氣而
又房事不慎則毛竅盡開易于侵犯治之不得法皆與府
風症相同可見麻風之病南北俱有必以解毒爲先然而
近人元氣虛者甚衆止瀉其毒而不兼補氣血則毒敗而
真精隨耗何能全活乎倘惟事補正而不急敗其毒又恐
引邪入內致崩臟腑亦可畏也故當補正散邪兼而治之
始易奏功

掃癟丹、岐天師傳治頭面身體先見紅點斑文流
水成瘡髮眉墮落遍身腐爛臭穢

蒼朮三錢熟地一兩玄參一兩蒼耳子三錢

車前子二錢金銀花二兩薏仁五錢水煎服二十劑必

愈

黃金湯 伯高太師傳治初起大麻風

大黃五錢金銀花半斤水煎汁三碗分作三次一月。

服完必然大瀉惡糞後單用金銀花三兩連服十

日全愈

解癘仙丹 治酒濕感毒而生大麻風神效

茯苓三錢白朮五錢薏仁五錢黃連一錢

玄參一兩
金錢花三兩
柏木枝三錢
水煎服連服三十

劑已爛末爛俱愈

漆甲散

川山甲一副

全明雄黃四兩

爲末真生漆和勻刷

在甲上微炙微刷以盡爲度將川甲分記上中下

左右共作六硯各另研細末用四年陳醋冬米飯

爲丸每服五錢

白滾湯送下患左用左患右用右

上服上中服中下服湏記分自如在通身一起製

服神效

蛇 窠瘡

蛇窩瘡生于身體臍腹之上下左右本無定處其形象宛如蛇也重者爛深輕者腐淺亦有皮肉蠕蠕暗動欲行而不可得也此瘡或穿著衣服棄于地上爲蛇所遊或飲食之中蛇涎沾染其毒未散因人氣血尚壯不傷臟腑乃發于皮膚耳重者毒重而痛甚輕者痛猶可受治法不必問其重輕總以解毒爲神也前人用松針刺其初起之瘡頭尚非治之善者大約以蜈蚣浸油頻搽以雄黃白芷佐治實得法也

蜈蚣油 正彭真君傳治蛇窠瘡兼治蛇咬傷成瘡

俱神

蜈蚣十條爲末不可經火白芷三錢爲末白者佳
雄黃三錢爲末生甘草末三錢香油二兩將三味
浸之三日或隨浸調擦皆能建功也

蜘蛛瘡

蜘蛛瘡生于皮膚之上如水窠髮鬚其色淡紅微痛三三
兩兩或一羣攢聚宛似蜘蛛故以蜘蛛名之此瘡雖輕然生
十皮膚終年不愈亦可憎之瘡也或謂霍濡蜘蛛之尿而

生者其說非是大約皆皮膚之血少而偶露毒氣濕氣遂
生此瘡耳方用苧麻在瘡上擦搓使其瘡破水出後用藥
擦之自易愈也

解蠍丹 治蜘蛛瘡

苧麻根灰三錢 水片二分 輕粉五分 抱出雞蛋殼
燒灰一錢 燈草灰二分 白明礬三分 共研細摻瘡
上卽痊然必須用苧麻擦皮破摻藥效之神也

陰陽濕痰瘡

陰陽濕痰瘡皆傷寒 寒熱鬱而生痰痰不能驟消于

臘臘留而不散久之結于肌肉遂成痰塊塊久則腫腫久
則痛痛久則潰潰則成瘡矣但其瘡有陰陽之分陽瘡多
生于兩手陰瘡多生于兩足陽瘡則熱陰瘡則寒熱者病
在陽腑寒者病在陰臟也故治手上之瘡者宜治其陽之
熱經而佐之云濕化痰之品治足上之瘡者治其陰之寒
經而佐之去濕化痰之味無不收功也前人專用艾火灸
之尚非正治耳

通陽消毒湯 巫彭真君傳治陽濕痰破瘡在手者

茯苓 三錢 神麩 一錢 硝砂 一錢 甘草 一錢

麻黃五分 白术三錢 黃柏一錢 天花粉三錢

黃芪五錢 蒲公英三錢 水煎服如已潰者用冲和膏

貼瘡口自愈

治陰化濕湯 巫彭真君傳治陰濕痰破瘡在足者

白术五錢 茯苓五錢 肉桂二錢 附子一錢

黃芪一兩 半夏三錢 水煎服如已潰破者用玉龍

膏外敷之內外兼治則易愈也

飲水止渴爲事雖火爲水折胸鬲之炎熱少除而水多難
傷寒有大渴之症貧家無力買藥或富家悞用藥餌惟以

化未免留滯下焦停積成淤而兩足之氣不通濕熱生瘡久則破爛筋弛肉腐而兩足墮落矣此等之瘡非尋常藥味些小分兩可以保全者

全活湯 巫彭真君傳治傷寒愈後兩足生瘡流水流膿神效

白术

三兩

蒼术

二兩

肉桂

一錢

薏仁

二兩

車前子

五錢

人參

一兩

如貧家用黃芪

二兩

水煎服

一連服十日不特兩足之爛可除而餘生亦可全

活

楊梅疳瘡

楊梅疳瘡生于龜頭之上者多生于穀道玉莖上者少生于鼻內者更少皆熱毒之氣也風流子弟何忽生此瘡平日所食者肥甘所衣者輕緩何傷此熱毒乎蓋得之于嫖妓與有毒之女兩相鬪戰而中毒也妓女何毒重如此亦遇毒感毒耳泄精之時自覺馬口之間如針刺痛此毒氣來犯矣重則生魚口輕則生疳瘡疳瘡乃楊梅先兆也當酣戰之時本難中毒然而鼓勇而鬪內火沸騰及至泄精元氣虧損毒氣卽乘虛而入內火與毒氣之火兩相和合

而不化故生瘡瘍不補虛而惟事敗毒則已虛益虛無異
下石末有不滿身生瘡者矣治法內用二生湯外用保身
散治之卽愈苟或不然變出非常非玉莖爛落卽鼻柱塌
陷破壞面目可畏哉

二生湯 岐天師傳治初生瘡瘍

生黃芪

三兩

土茯苓

三兩

生甘草

三錢

水煎服外用藥敷

六

保身散

巫彭真君傳外治瘡瘍

輕粉一錢

黃柏五錢

乳香一錢

水粉三分

孩兒茶三錢百草霜一錢冰片三分各爲末猪膽調搽

楊梅圈瘡

楊梅圈瘡此楊梅瘡發已久將要結癩而復犯房事以致作痛生圈此等治法必湏大補氣血氣血足而精生精生則臟腑還元而瘡自結癩矣不可悞認毒之未淨而仍用敗毒之劑也一用敗毒更傷損氣血終無奏功之日矣惟內用大補之藥外用調搽之未便易收斂且慶安全也

加味十全大補湯 祖傳方內治楊梅圈瘡

人參二錢當歸三錢白朮三錢茯苓二錢

生甘草二錢 黃芪三錢 肉桂三分 川芎一錢

熟地五錢 柴胡五分 土茯苓五錢 水煎服十劑虛甚

者多服爲妙

粉霜神丹 外治楊梅圈瘡

粉霜一錢 人參一錢 生甘草一錢 冰片三分

輕粉一錢 丹砂一錢 石膏二錢 槐米一錢 各研細末 猪膽

調搽愈

楊梅結毒

楊梅之瘡多生干蠅蚊聞人毒氣而生者其癆即發不生

于玉莖馬口之間也惟嫖妓而得之必從玉莖始以毒自此入則瘡亦自此興倘初生下疳卽用徧德湯大劑吞服不特瘡瘍頓愈而楊梅之瘡亦必不生卽生亦輕少斷無結毒之禍無奈世醫不知此方之妙妄用藥餌惟識敗毒不雜用補氣補血之味以致難于收功而風流子弟厭惡生瘡且歸咎醫生亟請收斂醫生貪圖厚謝不補氣以祛邪不補血以化毒竟用輕粉之類以收斂之毒入骨髓不敢外發一時瘡淨亦爲可喜子弟甘謝而無怨言醫生樂酬而生德色苟仍補其氣而加之暗消之品終年累月

而服之則元精既足元氣自旺毒難內存猶能外泄無如子弟旣苦于服藥而醫生亦倦于防益彼此相忘竟置之不論不議之天誰知收斂之後不知保守縱慾如故而毒難久留或半年或二三年乘何臟腑之虛乃突而外攻矣大約毒結臟腑之虛俱是難救之瘡而結于鼻與玉莖者尤爲難救

徧德湯 伯高太師傳治下疳楊梅

當歸 二兩 白朮 二兩 生甘草 五錢 土茯苓 一
兩

金銀花 四兩 天花粉 三兩 水煎服連服十劑而遍身之

瘡如掃矣

寒水再造丹 伯高太師傳治結毒至鼻爛莖爛者皆效

麥冬三兩 生甘草一錢 桔梗三錢 黃芩三錢

連翹

三錢

貝母三錢

土茯苓二

兩

寒水石研細末

三錢

夏枯草

二兩

水煎汁二碗調寒水石末服倘鼻尚未

落一劑不爛落也如已爛落一劑不再爛也二劑全愈倘結毒生于他處減半多服無不奏效

翻花楊梅

此瘡亦感淫毒之氣也視其瘡勢若重其毒反輕蓋毒欲
盡情出外也古人云是濕熱表虛表虛則有之不可全歸
于濕熱也總皆毒氣外發因表虛而反熾誰知因熾而補
其表則表實而毒難藏轉易收功也惟是表虛不可再貪
色慾不獨傳其毒而害人且虛其虛而自害故必須節飲
食戒惱怒而斷房帷固無意外之虞外用點藥敷之自奏
功如神矣

黃芪外托散 家傳治翻花楊梅瘡

黃芪 一兩 當歸 三錢 人參 三錢 茯苓 五錢

土茯苓二兩 白芍五錢 生甘草三錢 白礬二錢 水煎服

四劑重者十劑外用藥調搽卽愈

地龍粉霜丹二錢 祖傳方外治翻花楊梅瘡

粉霜二錢 蚍蜉糞一錢 火焰乾兩 百草霜三錢

輕粉二錢 黃丹三錢 飛過生甘草二錢

冰片二錢 黃柏炒二錢 胡粉二錢 各爲細末點搽自

愈

陰陽楊梅瘡

楊梅瘡有陰陽之分古人以陽屬氣虛而感毒陰屬血虛

而感毒實爲有見非無稽之語也陽必高矣陰必低陷陽必痛陰必癢而其色皆紅也故陽宜用補氣之藥而佐之化毒之味陰宜用補血之藥而輔之消毒之品然後外以末藥調搽豈難速愈乎

六君加味湯 治陽楊梅色紅作痛而高突者神效

人參五錢白朮五錢半夏一錢生甘草三錢

茯苓三錢凍皮五分土茯苓一兩金銀花一兩水煎服

十劑愈

加味四物湯 治陰楊梅色紅不起不破作癢者神

湘
卷之十
效

熟地五錢 川芎二錢 當歸五錢 白芍一錢

白茯苓二錢 生甘草二錢 金銀花一兩 天花粉二錢

土茯苓一兩 水煎服二十劑愈

丹砂欵毒丹 外治陰陽楊梅瘡兼治疳瘡

丹砂一錢 雄黃二錢 粉霜一錢 孩兒茶三錢

露蜂房燒灰五分 水片三分 生甘草一錢

輕粉一錢 各爲細末 猪膽調搽自愈

楊梅癰瘡

此乃女子感染男子餘毒而生者也或前已生瘡用藥既
痊偶食牛肉或洗浴當風抓癢或行房事以虛其皮膚毒
結不散乃生癬矣或血乾而起白屑或內碎而流紅水以
致淋漓臭穢者有之用蝸牛枯霜散原易奏功然內不服
藥以補虛則氣血雙虧外難卽愈必湏內外兼治否則日
久不痊必生虫蝕反難速瘥也

雙補化毒湯 岐天師傳內治楊梅癬

天花粉二錢 當歸五錢 黃芪五錢 柴胡一錢

生地三錢 藜冬三錢 天冬三錢 荆芥一錢
分

威靈仙二錢白蘚皮一錢胡麻二錢槐角二錢

乳香末一錢生甘草二錢水煎十劑外用末藥搽之必

愈

蠍牛柏霜散 岐天師傳外治楊梅癬

黃柏二錢沒藥一錢輕粉一錢粉霜一錢

雄黃二錢冰片三分丹砂五分孩兒茶三錢

枯礬一錢 蠍牛十個各爲末猪膽調搽日數次搽

三日漸愈神效

楊梅痘子

其瘡細小亦是淫毒與大者相較其毒尚輕蓋其人氣體壯實感毒不重故瘡亦不惡也急用內托之藥十數劑則毒易散而痘亦易回倘恃強而仍然漁色則氣血雙耗必至輕寢爲重矣輕既可以寢重安在重而不可以寢危乎摠之楊梅之瘡母論輕重必須速治加之絕慾則病去如掃無如世人好色甚多服藥甚倦遂至寢生不測也鐸有神方因載于後聽世採取耳

早奪湯

岐天師傳治初出楊梅瘡痘神效

人參一兩

生黃芪一兩

茯苓一兩

當歸一兩

遠志

三錢

生甘草

三錢

金銀花

一兩

大黃

一兩

石膏

一兩

柴胡

二錢

白朮

一兩

天花粉

三錢

水煎服一劑大瀉惡物臭穢不堪再服二劑毒盡去矣去大黃石膏加土茯苓二兩同前藥再服四劑必有瘡影發于滿身在皮之內而出于皮之外也再服二劑全愈

外表湯

治楊梅痘子

黃芪

一兩

當歸

五錢

麥冬

五錢

金銀花

一兩

天花粉

三錢

木通

一錢

澤瀉

二錢

柴胡

二錢

黃芩 二錢 生甘草一錢 水煎服

齒窟瘡

齒窟瘡因傷損齒牙其齒墮落而成者也蓋人齒最深其窟甚大氣血盛而易于長滿氣血虛而難于生合其症高年老人尤多夫齒雖有臟腑之分而根實出于腎也高年老人腎精耗竭無不虛者所用飲食止可生氣生血不能生精精少則腎氣不生而腎血又何易生乎此齒窟之更難填實也况兼食鑿或用硬物楂破少合而重傷畧滿而再損疼痛切骨連心者往往然也內用加味地黃丸以填

其精外用填齒散脩之自然精不涸而氣血相助則齒窟
不至空缺也卽不生齒而生肉必速矣

加味地黃丸 內治齒傷成窟

熟地 五錢 山藥 三錢 山茱萸 二錢 茯苓 二錢

骨碎補 二錢 补骨脂 二錢 丹皮 二錢 當歸 五錢

麥冬 三錢 澤瀉 一錢 氣虛甚者加人參 五錢 水煎

服以齒滿爲期

填齒散 外治齒窟

人參 一錢 骨碎補 一錢 三七末 一錢 同川蒺藜 二錢

乳香一錢
風脊骨末一錢各爲末用黃蠟化開圍

成丸如齒窟大填入隙數日卽愈如蠟化頻填自愈

胎湯皮瘡

胎湯皮瘡初生嬰兒所長之瘡也有肉無皮視之可痛蓋母食五辛之味或餐燶熬炙焯等物或父母有瘡而坐孕往往生無皮之子然而傷熱而生之者其病輕受毒而生之者其病重重者母子必湏同服化毒之藥則皮生而兒無死亡之禍否則無不夭者若因食熱物而生者雖半體

頭面皆無皮不必母子同服解毒之藥但用白芨雄黃散
敷之自安也

全蝎生皮散 岐天師傳治父母生瘡因產胎漏皮
瘡之子者此方主之

全蝎一兩 生黃芪四兩
金銀花八兩 生甘草一兩

麥冬四兩 各爲末蜜爲丸每日服五錢子服三丸

一料全愈

白芨雄黃散 岐天師傳治食五辛熱物子生渴皮

瘡神效 白芨一兩 雄黃末一錢各爲末摻之自然生皮且又不痛
即愈

洞天奧旨卷之十一

山陰陳志鐸敬之甫號遠翁著

曾孫陳鳳翽繼編

資褚喚式玉尚白雷號存齋評

玄鑑方溯復校

風熱瘡

風熱瘡多生于四肢胸腹初起如疣瘤癢而難忍爬之少快多爬久搔未有不成瘡者甚則鮮血淋漓似疥非疥乃肺經內熱而外感風寒寒熱相激而皮毛受之故成此症也世人以防風通聖散治之亦有愈者然鐸更有治其外

而自愈紀之以便不願服藥之男婦也

三聖地膚湯 岐天師方

地膚子

一兩

防風二錢

黃芩三錢

煎湯一大碗加

猪膽二個取汁和藥同煎以鵝翎掃之卽止癢癩

止而瘡亦盡愈

黃水瘡

黃水瘡又名滴膿瘡言其膿水流到之處卽便生瘡故名之也此瘡生在皮毛之外不在肌肉之內雖是脾經濕熱亦由肺經乾燥脾來顧母本以濕氣潤母也誰知此濕有

熱熱得濕而生蟲欲救母而反害母之反膚也治法內服除濕清熱之藥而佐之涼血之味血涼而熱退熱退而水更清亦易行也濕熱兩除何蟲不死又得外治以解其鬱毒又何能長存乎故隨洗而隨愈也

安體散 岐天師方內治黃水瘡

茯苓 三錢 荘术 二錢 荆芥 二錢 防風 一錢

黃芩 一錢 當歸 五錢 蒲公英 二錢 半夏 一錢 水煎服

四劑

解丹 岐天師傳外治黃水瘡神效

卷之二
雄黃五錢防風五錢荆芥三錢苦參三錢水煎湯

取二碗洗瘡卽愈

粉黃膏 章雲樵傳治黃水瘡

蛤粉一兩石膏五錢輕粉五錢黃柏五錢共爲細

末暑天用無根水秋冬用麻油調敷

傷守瘡

傷守瘡者言不守禁忌也凡生瘡毒必須堅守房帷無論大小皆宜如此大瘡毒而不守禁忌必致喪亡小瘡毒而不守禁忌必至痛苦今名傷守者猶言小瘡癆也醫生錯

云傷手豈搔抓能害之乎凡犯色慾其瘡口必黑黯道如
刀割腐爛必深非止補精血神氣萬難奏效內服加味補
中氣湯或加味十全大補湯以補之外用末藥敷之始可
轉危爲安變死爲生也

補中益氣加金銀花湯 祖傳治不慎色慾

人參 五錢 黃芪 一兩 柴胡 一錢 升麻 五分

生甘草 一錢 當歸 五錢 陳皮 五分 白朮 五錢

金銀花 一兩 加棗 二枚 水煎服如虛極者倍加參芪
歸木寒虛者加附子內桂各 一錢 餘不必加

加味十全大補湯 祖傳治傷守瘡

熟地一兩 川芎二錢 當歸五錢 生黃芪一兩

白朮五錢 茯苓二錢 甘草一錢 肉桂一錢

白芍二錢 人參二錢 金銀花一兩 水煎服

救敗丹 岐天師傳 外治傷守

人參二錢 三七根末三錢 孩兒茶三錢 乳香一錢

白僵蠶二錢 輕粉一錢 髮灰二錢 各爲細末滲于膏

藥內貼之若不用膏藥者乾滲妙猪油調擦亦妙

手足丫毒瘡

手足丫毒瘡雖生于手足名同而了宜辨也生于手丫者
屬手經生于足丫者屬足經然手足亦宜辨也生于手足
之背了者是三陽經生于手足之掌了者是三陰經看其
何經而用何經之藥托裡調中更加引經之味則計日可
以奏效矣倘內既服藥而外復加敷藥以籠其毒則毒不
走散一出膿而卽安尤治法之神也手足丫毒近于丹穴
最宜早治萬勿因循至輕變爲重也

全消飲 岐天師傳治手足丫毒瘡

當歸 三錢 生黃芪 三錢 紅花 一錢 生地 三錢

荆芥葉

一錢

貝母

一錢

茯苓

二錢

黃柏

二錢

地骨皮

三錢

菊花根

一把

水煎

一碗急服

敷劑無不內

消若失治一至潰爛多費時日矣然肯服此方亦

不大潰

錙毒神丹 岐天師傳外治手足丫毒瘡

地榆

二錢

天花粉

一錢

菊花根

一把

生甘草

一錢

芙蓉

葉

十四葉

蒲公英

鮮者

一把

將乾研末

搗鮮藥取汁

調之敷上則毒不走開內自化矣

胎癰瘡

胎竈瘡乃初生小兒背上或有一二孔也此等小兒明是
臟腑不足少氣少血以長皮肉也倘雖有孔竈而肉膜遮
護猶有生機急用氣血竣補湯大劑與母吞服兒食其乳
尚有生機再嚼人參三七之片數分填于孔竈之內則氣
血壯旺生皮亦速也苟孔竈之中無有脂膜洞見臟腑數
日卽死救之亦無益也總補母之氣血一時填隙而兒之
先天大缺僅可延數年之日月不能享百歲之光陰也

氣血竣補湯 治兒生胎竈瘡

黃芪一兩 當歸一兩 五錢 川芎五錢

紅花五分益母草一錢水煎服二十劑至月餘後可

錢

服補中益氣湯數十劑

濕毒瘡

濕毒之瘡多生于兩足非在足脰卽在足踝非在足背卽在足跟其故何也蓋濕從下受而兩足親于地故先受之也夫水濕之氣寒冷者多而一入人身之內則人氣熏蒸必變爲熱濕熱相合內必生蟲故初起之時微癢者正蟲之作祟非止氣血之不和也治之法必湏去濕爲主而少加殺蟲之味則愈病甚速轉不必解其熱也蓋濕解而熱

自散况生瘡既久流膿流水氣血必虛安在熟有乎此除
濕之所以神也

除濕解毒湯 祖傳治濕毒足瘡

白术 五錢 山藥 五錢 豆仁 五錢 金銀花 一
兩

內桂 三分 澤瀉 二錢 烏梅根一把水煎服十劑自

愈如未愈者再用龍馬丹傳之妙

龍馬丹 岐天師傳統治濕毒瘡

馬齒莧 二錢 黃柏 五錢 陳年石灰 二錢 輕粉 一
錢

地龍糞 三錢 伏龍肝 二錢 黃丹 三錢 赤石脂 三
錢 各爲細

末察調敷之一二次卽愈

火丹瘡 附赤白遊風

火丹瘡遍身俱現紅紫與發斑相同然斑隨現隨消不若火丹一身盡紅且生瘡也發斑熱鬱于內而發于外火丹熱鬱于外而趨于內發于外者有日散之機趨于內者有日深之勢故發斑輕而火丹重然而火丹有二種一赤火丹一白火丹也赤色皮乾白色皮濕似乎各異而熱鬱于皮毛之外由外而入內則赤白無異也大約赤者純是肺經之火熱若色帶白乃是脾經之火熱也故赤者竟解肺

經之熱補水之不足以散火之有餘此消丹飲之爲妙也
自者解脾經之熱利水濕之氣從膀胱而下走不必又去
外逐皮毛蓋濕氣之盛在脾而不在肺耳此桑白分解散
之所以妙也更有一種赤白遊風往來不定小兒最多此
症有似發斑但發斑有一定之根而赤白遊風無一定之
包此胃火鬱熱不解故亦結瘡而不愈治之法必湏清熱
而清熱又必湏涼血蓋血寒則凝滯不行雖火得血而可
止終不能散火此清火消丹所以妙也三症分而治之自
有奇驗正不可混耳

消丹飲 岐天師傳治紅紫火丹

玄參 三兩 升麻 二錢 麥冬 一兩 桔梗 二錢

生甘草 一錢 水煎服一劑丹化爲無矣小兒減藥之

半

桑白分散散 伯高太師傳治白火丹

薏仁 二兩 澤瀉 三錢 升麻 一錢 天花粉 三

錢 神麴 三錢 水煎服小兒減藥之半

桑白皮 三錢 水煎服小兒減藥之半

清火消丹湯 岐天師傳治赤白遊風丹

生地 一兩 丹皮 三錢 甘草 一錢 玄參 三錢

牛膝

一錢

赤芍

三錢

天花粉

一錢

水煎服

二劑

消半

四劑全消小兒減半赤遊丹又可外治用積年胎
衣所化之水和金汁塗之卽消神效

經驗方

外治小兒丹毒皮膚熱赤

寒水石

五錢

白土

一分爲末

米醋調塗之

內丹

內丹者生赤色于皮毛之內而外不十分顯出也點燈照
之若用紗裹硃砂而透明故以內丹呼之此等之丹得于
胎熟其母受胎之後不忌熱物信口食或感夏天風熱

或好色浪戰皆能助火火邪內攻胎受其毒而傳氣于小兒乃發爲丹毒也此火欲出而不得遽出隐隐外突于皮毛倘發于腰臍而作痛或大小便閉結不通皆死症也苟生于淵液京門等穴或左或右尚非死症以熱在膽經而不在家經也方用荆芥祛風湯實可救治然救之亦必湏早蓋內丹不早治亦必死耳

荆芥祛風湯 伯高太師傳治內丹

荆芥 二錢 甘草 一錢 半夏 五分 麥冬 五錢

當歸 三錢 白芍 三錢 水煎服數劑愈

散丹湯 岐天師傳治火丹

當歸

三錢

生甘草

錢

赤芍藥

三錢

大黃

一錢

升坡

二錢

柴胡

八分

黃芩

一錢

水煎服

二劑愈

飛竈丹

小兒丹毒有十種一飛竈二吉竈三鬼火四天火五天竈六水激七胡次八野火九烟火十胡漏也皆父母胎毒所成治症必湏辨明不可混治丹症原是難治之病況又辨之不明妄用藥餌安得十全且名丹不依症早治攻人賜胃十無一生可不慎乎飛竈丹者從頭頂上紅腫起此火

毒在泥丸也本是難救然急用葱白搗自然汁調白芨炒黃柏塗之卽消又不可不知也

芨柏散

白芨三錢黃柏三錢炒各爲細末急用葱白搗爛取自然汁塗在泥丸頂上一晝夜卽消

吉寵丹

吉寵丹從頭上向腦後紅腫者是亦有腫而作疼者尤爲可畏是足太陽膀胱風熱故作痛也更有渾身作熱者內宜服防風通聖散加減治之外宜用紫荆散調搽自愈

防風通聖散 世傳方

防風 荆芥 連翹

麻黃

薄荷 川芎 嘗歸

白芍

白术 山梔子 大黃

芒硝

黃芩 石膏 桔梗

甘草

滑石等分水煎服

紫荆散

紫荆皮一錢
赤小豆一錢
荆芥一錢
地榆一錢
各等分

爲細末以雞子清調塗神效

鬼火丹

鬼火丹先面上赤腫後漸漸由頭而下至身亦赤腫也是手足陽明經內風熱治宜用白虎湯以瀉胃熱加防風荆芥薄荷桑白皮葛根以散其風引其從皮毛而外散也然大腸亦熱何故不瀉大腸之火不知胃之火甚于大腸胃火散而大腸火亦散不必又治之也但外用伏龍散末以雞子清調搽尤妙

白虎加味湯 世傳方內治鬼火丹

石膏二錢 知母一錢 麦冬三錢 半夏一錢

防風 五分 荆芥 二錢 薄荷 一錢
甘草 一錢

桑白皮二錢葛根 一錢 竹葉三十片水煎服二劑

伏龍散 家傳外治鬼火丹

伏龍肝末三錢炒黃柏三錢爲末雞子清調搽神效

天火丹

天火丹從脊背先起赤點後則漸漸赤腫成一片是腎督脈中熱毒兼足太陽經風熱宜治腎而并治膀胱爲是不可純用防風通聖也外用桑榆散外敷則得之矣

解苦散 岐天師傳內治天火丹

卷之十一
玄參五錢 生地五錢 羌活一錢 黃柏二錢

白茯苓三錢 升麻五分 丹皮三錢 水煎服四劑自散

桑榆散 家傳外治天火丹

地榆二錢 桑白皮二錢 羌活一錢 玄參三錢 各爲細

末羊脂溶化調塗

天竈丹

天竈丹從兩臂起赤腫少黃色或止一臂見之皆手陽明經風熱內服解毒之藥外用柳枝燒灰爲末水調塗之亦易愈也蓋天竈丹乃丹毒之最輕者故亦可輕治之耳

輕解散 岐天師傳內治天竈丹

防風五分麥冬三錢生地三錢桑白皮二

黃芩一錢柴胡八分白芍三錢天花粉五

錢水煎服

二劑

柳灰散 家傳外治天竈丹

柳枝燒灰五錢荆芥炒末二錢滑石三錢

生甘草二錢爲末水調塗之卽愈

水激丹

水激丹初生于兩脇虛腫紅熱乃足少陽膽經風火也此

方亦熱之輕者治膽經之火而去其風可計日而痊也
用加味小柴胡湯治之最神外更以敷藥塗擦又何慮乎

加味小柴胡湯

柴胡一錢半夏五分甘草五分黃芩一錢

陳皮三分白芍二錢防風五分荆芥一錢水煎服

數劑丹消

缺屑散

生缺屑二錢母猪糞燒灰二錢和蠟水調塗妙

胡次丹

胡次丹先從臍上起黃腫是任經濕熱也去其熱濕而丹
毒自散古人用三黃解毒湯未免過峻恐小兒氣虛難受
鑄受異人之傳另用化濕飲方治之尤覺安穩更用梔榔
外治萬無一失也

化濕飲 岐天師傳內治胡次丹

白朮

十個

白术

一錢

黃柏

二錢

山藥

二錢

茯苓

三錢

澤瀉

一錢

木通

一錢

赤芍

二錢

荆芥

一錢

天花粉

一錢

水煎服

梔榔散

楨榔爲末二錢生甘草一錢米醋調搽自愈

野火丹

野火丹從兩腿上起赤腫痛甚如火之燒乃足陽明胃經風熱也內服涼膈散加減外以羊脂調末藥塗搽自易愈也此丹雖火盛極不可信是胃經熱熾竟用石膏湯與瀉黃散也恐小兒脾胃欠實不禁大瀉反恐胃氣損傷轉難救耳

涼膈散 世傳內治野火丹

連翹二錢大黃一錢芒硝五分甘草一錢

梔子二錢黃芩二錢薄荷一錢茯苓一錢水煎服

二劑

消腫散 岐天師傳外治野火丹

乳香一錢白芨一錢火丹草一錢各爲末羊脂調

塗妙

烟火丹

烟火丹有從兩足跗起赤色腫痛乃足三陽經風熱也亦有從足底心起乃足少陰腎經大熱也內宜服滋陰抑火之藥使水旺足以制火也外以末藥兼治爲妙

抑火制陽丹 岐天師傳內治烟火丹

玄參五錢 蒜苔草二錢 黃柏一錢 生地三錢

熟地一兩 丹皮三錢 細甘草一錢 沙參二錢

牛膝一錢 金釵石斛二錢 水煎服

柏土散 家傳外治烟火丹

猪槽下土黃柏末蜜調塗之自愈

胡漏丹

胡漏丹從陰上起黃瞳皆厥陰肝經虛火發于外也內宜
服補陰清火散風之藥外用末藥調擦可愈倘用菖歸龍

薈丸與瀉青散皆不能成功耳以上丹症小兒百日內發者不論是何丹皆胎毒也三日內治之皆可救遲則無及矣倘百日之外生丹者遲尚不至于死亡然亦心煩急治不可令其入腹一入腹亦難救故腹脹不飲乳者必死無疑蓋丹症能食乳者皆可治療以其胃氣之未絕也更有一種紅線痛者尤難救援以父服熟藥遺熱在胎非藥所能解耳

清散湯 岐天師傳內治胡漏丹

白朮一錢 茶芩一錢 甘草五分 當歸二錢

炒梔子一錢 荆芥一錢 防風三分 生地二錢

麥冬二錢 黃柏一錢 水煎服

屋土散 岐天師傅外治胡漏丹

瓦上陳土炒黃柏生甘草各研細末密與醋同調塗卽消

粉瘦瘻

瘻與瘻雖俱生于肌上而瘻生于頸下瘻則不止生于頸也瘻則不破瘻則久而破者多矣瘻感沙水之氣皮寬不急挺挺然也古云瘻有三種一血瘻一肉瘻一氣瘻血可

破肉可割氣可針其實三種俱宜內消不宜外治惟癟則可外治也然亦有宜有不宜者大約粉癟宜用外治蓋粉癟大而必軟久則加大似乎有膿而非膿也乃是粉漿藏于其內擠出宛如線香焚後之滓又受水濕之狀如已破矣必擠淨後用生肌藥搽之不再生否則仍復長也初生此癟必湏治之如不治日必大甚亦被其累當用艾灸斗數壯卽以醋磨雄黃塗紙上剪如螺旋蓋大貼灸處外用膏藥貼一二日一換擠出其膿必愈妙法也

消瘦散 岐天師傳 統治各瘦

海藻一錢 龍膽草一錢 昆布五分 土枳根二錢

半夏一錢 小麥麵一錢 甘草一錢 乾薑五分

附子一片 水煎十劑必散

化癰丹 仲景夫子傳治諸癰

海藻三錢 桔梗三錢 生甘草一錢 陳皮一錢

半夏三錢 茯苓五錢 水煎服

筋瘤骨瘤石瘤

筋瘤者乃筋結成于體上也初起之時必然細小按之乃筋也筋畜則屈屈久成瘤而漸大矣然雖漸大亦不甚大

也固是筋瘤亦無大害竟可以不治置之若至大時妄用刀鍼往往傷筋反至死亡故筋瘤忌割也必要割去亦宜于初生之日以芫花煮細扣線繫之日久自落因線繫而筋不能長大或可用利刀割斷輒用止血生肌之藥敷之可慶安全倘初生根大難用線繫萬不可輕試利刀割斷也至于骨瘤石瘤亦生皮膚之上按之如有一骨生于其中或如石之堅按之不疼者是也皆不可外治或用陷腫散內治則可

陷腫散

千金方岐天師加減治骨瘤石瘤

烏賊魚骨一錢 白石英二分 石硫黃二分 鐘乳三分 紫石二分

乾薑一錢 丹參八分 琥珀末一錢 大黃一錢

附子三分 朝燕尿一錢 石礬一錢 水煎服十劑全消

消癟丹 仲景公傳可消諸癟

白朮三兩 茯苓十兩 人參三兩 陳皮三錢

生甘草一兩 薏仁五兩 茄實五兩 澤瀉五兩

半夏五兩 各爲末米飯爲丸常服自消

氣癟

癟何名之曰氣蓋有時小有時大乃隨氣之消長也斷宜

內散不宜外治。隨氣消長亦可隨氣治之。其症不痛不紅皮色與癟處同也。其贅則軟而不硬。氣旺則小氣長。反大氣舒則寬。氣鬱則急。故治法必湏補其正氣。開其鬱氣。則氣癟自散矣。古人有用枳殼扣其外以艾火在外灸之似亦近理。然終非妙法也。不若純用補氣之味而佐之。開鬱散滯之品。卽不全消亦必不添增其火也。

沉香化氣丸 岐天師傳治氣瘤

沉香一兩 木香二兩 白芍四兩 白木八兩

人參二兩 黃芩八兩 枳殼一兩 柴榔一兩

茯苓

四兩

杏仁二兩

附子五錢

天花粉四兩

各爲細

末蜜爲丸每日服三錢一料全消

外治仲景張公密傳統治各瘤神效但不可治日久之瘤也小瘤根細最效

水銀一錢兒茶二錢共研至無星爲度加入冰片

二分

再加入麝香五厘

再研又入硼砂五厘

再研

不見水銀始可用此藥敷于瘤處肉瘤血瘤粉瘤氣瘤俱化爲水約三日必消盡然後服消癟丹每

用一兩滾水吞服不拘時如筋骨之瘤內外二法

俱不必用蓋二瘤無害于人不必治亦不必治進

血瘤贊

血瘤而贊生于皮外者乃臟腑之血瘀而又有濕氣入于
體中故生于外也初生之時亦有細于髮者久之而大矣
小者如膽大者如茄以利刃割斷卽用銀烙匙燒紅一烙
卽止血且不潰不再生也否則復出血瘤一月如舊鐸于
腋中曾生此瘤甚小如粟也偶爾發癢友人紿生八角
虱余心疑而更癢自思武逆水銀則死而書齋之中無水
銀也曾爲人治下症方中用水銀乃取而擦腋下甚重至

痛而止夜臥則忘其痛矣早起見席上有血筋一條取觀之乃腋下所生血瘤已墮落矣余嘵之不能斷始知前方能去瘤也因商酌載之治初起之瘤頗多驗

銀銹散 家傳治初起血瘤

水銀一錢冰片三分輕粉一錢兒茶三錢

黃柏二錢朝腦一錢鏡锈一錢貝母一錢各爲末

搽擦卽墮落

肉瘤膏

肉瘤乃于皮上生一瘤宛如肉也初生如桃如粟漸漸加

大如拳其根皆濶大非若血瘤之根細小也不疼不癢不紅不潰不軟不硬不冷不熱其形可醜而病則不苦也此等之瘤皆犯神道之忌故生于四體以紀罪愆不妨順受倘必欲治之用刀割傷用火燒炙不特無功轉添痛楚矣

內托外消散

治肉瘤血瘤粉瘤

張仲景真人傳

蓋濕熱生耳

水銀

一兩

兒茶

二兩

共研至無星爲度

冰片

一錢

輕粉

三錢

麝香

五分

又入硼砂

五分

不見水銀始

可用以此藥敷于

瘤處

肉瘤粉瘤俱化

爲水約三

日必消盡然後再服湯藥用人參二錢白朮三錢

茯苓三錢陳皮五分生甘草五分柴胡八分白芍

三錢水煎服十劑永斷根矣如筋瘤難治然亦不必治也骨瘤亦不必治終身大如杏也

治肉瘤或男婦生在面上頸上手上即可去之

白芷五分人參五分煎湯生半夏十粒泡于白芷

人參之內數日將半夏切平頻擦患處效如手取但不可治瘀血之瘤也恐難收口錢又選傳

洞天奧旨卷之十一終