

二卷

牡丹皮

續斷

骨碎補

益母草子

澤蘭蘭草

白微

艾野艾

延胡索

紅花藤脂

葶藶

紫葳葶

凌霄花

大小薊

三七又三

地榆

蒲黃

卷柏

蘭茹

菴藁子

鬱金

薑黃片

菝葜

荆三稜

白茅根針

蘆根

葶根皮

薯蕷根薯蕷

魚鱗

芭蕉根

大黃

蓼

黃連

胡黃連

苦參

知母

龍膽草

青黛

大青

牽牛

防己漢已

厚樸甜

甘遂

大戟

商陸

葶

葶花

澤漆

常山蜀

藜蘆

木通

通草

澤瀉

車前草

燈草

瞿麥

扁蓄

天仙籐 地膚子葉 石韋瓦 海金砂 茵陳 香需膏 青蒿屑

附子烏頭 天雄 烏附尖 側子 草烏頭 白附子 破故紙 肉蓯蓉 瑣陽

巴戟天 胡盧巴 仙茅 淫羊藿 蛇麻子 兜絲子 覆盆子葉

蒺藜子沙苑 磁藜 刺蒺藜 根 使君子 益智子 砂仁 白豈蔻 肉豈蔻

草豈蔻草 香附 木香 藿香 茴香大小 八角 甘松香 山柰

良薑紅 薑 寇 蕪荑 煙草 金銀花膏 蒲公英 紫花地丁 杜牛膝

鶴虱 山豈根 牛蒡子根 山慈菘 漏蘆 貫眾 射干

續隨子 馬藺子根 葉 苧麻子 白頭翁 王瓜子 王不留行 冬葵子春 葵

子蜀 白鮮皮 葶藶拔契 土茯苓赤 白 白斂赤 斂 預知子 旱蓮草膏

寄奴草 馬鞭草 穀精草 青箱子 決明子 蓼實馬勃 木鱉子 終

增訂本草備要卷之二

休寧汪 昂初菴著輯

男汪

弟汪 桓殿武恭訂

姪汪惟



同鄭曾慶贊高訂

姪婿 澐天一同較

草部

牡丹皮

瀉伏火而補血



辛甘微寒入手足少陰心厥陰肝包  
瀉血中伏火丹

故入血分時珍曰伏火即陰火也陰火即相火也世人每以黃相治相火不知丹皮之功更勝故仲景腎氣丸和血涼血而生血血熱則枯破積血積痰不去則新血不

生通經脈為吐衄必用之藥血屬陰本靜因相火所逼故越出上竅治中風五勞驚癩瘵

癱筋脉伸縮捕掣為癰癥或手足捕掣舌眠喘邪卒然眩化吐涎除煩

本草卷之二 牡丹皮 續錄 骨碎補

執療癰瘡

涼血

下胞胎退無汗之骨蒸

張元素曰丹皮治無汗之骨蒸骨皮治有汗之骨蒸神不足者手

少陰志不足者足少陰故仲景腎氣丸用丹皮治神志不足也按內經云水之精為志故腎藏志火之精為志故腎藏神

單瓣花

紅者入藥肉厚者佳酒拌蒸用畏貝母免絲大黃忌蒜胡荽伏砒

時珍曰花

白者補赤者利人所罕悟宜分別之

續斷

補肝腎  
理筋骨



苦溫補腎辛溫補肝能宣通血脈而理筋骨主傷已

補不足

經疏云味甘故然

煖子宮縮小便破瘀血治腰痛胎

漏

懷妊瀝血

崩帶遺精腸風痢

是齋方平胃散一兩川續斷二錢半每服二錢

米飲下治時痢亦驗

癰痔腫毒又主金瘡折跌

以功命名止痛生肌外科需為上

齊川產良狀如雞脚皮黃皺節節斷者真去向裏硬筋酒浸用地黃

為使

骨碎補

補腎治

折傷

經曰腎

者胃之

閉也前

陰利水

後陰利

殼

益母草

一名菴

蔚

通行瘀

血生新



蒸



苦温補腎故治耳鳴

耳鳴必由腎虛

及腎虛久瀉

研未入猪腎煨熟空

心食之腎主二便久瀉多屬腎虛不可專責脾胃也

腎主骨故治折傷

傳傷牙痛炒黑為末擦下亦良

又八厥陰

心包能破血止血

入血行傷故治折

根似薑而扁長去毛用或蜜拌

傳粥和未裏傷虛

辛微苦寒入手足厥陰

心包

消水行血去瘀生新調

經解毒

瘀血去則經調

治血風血暈血痛血淋胎漏產難崩

中帶下

帶脉橫于腰間病生于此故名為帶赤屬血白屬氣氣虛者補中益氣而兼升提血虛者

養血滋陰而兼調氣

為經產良藥消疔腫乳癰

亦取其散癥解毒

通大小便然辛散之藥

瞳子散大者忌服

益母子主治畧同調經益精明目

血滯病目者則宜之活血

澤蘭  
通行血  
消水



順氣逐風

氣行則血行  
血活則風散

行中有補治心煩頭痛

血虛而熱之候

胎產帶崩

有子

有補陰之功時珍曰益母根莖花葉實皆可同用若治瘡腫胎產消水行血則宜並用若治血分風熱明目調經用子為良益母莖

花葉專手行于則行中有補也產寶濟陰返魂丹小暑端午或六月六日採益母莖葉花實為末窰丸治胎產百病近効方搗汁熬膏亦良

思鐵子微炒用

苦泄熱甘和血辛散鬱香舒脾入足太陰厥陰

肝脾通

九竅利關節養血氣長肌肉破宿血調月經消癥瘕

散水腫防已治產後血瀝腰痛瘀行吐血鼻洪目痛未盡

頭風癰毒撲損補而不滯行而不峻為女科要藥古方

澤蘭九甚多時珍曰蘭草澤蘭二種俱生下濕紫莖素枝赤節綠葉

葉對節着細齒但以莖圓節長葉光有岐者為蘭草莖微有節短葉

有毛者為澤蘭嫩時並可接音那而佩之楚詞所謂紉秋蘭以為佩是也

朱文公離騷辨證云必花葉俱香燥温不變方可刈佩今之蘭蕙花雖香而葉無氣質弱易萎不可刈佩吳人呼為香葦俗

名孩兒菊夏月採置髮巾則髮不腫浸蘭草走氣分故能利水道除痰

癖殺蠱辟惡而為消渴良藥經曰數食肥甘傳為消渴治之以蘭除陳氣也澤蘭走血分故能

消水腫塗癰毒破瘀除癥而為婦人要藥以為今之山蘭者誤矣防已

為使寇宗奭朱丹溪並以蘭草為山蘭之葉李時珍考衆說以譏之按別本云蘭葉甘寒清肺開胃消痰利水解鬱調經閩產者力勝李

士材云蘭葉剪去金水之氣故入肺藏東垣方中嘗用之內經所謂治之

以蘭除陳氣者是也余屢曉之李時珍又謂東垣所用乃蘭草也其集

諸家之言曰陳遜齋閑覽云楚騷之蘭或以為都梁香或以為澤蘭或

以為猗蘭當以澤蘭為正今之所種如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故

陳止齋云客蘭說以譏之方虛谷訂蘭說言古之蘭草即今之千金草

俗名孩兒菊菊今之所謂蘭其葉如茅者根名上續斷因花馥郁故得

蘭名楊升菴云世以如蒲管者為蘭九畹之受誣也久矣又吳草廬言

閩產為勝則是建蘭矣

即名幽蘭正合騷經矣

升菴九種多有



未確故  
陳文燭  
作正楊  
以辨之

黃山谷稱之世遂謬指為離騷之蘭寇氏本草溺于流俗反疑篋  
非夫醫經為實用豈可誣哉今之蘭果可以利水殺蠱而除痰癖乎其  
種盛于閩朱子閩人豈不識其土產而辨折若此世俗至今猶以非蘭  
為蘭何其惑之甚也昂按朱子為蘭援離騷網佩以為證竊謂網佩亦  
騷人風致之詞耳如所云飲水蘭之隆露餐秋菊之落英豈真露可飲  
而英可餐乎又云製芰荷以辨衣集芙蓉以為裳豈真芰荷可衣芙蓉  
可裳乎宋儒釋經執泥恐未可為定論也第騷經既言秋蘭則非春蘭  
明矣本經既言澤蘭則非山蘭明矣是離騷之秋蘭當屬本經之澤蘭  
無疑也然離騷不常曰春蘭兮秋菊乎不又曰結幽蘭而延竚乎不又  
曰疏石蘭以為芳乎若秋蘭既屬之澤蘭將所謂春蘭幽蘭石蘭者又  
不得為山蘭當是何等之蘭乎且山蘭為花中最上之品古今評者列  
之梅菊之前今反屈于孩兒菊之下以為盜龍萑名世間至賤之草皆  
收入本草獨山蘭清芬佳品檳葉不錄何其不幸若斯之甚也本草殺  
蠱之藥良多皆未必有驗至于行水消痰固山蘭之葉力所優為者也  
蓋李時珍陳方吳楊輩皆泥定陳藏器以澤蘭蘭草為一類二種遂併  
騷經而疑之崇澤蘭而黜山蘭遂合蘭草無復有用之者不思若以為  
一類則本經蘭草一條已屬重出何以本經蘭草反列之上品而澤蘭  
止為中品乎况一入氣分一入血分迥然不同也又騷經言蘭者凡五  
除不蘭人所不識其餘秋蘭春蘭幽蘭石蘭若皆以為孩兒菊是不特  
二重一類且四重一類矣行以公心定之區區豈里也哉蓋本經言

幽字何  
可當也

# 白微

瀉血熱

蘭所以別乎山也言蘭草非用藥而用其花也  
乎春也言石蘭所以別乎澤也愚謂秋蘭當屬澤蘭而春蘭石蘭定是  
山蘭其曰幽蘭則山蘭之別名以其生于深山窮谷故也  
寇氏朱氏之論又安可全非乎姑附愚說以諮多識之士



苦鹹而寒陽明衝任之藥利陰氣下水氣主中風身

執步滿忽忽不知人陰虛火旺則內熱生風火氣焚灼故身熱支滿痰隨火湧故不

知血厥汗出過多血少陽氣獨上氣塞不行而厥婦人尤多此症宜白微湯白微當歸各一兩參

五錢甘草錢錢熱淋温瘧洗洗寒熱酸痛寒熱作則營氣不能內管故酸痛婦人傷中淋

露血熱千金白微散治胎前產後遺尿不知時白微芍藥等分酒調服


丹溪曰此即河間所謂熱甚廷孔鬱結神無所依不能收禁之意也  
廷孔女人產虛煩嘔仲景安中益氣竹皮丸用之經疏云古方調經種

溺孔也子往往用之蓋不孕緣于血熱血少而其源起于似牛膝而短  
真陰不足陽勝而內熱故營血日枯也益陰清熱則血

自生旺而有子矣須佐以歸地芍藥杜仲菴蓉等藥  
小柔軟去鬚酒洗用惡大黃大戟山茱萸棗

艾葉

宣理氣  
血燥逐  
寒濕



苦辛生溫孰熱純陽之性能回垂絕之元陽通十二

經走三陰太少厥理氣血逐寒濕煖子宮止諸血溫中

開鬱調經安胎胎動腰痛下血膠膠湯良治吐血崩

帶治帶要藥腹痛冷痢霍亂轉筋皆理氣血逐寒濕之效殺蛇治癰

醋前外科有用乾艾作湯投白礬二三錢洗瘡然後敷藥以之灸音火

者益人血氣冷必假艾力以佐陽而艾性又能殺蟲也

能透諸經而治百病血熱為病者禁用灸火則氣下行入藥則熱上衝不可過劑○丹田氣弱臍腹冷

者以熟艾裝袋兜臍腹甚妙寒陳者良揉搗如綿謂之熟艾灸火用

濕脚氣亦宜以此夾入襪內

婦人丸散醋煮搗餅再為未用入茯苓數斤同研則易細前服宜鮮者苦酒醋香附也

為使艾附丸謂婦人諸病宗時重湯陰艾有明成化來則以蘄州艾為勝云多酒曇一炙便透其家發明並以野艾為真蘄艾離番實非

重艾

延胡索

宜活血  
利氣



辛苦而溫入手足太陰脾厥陰肝經能行血中肌

滯氣中血滯通小便除風痺治氣凝血結 下內外

諸痛通則癥瘕崩淋月候不調氣血不和因而凝滯不以時至 產後

血運暴中上衝折傷積血疝氣危急為活血利氣第一藥然辛溫走而

不守獨用力迅宜通紅墜胎血熱氣虛者禁用 根如半夏肉黃小而

堅者良酒炒行血醋炒上血生用破血炒用調血

紅花 一名

紅藍花  
通行血  
潤燥



辛苦甘溫入肝經而破瘀活血瘀行則血活有熱

血者吐出為好吐未盡加桃仁紅結于中暴吐紫黑

花行之大抵鮮血宜止瘀血宜行 潤燥消腫止痛凡

能痘癩血熱本草不候痺不通又能入心經生新血須兼補血 藥為佐使 俗用

# 茜草

通行血



染紅併作胭脂胭脂活血解毒疔挑破以油胭脂傳之良少用養多則行血過用能使  
 血行不止而斃血生于心包藏于肝属于衝任紅花汁與相類故治血病有產婦血悶而死名醫陸氏以紅花數十斤煮湯寢婦于上而薰之湯冷再加半日而蘇金匱有紅藍花酒云治婦人六十二種風

色赤 營氣溫行滯味酸走肝而齒走血本經 苦寒入厥

陰血分心包能行止血能行故能止消瘀通經又能止吐崩尿血消痰

通經酒煎一兩通經甚効治風庫黃疸有黃疸設疸酒疸黃汗疸女勞疸此益蓄

血發黃不專于濕熱者也女勞疸必屬腎虛亦不可以濕熱治當用四物知相壯其水參耒培其氣隨症而加利濕清熱藥崩運撲

損疔癩瘡瘡少者忌用 根可染絳忌鐵

# 紫草

瀉血熱



甘鹹氣寒入厥陰血分心包涼血活血利九竅通二

便鹹寒治心腹邪氣即熱水腫五疸癰瘡瘡血熱

反痘瘡血熱毒盛二便閉澀者血熱則毒開得此草涼之則血行而毒出大便利者忌之活切心書云紫草性  
 寒小兒脾胃實者可用脾胃虛者反能作瀉古方准用茸取其初得陽氣以類觸類用發痘瘡今人不達此理一槩用之誤矣瀉者忌用

去頭鬚澆

凌霄花

一名紫

葳

瀉血熱



甘酸而寒入厥陰血分心包肝能去帶伏火破矣

瘀主產乳餘疾崩帶癥瘕腸結不大便血閉淋濁風痒

血熱生風之症女科多用孕婦忌

本經云養胎經疏云破血之藥非所宜也。肺癰有用之為君藥者

凌霄花為末和蜜陀僧唾調敷酒齶甚驗

簾花開五瓣葉赤有靛不可近鼻簡傷腦

大小薊

瀉涼血



甘温大明白涼皆能破血下氣行而帶補治吐血飢腸癱女

子赤白沃安胎涼血之功小薊力微能破瘀生新葆精養

血復執補虛不能如大薊之消癰毒丹溪曰小薊治下焦結熱血淋

三七  
名亦

止痛  
瀉  
山漆  
瀉

地榆  
瀉止血

本事方一人冷氣入陰囊腫  
滿疼痛煎大薊汁服立瘥  
薊莖低而葉不皺皆甬根

兩薊相似花如髮大薊莖高而葉皺小



甘苦微温散血定痛治吐血衄血血痢血崩目赤癰  
腫醋磨塗即散已為金瘡杖瘡要藥杖時先服一二錢則血不衝心  
杖後敷之去瘀消腫易愈大抵  
陽明厥陰血分之藥故治血病  
此藥近時始出軍

中特之從廣西山洞來者略似白及地黃有節味微甘頗似人參以未

摻猪血中血化為水者真近出一種葉似菊艾而勁厚有歧尖莖有赤稜夏秋開黃花莖如金絲盤紐可受而氣不

香根大如牛蒡味甘極易熟衍云是三七  
治金瘡折傷血病其效與南中來者不同

苦酸微寒性沉而瀉本草未嘗言瀉然能收入下焦



除血熱治吐血崩中血虛腸風血鮮者為腸風隨感

本草圖經

蒲黃

生滑行  
血炒澀  
止血

卷栢

生用破  
血灸用  
止血

毒積久而後也。葉前為近血。出腸胃後為遠血。出肺肝。血痢。積頰。白古方斷下多用之。初宗。似。柳根外黑裏紅。取上截炒黑用。稍反行血。得髮。食。惡。寒。



葛柔等分。擦之。愈時。珍曰。觀此。則蒲黃之涼。血活血。可知矣。少黑。性。澀。甚。舌。為。心。苗。心。包。相。火。乃。其。臣。使。得。乾。薑。胃。陰。陽。相。濟。也。  
止一切虫朋帶泄精 香蒲花中葶屑湯或入藥



甘平厥陰血分藥。心包。生用。性滑。行血。消瘀。通經。脉。

利小便。祛心腹膀胱寒執。向五靈脂。治心腹。血氣痛。名失笑散。療。撲打。

損傷瘡癰。諸。重。一。婦。舌。脹。滿。口。以。蒲。黃。類。搽。此。曉。乃。愈。宋。度。宗。苦。脹。滿。黃。御。醫。用。蒲。黃。乾。

生用。辛平。破血。通經。治癰。癢。淋。結。灸。用。辛。溫。止。血。治。

腸風。脫肛。生石上。拳。纏。子。如。雞。足。俗。呼。萬。年。松。凡。使。

鹽。眾。煮。半。日。井。水。者。半。日。焙。用。

本草圖經 卷二 草 三七 地俞蒲黃 卷百 二



蘭茹

瀉破血



辛寒有小毒蝕惡肉排膿血殺疥虫除熱痺破癥瘕

內經同烏解骨  
治婦人血枯

根如菘蕈皮黃白葉長微潤折

之有汁結實如豆一顆三粒甘草為使

菴蘭

瀉行水

散血



苦辛微寒別錄微溫入肝經血分行水散血散中有補治

陽痿經泄腰膝骨節重痛後血氣作痛閉折傷

撲打方能制蛇見之  
多用之能制虫則爛

葉似菊而薄莖似艾而粗以蕙為使

鬱金

宜行氣

解鬱

涼血破

瘀



辛苦氣寒純陰之品其性輕揚上行入心及包絡蕙

入肺經涼心執散肝鬱氣破血行滯氣亦不損正  
氣破瘀血亦能生

新治吐衄尿血婦人經脈逆行經不下行上為吐衄  
諸症用鬱金未加非

汁黃汁童便服其血自清痰中其血者加个壓血氣諸痛產後敗血攻心顛狂失心顛多主喜笑  
尚如限

黃黃  
瀉破血  
行氣



症屬不足狂多忿怒人黃能制症屬有餘病多因破傷風痰血塞于心  
或所致鬱金七兩白礬三兩米糊丸服名白金丸鬱金入心散惡血明  
禁化頑瘡毒入心鬱金一兩甘草二錢半者乾焙研末水片五分每用  
痰故也瘡毒入心一錢加猪血五七滴新汲水下治斑痘始有白泡忽  
搐入腹紫下蟲毒同升麻服  
黑無膿不吐則下  
出川廣體節如蟬肚外黃內赤色鮮  
微香味苦帶甘者真市人多以黃薑偽之



苦辛 本草大寒 藥性色黃入脾兼入肝經理血中之氣  
器大明曰熱 下氣破血除風消腫功力烈于鬱金治氣脹血積產  
後敗血攻心通月經療損片子者能入手臂治風

寒濕痺

血虛臂痛者勿用時珍曰入臂

出川廣

陳藏器曰鬱金苦寒色赤黃辛溫色黃

述味苦色黃三物不同所用各別經疏曰黃薑主治介乎三稜鬱金之間  
時珍曰黃薑鬱金形狀功用大畧相近但鬱金入火專治血薑  
黃入脾兼治血中之氣速入肝治氣中之血稍為不同今時以扁加乾  
黃者為片子黃黃圓如蟬肚鬱金並可染色透形雖似鬱金

而色不黃也

義述音

瀉破血行氣消積

賈同齊



辛苦溫入肝經血分破氣中之血能通肝經聚血消瘀通

經開胃化食解毒止痛忘腹諸痛冷氣吐酸奔豚

瘕癖酒醋者服眩音賢小腹積瘕癖多見于男子癥瘕多見于婦人義述香烈行氣通竅同三稜用

治積聚諸氣良按五積心積曰伏梁起臍上至心下肝積曰肥氣在左脇肺積曰息音在右脇脾積曰痞氣在胃脘若側腎積曰奔豚在小腹上主心下治之不宜專用下藥恐損真氣管子破血行氣藥中加補脾胃藥氣旺方能磨積正旺則邪自消也經曰大積大聚其可犯也良其大半而山過者死東垣五積方用三稜義述皆蕪人參香助成功按治積諸藥神效麥芽化穀食萊蕪化食食鹵砂阿魏山查化肉食紫蘇化魚解毒葛花枳椇消酒積麝香消酒積真糖羌花蔞牛大戟行水飲三稜莪朮散單消癥瘕水香檳榔行氣滯礞石蛤粉攻痰積巴豆攻冷積

大黃芒硝攻熱積雄黃臍粉雖為泄劑亦能壯氣王好古曰故治氣短攻涎積蠶蜋水蛭攻血積

九集香丸諸湯根加生薑茂生根下似木質堅硬難擗火煨透

效中多用之

荆三稜  
瀉行氣  
破血消  
積

白茅根  
瀉火補  
中止血  
止噦

乘執搗之入氣或醋磨酒磨者孰用入血分



病塊如石文理五色  
三稜柄消成水乃知此藥奇療癥癖  
力峻虛者慎用



苦平色白屬金及黑  
入肝經血分破血中之氣亦通肝經

聚蕪入脾經散一切血瘀氣結瘡硬食老塊堅積

乃堅者削之從血藥則治血從氣藥則治氣須輔以健脾補氣藥良昔有人患癥癖死遺言開腹取之得

消腫止痛通乳隨藉功近香附而

色黃體重若鯽魚而小者良醋浸炒或麩裏煨

甘寒入手少陰心足太陰陽明脾補中益氣除伏熱

消瘀血利小便解酒毒治吐血諸血心肝火旺逼血上行則吐血肺

火盛則衄血茅根甘和血寒涼血引火下降故治血之撲損瘀血搗汁服名茅花湯亦治鼻衄產淋

閉寒熱血瘀則閉閉淋瀝血熱則閉傷寒噦逆即呃逆說文曰噦氣摶也東垣作乾嘔之甚者

本草 我述荆三稜 白茅根

蘆根

嘔 瀉 熱 止

瀉 瀉 熱 散 亭 根

未肺熱喘急內熱煩渴黃疸水腫清火行水時珍曰良藥也世人以微而忽之惟事苦寒之劑傷沖和之氣

鳥足知 此哉

茅針瀆癰瘡 酒煮服一針瀆 孔二針瀆三孔



甘其胃寒除火治嘔噦反胃 胃熱火升則嘔逆食不 下金匱方蘆根煎服

消渴客熱傷寒內熱止小便數 肺為水之上源脾氣 散精上歸于肺始能

通調水道下輸膀胱腎為水藏而主二便三經有熱則小便數甚至不能少忍火性急速故也蘆中空故入心肺清上焦熱熱解則肺之氣化行而小便復其常道矣 能解魚鱈河豚毒 取逆水肥厚者去鬚節用



甘寒而滑補陰破瘀解熱潤燥治天行熱疾大渴大 狂胎動下血諸淋血淋搗貼赤遊丹毒癰疽瘰癧益

瘡折傷止血 難骨更搗下龍眠雞骨 易 湯如魚骨魚湯下汁能化血為水帶皮與產婦

乍枕止血軍安復上止產後報痛 散瘀 寧心 療 胃 腐

猛獸根  
瀉濕熱

芭蕉根

瀉熱

大黃

大瀉血  
分實熱

下有形  
積滯



苦澀而冷入胃大腸經除風熱濕熱生肌殺蟲治泄痢消渴牙痛口糜前汗遺尿好眠癰疽瘡癤花有金

黃白紅紫數色以黃心白色粉紅者入藥子名芭實酸溫主治畧高十  
曰薔薇根角蒿口瘡之神藥角蒿所在多有開淡紅紫花  
角微彎長二寸許辛苦有小毒治惡瘡有重及口齒瘡

味甘大寒治天行熱狂煩悶消渴瘵後血脹曲搗汁服塗

癰腫吉丸為末油調敷霜後者佳

大苦大寒入足太陰脾手足陽明厥陰大腸胃血分心包肝

其性浮而不沉其用走而不守若酒湯亦能引至

高之分仲景太陽門調胃承氣湯大黃註曰酒浸陽明門大承氣湯大黃註曰酒洗少陽陽明小

承氣湯大黃不用酒製皆有分別東垣曰邪氣在上非酒不至若用生者則遺至高之邪熱病愈後或目赤喉痺頭腫膈上熱疾生也

本草 蘆根 薔薇根

以蕩滌腸胃下燥結而除痰熱治傷寒時疾發熱譫語大腸有燥糞故

音温熱瘧瘧下痢赤白腹痛裏急黃疸水腫癥瘕積聚積之成形謂之積屬陰聚散無

常謂之聚屬陽積多是留飲宿食心腹痞滿二便不通皆土鬱吐血衄

血血閉血枯損傷積血一切實熱帶伏火行水除痰餽膿消腫能推

陳致新然傷元氣而耗陰血下多若病在氣分胃虛弱人禁用病在氣分

而用之是為誅伐無過東垣曰能推陳致新內定禍亂以致太平所以

有將軍之號時珍曰仲景瀉心湯治心氣不足吐衄血者用大黃黃連

黃芩乃瀉心包肝脾胃四經血中之伏火也又治心下痞滿按之軟者

則痞滿乃寒傷營血邪結上焦胃之上脘當心故曰瀉心經曰太陰所

至為痞滿又曰濁氣在上則生腫脹是已病發于陽而反下之則結胸

膜音噴

乃熱邪陷入血分亦在上脘故大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分

之邪而降其濁氣也若結胸在氣分只用小陷胸湯痞滿在氣分只用

半夏瀉心湯或問心氣不足而吐衄何以不補心而反瀉心丹溪曰少

藜

濕瀉火除

肺肝各受火邪而病作故用藜麥救肺黃連救肝肺者於之主肝者心之母血之合也肺肝火退則血歸經而自安矣寇宗奭曰以苦泄其熱就以苦補其心蓋一舉而兩得之李士材曰古人用大黃治虛勞吐衄意甚深微蓋瀉陰不降則清陽不生瘀血不去則新血不生也

川產錦紋者良有酒浸酒蒸生熟之不同生用更峻黃芩為使欲取通利者不

得聚進穀食天黃得穀食便不能通利耳夷堅志瀉火傷者搗生大黃醋調敷止痛無礙



苦入心寒勝熱瀉中焦實火除脾家濕熱治癖痢腹

痛便血曰辟寒痛忌用凡腹痛有寒熱虛實食積痰血痰濕之不同寒宜溫熱宜清虛宜補實宜下食

宜消道瘀血且行散痰濕且化痰利濕痛時寒熱往

來邪在少陽黃疸五淋血閉實熱在血分氣逆癰疽瘡瘍及諸失血消痰丹溪曰黃芩降

痰假其降火也按痰利水解渴度胎胎孕宜清熱涼血血不安行則胎安養陰退陽補勝

照水酒炒則上行瀉肺火利胸中氣肺主氣熱傷氣瀉熱所以保肺治上焦之風熱濕

本草黃芩 卷二 草 黃芩 十一



熟丹溪曰苦芩  
上中二焦藥  
火嗽喉腥五具肺為腥  
目赤腫痛過服損胃虛寒中養

用得柴胡具寒熱得芩藥治痢得厚朴黃連止腹痛得桑皮瀉肺火得  
白木安胎之聖藥時珍曰仲景治少陽症小柴胡湯太陽少陽合病

下利黃芩瀉少陽症下後心滿瀉心湯並用之蓋黃芩苦寒入心瀉熱  
除脾家濕熱便胃火不流入肺不致刑金即所以保肺也肺虛不宜者

苦寒傷土損其母也少陽症雖在半表半裏而心膈痞滿實兼心肺上  
焦之邪心煩喜嘔默默不欲食又兼脾胃中焦之症故用黃芩以治手

足少陽相火黃芩亦少陽藥也楊士瀛曰柴胡退熱不及黃芩時珍曰  
柴胡乃苦以發之散火之標也黃芩乃寒能勝熱折火之本也東垣治

肺熱身如火燈煩躁引飲而晝盛者宜一味黃芩湯以瀉  
肺經氣分之火黃芩一兩煎服本方用治朋中暴下  
黃明者良中

虛名枯苓即片芩瀉肺火清肌表之熱內實名條苓即子芩瀉大腸火

補膀胱水上行酒炒瀉肝胆火猪胆汁炒山茱龍骨為使良丹皮丹砂

# 薑

瀉火燥



## 大苦大寒入心瀉火

王海藏曰瀉心實瀉脾也實則瀉其子

### 鎮肝涼血

凡治血防風為上部之使黃連桑寄生絞絲草單用

消除煩益肝胆厚腸胃消心痲前止盜汗治腸泄瀉痢

連九濕熱鬱而為痢黃連治痢要藥噤口者熱壅上焦同人參煎湯呷

之但得下咽便好喻嘉言曰下痢必先汗解其外後調其內首用辛涼

以解表次用苦寒以攻裏機要云後宜宜下腹痛宜和身重宜除濕脉

脈宜去風風邪內結宜汗身冷自汗宜溫膿血稠粘宜重劑以竭之下

痲赤屬血分白屬氣分戴氏曰俗謂赤熱白寒瘡滿燥濕開鬱仲景治

者非也通作濕熱處治但有新久虛實之分瘡滿九種心下痞五等

瀉心湯清腹痛清伏梁清目痛皆傷人乳浸點或合歸芍等

皆用之積分煎湯熱洗散熱活血癰疽瘡

疥諸痛癢瘡酒毒胎毒小兒初生合甘草明目傳信方羊肝一具黃酒

皆屬心火為未審調令燕之一兩搗丸凡是目疾皆

治名羊肝丸定驚鎮止汗解毒除疳同猪肝殺虺蛇得苦虛寒為病者禁用

久服黃連苦參反熱從火化也昂按炎上作苦味苦必燥燥則熱矣且

苦寒沉陰陰翳殺伐傷生和之氣也韓愈曰黃連與肉桂同行能交心腎

于頃刻時珍曰治痢用香連九薑連九用黃連乾薑薑薑散用黃連生

薑薑差金丸用黃連吳茱萸治口瘡用黃連細辛止下血用黃連大蒜一

陰一陽寒山熟用熟因

寒用者最得製方之妙

出宣州者粗肥出四川者瘦小狀類鷹爪連

珠者良去毛治心火生用虛火醋炒肝胆火猪胆汁炒上焦火酒炒有

酸嘈雜等症亦有吐酸者名酢心中焦火薑昇炒下焦火鹽水或童便

炒食積火黃土炒治濕熱在氣分吳茱萸湯炒在血分乾漆水炒點眼

赤人乳浸時珍曰諸法不獨為之引道蓋辛熱制其苦寒鹹寒制其燥性用者詳之黃芩龍骨為使惡菊花

寒參殭蚕白解皮畏款冬牛膝忌猪肉時珍曰方有藏連丸黃連猪肚丸豈忌肉而不忌藏府乎殺

為頭巴豆黃連瀉心火佐以龍胆瀉肝胆火白芍瀉脾火石膏瀉胃火知母瀉腎火黃枯瀉膀胱火木通瀉小腸火黃芩瀉肺

火梔子佐之瀉大腸火黃連佐之柴胡瀉肝胆火黃連佐之瀉三焦火黃芩佐之鄭真一日熱鬱懣心兀兀欲吐用黃連數分甚効

### 胡黃連

瀉熱療驚疽



苦寒去心熱益肝胆厚腸胃治骨蒸熱五心煩熱

心窩手三消渴而多飲為上消肺熱也心移熱于肺

心足心傳為高消是也多食善肌為中消胃熱

也瘰成為消中是也渴而小便云云此痔此痔脉痔

苦參  
瀉火燥  
濕補陰

則逼肛門而為痔腫  
藥朱二允曰解吃烟  
毒暴服之甚効

亦有之心脾外黃折之虛出如烟者真良藥同黃蓮



苦燥濕寒勝熱沉陰善腎補陰益精養肝胆安五臟

濕熱去則血氣和平而五臟自安

利九竅生津止渴明目止淚

淚為肝熱

治温病血痢

純下青血者風傷肝也宜散風涼血腸下如荳汁者濕傷脾也宜清熱滲濕

風濕赤黃疽酒毒熱生風濕生虫又能祛風逐水殺虫治大風疥癩然

大苦太寒肝腎虛而無執者勿服

張從正曰凡藥皆毒也雖苦參甘草不可不謂之毒久服必偏勝為患經

曰五味入胃各歸其所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久之由也王水註曰氣增不已則藏有偏勝偏勝則藏有偏絕故令人暴天筆談云久用苦參擦牙遂病腰痛由其氣傷腎也經又曰大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九穀

藥能醫

病不能

養人食

能養人

不能醫

病

知母

瀉火補

水潤燥

滑腸

東垣治

便秘以

渴不渴

分之

肉菓菜食養盡之無使過之傷其正也按人參補脾沙參補肺紫雲  
參補肝丹參補心玄參補腎苦參不在五參之內然名參者皆補米  
酒煎或醋者

其浸去腥氣蒸用玄參為使臣貝母免絲子漏盧農菽蘆  
苦參二兩或

能吐天  
行時毒



辛苦寒滑上清肺金而瀉火瀉胃熱膀胱邪下潤腎

燥而滋陰入二經氣分黃柏入二經血分故消痰定

嗽止渴安胎其非清火之用治傷寒煩熱虛勞產汗之

骨蒸燥渴虛煩久瘧下痢治嗽者清肺火也治渴者清胃熱也退骨蒸者潤腎火也利二便消浮腫小便

利則腫消東垣曰熱在上焦氣分便秘而渴乃肺中伏熱不能生水膀胱絕其化源宜用滲濕之藥瀉火清金滋水之化源熱在下焦血分便

閉而不渴乃其水不足膀胱乾涸無陰則陽無以化宜用黃柏知母大苦寒之藥滋賢與膀胱之陰而陽自化小便自通丹溪曰小便不通有

熱有濕有氣結于下宜清宜燥宜升又有隔二隔三之治如肺不燥但

龍胆草  
瀉肝胆  
火下焦  
濕熱

西脾濕不運而按不上升故肺不能生水則潤胃健脾比隔三之治瀉  
膀胱黃柏知母之類清肺車前茯苓之類燥脾二木之類昂按凡病皆  
有隔二隔三之然苦寒傷胃而滑腸多服令人瀉李士材曰苦寒蕪殺  
非長養萬物者也世  
以其滋陰施之虛損之人則  
如水益深矣特表出以為戒  
得酒良上行酒浸下行鹽水拌忌鐵



大苦大寒沉陰下行竅肝胆而瀉火相火寄于肝胆  
有瀉無補瀉其  
邪熱即所  
以補之也  
兼入膀胱之經除下焦之濕熱與防已同  
功酒浸亦能外行上行治骨間寒熱腎主  
骨散屬邪氣

肝經  
風火時氣濕熱痢瘕黃寒濕腳氣足傷寒濕則成脚氣腫而痛者為  
濕脚氣宜清熱利濕搜風又有掌  
縮枯細痛而不腫者名  
乾脚氣宜養血潤燥  
要藥草按若目疾初  
起宜發散忌用寒涼  
癰疽瘡疥過服損胃  
甘草水浸一宿暴用小豆  
貫衆為使息地黃

青黛

瀉肝散  
鬱火

大青

瀉心胃  
熱毒



蓄溫風熱毒氣若  
內痔婦不能禁酒物果仍發痔  
研置餅中煨食  
名聖餅子治咯血  
碧著水飛淨用  
內多石灰  
故須陶淨

本草綱目卷二

鹹寒色青瀉肝散五藏鬱火解中下焦鬱風熱行

日一婦患臍腹二陰遍生濕瘡熱痒而痛出黃汁二  
便澀用鰻鯉松脂黃丹之類塗之熱痛愈其婦嗜  
酒喜食魚蝦發風之物乃用馬齒莧四兩研爛入青  
黛黑一兩和塗熱瘡皆去仍服八五散而愈此中下焦

治傷寒發斑吐咯血痢  
陰虛火炎者  
忠用合杏仁

小兒散癩瘡熱丹熱傳癰瘡蛇犬毒 即靛花取嬌

微苦鹹水寒解心胃熱毒治傷寒時疾熱狂陽毒發

狂熱甚傷血裏實表虛則發斑輕如疹子重如錦紋  
紫黑者熱極而胃爛也多死活人治赤斑煩痛有  
犀角大  
青湯  
黃疽熱痢丹毒喉痺處處有之高三三尺

去... 藥... 針... 工... 口... 示...

巨瀉氣  
分濕熱



辛熱有毒屬夾善走入肺經瀉氣分之濕熱火能平

金而能達石腎命門走精隧通下焦鬱遏及大腸風泄肺

秘氣秘利大小便逐水消痰殺虫墜胎冷水腫喘滿

痰癖氣塊若濕熱在血分胃弱氣虛人禁用

東垣曰牽牛苦寒誤矣其味辛辣久嚼猛烈雄壯所

謂苦寒安在哉乃瀉氣之藥比諸辛藥泄氣尤甚若濕從下受下焦主血中之濕宜苦寒之味而反用辛熱之藥泄上焦之氣是血病瀉氣

便氣血俱損也王好古曰以氣藥引則入氣以大黄引則入血時珍曰一婦腸結年幾六十服養益潤燥藥則泥一服硝黃藥則若罔知如此

三十餘年其人體肥膏沮而多鬱曰吐酸痰乃寬此乃三焦氣滯有升無降津液皆化為痰不能下潤腸腑非血燥也潤劑留滯硝黃入血不

能入氣故無効用牽牛為末皂角膏丸緩服便通外甥素多酒色病二便不通脹痛呻吟七晝夜用通利藥不効予思此乃濕熱之邪在精道

穿墜路病在二陰之間故前阻小便後阻大便病不在大腸膀胱也用珠實箇香穿山甲諸藥位牽牛三服而平東垣補下焦陽虛天真丹用

牽一鹽水炒黑佐沉香杜仲肉桂有黑白二種黑者力速亦名黑丑取子

本草 青黛大青 牽牛 五



防心

通下水  
瀉下魚  
血分瀉  
熱

木集以

行水為

通劑改

熱藥為

燥劑

淘去浮者春去皮用得木香乾薑

此藥漢前未入本草故仲景方中無此別錄始載之宋後始多用者

大辛苦寒

本經平別錄溫

太陽經藥勝能行十二經通腠理

利九竅瀉下焦血分濕熱為瘡風水之要藥治肺氣

喘嗽

水熱氣諸瀉

降氣下痰

濕瘧脈氣

足傷寒濕為脚氣寒濕鬱而為熱濕



則腫熱則痛防已為去濕濕加苡仁蒼朮木瓜木通熱加苓栝風加菴活草薜痰加竹瀝南星痛加一附木香活血加四物大便秘加桃仁紅花小便秘加牛膝澤瀉痛連臂加桂枝威靈仙痛連脇加胆草又有足跟痛者屬腎虛不與脚氣同論 水腫風腫癰腫惡瘡或濕熱流入十二經致三陰不通者非此不可然性險而健陰虛及

濕熱在上焦氣分者禁用

十劑曰通可去滯通草防已之屬是也通草即水通是徐之才亦以行水者為通與燥劑

無以別矣木通甘燉瀉無分

出漢中根大而虛通心有花紋色黃名

濕熱防已若寒瀉血分濕熱

美方已異點黃腥水魚首呆方已不佳 陳藏器曰治風用木香先用

惡細辛畏葶藶

葶藶

大濕氣  
秘通行  
木



辛苦大寒屬靈性急大能下氣行膀胱水肺中水氣

膈急者非此不能除破積聚癥結伏留熱氣消腫陰

痰止咳定喘水濕泛溢為腫脹通經利便及服令人

虛十劑曰洩可去閉葶藶天黃之屬是也大黃泄陰分血閉葶藶泄陽

肺而傷胃宜大棗輔之仲景有葶藶天棗瀉肺湯治肺氣喘急不得臥昂按輔以大棗補土所以制水

色黃谷糯米微炒黍米用得酒良榆皮為使

子如黍米微長

甘蔞

大通瀉  
經蔞水  
濕



苦寒有毒能瀉腎經及蔞道水濕直達水氣所結之

處以攻決為用為下水之聖藥什景天陷主十二種

水大腹腫名水蠱喻喜言曰腎為水穀之海五藏六府之源脾不能散胃之水精于肺而

本草防已葶藶甘蔞

腎者胃之關也  
前陰利水後陰利穀

大戟  
大通瀉



病于中肺不能通胃之水道于膀胱而病于上腎不能司胃之門時其蓄泄而病于下以致積水浸淫無所底止王好古曰水者脾肺腎三經所王有五藏六府十二經之部分上頭而中四肢下腰脚外皮膚中肌肉內筋骨脉有尺寸之殊浮沉之利不可輕瀉當知病在何經何藏方可用之按水腫有痰裏食積瘀血致清不升濁不降而成者有濕熱相生墜道阻塞而成者有燥熱沖擊秋結不通而成者症屬有餘有服寒涼傷飲食中氣虛衰而成者有大病後正氣衰憊而成者有小便不通水液妄行脾莫能制而成者症屬不足宜分別治之然其源多由中氣不足而起丹溪曰水病當以健脾為主使脾胃而氣運則水自行宜參苓為君視所決症加減苟徒用利水藥多致不救  
留飲宿食痰迷癩癩虛者忌用 皮赤肉白根作連珠重貫者良麩裏

煨熟用或用甘草蘇危汁浸三日其水如墨以清為度再麩裏煨瓜蒂為使惡遠志反甘草仲景治飲與甘草同用取其相反以立功也有治水腫及腫毒者以甘遂未傳腫處濃煎甘草湯服之其腫立消一物相反感應如此

苦寒有毒能瀉臟腑水瀉不利大小便治十

二水復萌亦謂重復也惡長須皮雖腫氣毒即重痛

隨胎誤服損真氣時珍曰痰涎為物隨氣升降無處不致入心則逆成癩癩入肺則塞竅為咳喘背冷入肝則脇痛乾嘔寒

熱往來入經絡則麻痺疼痛入筋骨則牽引隱痛入皮肉則癩癧癰腫

陳無擇並以控涎丹主之殊有奇効此乃治痰之本痰之本水也濕也

得氣與火則結為痰大戟能泄藏府水濕甘遂能行經絡水濕白芥子

能散皮裏膜外痰氣惟善用者能收奇功也又曰錢仲陽謂腎為真水

有補無瀉復云痘疔變黑歸腎者用百滋營下之非瀉腎也瀉其府則

藏自不實府者膀胱也百祥惟大戟一味能行膀胱之水故也竊謂非

獨瀉府乃腎邪實而瀉肝也實則瀉其子大戟浸水青綠肝胆之色也

疔疔毒盛火熾則水益涸風挾火勢則土受虧故津液肉竭不能化膿

而成黑陷之症瀉其風火之毒所以救腎扶脾也昂按瀉心乃所以補

心瀉腎即所以救腎也熱退則真陰復矣撻要用大戟一兩棗三枚同

煮乾乾去戟用棗丸服名棗變百祥丸 杭產紫者為上批產白者傷人漿水煮去骨用

得大棗則不損脾畏甘滿反甘草

苦寒有毒諸家辛酸時珍苦寒 沉陰下行與大戟甘遂同功療

不腫脹滿腫屬脾脹屬肝腫則陽氣猗行如單脹而不腫者名蠱脹為水橫剋土難治腫脹朝



商陸

水大通行

本草葯要卷二草大戟 商陸 十一

堯花  
大通行  
水



良

人見鬼神取花白者根

亦者傷人只堪貼臍八臍  
三分搗貼小便利則腫消

豈豈湯浸蒸用得蒜

寬莫急為血虛暮寬朝急為氣虛朝寬暮急為氣血兩虛腫脹由心腹  
而散四肢者吉由四肢而入心腹者危男自下而上女自上而下皆難  
治  
瘕疝癰腫喉痺不通薄切醋炒濕熱之病瀉蠱毒傳惡瘡隨胎孕令  
塗喉中良

苦溫有毒去水飲痰癰瘰五水在吾藏皮膚脹滿喘

急痛引胸脇咳嗽瘧瘧

五水者風水皮水正水石水  
黃汗也水積胸中壅滿如石

石水汗如栢汁名黃汗久不愈必致癰腫時珍曰  
仲景治傷寒太陽症表未解心下有水而咳乾嘔發

熱或喘或利者小青龍湯主之表已解有時頭痛出汗惡寒心下有水  
乾嘔喘引兩脇或喘或咳者十棗湯主之蓋青龍散表邪使水從汗出  
內經所謂開鬼門也十棗逐裏邪使水從兩便出內經所謂  
潔淨府去陳莖法也十棗湯堯花甘草大戟等分棗十枚

葉似

如二月開花紫莖葉老老皮東之旨也昔京邑人獲其子及子亦可


毒魚反甘草 開山若取葉際皮層輒依赤腫假傷以誣人

蕘花

水大通行



澤漆 通行水



常山

宣吐痰 截瘧通 行水



辛散結苦澁熱行水捷藥主治畧同羌花

辛苦微寒消痰退熱止嗽殺虫利大小腸治大腹水

腫益丈夫陰氣 生平澤葉圓黃綠類貓睛一名

貓兒眠睛草莖中有白汁粘人 時珍曰別錄云是大戟苗非也功相類耳

辛苦而寒有毒能引吐行水祛老痰積飲 痰有六風痰熱痰食痰氣痰也飲有五流于肺為支飲于肝為懸飲于心為伏飲于經絡為溢飲于腸胃為痰飲也

常山力能專治諸瘧瘵悍暴能損真氣弱者慎用 特珍

曰常山蜀漆劫痰截瘧須在發散表邪及提出陽分之後用之瘧有經瘧藏瘧風寒暑濕瘧食瘧鬼之別須分陰陽虛實不可驟論常山蜀漆

本草毒草 卷二 草 羌花 澤漆 常山

# 藜蘆

宜引吐

得甘草則吐得大黃則利得烏梅穿山甲則入肝得小麥和葉則入心  
 得秫米麻黃則入肺得龍骨附子則入腎得草薺楝榔則入脾蓋無痰  
 不作瘧一物之功亦在驅逐痰水而已李士材曰常山發吐唯生用多  
 用為然與甘草同用亦必吐若酒浸炒透但用錢許每見奇功未見其  
 或吐也世人泥于雷斅老人久病忌服之說使良藥見疑沉痾難起抑  
 何愚耶。常山吐癰瘰瓜蒂吐熱痰烏附尖吐濕痰萊菔子吐氣痰藜  
 蘆吐  
 風痰 雞骨者良酒浸蒸或炒用栝萐為使烏蘆者葉名蜀漆功用

畧高 古方有蜀漆散取其苗  
 性輕揚發散上焦邪結 甘草水拌蒸



辛寒至苦有毒入口即吐善通頂令人嘔風爛疔多

用之 張子和曰一婦病風痾初一二年一作後漸日  
 作甚至一日數作求死而已值歲大札采百草

食見野草若葱菜菘菹食覺不安吐膠涎數日約一  
 二斗汗出如洗甚昏困後遂輕健如常人以此所食葱

訪人乃熟藜蘆則藜蘆是矣李時珍曰和王紀年七十中風不省牙關  
 緊閉先考大醫吏日月也翁診視藥不得人不獲已打去一齒濃煎藜  
 蘆湯灌之少頃意氣遂生痰而

木通 降火清肺



大黃湯即止

甘淡輕虛上通心包降心火清肺熱心火降則肺熱清矣化津

液肺為水源肺熱清則津液化水道通下通大小腸膀胱導諸濕熱由

小便故道赤散用之凡利小便者多不利大便以小便愈通大便愈燥也木通能入大腸蕪通

大便通利九竅血脉關節治胸中煩熱遍身拍痛楊仁齋云遍身隱熱疼痛拘急足冷皆伏熱傷

血血属于心宜木通以通心竅則經絡流行也大渴引飲中焦火淋瀝不通下焦火心與小腸相表裏心移熱于小腸

則淋水腫浮大利小便耳聾泄腎火目眩口燥舌乾舌為心苗喉痺咽痛火炎上焦

鼻鼈音雞熱雍清道則氣室不通失音清脾疸好眠脾主四肢倦則好眠心為脾母心熱清則脾熱亦除煩

退熱止痛排膿破血催生行經下乳火不亢于內氣順血行故經調有準乳汁循常汗多者禁

寒水太 湯膀胱

用東垣曰肺受熱邪津液氣化之源絕則寒水漸流膀胱受濕熱癢閉約束則小便不通宜此治之朱二允曰火在上則口燥眼赤鼻乾在

本草 木通



通草古名

通脫木

輕通利

澤瀉

通利水

火

中則心煩嘔噦浮腫在下則淋秘足腫必藉此甘平之性瀉諸輕之火  
火退則小便自利便利則諸經火邪皆從小水而下降矣○君火宜木  
通相火宜澤瀉利  
水雖同所用各別  
滕有細孔兩頭皆通故通



治五淋水腫昆其龍薑囊葉首

淡通竅寒降  
火利肺氣

退熱催生



甘淡微鹹入膀胱利小便瀉腎經之火邪功崇利濕  
行水治消渴痰飲嘔吐瀉痢腫脹水痞脚氣疝痛淋  
瀝陰汗陰間尿血洩精既利水而又止洩精何也此  
有汗乃濕熱為病不為虛滑者言

也虛滑則當濕熱之病濕熱既除則清氣上行又能養五臟益氣起  
用補澁之藥

脾喜燥  
腎惡燥  
故煎補  
為難

車前草

通行水  
偶熱涼

令而清氣上行故本經列之上品云馳耳  
明目而六味九用之今人多以昏目疑之  
多服昏目虛故也眠中有水  
屬膀胱過利則水涸而火生仲景八味九用澤瀉寇宗奭謂其接引桂  
附入腎經李時珍曰非接引也乃取其瀉膀胱之邪氣也古人用補藥  
必兼瀉邪去則補藥得力一闢一闢此乃玄妙後人不知此理常一  
于補必致偏勝之患矣王履曰地黃山茱萸茯苓丹皮皆腎經藥桂附右  
腎命門之藥何待接引乎錢仲陽謂腎為直求有補庶瀉或云脾靈腎  
旺故瀉腎扶脾不知腎之真水不曰瀉瀉其伏留之邪耳易者云去將  
中留垢以其微鹹能瀉伏水故也昂按六味丸有熟地之溫丹皮之涼  
山藥之瀉茯苓之滲山茱之收澤瀉之瀉補腎而兼補脾有補而必有  
瀉相和相濟以成乎補之功乃平淡之神奇所以為古今不易之良方  
也即有加減或加紫河車一具或五味麥冬杜仲牛膝之類不過一二  
味極三四味而止今人或疑澤瀉之瀉而減之多揀本草補藥恣意加  
入有補無瀉且客倍于主責成不專而六味之功且退處于虛位失製  
乃配合之本旨矣此  
近世庸師之誤也

鹽水拌或酒浸用忌鐵

甘寒涼血去熱止吐衄消瘰癧明目通淋凡利水之劑多損于

目惟此能解肝與小腸之熱濕熱退  
而目清矣雷斅曰使藥勿使莖莖  
子甘寒清肺



本草通串 澤瀉 車前草

肝風熱滲膀胱濕熱利小便而不走氣與茯苓同功強陰養精令人有

子腎有二竅車前子能利水竅而固精竅精盛則有子五子衍宗丸用

之枸杞兔絲各八兩五味覆盆各四兩車前二兩蜜丸惜遺洩者車

前易蓮子時珍曰入服食須佐他藥如治濕痺五淋暑瀉痢歐陽文忠惠暴

六味丸之用澤瀉可也若單用則過泄

下國醫不能愈夫人云市有藥三文一貼甚效公不肯服夫人難他藥

進之一服而愈問其方乃車前子為末米飲下二錢七云此藥利水而

不動氣水道利則清

濁分谷藏自止矣

入滋補藥炒研

入利水泄瀉藥



甘淡而寒降心火心能清肺熱利小腸心與小腸相表裏心火清

則肺清小腸亦清

而熱從小便出矣

通氣止血治五淋水腫燒灰吹喉

痲塗乳止夜啼擦癩最良

縛成把擦摩極靈時至從草出浮水可見十餘次則

能斷

瞿麥

通利水  
破血



苦寒降心火利小腸逐膀胱邪熱為治淋要藥正散

用之五淋大抵皆屬濕熱熱淋者八正及山危滑石之類血淋宜小蓊牛膝膏腎虛淋宜補腎不可獨瀉老人氣虛者宜參水帶木通山桅亦有痰滯中焦皮作淋者宜行痰蕪通利藥最忌發汗汁之必使血破

血利竅決癰消腫明目去翳通經隨胎性利善下虛者慎用

寇宗奭曰心經雖有

熱而小腸虛者服之則心熱未清而小腸別作病矣

花大如錢紅白斑爛色甚嬌媚俗呼洛陽

花用蒞殼丹皮為使惡黠消產後淋當去血瞿變滿黃皆為要藥

扁黃石

扁竹通淋



苦平殺五疢利小便治黃疸熱淋吐咬腹痛虫蝕下

部煮葉細如竹莖蔓引促節有粉三月開紅花

天仙籐

苦溫疏氣活血治風勞腹痛妊娠水腫有天仙籐散治水腫

消腫  
通活血



葉似葛圓而小有白毛根有鬚四時不凋一去即青木香籐

本草綱目卷二 草 燈草 瞿麥 扁黃 天仙籐 十一

也膚

通利水  
補陰

石葦

通淋補  
勞



蚕砂惡蟻下消

甘苦氣寒益精強陰入膀胱除虛熱利小便而通淋  
 時珍曰無陰則陽無以化亦猶東垣利小便不通用  
 知栢滋腎之意王節齋曰小便不禁或頻數古方多  
 以為寒而用溫濕之藥殊不知屬熱者多益膀胱火  
 邪妄動水不得寧故不能禁而頻數也故老人多頻  
 數是膀胱血少陽火偏旺也治法當補膀胱陰血瀉火邪為主而佐以  
 收澁之劑如牡蠣山菜五味之類不可獨用病本屬熱故宜瀉火因水  
 不足故火動而致便數小便既多水益虛矣故宜  
 補血補血瀉火治其本也收之瀉之治其標也  
 治癩疔散惡瘡前湯  
 亦葉作浴湯去皮膚風熱丹腫洗眠除雀瞽澁痛 葉如葛葉赤字類

苦甘微寒清肺金以滋化源凡行水之藥必通膀胱  
 皆能先清肺火  
 而利水道益精氣補五勞利濕清熱之功高陽負對  
 黃帝治

去毛微取用杏仁滑石射干為使得葛蒲良生口瓦上者名瓦草治淋

海金沙

通淋渴  
濕熱



茵陳

通利濕  
熱治諸  
黃



加附子乾薑  
隨寒熱治之

香薷

宜通利  
濕清暑



甘寒淡滲除小腸膀胱血分濕熱治腫滿五淋莖痛  
得梔子牙硝蓬砂治傷寒熱狂大熱利小便比金  
底抽薪之義也  
莖細如線引竹木上葉紋皺處有砂葉赤色忌火  
苦燥濕寒勝熱入足太陽經膀胱發汗利水以泄太陰  
陽明之濕熱脾胃為治痘黃之君藥脾胃有濕熱則發黃者脾之色也  
熱甚者身如橘色汗如柏汁亦有寒濕發黃身黃黃  
而色暗大抵治以茵陳為主陽黃加大黃梔子陰黃  
又治傷寒時疾狂熱瘧瘧頭痛頭眩女人瘕疝皆濕熱為病

辛散皮膚之蒸熱溫解心腹之凝結屬水而主肺  
為清暑之主藥肺氣清則小便行而熱降暑必兼濕治暑必兼

本草要  
卷三  
草部  
香薷子  
石韋  
每合少  
直東  
石韋  
上

身寒寒  
字當熱  
字看傷  
寒必病  
熱  
青蒿  
瀉熱補  
勞



利濕若無濕但治嘔逆水腫熱膏服小脚氣只氣煎湯  
 為乾熱非暑也便利則消脚氣只氣煎湯  
 筋時珍曰暑有乘涼飲冷致陽氣為陰邪所遏反中入內遂病頭昏發  
 熱惡寒煩躁口渴瀉霍亂宜用之以發越陽氣散邪和脾則愈暑  
 飲食不節勞役作喪之人傷暑大熱大渴汗山如雨煩躁喘促或瀉之  
 吐者乃內傷之病宜用清暑益氣湯人參白虎湯之類以瀉火益元可  
 也若用香需是重虛其表而濟之熱矣蓋香需乃夏月解表之藥如冬  
 月之用曆黃氣虛者尤不宜多服令人謂能解暑藥用代茶誤矣李士  
 材曰香需為夏月發汗之藥其性溫熱只宜于中暑之人若中熱者誤  
 服之反成大害世所未知按潔古云中暑為陰症為不足中熱為陽症  
 為有餘經曰氣盛身寒得之傷寒氣虛身  
 熱得之傷暑故中暑溫散中熱宜清涼  
 陳者勝宜冷飲熱  
 服令人瀉

苦寒得春少陽之令最早二月  
 生苗故入少陽厥陰血

分胆治骨蒸熱  
 取汁熬膏  
 葶藶虛熱凡苦寒之藥  
 多傷胃魚惟

青蒿芬香入脾獨宜于血虛  
 有熱之人以其不犯胃氣也  
 風毒熱黃久瘧久痢癰

木香... 時珍曰月令通纂言伏內庚曰采蒿懸門延可辟邪

附子

大藥回

陽補腎

命火逐

風寒濕

八八味

九內亦

從地黃

等補陰

當翹韭  
汗牛乳

也 補中明目

童便... 勿使華使根勿使並



辛甘有毒大熱純陽其性浮而不沉其用走而不守  
通行十二經無所不至能引補氣藥以復散失之元  
陽引補血藥以滋不足之真陰引發散藥開腠理以

逐在表之風寒

同乾薑桂枝溫經散寒發汗

引溫燥藥達下焦以祛在裏之寒濕

火下行亦有津調貼足心者

治三陰傷寒

吳緩曰附子陰症要藥凡傷寒傳變三陰中寒夾陰身雖大熱而脉沉細者或厥冷

腹痛甚則唇青囊縮者身須用之若待陰極陽竭而用之已遲矣東垣治陰盛格陽傷寒面赤曰赤煩溫引飲脈七八至但按之則散用薑附

湯加入參救半片得汗而愈此神聖之妙也

中寒中風

卒中曰中漸傷曰傷輕為感氣厥痰

厥虛寒而厥者宜之如傷寒陽盛格陰身冷脉咳逆風厥胃膈

多由氣血虛胃冷胃穢而成飲可下而食不可下稿在吸門喉間之厥會史良下胃脘痛須臾出稿在賁門胃之上口也此上焦名噎食下



良久吐出稿在幽門胃之下口也此中焦名膈朝食暮吐稿在關門大  
小腸下口也此下焦名反胃又有痰飲食積痰血壅塞胃口者如寒痰  
胃冷則宜薑附參木胃熱者當滋脾泄命火冷痢寒瀉霍亂轉筋脾虛  
潤宜四物牛羊乳血瘀者加韭汁月泄不足冷痢寒瀉霍亂轉筋脾虛  
中焦為霍亂寒客下焦肝拘攣風痺癥瘕積聚督脈為病脊強而厥小  
腎為轉筋熱霍亂者禁煎拘攣風痺癥瘕積聚督脈為病脊強而厥小  
兒慢驚痘疹炭白瘰癧一切沉寒痼冷之症經曰陰盛生內寒陽盛生外寒助陽

退陰殺邪辟鬼

本草 經隨胎凡陰症用薑附藥宜冷服熱因寒用也  
未載 按陰寒在下虛陽上浮治之以寒則陰

益甚治之以熱則拒格不納用熱藥冷飲下隘之後冷體既消熱性便  
發情且不違而致火益此反治之妙也又有寒藥熱飲治熱症者此寒  
因熱用義亦相同也經曰正者正治反者反治如用寒治熱用熱治寒  
此正治也或以寒治寒以熱治熱此反治也經所謂必伏其所主而先  
其所因蓋借寒藥熱藥為反佐以作向導也亦曰從治王好古曰用附  
子以補火必防涸水如陰虛之人久服補陽之藥則虛陽益熾真陰愈  
耗精血日枯而氣無所附麗遂成不救者多矣

母為烏頭附生者為附子連生者為側子細

長者為天雄兩歧者為烏喙五物同出異名附子以西川彭明赤水產

著柳最皮黑龍圓底平八角重一兩以上者良或云二兩者更勝然難得生用發散

熟用峻補趙嗣真曰仲景麻黃附子細辛湯熟附配麻黃發中有補四

景八味丸用為少陰嚮遺後世因以為補藥誤矣附子走而不守取其

健得走下以行地黃之滯耳相習用為風藥及補藥殺人多矣昂按附

子味甘氣熱峻補元陽陽微欲絕者回生起死非此不為功故仲景四

逆真武白通諸湯多用之其有功于生民甚大况古人日用常方用之

最多本非禁劑丹溪乃僅以為行經之藥而去用作補藥多致殺人言

亦過矣益丹溪法重滋陰故每嘗陽蒸亦其偏也王節齋曰氣虛用四

君子湯血虛用四物湯虛甚者俱宜加熟附蓋四君四物皆和平寬緩

之劑須得附子健悍之性行之方能成功附子熱藥不可輕用但當

病則雖暑熱時水浸麩裏煨令發折乘熱切片炒黃去火毒用又法甘

草二錢隨求薑洋薑便冬生薑著熟用畏人參黃耆甘草防風犀角綠

豆童便反貝母半夏栝蠆膏及白斂中其毒者黃連犀角甘草煎湯解

之黃土水亦可解烏頭功同附子而稍緩附子性重峻溫脾逐寒烏

今人用  
黑豆煮  
亦佳

頭性輕疎溫脾逐風寒疾宜附子風疾宜烏頭 烏附尖吐風痰治癩

癩取其鋒銳直達病所 丹溪治許白雲屢用瓜蒂梔子苦參菘薑等劑吐之不透後用附子尖和漿水與之始得大吐

膠漆 數補 天雄補下焦命門陽虛 寇宗奭張元素皆云補上焦丹溪曰可為下部之位時珍曰其尖皆向下生故

下行然補下乃所以益上也若上焦陽虛則屬心肺之分當用參耆不當用雄附矣 治風寒濕痺為風家主藥

汗又能止陰汗 側子散側旁生宜于發散四肢充達皮毛治手足風

濕諸痺

草烏頭 大燥開 頑痰



狀見無元

辛苦大熱搜風勝濕開頑痰治頑瘡以毒攻毒勝川烏欲至毒無所釀制不可輕投 野生莢類川烏亦名烏喙薑澤妙或黑腐者用然膏有射罔傳射

白附子

燥祛風

濕治面

疾

破故紙

一名補

骨脂

燥補命

火



辛甘有毒大熱純陽陽明經藥能引藥勢上行治面

上百病

陽明之脈營于面白附能去頭面遊風作面脂消班疵

補肝虛祛風痰

治心痛血痺諸風冷氣中風失音陰下濕癢 根如

草烏之小者長寸許皺紋者節炮用

陶弘景曰此藥久絕無復真者今惟涼州生

辛苦大濕入心包命門補相火以通君火煖丹田壯

元陽縮小便

亦治瀉尿

治五勞七傷 五藏之勞要脊冷痛七情之傷

腎冷精流腎虛泄瀉 腎虛則命門火衰不能薰蒸脾胃脾虛寒運于運化致飲食

減少腹脹腸鳴嘔涎泄瀉如鼎釜之下無火物終不熟故補命門相火

即所以補脾破故紙四兩五味三兩肉苁二兩吳茱一兩薑者棗丸名

四神丸治婦人血氣 婦人之血脫氣陷亦猶男子之腎冷精流 墮胎 出南番者色赤嶺南

者色綠酒浸蒸用亦有重復乳浸鹽水炒者得胡桃胡麻良惡甘草 唐

芸薹油  
菜也

肉蓯蓉  
補腎命  
滑腸

瑣陽  
補陽

相國方破故紙十兩酒浸蒸為末胡桃肉二十兩去皮爛研蜜和每日酒調一匙或水調服自飛霞曰故紙屬火堅固元陽胡桃屬木潤燥養血有木火相生之妙忌芸薹羊血加杜仲名青娥丸



一宿刷去浮甲劈破除內筋膜酒蒸坐白又酥炙用忌鐵補恭曰今人所用多草莖  
管功力  
稍劣



甘酸鹹温入腎經血分補命門相火滋潤五藏益體

強筋治五勞七傷絕陽不興絕陰不產腰膝冷痛崩

帶遺精峻補精血時珍曰補而不峻驟用恐妨心滑

大便長大如臂重至斤許有松子鱗甲者良酒浸

甘温補陰益精與陽潤燥養筋強筋故能與陽治痿弱滑大  
揚便燥者啖之可代  
鱗甲櫛比狀類魚腸酥炙

巴戟天  
補腎祛風

胡蘆巴

燥補腎  
命陰寒濕

仙茅

燥補腎  
命



也蜀產佳

出崔根似巴戟但色白人或醋者以乱之

去心酒浸焙用覆盆子為使惡丹參



若溫純陽入右腎命門煖丹田壯元陽治腎藏虛冷  
陽氣不能歸元同附子 硫黃 痲疝冷氣同茴香巴戟川寒 烏川棟吳茱萸

濕脚氣

出嶺南番舶者良云是番蒸服子酒浸暴或蒸或炒



辛執有小毒助命火益陽道明耳目補虛勞治失溺  
無子心腹冷氣不能食溫 胃腰脚冷痺不能行煖筋相  
火盛者忌服 葉如茅而畧潤根如小指黃白多涎

淫生藎  
補腎命

蛇床子  
補腎命  
去風濕

竹刀去皮切糯米泔浸去赤汁出毒用忌鐵唐坡羅門始進此方當時

苑密丸酒服禁食牛乳牛肉許真君書云甘能養肉辛能養骨即  
苦能養氣鹹能養骨酸能養筋滑能養膚和苦酒服之必効也

辛香甘温入肝腎補命門時珍曰手足陽益精氣堅

筋骨利小便治絕陽不與絕陰不產冷風勞氣四肢

不仁手足麻木一名仙靈脾北部有羊一日百合食此

藎所致故名去枝羊脂拌炒山藥為使得酒良



辛苦而温強陽益陰補腎散寒祛風燥濕治陰痿囊

濕女子陰痛陰癢濕生再同子藏虛寒薺門不閉熱少

之腎命之病及腰酸體痺帶胎肛喉痺齒痛濕癩

惡瘡殺虫風濕者病前湯浴止風養時珍曰腎命三焦氣分之藥不獨

此而才補強子遠垣  
豈非貴耳賤目乎

### 丹皮負母巴豆

仙小苗而細微炒殺毒則不辣以地黃汁拌  
蒸三遍佳

### 兔絲子

平補三陰



甘辛和平凝正陽之氣入足三陰脾肝腎強陰益精溫

而不燥不助相火治五勞七傷精寒淋瀝口苦燥渴

脾虛腎燥而生內熱祛風明目補衛氣助筋脉益氣力

昂按此人或感

### 肥健人

補肝腎之効者學痛筆記予疾弟少服兔絲子凡數年飲食倍

他毒未可盡歸

開飲至數斤腫悉消兔絲過服尚能無根蔓延草上子黃如黍粒得酒

外子兔絲也

良淘去泥沙酒浸一宿異乾搗大山藥為使

### 覆盆子

平補肝腎



甘酸微溫益氣藏而固精補肝虛而明目起陽痿縮

小便冠氏曰服之當澤肌膚烏髭髮相汁塗女子多

本草淫羊藿蛇床子兔絲子覆盆子十二



孕同室為膏治肺氣虛寒李士材曰粥腎無燥熱之偏固精無凝滯之害三五之品也狀如覆盆

故名去蒂淘淨搗餅用時酒拌蒸等淨摘目中出目弦重除膚赤

收濕止淚

疾藜子  
平補肝  
腎



苦溫補腎辛溫瀉熱氣而散肝風益精明目肝以散為補反

補肝葉皆能明目治虛勞痛遺精夢咳逆肺痿乳閉癥瘕痔漏陰瘡音積腎敗肺三經之病催生墮胎刺疾藜去惡血

故能破癥下胎

沙苑藜藜綠色似腎故補腎炒用亦可代茶刺疾藜三角有刺去刺

酒拌蒸風家宜刺疾藜補腎則少死者為優餘功瑞竹掌力齒牙打動者疾黎根燒灰傳之膏

使君

補脾殺  
虫消積



甘溫健脾胃除虛執殺藏薯治五疳使濁瀉痢瘡癪

為小兒諸病要藥經疏曰五疳便濁瀉痢腹虫皆由脾胃虛弱因而

芩芩

燥脾胃  
補心腎

砂仁  
即縮

砂仁  
宣行氣

塞而成脾胃健則積滯消濕熱散水道利而前症盡除外時珍曰此能殺虫之藥多是苦辛獨使君子在于甘而殺虫每月上旬虫頭向上中旬頭橫下旬向下道藏云初一至初五虫頭向上凡有虫病者每月上旬空心食散枚虫皆死而出也

出閩蜀五辨

穠肉仁如榧可煨食久則油黑不可用忌飲熱茶犯之作瀉



辛熱本脾藥兼心腎主君相二火補心氣命門三焦之不足心為脾之母補火故能生土能清精固氣本草未載又能開發鬱結使氣宣吐味辛能散溫中進食攝涎唾胃冷則涎湧縮小便

便腎與膀胱相表裏益智辛溫回腎鹽木炒同烏藥等分酒煮山藥糊丸臨晉多下名縮泉丸治嘔吐泄瀉客寒犯胃冷氣腹痛崩帶泄精清精固氣山熱而崩漏者亦用出嶺南形如棗核用仁



辛溫香竄補血益腎和胃醒脾快氣調中通行結滯治腹痛痞脹痞滿有傷寒下早裏虛邪入而痞者有良藥瘞塞而痞者有嘔虛氣弱而痞者

本草綱目卷之二十一 砂仁

須分虛實治之不宜用利藥恐變為鼓脹鼓脹內脹而外有形痞脹惟噎膈而巳皆太陰為病也 噎膈嘔吐去氣咳

嗽赤白瀉痢 濕熱積滯 霍亂轉筋奔豚崩帶祛痰逐冷消食

醒酒止痛安胎 氣行則痛 散咽喉口齒浮熱化銅鐵骨哽 王好古曰得檀香豆

寇入肺得人參益智入肺得黃芩茯苓入腎得赤石脂入大小腸翳通 曰辛能潤腎燥引諸藥歸宿丹田地黃用之拌蒸亦取其能達下也經

疏曰腎虛氣不歸元用為 嚮道茹勝桂附執藥為靈 出嶺南研用

白菴藪

宣行氣 煖胃



辛熱流行三焦溫暖脾胃 三焦利脾胃轉 而為肺家

本藥 肺主 散泄氣消酒積除寒燥濕化食寬膨治脾

虛癯疾感寒腹痛吐逆反胃 肺胃火盛及 白睛翳膜

白精屬肺 能散肺帶 太陰經目皆狂筋 太陽脉 番舶者良研

細用

茵苳

一名肉

菓  
燥脾瀆  
腸

草薺

一名草

燥濕法

寒除痰

截瘧



草薺外有皺紋內有斑紋糯米粉裏煨熟用忌鐵



辛熱香散煖胃健脾破氣開鬱燥濕祛寒除痰化食

治瘴癘寒瘧佐常山能截瘧或與知母同用取其一

勝之藥知母治陰一陽治寒熱瘴癘蓋草薺治太陰獨寒客胃痛散滯氣利膈痰因霍亂瀉

痢噎膈反胃痞滿吐酸痰飲積聚解胃氣酒毒魚肉毒故食料過劑

助脾熱耗氣損目 閩產名草薺如龍眠而微長皮黃白薄而稜峭仁

如砂仁而辛香氣和瀉廣所產名草薺如詞了皮黑厚而稜密子粗而

本草綱目卷二 草 白草薺 茵苳 草薺 廿九

香附名一

莎草根

宣調氣

開鬱

素問中

仍有寒

則氣收

熱則氣

泄名凡

氣

故古人

治瀉多

用五香

連到飲

辛真雖是一物微有不同麪裏稔熟取仁用忌鐵

性平氣香味辛能散微苦能降微甘能和乃血中氣

藥通行十二經八脉氣分生一切氣人身以氣為主

衰順則平逆則病絕則死矣經曰怒則氣上恐則氣

下喜則氣緩悲則氣消驚則氣亂思則氣結勞則氣

耗此七情之氣也以香附為利君隨症而加升降消補之藥

血鬱濕 鬱食鬱 止諸痛通則

多怒多憂痰飲痞滿胸腫腹脹飲食積聚霍亂

吐瀉腎氣脚氣癰疽瘡瘍血疑氣滯所致香附一味末服名獨勝丸治

亦宜服之大凡瘡疽疔毒服香葉行氣通血最忌臭穢不潔觸之康祖左

乳病癰又臆間生核痛楚半載遠張王夢授以方薑汁製香附為末每

服二錢米吐血便血崩中帶片候不調氣為血配血因氣行經成塊



本草綱目卷之九

九

引血適至氣分而生血此正陽生陰長之義凡產百病能推陳致新古

諸書皆云益氣行中有補丹溪曰天行健運不息所以生生無窮即此理耳時珍曰凡人病則氣滯而餒香附為氣分君藥臣

以參耆佐以甘草治虛怯甚速也

以參耆佐以甘草

去毛用生則上行胸膈外達皮膚熟則下走肝腎

旁徹腰膝童便浸炒則入血分而補虛鹽水浸炒則入血分而潤燥

炒水青鹽炒則補腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚且斂其散薑鼻炒

則化痰飲炒黑又能止血鐵時珍曰得參木則補氣待歸地則補血得木香則散滯和中得檀香則理氣醒

脾得沉香則升降諸氣得芎藭蒼朮則總解諸鬱得梔子黃連則清降火熱得決神則交濟心腎得茴香破故紙則引氣歸元得厚朴半夏則

決壅消脹得紫蘘慈白則發汗散邪得三稜莪朮則消積疔塊得艾葉則治血氣煖子宮乃氣病之總司女科之仙藥也大抵婦人多鬱氣行

則鬱解故服之尤効非宜于婦人不宜于男子也李士材曰乃治標之劑惟氣實血未大虛者宜之不然恐損氣而燥血愈致其疾矣世俗泥

于女科仙藥之一語惜未有發明及此者

木香 冥行氣



辛苦而溫三焦氣分之藥能升降諸氣泄肺氣疏肝

氣和脾氣

怒則肝無上肺氣調則金能制木而肝平木不尅土而脾和

治一切氣

痛九種心痛

痛屬胃脘曰寒痛熱痛氣痛血痛濕痛痰痛食痛虻痛痺痛益君心不易受邪

真心痛者手足冷過腕節朝發夕死

嘔逆反胃霍亂瀉痢後重

同擯榔用劉河間曰痢疾行血則膿血自愈調氣則

後重自除瘴閉痰壅氣結疝癥塊腫毒蟲毒衝脉為病氣逆真為殺鬼物

禦瘴蠱去痰臭實天腹消食安胎

氣逆則胎不安

過服損真氣

丹溪曰味辛氣升若陰火衝上

者反助火邪當用黃柏知母少以木香佐之王好古曰本草主氣劣氣不足補也通雍道氣破也安胎健脾胃補也除痰癥瘕塊破也非同如此溼悅曰與補藥為佐則補與瀉藥為君則瀉時珍曰諸氣積鬱皆屬于肺上焦氣滯用之者金鬱泄之也中氣不運皆屬于脾中焦氣滯用之者脾胃喜芳香也大腸氣滯則後重膀胱氣不化則癃閉肝氣鬱則為痛下焦氣滯用之者寒者通之也

番舶上來形

如粘骨味苦粘舌者良名青木香

今所用者皆廣磨汗用東垣用黃連

藿香

宜去惡氣

茴香古作

煖香燥補腎命治寒疝

製亦有蒸用麩裏瀉用者腸用實畏火



辛甘微温入手足大陰肺脾快氣和中開胃止嘔胃弱

而嘔者忌用去惡氣進飲食治霍亂吐瀉心腹絞痛肺虛

有寒上焦壅熱能理脾肺之氣古方有藿香正氣散正氣通暢則邪逆自除出

交廣方括有節葉微似茄葉古惟用葉今枝莖亦用之因葉多偽也



大茴辛熱入腎膀胱煖丹中補命門開胃下食調中

止嘔療小腸冷氣癩疔陰腫疔有七種氣血寒水筋脈

經以厥陰肝脈絡陰器也多因寒濕所孤癩也肝經病不屬腎致亦有挾虛者當加參木于濕散藥中乾濕脚氣多

食損自發瘡小茴辛平理氣開胃亦治寒疝食料宜之 大如麥粒輕

而有細稜者名大茴山薑夏他處亦者名小茴自番舶來實八瓣者名

本草 藿香 茴香



八角茴香炒黃用得酒良得鹽則入腎發腎邪故治陰疝受病于肝見症于腎大小

茴各一兩為末猪肝一箇  
運尿入藥酒煮爛為丸服

甘松香

宜理氣  
醒脾



甘松芳香理諸氣開脾鬱治腹卒滿痛風疝齒齲脚  
膝氣浮煎湯淋洗出涼州及黔蜀葉如茅根極繁密用根

柰

宜溫中  
辟惡



辛溫煖中辟惡治心腹冷痛寒濕霍亂風虫牙痛  
生廣中根葉皆如生薑入合諸香用

良薑

宜煖煖  
胃散寒



辛熱煖胃散寒消食醒酒治胃皖冷痛凡心口一點痛俗言心氣  
薑酒洗七次香附醋洗七次焙研因寒者薑二錢附

一錢因怒者附二錢薑一錢寒怒兼者每錢半米飲加薑汗一匙鹽  
少許服初梁組患心脾痛夢神授此方二味等分服後入各炒分用

亂瀉痢吐惡噎膈痞瘧人癖肺胃執者忌之  
出嶺南高州子名紅薑

蕞菜作

撥

燥除胃

冷散浮

熱

烟草新

宜行氣

辟寒

蕞菜溫肺散寒醒脾燥濕消食解酒中常用之 煎藥鹽土炒用



辛熱除胃冷温中下氣消食祛痰治水瀉氣痢牛乳點服

虛冷腸鳴亦入大腸經 冷痰惡心嘔吐酸水痞瘕陰燥

散陽明之浮熱治頭痛偏頭痛者口含湯水隨左右吹一字入鼻効 牙

痛寒痛宜乾薑蕞菜細辛熱痛宜石膏牙疳風 鼻淵多服泄真氣動脾

肺之火損目 出南番嶺南亦有類椹子而長青色去挺用頭醋浸刮

淨皮粟免傷人肺



辛温有毒治風寒濕痺滯氣癰痰出風瘡露其氣入

口不循常度頃刻而周一身令人通體俱快醒能使

醉醉能使醒飢能使飽飽能使飢人以代酒代茗終

本草甘松香山奈良薑蕞菜烟草三

身不厭故一名相思草然火氣薰灼耗血損年人自不覺耳 閩產者佳

能解蛇毒

### 金銀花

馮執解毒



甘寒入肺散熱解毒清熱即補虛凡物甘是解毒者皆補療風養血

止渴丹溪曰癰疽安後發渴黃耆六一湯吞忍冬丸切當忍冬養血黃耆補氣渴何由作治癰

疽疥癬楊梅惡瘡腸癖血痢五種戶症 經冬不凋一名忍冬又名左纏藤

花葉同功花香尤佳釀酒代茶熬膏忍冬酒治癰疽發背一切惡毒初起便服奇效乾者亦可

不及生者力速忍冬五兩甘草一兩水二碗煎至一碗再入酒一碗畧煎分三服一日一夜吃盡重者日二劑服至大小腸通利則藥力到忍冬丸照煎分兩酒煮晒乾同甘草為末以所煮餘酒打糊為丸陳藏器云熱毒血痢濃煎服之為末糖調常服能稀痘

### 蒲公英

一名黃花也下



甘平花黃屬土入太陰陽明脾胃化熱毒解食毒消腫

核常治乳癰乳頭屬厥陰乳房屬陽明同疔毒赤痢

毒

紫花地

丁

馮熱解

毒

杜牛膝

一名天

名精

一名地

松

通淋妙品  
林試之甚驗  
牙痛長髮  
腎東垣曰苦寒腎經君藥  
白汁

塗惡刺  
凡蠅螂諸毒盛處  
字有游諸物上必遺精汁乾久則有毒入手  
觸之成疾名狐尿刺  
疼痛不眠百療難效  
取汁厚塗即愈千金

方極言  
其功  
葉如萬葉花如單瓣菊  
花四時有  
花化罷飛絮斷  
葉中有

白汁  
鄭方升曰一莖兩花  
高尺許者掘下數尺根大  
如拳旁有人形拱抱  
搗汁酒服治隔噎如神



辛苦而寒治癰疽發背疔腫癩癧無名腫毒  
葉如

柳而細夏開紫花結角生平地者起莖生溝壑者起

蔓

甘寒微毒能破血  
一婦產後口渴氣喘面赤有斑太  
便泄小便秘用行血利水藥不效

用牛膝濃煎膏飲下  
血一桶小便利通而愈  
能止血吐痰除熱解毒殺蟲

乳蛾喉痺砂淋血淋  
良方云濃煎加小兒牙關緊閉急慢驚風  
乳癰亦許神效  
一名地

本草綱目卷二 草 金銀花蒲公英紫花地丁杜牛膝三三

瀉熱吐  
痰破血  
解毒

鴉虱

瀉殺蟲

出豈根

瀉熱解  
毒

豈

汁入好酒灌之即醒  
服十吐瘡痰馬風服之亦  
以醋拌渣傳項下  
取其吐痰  
重釐毒根白如短牛膝地黃為使前湯洗痔渣  
寒患處良  
漱汁止牙痛搗之傳



豈經冬不凋

苦辛有小毒殺五藏虫治蛇螫腹痛  
肥肉汁  
調末服  
沈存中筆記云是杜牛膝子或曰非也  
粘人衣有狐氣炒熟則香  
別是一種最

苦寒瀉心火以保金氣去肺大腸之風熱心火降則  
金清肺與大腸相表裏  
肺金清則大腸亦清  
消腫止痛治喉爛喉風腫  
齒痛含之喘滿熱咳腹痛下痢五疳諸瘡解諸毒  
傳禿瘡蛇狗蜘蛛傷療人馬急黃血熱極  
萬莫如

牛薺子

一名鼠

粘子

一名惡

實

瀉熱解

毒

山慈菘

瀉熱解

毒

瀉熱解

瀉熱解

毒



辛平潤肺解熱散結除風利咽膈理痰嗽消斑疹利  
二便行十二經散諸腫瘡瘍之毒利腰膝凝滯之氣  
性冷而滑利痘症  
虛寒泄瀉者忌服  
實如蒲萄而褐色酒拌蒸待有

霜拭去用根切肉反出寒竹刀刮淨絞汁蜜和服治中風汗出乃愈搗和猪脂  
貼瘡腫及反花瘡如花狀



甘微辛有小毒功出清熱散結治癰瘡疔腫癩癧結

核醋磨解諸毒蛇虫狂大傷根與慈菘小慈

相類去毛殼用王樞丹中用之廣筆記云出處州遂  
昌縣洪山無毛少直者有毛換也

鹹軟堅苦下泄寒勝熱入胃大腸通肺小腸散熱解

毒通經下乳排膿止血生肌殺虫治遺精尿血難



貫衆

瀉熱解毒



發背古方以漏盧湯為稱首及預解時行瘧疾毒取其寒勝熱又能入陽明故也出閩中莖如油麻枯黑潔者真甘草拌蒸連翹為使

味苦微寒有毒而能解邪熱之毒治崩中帶下產後

血氣脹痛破癥瘕發斑痘王海藏快斑散用之化骨哽能軟殺

三五根似狗脊而大汁能制三黃化五痰鍾乳

結砂制永解毒軟堅以此浸水缸中日飲其水能辟時瘧

射干 瀉火解毒散血 消痰



苦寒有毒能瀉實火降則血散腫消而痰結自解

故能消心脾老血行太陰厥陰之積痰肺脾治喉痺

咽痛為要藥搗汁醋和搗之引涎干消結核癥疔便

毒慮母救急中煎九治瘡母用之通經明利大腸鎮肝明目 屬花根

續隨子

一名干

金子

瀉行水

破血解

毒

馬蘭草

一名蠶

實

瀉濕熱

解毒

蓖麻子

瀉通竅

振毒出

也 藥橫鋪如鳥平及崩 故一名鳥崩鳥望 泔水浸一日 簞竹葉煮半日用



葦葉相似圭燎亦相 似長于 利水用之得法皆要藥也



辛 濕有毒行水破血治癥瘕痰飲冷氣脹滿蠱毒鬼

疰 利大小腸下惡滯物塗疥癬瘡 王樞丹用之治百 病多効經疏曰乃

以毒治 毒之功 去殼取色白者厭去油用 時珍曰續隨與 大戟澤漆甘遂

甘平治寒疝喉痺癰腫瘰癧婦人血氣煩悶血運崩

帶利大小腸久服令人瀉 叢生葉似薤而長厚結

角子如麻大赤色有稜少用治疝用醋拌根葉同功

辛甘有毒性善收亦善走能開通諸竅經絡治偏風

不遂喎邪 搗餅左貼右 口噤鼻窒耳聾 搗爛綿裹塞耳塞鼻

本草綱目卷之五 續隨子 馬蘭子 蓖麻子 三五



有形帶物

痺舌脹

油作紙擦烟薰

能利水氣治水癥浮腫

壯人只可五粒

能出有形滯

物治針刺入肉

搗軟傷處頻看刺出即去藥恐發出好肉

竹木膏

鹿麻子一兩凝水石二兩研勻以一稔置舌根

噙嚙自

胞胎不下

昆麻二粒巴豆一粒麝香一分貼臍中併足心胎下即去之若子腸挺出者搗膏塗頂心即收

膿拔毒傳癰癰惡

鴉鵂油能引毒氣入內燕麻油能拔病氣出外故諸毒多用之然

有毒熱氣味頗近口

豆內服不可輕率一粒至三四粒治大風疥癩

形如牛蝗黃褐有

斑鹽水煮去皮研或油

忌鐵食蓖麻一生不得食炒豆犯之脹死

白頭翁

苦堅腎寒涼血入陽明

胃大腸治熱毒血痢

瀉熱涼血



痢有白頭翁湯合黃連黃栢秦皮東垣曰腎欲堅急食苦以堅之痢則下焦盡故以純苦之劑堅之

瀘寒熱齒痛骨痛

腎主齒骨

鼻衄禿瘡癰癰惡血

痔偏墜

搗傅

明目消疔

有風反靜無風則搖近根處有白毒

本草綱目卷之...

三五

王瓜  
上日

瓜根  
濕熱利  
水行血

王不留

行  
通行血

冬葵子

滑腸利  
敷



治畧似栝蘆傷寒發斑用王  
瓜搗汁和伏龍用未服甚効



木刺孕婦受



苦寒濕熱利水治天行熱疾黃疸消渴便數

下月閉瘀血利大小腸排膿消腫下乳通乳藥多用之單服亦可

隋胎 根如栝蘆之小者味如山藥根子經疏曰主

其苦而平其性行而不住能走血分通血脉乃陽明

衝任之藥陽明多氣多血除風去痺止血定痛通經利便下

乳催生俗云穿山甲王不留婦人服之乳長流治金瘡止血癰瘡散出竹

花如鈴鐸實如燈籠子殼五稜取苗子蒸漿水浸用

甘寒滋滑潤燥利竅通經衛氣脈行津液利二便

消水腫用榆皮等分煎服通關格下乳滑胎 秋葵復通經

本草綱目 卷一 瓜 王不留行 冬葵子 三十一

冬至春作子者名冬葵子根葉同功春葵子亦滑不堪入藥 蜀葵花  
 赤者治赤帶白者治白帶赤者治血燥白者治氣燥亦治血淋關節皆  
 取其寒潤滑利之功也

白鮮皮  
通祛風  
 濕



氣寒善行味苦性燥行水故燥入脾胃除濕熱兼入膀胱  
 小腸行水道通關節利九竅為諸黃風痺之要藥味  
 白鮮皮湯治產後風時珍世醫止施之瘡科淺矣兼治風瘡疥癬女子陰中  
 腫痛濕熱乘虛客腎與膀胱所致 根黃白而心實取皮用惡葉

葶藶  
通祛風  
 濕



蠅蚶桔梗扶苓葶藶  
 甘苦性平入足陽明厥陰胃肝祛風去濕以固下焦陽  
 主肉屬濕厥補肝虛祛風堅筋骨風濕去則左精明目  
陰主筋屬風

腎有二  
數淋症  
出于溺  
數濁症  
出于精  
竅

土茯苓  
通祛濕  
熱補脾  
胃

治風寒濕痺腰痛久冷關節老血膀胱宿水陰痿失溺甚痛遺濁痔瘻

惡瘡 諸病皆陽明熱流入下焦草解能除濁分清古方有草解分清

方云凡人小便頻數便時痛不可忍者此疾必因大腑秘熱不通水液

只就小腸大腑愈加乾渴甚則身熱心躁患水即重症也此疾本因貪

酒色或過食辛熱薰臍之物積有熱毒腐物瘀血乘虛流入小腸故便

時作痛也比便數而痛與淋症瀉而痛不同宜用草解一兩塩水炒為

末每服二三錢使水道轉入大腸仍以葱湯 有黃白二種黃長鞭音

頻洗穀道令氣得通則便數及痛自減也

白虛軟軟者良薑以爲使畏天黃柴胡前胡芫荽醋 時珍曰草解莖葉

主治不甚相遠豈一類數種子草

解根細長淺白莖葉根作塊赤黃

甘淡而平陽明主藥 胃大腸 健脾胃祛風濕脾胃健則

營衛從風濕除則筋骨利利小便止瀉泄治筋骨拘

攣楊梅瘡毒 楊梅瘡古方不載明正德間起于嶺表

其症多屬陽明厥陰而兼及他經甚相



白斂  
濕火散  
結



火寄于燄陰肌肉属于陽明故也醫用輕粉劫劑其性燥烈入陽明劫去痰涎從口齒出瘡即乾愈然毒氣竄入經絡筋骨血液枯槁筋失所養變為拘攣癰漏竟致廢疽土茯苓能制輕粉之毒去陽明濕熱用一兩為君以仁金銀花防風木通木瓜白鮮皮各五分皂角子四分氣虛加人參七分血虛加當歸七分名搜風解毒湯 瘰癧瘡腫 濕鬱而為熱營衛不和則生瘡腫經淡能滲甘能補患膿 疥者煎湯代茶甚妙 大如鴨子連綴而生俗名冷飯團有赤白二種白者良可煮食亦可生啖是茶

苦能泄辛能散甘能緩寒能除熱殺火毒散結氣壅肌止痛治瘡疽瘡腫面上疔瘡金瘡撲損箭鏃不出者同丹皮或半夏為斂瘡方多同之 改名每與茶凍耳同黃柏末酒服 白及相須搽末油調

蔓赤枝有五葉根如卵而長三五枚同窠皮烏肉白一種赤斂功用

皆同 鄭真一曰能治溫瘧血痢腸風痔瘻亦白帶下

預知子

補勞瀉  
熱

是蓮草

一名鱧

腸又名

金陵草

補腎

劉寄奴

草

瀉破血

止血



苦寒和五安之傷治瘧氣塊天行溫疾蛇虫咬毒

殺虫療毒綴衣領中凡遇蠱毒則聞其聲而須知之故名利便催生 藤生

子如皂莢褐色光潤出蜀中云亦難得

甘鹹汁黑補腎止血黑髮烏髭千金云當及時多收其効甚速經疏云性

涼不益脾胃破于金方

金陵煎丸用薑汁和劑

有汁須更而黑熬膏良

苦溫破血通經除微下脹止金瘡血多服令人吐利

一莖直上葉尖長糙澁花白蕊黃如小菊花有白

絮如苦曹絮子細長亦似苦曹草莖葉花子皆可用

劉裕小字寄奴微時金射一蛇明日見童子林中搗藥問之答曰吾王為劉寄奴所傷今換數之裕曰王何不殺之童曰寄奴王者不可殺也

本草綱目卷之二十一 草部白微預知子早蓮草寄奴草三十一

馬鞭草

瀉破血  
熱脹殺  
虫

穀精草

輕明目

青葙子

一名草  
决明

此之不見乃收藥回  
每遇金瘡傳之立愈



精煮熟食之  
或作丸茶下



味苦微寒入厥陰肝祛風熱鎮肝明目治青盲障翳

腫毒 壅陷甚多方莖葉似益母對生夏秋開細葉

花穗如車前草類澤蒿而細根白而小用苗葉

辛溫輕浮上行陽明胃蕪入厥陰肝明目退翳之功

在菊花之上亦治喉痺齒痛陽明風熱收穀後荒

田中生葉似嫩秧花如日星 小兒雀盲者搗羊肝一  
具不洗竹刀割開入穀

味苦微寒入厥陰肝祛風熱鎮肝明目治青盲障翳

虫疥惡瘡腫毒散大者忌服 能動 類雞冠而穩安

瀉肝明目

決明子

瀉肝明目


宜溫中

馬勃

輕解熱

瘡

長



甘苦鹹平入肝經除風熱治一切目疾故有決明之

名又曰益腎精睡子神光屬腎曰華曰明狀如馬

蹄俗呼馬蹄決明搗碎煎蔥大麻仁

辛溫溫中明目耐風寒下水氣時珍曰古人種藜為

麩用其汁耳以香藜收于入藜今惟酒有香藜青藜此藜系藜木藜水

藜馬藜

辛平輕虛清肺解熱東垣皆濟消散血止嗽治喉痺

咽痛吹喉中良或加白礬鼻于失音外用傳諸瘡良

生濕也朽木上狀如肺肝紫色虛軟彈之粉出取

本草綱目卷之九 馬勃 青箱子



粉用



木鼈字  
濕熱疔  
用治瘡

苦溫微甘有小毒利大腸治濕痢疳積瘰癧瘡時乳  
癰蛙毒消腫追毒生肌除野音早黑斑音早入外科核扁  
如鰐鱗色搥去油者能毒狗