

婦科冰鑑

一



清 · 柴得华 撰

婦科金鑑

中医古籍出版社



王 者 悦
胡永盛王耀庭

主 编
审 定

类 要
四 册

二 册
六 册

尚 湖 医 珍

端 木 蕤 良

傅景华徐岩春
端 木 蕤 良

编 辑
题 签

中医古籍出版社



春湖医珍八种

一、集验良方 六册

二、医林一致 五册

三、金匱要略广注 三册

四、医易经传会通 二册

五、古今医学捷要六书 六册

六、妇科冰鉴 四册

七、马氏庭训 六册

八、养生类要 二册



据长春中医学院
图书馆藏清乾隆
四十一年钞本原
书影印



内容提要

《妇科冰鉴》，清柴得华撰。得华（丽东），乾隆间医家。

本书成于乾隆四十一年（公元一七七六年）。序中记述作者「少年病温，几为医误，于是弃儒业医，酷嗜岐黄家言」，「兢兢业业，苦攻多年，伤寒方脉未敢稍为惮烦，而于妇科特究心焉」。作者深感古代医著「率多论而不详，语而不畅，或存论而遗脉，或有治而无方，使留心斯道者，非失遗珠之恨，即生望洋之叹」，因而编撰本书。

柴氏依《医宗金鉴》编目体例，分十二门，八卷。立论悉本内经奥旨，博采先哲精萃，复加探讨，创为一家之言。各门首论病情症状，次详脉法方药，辨证精审，论理透彻，立方遣药，丝丝入扣，读之易于领会，豁然贯通。所以本书对中医妇科临床、教学及学习研究均有重要参考价值。

本书极为罕见，仅有钞本传世。本院图书馆所藏，为乾隆四十一年（公元一七七六年）钞本，序后钤有柴氏朱红印章，当为稿本。



本詩... 凡以... 千景... 韻... 黃寒言... 一... 兼... 業... 書... 卷... 半... 本詩... 凡以... 千景... 韻... 黃寒言... 一... 兼... 業... 書... 卷... 半... 本詩... 凡以... 千景... 韻... 黃寒言... 一... 兼... 業... 書... 卷... 半...

... 凡以... 千景... 韻... 黃寒言... 一... 兼... 業... 書... 卷... 半... 本詩... 凡以... 千景... 韻... 黃寒言... 一... 兼... 業... 書... 卷... 半...

... 凡以... 千景... 韻... 黃寒言... 一... 兼... 業... 書... 卷... 半... 本詩... 凡以... 千景... 韻... 黃寒言... 一... 兼... 業... 書... 卷... 半...

... 凡以... 千景... 韻... 黃寒言... 一... 兼... 業... 書... 卷... 半... 本詩... 凡以... 千景... 韻... 黃寒言... 一... 兼... 業... 書... 卷... 半...

... 凡以... 千景... 韻... 黃寒言... 一... 兼... 業... 書... 卷... 半... 本詩... 凡以... 千景... 韻... 黃寒言... 一... 兼... 業... 書... 卷... 半...

... 凡以... 千景... 韻... 黃寒言... 一... 兼... 業... 書... 卷... 半... 本詩... 凡以... 千景... 韻... 黃寒言... 一... 兼... 業... 書... 卷... 半...

內容提要

《戊梅水鑑》、《香榮詩半》、《香半》(兩卷) 一九八六年六月
王耀庭識 中醫藥大學圖書館



序

昔子輿氏有言夫道若大
路然豈難知哉是故六經之言
道如天地之無所不包四子
之言道如日月之無所不燭



不獨大道為然醫雖小道
道中之一事究其綱領條
經常變化上關運氣下切
癆而寄生命與大道無兩
樞軸也華性惛愚讀書無
成其



於大道如在尊寐中耳少年
患温幾為醫誤於是棄儒業
醫酷嗜岐黃家言潛心數載
似少有得然猷不敢自信竊
見泥古而執成規者不反覆

致詳而簡略從事經目而未
必經心過而不入此又難之
難矣夫太極判而天地分天
地位而萬物育生生化化不
外於陰陽相濟而成然先儒



南京中醫藥大學圖書館版權所有

嘗言寧治十男子不治一婦
人，蓋謂男子以氣為本而婦
人以血為主氣固不易理而
血尤難調燮也故兢兢業業
苦攻多年傷寒方脈未敢稍



為憚煩而於婦科特究心焉
及循考群書率多論而不詳
語而不暢或存論而遺脈或
有治而無方使留心斯道者
非失遺珠之恨即生望洋之



嘆爰不揣固陋編輯是書
分十二帙集八卷理本靈素
奧旨法述先哲精言畧者詳
之冗者刪之遺者補之缺者
增之雖不敢自以為是私心

竊願醫之為術。廓如天地
如日月由道之一端。悟道
全體不舍易以求難精進勉
研以冀

大方誨我



肯

乾隆四十一年歲次丙申孟

春上澣後學柴得華齋

東氏書於酒泉之育齡

齋



凡例

一 婦人諸證與男子無異其所異者惟月經崩漏帶濁癥瘕嗣育胎產乳房前陰而已此古人立婦科之端由也茲門剖十二自月經以至雜證次第不紊使觀者豁然貫通焉

一 望聞問切稱為神聖工巧古聖於此四者不能舍一奈世染成風每延醫至端一諱疾試其良否蓋不明經曰聞其聲而知其人之疾苦問其苦欲而知其病之所在故余首揭醫婦之難以

作曉夜晨鐘云

一 是書悉本內經奧旨博採先哲精萃復加探討
創為一家之言俾讀者了然心目非敢故託前
賢苦心也

一 各門首論病情證狀次詳針法方藥其中有相
雷同者下贅宜互參考既可易於領會復明貫
通之妙

一 證候狀態變化無窮要不越表裏陰陽虛實寒
熱八者此軒岐垂訓千古難歷代名賢疊出無

能外焉故余逐篇諄諄詳之則知所遵從而
望洋之歎正所謂知其要者一言而終也



婦科水鑑總目

卷一

月經門

論證計十四條

彙方計五十三

卷二

經閉門

論證計六條

彙方計十六



崩漏門

論證計二條

彙方計八

卷三

帶下門

論證計一條

彙方計八

積聚門

論證計十條



彙方 計十

卷四

嗣育門

論證 計十四條

彙方 計十

卷五

胎前門

論證 計二十六條

彙方 計四十三



卷六

生育門

論證 計十六條

彙方 計八

卷七

產後門

論證 計四十五條

彙方 計六十六

卷八



乳證門

論證 計六條

彙方 計十六

前陰門

論證 計九條

彙方 計十三

雜證門

論證 計七條

彙方 計三



婦科冰鑑卷一

月經門目錄

醫婦之難 一

診婦問娘 二

經血源流 三

經病大綱 四

經血異常 五

察辨血色 六

經血愆期 七



經期腹痛

八

經行發熱

九

經期體痛

十

經行吐瀉

十一

通經妄行

十二

經行帶下

十三

經際傷寒

十四

月經門彙方目錄

四物湯一



芩連四物湯 二

地骨皮飲 三

膠艾四物湯 四

芩朮四物湯 五

桃紅四物湯 六

薑芩四物湯 七

佛手散 八

逍遙散 九

加味道遙散 十



當歸補血湯 十一

聖愈湯 十二

膠艾八珍湯 十三

歸脾湯 十四

六味地黃湯 十五

八味地黃湯 十六

過期飲 十七

香桂四物湯 十八

芩歸二陳湯 十九



香連四物湯 二十

復和飲 二一

人參養榮湯 二二

八珍散 二三

十全大補湯 二四

六味地黃丸 二五

加味烏藥散 二六

琥珀散 二七

延歸散 二八



小温經湯 二九

大温經湯 三十

吴茱萸湯 三一

膏歸建中湯 三二

木香四物湯 三三

加味地骨皮飲 三四

六神湯 三五

羌桂四物湯 三六

黄芪建中湯 三七



益智六君湯 三八

香砂六君子湯 三九

參苓白朮散 四十

理中湯 四一

七味白朮散 四二

三黃四物湯 四三

沉香涼血飲 四四

犀角地黄湯 四五

芩連犀角地黄湯 四六



生地六味湯 四七

補中益氣湯 四八

桂枝四物湯 四九

麻黃四物湯 五〇

葛根四物湯 五一

柴胡四物湯 五二

玉燭散 五三

婦科水鑑卷一

月經門

醫婦之難一

寇宗奭曰、寧治十男子莫治一婦人、謂婦人之病
不易治也、蓋婦人深閨幽處、情多抑鬱、加之憂恚
憎忌、慈愛多疑、所願不遂、性執偏拗、診時又不令
醫師觀形望色、聞聲問因、富貴之家、居奧室之中
處幃幔之內、且復以綿帕蒙其手、既不能行望色
之神、又不能盡切脈之巧、未免詳問問之覺繁、反

謂醫學不精，往往並藥不信，不知問非易事，非精於醫者，必不能問也。夫望聞問切四者，欲去其即，神醫無由施其神矣。此古今之通患，牢固難破者也。

診婦問娘二

凡診婦女，須明在室適人及其夫宦遊同處與夫有無妊娠。一一詳問，然後切脈。蓋臨診之際，婦女情多羞慚，未免飾必不真。且初妊之後，每每不形於診，非詳問不能知其由也。倘獨恃一脈不知脈



多疑似設誤觸犯咎必歸己假診室女突呼有
不但病家憎忌而傍人譎議勢所難免故筆記
此以為醫士之鑒

經郵源流三

上古天真論曰女子二七天癸至任郵通太衝
盛月事以時下故有子夫天癸者天一之氣也任
衝者奇經之二也任主胞胎衝為血海氣盛郵通
故月事下而有子月事者謂女子經水按月而至
其盈虛消長應於月象月以三旬而一盈經以三



旬而一至、月月如期、不失其常、故曰月經、又名月信者、如潮、信之不爽也。

經病大綱 四

血者水穀之精氣也、和調五藏、灌陳六府、乃能入於脈也、凡其源源而來、生化於脾、總統於心、藏受於肝、宣布於肺、施泄於腎、灌溉一身、在男子則化而為精、在婦人則上為乳汁、下歸血海、而為月水。若情志調和、精氣充暢、食飲有節、起居無傷、則陽生陰長、百脈充實、何不調之有焉、不知慎或六淫



侵其外，七情傷其中，勞役損其形，嗜慾耗其精，有觸犯經斯病矣。調之之法，惟陰陽寒熱氣血虛實八者而已。縷析於左。

經脈異常五

月經一月一至此其常也。然亦有兩月一行者，謂之併月；有三月一行者，謂之居經；有一年一行者，謂之避年；有一生不行而能孕育者，謂之暗經。此皆所稟不同，不須求治。若經行吐衄者，是謂逆經。有受孕之後，經復循月而產子者，是謂胎前。有妊

孕數月忽然下血而胎不墮者是謂漏胎此皆異乎常人均至病也治見本條

察辨血色六

血色之辨足以察虛實徵寒熱不可不知也血者陰屬也奉心化赤故以鮮紅為正即有經病亦易治療若深紅紫黑者熱之徵淺淡紅白者虛之象黃如未泔者濕之化黏如鼻涕者實之兆此其槩也更當審其有無瘀塊色之明黯血之遲數證之喜惡詳而施治庶無差誤若紫黑而明稠黏臭穢

血見浮數洪滑證候喜冷惡熱為實為熱如紫黑
而黯清澀或腥血見沉遲細弱證兼惡冷喜煖
虛為寒以此辨之最為切當學者宜深意焉

經血愆期 七

月經按月而至是為常候或前或後謂之愆期丹
溪曰先期而至者血熱也後期而至者血虛也王
子亨曰陽太過則先期而至陰不及則後時而未
觀二子之論陽盛血熱陰虧血虛致期先後理誠
然矣然猶有未盡不可不察嘗見薄弱之女每每



先至積想之婦恒多後期蓋薄弱者中氣常痿脾
宮失其統攝之權積想者心火時燥元海乏其源
流之血又見經愆之輩虧損肝腎衝任失守以致
乍多乍少或前或後今世患經病者率由乎此誠
崩漏之肇端亦剪嗣之根蒂也

先期而至或見洪數之類證兼喜冷者熱也大率

血分諸病四物湯主之 屬熱者芩連四物湯

虛熱者地骨皮飲 血多日久不止者膠艾

四物湯 血過多屬熱者芩朮四物湯 血多



有塊色紫稠黏者有瘀停也。桃紅四物湯隨
流以逐之。血滯少色赤者乃熱盛滯血也。
芩四物湯有瘀者佛手散。肝脾鬱滯者逍
遙散。脾經血燥者加味道遙散。

若脈見濡弱沉細之類證。兼喜暖為虛寒也。

血色淺淡乃氣虛不能攝血也。當歸補血湯。

虛甚者聖愈湯。柴衛怯弱氣血兩虛血多不

止者膠艾八珍湯。心脾虧損情志抑鬱以致

經早其血淋瀝不止者歸脾湯最妙。蓋脾統血

也 經肆情慾致損肝腎衝任之源者惟當鎮
固命門為主如左尺洪大無力者是真陰虛也
六味地黃湯 若右尺豁大無力或沉遲細清
是真陽虛也八味地黃湯

過期不至或見沉瀆者過期飲 尺中或微瀆或

兼腹痛者香桂四物湯 色淡黃者痰濕也芎

歸二陳湯 紫黑有塊或成條片者熱燥血也

必作痛者連四物湯

過期不至尺或微弱或清面頰黃白無脹痛之證

者乃、妄血可行切戒攻破之劑宜補益榮衛壯氣血為主所謂積流而集自通也

弱者復和飲人參養榮湯 氣虛血虧者八珍

湯十全大補湯 肝經血少者六味地黃丸

水即所以補肝也

四物湯 本門一

芩連四物湯 本門二

地骨皮飲 本門三

膠艾四物湯 本門四



苓朮四物湯 本門五

梔紅四物湯 本門六

薑芩四物湯 本門七

佛手散 本門八

逍遙散 本門九

加味道遙散 本門十

當歸補血湯 本門十一

聖愈湯 本門十二

膠艾八珍湯 本門十三



南京中醫藥大學圖書館版權所有

歸脾湯 本門十四

六味地黃湯 本門十五

八味地黃湯 本門十六

過期飲 本門十七

香桂四物湯 本門十八

芎歸二陳湯 本門十九

香蓮四物湯 本門二十

漢和飲 本門二十一

人參養榮湯 本門二十二



南京中醫藥大學圖書館版權所有

八珍湯本門二三

十全大補湯本門二四

六味地黃丸本門二五

經期腹痛八

經期腹痛有前後虛實之殊不可不析實痛者多
痛於未行之前經行而痛頓減虛痛者每痛於既
行之後血空而痛轉加良由經前氣凝血滯不能
流暢經後血虧氣弱無以充實然亦有經前屬虛
經後屬實者須令以手按腹喜按喜揉者虛也拒

按拒揉者實也。虛實之真假凝滯之有無於此可
察。臨是證者詳其所因，辨其虛實，庶治無遺。蘊矣。
經前腹痛，脹痛若脹過於痛，是氣滯其血也。加味烏

藥散

若痛過於脹，是血凝其氣也。琥珀散

若臍腹疼痛者，延歸散

若臍府冷痛者，小溫

經湯

或因受寒過期不行，少腹冷痛者，大溫

經湯

若胞中不虛，惟風寒凝結，以致少腹疼

痛者，吳萸茱湯

經後腹痛，乃血虛也。當歸建中湯

若去血過多



以致腹痛者聖愈湯十全大補湯
若經行之際偶有憂鬱經遂止而腹痛者木香四物湯
因怒傷肝致腹脇牽痛者逍遙散

加味烏藥散 本門二六

琥珀散 本門二七

延歸散 本門二八

小溫經湯 本門二九

大溫經湯 本門三十

吳茱萸湯 本門三一



當歸建中湯 本門三二

聖愈湯 本門十二

十全大補湯 本門二四

木香四物湯 本門三三

通運散 本門九

經行發熱九

經行發熱有經前經後潮熱表熱之分所當察也
在經前者血熱也在經後者血虛也若經後日晡
潮熱者乃真陰虧涸而然經曰陰虛生內熱法當



壯水之主以制陽光若表熱者必有三陽表證可
據證既屬表法當解散所謂由表而入者必表
出也

若經前發熱者加味地骨皮飲 經後發熱者六

神湯 寒熱似瘧者脾虛肝熱也逍遙散 日

晡潮熱者六味地黃湯 若見三陽表證者則

當按經解散法具後第十四經際傷寒條宜五

參閱

加味地骨皮飲 本行三四

六神湯 本行三五

逍遙散 本行九

六味地黃湯 本行十五

經期體痛 十

氣血盛實、陰陽和調則形體通泰、或外虧衛氣之充養、內乏榮血之灌溉、故經行而身痛也。其間或有表證者、法當解散、設無表證、形狀乃榮衛虧乏、血脈壅遏、而然宜調榮益衛、疏經通絡、俾氣充血盛、經通絡達、其證自已。若在經行之後、或因去



血過多乃血虛不能榮於肢節又當從乎補矣

若血衄壅滯者羌桂四物湯 榮衛虧乏者八

湯 去血過多者黃芪建中湯

羌桂四物湯 本行三六

八珍湯 本行二三

黃芪建中湯 本行三七

經行吐瀉 十一

胃為受穀之宰脾司運化之權二者安和則生納自如一有乖戾則受化或廢而吐瀉作矣然吐與



瀉主各殊別。吐出於胃，瀉由乎脾也。蓋經行之脾氣輸運血海，不暇滲溢，固中胃中無藉健運，能化其積，故吐瀉之端由而治不可不分別者也。

若嘔吐涎飲者，胃弱也。益智六君湯。吐出食物

者，胃寒也。香砂六君子湯。若瀉者，脾虛也。參

苓白朮散。鴨溼澄澈清冷而痛，乃脾寒也。理

中湯。肌熱渴瀉者，虛熱也。七味白朮散。

益智六君湯 本行三八

香砂六君子湯 本行三九

參苓白朮散 本行四十

理中湯 本行四一

七味白朮散 本行四二

逆經妄行 十二

經期吐衄名曰逆經夫血者陰也陰從乎陽故隨氣而為升降若氣逆於上則不能循道下行或熱傷陽絡迫血溢而外溢經曰天暑地熱經水沸溢蓋血逆溢多由乎熱也治宜抑氣清熱則經水安



瀾而無沸溢之患矣

若經前吐血衄血者乃熱壅迫其血也三黃四

湯氣逆載血者以抑氣清熱為主抑氣涼血

飲若經後其熱已減宜犀角地黄湯熱

或甚者芩連犀角地黄湯若此沉弱或細者

惟以清補為主生地六味湯少加童便沖服

三黃四物湯本門四三

抑氣涼血飲本門四四

犀角地黄湯本門四五



琴連犀角地黃湯本行四六
生地六味湯本行四七

經行帶下十三

帶下一證有赤白之分赤由濕熱之腐化白屬氣
虛之陷下蓋經將行時氣輸血海倘素涉中虛或
宿有濕熱故隨氣流下涸清其間若形清醒穢又
為寒虛所化間白帶多於經後名曰脫陽法當大
補否則禍不旋踵矣
若色白者氣虛陷下不能固攝也補中益氣湯

色赤者濕痰熱化也知柏四物湯 白帶多於

經後者十全大補湯

補中益氣湯本行四八

知藥四物湯方見前漏門一

十全大補湯本行二四

經際傷寒十四

經行之際不謹調攝因而偶感外邪須明風寒之
辨若頭痛汗出暈昏惡寒翕翕發熱鼻鳴乾嘔者
此風邪中太陽衛分也若頭疼脊強身痛無汗惡



寒者此寒邪傷太陽榮分也上二證者以有無汗
出為風寒之確辨咸宜速除者也稍涉延蔓則必
傳入陽明之表而見惡熱汗出目痛鼻乾不眠等
證再或不愈因見寒熱往來嘔而口苦咽乾目眩
此邪已傳少陽也倘日晡潮熱自汗喜飲腹滿惡
寒舌眩蒼黃邪已傳陽明胃府不復傳也

若風傷太陽衛分者桂枝四物湯 寒傷太陽榮

分者麻黃四物湯 邪傳陽明之經者葛根四
物湯 邪入少陽者柴胡四物湯 邪傳陽明

胃府者玉燭散

桂枝四物湯 本門四九

麻黃四物湯 本門五十一

葛根四物湯 本門五一

柴胡四物湯 本門五二

玉燭散 本門五三

月經門彙方

四物湯 一

穀地 二錢

當歸

二錢



白芍 二錢

川芎 一錢

若為祖末水煎溫服如血熱者以生地易之

地黃服照前

芩連四物湯 二

生地 三錢

當歸 二錢

白芍 二錢

川芎 一錢

黃芩 一錢

黃連 一錢

水煎溫服

地骨皮飲 三



生地 酒炒

白芍 一兩 錢

丹皮

水煎 微溫服

膠艾四物 陽

熟地 三錢

白芍 二錢 酒炒

阿膠 蛤粉炒珠

艾草 五分

當歸 酒洗 二錢

川芎 八分

地骨皮 各二錢

當歸 酒洗 二錢

川芎 錢五分

艾葉 醋炒 三錢



水酒煎宜心温服

芩木四物湯五

生地三錢

白芍二錢

黃芩一錢

水煎温服

桃紅四物湯六

生地三錢

白芍五錢

當歸二錢

川芎一錢

白木土錢五分

當歸四錢

川芎一錢



桃仁 去尖皮 炙 研 泥 紅花 酒一錢 洗

水煎温服

薑 葱 四物湯 七

當歸 酒洗

熟地

赤芍 酒炒

川芎

薑黃

黃芩

丹皮

元胡 酒炒

香附 酒炒 各等分

水煎温服



佛手散

川芎 二兩

當歸 三兩

右為細末每服二錢水一盞酒二分煎七

溫服

逍遙散 九

白朮 二錢 土二錢

茯苓 一錢

當歸 二錢 酒洗

白芍 二錢 酒炒

柴胡 八分

炙草 六分

南薄荷 三分



加薑棗水煎溫服

加味逍遙散十

即前方加山梔丹皮各一錢

當歸補血湯十一

當歸酒三錢洗

黃芩一兩

右水煎服

聖愈湯十二

熟地四錢

當歸酒二錢洗

白芍酒二錢炒

川芎一錢



黄耆 二钱
穿 二钱
人 参 一钱

右水煎服

胶艾八珍汤 十三

人 参 一钱 或 二钱
去 苦 另 煎 冲

茯 苓 一钱
次 草 八分

熟 地 三钱
当 归 二钱 洗

白 芍 二钱 炒
川 芎 一钱

阿 胶 一钱 炒
艾 叶 一钱 醋 梨

加薑枣水煎温服



歸脾湯 十四

人參 一錢餘

黃芪 二錢

當歸 錢五分

遠志 六分

木香 三分

加薑棗水煎溫服

六味地黃湯 十五

熟地 四錢

白朮 二錢

白苓 一錢

粳仁 二錢

炙草 一分

龍眼肉 一錢

山藥 二錢



山茱萸 二錢
白苓 錢五分

丹皮 酒洗 五分
澤瀉 錢五分 拌炒

右水煎空心温服

八味地黄湯 十六

於前六味地黄湯方加製附子一錢肉桂一錢

煎服照前

過期飲 十七

熟地 白芍 酒炒

當歸 酒洗 香附 酒各製 二錢



川芎 一錢

桃仁 六分

木通 各五分

肉桂 各四分
去皮

水煎食前温服

香桂 四物湯

當歸 四錢
酒洗

赤芍 五錢
炒

香附 二錢
酒製

紅花 七分
酒洗

莪朮 醋製

艾草

木香 二分

熟地 三錢

川芎 五錢

肉桂 一錢
剉粗皮



右酒水各半煎服腹痛者加延胡索二錢

芎歸二陳湯十九

陳皮 錢五分

半夏 二錢
姜製

白苓 二錢

尖草 八分

川芎 錢五分

膏歸 二錢
酒洗

水煎服

香連四物湯二十

於前四物湯內加木香六分黃連一錢

飯和飲二一



熟地 四錢

白芍 二錢
酒炒

黃芪 二錢
蜜炙

加薑棗水煎溫服

人參養榮湯 二二

人參 一錢

黃芪 二錢
蜜炙

熟地 三錢

白芍 一錢
酒炒 五分

當歸 二錢
酒洗

川芎 一錢

炙草 八分

白朮 二錢
土炒

白苓 一錢

當歸 二錢
酒洗

陳皮 七分



肉桂 去^八皮^分

炙草 六分

加薑棗水煎服

八珍湯 二三

人參 一錢

白朮 土二錢 炒

白朮 一錢

炙草 八分

熟地 三錢

當歸 二錢 洗

白芍 一錢五分 炒

川芎 一錢

加薑棗水煎服

十全大補湯 二四



於前八珍湯加黃芪二錢肉桂一錢引黃同

六味地黃丸二五

大懷熟九蒸者

懷山藥炒四兩

雪白苓三兩梨

杭山菜白核兩酒蒸

南丹皮三兩洗蒸

建澤瀉三兩切片鹽水浸焙

右為細末加煉蜜丸如桐子大每服三四錢

空心淡盪湯送服忌三白

加味烏藥散二六

烏藥

砂仁



木香

延胡索

香附

甘草

檳榔 各等分

右為細末每服七錢生薑三片水煎溫服

琥珀散 二七

三稜

莪木

赤芍

當歸

劉寄奴

丹皮

熟地

官桂



烏藥

延胡索 各一兩

右前五味用烏豆一升生薑半觔切片末醋
升同煎豆爛為度焙乾入後五味同為細末

每服二錢溫酒調下空心食前服

延歸散 二八

延胡索

當歸 各等分

右為粗末每服三錢加生薑三片水煎稍熟

服

小溫經湯 二九



當歸酒洗
附子各等分

每服三錢水煎空心服

大温經湯三十

吳茱萸 薑湯泡製丹皮酒焙

白芍酒炒 人參去芦另煎冲

肉桂去皮 當歸酒洗

川芎 阿膠拾粉炒珠

炙甘草一錢 麦冬去心二錢

半夏二錢五分 姜製



如生薑水煎食前服

吳茱萸湯三一

吳茱萸

肉桂

當歸酒洗

丹皮

半夏薑製

麥冬
去心
二錢

防風

細辛

藁本

乾薑

茯苓

木香

炙草 各一錢



水煎服

當歸建中湯三二

當歸一兩

白芍二兩

肉桂一兩

炙草七錢

右取咀每服五錢加生薑大棗水煎空心溫服

木香四物湯三三

於四物湯內加煨廣木香一錢

加味地骨皮飲三四



生地

白芍 各二錢

丹皮

胡黃連 一錢

水煎服

六神湯三五

熟地

白芍

黃芪

當歸

川芎

地骨皮 各三錢

當歸

川芎

地骨皮 各等分



右以咀水煎服

羌桂四物湯三六

於四物湯內加羌活桂枝各一錢五分

黃芪建中湯三七

黃芪一兩

肉桂一兩

白芍二兩

炙草七錢

每服五錢薑棗水煎服日二三服如虛甚加

附子

益智六君湯三八



人參 一錢

白朮 二錢

半夏 二錢
薑製

益智 一錢
去皮炒研

加薑棗水煎服

香砂六君子湯 三九

人參 一錢

白朮 錢五分

陳皮 一錢

白朮 二錢
土炒

陳皮 錢五分

炙草 六分

白朮 二錢
土炒

半夏 二錢
薑製

藿香 一錢



縮砂仁 一錢

炙草 八分

加薑棗水煎溫服

參苓白朮散 四十

人參

白苓

白朮 土炒

山藥 炒

甘草

蓮肉 去心

白扁豆 各一錢五分 薑汁炒

薏米 炒

縮砂仁

桔梗 各八分

右為細末每服二錢薑棗湯調服



理中湯 四一

人參

炮薑

水煎服

七味白朮散 四二

人參

茯苓 各錢五分

木香

甘草 五分

白朮 土炒
炙草

白朮 土炒

藿香

葛根 各一錢

水煎服

三黄四物汤 四三

生地 四钱 洗

白芍 三钱

当归 五钱 洗

川芎 六分

黄芩 一钱 炒

黄连 一钱 炒

大黄 量其虚实用

右剉水煎服

抑氣涼血飲 四四

生地 五钱

白芍 三钱



黃芩 錢五分

沉香 末三分 調

水煎服

犀角地黃湯 四

生地 六錢

丹皮 三錢

丹皮 二錢

柏葉 一錢

白芍 四錢

犀角 鑄一錢

水煎服有熱如狂者加黃芩錢五分

苓連犀角地黃湯 四

於前方加黃芩黃連各一錢



生地六味湯 四七

生地 酒洗 五錢

山藥 炒 二錢

白苓 錢五分

水煎空心服 右寸 脈浮洪在冲 童便一杯服

補中益氣湯 四八

人參

白朮

陳皮

山黃 製 二錢

丹皮 二錢

澤瀉 錢五分

黃芪

當歸

柴胡



升麻

炙草

加薑棗水煎溫服

桂枝四物湯四九

當歸

熟地

川芎各二錢

白芍三錢

桂枝三錢

炙草一錢

薑棗水煎服

麻黃四物湯五十

當歸

熟地



白芍

杏仁

二十粒
去皮尖

麻黃

石先煎麻黃去上沫內諸藥加薑棗煎溫服

葛根四物湯五

當歸

熟地

川芎

各二錢

白芍

桂枝

各三錢

炙草

一錢

葛根

錢五分

麻黃

一錢

川芎各二錢

炙草一錢

桂枝各一錢



薑葱水煎服

柴胡四物湯五二

當歸

熟地

白芍

川芎 各錢五分

柴胡

半夏 薑製

人參

黃芩 各二錢
酒炒

炙草 五分

右為末每服五錢加薑葱水煎服

玉燭散 五三



當歸

熟地

茯苓

大黃

君劉每服

錢水食前服

各一錢
酒洗

川芎

白芍各二錢

芒消



婦科水鑑卷二

經閉門目錄

血滯經閉 一

血虧經閉 二

血枯經閉 三

師尼室寡經閉 四

婦人經斷復來 五

室女經來復止 六

經閉門彙方目錄

三和湯 一
 五補丸 二
 衛生湯 三
 麦味地黄湯 四
 六君子湯 五
 歸芍地黄湯 六
 杞菊散 七
 參麦地黄湯 八
 加味都氣湯 九



地龜都氣湯 十

大黃廩蟲丸 十一

澤蘭桑湯 十二

柏子仁丸 十三

金蘭道遠散 十四

芩心丸 十五

益陰煎 十六

崩漏門目錄

崩經漏血



殺血心痛 二

崩漏 門彙方目錄

知藥四物湯 一

劑芩四物湯 二

加味歸脾湯 三

薑附芎歸湯 四

益胃升陽湯 五

調經升陽除濕湯 六

地榆苦酒煎 七

失笑散

八

三





婦科冰鑑卷二

經閉門

血滯經閉

水脹篇曰石癥生於胞中寒氣客於子門子門閉塞氣不得通惡血當寫不寫血以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下夫胞者子宮也子門者胞之門也氣血交通月以時下或寒邪外干或瘀血內壅氣不宣通血因遏阻是以當寫者不能得寫血凝塞胞中狀如懷

子若不早為祛除則必日以益大其堅如石故曰
石癥寒邪既從下襲溫尊奚容寬緩務期外留去
而元氣無傷斯為用導之善者矣
評熱病論曰月事不來者胞脈閉也胞脈者屬心
而絡於胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事
不來也蓋相火居於胞中心火主乎血脈陽氣上
下交通陰血隨其灌注何有不來之虞第婦人心
氣恒鬱怒火時萌火之發也刑乎金金之燦也氣
上冲欲下咳嗽勢不能已愈咳則氣愈上致之下

絡之權。故月事斷絕矣。夫病由心生。亟宜速治。否則咳嗽日久。必增息賁而成肺勞矣。潔古曰。宜先服降心火之劑。後養脾血。余佩而用之。每奏捷功。先哲之言。信非誣也。

若外邪客犯。致成石癥者。宜吳茱萸湯溫而散之。羸氣壅滯而成者。宜琥珀散以攻導之。

氣上迫肺。月事不來者。先宜三和湯。後服五補丸。及衛生湯。

吳茱萸湯 見月經門三一

琥珀散 見月經門二七

三和湯 本行一

五補丸 本行二

衛生湯 本行三

血虧經閉 二

陰陽別論曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子
不月其傳為風消其傳為息責者死不治夫二陽
者足陽明胃也從生於心藉化於脾二者安和則
胃納水穀而化精微倘女子有隱情曲意不得舒



衆暢懷則心脾氣鬱不行胃之生化飲食日少血
何由生所謂二陽之病發心脾女子不月矣能使
心脾和暢胃職乃司中焦氣受_上取汁變化而赤庶
血海日盛經斯復下矣苟或遷延陰血愈虛內熱
愈熾肌為乾燥如風_消物皮膚甲錯日漸瘦枯名
曰風消火之化也火盛無制必刑肺金金氣受邪
不能運布水精滯於胸中津液悉凝為痰咳嗽晝
夜難已腎失水源因而氣上不歸息肯促急肝無
水滋毫毛焦枯髮脫落五藏徧傳欲望有生

待可

若因胃熱燥血海乾枯者玉燭散泄其熱則經

自行 心脾氣鬱者歸脾湯 氣血虧衰者人

參養榮湯 咳嗽氣急者此金水不能相濟也

麦味地黄湯 肝失水榮者六味地黄湯諸所

未盡詳血枯經閉宜互參考

玉燭散 見月經門五三

歸脾湯 見月經門十四

人參養榮湯 見月經門二二

麦味地黄湯 本門四

六味地黃湯見月經行十五

血枯經閉三

血枯經閉一證其因多端有不可一途論治者夫
枯者涸竭之謂也原其所致之由或思慮而傷心
脾或繼慾而損肝腎或崩漏吐衄而陰血暴亡或
產多乳衆而衝任漸涸蓋思慮抑鬱則心脾氣滯
不行因而胃廢出納之用經慾過極則肝腎真精
日損以致筋骨無藉滋榮崩漏吐衄隧道乏其灌
注產多乳衆血海無以充盈故月事斷絕面爪黃



白肢體困倦午後潮熱種種見證靡非精血虧竭
之候名曰虛損於是當滋補肝腎培養脾胃蓋
胃者衛之源脾者榮之本俾氣血充足經脈貫通
斯太衝漸盛月當自下矣舍此不治必陰水愈
耗陽火愈熾火上燥肺致使頻咳喘促從而骨蒸
勞熱面色枯白額若塗朱肌膚甲錯甚為寒熱迭
變諸證皆由真陰枯涸元陽飛越變為壯火勢與
元氣不兩立戕賊氣血難遏難止經曰壯火食氣
氣亦弱矣此勞瘵中最危最惡之候也惟宜壯水

之主以制陽光或可冀其萬一倘妄肆寒涼危
立待醫不識此安望有濟於他哉

若因思慮傷脾者歸脾湯 飲食懶思時或多痰

者六君子湯 縱慾過極以致肝腎精血虧損

者歸為地黃湯所謂乙癸同源也 崩漏吐衄

產多乳象血無以生者人參養榮湯十全大補

湯八珍湯 午後潮熱者地骨皮飲六味地黃

湯 咳嗽成勞頻頻不已者劫勞散 咳而喘

促者此腎虛不能納氣歸源也 麦味地黃湯參

麥地黃湯加味都氣湯此納氣藏元之治也
 骨蒸勞熱或多盜汗者地龜都氣湯身發壯
 熱時或乾渴者此真陰涸竭元陽飛越也法當
 壯水制陽為主如六味地黃湯加龜膠青蒿之
 類如寒熱似瘧者此氣血大虛之候也惟宜
 培補如十全大補湯加姜炭柴胡之類若咳
 嗽初起須審其因如由外邪當以疏解倘驟用
 補則邪必留連久而成勞經曰風發於肺下
 正謂此也



歸脾湯 見月經門十四

六君子湯 本門五

歸芍地黃湯 本門六

人參養榮湯 見月經門二二

十全大補湯 見月經門二四

八珍湯 見月經門二三

地骨皮飲 見月經門三

六味地黃湯 見月經門十五

劫勞散 本門七



麦味地黄湯 本門四

参麦地黄湯 本門八

加味都氣湯 本門九

地龜都氣湯 本門十

師尼室寡經閉 四

夫師道姑也尼女僧也室係尚未適人之女寡乃
少而亡夫之婦凡此經閉者不可同尋常妻妾論
治也盖寂居深幽獨陰無陽情志恒多鬱結愆念
時崩弗遂欲察其驗肝脉弦出寸口其故何也由



相火寄權於肝也抑其夫宦遊客處者每患斯疾
業是科者先須識此明乎此則情志錯雜難名之
狀洞徹無餘調治之法和肝理脾開鬱清心而已
然更瀕病者自移心志始能窺弭蕭牆之禍矣
室女多屬氣血凝結者法當攻破大黃廔蟲丸
體弱絀虛難任攻下者澤蘭葉湯柏子仁丸兼
服之其血自行 師尼寡婦多屬鬱熱宜金
蘭道遠散以和肝理脾開鬱清心經自通也

大黃廔蟲丸

本門十一

澤蘭桑湯 本門十二

柏子仁丸 本門十三

金蘭道遠散 本門十四

婦人經斷復來五

婦人七七天癸竭地道不通當月水不下倘仍不
斷別無他證乃血有餘不可用藥強止若斷已年
餘之外忽爾復來者當審其因果何干犯隨證施
治無奇也

若因血熱者芩心丸 血熱甚者益陰煎 血去

過多衝任虛損不能固其血者十全大補湯
膠艾八珍湯 怒氣傷肝致血不藏者逍遙
憂思傷脾不能統攝者歸脾湯

芩心丸 本門十五

益陰煎 本門十六

十全大補湯 見月經門二四

膠艾八珍湯 見月經門十三

逍遙散 見月經門九

歸脾湯 見月經門十四

室女經來復止六

女子二七天癸至，徑行數度，仍復不來，無他疾苦。必是避年，蓋緣氣血尚弱，經隧未充，當俟自下，不必求療。倘兼虛損形證，緊數之脈，則為室女血枯。經閉名曰童勞，命屬風燭，斷非享齡之地。寇宗奭曰：夫人之生，以氣血為本。人至有病，未有不先傷氣血者。世有童男室女，積想在心，思慮過度，多致勞損。男子則神色先散，女子則目水先閉。蓋憂愁思慮則傷心，心傷則血逆竭；血逆竭則神色先散。

而月水先閉也。火既受病，則不能榮養其子，故不嗜食。脾氣虛，則金氣虧，故發嗽。嗽既作，則水絕。四肢乾木，氣不暢，故多怒。鬢髮焦，筋骨痠，五藏傳徧而終死矣。此種癆瘵，最難治。蓋病起於五藏之中，藥力所不可及也。若能改易心志，用藥善於調理，或得九死一生耳。法詳血枯及室寡經閉，茲不冗贅。

經閉門彙方

三和湯一



當歸

白芍

大黃

黃芩

連翹

甘草 各等分

右剉每服八錢水煎服

五補丸 二

熟地

川芎

生地

朴消

山梔 炒

薄荷

人參



牛膝 酒焙

地骨皮 右等分

白苓

右為末煉蜜丸桐子大每服三五十九空心

溫酒送下

衛生湯 三

當歸 二兩 酒洗

黃芪 三兩 蜜炙

白芍 二兩 酒炒

甘草 一兩 炙

右為末每脹半兩水二盞煎一盞空心溫服

如氣虛者加人參一兩

十



麦味地黄汤 四

熟地 四钱

山萸 各二钱
酒蒸 去核

丹皮 酒焙

麦冬 二钱
去心

水煎 空心温服

六君子汤 五

人参 一钱

白苓 钱五分

山萸 炒

白苓

泽泻 各一钱
盐水 炒
五分

五味 八分
蜜炙

白术 二钱
土炒

半夏 二钱
蜜炙



橘皮 一錢

炙州 八分

加薑棗水煎食後溫服

歸芍地黃湯 六

熟地 四錢

山藥 卅

山黃 各二錢
酒蒸 去核

白朮

丹皮

澤瀉 各錢五分
鹽水浸炒

當歸 二錢
酒洗

白芍 錢五分
酒炒

水煎空心溫服右尺脈微者加肉桂一錢

紅芍散 七



白芍 六兩 酒炒

甘草 蜜炙

當歸 酒洗

五味

黃芪 四兩 蜜炙

人參 去苳

熟地 煨乾

真阿膠 各一兩 碎炒珠

右為粗末每服三錢水一盞生薑七片棗核
煎至九分溫服

麥地黃湯

熟地 五六七錢

山藥 炒黃

山萸 六二錢 酒蒸去核

白苓



加

丹皮 酒焙

麦冬 三钱 去心

人参 一两二钱 另煎冲入

水煎早晚温服

味都气汤丸

熟地 自四钱至 七八钱

山萸 二钱 去核

丹皮 各钱五分

川牛膝 酒焙 各钱五分

泽泻 各钱五分 盐水处理

五味 八分 蜜炙

小蘗 炒黄

白苓

泽泻 一钱 盐水处理

麦冬 二三钱 去心



遠五味 七八分至
肉桂 一錢若尺沉而有力者

黑沉香 三五分
末調入

水煎空心温服

地龜都氣湯 十

熟地 四錢

山萸 酒蒸 二錢 去核

丹皮 酒洗

龜板 一板 炙

五味 一錢

山藥 二錢 炒黃

白苓

澤瀉 各一錢五分 鹽水拌炒

地骨皮 一錢 炙



水煎温服尺脉洪大者加生地二钱丹
至二钱肝脉浮弦者加生白芍二钱

大黄 广虫九十一

大黄 酒蒸

赤芍 酒炒

生地 酒洗

桃仁 去皮尖

杏仁 去皮

乾漆 炒去烟

甘草

黄芩

广虫

蜈蚣

僵蚕

蟾蜍 各等分



膠艾八珍湯見月經門十三

人參養榮湯見月經門二二

十全大補湯見月經門二四

歸脾湯見月經門十四

加味歸脾湯本行三

逍遙散見月經門九

加味逍遙散見月經門十

六味地黃湯見月經門十五

八味地黃湯見月經門十六



若為細末煉蜜丸桐子大空心未飲送下

十九

金蘭道送散 + 四

當歸酒洗 白芍酒炒

白朮土炒 茯苓

柴胡 炙草

香附醋炙 生地酒洗

黃芩酒炒 薄荷

鬱金 澤蘭



加薑枣水煎温服

苓心丸十五

用黄苓心枝除者三两
又米泔浸七日
又干又

右为末醋丸如桐子大每服七十九空心温

酒送下日进二豚

益阴煎十六

生地三钱
知母二钱
炒

黄柏二钱
龟板四钱
醋炙

缩砂仁
甘草
炙各一钱



崩漏門

崩經漏血

經曰心生血肝藏血脾統血夫血者陰也隨氣而
為升降升降調適則月事下止依時苟有疾乖斯
崩或漏矣崩者血卒大下若山崩難遏之勢漏乃
不時淋漓綿綿弗已之謂致此之由或思慮傷脾
中氣因餒別不能統攝歸源忿恚傷肝火動於中
迫血無藏納之所悲哀太過心胞系損因而血之
主宰房慾不謹腎命日虧以致閉藏失權此皆犯



其藏者也。更或向有瘀停，因新血冲激而始泄。熱傷陰絡，為火搏擊而妄行，治療之法在乎
若果有瘀，有火清之，逐之為宜。倘涉虛，在當從
補不得肆用寒涼攻剋，反伐生氣之源，為害匪細。
經曰：血脫者，益氣。東垣云：大失血後，須用四君輩以
收功，可謂得經旨之奧矣。

若崩漏去血過多者，膠艾四物湯止之。血熱者

知藥四物湯清之。熱微者，荆芩四物湯和之。

漏血瀉少間有痞塊者，桃紅四物湯加香附。



破之崩血初起腹脇脹痛色紫成塊者屬瘀
凝也琥珀散攻之崩漏日久去血過多而氣
隨血去衝任損傷因見肢體倦怠脈息沉弱細
濡之類大虛之候當恃溫補宜膠艾八珍湯人
參養榮湯十全大補湯尺脈微加附子若色黑
如豆汁清稀者此敗血也尤宜前藥思慮勞
倦致脾不能統血歸源者歸脾湯脾經鬱火
者加味歸脾湯忿恚傷肝者逍遙散加香附
青皮怒動肝火者加味逍遙散房勞傷腎

以致衝任失守當以鎮固命門為主左尺脈細弱者六味地黃湯加續斷阿膠右尺脈微細者八味地黃湯不可以肉桂動血執泥此余屢用屢驗者崩血已多其色紫黯清稀腹痛無時者薑附芎歸湯悲哀太過者補中益氣湯或日久脾傷食少中氣下陷不能載血者亦宜是方中氣不固不能提攝者益胃升陽湯崩漏夾水或日水瀉一二次形氣不甚弱者調經升陽除濕湯以風先勝其濕然後補益中州

形氣虛弱者補中益氣湯加風藥一二味如
風桂枝之屬補中以勝濕也崩血補之仍
不止者須防滑脫宜地榆苦酒煎以止之止後
隨證施治可也

膠艾四物湯見月經行四

知蘇四物湯本行一

荆芩四物湯本行二

桃紅四物湯見月經行六

琥珀散見月經行二七



煉蜜丸每服丸數量虛實增減

澤瀉葉湯十二

澤瀉葉 三兩

青歸酒洗

白芍藥 酒各二兩

甘草 五錢

右為粗末每服五錢水二盞煎一盞溫服

柏子仁丸十三

柏子仁 炒研

牛膝 酒洗

卷柏 各五錢

澤瀉葉

續斷 各二兩

熟地 三兩五錢酒浸透石白



薑附苓歸湯本門四

補中益氣湯見月經門四八

益胃升陽湯本門五

調經升陽除濕湯本門六

地榆苦酒煎本門七

救血心痛二

崩血而心痛甚者名曰救血心痛由亡血過多心
脾無所榮養間有瘀血凝結不散者必有形跡可
徵若因小產去血太甚以致心痛者緣由雖二其

致一也

若因血滯不散者失笑散先定其痛後隨證施

如因去血過多歸脾湯人參養榮湯十全

補湯等乃治此之神劑

失笑散本行八

歸脾湯見月經行十四

人參養榮湯見月經行二二

十全大補湯見月經行二四

崩漏門彙方



知 藥 四 物 湯 一

生 地 酒 三 錢 洗

白 芍 酒 三 錢 炒

知 母 酒 炒

水 煎 溫 服

荆 芥 四 物 湯 二

生 地 酒 三 錢 洗

白 芍 酒 二 錢 炒

荆 芥

當 歸 頭 錢 五 分

川 芎 錢 五 分

黃 蘗 酒 一 錢 炒

當 歸 酒 洗

川 芎

黃 蘗 酒 炒



香附 各一錢

水煎溫服

加味歸脾湯三

人參 一錢

茯苓 一錢

杏仁 二錢

歸脾 錢五分

吳草 八分

柴胡 五分

白朮 二錢

黃芪 二錢

遠志 六分
甘草 水浸去骨炒

木香 三分

龍眼肉 一錢

山梔子 一錢



丹皮一錢

加薑棗水煎食遠溫服

薑附芎歸湯四

當歸酒洗五錢

薑炭錢五分

水煎溫服

益胃升陽湯五

黃芪二錢

蜜炙

白朮

土三錢炒

川芎二錢

附子錢五分炮

人參一錢

神曲錢五分炒

膏歸 酒洗

炙草 各一錢

柴胡 各五分

陳皮

升麻

生黃芩 二錢

右為鹿麋末每服三錢或五錢如食添再加之
如食減只服三錢或更減之不可多服水煎
去滓熱服

熱者用黃芩寒者減芩加肉桂一錢腹痛加
白芍有嗽去人參

調經升陽除濕湯六



黃芪

羌活 各錢五分

藜蘆

升麻

柴胡

炙草 各一錢

獨活 五分

蔓荊子 七分

水五盞煎一盞去滓稍熟服空心服果待少
時以桑膜壓之

地榆 苦酒煎七

地榆 頭 一兩



醋煎露一宿次早溫服立止止後隨證調治
之苦酒即醋也

失笑散

五靈脂

蒲黃 各等分

右為末先用醋調二錢熬膏入水一盞煎
至七分食前熱服良驗

