

胎產秘書

上

大英圖書館藏本



句章劉暢園重校刊

昌黎先生集

育德堂藏板



同治戊辰
仲冬開曆

胎產最為要候、卷帙不繁、採輯精詳、凡
仕商定所共珍、然竊慮鄉隅未能徧備、
希四方藥鋪各置是編、以便就近遇症
檢方、購藥同行利濟云爾。

序

天地之大德曰生人。百計圖維扶術以謀生者。壹是皆以養生為本。然衣食水火之需。固人所賴以得生而一不可少。至岐黃一道。猶為生人此。因切若夫存利濟之心。明微渺之機。學有淵源識。

超庸衆見一病而立一方靡不桴鼓相應是深體天地之心而以生之不息之旨者也法具靈素及諸前賢於究心於學老不能知亦不能作述也余自道光己亥受業於月笙馮先生每于讀書闇然先生好談岐黃家言因而自靈素仲聖

及諸賢名書究心玩索遇各時賢之嘆
不降心探討每恨質魯未能多所領畧
猶幸遇疵尚稱以心應手犹窮慮疵之
亟急亟危如胎產諸疵成法雖散見諸
名家法言之中而採輯專科裒成一帙
者卒鮮徧搜訪間杳不可得歲丙辰究

於滬江傷臘蕭山施氏重刊古雲何杏
園先生胎產秘考未詳輯自何人細閱
之其叙述簡而確其採方約而精底皆畢
具藥道宜忌真胎產之寶筏也因憾
其刻佈他邦未嘗惠及本省每以重付梨
棗力有未逮迄西遷授以余藏訛書皆遭

星散章此卷以保其遺稿有數存乎
其間是以勉力付梓公於世以廣流傳
庶安置一編遇賜產危急之時抑瘳稽
方轉危為易於天地生人之大病不然
小補兼復有增入諸家症驗方補遺使
杏園尚在見之不亦快乎是為序

皆

同治七年戊辰季夏

慈水後學暢園劉榮識



胎產秘書序

昔予束裝遠遊從事吏治每好取古
人經驗良方裒輯成帙而于胎產一
書尤爲汲汲窃謂三月而孕懷胎之
始自胎前臨產產後往往氣血不周
諸症百出此留心濟世者所以集醫
方之良而視爲急務也顧碌碌迄今

有志焉而未之逮頃者得晤舊雨何
杏園先生出所刻胎產秘書凡一切
症候無不畢載而其方皆斟酌盡善
見效于時若據左券閱之不勝狂喜
然杏園所遊之地旣鋟版而行世矣
而流傳未廣江以南見者闕如予滋
憾焉夫有聞而未見與見而非隨感

立應者均不足異若旣見其書而又
能神效速至歷歷可據便不爲之廣
其傳非濟世之心亦非予平生之志
也亟重付束梨庶由茲以達于四方
人置一編家無產患不特夙願爲之
一快卽質諸杏園應亦拊掌一大噱
否

嘉慶十九年歲在甲戌月

蕭山新田書于蘇垣泉署



此印本是吳兆宜所藏，其後歸又

胎產秘書原序

症之至危而治之甚難者莫如胎產未產而保衛之已產而調護之此其道失之毫釐謬以千里者也吾鄉山陰錢氏及蕭山竹林寺僧獨擅其道以行於世遠近就醫如市賴以生活者不可勝計第其方書秘而不露無能窺其奧咸爲悵然卽今之達生篇雖善但何症應作何治尙未詳備余自成童卽留心胎產前於受業師陳勿庵先生家得其珍藏秘本細加披閱內分胎前臨產產後三門復附保

嬰要訣其別類也詳其論症也確其立方也精較之達生
篇更爲盡善而盡美此治產之寶鑑濟世之良書也然後
知錢氏及竹林寺僧擅腎獨步者其方書均出於此矣誠
使是書家置一本臨時翻閱驗症引方則安者不至於危
危者可轉爲安其有益於人世豈曰小補之哉是書余於
乾隆乙卯遊幕楚南與陳百樓先生同館岳陽郡署已付
剞劂公之於世旋赴粵西又之黔之滇所攜刻木出以與
人依方治病無不神效然藏板星沙終以不得遍行海內

爲未愜於心茲遊皖江復遇好善樂施諸公因而重鐫以
廣流傳夫利一身者一身行之利天下者當與天下共
是書他日自邇迄遠轉相鐫刻俾得人人而濟之尤余之
所厚望也夫

時

嘉慶十四年歲次己巳七月旣望古虞杏園何榮撰



胎產續要目

症宜審辨

胎動胎漏欲墮

濟陰返魂丹用引法

安胎須理氣養血

分經養胎

胎墮半產明辨

胎氣上逼熱痛下血

跌仆動胎

胎前病因辨

欲墮預保

半產墮胎後治法

鬼胎腸覃石瘕

滑胎催生備用方

試胎弄胎腹痛辨

產難五辨治法

橫生逆產

胎衣不下

死胎不下

未足月死胎不出

產後虛實

千金不易牡丹方治法

產後玉門不閉

產後子腸不收

產後腸痙

產後昏暈

產後敗血上沖

胎產續要

慈水劉 荘暢園輯

胎產在冬夏大寒大熱之交猝時起病證與書有不合者
自宜延醫審定有寒暑感挾須當兼治若氣序清和症與
書合自可依方服之其有症闕險危法稍未周茲復博搜
後賢諸良方補入庶不苦束手無措第暢識見有限惟希
博識諸公遇有得心應手良法惠刻編內其成利濟則幸
甚矣

胎動不安胎漏欲墮腹痛者銀亭酒最宜若審其血熱加生地黃芩白芍涼血氣熱加竹葉知母山梔清氣寒則艾附鹿霜溫之虛則參木杜仲補之兼鬱香附砂仁橘紅調之兼逆厚朴陳皮腹皮降之法具編內擇而用之

銀亭酒

白紋三兩 青苧根一二兩 陳酒一杯水煎服

濟陰返魂丹光

專治胎產百病不拘丸數以愈爲度真神方也

胎前臍腹刺痛或作聲米飲下 胎動不安或下血當歸
湯下 產後臍腹刺痛童便下 胎衣不下或橫生逆產
或死胎不下炒鹽湯下 眩暈熱渴煩悶譖狂不省人事
或塊痛寒熱面赤煩心及惡露上沖心胸刺痛童便和酒
下薄荷自然汁亦可 瀉血水棗湯下 赤白痢米湯下
隨崩漏糯米湯下虛加黃芪四錢 赤白帶阿膠二錢
艾葉一錢煎下 月水不調或閉酒下 中風牙緊半身不
遂失音不語童便下 氣喘咳嗽嘔逆吐酸面目浮腫脇

疼酒下 大小便不通煩躁口苦薄荷湯下
此尤卽端日小暑六月六日採益母莖葉陰乾焙研煉蜜
丸價廉功大服之立驗本堂採收遵法丸備各處藥店均
宜遵期採收尤備庶無力醫藥者遇症按引送下不致一
時失治并婦女經閉不調及男女久近跌撲內傷停瘀每
逢天陰地潮損處作痛大人小兒尿血皆極效也不可以
其賤而忽之

受孕以後三焦氣血壅滯蓋腹爲胎阻衝脈氣逆肺降肝

升脾胃行運之氣不復調順因而水飲積聚煩悶喘急嘔逆諸症並起故安胎養血必需順氣如枳朴蘇陳砂仁及理飲驅水用芩术半夏腹皮且氣滯自必血熱芩芍側柏阿膠又必須也

巢氏分經養胎謂一月足厥陰肝二月足少陽膽三月手厥陰心主四月手少陽三焦五月足太陰脾六月足陽明胃七月手太陰肺八月手陽明大腸九月足少陰腎十月足太陽膀胱按木火土金水相次生成從來安胎劑中鮮

有論及准葉氏案中頗有兼顧究心胎產者宜按月分理之

胎三月未成形曰墮五七月成形曰半產亦曰小產其欲墮也勢猶大生必先腰腹痛而血下依半產條已墮未墮治之若但下血則爲胎漏但腹痛不連腰且無下血則爲腹痛切勿妄指胎墮當各依胎漏腹痛條治法服藥又跌外傷動欲墮者佛手散送濟陰丹丸

佛手散

見二卷

一方治胎氣上逼熱痛下血煩悶用葱二十莖水濃煮飲之胎未傷卽安已傷卽下未效再服

一方頓仆動胎腹痛下血欲墜川芎末二錢酒送二三服又方砂仁連皮炒研每服二錢米飲下服後不下卽安

胎前無虛產後無病蓋胎前全賴脾胃強壯水穀多進氣血自能生旺胎元日充臨產安順故妊娠首宜調脾若胎前脾強而復多病定由勞慾或七情所致宜節勞戒慾併調七情高安夢周者歸附凡神仙附益凡不時服之非僅

調補且免小產產後諸症也

歸附丸

香附一觔

全當歸十兩

鹿角二兩

醋煮干

酒炒

去皮炒用霜亦可

共研末醋丸每三錢早晚白湯下

此丸兼能種子服一月成房卽至屢經試驗

神仙附益丸

香附一觔

童便浸透水洗露一夜晒干醋炒

益母草十二兩

焙研

再用香附四兩

艾一兩

煮汁全醋丸每空心下二錢

屢胎欲墮由中衝脈虛滑預爲保固千金保胎丸

千金保胎丸

白术

土炒熟地

姜汁炒

杜仲

姜汁炒

當歸

續斷

酒炒

阿膠

蛤粉炒

四製香附

益母草

條芩

炒

各二兩

陳

皮川芎

艾葉各一兩

砂仁炒

五錢

右爲末煉蜜丸空心服二錢

半產墮胎後惡血續下宜生化湯逐瘀生新倘下血不止
面黃唇白症見血脫者宜獨參湯固之無力服參以桂圓

代之氣喘和童便一杯降之如瘀滯不行腹脇脹疼壯實
回生丹逐之虛者益母丸導之

鬼胎卽腸覃石瘕之類猶受孕狀抑非瘕覃亦由邪思結
成何曾真有鬼交經云按之則堅推之則移月事以時下
此其狀如懷子起若鷄卵而漸大經文明謂寒客腸外與
氣搏聚而成腸覃也經云石瘕寒客子門子門閉塞氣不
得通血當下不下衄以留止日以益大月事不以時下經
以兩者皆可導而下但腸覃氣被寒阻止爲氣病故血下

石瘕氣病及血併血不下腸覃香稜湯石瘕吳萸湯鬼胎
由邪思結成者平胃加辰砂人參虛再加黃耆當歸白朮
白芍紅花治之

香稜丸

丁香 木香 蕃香各五錢 川棟肉 青皮 三稜

酒浸

炒枳壳 蓬朮各一兩
巴豆三十粒全炒豆黃去之

醋煮麵丸桐子大硃砂爲衣每服三十九姜鹽湯或酒下

吳萸湯

吳萸二錢 細辛

官桂一錢 姜半夏三錢

防風

茯苓

丹皮

炙甘草八分

乾姜一錢

青皮八分

藁本錢半

木香六分

滑胎書內卻有無憂易產兩方然慮法猶未備今採歷驗者附刻以便擇用

神滑散

乳香五錢

枳壳一兩

研末蜜丸每二錢臨月預服

達生散

人參

白芍

腹皮

各一錢半

歸身

錢半

陳皮

炙甘草

各五分

蘇葉

八分

葱

五莖

黃楊樹梢

七個

春加川芎

夏加黃芩

各一錢

秋加砂仁

枳壳各五分

便產神方

歸身

錢半

川芎

錢三

炒枳壳

六分

艾葉

五分

川朴

姜炒七分

川羌

五分

川貝

去心

荆芥

八分

黃耆

蜜炙七分

絲子

一錢酒洗

炙甘草

五分

白芍

錢三

七八九每月服四帖臨月再服四五帖易產且無產後諸病

試胎月未足而腹痛痛定如常弄胎月足腹痛而腰不痛時作時止

難產有五一因胎前安眠少動作行走二因臨時膽怯心虛氣沮三因用力太早欲生反因乏無力以送四因傷胞血出血壅產路五因胞漿破早血液乾枯此外又有時值嚴寒氣血凝滯一症急以川芎三錢當歸五錢紅花一錢

加酒煎服外以椒葉吳萸煮湯用綿帛乘熱漬熨少腹上
下溫則易之內外交治氣血溫通自能安產其五難須細
辨分治採各方列右

一難宜紫蘇飲

見一卷子懸條

血虛者奇效湯

奇效湯

川芎

當歸

益母草

各五錢

白芷三分

丹參

菟絲子

車前子

各二錢

二難三難三合湯

人參

乳香

研去油

菟絲子

車前子

各三錢

白芷

八分

川芎

三錢

當歸

五錢

辰砂

絹包一錢

丹參

益母草

各半錢

四難奇效湯

見一

送如神散

金心百草霜

香白芷

等分

研末

薛氏云此散大能固血治逆產橫生其功甚大每服三錢童便米醋調和如膏用沸湯下

五難肝蜜飲

猪肝

六兩

上白蜜

三兩

酒水各三碗

煎二碗

頻飲

、

又膠滑煎

驢皮膠 當歸 冬葵子 滑石 每五錢 酒水煎

上五症服藥後再有經日不生者

真真雲母粉 五錢 溫酒調服百試百驗

橫生逆產如神散 見四難 每日不生力乏者

神效參乳散

人參 培 乳香 去油 明辰砂 飛淨 各一錢 研勻 和鷄子白一

枚生姜自然汁三匙攪勻冷服子母俱全

胎衣不下奪命散

沒藥去油

血竭等分

研勻童便和酒服

服後再或不下牛膝湯

牛膝

瞿麥各四兩

歸尾

通草各六兩

滑石八分

葵子五兩

桂心二兩

水九升煮三升旦三服

此方起死回生服後立下

死胎不下虛者決津煎加朴硝

決津煎

當歸 五錢 熟地 三錢 牛膝 一錢 澤瀉 錢半 肉桂 一錢

烏藥 一錢 朴硝 五錢

赤足月死胎不下 萸歸加麝湯

川芎 三錢 當歸 丹參 益母 各五錢

麝香 五分 夏加大黃 三錢 冬加桂心 一錢 後煎

產後虛實宜審朱氏以大補爲主雖有他症以末治之張氏以不可作諸虛不足二說各有深意醫者宜詳參症脈有無瘀痛而細究之則從虛從實自有主見萬勿輕忽悞

人

附子金不易牡丹方治產後十三症

當歸

三錢

川芎

生地

澤蘭葉

香附

醋炒

益母草

延胡

各錢半

胃風加防風天麻血量加五靈脂

醋炒

荆芥穗炒三四日

後發熱加炮姜炭參耆心胸迷悶加枳壳砂仁砂加地榆黑山梔丹皮嗽加桔梗杏仁桑皮血瘀不行腹硬加紅花枳實桃仁食滯加楂肉麥芽脹滿加白朮蒼朮茯

斧川朴陳皮枳壳砂仁恍惚加茯神遠志各一錢胎衣
不下加朴硝三錢

產後玉門不閉

吳萸 菟絲子各八分蛇床子五分硫黃二錢煎洗

子腸不收

活鯽魚煮焙研細半搽腸半酒服卽收

產後腸痙不可忍

用針線袋放腹下或翦繖亦可勿令知之

張璐玉云產後元氣虧損惡露乘虛上攻眼花頭暈或心
下滿悶神昏口噤痰涎壅盛者急用熟童便主之或血下
多而暈昏亂者芎歸湯加人參澤蘭童便補散之

秦天一云敗血上衝有三或歌舞談笑或怒罵坐臥甚則
踰牆上屋此敗血衝心多死花蘚石散或琥珀黑龍丹如
雖悶亂不致顛狂者失笑散加鬱金若飽悶嘔惡腹滿脹
痛者此敗血衝胃五積散或平胃加姜桂不應送來復丹
嘔逆腹脹血化爲水者金匱下瘀血湯若面赤嘔逆欲死

或喘急者此敗血衝肺人參蘇木甚則加芒硝蕩滌之大
抵衝心者十難救一衝胃者五死五生衝肺者十全一二
又云產後面起黑色在口鼻劙者是胃氣虛且敗而血滯
也急用人參蘇木稍遲不救

血上沖心但滿悶欲絕以乾漆燒烟薰之進卷荷散

花蕊石散

花蕊石四兩硫黃一兩研細泥封煅赤每一錢童便下

琥珀黑龍丹

當歸 五靈脂 川芎 良姜 熟地各二兩判碎砂

鍋內紙筋鹽泥

固濟

百草霜 一兩

硫黃 乳香各二錢

琥珀

花蕊石 各一錢

研細醋糊丸子大用一二丸火煅紅

投生姜自然汁浸碎童便和酒調灌下

失笑散

蒲黃 五靈脂 飛加鬱金

五積散

白芷 陳皮 川朴 當歸 川芎 芍藥

茯苓 桔梗 蒼朮 枳壳 半夏 麻黃 乾姜

肉桂 炙甘草 姜 葱

平胃散

見二卷死胎不下條

胎動不安

來復丹

玄精石 硫黃 硝石 五靈脂 青皮 陳皮

金匱下瘀血湯

大黃 桃仁 壬虫

子滿

本工 電出

電機 電燈 電線 電氣 電文

長

電工實驗工本

外員直、製、燭

電工實驗工本 製、燭

胎產秘書上卷目錄

胎前總論

惡阻

胎動不安

胎動腹痛

胎漏下血

漏胎

跌撲動胎

小便帶血

子淋

子腫

子滿

子懸

子煩

子嗽

子瘡

子癟

子瘡

外感風寒

霍亂吐瀉

下痢

熱症

因怒滿悶

小腸重墜作痛

小腹虛脹閉滯

胎漏腹痛欲瀉

胎驚心悸氣促脹痛不安

頭旋目暈壅將危

雨月不明頭項脣痛

產後總論

生化湯論

惡露

產後用藥十誤

產後血暈

產後厥逆

暈厥總論

產後血崩

產後類傷寒三陽症

產後類傷寒三陽症

產後類中風痉症

產後癰瘍症

產後類瘧

產後疝症

產後汗出

產後氣短發喘

產後咳嗽

產後譫語

產後怔忪驚忡

產後忿怒

產後傷食

產後泄瀉

產後痢症

中論瀉痢十方

產後嘔逆

產後霍亂

產後膨脹

產後口渴兼小便不利

產後便數麻症

產後傷脬小便淋數不止

遍身刺痛喘滿筋攣

因失血類中風症

心煩腹脹百節酸痛小便閉澁

半產

腹中兒啼

乳吹

轉脬

不宜服渡胎方辯

胎前脉法

胎前禁藥歌

附增異症

胎形

胎產秘書中卷目錄

臨產總論

臨產脉法

楊子建十二難產論

將產昏倒

交骨不開

死胎不下

胎衣不下

胎衣不下調護法

既產調護法

集催生諸方

王叔和難產死歌

王叔和生死脉歌

新產禁補

產後水腫

產後熱蒸成勞瘵症

產後心腹痛

產後遍身疼痛及腰腹痛

產後乳癰乳癰

產後流注

陰明腫痛

陰門突出

產後陰門發痒

產後陰門生瘡

乳汁不通

消乳

產後諸累症

下物如鉢

下物如加

下物如帕

下肉線

乳懸

陰挺下脫

產後癰疽并內外腸癰

產後狐惑

產後脫肛

產後頭癱鼻淵

產後總三方

胎產應製藥味

附保嬰要訣目錄

夢生

拭口法

斷臍法

米牙

臍風

哺乳法

護兒法

最口
夜啼

稀痘方

擬石城

序

墨子論

序

齊東野語

序

遊風

序

歐陽文忠公集

序

胎產秘書

山陰六芳余黃
蕭山學誠施太平同校對

胎前總論

凡孕婦脾胃健旺氣血充足。則胎安產順。毋庸用藥調理。
惟稟不足。而氣血衰。脾胃弱。而勞役過。以致諸症百出。不
得不資藥力矣。肯舟奚定補母安胎之方。以補氣血爲主。
以順氣清涼爲佐。麥芽黃芩爲安胎之聖藥。芎歸熟地爲
補血之良劑。加以蘇陳等味。定爲常服主方。至胎成六月。
茯苓性降。不宜多用。黃芪肥胎。不可常加。香附雖快氣疏

肝過則耗氣無補。砂仁能止嘔逆。定痛多亦動血行胎。此誠先賢之法戒。後學之準繩也。而猶以爲未備。因分晰胎前諸症。擬成數十餘方。以便臨期酌用。

胎前症治

惡阻

凡妊娠一二月。惡阻嘔逆。煩悶嗜臥。卽俗所謂癩兒也。此由婦人本元虛弱。平時喜怒不節。寒暑不調。中腕宿有停滯。積飲受孕。經閉。飲食相搏。氣不宣通。以致心下煩悶頭

眩眼花。四肢倦怠。闇食即吐。喜酸嗜鮮。多臥少起。甚至嘔逆不食。法當順氣理血。豁痰導水。而諸症自除。以加味參橘飲治之。

加味參橘飲

人參一錢 白朮二錢 砂仁三分 厚朴一錢

橘紅四分 當歸一錢 香附五分 甘草三分

姜三片 竹茹一丸 若無力。服參去之亦可。或方

內加全夏麴八分

胎動不安

凡妊娠二三月胎動不安者。蓋因子宮久虛氣血兩弱。不能攝元養胎。致令不安。欲墮急服安胎飲以保之。若先經墮過者。可先服大造丸。繼服杜仲丸。庶無半產之患。

湯氏云。半產多在三五七個月。如前次在幾個月墮者。後必如期復然。故當追算前在三個月墮者。即於未墮半月前。先服清熱養血固胎之藥敷帖。以補其虛。五月七月墮者。亦於未墮半月前。預先服藥方保平安。此據

受孕後來熱者而言。蓋三五七條陽月。緣人能銷燬故也。

安胎飲

人參一錢虛者倍用。當歸二錢。熟地三錢。
條芩一錢。川芎七分。白朮二錢。陳皮四分。
紫蘿四分。甘草四分。元棗二枚。

如虛肥人陳皮去白。加川連五分。如脾胃瘡漏加蓮子
十粒砂仁五分。川連五分去熟地黃芩。怒而多漏。如
炒

木香三分 湯加麥冬二錢 怨仲驚悸加棗仁二錢

益智仁一錢 龍眼肉十個

大造丸

紫河車一具 清水洗淨炙酥

杞子一兩 人參一兩五錢

當歸二兩 麥冬一兩三錢 天冬一兩 益智一兩

茯苓二兩

五味五錢

熟地 炙炒二兩

川膝五錢

山藥八錢

兔絲子 炙水炒四兩

川柏

黃水炒一兩

其爲末密煉丸如桐子大白滾湯送

下五十九。

杜仲丸

杜仲 姜汁炒川斷酒浸各等分爲末。煉蜜爲丸如桐子大。米飲湯送心下五六十丸。

又方

杜仲三錢 川斷三錢 水煎服名爲泰山磐石飲。

胎動腹痛

凡妊娠胎動腹痛者。或因飲食冷執。發動風毒。物或因交

感搖動骨節。傷犯胞胎。或因服藥太過。血氣不調所致。宜服順氣補血之藥。如加味安胎飲。或如聖散。

加味安胎飲

砂仁炒

麥冬

條芩各一錢

人參

當歸

熟地各二錢

陳皮

紫蘿各四分

生白朮

一錢五分

甘草三分

大棗一枚

生姜三片

水煎服

此方凡姪娠元氣不足。精神倦怠。胎動不安。或身上微熱者。並宜服之。心一日兩服。方可平安。如腹痛者去。

麥冬加蘄艾 醋炒黑七分或再加四製香附一錢 蓋氣
通則不痛也。如咽燥多痰兼失血者加川貝一錢五分

黑荆芥一錢

如聖散

鯉魚皮 阿膠 當歸 川斷各二錢熟地三錢

白芍一錢川芎一錢

甘草六分 加葶麻根少許

生姜五片水煎空心服。

胎漏下血

月言 卷一
凡妊娠胎漏經血妄行。此是胎息未實。或因勞役過度。傷動胞胎。或因房室驚觸。致令子宮虛滑。經血淋漓。若不急治。日漸胎乾。子母不保。急服寄生散。或參歸飲。或阿膠湯。陰湯。或保產無憂散。

寄生散

寄生 川斷 阿膠 香附 黑人參 白朮 川芎
各等分。加姜五片。水煎服。

參歸飲

人參 當歸 寄生 淮生 淮熟條芩 香附

茯苓

阿膠各一錢

川芎五分

生甘草五分

白芍二分

黃芪一錢半 黃楊葉三片

生姜二片

水煎服甚者日進一劑

阿膠濟陰湯

阿膠

白朮各一錢

地黃

白芍 當歸 川芎各

錢半

砂仁帶壳五分

條芩 蘆薈各錢半

香附八分

炙甘草五分

用方利害
卷一
黏米一撮水一湯碗煎至一碗溫服如血塊加地榆
腰痛加杜仲觸患胞胎加金銀花須一日一夜三服以
防敗血攻心如血不止加川斷一錢炒黑荆芥一錢五
分黑大豆四十九粒如因傷瘀而痛怕按者加桂心三
四分

保產無憂散

生綿蓍一錢半
兔絲餅一錢
羌活七分
厚朴七分
甘草二分
歸身一錢
酒炒
七分姜只壳六分
汁炒
麵炒

斷艾七分醣炒

荆芥穗一錢川貝一錢

白芍酒炒

冬月八分夏月一錢日進二劑亦可此方兼可催生

不見血加生姜一片

紫蘇

甘草

各四錢

漏胎

斷艾

田昔各三分當歸一錢熟地一錢

半錢

凡受孕之後經血不時點滴謂之漏胎蓋由勞傷氣血虛弱之故或因惱怒或食炙燙熟物所致宜補中安胎飲
補中安胎飲

條芩

白朮人參各三錢熟地二錢當歸

錢半

白芍一錢 生甘草五分 蔓梗八分

跌撲動胎

凡妊娠跌撲動胎下血不止急服安胎參蘿飲

參蘿飲

人參 蘄艾 川芎 各三分 當歸一錢 條芩 生柴
不各二錢 陳皮 柴蘿 生甘草 各四分

阿膠一錢 有外感者加葱白四寸 腹痛減斷艾加砂

仁四分

小便帶血

凡姪娠小便中帶血此由形體勞苦或過食炮炙之物所致宜清膀胱之火服加味逍遙散

加味逍遙散

當歸 白朮各二錢 柴胡 白芍各一錢 丹皮
茯苓 桃子各七分 生甘八分 加燈心七莖

子淋

凡姪娠小便淋漓此由調攝失宜酒色過度傷損管衛致

卷一
令子宮氣虛而然又或下焦有熱而閉者名曰子淋宜
服安榮散

安榮散

當歸五錢 滑石一兩 通草二兩 入參三錢

麥冬二兩 細辛一錢 炙甘 燈心各五錢 共爲

末每服四錢白湯下

又方用桑螵蛸爲末每服一錢空心米飲湯下

又方用陳米泔濃汁服之此方并可治男子癃閉

按此症由飲食無忌熱積膀胱者居多湯氏用古芎歸
湯加木通麥冬人參燈心甘草滑石治之如清涼通
利等藥不效卽用補中益氣湯加淨車前子益中氣
一提則下竅自開况車前利水通淋一提一降自然見
效補中益氣湯見子滿條下

當子腫

臘首大長

榮蘇

東史卷四

凡妊娠面目虛浮四肢有水氣名曰子腫蓋由脾胃虛弱
所致宜服金生白朮散或鯉魚湯

全生白术散

人參一錢 白术二錢 茯苓皮八分 甘草三分

當歸二錢 川芎八分 紫蘿陳皮各四分

生姜三片水煎服或加蒲種壳一錢或乾浮萍一錢生姜用皮并加冬瓜子三錢

鯉魚湯

鯉魚不拘大小二三尾洗去鱗用水煮熟去骨每服用湯一大鍾煎後藥服之

當歸 白朮各五錢 茶芩四錢 陳皮二錢

每服四錢加生姜七片投魚湯內煎服以愈爲度

湯氏云子腫於五六個月時多有之或腹大高過心胸氣逆不安此由胎中蓄水所致若不早治必然生子殘疾

子母難保常煮鯉魚粥食之

朱昂陽云黑體魚亦可代鯉魚

天子滿

凡妊娠腿膝浮腫脚面足指出水氣促滿悶此由脾虛血化成水所致名曰子滿又名子氣宜服加味天仙籐散如

脾氣弱甚者宜服補中益氣湯

加味天仙藤散

天仙藤洗畧炒六分 木瓜一錢 香附六分

紫蘿陳皮各四分 烏藥七分 甘草三分

水煎服虛甚加人參一錢 當歸 白朮各二錢

補中益氣湯

人參 炙芪各錢半 炙甘五分 白朮 歸身各一錢

陳皮七分 柴胡 升麻各三分

或加川椒目一錢 净車前一錢更佳水煎服

按妊娠七八個月兩足浮腫乃胞漿水濕下流之故其
微腫者名曰皺脚得之易產其腫甚或由黃水者始服
補中益氣湯

子懸

凡妊娠胎氣不和上湊心腹漏痛難忍謂之子懸以紫蘋
散治之

紫蘋散

紫蘿陳皮白朮腹皮當歸川芎各等分

人參甘草各減半姜五片葱白五寸水煎空心服

一方以蓮房燒灰酒送下

安胎順氣飲卽前方去腹皮加砂仁三粒木香三分
磨汁加姜煎

按受孕至三五個月斯時相火養胎火盛胎熱則氣逆
湊心多有此症

子煩

凡妊娠心驚胆怯煩悶不安名曰子煩宜服竹葉安胎飲
竹葉安胎飲

人參三分 白术 條芩 當歸各二錢

棗仁

遠志各八分 陳皮三分 川芎七分

生甘四分 生地錢半 麥冬一錢 竹葉十片

姜棗引 有痰加竹瀝姜汁虛甚人參倍用瀉加芡實

減生地

按此症亦多在四五個月之時相火用事或因夏令君

火大行俱能乘肺以致煩躁 湯建中云相火者加
知母因君火者加川連

子嗽

凡妊娠子嗽因外感風寒者參蘓飲去人參半夏加桑皮
杏仁因火乘肺金者二陳湯去半夏加苓連枳桔貝母痰
而喘者加萎仁前胡桑皮如咳嗽吐血不止者用生地飲
如風壅相攻留滿久嗽者用百合散

加減參蘓飲

蘿葉

杏仁

橘紅各一錢

只壳炒七分

前胡八分

木香三分

桔梗

乾葛各七分

桑皮七分

甘草四分

水煎服喘加葵仁二錢

加減二陳湯

枯芩二錢

川連

橘紅

川貝

茯苓

桑皮各一錢

前胡七分

石斛八分

只壳甘草五分

瓜萎一錢

生地飲

五甘草四分

升麻八分

葛根一錢

知母一錢

天冬一錢

生地三錢

犀角三分

白芍八分

葛根八分

知母八分

天冬八分

麥冬各二錢
黃芩八分
桔梗八分
當歸一錢

紫苑錢五分
甘草四分
喘加瓜蒌一錢

百合散

百合二錢
桑皮七分
前胡八分
桔梗七分
芍藥一錢

赤苓八分
貝母一錢
橘紅一錢
甘草五分

生姜引水煎服或加紫苑款冬

子瘡

凡妊娠病癟多由營衛虛弱脾胃不足或感風寒或傷生

冷傳爲瘧疾名曰子瘧宣服驅邪散熟多寒少者清脾飲去半夏寒少熱多者人參養胃湯去半夏久而虛者四獸飲主之

驅邪散

霍香

白术

茯苓各等錢

甘草

草菓

少許

知母一錢橘紅八分砂仁八分姜棗引如有表邪者加薄荷八分葱白五寸或加柴胡八分

清脾飲

白术 茯苓 知母各一錢 青皮四分 厚朴八分

黃芩或甘草五分 生姜爲引 水煎服 原方有柴胡

人參養胃湯

人參 蒼朮 霍香 厚朴 各一錢 陳皮一錢五分

草果六分 茯苓一錢二分 焦甘五分

姜引或加烏梅一箇

四獸飲

人參一錢 白朮土炒二錢 茯苓一錢二分 焦甘五分

陳皮一錢二分草菓八分元棗三枚姜一片烏梅三個
或加當歸二錢虎骨膠二錢如無膠用虎骨六錢以上
各方虎骨當歸均可加入

子癇音閑卽胎風一名兒暈又名癲

凡妊娠口噤項強手足攣搐高語蹇濶痰壅盛不省人事名曰子癇切不可作中風治宜服加味羚羊角散或加味地黃湯如無痰涎言語如常但見中風形狀此緣血少類風如以風藥投之貽害不淺

加味羚羊角散

羚羊 當歸 防風 獨活 茯苓 薏仁 五加皮
各一錢 米仁五分 杏仁八分 甘草 大香各三分

葱白五寸 姜五片 煎服虛加人參 痰加竹瀝姜汁

脾虛加炒白朮 風痰湧甚加天竺黃一錢 川貝一錢

加味地黃湯

大熟地姜汁砂仁拌炒八錢淨萸肉四錢懷山藥四錢
茯苓三錢丹皮三錢澤瀉二錢陳胆星一錢吳茱萸三分

川連五分者汁泡七次炒一錢荆瀝冲服

子瘡

音因

凡妊娠三五個月忽失音不語者胞絡脉絕也名曰子瘡
蓋胞繫於腎腎脈貫舌故失音此非藥可治分娩卽自
出聲 湯建中云前症俱由妊娠脾土不運而生濕濕
之癥痰生熱熱生風如子腫濕也惡阻痰也子煩子淋熱
也子癟風也子懸氣也轉脬虛也治法雖有清熱消痰
滲濕順氣疏風補虛之不同要不外去邪保胎四字爲

總訣也

外感風寒

凡妊娠外感風寒渾身壯熱眼花頭旋此因風寒格於肌表侵入脾胃傷損榮衛是以增寒發熱頭疼眼痛甚至心腹煩悶不可妄投峻劑只宜芎藴散表其寒邪

按婦人天癸未行屬少陰天癸已行屬厥陰天癸已絕屬太陰胎產一病治厥陰者溯化之源也故機要曰胎產病當從厥陰經論毋犯胃氣及上二焦謂之三禁不

可汗不可下不可利小便是也汗則痞滿下則傷脾利
小便則內亡津液中州枯燥故受孕三五個月時不可
用一毫辛散滑利之藥惟七八個月後倘有閉結乃敢
稍施以滑利之劑故上云不可妄投峻劑

加味芎蘿散

紫蘿 羌活 陳皮 麥冬 各一錢 川芎 白芍 各八
分 乾姜 生甘 各五分 加生姜二片 水煎服胎前宜清涼
乾姜還須忌用

霍亂吐瀉

凡妊娠霍亂吐瀉心躁腹痛宜服六和湯

六和湯

藿香

砂仁各五分

陳皮

茯苓

生甘各四分

人參

木瓜各一錢

扁豆二錢

杏仁十粒

夏曲六分

姜三片

棗二枚

竹茹一九

下痢

凡妊娠下痢赤白此由生冷傷脾鬱積傷胃以致濕熱相

干氣血凝滯其濕熱傷於氣分則下白積傷於血分則
下紅積腹鳴後重下痢頻急服姜連丸治之如腹中
疼痛心下急滿宜當歸芍藥湯或歸芍湯更佳

姜連丸

川連 白术 砂仁 阿膠 炮姜 川芎各一兩

只壳五錢炒 乳香三錢另研 共爲末加鹽楊梅三枚

醋少許打糯米糊爲丸如桐子大每服四十丸白痢淡
姜湯下赤痢甘草湯下赤白痢甘草生姜湯下按赤痢

可加銀花白痢腹痛可加青皮姜炒川連亦必不可少
不必分赤屬熱白屬寒拘泥於姜湯甘草送下也

當歸芍藥湯

當歸 白芍 只壳 麵炒山楂 各一錢 厚朴 八分

陳皮 紅木香 紅甘草 四分 黃芩 二錢 水煎忌生冷

歸芍湯

當歸 三錢 白芍 半生半炒 二錢 萊菔子 炒研二錢

廣木香 八分 柶榔 七分 只壳 八分 甘草 五分

淨車前一錢五分山楂砂糖炒一錢五分白痢加生姜

紅痢加白糖煎服積已清而腸薄不止始用川連丸并
阿膠參芪可也 热痢初起用馬齒莧一味不拘多少
煎當茶服亦效其馬齒莧葉青梗紅根白花黃子黑名
曰五方草又名五行草有奇功凡下痢俱可用

熱症

凡妊娠病熱嘔吐不食胸中煩躁宜安胎涼膈散如熱甚
發赤黑斑小便如血胎漸落將危者急以梔子石膏湯

救之遲則墮矣如火熱壅極心煩口渴者宜清心潤肺
湯

安胎涼膈飲

知母 麥冬 人參 芦根 葛根 黑梔 竹茹

葱白各等分水煎服

梔子石膏湯

梔子 黃芩 生地 各二錢 石膏 四錢 青黛 一錢

升麻 四分 荆豉 一錢 葱白 三斤 水煎服按本方

治發斑可加元參連翹各二錢或去石膏加犀角一錢
恐石膏重疊不化

清心潤肺湯

黃芩 柴子 麥冬 各二錢 知母 花粉 人參各一
錢
甘草 五分 犀角 三分 姜棗引按方內用人參恐火得補而
益熾治熱之方去之爲得

因怒滿悶

凡妊娠因多怒氣鬱脹滿悶或服順氣耗氣藥太過以致

滿悶益增者當散氣消悶散治之烏藥香附只壳砂仁等故須少用

散氣消悶散

人參一錢白朮二錢川芎三分木香磨汁三分蘿蔔

條芩 甘草各三分 姜三片水煎服

小腹重墜作痛

凡妊娠腹痛時作小腹重墜此緣氣虛下陷間有兼寒者宜加味安胎飲治之

加味安胎飲

白术 熟地 當歸 各二錢 陳皮 藥梗 川芎

甘草 各四分 砂仁 五分

兼寒者加吳萸 五分 乾姜

五分 水煎服或去乾姜加醋炒良姜七分 生綿芪一錢
五分 母丁香四分

小腹虛脹閉滯

凡妊娠小腹虛脹因食硬物傷胎胎既受病傳於脾胃胃氣虛冷下逼小腸若奔豚腰重或大便閉滯兩脇虛鳴

宜服勝金散溫中下氣胎自安矣

勝金散

吳萸 陳皮 熟單

乾姜 川芎 各二兩五錢

厚朴

砂仁

甘草各三錢共爲末

每服二錢加湯送下

胎冷腹痛欲瀉

凡妊娠胎冷腹脹兩脇虛鳴臍下疼痛欲瀉小便頻數九便虛滑此因胎已成形而多食瓜果生冷之物或當風取涼受不時之氣致令胎冷子身不安皮毛刺痛筋骨

拘緊而母有此病急宜安胎和氣飲治之

安胎和氣飲

阿子 麵煨

白朮各二兩

橘紅

白芍

木香

各五錢

良姜炒二錢

炙甘三錢

姜三片

陳米一撮

每服五錢忌生冷或加母丁香五分以去瓜果積

胎驚心悸氣促脹痛不安

凡妊娠心神怯悸睡夢多驚腸腹飽脹過時連躋急短氣促不甯此是胎氣既成五臟安養已久或因氣熱或因

嗁呼致令胎驚筋骨傷痛四肢不安急以大聖散治之
大聖散

當歸 川芎 麥冬 茯苓 各二錢 炙芪 人參
木香 甘草 各五分 姜三片水煎服

頭旋目暈痰壅將危

凡妊娠頭旋目昏頸項腫硬此因胎氣有傷熱毒上攻太
陽沉痛欲嘔皆項拘急致令眼暈生花若加痰壅危在
片時急以消風散治之

消風散

雨茶 甘菊 皂角 石膏 當歸 川芎 羚羊角

白芷 荆芥 防風 各等錢 甘草 八分 姜煎食後服

兩目不明 頸項腫滿

凡妊娠將臨月忽然兩目不明 燈火不見頭痛項腫不能轉頭 此由常居火閣衣襟臥褥伏熱在內或服補藥熱物太過致令胎熱而肝臟壅極風熱上攻入腦故見此症急以天冬飲子治之大忌酒蒜炙燙油膩一切辛熱

廢物否則眼不復明矣

天冬飲子

天冬 荆芥各錢五分 當歸 川芎 熟地 白芍

茯苓 知母各二錢 人參六分 五味十四粒

防風 菘蔚子各一錢 如病退間日一劑 切服 每日一帖

遍身刺痛 滿筋攣

凡妊娠遍身刺痛 脹滿此由五臟不利 血氣虛寒 因食生
冷或發熱增寒唇白面青筋脈拘攣 骨節酸疼 皮毛乾

澁氣急上喘大便不通嘔吐頻頻此危症也急以平安
散保之

平安散

厚朴、陳皮、熟地、甘草、川芎、木香各等錢

姜三片煨鹽一撮水煎服

因失血類中風症

即音內及傷也

凡妊娠因吐血衄血或被傷失血驚患口噤項背強直類

中風症宜服加減安胎飲

加減安胎飲

人參 白术 麥冬 當歸 熟地 天麻各二錢

防風

荆芥各一錢

陳皮

甘草各五分

姜三片水

煎服或加川貝一錢天竺黃一錢

心煩腹脹百節酸痛小便閉滯

凡妊娠面赤口乾舌苦心煩腹脹百節酸疼小便不通此

由恣意飲酒及食水菓魚肉一切腥羶熱毒之故以歸

涼節命飲治之

歸涼節命飲

苧根 白芍 當歸 川芎 麥冬 各一錢

生白朮一錢半 砂仁五分 甘草六分 粘米一撮

如中酒者加葛根一錢 積食者加山楂麥芽各一錢 小便閉者加赤苓腹皮各一錢 葱白引

半產

凡妊娠月未足而半產者由氣血虛弱臟腑皆虛加以病患相感情慾相擾以致精血攻衝侵損榮衛而胎無所

養與枯枝落果無異如旣墮以生化湯加減治之未墮而血行腰痛急以十聖散連進數帖或芎藭補中湯

十聖散

人參 黃芪各二錢 當歸 白芍 川芎 熟地

白朮各一錢 砂仁五分 川斷七分

甘草五分

姜一片棗一枚飯後多時再服忌惱怒并食生冷一切辛熱等物或加枸杞一錢半

芎藭補血湯

川芎 白术 呵膠 白芍 杜仲 人參 黃芪
五味 木香 各等錢 甘草 八分 加姜一片 杳二枚

方列漏胎下

按此症保胎無憂散連服七八劑一日兩帖更妙

腹中兒啼

凡妊娠臨月或九個月腹中兒啼者緣兒在母腹口含臍帶隨母呼吸姪母或將手拔高取物提出兒口臍帶故啼但令其母如男子作揖使臍帶仍入兒口卽不鳴矣或煎黃連濃汁呷之

轉脬

凡妊娠將足月脬爲胎壓轉在一邊以致臍下急痛小便不通但升舉其胎則脬仍還舊而水道自通宜六君子合四物湯去茯苓加半夏陳皮探吐以提之不宜專滑滲之藥產後亦有此症搗葱白鋪於臍上炙之立效

六君子湯

半夏

姜製

陳皮

去白

茯苓

甘草

五分

人參

白朮各錢

四物湯

當歸四錢酒洗 生地三錢白芍一錢半 川芎一錢半

乳吹

凡孕婦胎前兩乳硬腫疼痛寒熱並發者此名內吹乃督任不通經絡不和寒束毛竅氣閉血滯乳管阻塞治宜加減無憂散

加減無憂散

生黃芪三錢 當歸二錢 川芎一錢 兔絲餅二錢

厚朴

姜炒八分

只壳

麵炒

一川羌七分

荆芥穗一錢

川貝一錢五分

生甘一錢

遠志一錢三分

蒲公英一錢

五分

姜二片甚者加鹿角屑五錢

淨銀花一錢

服後飲紹酒

一杯

一方單用鹿角屑四五錢紹酒煎服

一方用豆腐皮一兩炙焦研末紹酒沖服

一方用遠志二兩煎紹酒時時服之卽將遠志渣搗爛鋪乳硬處再用葱姜搗爛和食鹽少許鋪遠志上用艾灸

七大壯重者用麻黃三錢小青皮二錢炒研末紹酒調
服凡產後乳略皆可照前方用未滿月者宜用
不宜服瘦胎方辯

凡妊娠臨產艱難者大率由口饜甘肥身耽安逸既飽卽
臥遂令胞胎肥厚行動氣急以致臨盆難產宜於胎將
足月之時時動作勿嗜肥鮮勿食坐臥勤行勤走此
即不藥滑胎之妙法也乃世醫咸謂安胎之後必須更
進滑胎藥始爲合宜豈知滑胎名目昔人原爲湖陽公

主而設葢以貴家居養豐逸身體肥盛誠恐軀脂凝結
胞系堅固特藉此以稍疎其肥滯耳若平等婦人母
之氣血分蔭其胎尙虞不敷苟復加無憂易產名目一
概施之是猶寔人而復遭削奪其能勝此乎然恐後人
疑爲未備特詳錄二方以爲體肥稟厚者採擇也宜湖
陽公主每產累日不下南山道人進以滑胎只壳散用
麵炒只壳二兩炙甘二兩共爲末每服二錢白滾湯送
下一日三服殊效蓋爲壯實者立法也

無憂散

當歸

只實各二錢

白芍錢二分乳香

麥冬

神曲各一錢

陳皮八分

木香三分

訶肉一枚

血餘一圓

甘草八分

易產湯

當歸 川芎 生地 甘草 腹皮 廣皮 白朮

益母草各等錢

胎前脉法

周易卷一
婦人有孕陰搏陽別

脉以寸爲陽尺爲陰脉搏指而動與寸脉迥然分
別者此孕成之候也

少陰獨動其胎已結

少陰心脉也心主血今心脉往來流利而獨動乃血旺
成胎之象故可知其有孕又曰動者如豆粒之逼指而
動也

滑疾不散胎必三月

疾卽散也不散者按之愈有而不散也

但疾不散五月可決

總之按而不散者爲有力故斷之爲胎亦間有損症似

此者須細辯之

左疾爲男右疾爲女女腹如箕男腹如金
又曰三部之脉浮沉正等無他病而月經不通者乃有
孕也

三部之脉浮沉正相等是無病之脉也又何以不月既

用方秘書 卷一
已不月者是有病之驗也又何以無他病故脉雖不顯而受孕可知

再脉沉實爲男沉實爲坎中滿屬真陽也虛浮爲女虛浮爲離中虛屬真陰也左手沉實爲男右手虛浮爲女兩手沉實爲雙男兩手虛浮爲雙女一手沉實一手虛浮不拘左右爲一男一女也

胎前禁藥歌

芫荽水蛭及蜜茱烏頭附子與天雄野葛水銀共巴豆

牛膝薏苡并蜈蚣三稜莪木芫花麝大戟甘遂黃雌雄
代赭芒硝牡丹桂槐花帝生皂角同半夏南星及通草
瞿麥乾姜桃仁通礬砂乾漆蟬甲爪地胆牙硝是禁中

附增異症

腹中兒啼煎川連汁呷下或青黛亦效

腹中作鐘鳴或哭者用多年空房內鼠穴中土爲末黃
酒送下或乾噙之卽止

有臟燥悲傷慘戚嘔下者大麥甘草大棗煎服

有自哭自笑者紅棗燒存性米飲下

妊娠患痘無從用安胎補劑若用攻藥必致去血泄氣立危之症也不必服藥

胎形

一月如露珠二月如桃花三月分男女四月形像具五

月骨節成六月毛髮生七月動右手

是男於母左八月是女於母右

動左手

是男於母右九月是女於母左

三轉身十月始滿足

胎產秘書

臨產總論

婦人以血爲主血和則氣順氣順而產亦順奈富貴之家居尊養優耽於安樂全不運動使精血凝於胞胎氣不流通抑或臨產驚恐穩婆冒昧坐草太早迨產母因懶無力送兒以致難產節如腹痛或作或止名曰弄胎將水點滴微來名曰試水此時兒方轉身切其天倉皇並禁穩婆將手入探腹上揣摩直至腰痛如折眼中火出水

破淋漓兒逼產門方可坐草用力送之而猶遲遲未下者始服催生之藥然又不可輕用峻劑徒滲承道愈冬難產時逢盛暑氣散血沸產室宜置水缸以收熱毒節屆嚴冬氣滯血凝產室宜備火盆以解寒邪此調護之法當因時以制宜也

臨產脉法

欲產之脉散而離經

難經曰一呼脉三至曰離經是陽加於陰一部也一呼

脈一至亦曰離經是陰加於陽一部也蓋胎動於中是以脉亂於外故知其欲產

沉細而滑不日分娩

沉細而滑乃腎臟本脉之形腎繫胞胎故見此脉者亦與離經同也

楊子建十二產難論

一曰正產懷胎十月陰陽氣足忽然作陣疼痛胎至產

門漿破胎下兒節正產

二曰便產胎未足月有所傷動以致忽然臍腹疼痛或
服催生藥太早或產母用力太過逼兒錯路以致不
能正生故分娩須待兒身轉動頭對產門然後努力
一送自然產下

三曰催生欲產時兒頭已至產門而生猶遲滯者方用
藥催之又或挨延日久產母困倦難支包服藥以助
其氣血令兒速生

四曰凍生天氣寒冷產母氣血凝滯不能速生務要產

室和暖衣被加厚使產母溫和不致血凝胎滯
五曰熱害者天產母熱也則頭痛面赤昏暈或產室人
多氣逼亦致此患名曰血量宜多致水益以收熱毒
庶免崩暈然或遇涼風陰雨又當謹避

六曰橫生此由兒方轉身產母努力逼之以致兒頭不

正當令產母安然仰臥推兒身正直撥頭對產門推
撥時以中指撥兒肩不令臍帶繫絆方用藥確之繼
以努力送即生矣用川歸阿膠蕕子滑石爲末酒密
調下古人用三退散爲末用蜜潤下

七曰倒生出兒尙未掉頭努力一逼故也亦令安然仰臥令穩婆徐徐將兒足推送入陰模兒身自順切勿驚皇如良久不生令穩婆輕輕用手推之就令一邊直上撥兒轉身令兒頭一邊漸漸順下正對產門然後服催生藥努力一送即生矣

八曰偏生由兒頭未順生路產母努力一逼以助兒頭偏墜一邊雖已露頂實乃頭角也亦當令仰臥輕輕將手撥正小兒頭面直對產門一送即下若兒頭項

後骨偏墜穀道而先露頭則令穩婆以綿衣烘暖裹
手於穀道外旁轉手推兒努力送之自生

九曰礮生兒身已正門路已順兒頭已露因兒轉身時
臍帶絆住其肩以致難下亦令仰臥轉手推兒近上
以中指托兒肩脫去臍帶仍候兒身順正一送即下
十曰坐產言兒欲生時當於高處牢掛手巾一條令產
母以手攀輕輕屈足良久兒即順生

十一曰盤腸生臨產時小腸先出然後生兒其腸不收

名曰盤腸急以熱水浸軟舊布蓋住其腸不可包托
外以醋半盞新汲水半盞默嚙產母背面一噴令一
縮再噴再縮以盡爲度不可驚惶可用如聖膏塗頂
心收盡卽洗去或以半夏末吹鼻卽收或以麻油紙
烟薰鼻或用磨刀水少許火上溫過以潤其腸後用
好磁石煎湯一盞服之自收磁石卽吸鐵石並用磨
刀水之故卽以借其勢如陽入出而爲風吹莫不能
收者用淨器盛貯煎黃芪湯浸之

十二日交骨不開陰門不閉二症皆由元氣素弱胎前失於調攝以致氣血不能運達而然交骨不開者陰

氣虛用加味芎歸湯陰門不閉者氣血兩虧也用十

全大補湯

將產昏倒

凡將產忽然昏倒或坐草之時驀然口噤目翻吐沫者皆因胎前不能忌口恣食肥甘以致五臟氣滯六腑不和且胎氣無肥用力太早遂令胎驚驟倒治以瘦胎金腋

用
卷二
九可保無虞

金液丸

公母羊糞

燒存性

飛生毛

腋下者
煅存性

血餘

無病者煅
存性錢

灶心土一錢

砂仁五分

黑鉛一錢

水銀一錢入鍋

內鎔化拌勻取出研碎共爲末用棕子角爲丸如棗豆大遇前症及橫生倒產以急流水吞下五丸則子母俱

保

上交骨不開

凡將產真陰枯滯或中年破腹交骨不開以致難產者宜

服開骨千金不易湯

開骨方

當歸六錢 川芎三錢 敗龜板三錢 胎髮一大丸
加酒一盞煎服此方頭產婦人更宜服用胎髮以無垢
泥者爲佳其髮不拘男婦皆可用

死胎不下

凡胎死腹中外症指甲青黑脹悶不食口中極臭用平胃

散加朴硝五錢水酒煎服其胎化成血水而下如血乾
有寒者芎歸湯下或服桂香丸或服產見影方

平胃散

蒼朮二錢 厚朴 陳皮 甘草各一錢 川芎歸湯卽

佛手散 桂香丸 肉桂 蘆香

立竿見影方

黃葵花三錢 牡丹花三分 真燕蕕三分 射香一分

桑牛半個 巴豆半粒去油 草薢半粒去油

共爲末醋糊爲丸如彈子大大黃爲衣臨用研碎一丸
熱酒和香油少許送下按此方用葱汁打糊作丸更妙

此方治水瘦胎軟骨一切橫生逆產死胎卒下如雙胎
一死一活者用蠍爪一兩甘草二兩東流水十盞煎至
三盞去渣入阿膠三兩作三次頓服能令生者安死者

出

胎衣不下

凡胎衣不下由產母困倦無力送胎衣或停滯已久外入

冷氣凝滯血道或胎前素弱血氣枯涸而衣遂傳留三者俱速煎生化湯大料進之血旺復和衣自下矣或兼送益母丸一法也次送鹿角灰二法也外貼如聖膏三法也但服藥固當尤須盡調理之宜

益母丸 用益母草端午後小暑前收連根葉花子當風陰乾爲末蜜丸如彈子大臨時捺一丸於熱湯盞內生化湯下

如聖散

草藤肉二錢 雄黃二錢 共研成膏塗產母足心胞

衣一下卽洗去

胎衣不下調護法

胎衣未下時產母只宜坐守不可臥倒必須先斷臍帶
用草鞋一隻繫之否則胞上抱心而斃如寒月扶母到
床依人坐定用火籠被中蓋覆時換熱衣暖腹自然血
旺胎下但下後防虛仍須連進生化湯三四貼方妙

生化湯 方見產後

既產調護法

一產畢不可卽時臥倒當依人坐定令人以熱手從心
下輕輕揉挪至臍腹五六次然後睡下亦不可久坐
以致耗乏睡時仍不時揉按庶使惡路不滯其法須
將兩足豎起坐不可伸膝其睡須高枕厚褥四壁無
風

一產畢卽煎生化湯三帖連服數碗如饑則服一煎
後食白粥不可過飽片時卽服第二煎如不饑將藥

服完然後進食自無塊痛諸病

一產母腹中時用小衣烘煖溫之卽暑天亦不可缺被
或以薄棉衣蓋護心腹如春冬天氣嚴寒尤當密閉
產室四圍置火常令和暖且下部衣被更宜加厚方
免胎寒血凝變生諸症

一初產不可問是男是女恐因言多泄氣或以愛憎動
氣皆能致病不可獨宿恐致虛驚犯時微若秋毫成
病重於山嶽可不慎哉

集催生諸方

佛手散

當歸八錢川芎四錢血旺則胎自下此方氣血虧者

尤當必服如胞漿已破者恐其乾涸宜加冬葵子二三

錢

二脫散

蛇脫白者一條蠶脫一隻煅存性酒送下綱目云一、脫

散須煎榆白皮一錢調下連二服覺痛便生

二脫六一散

蛇脫 蟬脫 蟬脫各煅滑石一錢甘草一錢共爲末
酒送

三脫散

人脫男子脫下頭髮 蟬脫十四 蛇脫一條
如雞子大一丸 蟬脫一枚

俱燒灰爲末分三服酒調下此方并可治橫逆難產子
死腹井

桂香散

桂心一兩 乳香去油一兩 共爲末作三服 茜歸湯下

香桂散

寸香五分另研官桂三錢爲末和勻作一服加童便和酒下或葱白汁調服須臾如手推下此方係下死胎之藥宜慎用之

滑血飲

歸身六錢 川芎 益母各三錢 冬葵子一合

阿膠一兩炒 滑石三錢 水煎服凡胞漿已破而胎

猶不下者連進三服亦可或方內加酥油一兩
經驗催生秘方

魚膠一兩用紅棉布一尺捲魚膠以罐盛貯封固火煅
存性爲末每服一錢用香油蜜酒各半盞調服立下此
方胞漿水破瀝乾不下者可用

油蜜煎

香油 蜂蜜 童便 各一碗和勻入銅鍋漫火煎三
沸掠去浮沫調白滑石末一兩或益母草末亦可攪勻

胎理卷二
頓服外以油蜜於母臍上下摩之此治難產瀝漿胞胎
不下最妙綱目云此方甚安蓋童便取破血又有濁陰
下降之理而摩法更妙

催生如聖散

黃葵子不拘多少焙干爲末熱酒調下一錢神效如無
葵子則花亦可若漏胎血乾難產極痛者并進三服良
久腹中氣寬胎滑卽產如打撲死胎紅花酒下一云黃
葵子炒服七十粒難產危時免哭泣

華佗肘後方

芭豆肉三粒 草麻七粒

寸香少許共研如泥捻作

餅貼於臍上須臾子母分張矣

王叔和產難生死歌

身重體寒熱又頻舌下之脉黑復青舌上反冷子多死
腹中須遣母歸宜身重者胃氣絕也體熱者陰氣虛也
寒慄者陽氣衰也舌捲下舌脉青黑及舌反冷不溫乃
子母俱傾之候

面赤舌青獨留母 面赤是榮衛流行之氣故留母舌
上青色是姪娠絡絕故子死

唇口俱青子母傾 唇口俱青榮衛氣絕也舌青而又

榮衛俱青故子母俱死

面舌俱青頻出沫母亡子活定須應 面舌俱青是榮
衛兩絕吐痰沫是胎氣上冲脾胃氣絕乃子活母死

舌之症

王叔和生訣歌

新產之脈緩滑吉實大弦急逆分明寸口滑絕不調死沉細附骨命可生按產後身發寒熱其脉多數切不可因熱而作熱治蓋緣血虛陰虧而然只須重用當歸則身熱自退其脉數自漸除

新產禁補

丹溪云產後大補氣血爲主雖有他症以未治之昔有陳氏婦新產四五日腹痛寒熱醫者拘於大補之語誤進參芪遍身紫黑發喘而死殊不知其言治末者卽標

本之謂也陳氏婦瘀血未淨惡寒發熱所謂急則治其
標正合用生化湯倍加當歸先去其瘀血則身熱者自
然漸退矣今驟然大補是失丹溪主末二字之義也又
有一婦產後血量用參附而愈蓋一因血虛補之而痊
一因惡路不清誤補而死一症也一藥也而病源不同
利害立判是在臨期細心斟酌必須問其惡路有無按
之痛與不痛審証的確然後施治方保萬全如瘀血未
淨腹痛便結脉現濇滯沉實有神浮洪有力治宜生化

湯若或寒或熱脉浮而數重按無力者當遵產後大補氣血爲主也

難產危急之至屢用屢驗

當歸

三兩

龜板

四兩

川芎

一兩

血餘

一兩

本人更好壯

婦亦可洗淨

燒灰

打碎

五錢

存性

長流水煎取汁服後安心仰卧大痛時臨盆母子獲全

安徽舒城朱昂陽傳