

卷二十一



浙江圖書館



浙江圖書館



醫學綱目卷之二十一

脾胃部

內傷飲食

胎前傷食

百病皆生於痰

痞

不能食

飢不能食

惡食

妊惡食

消瘴門

渴而多飲為上消

消穀善飢為中消

渴而便數有膏為下消

胎前產後渴

口燥咽渴

黃疸 產後黃

食勞疝黃

黃汗

目黃

黑疸

內傷飲食



垣飲食所傷論○陰陽應論云水穀之寒熱感則害人六  
 府痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自信腸胃  
 乃傷此乃混言之也分之為二飲也食也飲者水也無  
 形之氣也因而大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺、病則  
 則為喘咳為腫滿為水瀉輕則發汗利小便使上下分  
 消其濕解醒湯五苓散生姜半夏枳實白朮之類是也  
 如腫則蓄積為滿者芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之  
 此其治也食者物也有形之血也如生氣通天論云曰  
 而飽食筋脉橫解腸痺為痔又云食傷太陽厥脉氣  
 口大於人迎一倍三倍者或嘔吐痞滿或下利腸澼當  
 分寒熱輕重而治之輕則內消重則徐下如傷寒物者

輕則內消  
 重則徐下

輕則治之輕重而治之輕則內消重則徐下如傷寒物者

半夏神曲乾姜三稜廣茂巴豆之類主之如傷物者  
枳實白朮青皮麥蘗黃連大黃之類主之亦有宜吐者  
陰陽應象論云在上者因而越之瓜蒂散之屬主之然  
不可過劑則反傷其胃蓋先因酒肉自傷又加之藥  
過度故腸胃復傷而氣不能化食愈難消也漸至羸困  
故五常政大論云大毒治病十去其六小毒治病十去  
其七常毒治病十去其八無毒治病十去其九不可過  
之此聖之深戒也

丹傷食惡食者脊中有物導痰補脾三陳湯加蘇白朮

山查 川芎 蒼朮

垣五苓散治煩渴飲食過多或水入即吐心中淡、停濕

弱者傷輕者內消內消傷飲

在內小便不利 方見傷寒

右為細末每服二升熱湯調服不計時候服訖多飲  
熱湯有汗出即愈又治淋熱在裏身熱黃疸濃莖首  
藨蒿湯調下食前服之疸黃渴及中滿引飲亦用水  
調服之

治傷冷飲者五苓散三錢或四錢七加生薑姜服之

治傷食並傷冷飲者並五苓散送半下枳朮丸

治傷冷飲不惡寒者腹中亦不覺寒惟覺勞同身重

飲食不化者或小便不利並去桂五苓散依前酌斟

酌服之

除濕散治傷馬牛羊乳酪水一切冷物

除濕散治傷馬牛羊乳酪水一切冷物

半夏湯洗七次 車前子炒香 神曲炒黃色 紅花二分

炙甘草二分 茯苓七分 干生薑三分 澤瀉半升

右同為極細末每服三分七白湯調下食前

丹導飲丸治水飲

吳茱萸三分 白茯苓一分 黃連半升 蒼朮一分

滑石七分半 共為細末神曲丸

丹參萸丸治飲滑石六兩甘草一兩茱萸一兩為丸

垣夫酒者大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之止

當散汗出則愈矣其次莫如利小便二者乃上下分

消其濕今之酒病者往服酒癥凡大熱之藥下之又

有用牽牛大黃下之者是無形元氣受病反下至形陰

內消傷酒

血乖悞甚矣酒性大熱以傷元氣而復重瀉之况亦損  
腎外真陰及有形陰血俱為不足如此則陰血愈虛真  
愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是以元氣消止折人  
長命不然則虛損之病成矣酒疸下之久、為黑疸慎  
不可犯

海藏治酒病宜發汗若利小便炎酸不肯下行故曰火鬱  
則發之辛溫散之是從其體也是知利小便則濕去熱  
不去動大便尤為踈慢大便者有形質之物酒者無形  
之水從發而汗是為近理是濕熱俱去治以為溫發  
其火必佐以苦寒除其濕

垣  
葛花解酲湯治飲酒太過嘔吐痰涎逆心煩亂胸

高瘡寒手足戰搖飲食減少小便不利

白豆蔻半斤

縮砂仁半斤

葛花半斤

木香半斤

橘皮

一斤半 吉白

白朮二斤

干生姜二斤

白茯苓

一斤半

猪苓

吉黑皮一斤半

澤瀉二斤

人參

一斤

神曲

炒黃色二斤

青皮

去核三斤

右為極細末每服三斤七白湯調下但得微汗酒病

去矣此蓋不得已而用之豈可恃賴日、飲酒此分

氣味辛辣偶因酒病服之則不損元氣何者飲酒病

故也

聖惠治醉酒不省用菘菜子二合細研井花水一盞調為散

丹烏梅丸治酒毒化痰消食

烏梅

一斤

半夏

八斤

白朮

八斤

生姜

二片

內消酒毒逐積

石件石曰搗細末新瓦兩片夾定火上焙三日三夜  
為度次入神曲麥牙陳皮青皮義术枳殼丁皮大腹  
子各四兩酒糊丸每服四五丸姜湯下

世烏梅丸治酒積神効

方見積塊門

潔百益丸治酒停腹中鬲氣痞滿面色黃黑將成癰疾飲

食不進日漸肌瘦如飲酒者先投此藥百益不醉亦無

諸痰

生姜

一斤去皮切片子  
薑二斤淹一宿焙干

紅皮

三斤去白科

廣茂

炮二斤

干姜

益智仁

丁香

甘少

京三稜

縮砂仁

木香

茴香

白豆蔻仁

石為細末煉蜜為丸每一兩作五丸朱砂為衣生姜

石為細末煉為丸每兩作五丸朱砂為衣生薑

湯下細嚼無時

丹解酒毒并熱毒

柏若本少名枳椇北人名為爛瓜杭州貨賣名蜜屈之

生於春熟於秋冬經霜時取

垣枳木丸治痞消食強胃

海上海本仲京枳木湯也今易老改為丸用治老幼虛弱飲食不消或歲府軟泄

枳實

夫炒黃色去穢淨一升

白木

二升

石為細末荷葉裹燒飯為丸如梧子大每服五十丸多

用白木湯下每時白木者本意不取其食連化但久令

人胃氣強實不復傷也

浙

橘皮枳木丸治老幼元氣弱飲食不消或歲府不調心

下痞悶

內消傷食

橘皮 一升

枳實 一升炒去穰

白朮 二升

右件為細末荷葉燒飯為丸如梧子大每服五十九丸多用白湯下夫內傷用藥之大法所貴服之強人胃氣令胃氣益厚強猛食多食重食而不傷此能用食藥者也此藥久益胃氣令不復致傷也

枳朮丸治為人所勉勸強食之致心腹滿悶不快

仁曲炒

麥蘖炒

枳實炒

白朮三升

右為細末荷葉燒飯為丸如梧子大每服五十九丸溫水

送下食遠

木香枳朮丸破滯氣消飲食開胃進食

木香一升

枳實炒

白朮一升

右為細末荷葉燒飯為丸如梧子大每服五十九溫水送下食遠

木香人參生姜枳朮丸開胃進食

木香 二斤

人參 一斤半

干生姜 一斤半

枳實

炒黃

白朮 一斤半

橘皮 三斤

書

右為細末荷葉燒飯為丸如梧子大每服三五十九溫水送下食前忌飽食

檳榔丸消食破滯氣

檳榔 三斤

木香 二斤

陳皮 五斤

甘草 一斤

人參 二斤

羅木香檳榔丸疎通三焦寬胸膈破痰飲快氣潤腸  
右件為末蒸餅為丸梧子大每服十五丸溫水送下食前服

木香 檳榔 青皮去白 枳壳夫炒 杏仁夫炒 去皮尖各

半夏曲 皂角去皮 酥炙 郁李仁去皮 已上各二又

右為細末 別用皂角四兩用漿一椀揉揉熬膏更入熟蜜

少許丸如桐子大每服五十九丸熱生姜湯下

丹保和丸治食積酒積

查一又 半夏姜汁製 蔓葛子半又炒 神曲三又炒 麥月三又炒

黃連半又 陳皮半又

有為細末酒糊丸如梧子大

太安丸脾經消導之藥虛者宜斟酌用之

查肉二又 神曲炒一又 半夏一又 茯苓一又 陳皮半又

蘿蔔子半又 白木二又 連翹半又

右為末粥丸一方白木有仁曲

三黃枳朮丸治傷肉食濕麵辛辣味厚之物填塞悶亂不快

黃芩二升

黃連

酒洗

大黃

一升濕

神曲

一升炒

白朮一升

橘皮

一升

右為細末湯浸餗餅為丸如棗豆大一倍大每服五

十九白湯下

丹阿魏丸治傷肉神効方見小兒腹脹

垣除濕益氣丸治傷濕麵心腹滿悶肢體沉重

枳實

炒乙升

白朮

一升

蘿白子

炒熱去入涼穢半升

黃芩

生用

仁曲

炒

紅花

三分

右為極細末荷葉燒飯為丸如棗豆大一倍大每服五十九白湯

送下

上二火丸治傷熱食痞悶元欲吐煩亂不安

黃芩二分

黃連

淨酒洗

升麻

柴胡三分

甘草二分

右為細末湯浸餽餅為丸如棗豆大每服五七十九丸白湯

送下

枳木導滯丸治傷濕熱之物不得施化而作痞滿悶亂不安

黃芩

茯苓

白朮

黃連

淨各三分

澤瀉二分

枳實

夫炒去穰

炒曲

各五分

大黃二分

右為細末湯浸餽餅為丸如桐子大每服五十九丸溫水

三黃下食遠

白朮丸治傷豆粉濕麵油膩之物

白木丸治傷豆粉濕麵油膩之物

白木一方 半夏湯洗 橘皮去穢 神曲炒 枳實炒

黃苓羊刃 白朮枯三分

右為細末湯浸餗餅為丸如藁豆大每服五十九白湯

下量所傷加減服素食多用干姜故加黃苓以瀉之

梅師食狗肉不消心下堅或腹脹口干忽發熱妄語煮芦

根飲之

千金食魚鱠及生肉在胸膈不化必成癥瘕擣馬鞭少汁

飲之一升生姜水亦得即化

垣半夏枳朮丸治因冷食傷更作一方加澤瀉一兩為丸

有小便淋

半夏湯浸七次 枳實炒 白朮二方

內消傷寒食

右同為極細末葉裹燒飯為丸如桐子大每服五十  
添脹不妨無定法如熱湯浸餛餅為丸亦可如食傷  
寒熱不調每服加上二黃丸十丸白湯下

木香干姜枳實丸破除寒滯氣消寒飲食

木香二系 干姜五系炮 枳實炒一系 白木一系半

右為極細末荷葉燒飯為丸如梧子每服三五十九  
溫湯送下食前

丁香爛飯丸治食傷太陰又治卒心胃痛

丁香一系 丁香皮三系 炙甘草二系 甘松三系去土秤

縮砂三系 益智仁三系 京三稜一系炮 廣茂一系炮

香附半系 木香一系

壯者傷重  
者徐下  
徐下傷飲

右為細末湯浸飯餅為丸如菜豆大每服三十丸白  
湯送下或細嚼亦可不拘時候

丹小胃丹

甘遂

水浸過以麵為衣長流水浸令  
麵去再換新水煮一持再

大戟

細切長流洗煮一持再  
換新水柳洗干晒

芫花

好醋拌勻過宿於瓦器內炒不  
住手柳勻黑色不要炒焦研碎末

大黃

帶包水潤火煨勻令熱焙於藥  
焙干再以酒淘炒令熱焙於藥切

黃柏

焙於前藥各三兩  
兩後二味各三兩

右五藥俱用製過分兩秤為末以白朮膏為丸如蘿

蔔子大每十二三五津液下常用烘焙

本事治中酒不省兼有酒食傷

徐下傷食

巴豆一粒 烏梅二 丁香三立 胡椒五立

右用搗為細末入飯同杵三二千下為丸如此。大

每服五丸七丸細嚼丁香湯下小兒一丸與服

仲倫急丸治尺寸俱盛填塞悶乱方見卒中門

垣鬻飲枳實丸逐飲消痰導滯清高

枳實 夫稔炒 半夏 湯洗 陳皮 去白已上各二兩

黑牽牛 取末三升

右為細末水煮麩糊為丸如桐子大每服五十丸食

後生姜湯下

如所傷飲食在背鬲悶不欲吐逆覆悶乱以物探吐

之甚者瓜蒂散

之甚者瓜蒂散

仲人病有宿食何以別之師曰寸口脉浮而大按之反瀉  
尺中亦微而瀉故知有宿食大承氣湯主之 方見傷寒

脉數而滑者實也此有宿食下之愈宜大承氣湯

下利不飲食者有宿食也當下之宜大承氣湯

脉緊如轉索無常者有宿食也 脉經云寸口脉緊中有宿食不化

海金露丸治時內傷心痞氣不升降水穀不消

大黃 一升 枳實 半升 桔梗 二升 牽牛 二升

右為細末荷葉裹燒飯為丸如梧子大溫水送下三

五十九丸食後常服減半 一本姜糊丸蒸餅亦得

垣木香見睨丸治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛 睨胡典切出目也

巴豆霜半斤 京三稜煨一斗 神曲炒一斗 石三稜去皮根一斗

木香三斤 香附子半斤 升麻 柴胡各三斤

草豆蔻煨 熟取心半斤

右為細末湯浸餛餅為丸如菜豆大倍大每服一二

十九加減溫白湯下

三稜消積丸治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

京三稜炮七 黃芪炮七 青橘皮五斤 陳皮五斤

丁皮三斤 益智三斤 炒麴七斤 茴香炒半斤

巴豆和皮米炒黑焦去米五斤

右為末醋打麴糊為丸如梧子大每服十九至二十

丸溫姜湯送下食前量虛實加減得更衣止後服

丸温姜湯送下食前量虛實如減淨更衣止後服

感應丸治虛中積冷氣弱有傷停積胃脘不能傳化或  
目氣傷冷目飢飽食飲酒過多心下堅滿兩脇脹滿痛  
心腹大疼霍亂吐瀉大便頻後重遲瀉久利赤白膿血  
相雜米穀不化食而復發又治中酒嘔吐痰逆惡心喜  
唾頭旋骨聾痞滿四支倦怠不欲飲食又治妊娘傷冷  
新產有傷若久有積寒吃熱藥不効者并惡治之又治  
久病形羸荏苒歲月漸至虛弱面黃肌瘦飲食或進或  
退大便或秘或泄不拘新久積冷並皆治之

巴豆

七十個去皮  
心腹研去油

南木香

去芦心  
兩半

杏仁

一百四十個湯  
去皮尖研膏

干姜

炮裂  
一兩

丁香

一兩

肉豆蔻

去皮  
二十個

百草霜乙又

右七味除巴豆粉百草霜杏仁三味外餘四味搗為

細末却與三味同拌勻研令極細用好麩和洗淨蠟  
六兩溶化作汁以重綿濾去渣更以好酒一升於銀  
石器內煮蠟溶滾數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上  
取蠟秤用丸春夏脩合用清油一兩於鈹內熬令末  
散香熟次下酒煮蠟四兩同化作汁就鍋內乘熱拌  
和前項藥末秋冬脩合用清香油一兩半令煎煮熱  
作汁和麩藥末成劑分作小錠子以油單帶果之旋  
丸服耳

神應丸治目一切冷物冷水及潼乳酪小腹痛腸鳴米

穀不化

巴豆

杏仁

乾姜

百草霜

各半

巴豆 杏仁 乾姜 百草霜各半斤

丁香 二斤 木香 二斤 黃蠟 一斤

右先將黃蠟用好醋煮去滓穢將巴豆杏仁同炒黑  
烟尽研如泥將黃蠟再上火春夏入小油半兩秋冬  
入小油八分溶開入在杏仁巴豆泥子內同攪漸下  
丁香木香等藥末研勻搗作錠子油裹子漸丸用服  
三五十九丸溫米飲送下食前日三服大有神効

雄黃聖餅子

巴豆 一百斤志 雄黃 半斤 白麵 一十斤炒  
油心膜 羅淡過

右三味內除白麵八九兩餘同為細末共麵和勻用  
新水和作餅子如手大以漿煮至浮於湯上 出控  
旋者硬軟搗作劑丸如桐子大捻作餅子每服五七

脉緊感咽

餅子加至十餅十五餅嚼破一餅利一行二餅利二  
行茶酒任下食前

潔夫人之生也由五穀之精氣所化五味之備故能生形  
經曰味埽形若傷於味亦能損形今飲食過其節以致  
腸胃不勝氣干及化故傷也經云壯火食氣、食少  
火壯火散氣少火生氣又云飲食自倍傷胃乃傷以失  
四時之調食故能成身之病脉在氣口故經曰氣口緊  
盛傷於食心胸滿而口無味口與氣口同者以其氣口  
曰坤也兼口乃脾之候故脾胃傷而氣口脉為之緊盛  
有諸內邪形于外然氣口緊盛而傷亦然必有多少輕  
重之異焉若氣口一盛脉得六至則傷於厥脉合人心

重之異焉若氣口一盛脈得六至則傷於厥陰合人心

腹膨悶傷之輕也宜栝榔丸之類若氣口二盛脈得七

至則傷於少陰甚則兩腹虛脹傷之重也宜煮黃丸厚

朴丸之類若氣口三盛脈得八九至傷於太陰傷之

重填塞悶亂甚則心胸大痛不瓦飲之則俗呼謂之

迷風是也經曰上部有脈下部無脈其人當吐不吐者

死當吐之宜吐之以瓜蒂散之類如不已則無治也經

曰其高者因而越之此之謂也備急丸下之亦可也

栝榔丸治飲食過多心腹膨悶

栝榔 二升半 陳皮 一斤 牽牛 一斤 木香 五升半 枳實 半斤

右為細末醋糊丸桐子大生姜湯下三四十丸

煮黃丸治飲食過多心脹滿脇肋走氣痞癰則痛如神

氣盛於人

即一倍

氣盛於人

即二倍

雄黃

研一分

巴豆

五名去皮心臍如泥上同雄黃

研

右二味入白麵二兩用研滴水丸桐子大滾漿水煮

十二丸煮熱瀉入冷漿內令沉每一時用浸藥冷漿

下一丸一日十二時服十二丸也以微和為度不必

盡劑

仲宿食在上脘當吐之宜瓜蒂散

又云七血虛家不可與之

垣瓜蒂散治大滿大實氣冲上部有脉下部無脉填塞胸

乱者用之如尺寸俱盛者倍急丸

瓜蒂

一分炒黃

赤小豆

一分煮

右二味為細末每服二名七溫漿水調下取吐為度

仲景以香豉七合煮取汁和散一名七溫服之不至兩手

氣口盛於  
人迎

仲景以香豉七合煮取汁和散一升七溫服之不至兩手  
尺脈絕無不宜便服此藥恐損原氣令人胃氣不復  
若止胸室塞悶亂不通以指探去之如不得吐以物  
探得吐則已如食不去以此藥吐之或曰盛食填塞  
於胸中為之室塞兩寸脈當主事反兩尺脈不見其  
理安在對曰胸中有食故吐出之食者物也物者坤  
土也是足太陰之號也胸中者肺也為物所填肺者  
手太陰金也金主殺伐也與坤土俱在于上而旺于  
天金能克木故肝木生發之氣伏於地下非木鬱而  
何吐去上焦太陰之物木得舒暢則鬱結去矣食塞  
於上脈絕於下者若不明天地之道無由達此至理水  
火者太陰之微非天地之別名也故獨太陰不生獨太

寒甚者雖脈  
盛堅亦宜溫

不長天之用在於地下則萬物生長地之用在於天  
上則萬物收藏此乃天地交而萬物通也此天地  
相因之道也故陽火之根本於地下陰水之根源本  
於天上故曰水出高原人五歲至有形之物、者冰  
冰者水也右三部脈主之偏見於寸口食塞其上足  
絕五歲之源、絕則水不下流兩尺竭絕之何疑之  
有

海秦二娘脈天生茶及冷物積而痛寒脈非浮非沉上下  
內外攀按極有力堅而不柔觸樞突出膚表徃來不可  
以至數名縱橫不可以巨細狀此冰証鼓擊脈也一身  
存行之火萃于胸中寒氣逼之故博大者力与真武四

脈微弱  
宜溫

逆等藥佐以芍藥苗香酒糊使不僭上每百丸一晝夜  
相接八九服至半干作汗而愈亦世罕有也

潔古既有三陰可下之法亦必有三陽可補之法也予故  
舉此內傷三陰可溫之劑若飲冷內傷雖先損胃未知  
色脈各在何經若面青黑脈浮沉不一弦而弱者係在  
厥陰若面紅赤脈浮沉不一細而微者傷在少陽若面  
黃潔脈浮沉不一緩而遲者傷在太陰也

傷在厥陽肝之經當歸四逆湯當歸四逆加吳茱萸生  
姜湯吳茱萸湯之類主之方見傷寒

傷在少陽腎之經通脈四逆湯主之方見傷寒

傷在太陽脾之經理中丸湯主之大便軟者宜湯結者

禁忌

宜丸方見傷寒

海  
或唐臣嗜冷食遂成冰脉遲七八至一止後僅三至勿  
亟與溫劑數服四五日不解遂續灸三夜一七日脉生  
大汗而解

羅  
陰氣者靜則神藏燥則消亡飲食自倍腸胃乃傷謂食  
物無務於多貴在能節所以保中和而遂頤養也若貪  
多務飽飲寒雜消徒積暗傷以召疾患蓋令物飽甚耗  
氣非一或食不下而上湧嘔吐以耗虛源或不消而作  
疾咯唾以耗神水大便頓數而洩耗穀氣之化生波便  
滑利而濁耗源泉之浸潤至於精清冷而下漏汗淋漓  
而外洩莫不申食物過傷滋味太厚如能節滿意之食

而外洩莫不由食物過傷滋味太厚如能節滿意之食

省爽口之味常不至於飽甚即頓、必無傷物、皆為  
益津液內畜精華和凝邪毒不能犯疾亦無由作矣

胎前傷食

本事治婦人有孕傷食 木香丸

木香 各七 京三稜 書 白茯苓 人參 各三

右細末麵糊丸菜豆大每服三十丸熱水下

治妊娠氣不和調飲食 白朮散

白朮 炒 干紫蘇 各一 白芷 皮炒 人參 三

川芎 訶子皮 青皮 各半 甘草 一

右為細末每服二升水一盞姜三片煎至七分不拘時

候溫服

經云飲食自倍腸胃乃傷又至脾之所生本在五味脾之五宮傷在五味

若妊子飲食不節生冷毒物恣意食喂致脾胃之疾故

妊娠傷食難得藥唯此二方穩當

右妊娠傷食又當於前條傷飲食之輕劑參量用之

百病皆生於痰

仲有痰飲有懸飲有溢飲有支飲

其人素感今瘦水走腸間漑漑、有聲謂之痰飲病痰飲

者當以溫藥和之 又云心下有痰飲者 苓桂朮甘湯全文

飲後水流在脇下欬唾引痛謂之懸飲病懸飲者十寒

湯主之 方見傷寒

仲景緊舉 痰之節目 四飲 素感今瘦 為痰飲 欬飲脇痛 為懸飲

身體疼重  
為溢飲

咳喘短氣  
為支飲

水在五臟病  
在心短氣不  
在肺燥欲飲  
在脾少氣身  
重

留飲者脇下痛引缺盆咳嗽則轉甚

飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身體疼重謂之

溢飲病溢飲者當發其汗大青龍湯主之小青龍湯亦

主之大青龍湯並見傷寒

胸中有留飲其人短氣而渴四肢歷節疼脈沉者有飲

咳逆倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲

久欬數歲云其人本有支飲在胸中故也治屬飲家

支飲亦喘而不能卧加短氣其脈平也

水在心、下堅築短氣思水下欲飲

水在肺吐涎沫欲飲水

水在脾少氣身重

在肝脇滿

在腎心悸

痰飲所生病証

嘔吐是飲

眩悸是飲

水在肝脇下支滿噎而痛

水在腎心下悸

嘔吐是水飲在心脇仲景云嘔吐心下痞者胸間

有水半夏加茯苓湯主之又云嘔家水渴今反不

渴心下有支飲故也小半夏湯主之又去先渴却

嘔者水停心下小半夏加茯苓湯主之羅謙甫云

痰飲為惡或嘔吐惡心或頭眩心悸或半風不快

或為寒熱並二陳湯主之方見丹溪痰飲

眩悸是飲仲景云卒嘔吐心下痞眩悸者膈間有水

半夏加茯苓湯主之嘔方見又云瘦人臍下有悸吐

嘔沫而癩眩者此水也五苓散主之嘔方見又云

嘔沫而癩眩者此水也五苓散主之方見又云

胸滿目眩者苓桂术甘湯主之方見又曰心下有

支飲其人苦胃眩澤瀉湯主之是也方見眩

仲膈上有痰滿喘咳吐酸則寒熱背痛腰疼目泣自出其

人振身暈劇必有伏飲治見振

脈夫心下有留飲其人背寒冷大如手

病人臂不隨時復轉移在一臂其脈沉細非風也必有

飲在上焦其脈虛者為微勞榮衛氣不用故也久久自

差脈虛茯苓丸不虛者控涎丹

胸滿是飲仲景云支飲胸滿者厚朴大黃湯主之

方見胸滿又云心下有痰飲胸脇支滿目眩苓桂术甘

湯主之方見短氣

潤振是飲

背寒是飲

臂痛是飲

胸滿是飲

渴燥是飲

自利是飲

渴燥是水飲在腸胃所作仲景云渴所小便不利  
五苓散主之又云先渴却嘔者為水停心下小半  
夏加茯苓湯主之又云腹滿口舌干燥此腸胃間  
有水氣也枳實黃丸主之但曰水所在之處不同  
而所兼之証不一也

自利是飲故丹溪治久痢皆吐之去膠痰渴愈又  
仲景云病者脈伏其人欲自利一反快雖利心下  
續堅滿此為留飲欲去故也甘遂半夏湯主之見  
泄又云小便不利四支沉重疼痛自利者此為小  
氣真武湯去芍藥加干姜主之又云傷寒表不解  
嘔欬自利者此為水氣小青龍去麻黃加芫花主

嘔欬自利者此為水氣小青龍去麻黃加芫花主

之

尺膚虛如枯魚之鱗者水候飲也

全之見論

色鮮明者有留飲

素肝脈熯而散色澤者當病溢飲溢飲者渴暴多飲而溢

入肌皮腸胃之外也脈熯精微

肝脈濡甚為溢飲全文見治虛實法

仲脈双弦者寒也皆大下後喜虛脈偏弦者飲也

肺飲不弦但苦喘短氣

脈弦數有寒飲冬夏難治漸

脈沉而弦者懸飲肉痛

脈滑而細滑傷飲

色鮮明是飲

痰脈

脈而大散是飲

脈濡是飲

脈弦是飲

脈沉冷汗起  
不啻是痰

丹溪曲尽  
痰之情狀  
風痰多見  
奇病

孫綵帛鋪劉真外患傷寒六七日晝夜不得眠總眠即  
起總起即倒未嘗少息看待厭倦召孫、曰若言是氣  
必喘作今無此証非氣也時復身上冷汗出尺寸脈皆  
沉閉中亦沉重診之鼓繫於指下此痰積塞聚於鬲間  
必遂用橘皮半夏生姜物並用各一兩為飲姜半兩搥碎  
以水兩碗並至七分梳去查分三服、藥經時遂睡經  
一晝夜不蘇既覺奏廁下痰一塊如雞子其痰遂愈凡  
痰証皆有冷汗其証明矣

丹風痰多見奇証

凡風痰病必用風痰藥白附子天麻雄黃牛黃姜蚕皂  
角之類

濕痰多見  
倦怠

濕痰多見倦怠 軟弱

濕痰多軟如身倦而重之類寒者清之

濕痰用蒼朮 又油炒半夏大治濕痰

痰之清者用二陳湯之類

半夏

橘皮

各五

茯苓

甘草

各一升半

右吹咀每服四升水一盞半生姜七片烏梅一个煎

至六分去渣熱服不拘時嘔吐甚者加丁香二升

導痰湯

半夏

四升

南星

橘紅

枳殼

赤茯苓

各半升

甘草

燥濕痰方

熱痰多見  
外証

食積痰

老痰鬱痰

虛痰

南星

乙丑

半夏

乙丑

蛤粉

二斤

青黛為衣

熱痰多挾風外証為多

熱痰用青黛黃連又天花粉大快鬲上熱痰

痰目火盛送上者治火為先白朮黃芩石膏之類中氣

不足加參朮黃芩治熱痰假治以降其熱也

食積痰神曲麥月山查

吐食積痰蘿蔔子油炒漿水調下探今吐

食積痰必用攻兼氣虛者用補藥送

老痰海石半夏瓜蒌香附又五倍子佐他藥大治頑痰

鬱痰 姜蚕 杏仁 瓜蒌 訶子 貝母 五倍子

痰而脾虛者清中氣二陳加白朮之類兼用提藥

虛痰

痰而脾虛者清中氣二陳加白朮之類兼用提藥

痰証

眩嘈是痰

喉中有物咯  
不去是痰

身有塊是痰

內傷挾痰必用參朮芪之類多用姜汁傳送或加半夏之類虛甚加竹瀝

眩暈嘈雜乃火動其痰用二陳湯加梔子芩連之類

噫氣吞酸此係食鬱有熱火氣上動以黃芩為君南星

半夏為臣橘紅熱多加青黛

喉中有物咯不出咽不下此是痰也重者吐之輕者用

瓜蒌葶氣實用荆瀝仲京用半夏蒴藋姜治水神驗

痰結核在咽喉燥不能出入化痰藥加醎藥軟堅之味

瓜蒌仁 杏仁 海石 桔梗 連翹

少佐以朴硝姜蜜調噲之

凡人身上中下有塊是痰問其平日好食何物吐下後

痰之為物  
無處不到隨  
痰之所在攻之

用藥

痰之為物隨氣升降無處不到

痰在腸胃間可下而食

痰在經絡中非吐不可出吐中就有出汗之義

痰在鬲上必用吐之瀉亦不出

痰膠固者必用吐之脈浮者必用吐

吐法並見治法門上下各

痰在脇下非白芥子不能療

痰在皮裏膜外非姜汁竹瀝不下

痰在四肢非竹瀝不開

二陳湯一身痰都能食如要在下加下引藥在上加上

引藥

治症藥味  
久者未能

潤下丸降痰散妙

青礞石九重 在風化硝

小胃丹能損胃氣食積痰實者用之不宜多用

許學士用蒼朮治痰飲成窠囊一變行極効

海粉熱痰能降濕痰能燥結痰能軟頑痰能消可入丸子

不可入莖藥

枳實瀉痰能冲墻壁

竹瀝治鬲間有痰或顛或狂或健忘或風痰亦能養血

荆瀝治同治痰稍重此二味効速穩當二瀝治痰結在

皮裏膜外及經絡中痰必佐以姜汁韭汁治血滿不行

中焦宜飲自然汁冷吃三四盞必胸中煩燥不寧後食

痰吐不出者

雜治

痰是利藥

過多

後吳治痰

雜法

驚痰

熱痰

風痰

飲食痰

暑痰

氣實痰熱結者吐雜得出或成塊或吐咯不出兼氣鬱者雜治

中焦有痰食積胃氣亦賴所養卒不便虛若攻之則虛矣

凡治痰用利藥過多致脾氣下虛則痰及易生而多矣

周痰之為病方論少有細論之者近惟三曰畧言亦無

加減法夫痰之源不一有曰痰而生熱者有曰熱生痰

者有曰氣生痰者有曰風生痰者有曰驚生痰者有積

飲而成痰者有多食而成痰者有曰暑而成痰者有傷

冷物而成痰者有脾虛而成痰者又有曰酒而成痰者

其為痰也驚痰者則包心成痛成顛熱痰則成煩成頭

其為痲也驚為痲者則色心成痛成顛熱痲則成煩成頭

冷痲

酒痲

脾虛痲

氣痲

婦人驚痲

最多

臂動不止是痲

風爛眼成車結怔忡懊懷驚睡風痲成癱成瘓成大風

成暈成暗風成悶亂飢痲成脇痛四支不舉每日嘔吐

食痲成瘡成痢口出臭氣暑痲中暈睡胃蕪痲頭痲冷

痲骨痺四支不舉氣刺走注不定婦人於驚痲最多

十有八九蓋曰產日交接曰月事方行其驚曰虛而入

結而成塊者為驚氣痲必有一塊在腹發則如身孕轉

動跳躍築痛不可忍者。痛酒痲飲酒不消但得酒次日又吐脾虛生痲食不美及胃嘔吐氣痲改

大凡人手臂忽動不得或骨節遍身痛坐卧不寧此痲

入骨也有人脚氣久不治骨節痛與脚氣藥不効此痲

病也

凡傷寒得病後嘔吐藥不得入亦曰初病中有涎也

眼灰烟黑色  
是痰

或只以下之太早而議其非亦未為的論  
傷寒黃亦是痰病蓋目眊所搏而成凡大便秘者亦  
是痰結而成

右前件諸証變生不一甚不易辨指下雖求得此妙註  
慎勿輕傳非人也

凡有痰者眼皮及眼下必如灰烟黑色舉目便知不待  
求脈

眼黑而頰赤者熱痰也面大黃色熱痰也外必頰滿萬  
熱口干思冷大便秘結小便赤熱必主風或眩暈耳  
鳴眼花多虛証治之而用熱藥服至於久脈大實甚大  
熱而中風至此可急以此下之

熱而中風至此可急以此下之

眼黑而行步呻吟舉動生骨者入骨痠也其証節、疼  
痛骨髓疼痛

眼黑而面帶土黑者四支於痺屈伸不便如風濕也

眼黑而氣短促必驚氣痠也

便看左右關脉大者革一有疼也可吐之怕吐者稍推

送下

凡人每日背上一条如線而寒起者痠也宜吐下之

凡病百藥不効其關上伏而大者痠

妙應丸加減法 方見走注痠痛即控涎丹

脚氣加明脂一合換榔木瓜各一两卷栢半兩先以鹽水

煎半日次日白朮煮半日同前藥為丸每二十九加至

關脉大是痠

關脉伏是痠  
妙定諸痠  
皆治加減法

四五十丸更服下惡物立効

驚痰朱砂二分痛重令每八九丸常與之三五服去尽

酒痰加雄黃金竭各二分每十九丸與之

走注腰痛加桃核燒灰三枚每三十九丸加至五十九丸温

酒下

脚氣走注於前方內加吳茱萸

驚氣盛塊者加川山甲炒鱉甲燒各三分玄胡索蓬木

各四分每五十九丸加至七十九丸以利為度

腎痺痛加木鱉子去油一两桂半兩

熱痰加盆硝等分每加三兩丸

寒痰加胡椒丁香錫桂各等分每二十五丸

沉香丸諸般痰病皆可治

洞虛痰之為病成偏頭風成虛頭風成太陽頭疼目眩  
暈如坐舟車精神恍惚或口眼瞤或眉稜耳輪俱痒或  
頷腮四支起風腫硬似疼非疼或渾身燥痒搔之則隱  
疹隨生皮毛烘熱如錐珣或齒煩似痒而似痛而疼無  
定所滿口牙浮痛疼不一或暖氣吞酸鼻聞焦臭嗅聞  
頭醒心煩鼻塞咽溢不利各之不出嘔之不下或目噴  
嚏而出或目舉動而唾其痰如黑人如破絮或如挑膠  
或如蜆肉或心下如停冰缺閉滯妨悶暖嚏連聲狀如  
革氣或寢寐刑戮刀兵劍戟或夢入人家四壁圍遠  
暫得一竇百計得出則不知何所或適然妻有燒人地上  
四面枯骨烟火焦氣撲鼻臭穢無路可出或不目觸者

急急悲啼兩泪而寤或時却行或見天边兩月交輝或  
見金光數道回頭無有或足或膝酸軟欲倒或腰腎骨  
節忽痛呼吸難任或四支肌骨之間痛如鋸截乍痛乍  
止並無常所或不附手麻臂疼狀若風濕或卧如芒刺  
不~~安~~或如毛虫所螫或臂膊四肢不舉或手足重滯雖  
無痛苦亦不能寐或眼如薑蟄膠粘痒眼澁閉闔甚難  
或陰精交變之時胸痞氣結閉而不發則齒痒咽疼口  
糜舌爛反其奮然而發則噴嚏連声始則涕唾稠粘次  
則清水如注或眼前黑暗腦後風声耳内蟬鳴眼眵肉  
惕治之者或曰媵理不密風府受邪或曰上盛下虛或  
曰腦寒鼻潤或曰尸注鬼繫或曰虛或曰寒或曰邪惟

同虛子各此疾若乃廢病勢之末則胸腹間如有二氣

洞虛子備此疾者乃療病勢之未則胸腹間如有二氣  
交紐噎塞煩鬱有如烟火奮然上衝頭面烘熱眼花耳  
鳴痰涎涕泪並從肺胃間涌起凜然七竅噴嚏千百然  
後徧身煩燥大寒之時則去盡衣衾裸躰一凍則止片  
時或春夏乍涼之時即多加衣衾亦暫少緩或頓飲冰水  
而定或痛飲一醉而寧終不能逐去病根乃得神秘沉  
香凡獲大効於是以此之愈疾動數萬計但秘其方而不  
能傳恐貪愚噬利者輕舉妄論妨於濟衆故以隱語括  
之頃信士之口傳也○甌裏翻身甲帶金于今頭戴中  
堂深相逢二八為斤正硝煨青礞倍若沉十七兩中沉  
半兩水丸梧子意須斟能除恠病如神聖水瀉双身莫

服沉香丸法

與深

丹沉香丸治熱痰火多者

大黃

八分 蒸

黃芩

八分

礞石

乙分 煨

沉香 半斤

右為末水丸梧子大

顛狂法

一切新久失心喪志或顛或狂等証每服一百丸人壯氣盛能飲食狂甚者一百二十九丸已上加添臨時自忖

癰瘰法

一切中風癰瘰痰涎壅塞大便或通或結者每服八九十九丸壯者一百丸常服二三十永無大便不通之患

脚氣法

一切陽証風毒脚氣遍身起走住疼痛每服八九十九丸未効加十丸

身痛法

一切無病之人遍身筋骨等處平白疼痛不能名者或

一切無病之人遍身筋骨等處平白疼痛不能名者或

鼻氣法

頭疼非頭風牙痛或搖痒風蛀牙等証目風目寒鼻塞  
鼻重身體不痛非傷寒証者八九十九丸痰盛人實者加  
服之

一切噎氣吞酸至於噎逆鼻氣及胸中閉或疼或腹中  
氣塊衝上嘔沫涎吐狀如翻胃者心下怔忡如畏人捕  
林惕不安臥臥閉格變生乖証失飢傷飽憂思過慮心  
下嘈雜或痛或噦或晝夜虛飽或稍飢不喜食急悞喉  
閉赤眼每服八九十九丸未効加十九丸

喘嗽嘔吐法

一切新久痰氣喘嗽或嘔吐頭暈目眩八九十九丸虛老  
瘦者五十丸

頷腫疔瘡法

一切頷頷腫硬繞核若癰癰者若年深多次服之口糜

心腹痛法

一切荏苒  
疾法

舌爛爛喉生瘡者每服五六十九丸蜜少許一處嚼碎噲  
化睡徐、嘔之些子口瘡二三十九丸如前噲三二夜差  
一切男子嬾人大小虛實久不安心疼下連少腹面羸  
瘦日痛連夜者必嘔綠水黑汁冷涎乃至氣絕心下溫  
暖者並量大小多至七八十九丸專屬不虞之際至於百  
丸即便回生未至顛危者虛弱疑似之間只服三十丸  
五十九丸立見生意然後續、進之以差為度無服生津  
化痰溫中理氣之藥  
一切荏苒之疾凡男子嬾人患非傷寒內外之証或酒  
色或吐血或月事愆期心煩志氣或腰脹脇疼勞  
倦痰盛喜眩或委暴中目暑伏疾口眼喎斜眼痛耳聾

倦疲感喜眩或委暴中目暑伏疾口眼喎斜眼痛耳聾  
鼻塞骨節酸疼干嘔惡心諸般內外疼痛百藥無効病  
者不能喻其狀方書未嘗載其疾鑿者不能辨其証依  
前法加減服之大抵必須臨睡就床用熟水一口許送  
過咽即便卧令藥在喉間徐徐而下如日間病出不  
測疼痛不可忍必於差際者須是一時臨卧法服多半  
日不可飲食湯水及不可起身坐行言語直俟藥丸除  
逐上焦痰涎惡物過膈入腹然後動作方能中病每次  
須連進兩夜先夜所服次日痰物既下三五次者仍服前  
數下五七次或只下二三次而病勢頓已者次夜減廿  
丸頭夜所服並不下要物者次夜加十丸人壯病實者  
多至百丸唯喉動實大抵服罷仰卧咽喉稠粘壅塞不

利者痰氣泛上藥病相反之故也少頃藥力既勝自然  
寧帖往、病日久結實於肺胃之間或尺暴病全無泛  
濫者服藥下咽即仰卧頓然百骸安靜大抵次早先去  
大便一次其餘遍數其病逐下之時看甚麼糞用水攪  
之是係痰片粘涎或百有一稍、腹痛腰腎拘急者蓋  
有一種頑痰惡物治閉氣滑腸裏急後重狀如利疾積片  
餉即已若有痰涎易下者其餘快利不可勝言頓然滿  
口生津者百竅爽快間有片時倦怠者蓋連日病苦不  
一時為藥力所勝氣體暫和如醉得醒如浴方去如睡  
方起此藥並不洞泄刮腸大瀉但能取痰積惡物自腸  
胃次第守鑿而下腹中糟粕並不相傷雖下腹腸之糞

熱痰雜方

則藥力不到之處是故先去其餘詳息不能備述服者  
自能知之

黃連導痰湯二陳加黃連枳實是

垣黃芩利藹丸利胸中熱治藹上痰

生黃芩

炒黃芩

各一兩南星

半夏

黃連

枳殼

白朮

圖

陳皮

澤瀉

白朮

右為細末水浸宿蒸餅為丸梧子大每服三十九丸水

送下食遠

丹中和丸濕痰氣熱

浙

蒼朮

黃芩

半夏

香附

石等分為末粥丸

風痰雜方

垣小黃丸化痰止涎除濕和胃氣治胸中不利

黃芩一升

干姜半升

白朮五升

半夏

五升湯洗姜制

澤瀉三升

黃耆三升

右為細末蒸餅為丸如菘豆大每服三十九五十九溫水

送下

羅祛風丸有人味喜酸醎飲酒過多色慾無戒滲注成痰

飲聚於胸華湍則嘔逆惡心涎流一臂麻木升則頭目

昏眩降則腰脚疼痛深則左癱右瘓淺則厥然倒地此

藥寬中祛痰搜風理氣和血駐顏延年益壽

半夏

荊芥各四升

槐角子

夫炒

白朮生用

陳皮去白

朱砂研各乙升

右為末姜汁打糊為丸梧子大每服三十九生薑皂

右為末姜汁打糊為丸梧子大每服三十九生薑皂  
角子仁湯送下日三服

### 玄珠導痰丸

半夏

六兩分作三處一分用白凡水浸一分用肥皂  
角六條為末水浸一分用巴豆肉百粒合水浸

右法餘藥在下半夏在上浸至十日半月時、動水  
令二藥相透次相合一處揀去巴豆皂角煨火煮令  
干取半夏切碎日晒干後入

甘遂

二升制

百藥煎

二升

姜蚕

一升

全蠲

二升

右件為末同前半夏末一處合和用揀出皂角煉膏  
為丸如更再入薄糊令得所丸如梧子大每十五丸  
實者廿五丸

本事治膈上有痰川芎圓

川芎

二升 細剉 湯火熬熟

川大黃

二升 蒸 令極熟

右件焙干為末用不蛀皂角五七挺溫水揉令絹濾  
去渣瓦器中熬成膏和前二味為丸菜豆大每服十  
五丸生姜湯下小兒三丸

經驗治風痰鬱金一分藥廬十分各為末和令勻每服一  
字用漿水一盞先以少漿調下餘者水漱口却服便以  
食壓之

海藏五飲湯一留飲心下二瀝飲脇下三痰飲胃中四溢  
飲藟上五瀝飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多故  
有此疾

寒痰雜方

有此疾

旋覆花

人參

陳皮

枳實

白朮

茯苓

厚朴

半夏

澤瀉

猪苓

前胡

桂心

芍藥

甘草

右等分剉每兩分四服水二盞生姜十片同煎至七

分取清溫飲無時忌肉食生冷滋味等物因酒有飲

如葛根葛花縮砂仁

局方倍朮丸治五飲一曰留飲停水在心下二曰癖飲水

癖在兩脇三曰痰飲水在胃中四曰溢飲水溢在鬲五

曰流飲水在腸間瀝々有聲皆由飲水過多或飲酒過

寒所致

白朮一升

桂去麋皮

干姜

炮各半升

右為末蜜丸如梧子大每服二十九溫米飲下加至  
三十九食前

本事治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜腸鳴多睡口  
中清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虛冷所致其  
脉沉弦細遲旋覆花湯

旋覆花

細辛

橘皮

桂心

人參

甘草

桔梗

白芍藥

半夏

已上各  
半升

赤茯苓三分

右為粗末每服四升水一盞半生姜七片葱八分去

滓溫服

羅木香半夏丸治痰涎上壅心胸不利常服消痰飲寬胸

膈

木香七分

半夏

一升湯洗

陳皮

茯苓

姜屑

氣痰雜方

運氣皆屬濕

木香 七分  
半夏 一丸湯洗七次  
陳皮  
茯苓  
姜屑

草豆蔻  
白附子  
人參

右件為細末 麩糊為丸 如梧子大 每服三十丸 溫生

姜下食後湯

滌痰丸治三焦氣滯下痰飲消食利藪痞滿咳唾稠粘  
面目熱赤肢體倦怠不思飲食常服升降滯氣消化痰

涎 木香 賓郎 青皮 陳皮 京三稜 剉碎

枳殼 夫抄去穢 半夏 湯洗七次 大黃 各一 黑牽牛 炒二丸

右為細末 白麩糊為丸 如桐子大 每服四十丸 至五

十九丸 食後生薑湯送下

運氣痰飲皆屬濕土經云太陰在泉濕淫所勝民

針灸

病飲積又云歲土太過雨濕流行甚則飲發中滿  
又云土鬱之發飲發又太陰之勝與太陰之復皆  
病飲發于中治以諸抗劑是也

撮要諸痰為病頭風喘嗽一切為病竊端

豐隆

中脘

心術婦人年高風痰作楚脈沉實滑數痰在下則足無力  
在中則胸膈閉悶在上則頭風昏暈發則抽牽手足皆

動

風門

沿皮二寸半

巨關

三寸三分

豐隆

二寸半

肩井

五分五

甲溢飲脇下堅痛中脘主之

○痞

不能食

飢不能食

惡食

痞者心下痞滿而不能食也仲景云滿而不痛為痞  
滿而痛為結

大法

濕主痞

傷寒下早

痞

垣夫痞者心下滿而不痛是也太阴者濕也主壅塞及土  
未心下為痞滿也傷寒下大早亦為痞乃曰寒傷其榮  
榮者血也心主血也入於本故為心下痞悶仲景之瀉  
心湯數方皆用黃連以為瀉心下之土邪其効如響迄  
桴故活人書云審知是痞先用桔梗枳殼湯非用此專  
治痞也蓋因先錯下必成痞証是邪氣將陷而欲過胸  
中故先用截散其邪氣使不致於痞先之一字獨用之  
意也若已成痞而用之則失之晚矣不惟不能消痞而  
反損胸中之正氣則當以仲景痞藥治之經云察其邪

雜病下之亦  
為痞

實痞便閉厚

朴枳實

虛痞便秘利者

藥陳皮

飲食傷宜消

導可及吐之

治痞獨益

脾土升胃氣

氣所在而調治之正謂此也非止傷寒如此至於酒積  
雜病下之太過亦作痞滿蓋下之多亡陽亡陽者謂脾  
胃水谷之陰亡也故胸中之氣曰虛下陷於心之分野  
故致心下痞宜升胃氣以血藥治之若全用氣藥導之  
則其痞益甚復下之氣愈下降必變為中滿膨脹皆非  
其治也又有虛實之殊如實痞大便秘厚朴枳實主之  
虛痞大便利者芍藥陳皮主之如飲食所傷痞悶者當  
治消導去其胸中窒塞上逆兀、欲吐者則吐之所謂  
在上者因而越之

海治痞獨益中州脾土以血藥治之其法無以加矣

傷寒痞者從血中來雜病痞者亦從血中來雖俱為血

虛實

攻補兼施

証大抵傷寒之體從外之內從有形故無形氣証以

苦泄之有形血証以辛甘散之中滿者勿食甘下滿者

復當食也中滿者腹脹如自覺滿而外無腹脹之形

即非中滿乃不滿也不滿者病也當以甘而撐操之可

有形氣証以苦泄之者枳實黃連之類是也  
無形血証以辛甘散之者仲景人參湯是也

垣黃芪補中湯

黃芪 二斤 人參 八分 甘草 五分 白朮 蒼朮

陳皮 各五分 澤瀉 猪苓 羌活 各三分

右以咀只作一服用水二盞煎至七分去滓大溫送

下大消痞丸

丹一婦人十八九歲曰有大不如意事遂致萬滿不食目

循累月遂成痞蕩不能起坐至巳午間必發微熱面赤  
酉戌後熱退而赤亦退至夜則小便以數每出則數滴  
而已六脈沉濇而短小左右一狀重取皆有經水雖按  
月唯數点而已予曰此志不遂而氣鬱胃有瘀血而血  
亦虛鬱氣成痰中宮却食遂用補寫兼施之法治之以  
白朮二錢重人參一錢重茯苓一錢重紅茵一豆大帶  
白陳皮一錢重並取濃湯一呷食前執服之少頃藥行  
後與半匙稀粥又少頃減輕粉麝牛三卷丸如芝蔴大  
以津唾下十五丸一日一夜並藥丸藥各服四遍至次  
日方食知有味又次日食稍進第三日則執退面不赤  
已如此七日則飲食如旧人亦能起坐平復如初

已如此七日則飲食如旧人亦能起坐平復如初

七三 嬌渴食少气痞脉弦

白朮 青皮 半夏 干葛 一各半

木通 炙甘草

分二帖 姜二片 煎下与点丸三十九 保和廿丸

葶藶丸 治心下痞胸中不利

苦葶藶 酒浸 人参 各三 甘草 根炙 羌活 柴胡

独活 各二 黄芩 三各一 半 炒 白豆蔻 宿砂

苜陈 酒炒各 青皮 石膏 厚朴 炙 半夏 各半

当归身 七

右为末 蒸饼和匀 筛子内搭如米大 每服一各 临卧

少用 汤送下

木香消痞湯治夏氣食濕麪結中脘腹皮底微痛心下痞滿不思飲食之不消常、痞氣

柴胡四分 橘皮三升 甘少灸半升 半夏一升 生姜三升

當歸梢二升 紅卷少許 草豆蔻五升 枳實二升 木香三升

右剉麻豆大作一服水二大中煎至七分食前稍熱

服忌酒濕麪等物

大消痞丸治一切心下痞滿及積年久不愈者

黃連炒 黃芩炒 姜黃炒 白朮炒 人參炒

甘少灸炒 縮砂炒 枳實炒 半夏湯洗七次 干生姜炒

陳皮炒 神曲炒 茯苓加 澤瀉炒 厚朴炒

猪苓炒 一升半

無形氣沁以  
苦泄

右為細末水浸蒸餅為丸如梧子大每服五七粒黃  
至百丸白湯食遠吞下

黃連消痞丸治心下痞滿壅塞不散煩熱喘不寧

黃連 一石  
枳實 七石  
橘皮 五石  
干生姜 二石

半夏 九石  
黃芩 一石  
茯苓 三石  
白朮 三石

炙甘草 三石  
姜黃 一石  
澤瀉 一石  
猪苓 半石

右為細末水浸蒸餅為丸如梧子大每服五七粒

溫水送下食前

失笑丸治右關脈浮弦心下虛痞惡食懶倦開胃進食

枳實  
黃連 各五石  
干生姜 二石  
半夏 二石  
厚朴 一石

人參 三石  
甘草 炙 三石  
白朮 三石  
白茯苓 二石  
大麥 一石

右件為細末水浸蒸餅為丸如梧子大每服三十九  
溫水送下不計時候虛實臨時加減法服

丹小外心頭痞悶口干面微黃脈洪

黃連 半夏三升 白朮 青皮 木通三升

分三帖水二中姜二片煎取六分去渣熱飲下保和

丸十五丸查并煎

回金丸瀉肝火行濕與熱甚之反兩能回痞結治肝邪

補脾

黃連六升 吳茱萸一升

右用粥為丸一方用黃連六升 萸半升 名佐金丸

海少賦面赤下利心下痞瀉心湯加減例口易老單用黃

海少脈面赤下利心下痞瀉心湯加減例。易老單用黃

連瀉心湯用錢氏法後隨証加減

煩者加梔子

躁者加香豉

嘔者加半夏

滿者加枳實厚朴

腹脹加芍藥

脈遲加附子

下焦寒加干姜

大便硬加大黃酒浸

如用姜附先煎金熟似熱不僭後別黃連附子同共

羅枳實理中丸治中脘痞滿滯氣不宜積寒停冷飲食不

化方見傷寒部

仲人參湯治胸痺心痞

方見胸痺

半夏瀉心湯治痞滿閉脈沉方見傷寒

丹一女子在家回事不如意鬱結在脾半年不食每日但

食熱菱熱麥數枚適喜亦能食饅頭彈丸大唯說粥飯則

脾氣鬱結

有形血証辛甘散之

深惡之予思其脾氣實非枳實不能散遂以溫膽湯去  
竹茹与之二百餘帖經三個月後方愈

一女子二十餘許婚後夫往廣海經商二年不歸女子  
病不食困卧如痴他無所苦諸醫不效其父求治往視  
之多向裏床坐形瘦予思之此思想氣結病也藥不以  
能獨治得喜方可解令父母取其喜不可得不然令其  
怒又不可得予自往激其怒掌其面三日責以不得有  
外思於是大怒而哭待其哭一二時許令父母解之追  
藥二帖即求食矣予再与其父母曰雖愈必得喜方已  
若再思結氣必復至其父母偽作伊夫有書來約日成  
婚一月後夫果歸病遂全愈

飲食傷脾痞悶輕者大消痞丸枳木丸回命丸之類甚者微下之吐之下之者實即丸煮黃丸吐者二陳湯探吐之及瓜蒂散之類是也

經驗治葛下冷氣及酒食飽滿常服青橘皮四兩鹽一兩分作四分一分用湯浸青橘皮一宿漉出去穰又用鹽三分一處拌和勻候良久銚子內微妙焦為末每服一匙半茶末半水一盞煎至七分放溫常服不用入茶煎至沸湯點亦妙

寒熱

寒痞辛甘散之枳實理中丸之類是也

熱痞苦寒泄之大消痞丸之類是也

運氣

丹治痞軟石膏研末醋糊丸如藜豆大瀉胃火食積痰火

濕痞

寒痞

濕痞

針灸

○運氣痞有三

一曰濕痞經云上平氣曰備化備化之紀其病痞  
 又云太阴所至為搖滿為積飲痞滿又云太阴司  
 天之政民病寒濕痞又云上鬱之發痞堅腹滿又  
 云上不及卑監卑監之紀其病留滿痞寒是也  
 二曰寒痞經云水鬱之發民病痞堅腹滿又云太  
 陽之復心病痞滿是也

三曰燥痞經云少陰之復甚則痞滿是也

海  
 問井主心滿十二經皆有井當治何井

假令善潔面青善怒是少陽膽受病也當治金井竅

是也

假令滿門淋瀝便難轉筋足厥陰肝經受病也當治木  
井大敦是也

假令頭項痛腰脊強發熱惡寒是太陽膀胱受病也當  
治少井至陽是也

假令手足自溫自利不渴是太陽脾之受病也當治少  
井隱白是也

已上針藥同法



忌  
瘧戒暴下

羅藥戒。各有病瘧積於其中伏而不得下自外至者捍  
而不得納從鑿而問之曰非不知不可歸而飲其藥既  
飲兩暴下不終日而向之伏者散而無餘向之捍者柔  
而不支焦萑通達呼吸聞利快然若未始有疾者不數

日瘡復作投以故藥其快然也亦如初不踰月而瘡五  
作五下每下輒忽然客之氣語三引体不勞而汗股  
不少而慄力栗切膚革無所耗於前而其中藥然莫知  
其所來嗟夫謂瘡非下不可已予從而下之術來瘳也  
藥然獨何如聞夢之南有良醫焉往而問之醫笑曰子  
無恠是藥然者也凡子之術固為是藥然也跽吾語汝  
天下之理有甚快於予心者其本也必有傷求無傷於  
其終則初先望快於予心失陔伏而臥畜氣其無不運  
而為瘡橫乎子之胸者其累大矣擊而去之不須臾而  
除甚大之累和平之物不能為也必將擊搏震撓而後  
可夫人之和氣冲然而甚微泪乎其易危擊揚虛撓之

可夫人之和氣冲然而甚微沮乎其易危擊手揚塵挽之

成而子之和益已病矣由是觀之則子之痞凡一快者  
子之和一傷矣不踰月而快者五子之和平之氣不既  
素乎故体不勞而汗股不出而慄蓀然而不可終日也  
且將去之子痞而無害於和平子歸燕居三月齋戒而  
復請之鑿曰子之氣少復灸取藥而授之日服之三月  
而疾少平又三月而少康終是年而復常且飲藥不得  
亟進客一歸而行其又說然其初使人滿然遲之蓋三  
授藥而三反之也然日不見其所攻之効則月異而時  
不同蓋終歲疾平客謁鑿再拜而授之坐而問其故鑿  
曰是鑿國之說豈時鑿之於疾哉子獨不見夫秦之治  
乎民而不听令惰而不勤事故而不畏法令之不听治之

秦商治痞  
快猛政

先王治瘖  
撫歲月

不變則秦之民常瘖矣商君見其瘖也厲以刑法威以  
斬伐悍厲猛鷙不貸毫髮痛則而刀鉏之於是也秦之  
政如建瓴流通四達無敢拒而秦之瘖常一快矣自孝  
公以至二世也凡幾瘖而幾快已乎頑者已汎強者已  
柔而秦之民無歡心矣故猛政一快者歡心一口積快  
而不已而秦四支擗然徒其物而已民心日離已君孤  
豆於上故已夫大呼不終日而百姓皆起秦吹連其手  
足肩脊而泆然不我應矣故秦之有已者是好為快者  
之過也昔者先王之民其初亦嘗瘖矣先王豈不知然  
擊去之以為速惟其有傷於終也故不敢求快於吾心  
優柔而撫有之教以仁義道以禮樂則解而除去其瘖

優柔而接有之教以仁義道以禮樂則亂解而除去其滋

旁視而潏然有之矣然月計之歲察知前歲之俗非今  
歲之俗也不擊不搏無忤無逆是以日去其笑氣而不  
嬰其懽心於是政成教達安樂久而後患除矣是三代  
之治皆更數聖人歷數百年而後俗成則予之藥終而  
愈於痰無是恠故曰天下之理有甚快於予心者其末  
也必有傷求無傷於其終則初無望快于予心雖然豈  
獨於治天下哉客再拜而紀其說

不能食

心下不痞滿自不能養是也

經驗治大人小兒不進乳食和氣去痰人參四兩半夏乙

兩生姜汁煎一宿曝干為末麩糊丸如菜豆大每服十

虛實

脾虛難任

飲食

宜參朮補

忌枳朴代

丸食後生薑湯吞下 熬當作浸

垣和中丸開胃進食

干生薑 一升 干木瓜 九 炙甘草 三升 人參 一升

橘皮 一升 白朮 三升

右為末蒸餅為丸如梧子大每服五十九丸溫水送下

食前服

本事開胃養氣進食七散

人參 白朮 黃芪蜜水塗灸 山芋 白茯苓

粟米微炒 甘草 各乙升

右為細末每服二升水一盞姜枣同煎至七分如故

不思飲食加白匾豆一兩蒸用名八珍散予制此方

不思飲食加白匾豆一兩蒸用名八珍散予制此方

温平不熱每有傷寒瘦疾中暮得差之後用此以調胃

脾胃日三四服十日外飲食倍常

海六神湯治傷寒虛羸不思飲食

人參

白朮

黃芪

各乙

枳壳

又枳實  
夾妙

白茯苓

各半升

甘草

二升半

右為粗末每服五升水一盞半生姜二升棗三個劈

破粳米少許同煮食前

羅錢氏

異攻散治脾胃虛難任飲食

方見小  
鬼吐瀉

羅謙甫云脾胃虛難任飲食者不可一槩用剋伐之

劑宜錢氏方異攻散補之自然能食設或嗜食大過

傷脾而痞滿嘔逆權用枳實丸一服快氣慎勿多服

脾虛有移

不食

和淺參朮枳

卯深參朮已

霜

垣寬中進食丸滋形氣喜飲食

加川附三分半一服汗亦少而白安

○嘗治翁氏久瘡食少汗多先用補劑加黃連枳實者月餘食反不進汗亦不止曰悟謙甫斯言遂減去枳連純用補劑又務令粥多於藥而食漸進又於

草豆蔻仁 三分

縮砂仁 一分

半夏曲 七分

大麥曲 一分

橘皮 二分

木香 半斤

白朮 二分

白茯苓 二分

豬苓 一分 去皮

澤瀉 二分

人參 二分

枳實 四分

青皮 一分

右件為細末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服二十丸

白湯下

和中丸治病久虛弱厥不能食而藏府或秘或澹此

和中丸治病久虛弱厥、不能食而歲府或秘或澹此

知母炒 麥門冬 木通半升 生甘 炙甘一升

復勞苦不思食

白朮三升 活石 茯苓一升

下保和丸廿五丸

治柳氣瘦倦不思食

白朮二升 蒼朮 陳皮 黃連 黃柏

半夏各半升 扁柏七升 香附一升 白芍一升半

右為末姜汁麵糊為丸

憂柳傷脾不思飲食

炒連 酒芍藥 生莎末 青六末方見滯下滑石六廿

右姜汁炊餅

濕熱痰氣 柳滯

濕痰氣滯不思穀

三補加蒼朮倍香附

本事治脾氣久虛不進食停飲脇痛曲朮丸

神曲

十斤  
微炒

白朮五斤書干姜

官桂各三斤

吳茱萸

川楝各二斤

右為細末薄糊為丸如梧子大每服三五丸生姜

湯下食前稍空服有飲加半夏曲二兩癸亥中予作

數劑自服飲食倍進

治脾腎虛弱全不進食二神丸

破故帛

四斤

肉豆蔻

二斤

右為細末用大肥粳四十九个生姜四兩切片同煮

右為細末用大肥粳四十九个生薑四兩切片同煮

針灸

粳爛去姜取粳剥去皮核用肉研為膏入藥和杵丸  
如梧子大每服三十九鹽湯下人有全不進食服補  
脾藥皆不効下投此方服之頓然能食此病不可全  
作脾虛蓋腎氣怯衰弱真元衰劣自是不能消化飲  
食譬如鼎釜之中置諸米穀下無火力雖終日米不  
孰其何能化黃曾直嘗記服兔絲子淨淘酒浸曝干  
日抄數匙以酒下十日外飲嗽如湯沃雪亦如此理也  
摘英胃弱不思飲食腸鳴腹痛食不化

三里 三陰交

浙

東陽三焦停水氣攻不食身黃微熱胃中有寒也

維道

中封

胃俞

腎俞

提要三焦邪熱不嗜飲食

關元

一分  
三分  
皮白

東陽全不思食

然谷出血立飢

書

館

脈浮滑而疾者食不消脾不磨

陽脈滑而緊滑則胃氣實緊則脾氣傷得食而不消者此

脾不治也

枳朮丸之類是也

仲寸口脈微而瀋微者衛氣不行瀋者榮氣不遠榮衛不

能相將三焦無所仰身體痺不仁榮氣不足則煩疼口

難言衛氣虛則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者

噫而酢吞中焦不歸者不能消谷引食下焦不歸者則

脈滑為食  
不消

脈微瀋為中  
焦不消谷

胃氣虛弱也常服

噫而酢吞中焦不滯者不能消谷引食下焦不滯者則

胃氣虛弱也常服

和中理氣消痰去濕厚腸胃進飲食

厚朴姜制

白朮一斤

半夏湯浸

陳皮去白

枳榔四兩五

枳實夫炒三

木香二斤

炙甘草三斤半

右為細末生姜自然汁浸餳餅為丸如梧子大每服

三五十九丸溫水送下食遠

木香枳朮丸木香人參生薑枳朮丸開胃進食二方並見肉傷

飲食門

交泰丸升陽氣瀉陰火調榮氣進飲食精神助寬腹膨

除怠惰嗜卧四肢不收沉困懶倦

知母

四斤一斤炒一斤酒炒此一味春夏兩宜秋冬去之

柴胡

去芦

寒批  
虛批

厚朴

去皮炒三升  
秋冬加七升

人參

去芦一升

黃連

去須六升秋  
冬減一升半

苦練

酒煮三升

肉桂

去皮一升

白茯苓

三升

皂角

水洗煨去  
皮弦六升

紫苑

去苗六升

砂仁

二升

小樹

炒去汗并閉  
目去子一升半

白木

一升

川烏

炮四升

干姜

炮裂三升

巴豆霜

五升

吳茱萸

湯洗七  
次五升

右除巴豆霜另入外同為極細末煉蜜為丸如梧子

大每服十九溫水送下虛實加減

河間人參半夏丸下痰進食方見  
咳

丹陶伯成年三十日服熱藥多又自性急形瘦多倦食少

此時四月節候與此方分十四帖食前熱下大補丸十

五粒

白朮

一升半

炒曲

一升

陳皮

七升

黃芩

六升

人參

一升

藏府

胃挾腕寒

遺洩 異改散之類

飢不能食

塵黃帝曰人之善飢而不嗜食者何氣使然岐伯曰精氣  
并於脾熱氣留於胃、熱則消穀、消故善飢胃氣逆  
上則胃腕寒故不嗜食也大惑篇

運氣

運氣飢不欲食皆屬濕邪傷腎經云太陰司天濕淫  
所勝民病心如懸飢不欲食治以苦熱臬也

針灸飢不欲食有二法

針灸上  
補三里

其一精胃經云胃者水谷之海其膺上在氣街下至  
三里水谷之海不足則飢不受穀食善守其輪調其  
虛實是也

取腎

針從下

診

冬脉不及  
脉弱而遲

脾胃

其二取督經云腎足少陰之脉是動則病飢不欲食

心如懸若飢狀視盛虛熱寒陷下取之也

東易飢不能食飲食不下嘔而雷鳴

中廷

中極

食竇

又法

期門

章門

圖

冬脉不及為病在中令人心懸如飢

全文見治  
虛實法

仲寸口脉弱遲弱者衛氣微遲者榮中寒榮為血血氣則

豈熱衛為氣

惡食

素太陰所謂惡聞食臭者胃無氣故惡聞食臭也

丹惡食者胸中  
有物尊度補脾二陳加木查芎藭蒼湯

素太陰所謂惡聞食臭者胃無氣故惡聞食臭也

丹惡食者胸中有物導痰補脾二陳加木查芎蒼湯

白朮 山查 川芎 蒼朮 半夏

陳皮 茯苓

垣夫笑丸治虛痞惡食 方見痞

妊娠惡食

大全治妊娠惡食

人參 四升 厚朴 生姜 枳壳 甘草各二升

右切以米六升煮取三升分三服

凡妊娠惡食者以所思食任意食之必愈

消痺門

渴而多飲為上消 消穀善飢為中消 渴而便數有膏為下消 胎前產後渴 口燥咽干

圖書

宜

虛

上下

上消大渴引

飲

口消善食而瘦

下消燥渴小便如膏

垣

上消者舌上赤裂大渴引飲逆調論云心移熱於肺傳

為革消是也

白虎加人參湯主之

潔古云上消者上焦受病又謂之革消肺也多飲水而少食大便如

或常小便清利知其燥本上焦也治宜流濕以因其燥

中消者善食而瘦自汗小便頻數才和口口干多飲水

多食亦飢虛痺成為消中者是也以調胃承氣湯三黃

丸主之

潔古云中消者胃也渴而飲法宜下之至不欲飲則安

下消者燥躁引飲耳輪焦干小便如膏并和云焦煩水

易弓此腎消也以六味地黃丸主之

潔古云腎消者痞在下焦初發為膏

淋下如膏油之狀至病成而面色鰲黑形瘦而耳焦小便數而有脂治法宜養血以肅清分其濁而自食也

右上消者經謂之革消萆消者渴而多飲是也中消

者經謂之消中消中者渴而爽飲食俱多或不渴而

右上游者經謂之華消萬消者渴而多飲是也中消

者經謂之消中消中者渴而痰飲食俱多或不渴而  
獨渴是也下消者經謂之肺消肺消者飲一溲二其  
溲如膏油即華消、中之傳變王註門謂肺藏消燥  
氣无所持是也蓋肺主氣肺無病則氣能管攝津液  
而津液之精微者守養筋骨血脈餘者為溲肺病則  
津液無氣管攝而精微者亦隨溲下故飲一溲二而  
溲如膏油也筋骨血脈无津液養故其病成漸形瘦  
焦乾也然肺病本於腎虛、則心寡於畏妄行凌  
肺而移寒與之然後肺病消故仲景治渴而小便反  
多用腎氣丸補腎救肺後人目名之為腎消及下消  
也或曰經既云肺消死不治仲景復用腎氣丸治之

何也曰飲一溲二者死不治若飲一未至於溲二而病淺者尚或可治故仲景腎氣丸治飲本一斗小便亦一斗之証若小便過於所飲者亦無及矣

益火之源以消陰翳則便溺有節

熬猪肚湯

高痺飲少溲多

腎氣丸

羊肉冬瓜湯

胃熱消穀善食而瘦

地黃丸

消渴手太陰大渴不止

消中足陽明 消弱足少陰

麥門冬飲子

痺成消中而數小便

內化丹

化水丹

易老順氣散小承氣也

鳳髓丹

牡水之主以制陽亢則渴飲不思

總論消渴末傳能食者必苦腦疽背疽不能食者必傳

中滿膨脹張至 濟總錄皆為必死不治之証 潔古老人分

消渴未傳  
瘡瘍中滿  
者必死

總論消渴未傳能食者必當腦疽背疽不能食者必傳  
中滿膨脹至臍總錄皆為必死不治之証潔古老人分  
而治之能食而渴者白虎加人參湯主之不能食而渴  
者錢氏白朮散倍加葛根主之上中既平不復傳下消  
矣前人用藥願有旨哉或曰未傳瘡疽者何也此火邪  
勝也其瘡痛也而不癢或赤水弓者是也經曰有形而  
不痛者陽之類也急攻其陽無攻其水治在下焦元氣  
得強者生弱者死未傳中滿者何也以寒治熱雖方士  
不能廢繩墨而更其道也然歲府有遠近心肺位近宜  
制小与服腎肝位遠宜制大其服皆通其至所為故過  
與不及皆誅罰無過之地也如高有中消制之太急連  
過病所久成中滿之疾正謂上熱未除中寒復生者也

禁忌  
忌飲酒房勞  
鹹食

三消芳少石  
藥

非藥之罪失其緩急之制也。処方之際宜加審焉。

本事驗錄論消渴有三種。一者渴而飲水多小便數。脂似  
麩片甜者消渴病也。二者吃食多不甚渴小便少似有  
油而數者消中病也。三者渴飲水不能多便腿脚先  
瘦小脉痿弱小便數此腎消病也。特忌房勞。千金云消  
渴病所慎者有三。一飲酒。二房勞。三鹹食。及麪。能慎此  
雖不服藥亦自可消渴之人。愈与未愈常須慮患大癩。  
必於骨節間忽發癩疽而卒。

素帝曰。夫子數言熱中消中不可服膏。梁芳少石藥石藥  
是疽。芳少。發狂。夫。熱中消中皆富貴人也。今禁膏。梁是  
不合其心。禁芳少石藥是病。不合。急聞其說。岐伯曰。夫

不合其心禁芳少石藥是病不合屢聞其說岐伯曰夫

地骨皮 赤茯苓 加白芍 黃芪 石膏

黃芩 桔梗

右為細末每服三勺姜五片水一盞煎八分食後溫服

恒白朮散治虛熱而渴

人參 一勺 白朮 一勺 白茯苓 一勺 甘草 一勺 干葛 二勺

藿香 一勺 去土 木香 一勺

右為粗末每服三勺至五勺水一盞煎至五分溫服

如飲水多並與之無時服 海藏云四君子湯加減法 治濕勝氣脫泄利太過

海治脾胃虛弱大渴不止而食少小便不利大便不調精

神短少腹窄狹如繩束之急神効

白茯苓 去皮 陳皮 去白 生姜 各一勺減一半

不能食而  
為虛熱

右細末煉蜜丸彈子大每服一丸白湯化食前空心  
細嚼白湯送下亦可忌生冷硬物怒費思慮過度如  
脉弦或腹中急甚者加甘少三分

易老門冬飲子治老弱虛人大渴

人參 枸杞 白茯苓 甘少各一 五味子 半斤

麥門冬 去心各五斤

右為麤末生姜水煎

羅麥門冬飲子治鬲消骨滿煩心津液短小多為消病

知母 甘少各 瓜蒌實 五味子 人參

葛根 茯苓 生地黃 麥門冬 去心各二斤

右為麤末每服五斤竹葉十四片同煎

小便不利而渴知肉有濕也小便自利而渴知肉有燥

渴分濕燥也  
小便不利濕  
也

垣小便不利而渴知內有濕也小便自利而渴知內有燥

也濕宜滲泄之燥宜潤之

仲脈浮小便不利微熱消渴者宜利小便黃汗五苓散主

之傷方見

脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

傷方見

本事火府丹治消渴淋方見壬戌年一卒病渴日飲三斗水

不食三月心中煩悶時已十月予謂心經有伏熱與此

藥數服五十粒溫水下越二日未謝云當日二服渴止

又次日三服飲食如故此水治淋用以治渴信知用藥

要在變通

陳藏器石燕主消渴取水牛鼻和煮飲之

石為鹿末每服五升竹葉十四片同煎

小便頻數  
為燥熱  
渴分泄閉  
洩瀉互取  
燥結者潤血

渴而小便自利諸方並見下消燥熱條

垣神效生津甘露飲子 方見下消燥熱條

丹消渴洩瀉先用白朮白芍藥皆炒為末調服後隨証服藥

垣止渴潤燥湯治消渴大便閉澀乾燥結硬兼善濕飲塗

頭退縮蓋春定方舌白燥、唇口干眼澀是也見浮雲

升麻 一分半 柴胡 七分 甘草梢 杏仁 六分 桃仁泥 一分

麻仁泥 一分 當歸身 一分 紅花 少許 防風根 一分 京芥穗 一分

熟地黃 三分 小枳 二分 細辛 一分 黃柏 一分 知母 一分

石膏 七分

右判如麻豆大水二大盞去渣稍煎服食後

有汗而渴者以辛潤之無汗而渴者以苦堅之

渴者有汗無汗

渴者有汗無汗  
有汗而渴者以辛潤之無汗而渴者以苦堅之

芳草之氣美石藥之氣悍二者其氣急疾堅勁故非緩

心和人不可以服此二者帝曰不可以服此二者何以

然岐伯曰夫執氣慄悍藥氣亦然二者相逼恐傷脾

者土也而惡木服此藥者至甲乙日更論

腹中論云多飲數  
溲謂之熱中多食無溲謂之消中○芳少白芷石藥鍾  
乳之類

垣滑石治渴本為竅不利而用之以燥而能亡津液也天

令濕氣太過者當用之若無濕用之是犯禁

靈黃帝曰人之善病消痺者何以候之少俞答曰五藏皆

柔弱者善病消痺黃帝曰何以知五藏之柔弱也少俞

答曰夫柔弱者必有剛強剛強多怒柔者易傷也黃帝

曰何候柔弱之與剛強此人薄皮膚而目堅固以深者

診  
五藏柔弱  
者病消痺

五藏皆脆者  
病消痺

五藏脈小者  
病消痺

長冲且揚其心剝、則多怒、則氣止送胸中畜積血  
氣送留腕皮充肌血脉不行轉而為熱、則消肌膚故  
為消痺此言其人暴剝而肌肉弱者

五變篇

骨筋弱小以薄者心脆心脆則善病消痺熱中○

脊背薄者肺脆、則善病消痺易傷○脇骨弱

者肝脆、則善病消痺易傷○唇大而不可堅者

脾脆、則善病消痺易傷○耳薄不可堅者腎脆

、則善病消痺易傷全文見診法

心脈微小為消痺滑甚為善渴○肺脈微小為消

痺○肝脈微小為消痺小甚為多飲○脾脈微小

為消痺○腎脈微小為消痺諸脈小者冰陴形氣

肥貴人則膏

梁之疾

脉奕而散

自己

脉实大生懸

小微死

大法

為消痺。腎脉微小為消痺諸脉小者脉臥形氣

俱不足也勿取以針而調以甘藥也

全文見治虛實法

凡治消痺肥貴人則膏梁之疾也

全文見中風

素心脉奕而散者當消環自己

脉要精微論甲乙經環作渴

帝曰消痺虛實何如岐伯曰脉实大病久可治脉懸小

堅病久不可治 通評虛實論

難病若開目而渴心下牢者脉當得緊實而數反得沉濡

而微者死也

脉消渴脉數大者生細小浮短者死

渴而多飲為上消

漸

丹消渴

養氣

降火

生血為主

瓜蒌根治消渴神藥

挑  
渴分虛寒挑  
能食而渴為  
寒挑

心移熱於肺傳為葛消

全文見診病傳變○王註云  
心肺兩間中有斜葛膜葛膜

下際內連於橫葛膜故心熱入肺久  
久傳化內為葛熱消渴而多飲也

恒潔古老人云能食而渴者白虎倍加人參湯主之不能

食而渴者錢氏方白朮散加葛根大作湯劑廣服之

仲渴欲飲水口干舌燥者白虎加人參湯主之傷寒方見

保人參石膏湯治葛消上焦煩渴不欲多食

人參半斤 石膏一斤 知母七斤 甘草一斤

右粗末每五斤至七斤水煎食後溫服

潔小柴胡加白虎湯治上消

加減錢氏地骨皮散治上消

知母 柴胡 炙甘草 半夏

和毋 柴胡 炙甘草 半夏

太陽無汗而渴不宜與白虎湯若得汗後脈洪大而渴者宜與之

陽明汗多而渴不宜與五苓散若小便不利汗少脈浮而渴者宜與之

病退後餘

執渴

再復傷病退後躁渴不鮮此有餘熱下肺經可用參苓甘草少許生姜汁冷服或以茶匙挑姜与之  
虛者可用人參湯

潔化水丹治手足少陰渴飲不止或心痛者本治飲冷水多

川烏臍大者四個炮去皮臍 炙甘草二兩 牡蛎三兩生用 蛤粉六兩用厚者炮

右為細末醋浸餗餅為丸梧子大每服十九十五丸  
新水下心痛者醋湯下其疾立食飲水一石者一服

藏府  
六經湯

甘緩

金海藏云此藥化停水

垣太陽經湯其脉浮無汗者五苓滑石之類

陽明經湯其脉長有汗者白虎涼葛散之類

少陽經湯其脉弦而嘔者小柴胡湯加瓜蒌根之類

太陰經湯其脉細不欲飲縱飲思湯不思水

少陰經湯其脉沉細自利者猪苓湯三黃丸之類

厥陰經湯其脉微引飲少與之

聖惠治時氣煩渴用生藕汁一中盞入生蜜一合令勻分

為二服蜜酒

好蜜二斤

水一碗

細曲一升

好干酵二升

右先熬蜜水去花沫令飽冷下曲酵每日三攪三日熟

醜冥

仲渴欲飲水不止者文蛤散主之

文蛤

五不換本少云海中文蛤味醜寒治

右一味杵為散以沸湯五合利服方寸匕

經驗治一切渴大牡砺不計多少於臍月端午日黃泥裹

煨通赤放冷取出為末用治鯽魚煎湯調下一分匕小

兒服半分匕只兩服差

圖

本事治渴疾飲水不止神效散

白浮石

蛤粉

蟬殼

各等分

右細末用鯽魚膽七个調三分不拘時服神效

治消渴方

浮石

舶上青黛各等分

射香少许

右先熬蜜水去花沫令飽冷下曲酵每旦三攪三日乾

苦堅

辛潤

酸收

右細末每服一盞温湯調下

黃連丸瓜蒌根丸是也

保上焦燥而渴蜜煎生薑湯大器傾之時、呷之法曰心  
肺之病莫厭頻而少飲内經曰補上治上宜以緩又曰  
辛以潤之用賸理至津液通則肺氣下流故火氣降而  
燥甚矣其渴乃止

秦運副有人消渴引飲無度或令食韭苗其渴遂止法  
要日三五兩或炒或作羹無入鹽極効但吃得十斤即佳  
海千里漿一名水胡芦

木瓜 紫蘇葉

桂各半

烏梅肉

赤茯苓

各乙

一方有神曲豆粉

右為細末煉蜜為丸如彈子大噲化一丸嚥  
齒屬腎水故也

又方

百藥煎

烏梅肉

紫蘇葉

人參

甘草

麥門冬

右等分為細末煉蜜丸噲化

荔枝湯

烏梅肉

甘草

各二

百藥煎

一升

白芷

半升

白檀

三升

右細末湯点

運氣渴有二

一曰熱助心盛而渴經云少陽司天之政三之氣

運氣

熱助心盛渴者治以寒

改心虛  
渴者治以

雜方

吐後渴

炎暑至民病渴又云少阴之復渴而欲飲又云少

陽之復噎乾焦槁渴引水漿治諸寒劑是也

二曰寒攻心虛而渴經云太陽司天寒氣下臨心

火上從噎乾善渴又云太陽司天寒淫所勝民病

噎乾渴而欲飲又云歲水太過上臨太陽民病渴

而妄胃治以諸熱是也

丹消渴綠系湯用此吐引清氣上行朝于口

仲吐後欲得水而貪飲者文蛤湯主之兼主微風脉緊頭痛

文蛤五斤 麻黃 甘中 生姜各三斤 石膏五斤

杏仁五斤 大棗十三斤

石七味以水六升煮取二升温服一升汗出愈

渴病食法

垣甘草石膏湯治渴病全愈再創添舌白滑微腫咽喉嚨  
唾覺痛溢腫時有渴喜冷飲白沫如膠飲冷乃罷

又名辛潤緩肌湯  
又名清神補氣湯

升麻半斤

柴胡

甘少根三分

黃柏一斤

石膏六斤

杏仁六斤

桃仁一斤

當歸一斤

防風根一斤

京芥穗一斤

生地黄一斤

熟地黄一斤

黃連三分

知母一斤

細辛一斤

紅花少許

小枳三个

右件剉如麻豆大作一服水二大盞並至一盞去渣

稍熱服食後

針灸口渴咽乾有四法

其一取心經云心手少阴之脉是動則病噎乾心痛渴

針灸上  
心痛取心

目黃耳聾  
取肺大腸

口如膠取腎

面塵取肝

針灸下

而欲飲隨感虛寒熱陷下取之也

其二取肺大腸經云大腸手陽明之脈所生病者目黃

口干隨病感虛熱寒陷下又云肺虛則少氣耳聾嗌干

取其經太陽之太陽之外厥脈內血者是也

其三取腎經云腎足少陽之脈所生病者口熱舌燥咽

腫溢乾隨感虛熱寒又云嗌干口中熱如膠取足少陽

是也

其四取肝經云肝足厥陰之脈是動病甚則嗌干面塵

脫色隨感虛熱寒

寤語消渴消渴經百日已上者不可灸

玉液一分瀉見血三里瀉訖如前補玉液關元取廉泉

集成又法

金津玉液取漿再取

海泉人中廉泉腎腧氣海

東陽又法

小腸腧陽池各灸

廉泉出惡血免

又法

胃脘心腧膻中灸各之

圖書

又法

承漿然谷勞宮曲池各灸之  
意會闕元各灸之

世口熱咽干唾如膠口苦噎漸介然

大谿五分

陽陵泉二寸半

甲飲渴身體多噎隱白主之

口苦咽干

消渴嗜飲承漿主之

消渴腕骨主之

嗌乾腹痠痛坐起目眩、善怒多言伏番主之

消穀善飢為中消書

痺成為消中

全文見診。經云五藏皆柔弱而脆者病消痺。三註云痺謂濕熱也。

已食如飢者胃痺

平人氣象論註下痺勞病也。

穀入多而氣少得之有所脫血濕居下也

全文見診生死

靈胃中熱則消穀合心懸心善飢臍以上皮熱

師傳篇下全

胃中熱腸中寒則疾飢小腹痛

中熱

則胃中消穀 五癰津液篇

大腸熱則消水善渴

素二陽結謂之消

水陰別論。王註云胃及大腸俱熱結也。熱則善消水穀。

中消飲食

甘美致

垣消渴中消自古只治燥止渴悞矣殊不知二陽結謂之

消二以白陽明也手陽明大腸主津液所生病則目黃

口乾是津液不足也是陽明主血所生病熱則消穀飢善

血中決火是血不足也結者津液不足結而不潤皆燥

熱為病也此因飲食甘美而多肥故矣氣上逆轉為消渴

治之以茵陳除陳氣也不可服膏梁芳少五藥其氣慄悍

能助熱燥也越人云邪在六府則陽不和陽脈不和則

氣留之則陽脈盛矣陽脈大盛則脈氣不得榮也故肌

肉皮膚消削是也

浙

素帝曰消病口甘者病名為何、以得之岐伯曰此五氣

之溢也名曰脾瘴人五味入口藏於胃脾為之行其精

虛者潤之

氣津液在脾故令人味甘也此肥美之所資也此人必  
數食甘美而多肥也肥者令人內熱甘者令人中滿故  
其氣上溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也 奇病論

潔胃熱則善消水穀可甘辛降火之劑黃連末生地黄自

然汁白蓮藕自然汁牛乳各一斤熬成膏和黃連末為

丸梧子大每三五十九丸少呷溢水送下日進十服立止

河間猪肚丸治消渴消痞

猪肚一个 黃連五斤 瓜蒌根四斤 麥門冬四斤去心炒

知母一斤

右為細末納猪肚中線縫安置甌中蒸極爛熟就熱  
於木印中杵可丸為度加硬加蜜如梧子大每服三

於本印中粹可丸為度加便如蜜如梧子大每服三

十丸漸加至四五十丸渴則服之食前服 三四方多  
梁米苳神

本中云猪肚補  
中益氣止渴

實者下之

垣調胃承氣湯治消中渴而飲食多方見傷寒

三黃丸 方見治黃熱

潔順氣散治消中熱在胃而能食小便赤黃微利至不欲

食為効不可多利

厚朴一升 大黃四升 枳實三升

右剉每服五升水煎食遠服

大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食休 全文見診病傳  
變口食休者謂

謂食入移易而過不生肌膚亦易也東垣云善食而  
瘦者胃伏火邪於氣分則能食脾虛則肌肉削也食

胃移熱於膽亦曰食休 今上

食休即消中病

河間參 丸治食休胃中結熱消穀善食不生肌肉

人參 赤茯苓 菖蒲 遠志 地骨皮

牛膝 酒浸各乙刃

右為末煉蜜丸梧子大每十五丸米飲下

運氣

運氣消中皆

屬熱

針灸

消中皆取三里

運氣消中皆屬熱經云少陽之勝熱客于胃善飢治以寒劑是也

刺灸消中皆取於胃經云邪在脾胃陽氣有餘

氣不足則熱中善飢皆調于三里又云胃足則明

之脈氣盛則身已前皆熱其消餘於胃則消穀善

飢熱則疾之感  
則寫之也

甲 脾氣不足熱中消穀善飢腹熱身煩狂言三里主之

食位命脾

季脇

燥批

東垣丹溪法

腹中氣脹引脊痛食飲多而身羸瘦名曰食位每作

取脾俞後取季脇

渴而便數有膏為下消

羅消渴治驗 順德安撫張芸夫年四十五歲病消渴舌

上赤裂飲水無度小便數多先師以此藥治之旬日良愈

消渴多傳瘡瘍以成不救之疾既効亦不傳瘡瘍享年七

十有五終名之曰

神効生津甘露飲子治消渴上下齒皆麻舌根強硬赤

爛腫痛食不下腹時脹瘡癢泄黃如糜名曰飧泄渾身

色黃目白睛黃四肢痿厥前陰如冰痿弱而短小尻髻

腰背寒渾身由軟面夭黑紫黃塵色相雜下急痛噎噴

脾氣不足批中消穀善飢腹熱身煩狂言三里主之

善怒健忘

石膏二斤

人參二斤

生甘草根一斤

山梔子一斤

草澄茄一斤

白豆蔻二斤

白茯苓半斤

酒黃柏半斤

白芷一斤

連翹一斤

杏仁半斤

麥門冬半斤

黃連一斤

木香三斤

桔梗三斤

升麻根一斤

姜黃一斤

酒知母二斤

當歸身半斤

全蝎二斤

藿香葉二斤

柴胡根三斤

蘭香半斤

右為末湯浸餗餅和勻成劑捏作餅子日中晒半干  
杵碎如黃米大每服秤二斤抄於掌中以舌舐之津  
唾送下或白湯一口下食後戊申年十一月七日即  
律萬戶服之神効 凡消之為病燥熱之氣勝必內  
經曰熱淫所勝佐以甘苦以甘瀉之熱則傷氣、傷

經曰熱淫所勝佐以甘苦以甘瀉之熱則傷氣、傷  
則無潤折熱補氣非甘寒之劑不能除故以石膏甘  
草之甘為上啓玄子曰滋水之源以鎮陽先故以黃  
柏黃連梔子知母之苦寒補水為臣以當歸杏仁麥  
門冬全蠍連翹白葵藺香甘辛寒和血潤燥為佐升  
麻柴胡苦平行陽明少陽二經葶藶澄茄白豆蔻木香  
藿香反佐以取之人參為回用桔梗為舟楫便浮而  
不下也

垣和血養氣湯治口干舌渴小便數舌上赤脈山藥生澤  
除干燥生肥肉

仲冬定此一名黃飲子

口乾舌渴 杏仁 六個 生甘草 三分

小便數者 取膏六分

舌上赤脉 酒黃連八分 桃仁六個 酒生地黃純酒黃柏一

酒當歸梢細 柴胡一升 炙甘草少三 升麻一升 紅卷少許

酒知母半升 麻黃三升 酒防已 羌活根半升

右剉如麻豆大 作一服水二大盞 煎至一盞 去滓

熱服 食後忌酒 濕麪房事

生津甘露飲子 治消中能食而瘦 口干舌干 自汗大便

結小便數

羌活梢半升 柴胡梢一升 升麻梢四分 防風梢五分 當歸梢六分

黃柏系半 甘草梢多一升 石膏一升 酒知母半升 漢防已半升

酒龍胆半升 紅花少許 桃仁五個 杏仁十個 酒生地黃半升

黃芪根一系 酒黃芩一系 生甘草梢半系

右剉如麻豆大都作一眼水二大盞酒一匙煎至一

盞去查食後稍熱服

甘露膏 治消渴飲水極甚善食而瘦自汗大便結燥

小便頻數

石膏二系 知母一系 生甘草一系 炙甘草半系 人參半系

防風根一系 半夏湯洗三分 蘭草半系 白豆蔻 連翹

桔梗 升麻灸一系半

右件同細末水浸蒸餅和勻成劑捏作薄餅子日中

晒干碎如米大每服秤二錢淡生姜湯送下食後

丹 武義徐兄年四十一歲口乾溺數春末得之夏來求治

診其 兩手皆濡右畧數而不強重取似太而稍有力  
左稍沉畧弱而不弦然濡却多於右喜兩人皆不甚起  
此當作飲食味厚主熱此謂之痰熱禁其味浚降火以  
消金柳肝以補脾三補甘一粘明陽五粒阿魏五粒以  
生薑湯吞下一日六次又以四物湯加參朮陳皮生甘  
中五味子麥門冬煎服一日三次與丸藥間吃之一二  
日自覺清快小便減三之二口不干止是濁末清頭暈  
眼花久坐則腰疼遂以摩腰丹治腰疼仍以朮參芪芎  
湯減芎加牛膝五味子炒柏麥門冬煎飲調六乙散反  
覺便多遂去六乙散仍吃丸藥而安

芪萎根治消  
渴要藥

治消渴黃連末 天花粉末 人乳 生地黃汁 生藕汁

二物為膏入山藥搜和以姜汁和蜜湯為膏徐留於

舌上以白湯少許送下能食者加軟石膏

治消渴一味天花粉為末以人乳汁生薑汁韭苗膏為

丸如棗豆大每服百丸食後

肘後治消渴小便多者煮瓜蒌根汁飲之良

世治消渴無方可治者

天花粉 炒大烏頭

右等分為細末麵糊如梧子大每服百粒黑豆湯吞下

大効已上瓜蒌根為君本草云瓜蒌根主消渴止小便

流濕潤燥菖蒲酒要藥也

本事千金地黃丸治腎消

川黃連

四刀粗末

生地黄

半斤研末汁連查拌黃連末日干

右細末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食後門冬湯下

羅酒蒸黃連治消渴飲水無度小便頻數

黃連

淨半斤無灰好酒一升浸一宿湯重蒸伏時取出晒干用

石為末酒丸晒干如梧子大每服五七丸溫水下

又方治卒消渴小便多搗黃連絹篩蜜和服三十丸治

渴延年

麥門冬治消渴日夜飲水不止飲下小便即出

麥門冬

去心

黃連

冬瓜各二刀

石為粗末每服五升水一盞蜜七分去渣溫服如無干者用新瓜一个用重三斤去次核分作十二片為

干者用新瓜一个用重三斤去次穰分作十二片为  
十二服每服瓜一片劈破水三盞煎七分去渣温服  
日三服已

冬瓜飲子治消渴能飲食而飲水多小便如脂麩片及  
日夜無度

冬瓜 一个 黃連 十斤為末

右二味以冬瓜割開去穰中摻黃連末在冬瓜內却  
用頂蓋執灰中煨執去皮均細爛研在布內撓令取  
汁每服一盞至二盞日三服夜一服

本事治消渴三消丸好黃連去鬚細末不計多少剉冬瓜  
肉研裂自然汁和成餅子陰干再為末再用汁浸和如  
是七次即用冬瓜汁為丸梧子大每服三四十九以冬

瓜汁並大麥仁湯送下尋常渴止一眼

已上五方黃連  
冬瓜為君丹溪

云冬瓜性走而急久病与尿虛者  
忌之然有黃連為侶用者審之

食鹽主消渴飲水日夜不止小便數田中螺五升水一

斗浸經宿渴即飲之每日一度易水換生螺為妙又方

以水三升煮取汁冷即飲之螺即任吃

子和治飲水千盃尚猶未足小便如沙或如杏色服此藥

三五日小便大出毒歸于下十日永除根本此方今子

和辨過云是重劑可用僧人悟大歸親試驗

水銀四升

錫

二升用水研成砂子

牡礪

一升

蜜陀僧一升

知母一升

紫花苦參一升

貝母一升

黃丹半升

右為細末男子用不生兒猪肚一个内藥婦人用犢

右為細末男子用不生兒猪肚一个内藥婦人用積

猪肚一个内藥麻線縫之新瓦一合繩繫一二遭別

用米一升瓜萋根末半斤於新水内煮熟取出放冷

不用米瓜萋末只研猪肚并肚中藥末爛研就和為

丸如梧子大如硬加蜜丸每服三十九丸食前米湯下

三日方無貝母

河間

胡粉散治大渴百方瘡不瘥者亦治腎消

黃丹

胡粉各半

瓜萋根二升

甘草三升半

澤瀉

石膏

赤石脂

白石脂各半

右為細末水煎方寸匕漸二服壯者一匕半二年病

一日食二年病二日食渴甚者二服食腹痛者減之

如丸服尤妙每服十九多服則腹痛

反位以取之

葛根丸治消渴消腎日飲頌水者

葛根 三升

瓜蒌根 三升

黃丹 二升

附子

一升者炮去皮臍

右為末煉蜜丸梧子大每服十丸日進三服春夏去

附子

疸六味地黃丸治腎消方在治虛寒

經驗後方治消渴不止下元虛損牛膝五兩細剉為末生

地黃汁五升浸晝曝夜浸汁盡為度蜜丸如梧桐子大

空心溫酒下三十九丸久服壯筋骨駐顏色黑髮津液自

生

仲男子消渴小便反多以飲一斗小便一斗腎氣丸主之

方見治虛寒法

虛 下清皆屬腎

腎虛寒

保腎氣丸治腎消加減法

右依腎氣丸本方加山藥一語外桂附從四時加減冬  
一兩春秋三錢夏一錢

又法腎氣丸去附加五味子一兩半

本事唐祠部李郎中論消渴者腎虛所致每發則小便甜  
鑿者多不知其疾故亦闕而不言洪範言稼穡作甘以  
物推之淋錫醋酒作脯法酒更即皆能甜也是明人食  
之後滋味皆甜流在膀胱若腰腎氣盛則上蒸穀氣化  
精氣則下骨髓其次為脂膏其次為血肉也其餘則為  
小便故小便色黃血之餘也騷氣者五臟之氣鹹潤者  
則下味也若腰腎既虛冷則下能蒸於穀氣則下為

小便故味甘不變其色清冷則肌膚枯槁也猶如乳母  
穀氣上泄皆為乳汁消渴病者下泄為小便皆精氣不  
實於內則小便數瘦弱也又肺為五臟華蓋若下有煖  
氣蒸則肺潤若下冷極則坎不能升故肺乾而渴易於  
痞卦乾上坤下坎無陰而不降坎無陽而不升上下不  
交故成否也譬如釜中消水以火煖之其釜若以板覆  
之則煖氣上騰故板能潤也若無火力水氣則不  
能上此板則終不得潤也火力者則是腰腎強盛也常  
須煖補腎氣飲食得火力則潤上而易消亦免干渴也  
故張仲景云宜服腎氣八味丸此疾與脚氣雖同皆腎  
虛所致其脚氣始發於二三月盛於五六月衰於七八

虛所致其脚氣始發於二三月盛於五六月衰於七八

氣虛

汚無滲氣

月凡消渴始發於七八月盛於十一月十二月衰於二  
三月其何故也夫脚氣壅疾也消渴宣疾也春夏陽氣  
上故壅疾發則宣疾愈秋冬陽氣下故宣疾發則壅疾  
愈也審此二者疾可理也猶如善為政者寬以濟猛、  
以濟寬隨事制度爾

和劑黃芪六乙治諸虛不足胸中煩悸時常消渴口干

燥干或先渴而欲發瘡癩或病癰疽而後渴者方見癰

凡消渴而小便反多有脂者皆氣虛不能攝  
津液也黃芪補氣之要藥

保竹龍丸治消渴

五靈脂

衍義云五靈脂入肝最遠  
行經血有攻不能生血

烏豆

去皮

有等分每服三分冬瓜湯調下無瓜時苗葉亦可日三

雜方

眼小渴則二三服効渴定勿服熱藥在眼八味丸去附

加五味子

外臺治消腎小便數鹿角一具炙令焦搗篩為末酒服方

寸七漸、加至

任茴香散治瀉病下焦物証小便如膏油

茴香炒

苦練炒

右為末酒調之食後服

食鑿治消渴舌焦口干小便數野雉一隻以五味煮令極

熟取二升半已來去肉取汁渴飲之肉亦可食

又法主消渴飲

之每度小便多口干渴雖一隻切細和鹽豉作羹食

肝痺者夜卧則驚多飲數小便

全文見痺

肝瘵者夜卧则驚及飲數小便

心移寒於肺、消肺消者飲一溲二死不治

全文見診病傳

變口王註云肺藏消燥氣無所特故飲一而溲二

仲寸口脉浮而遲浮即為虛遲即為勞虛則衛氣不足勞則榮氣竭趺陽脉浮而數浮則為氣數即消穀而大堅氣盛則溲數溲數則堅、數相搏即為消渴夫陽脉數胃中有熱即消穀引飲大便必堅小便即數

胎前渴

云岐葛根散治婦人妊娠胸膈煩燥唇口干渴四支肚執

少食

葛根

黃芩

人參

萎蕤

黃耆

甘草

麥門冬

各等分

右吹咀每服四升竹茹彈子大水煎

人參黃連散 治妊娠身熱煩躁口干少食

人參 黃芪 葛根 秦艽 麥門冬 各一升

知母 七升 甘草 半升 赤茯苓 一升

右吹咀每服四升姜三片淡竹葉十四片水同煎

治妊娠雍熱心神煩躁口干渴逆

升麻 黃芩 人參 麥門冬 梔子仁

柴胡 茯苓 瓜蒌根 犀角屑 知母

甘草 各半升

右吹咀每服四升水煎

知母散治妊娠煩悶亂口干及胎藏熱

蘇方

虛執

血

知母

麥門冬

甘山

各半

黃芪

苓

赤茯苓

各七升半

右以咀每服四升竹茹一塊水煎

產後渴

云岐 竹葉湯治產後虛渴少氣力

竹葉三升

甘草

人參

茯苓

各二

小麥

五合

生姜

半夏

各三升

麥門冬

五升

大棗

十五个

右以咀以水九升先竹葉小麥生姜粳取七升去查

納茶再煎取二升去查每服五合日三夜一

延胡索散治產後血渴不止

延胡索

蔚金

乾葛

桂心

青皮

枳壳制等分

右件並以好醋浸一宿焙干為細末每服二分冷橘

皮湯調下日三服差

本事治產後出血太多虛煩發渴蒲黃散

真蒲黃末二升飲下渴燥甚新汲水下

大全產後中風煩渴

紅卷子五合

少微熱研碎

右以水一升並取七合每一匙徐呷

陳士良蓮子心生取為細末米飲調下二分療血渴疾

產後渴疾服之立愈

保桃花散治產後不煩而渴

燥  
桃

新石灰 乙丑 黃丹 半斤

右為細末渴時冷水下一分

口燥咽乾

垣飲食不節勞役所傷以致脾胃虛弱乃血所生病主口中津液不行故口干咽干也病人自以為渴鑿者以五苓散治渴燥而反加渴燥乃重竭津液以致危亡經云虛則補其母當於心與小腸以補脾胃之根蒂也甘溫之藥為之主以苦寒之藥為之使以酸味為之臣佐以其心苦緩急食酸以收之心火旺而肺金受邪金虛以酸補次以甘溫及甘寒之劑於脾胃中瀉心火之亢盛是治其本也

本事治口乾煩燥生津液思飲食黃芪湯

黃芪 熟地黃乾 白芍藥 五味子 麥門冬各三

白茯苓乙乃 甘少半乃 人參 天門冬各半乃

石粗末每服三升水一盞半姜枣烏梅同煎去滓服

食後

精母五味子湯葉枝益治口干方見瘧疽門

運氣口燥咽乾皆屬燥二氣然分而言之有四

一曰熱經云歲火太過民病噎燥又云少陰司天熱

淫所勝病胸中煩熱噎乾治以寒劑是也

二曰燥經云金樞鬱之貴噎干面塵又云陽明在泉燥

淫所勝甚則噎干面塵治以溫劑是也

運氣

口燥咽干皆屬

燥熱

胸煩者熱治以寒

面塵者燥治以

溫

經脈  
忌

大法

三曰上熱下燥經言少陰司天之政水火寒熱之氣  
時於氣交民病嘔乾四之氣寒熱五 民病噎乾是也  
四曰上燥下熱經云陽明司天之政四之氣民病噎  
干引飲皆治以寒溫少多其制是也

素脊脈生病噎乾 骨空論

丹 口燥咽乾 忌南星半夏

黃疸

產後黃目黃

食勞疳黃黑疸

黃汗

丹五疸 不用分與同是濕熱如膏麩相似又濕熱困倒  
胃氣輕者少溫中丸 重者大溫中丸多熱者加黃連  
濕多者茵陳五苓散加食積藥

服下藥大便不利者參朮加茵陳山梔甘少

諸疸痢復

仲諸病黃家但利其小便假令脉浮當以汗解之宜桂枝

加黃芪湯主之

穀疸之為病寒熱不食、即頭眩心悶不樂久、苦茗

為穀疸首蘼蒿湯主之黃疸病首蘼五苓散主之二方並見

傷寒門

羅茯苓濕湯 治黃疸寒熱嘔吐而渴欲飲冷身體面目

黃小便不得利不得臥不思食

白茯苓五分 澤瀉三分 首蘼蒿二分 木猪苓三分 生黃苓

黃連 梔子 漢防已 白朮 蒼朮 陈皮

青皮 各二分

右咬咀都作一服水煎空心食前服治驗

右收咀都作一服水煎空心食前服治驗

完顏正卿丙寅二月間因官事勞役飲食不節心火乘脾  
氣虛弱天以恚怒氣逆傷肝心下痞滿四肢困倦身體  
麻木次傳身目俱黃微見青色顏黑心神悶亂怔忡不  
安兀、欲吐口生惡味飲食遲化時下完穀小便癃閉  
而赤黑辰巳之間發熱日暮則止至四月尤甚其子以  
危急來請治之診其脈浮緩金匱云浮則為風緩則為  
痺、非中風四支苦煩脾色必黃瘀熱以行穀食則眩  
氣不消胃中苦濁、氣下流熱流膀胱身體盡黃名穀  
疸此之謂也茯苓梔子首癩湯主之

右與前方茯苓滲濕湯藥味皆同但多枳實一味  
右件收咀都作一服長流水三盞量至一盞去渣溫

服食後一服減半二服良愈梔子茵陳苦寒能瀉濕熱  
而退黃故以為君黃連枳實苦寒泄心下滿肺主氣熱  
傷其氣故身體麻木以黃芩苦寒瀉火補氣為臣二朮  
苦甘溫青橘皮苦辛溫能除胃中濕熱泄其壅滯養其  
正氣防已苦寒能去十二經留滯濕澤瀉鹹平茯苓猪  
苓甘平導膀胱中濕熱利小便而去癰閉也

丹沸生酒疸脉如

也尿赤

此後五方  
虛者宜之

白朮一升

人參

猪苓

茵陳五升

澤瀉七升

炒梔

木通三升

桂枝

一婦人年卅八歲發黃脉澀經自來不行倦怠未曾生子

陳皮

白朮

木通一升

生地

黃芩

歸頭 牡丹 半斤 甘草 半斤

分十二帖水二盞並取一盞食前執服

千金治黃疸取小麥杵絞取汁飲六七合昼夜三四飲之

三四日便愈

仲諸黃猪膏髮並主之

猪膏 半斤

乱髮 如雞子大 三枚

右一味和膏中並之髮消藥成分兩服病從小便出

垣腎疸湯治腎 垣回黃渾身黃小便赤澀

升麻根 半斤

羌活 半斤用根截

防風根 半斤 藁本 半斤

獨活根 半斤

白朮 半斤

柴胡根

半斤已上治腎疸目黃渾身黃

蒼朮 一斤

猪苓 一分

澤瀉 三分

白茯苓

已上治小便赤澀

葛根 半斤

甘中根 三分

陳皮 白朮 不通一升 生地 黃芩

瘧而復和脈浮者  
宜汗之

黃柏 二分  
人參 五錢  
麩 六分

右件剉如麻豆大分作二服每服以水三盞煎至一

盞去渣稍熱服食前

仲桂枝加黃芪

治黃疸脈浮

脈浮腹中不和者宜汗之若  
腹滿欲嘔吐懊憹而下和

者宜吐之非可汗也

桂枝

芍藥 各三錢

甘草 二錢

生姜 三錢

大棗 十二個

黃芪 二兩

右六味以水八升煮取三升溫服一升須臾飲熱稀

粥一升餘以助藥力溫服取微汗若不汗更服

丹車頭人年二十因勞胃而得黃疸脚瘦心忪口苦力弱

不黃脈浮而數病在表宜解外

疸而腹滿欲吐  
心挑懊懣  
脉浮者先吐之  
脉沉者下之

黃芪 三斤  
白朮  
蒼朮 一斤  
陳皮  
蘇梗葉

木通 半斤  
炒梔子  
甘梢 半斤

作一帖煎下保和丸十五粒与点柳青十九温中芩  
仲麻黃醇酒湯治黃疸

麻黃 三斤

右一味以美清酒五升煮取二升半頓服尽冬月用  
酒煮春月用水煮之

酒黃疸者或無热請言了腹滿欲吐鼻燥其脉浮者先  
吐之沉弦者先下之

酒疸心中热欲嘔者吐之食  
陳橘皮証欲嘔者韓氏苟

瓜蒂湯治諸黃

瓜蒂 二七個

右剉以水一升煮取五合去渣頓服

百乙治黃疸取藜蘆者灰中炮之小變色搗為末水服半

錢七小吐不過數服

子和蔡綦一女病黃遍身浮腫面如金色困之力無不思飢餓

惟喜食生物灰裁之屬先以苦劑蒸餅為丸痛痰一梳

又以舟車丸通經散下五七行如墨汁更以導飲丸磨

氣散不數日肌肉如初

季七老病涌水証面黃而喘兩足皆腫按之陷而復起

行則濯、有聲常欲飲水不能睡卧裁人令上涌去痰

而汗之次以舟車丸濟川散下之以益腎散復下之以

胆而腹滿汗出  
小閉宜下

○黃疸腹滿便

不利而出自汗出

此為表和裡實

當下之宜大黃

硝石湯主之

大黃黃柏消

各四枚梔子十四

右四味以水并

煮取五升去

相照。

分陟陟利水道之劑復下之所苦皆差

左脉浮而腹不和者吐之

仲酒黃疸心中懊懷或熱病梔子大黃湯主之

梔子十四 大黃一斤 枳實五升 豉一升

右四味以水六升煮取二升溫服三去渣內消更取一升頓

師曰病黃疸發熱煩喘胸滿口燥者以病發火劫其汗

兩熱所得然黃家所得從濕得之一身尽發熱面黃吐

熱、在裏當下之

羅黃連散治黃疸人小便必澀壅熱累效

黃連二升 川大黃拌抄 二升 好醋 黃芩 炙甘草 各二升

右為極細末每服二升食後溫水調下日三先用瓜

蒂散搗鼻取下黃水却服黃連散

瓜蒂散 見後雜方條

孫真人治黃疸皮膚睛赤金色小便赤取秦芫五兩

牛乳三升煮取一升去渣內芒硝一兩服

蕭炳云秦芫治酒疸

子和喜趙君玉為省椽日病黃遍身黃往問鑿者鑿

云君乃陽明証公等其麻知 幾皆受訓於張裁人是

商議吃大黃者難與論病君玉不悅歸自揣無別病乃

取三花神僮丸八十粒服之不動君玉乃悞曰予之濕

熱感矣此藥尚不動以舟車丸瀘川散作劑大下之斗

糞多結者一夕黃退君玉由此益信裁人之言

右脈沉腹不和者下也

仲諸黃腹痛而嘔者宜柴胡湯

林億云必小柴胡方見傷寒

瘧而腹痛嘔者和之

孫尚

治黃疸柴胡一兩去苗甘少一分都細剉作一劑以水

一碗白茅根一握同煎至七分去渣任意服一日尽

諸疸小便不利為裏實宜利小便或下之無汗為表

實宜發汗或吐之治法並見表裏疸條

仲男子黃疸大便自利當與虛勞小建中湯方見傷寒

海內感勞役形體飲食失節中州受寒之病生黃非壞之

而得只用建中理中大建中足矣不必用茵陳也

垣一婦人年六十歲病振寒戰慄大敗寒水也呵欠噦噴

足少陽溢也口亡津液足陽明不足也心下急痛而痞

手少陰受寒足少陰血凝而痞身熱欲近火熱在皮膚

寒在骨髓臍下惡寒丹曰有寒渾身黃睛黃寒濕也余

虛實

小便不利無汗

為實

小便自利自

汗為虛

証驗之知其寒也溺黃赤而黑類數者寒濕勝也目病  
來身重如山便自床枕者臥濕感也其脈右手關尺命  
門弦細按之洪而弦、急為寒加之細者北方寒水雜  
以緩甚者濕感出黃色洪大心火受制也左手又按之  
至骨舉指來實者壬癸腎旺也六脈按之俱空虛者下  
焦無陽也用藥法先宜以輕劑以去其中焦寒濕無退  
其洪大脈也以理中加茯苓湯投之  
按此証雖小便黃赤亦作寒治者蓋

以餘証及脈別之也

人參

白朮

甘草

甘姜

茯苓

右為細末水一大盞煎至一盞以冷水與之熱目寒  
用假寒与之對足太陰之假熱以干姜辛熱寫膀胱

之真寒故曰真對真假對假若不食當以木附湯水  
與之

羅陰黃治驗○至元丙寅六月時雨霖霖人多病濕疫真  
之韓君詳曰勞役過度渴飲涼茶及食冷物遂病頭痛  
肢節亦疼身體沉重胸滿不食以為外感傷用通聖散  
二服後添身體困甚方令鑿治之鑿以百解散發其汗越  
四日以小柴胡湯二服後加煩燥及六日以三一承氣  
湯下之燥渴尤甚又投白虎加人參湯柴胡飲子之類  
病愈增又易鑿用黃連解毒湯朱砂丸膏至宝丹至十  
七日後病勢轉增傳變身目俱黃肢體沉重皆惡寒皮  
膚冷心下痞更按之而痛眼澀不欲開目睛不了、傾

言語自汗小便利大便利而不了命予治之診其脈緊  
細按之虛空兩寸脈短不及本位此証得之曰熱而飲  
冷加以寒藥過度助水乘心反乘侮土先因其母後薄  
其子經云薄而不勝乘斯勝也時值霖雨乃寒濕相合  
此謂水証黃黃明也予以首朮附子干姜湯主之內經  
云寒淫于內治以甘熱佐以苦辛濕淫所勝平以苦熱  
以淡滲之以苦燥之附子干姜辛甘大熱散黃中寒故  
以為主半夏少豆蔻辛熱白朮陳皮甘溫健脾燥濕故  
以為臣生姜辛溫以散之澤瀉甘平以滲之枳實微苦  
寒泄其痞閉首朮微苦寒其氣輕浮佐以姜附能去膚  
腠間寒濕而退其黃故為佐使也並服一兩前証減半

證同寒濕而過其黃故為估使也並服一兩前証減半

再服悉去又以理中湯服之數日氣得平復或者雖曰  
黃皆以為熱今暑熱隆盛又以熱藥治何也予曰理  
所當然成無已云此証有云一者治外傷寒邪此証受  
之或曰冷物傷太陰經也二者始得此証以寒治之寒  
涼過度亦此為此也今君詳曰天令暑熱冷物傷脾過  
度腹寒涼此氣太盛此氣欲絕加以此而寒濕相合黃  
為黃也仲景所謂當於寒濕中求之孝思順云解之而  
寒涼過劑瀉之而逐寇傷君正以此也聖賢之制豈敢  
越哉或曰潔古之學有自來矣  
茵陳附子甘少湯治目眼涼藥過度則為此証身目俱  
黃皮冷心下痞眼澁不用自汗小便利

附子 泡去皮 脐三分 干姜 炮二分 茵陈 一分 少豆蔻 一分 麝香一分 用

茯苓 去皮 枳实 去炒 泽泻 各半 白术 四分

半夏 湯洗七次 陳皮 三分 去白

右剉為一服水盞半姜五片煎一盞去渣涼服不拘

時候

無澤養榮湯治五疸却弱心忙口說耳嚮微寒發熱氣急

小便白濁當作虛勞治之

黃芪 當歸 桂心 甘草 炙 橘皮

白朮 人參 各一分 白芍藥 三分 干地黄

五味子 茯苓 各三分 遠志 去心半升

右剉每服四升水一盞半姜三片粳二个煎至七分

去查空腹服

右五法治虛寒黃疸

丹許大四十歲久勞苦得面黃心悸口苦小便却不黃  
自利食甚少脉左大於右此虛中受濕也

白朮 一升  
芍藥 當歸 五升  
黃芪 黃芩

茯苓 人參 三升  
陳皮 一升半  
黃連 一升  
甘草 半升

分八帖下保和温中各廿丸

垣補中湯治面黃多汗目昏赤四肢沉重減食腹中時  
痛嗽兩手左脉短右手脉弦細兼澁右手關脉虛

升麻 柴胡 各二升  
當歸身 二分  
蒼朮 半升  
澤瀉 累

炙甘草 八分  
五味子 二升  
黃芪 二升半  
曲 三分  
紅花 少許

大麥麩半斤

右為細末分作二服每服水一大盞煎至一盞去渣

稍熱服食前

右二方治虛熱黃疸

仲黃疸小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱、除必

歲、者小半夏湯主之

方見嘔吐門小便色不變不可除熱者蓋中無熱故也清白而

不變黃色無熱可除也

諸疸小便色白不變不可除熱者無熱也若又虛寒

証者當作虛勞疸治之

諸疸小便色變黃赤為濕熱治法並見表裏疸條

嚴氏穀疸丸專治穀疸

寒熱

小便不白不變

為虛熱

小便色變黃

赤為濕熱

苦參 三升 龍胆 一升 牛胆 一个

右為末用牛膽汁入少煉蜜為丸如梧子大每服五

十九宜心熱水或生姜甘少湯送下

葛根湯治酒疸

葛根 二升 枳實 去白炒 梔子仁 豆豉 各二升 甘少 炙半升

右以咀每服四升水一盞煎至八分溫服不拘時

外臺治黃疸柳枝以水一斗煮取濃汁半升服令尽

經驗患五般急黃空心以水調山豆根末二升服

運氣黃痺皆屬濕熱經云少阴司天之政四之氣溽

暑至民病黃痺又云厥陰司天之政四之氣溽暑濕

熱相薄民病黃痺而為附腫是也

運氣  
黃疸皆屬濕  
熱

羅疔藥瓜蒂散治黃疸變身如金色累効

瓜蒂二升

毋丁香一升

黍米

四十斤

赤小豆

半升

右為極細末每用夜臥先含水一口却於兩鼻孔

內嚙上半字便睡至明日取下黃水便服黃連散

病輕者五日効重者半月効黃連數見前大小閉條

聖治如遍身如金色瓜蒂四十九个酒是六月六日收

者丁香四十九个用甘鍋子燒烟尽為度細研為末小

兒用半字吹鼻內及揩牙大人只用一字吹鼻內立差

傷寒類要治黃疸苦胡芦瓠四大棗許又以童子小便

二合浸之三四食頃收兩酸棗許分內兩鼻中病人深

吸氣及黃水出良

吸氣及黃水出良

傷寒類要治黃疸身髮皆如金色不可使婦人雞犬見  
取東引桃根細切如筋若釵股以下煮一握以水一大  
升並取一小升適溫空腹頓服後三五日其黃如薄  
雲散惟眼最及差百日方平復身黃散後可時、服一  
盞清酒則眼中易散不飲則散遲忌食熱麪猪魚等

針灸上

脾疸

刺灸黃疸者二法

圖

其一取脾經云脾足太陰之脈所生病者黃疸視  
盛虛熱寒取之也

腎疸

其二取腎經云腎足少陰之脈所生病者黃疸視

盛虛熱寒取之也

針灸下

玉龍黃疸

腕骨 三分 灸七壯 中腕補

集成 黃疸 虛傷 寒飲 食過多

腕骨 三分 湧泉 三分 灸 百勞 三里 中腕 膏盲

膀胱穴

甲黃痺 善大脇下滿 欲吐 脾俞 主之 千金云身重不可轉動

消渴 身熱 面赤 黃意 舍 主之

消渴 黃痺 足一寒一熱 舌絳 煩滿 然谷 主之

消痺 善喘 氣走 咽喉 而不能言 手足清 溺黃 便難 益中

腫痛 唾血 口中熱 唾如膠 大谿 主之 一本清

黃痺 中善渴 太冲 主之

身黃 暗有微黃 不嗜食 膝肉痛 踝前痛 少氣 身重 中封

主之

肝

腎

包絡  
大腸

診 替

穀食即頭眩  
小便不利

黃痺身黃勞官主之

嗜卧四肢不欲動搖身體黃矣于五里左取右、取左

黃痺刺脊中千金云腹滿不能食

素目黃者曰黃疸平人氣象論

溺黃赤安卧者黃疸

身痛而色微黃齒齧黃瓜甲上黃、疸也論症診尺篇

仲脉沉渴欲飲水小便不利者皆黃

腹滿舌痿黃燥不得睡屬黃家

跌陽脉緊而數、則為執漸則消穀緊則為寒食即為

滿尺脉浮為傷腎

跌陽脉緊為傷脾風寒相搏食穀即眩穀氣不消胃中

酒疸抗懷  
欲吐不利

女勞疸黑手足  
抗小便利

辨疸難治易  
治

苦濁、氣下流小便不通尿被其  
寒抗流膀胱身體  
及黃名曰穀疸

陽明病脉遲者食難用飽  
則苦煩頭眩小便又難此  
欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也

心中懊懷而抗不能食時欲吐名曰酒疸

夫病酒黃疸必小便不利其候心中抗足下抗是其証也

脉酒疸黃色心下結抗而煩

仲額上黑微汗出手足中抗薄暮即發膀胱急小便不利

名曰女勞疸腹如水狀不治  
治見黑疸

黃疸之病當以十八日為期治之十日以上瘥反極為

難治

虛極

疸而渴者其疸難治疸而不渴者其疸可治黃於脾部

其人必嘔黃於陽部其人振寒而黃也

脈凡黃候其寸口脈近掌無脈口鼻冷並不可

產後黃

丹婦人年約二十歲四月內產黃四肢倦怠食少經血

不來時黃也



白朮 一兩 人參 秦艽 牡丹皮 生地黃

木通 柴胡 芍藥 半兩 芎 黃苓

炒葛 一兩 甘少 一兩 浙

分十二帖水二中煎取一半食前服

食勞疝黃

一名黃胖夫黃疸者暴病故仲景云治疸以十八日為期食勞黃者病宿也至

脾虛汗侮

温中法

鉄粉寫肝

莎槁磨積

木少補脾

有積年不愈者故另立篇題

丹大温中丸治黃胖

朱先生  
晚年者

香附

一斤去毛童便浸裏  
夏一宿秋冬三宿

針砂

紅入醋燂  
一斤

苦參

春夏二刀  
秋冬一刀

芍藥

五刀

甘少

二刀

厚朴

五刀姜汁  
制炒紫色

陳皮

五刀

山查

五刀

蒼朮

五刀  
泔浸

白朮

茯苓

各五刀

青皮

六刀

已上十二味共七十六兩重俱為細末醋糊丸如梧

子大面黑筋骨露氣實者每服五六十九米飲下如

面白肥者与羸弱氣虛者每服三四十九白朮湯下

忌一切生冷油膩雞鷄羊瑁生硬并糞物難化之數

服過七日後便覺手掌心眼胞下口唇内有紅暈起

將理好者半月便好 人一舩

大夫黃脾胃有陳積口淡脚痰氣急

針砂淘炒干入好醋煨紅

蒼朮

香附

三稜一丸

陳皮

黃連

萊菔

參半丸

茯苓七丸

仁曲醋糊丸每五十丸苦痞滿入保和十丸酒以白

木湯下

又方小温中丸治黃胖

五少野貧賤人服蓋其飲食死積泄但補脾妙濕而已可積於人

針砂以醋炒九次為末一斤入糯米炒極黃為末一

斤以醋糊丸如梧子大每服四五丸米飲下忌口

同煖中丸輕者五丸重者不過七兩重

六十嫂面黃口苦而渴此食積生濕也

白朮一斤半 連翹一斤 羌活 通少

作湯吞下 穀疸丸保和丸四十粒 阿魏丸五粒  
穀疸丸忌

即姜氏方用  
苦參龍胆者

暖中丸治黃胖殺肝邪舒脾氣虛者不宜用

陳皮 蒼朮 制朴 三稜 白朮

青皮各五斤 香附一斤 甘少二斤 針砂十斤 醋紅

右為末醋糊丸每五十九粒空心鹽姜湯下午前酒下

晚食前亦酒下忌狗肉茶菜

右五方附朴查青稜蓬以磨積針砂酸醋以瀉肝

白朮 蒼朮 甘以補脾

又法  
凡醋寫肝  
來膈補脾

世治黃胖

右重可去怯惟暖中凡無補性故虛者不宜用

綠礬六兩用米醋於鉄鍋內煮七次以乾為度於地氣  
出火氣為末

南星一兩為末炒黃色麩一兩炒黃色

大皂角二斤於尺六鍋水者孰揉出裏面濃膠去皮查

瀝過再熬入麥子六兩蒸孰去皮核煎成濃膏搗勻和

前藥末得所為度丸如梧子大每服五丸清晨下床時

姜湯下臨上床姜湯下五丸忌油膩煎炒如身上黃紅

班時急濃煎棗湯服之班自愈

本事治男子嬾人惠食勞氣勞遍身黃腫欲變成水及久

患瘰癧小腸膀胱面目惡黃紫金丹

膽礬三斤 黃蠟一斤 青州棗五十个

好礬合用頭醋三升洗下礬棗慢熬半日取出棗去

皮核下蠟一處更煮半日如膏入好臘茶末二斤同

和丸如梧子大每服二三十丸茶酒任下日三服後

一月見效如久患腸風痔漏陳米飲下

宗室趙彥才下血面如鵝不進食蓋酒病也授此方

服之終劑血止面色鮮潤食亦倍常新安有丘士亦

如是與三百粒作一服亦愈

羅棗丸也如食勞黃目黃身黃者

皂礬不以多少砂碓內木炭燒  
通紅赤用米泔點之赤紅

右為細末，粳肉為丸，如梧子大，每服二三十丸，食後  
生姜湯下。一方用白礬，不用皂礬。

世專

礬丸治黃胖

皂礬煨過

粳肉二升

干蒸餅三升

為末，却用生姜自然汁丸，如梧子大，每服二十九丸。

日二次服用，用米飲下，食前。

右四方礬，醎之酸以瀉肝，粳之甘以補脾也。

虛黃於前，疸門小便自利，自汗虛勞，疸条下諸方。

選用之

丹嬭人年三十，面黃脚酸，弱口苦，喜茶，月經不勻，甚少，倦怠。

芪三分

白朮一分

黃芩三分

妙柏二分

秦二分

甘二分 通羊分 皮羊分 芍藥 參各一分

婦人年六十面黃倦甚足瘦口苦脉散面大此濕傷氣

白朮半斤 陳皮四分 白朮 黃芩 木通三分

宿砂 人參 芍二分 炒柏一分 炙甘草半斤

分六帖水二中半煎取食前熱飲

玉官痞後黃面脚瘦弱倦怠食飽則氣急頭旋

菝二分 蒼朮一分 白朮一分 通二分 甘草二分

炒柏三分 炒朴一分 陳皮一分

成庚五官面黃脚酸無力食難化脉虛而少弦口微苦

門之是肚脹身安而得此宜補之

...

實

蒼朮 半斤 通三分 白朮 半斤 芎藭 半斤 芍藥 一斤

陳皮 半斤 炙甘草 二分 芎藭 半斤 參 三分

煎下保和丸四十食前

經驗治食氣過身黃腫氣喘食不得心胸滿悶不吐皂角  
去皮及子塗好醋炙令焦為末一斤七巴豆七枚去油  
膜二件以淡醋及研好墨為丸如麻子大每服三丸  
食後陳橘皮湯下日三服隔一日增一丸以利為度如  
常服消酒食

子和一男子作贅渴病瘧善食而瘦四肢不舉面黃無  
力其婦翁欲棄之其女子不肯曰我已生二子矣更適  
他乎婦翁本農者召婿本欲勞作見其病甚每日辱詬人

雜方

茶黃

酒面黃

教之餌膽礬丸三稜丸了不關涉針灸禳祈百無一法  
戴人見之不診而療使無涌劑積痰去宿水一斗又以  
泄水丸通經散下四五十行不止戴人命以冰水一盃  
飲之立止次服平胃散等間服宿即丸五十日黃退刀  
生蓋黃疸之証濕熱與宿穀相搏故也俗謂之食勞黃  
世喜吃干茶

軟石膏

白芍藥

五黃苓

右水並服更於積塊門茶癖治相參用之

山居酒麵黃絲瓜兒連皮子燒灰目麵以病麵湯調下目

得病酒調下散服

黃汗

汗出染衣黃如汗出是也

仲問曰黃汗之為病身體腫黃熱汗出而渴狀如風水汗  
沾衣色正黃如麤汁脉自沉何從奪之師曰以汗出  
中汰小從汗孔入得之宜芪藥桂酒湯主之

黃芪 五斤

芍藥 三斤

桂 三分

右三味苦酒一升水七升相和煮取三服温服一升  
當心煩服至六七日乃解苦心煩不止者以苦酒阻

故也 一方用美酒代苦酒

黃汗之病兩胫自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又  
身常暮盜汗出者此勞氣也若汗出已反發熱者久、  
其身必甲錯發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒  
輕者久、必身暈、即胸中痛又從腰已上必汗出下

無腰腕弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩

燥小便不利此有為黃汗桂枝加黃芪湯主之

方見本門表症下

館

脈浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏風強則為隱  
疼身體為痒、為泄風久為痂癩氣強則為水難以倪  
仰風氣相擊身體洪腫汗出乃為惡風則虛此為風水  
不惡風者小便通利上焦有寒其口多涎此為黃汗

目黃

經云目黃者曰黃疸然亦曰目黃身不黃者故另之一門

風氣與陽明入胃循脈而上至目昔其人肥則風氣  
不得外泄則為執中而目黃 全文見諸風

河間青龍散治風氣邪傳化腹內疼結而目黃風氣不

青龍散治風氣和傳化腹內痰結而目黃冷氣不

得出泄為執中湯煩引飲

地黃

仙靈脾其防風

何首烏

吉黑皮泔浸一宿  
竹刀切焙各一分

荊芥穗

一乃

右為末每服一匙沸湯調下食後每日三服

雜方

針灸

心

心主

小腸

傷寒類要治黃疸目黃者不除瓜丁散瓜丁為細末如  
大豆納鼻中令病人深吸取鼻中黃水出而歇

針灸目黃有五法

其一取心經云心少脈之脈所生病者目黃脇痛云

其二取心主經云心主手厥脈之脈是動作則病面

赤目黃云

其三取小腸經云大腸手陽明之脈所生病者耳聾耳

大腸

膀胱

裏

酒疸

黃疸

其目黃云、

其四取大腸經云大腸手陽明之脈所生病者目黃

其口乾云、

其五取膀胱經云膀胱足太陽之脈所生病者目黃

滂出

云陷已上取之法並視盛虛寒

黑疸

熱

黃疸久、變為黑疸身黃額黑或身面俱黑是也若不

黃口面黑於面里門求之

仲酒疸下之久、為黑疸目青面黑心中如噉蒜薤狀大

便正黑皮膚爪不仁其脈浮弱雖黑微黃故知之

黃家日晡所發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急少

黃家日晡所發熱而反惡寒此為女勞得之勝脫急少

腹滿身尽黃額上黑足下熱目作黑疸其腹脹如水狀  
大便必黑時澹此女勞之病非水也腹滿者難治消石  
礬石散主之

消石

礬石

燒等分

右二味為散以大麥粥汁和服方寸七日三服病隨  
大小便去小便正黃大便正黑是候也

雜方診

聖惠治黑疸多死宜急治用王瓜根一斤搗碎絞汁六合

頓服當有黃水隨小便出如未出更服之服後云平旦

服食後須病汗小便出愈

面瘡然浮腫脊痛不能止立甚色怡黑急曲不利多

汗惡風者屬腎風

治見諸風

多汗惡風者屬腎風

醫學綱目卷之二十一終

浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館善本

甲登記號：010767

一九 年 月 日



浙江圖書館




卷二十一



浙江圖書館



浙江圖書館



Centimetres

**TIFFEN** Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue

Cyan

Green

Yellow

Red

Magenta

White

3/Color

Black