

善恐

附婦人妊娠善悲

赤水玄珠第六卷

新安生生子孫一奎著輯

吐酸門

論吐酸屬熱

內經曰諸嘔吐酸皆属于熱又云少陽之勝嘔酸夫酸者肝木之味也內火勝制金不能平木木自甚故為酸也如飲食熱則易于酸矣是以肝熱則口酸或言為寒者但謂傷生冷硬物而喜噫醋吞酸故俗主于和脾胃豈知人之傷于寒

也則為病熱蓋寒傷皮毛則腠理閉密陽氣怫
鬱而為熱故傷寒熱在表以麻黃湯發散使腠
理開通汗泄熱退而愈也凡內傷冷物者或積
陰勝陽而為病寒或寒熱相搏而致腸胃陽氣
怫鬱而為熱亦有內傷冷物而反病熱得汗泄
身涼而愈也或微而止為中酸俗謂之醋心法
宜溫藥散之亦猶解表之義若久喜酸不已則
不宜溫之宜以寒藥下之後以涼藥調之結散
熱去則氣和也所以中酸不宜食粘滑油膩者

謂能令氣鬱不通暢也宜羈食菜蔬使氣通利
則酸自不作矣

論雜病吐酸與病機外邪不同

發明云病機吐酸皆屬於熱此上焦受外來客邪
也胃氣不受外邪故嘔仲景以生姜半夏治之
以雜病論之嘔吐酸水者甚則酸水浸其心不
任其苦其次則吐出酸水令上下牙酸澁不能
相對以大辛熱藥療之必減吐酸是吐出酸水
也酸味者收氣也西方肺金旺也寒水乃金之

子子能令母實故用大鹹熱之劑瀉其子以辛
熱為之佐而瀉肺之實以病機作熱攻之悞矣
蓋雜病醋心濁氣不降欲為中滿寒藥豈能治
之乎

辨素問東垣論酸不同

丹溪云或曰吐酸素問明以為熱東垣又言為寒
何也予曰吐酸與吞酸不同吐酸是吐出酸水
如醋平時津液隨上升之氣鬱積而成鬱積之
久濕中生熱故從火化遂作酸味非熱而何其
有鬱積之久不能自湧而出伏于肺胃之間咯
不得上喘不得下肌表得風寒則內熱愈鬱而
酸味刺心肌表溫煖腠理開發或得香熟湯丸
津液得行亦可暫解非寒而何素問言熱者言
其本也東垣言寒者言其末也但東垣不言外
得風寒而作收氣立說欲瀉金之實又謂寒藥
不可治酸而用安胃湯加減二陳湯俱犯丁香
且無治鬱結濕熱之法為未合經意予常治吞
酸用黃連茱萸各炒隨時令迭其佐使蒼朮茯

苓為輔佐湯浸炊餅為小丸吞之仍教糧食蔬菜自養則病易安

劉宗厚曰謹按吐酸一證以病機言之則屬於熱以臟腑論之則脾胃受病以內邪言之則痰飲宿食之所為故治法熱者寒之脾惡湿以苦燥之有痰飲者清之分利之有宿食者消之導之驅逐之局方不察斯故以噫醋吞酸醋心吐酸水之證並入于氣門中率用溫熱之藥豈吐酸專主于寒而無他證也故此一門以叙河間東

垣丹溪之論其病源治法無餘蘊矣

停飲門

許學士云余苦有二疾一下血二膈中停飲下血有時而止停飲則無時始因年少時夜坐作文左向伏几案是以飲食多墜左邊半夜以後稍困乏必飲酒二三盞仍向左邊側睡壯盛時殊不覺病三五年後覺酒止從左邊下瀉有聲腸痛飲食減十數日必嘔數升酸水暑月止是右體有汗熱常潤左邊痛處絕燥遍訪名醫

及海上方服之少驗間或中病止得月餘復作其補如天雄附子礬石其利如牽牛甘遂大戟備嘗之矣予揣度之已成癖囊如潦水之有科臼不盈不行必盈科而行也清者可行濁者依前停蓄蓋下無路以出之也是以積之五七日必嘔而出稍寬數日復作脾土惡濕而水則流濕莫若燥脾以勝濕崇土以填科臼則疾當去矣于是悉屏諸藥止服蒼朮三月而除自此後不復發嘔胸膈寬飲啖如故暑月汗周體而身

涼飲亦從中下前此飲漬其肝目亦多昏眩其後燈下能書細字皆蒼朮之力也故名其方曰神朮丸其蒼朮一觔去皮切末用之白芝麻半兩水二盞研瀝取汁大棗十五枚煮爛去皮核研以麻汁成稀膏和入搜臼杵熟丸如梧子大每日空心白湯吞五七十丸一日服二三次忌桃李雀鴿初服時膈間必微燥且以蒼朮製之覺燥甚再進山枝子散一服久之自不燥也予服半年以後止用燥烈味極辛者削去皮不浸

極有力亦自然不燥山梔散用山梔一味乾之為末沸湯點服故知久坐不可伏向一邊時宜運動亦調息之法

脈經云胃脉虛主胃中冷苦吞酸頭痛寸口脉遲上焦有寒心痛嘵酸吐酸水宜服附子湯生姜湯茱萸丸閑脉沉心下有冷氣痞滿吞酸據此亦有胃冷吞酸者

張子和治張風村一田叟嘔酸水十餘年乃留飲証也醫皆以燥劑治之不効更以艾火燔針刺

之中脘脣脰瘡未嘗合予以苦劑越之出其涎如膠者二三升談笑而愈

噫腐噯酸或每晨吐酸水數口或膈間常如酸蟄皆飲食傷胃所致平胃散加神曲麥芽

茯苓半夏

口吐清水乃胃中溫熱所為宜平胃散加白朮茯苓滑石半夏不宜純用涼藥亦有胃寒而然者理中湯主之食薺有痰二陳加南星黃芩香附之類治酸必用吳茱萸者乃順其性而折之戴元禮云濕熱在胃口上飲食入胃被溫熱薺遏

其食不得傳化故作酸也如穀肉在器則易酸
治寒酸溫胃之劑

東垣藿香安胃散 治脾胃虛弱不進飲食嘔吐
不待腐熟 藿香 丁香 人參各二錢半陳皮五錢
右為末每服二錢生姜湯下

加減二陳湯 治痰飲為患嘔吐頭眩心悸或因
食生冷脾胃不和 丁香一兩半夏 陳皮各五錢
茯苓三兩 半夏半錢

三因麵木丸 治中脘宿食留飲酸漚心痛口吐

清水 神麵炒三錢 苍术米泔浸三宿洗淨陳皮
一方有砂仁一兩為末生姜汁打神麵糊為
丸姜湯下

加味平胃散 治吞酸食鬱所致

平胃散加炒神麵麥芽姜枣煎服

治吞酸因傷冷物所致 治食後吐酸水同

乾姜炒二兩 吳茱萸炒二兩為末酒服方寸匕二服日
治噫酢咽方 吳茱萸半斤生姜三兩人參二兩東枝十二根

水六升煮二升分三次食前服

治吐酸清水方

蒼朮

陳土炒

白朮

茯苓

滑石

陳皮

各分等

水煎服

聖惠方乾姜丸

治酒癖停飲吐酸水

乾姜

葛根

枳殼

橘紅

前胡

錢各五

白朮

半夏麵

各二兩

吳茱萸

錢各二半

右為末煉蜜丸桐子大每五十丸米飲下

三生丸

治中風痰涎眩暎嘔吐酸水頭疼恶心

半夏

二兩

南星

白附子

各一兩

右並生為末滴水丸梧子大以生麵裹為衣

陰乾每服十丸至二十丸生姜湯下
治熱之劑

丹溪方 一方加炒山梔仁三錢

吳茱萸

枝梗去乾

陳皮

黃芩

陳土炒各五錢

黃連

陳土炒一兩

蒼朮

七錢半

一方有桔梗茯苓

各一兩

右末神麵糊丸菉豆大每服一錢半白湯下

黃連清化丸

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

陳皮

五錢

半夏

一兩

右為末神麵糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

黃連

一兩

吳茱萸

錢一兩

桃仁

枝梗四錢

參茱丸 治濕而帶氣者濕熱甚者用之為向導
上可治吞酸下可治自痢

六一散料 吳茱萸製兩 為末飯丸

丹溪又云噫氣吞酸此係食鬱有熱火氣冲上黃
芩為君南星半夏陳皮為佐熱加青黛

解表之劑

丹溪治一人因外感涼氣與宿食相搏心下酸咸
嘔清水後有紅 青皮 枳殼 紫蘇 木通
甘草錢各三 黃芩 桔梗錢半人參二錢五分 麻黃

加姜水煎服

寬中攻下之劑

透膈湯 治脾胃不和中脘氣滯胸膈滿悶噎塞
不通噫氣吞酸脇肋刺脹嘔逆痰涎飲食不下
木香 砂仁 檳榔 枳殼 厚朴 白荳仁
半夏 青皮 陳皮 甘草 大黃 朴硝
各等分每服一兩生姜三片枣一枚煎至一
盞熱服

痰飲膠固稠粘者痰也 清而稀薄者飲也

痰飲為病所感不同有因氣脉鬱塞而得之者有
因脾胃虛弱不能運行水穀而得之者有因痛
飲飽食停滯胃中而得之者有因風寒暑濕之
氣入脾相搏而成之者有因七情失節藏氣不
行鬱而成之者所感不同病變甚多或為喘為
嗽為嘔為泄眩暈嘈煩悸忪憤悶寒熱疼痛腫
滿癰癧癰閉痞膈如風如癲皆痰飲之所致也
飲有六曰懸飲溢飲支飲痰飲留飲伏飲懸飲
者飲水流于腸咳嗽引痛溢飲者飲水流于四

肢當汗不汗身體疼重支飲嗽逆倚息短氣不
得卧其形如腫痰飲者其人素盛今瘦腸間瀉
瀉有聲留飲者其人背寒如手大或短氣而渴
四肢歷節痛肠下痛引缺盆咳嗽則轉甚伏飲
者膈滿喘嗽嘔吐發則寒熱腰背痛目疾出其
人振振惡寒身瞞惕

東垣謂痰飲皆濕熱相乘如湿在心經為熱痰結
而為膠其色紅濕在肝經為風痰其色青如沫
濕在脾經為湿痰濕久為熱其色黃濕在肺經

卷之三
為氣痰其色白咯出如米粒湿在腎經為寒痰其色如唾

王隱君云痰清白者為寒黃濁者為熱熱鬱之甚或至帶血血敗則黑口吐白血者不治白血者桃花色也

子和云入肺則多嗽入大腸則為泄入腎則為湧水水在上則面浮在下則腹腫在中則為痞膈痰遂

人之停飲留于胃脘皆由胃氣虛弱飲水飲酒不

能傳化結為痰飲行疾而漉漉有聲者自有癰囊在胃內飲水則滲入停蓄于其間其狀若胞囊不可速去然亦不能為速害若見變証百端在上焦須以瓜蒂散吐之在胃脘宜十枣湯下之然後以溫藥溫胃氣丁香茯苓半夏以蕩散水飲仍宜丁香半夏湯以拔其根

熱痰則多煩熱風痰多成癱瘓奇症冷痰多成骨痺濕痰多成倦怠軟弱驚痰多成心痛癲疾飲痰多成脹臂痛食積痰多成癰塊痞滿

或心下如停水雪心氣冷痛或脊上每日一條如線之冷起或渾身習習如虫行或胷腹間如有二氣之交紐又或如烟火上衝頭目烘熱或風毒脚氣或嘔冷涎綠水黑汁甚為癆瘵肺癰腸毒種種不一皆痰飲之所為也

嚴氏云人之氣道貴乎順順則津液流通決無痰飲之患自潤下從小便中出矣又有病人元有痰積其氣因痰而結滯者則又必先逐去痰結滯氣自行豈可執一

王隱君云津液既凝為痰不復周潤三焦故口燥咽乾大便秘面如枯骨毛髮焦槁婦人則因此月水不通若能逐去敗痰自然服藥有効

脾土上應于天亦屬濕化所以水穀津液不行即停聚而為痰飲夫人之病痰火者十居八九老人不宜速降其火虛人不宜盡去其痰攻之太甚則病轉劇而致危殆須以固元氣為本有病喜吐痰唾服八味丸而作効者叔和云腎寒多唾蓋腎為水之官腎能攝水腎氣溫和則水

液潤下腎氣虛寒則邪水溢上故用八味丸以溫利之

活人書云中脘有痰亦令人增寒發熱惡風自汗胸膈痞滿有類傷寒但頭不痛項不強為異丹溪云風痰多見奇症 凡風痰病必用風痰藥白附子天麻雄黃牛黃僵蚕皂角之類 温痰多見倦怠軟弱 湿痰宜用蒼白二味又用油炒半夏 熱痰多挾風外症為多用青黛黃連天花粉大快膈上熱痰 痰因火盛逆上者治

火為先白朮黃芩石膏之類中氣不足加參朮食積痰神麴麥蘖山楂欲吐食積痰用蘿蔔子油炒為末漿水調下探而吐之 食積痰必用攻若氣虛者用補氣藥送 老痰海石半夏爪萎香附五倍子佐他藥大治頑痰 癒痰僵蚕杏仁爪萎訶子貝母五倍子 痰而脾虛者清中氣二陳湯加白朮之類兼用升提藥 內傷挾痰必用參朮芪之類多用薑汁傳送或加半夏之類虛甚加竹瀝 脳運嘈雜乃火動其

痰用二陳湯加梔子芩連之類 噁氣吞酸此
係食鬱有熱火氣上動以黃芩為君南星半夏
橘紅為臣熟多加青黛喉中如有物咯不出咽
不下此老痰也重者吐之用瓜蒂散氣實用荊
瀝仲景用半朴茯姜治之神驗 痰結核在咽喉中燥不能出
入化痰藥內加鹹藥軟堅之味瓜萎仁杏仁海
石桔梗連翹少佐以風化硝薑蜜丸噙化 凡
人身上中下有塊是痰問其平日好食何物吐
下後方用藥 痰之為物隨氣升降無處不到

痰在腸胃間可下而愈 痰在經絡中非吐
不可出吐中就有發散意痰在膈上必用吐之
瀉亦不出 痰膠固及肺浮者俱用吐法 痰
在腸下非白芥子不能達 痰在皮裏膜外以
姜汁竹瀝導之 痰在四肢非竹瀝不能開
二陳湯善治一身之痰如在下加下引藥在上
加上引藥 潤下尤降痰最妙 青礞石丸重
在風化硝 小胃丹能逐胃痰積然不宜多
服 蒼朮治痰飲成窠囊者極効 海粉能治

熱痰降溫痰軟結痰消頑痰最効可入丸子不可入煎藥枳實鴻痰能衝墻壁竹瀝能治膈間有痰或癲狂或健忘或風痰最効又能養血荆瀝治痰稍重用此二味効速且穩當二瀝治痰結在皮裏膜外及經絡必佐以姜汁薑汁治血滯不行中焦有飲取自然汁冷飲三四盞以覺胸中煩躁不寧後自愈氣實熱痰吐難得出或成塊或吐咯不出及薰氣鬱者難治中焦有痰胃氣亦賴所養卒不便虛若攻之盡

則虛矣凡治痰用利藥過多致脾氣下虛則痰反易生而多矣

丹溪云痰之為病方論少有細述者近惟三因畧言亦無加減法夫痰之源不一有因痰而生者有因熱而生者有因氣而生者有因風而成者有因暑而生者有積飲而生者有多食而成者有飲酒而成者其為病也驚痰則成心包痛顛疾熱痰則煩躁頭風爛眼燥結怔忡懊

懷驚眩風痰成癱瘓大風眩暈暗風悶亂飲痰
成脇痛四肢不舉每日嘔吐食痰成瘻痢口出
臭氣冷痰骨痺四肢不舉氣刺痛酒痰飲酒不
消但得酒次日又吐脾虛生痰食不美反胃嘔
吐氣痰攻注走刺不定婦人于驚痰最多蓋因
產內交接月事方行其驚因虛而入結成塊者
為驚痰必有一塊在腹發則如身孕轉動跳躍
痛不可忍凡人手臂或動不得或骨節遍身痛
坐卧不能此痰入骨也 有人脚氣久不治骨
痰結

節痛與脚氣藥不効此痰病也 凡傷寒病後
嘔吐藥不得入亦因初病膈中有涎痰也或因
下之太早而遂議其非痰未為確論 傷寒發
黃亦是痰病蓋因熱搏而成冗大便秘者亦是

痰結

左右閏脉滑大者膈中有痰也可吐之怕吐者消
息下之凡人每日背上一條如線而寒起者宜
吐下之凡病百藥不効其閏上脉伏而大者痰
也用妙應丸加減法方見走注疼痛即控涎丹

洞虛子論疾之為病成偏頭風成雷頭風成太陽
頭痛眩運如坐舟車精神恍惚或口眼瞤動或
眉稜耳輪俱庠或頷腮四肢遊風腫硬似疼非
疼或渾身燥痒搔之則隱疹隨生皮毛烘熱色
如錦班或齒頰似痒似痛而疼無定所滿口牙
浮痛痒不一或嗳氣吞酸鼻聞焦臭喉間荳腥
氣心煩鼻塞咽嗌不利咯之不出咽之不下或
因噴嚏而出或因舉動而唾其痰如墨又如破
絮或如桃膠或如覘肉或心下如停水鐵閉滯

妨悶嗳嘔連聲狀如膈氣或寢夢刑戮刀兵劍
戟或夢入人家四壁圍遙暫得一竇百計得出
則不知何所或夢在燒人地上四面烟火枯骨
焦氣撲鼻無路可出或不因觸發忿怒悲啼雨
淚而寤或時郊行忽見天邊兩月交輝或見金
光數道回頭無有或足膝酸軟或骨節腰腎疼
痛呼吸難任或四肢肌骨間痛如擊鼓乍起乍
止並無常所或不時手痺麻疼狀如風濕或卧
如芒刺不安或如毛虫所螫或四肢不舉或手

足重滯或眼如姜蠶膠粘痒澁開闔甚難或陰晴交變之時胸痞氣結或齒痒咽痛口糜舌爛及其奮然而發則噴嚏連聲初則涕唾稠粘次則清水如注或眼前黑暗腦後風聲耳內蟬鳴眼瞼肉惕惟洞虛子備此疾若述甚詳悉乃能治療病勢之來則胸腹間如有二氣交紐噎塞煩鬱有如烟火上衝頭面烘熱眼花耳鳴痰涎涕淚並從肺胃間湧起凜然毛堅噴嚏千百然後遍身煩躁則去衣凍體稍只片時或春秋乍

涼之時多加衣衾亦得暫緩或頓飲冰水而定或痛飲一醉而終不能逐去病根乃得神秘沉香丸方屢獲大効愈人數萬但不欲輕傳匪人故以隱語括之詩曰覩裏翻身甲帶金于今頭戴草堂深相逢二八求斤正硝煅青礞信若沉十七兩中零半兩水丸梧子意須斟驅除怪病安心志水鴻雙身却不然

大黃蒸八黃芩八青礞石一兩硝煅沉香半兩

右為末水丸如梧子大白湯食後空心服

治飲之劑

心下有痰飲胸脇支滿目眩苓桂术甘草湯主之

茯苓錢四桂枝白术各三甘草二錢水煎服

小便自利短氣有微飲當從小便去湯之亦前病者脉伏其人欲自利利反快雖利心下續堅消此為留飲欲去故也甘草半夏湯主之

甘遂去心麵裹煮大者三枚半夏十二枚製芍藥五枚甘草一錢指大一枚以水二升煮取半升去粗以蜜半升和藥汁煎取八合頓服之

懸飲十枣湯主之

芫花

洗淨醋拌經炒令黑勿焦宿

甘遂

同前製去心

大戟

去皮長流水煮

一時洗淨日乾各等分

為末

以水

一升五合

先煮肥大棗十

枚取八合去柂納藥末強盛人五分平旦服之不下更加五分下後以糜粥調之

溢飲者當發其汗大小青龍湯主之大青龍湯

麻黃

去節六錢

桂枝

去皮二錢

甘草

炙二錢

杏仁

四枚去皮尖

石膏

研碎二錢

生姜

三錢

大棗

二枚

水

三碗

半煎去粗

溫服取微汗汗多者溫粉撲之

小青龍湯 麻黃去節三錢 五味子 半夏各二錢 乾姜

甘草炙

細辛

桂枝去皮各三錢

水七碗煮麻

黃至六碗去沫內諸藥煮取二碗

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脉沉
繫得之數十日醫吐下之不愈木防已湯主之
虛者即愈實者三日復發復愈不愈者宜防已
湯去石膏加茯苓芒硝湯主之微利則愈

木防已

石膏各三錢

桂枝二錢

人參四錢

水三碗煎一碗溫服

加茯苓四錢

芒硝三錢

去石膏名防已芩硝湯

心下有支飲其人苦胃眩澤鴻湯主之

澤鴻五錢

白朮二錢

水碗半煎一碗溫再服

支飲胸滿者厚朴大黃湯主之

厚朴三錢

大黃六錢枳實五分

水煎溫服

支飲不得息葶藶大東、鴻肺湯主之

葶藶炒令黃色

丸如彈丸大東一枚

先以水三升煮

東至二升去東、內葶歷煮取一升頓服

嘔家本渴者為欲解今反不渴心下有支飲故

也 小半夏湯主之 方在嘔吐門

腹滿口舌乾燥此脹間有水氣已椒蘚黃丸主之

防已 椒目 莖蘚炒大黃各一

右為末蜜丸如梧子大先服一丸日三服稍增口中津液渴者加芒硝五錢

卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯

主之 方見嘔吐門

假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癲眩此水也五苓

散主之 白朮 茯苓 猪苓各三澤瀉一錢

柱錢右為末白飲服方寸七日三服飲暖水出汗

水氣去後心胸間虛氣滿不能食茯苓飲消痰氣能令食 茯苓 人參 白朮錢各三陳皮半錢

枳實 生姜各四水煎連進三服每一服後如

人行八九里復進

欬逆倚息不得卧小青龍湯主之青龍湯服後多

唾口燥寸脉沉尺脉微手足厥逆氣從小腹上衝胸咽手足痺其面翕然如醉狀因復下流陰

股小便難時復冒者與茯苓五味甘草湯主之

茯苓

桂枝

錢

甘草

錢

五味子

錢

作三服

衝氣即降而反更欬胸滿者苓、甘五味姜辛湯主

之

茯苓

錢

五味子

錢

甘草

錢

乾姜

錢

細辛

錢

水

三鍾

煎一鍾

日

三服

欬滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾姜為

熱藥也

服之當

遂渴而渴

反止者

為支飲也

支飲者

法當胃胃者必

嘔嘔者

復納半夏

以去其

水苓

甘五味

姜辛夏湯

主之

茯苓

五味子

半夏

各錢

四

甘草

錢

細辛

半姜

錢

二

水煎

日三服

水去嘔止其人形腫者加杏仁主之其症應納麻黃以其人遂痺故不納之若逆而納之者必厥所以然者以其血虛麻黃發其陽故也

若面熱如醉此為胃熱上衝熏其面前方加大黃三錢以利之先渴後嘔為水停心下此屬飲家小半夏茯苓湯主之半夏錢茯苓一錢生姜

片十

水煎服

五飲湯治五飲最効

旋覆花

人參

橘紅

枳實

白朮

茯苓

厚朴

製

半夏

製

等分

澤鴻

猪苓

前胡

桂心

白芍藥

甘草

炙各等分

每兩分二服

姜

十片水

二盞

煎去渣溫服無時忌肉食生冷等物因酒冷所致其脉沉弦細遲旋覆花湯

成飲加葛花砂仁

治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜腸鳴多噏口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虛

細辛 陳皮 桂心 人參 甘草 桔梗

芍藥

半夏

旋覆花

酌半

赤茯苓

每服四錢姜七片煎去渣溫服

木香半夏丸

治癥癶上湧心胸不利常服消痰

寬膈

半夏

一兩 木香 鍤 陳皮 茯苓 姜屑

人參

白附子

草蔻

各五錢

右為末麪糊丸

食後生姜湯下五十丸

降痰丸

治三焦氣滯下痰飲消利膈痞滿欬

唾稠粘面熱目赤支體倦怠不思飲食常服并

降滯氣消化痰涎

木香 檳榔 青皮

降滯氣消化痰涎

木香 檳榔 青皮

陳皮

枳殼

大黃

半夏

湯

京三稜

黑牽

牛乳

二兩

右為末麵糊丸食後薑湯下

吐劑

治嘔嗽妙方

砒霜

麵

海螵蛸各一錢

為末水調作餅二慢火炙黃再研令細每服一字用井花水作一呷服良久吐出為度小兒減半忌食熱物凡吐寒痰藜芦瓜蒂

吐不透者用附子尖妙

瓜蒂散

赤小豆

瓜蒂

妙等分

右末香豉一合

水二盞煮作稀粥去查取三之一和末一錢頓服之不吐少少得快吐乃止

三聖散

防風

瓜蒂

各三兩

藜蘆

去苗及心或一兩

或半兩

右為各粗末每服約半兩以葷汁三碗先用二碗煎三五沸去葷汁次入一碗煎至三沸却將原二盞同一處煎二沸去查放溫徐徐服之不必盡劑以吐為度

稀涎散

豬牙皂角

不蛀者去皮弦一兩

綠礬

半兩

藜蘆

半兩

白礬

一兩

右為末每服一錢溫水下

治湿和中之劑

枳木湯 枳實半兩 白朮二兩 水煎作三服

桔梗半夏湯 桔梗 半夏 陳皮 生姜水煎

導痰湯 治一切痰涎壅盛胞膈留飲痞塞不通

二陳湯加枳實南星改白朮用赤茯苓

此方加桔梗一兩木香一兩沉香半兩各二香

導痰湯又方無二香加人參瓜萎仁

神术丸 治痰飲 方在吐酸停飲門

茯苓澤瀉湯 小半夏加茯苓湯並見前

治風痰之劑

玉壺丸 治痰飲 方在頭痛門

水煮金花丸 治風痰頭眩嘔吐咳嗽

南星 半夏各一兩 生用 寒水石二兩 白麵三天 麻錢五

雄黃錢一滴 水丸菉豆大每服五七十丸日乾煎

漿水沸下藥煮浮為度漉出淡漿水浸另用

姜湯下通聖加半夏亦可服

熱痰之劑

小陷胷湯 半夏 黃連 瓜萎仁 水煎服

半夏丸 瓜萎仁 半夏一製各兩 姜汁打糊丸

小黃丸 人參 黃芩 南星 半夏 生姜

姜汁糊丸

寒痰之劑

消飲丸 薰治宿酒停飲胸滿嘔逆目視瞞瞞腹

中水聲痛不思飲食

白朮

五兩 茯苓 二兩 枳實 七錢

乾姜

一兩 右丸蜜丸菉豆大每服溫水下三十丸

化痰丸 半夏

三兩 陳皮

乾姜

白朮 酒 一

姜汁糊丸姜湯下二十九丸

溫中化痰丸 青皮 陳皮 乾姜 良姜

倍朮丸 治五飲

乾姜

肉桂 各半斤

白朮 一斤

為末蜜丸小豆大每服二三十丸米飲下

丁香半夏丸

檳榔 一兩半

丁香

半夏 各兩

細辛

乾姜

人參 各半兩

姜汁糊丸

服三十丸姜湯

姜桂丸

南星

半夏

官桂 各一兩

糊丸菉豆大姜湯下五七十丸

理氣之劑

卷之六
三十六
四七湯 治全六合

半夏五兩 茯苓四兩 蘇葉 厚朴各三兩 姜東煎

三仙丸

南星

半夏各二兩

香附五兩

糊丸姜湯下四十丸

蘇子降氣湯 前胡 厚朴 陳皮 甘草

川歸二兩

桂各二兩

蘇子一兩

半夏各五兩

姜東煎

六合湯 治七情氣鬱結成痰涎狀如破絮或如梅核咯不出喫不下嘔逆恶心

陳皮

半夏

茯苓

厚朴

香附

紫蘇莖

等分每服四錢生姜三片水煎服

加味化痰丸

人參 白朮 半夏 製茯苓

桔梗

各一枳實

香附 前胡 甘草

半兩

右為細末用半夏末姜汁糊丸每服五十丸

白姜湯下

二生湯 治胃冷有痰

附子

生去皮臍

半夏

各等分

每服四錢水二盞生姜十片煎至七分溫服

加木香少許尤佳

水玉湯 治眉稜骨痛不可忍此痰厥也

半夏製每服三錢姜十片煎八分食後溫服

又宜服溫膽湯

仲景茯苓飲 治胸停水飲吐水氣滿不飲食

白术 茯苓各一
人參半兩 錢陳皮 枳實各五

每服水二鍾生姜一錢煎七分服

又方 治痰飲吐水無時節者其源以飲冷過度
遂令脾胃氣弱食不消化飲食入胃則皆變冷
水反吐不停 赤石脂一觔搗篩服方寸匕酒
飲任服稍稍加至三錢七服盡一觔終身不吐

冷水又不下利補五臟令人肥健有人痰飲服
諸藥不効服此即痊

二賢散 此消痰飲之要藥也

陳皮
二兩 甘草
半兩 為末每服二錢沸湯下

治一切痰方 陳皮一觔去穰取紅淨外以甘草
益各四兩水五碗慢火煮乾焙為末白湯點服
清健丸 治一切痰飲

枳實 白术各二
白芥子 半兩
黃芩 陳皮各一
蒼朮各半
川連 川芎
山楂 川歸

各二兩

白芥子

黃芩

蒼朮

各半兩

川連

川芎

山楂

川歸

砂仁 錢五 右為末用神麵五兩為粉取竹瀝二

碗姜汁半盞煮糊丸梧子大每服八十九丸

白湯送下

竹瀝達痰丸

半夏

滾姜湯泡透去皮臍

瓦上微火炒二兩

白茯苓

陳皮 去皮二兩

大黃

酒浸透

白术

黃芩

酒炒

沉香 錢五 各三兩

甘草

炙人參

青礞石

硝一兩

如金色

沉香 錢五 各一兩

右為細末用竹瀝一大碗半生姜汁二

盞和勻入鍋內火熬一刻許令熟將前藥和

搗為稀醬樣磁器盛晒乾仍以竹瀝姜汁如

前法搗勻和晒乾如此三次仍前竹瀝姜汁
和丸如小豆大每服一百食遠白米湯下能
運痰從大便出不損元氣神妙神妙

半夏利膈丸

治風痰頭疼目眩咽膈不利涕唾

稠粘并治酒過停飲嘔逆惡心胃脹引痛腹內

有聲

半夏

湯泡三兩

白附子

生二兩

天南星

生一兩半

白术

茯苓皮

白礬

人參

去芦一兩

滑石

各一貝母

右為末麵糊丸梧子大每服三十丸食後姜

湯下

八味丸 治脾虛不得克制腎水多吐痰唾而不

咳者

附子

炮

去

皮

臍桂心

各

一山茱萸肉

山藥

各四兩

白茯苓

澤鴻

牡丹皮

各兩

懷熟地黃

右八兩

為末蜜丸梧子大每服五十丸空心鹽湯

葉氏分涎湯

治風痰留滯膈間喘滿惡心涎唾

不利

橘紅

人參

桔梗

枳實

半夏

湯洗

七次

令軟片用姜汁浸一个切四

天南星

去外皮火煨香熟

希包取出各

等分

姜十片

每服三錢水

一盞煎食後服

指迷茯苓丸

治中脫留伏痰飲臂痛難舉手足不得轉移

不得

轉移

半夏

二茯苓

一枳殼

炒去穰麸

五錢

風化

辰砂祛痰丸

治酒食過多酸鹹作成痰飲聚于胸中凝則嘔逆惡心流則臂痛頭

目昏眩

腰脚疼

深則左癱

右癱

水飛

瘡淺則蹶然倒地

此藥神効

右癱

碑砂一兩入藥

一半半夏

生姜

四兩與半夏

製作餅陰乾

陳皮

白礬生

荆芥

各一兩

為末姜汁糊丸梧桐子大

每食後服

五十丸姜湯吞下忌動風動氣物

檳榔散

治胸膈停滯痰飲腹中虛鳴食不消化時或嘔逆

杏仁

去皮旋覆花

去枝

半夏

湯洗

七次

檳榔 桔梗 炒芦白术 乾姜 炮橘紅各一

甘草 炙人參各半

兩

吳仙丹百一選方治痰飲上氣不思飲食小便不利頭目昏眩 吳茱萸湯泡白茯苓各等分

右為末蜜丸梧子大每服三十丸滾湯溫酒任下

辰砂化痰丸 治風化痰安神定志利咽膈清頭

目 白礬

枯辰砂

飛各

天南星

炮

一半夏

洗三

右為末以姜汁麵糊丸梧子大辰砂為衣每

服二十丸姜湯下

防風丸 治風痰上攻頭痛惡心項急目眩旋暉

痰涎壅滯昏憒

天麻

酒浸一夜

甘草

炙川芎

各一

防風各一

硃砂

五錢為良

右為末麵糊丸梧子大

每服一錢荆芥湯下

控涎丹一名妙應丸 兀人忽冒背手脚頸項腰
脇隱痛不可忍連筋骨牽引釣痛坐卧不寧時
時走易不定俗醫不曉謂之走注便用風藥及
針灸皆無益又疑是風毒結聚欲作癰疽亂治
亦非也此乃是痰涎伏在心膈上下變疾狀或

令人頭痛不可舉或神思昏倦多睡或飲食無味痰唾稠粘夜間喉中如鋸聲口流唾涎手腳重腿冷痺氣不通誤認為癱瘓亦非也丸有此疾但用是藥不過數服其疾如失

甘遂

去心

紫大戟

去皮

真白芥子

各一兩

右為末煮糊丸梧子大晒乾臨卧淡姜湯或滾水下五七丸至十丸痰猛氣實加丸數不妨其効如神 加減法

脚氣加明松脂一錢檳榔木爪各一兩卷柏半

兩先以鹽水煎半日次日白水煮半日同前藥為丸每服二十丸加至四五十丸再服下惡物立効 驚痰加硃砂全蝎各二錢每用八九丸常與之三五服去盡 酒痰加雄黃全蝎各二錢每服十丸走注腰痛加核桃三箇燒灰每服三十丸加至五十丸溫酒下 脚氣走注于前方內加吳茱萸 驚氣成塊者加川山甲炒鱉甲燒各三錢玄胡索蓬术各四錢每服五十丸加至七十丸以利為度 腎痺痛加木鼈子去

殼研一兩桂半兩 熱痰加盆硝等分每服三
兩丸 寒痰加胡椒丁香蝎桂各等分每服二
十五丸

十五丸

茯苓半夏湯 治胃氣虛弱身重有痰恶心欲吐
風邪羈絆于脾胃之間當先實脾胃方在嘔門
御愛紫宸湯 解宿酒嘔噦惡心痰唾進飲食

木香半兩 檀香俱不見 火硝
藿香 砂仁 葛花

茯苓 官桂各一
火不見 矢甘草各二 陳皮 乾葛 良姜 丁香
兩 二 每服四錢水煎不拘時服

胡半夏湯 治痰症不敢見風眼澁頭痛有痰
眼黑惡心兀兀欲吐風來覺皮肉緊手足重難
舉居煖處有微汗便減如見風即復作肝湯
一名補

柴胡
蒼朮
錢各一
半夏半錢
半夏二錢
茯苓二錢
神曲
錢半
水煎食遠服

枇杷葉散 治痰逆此藥溫胃思食

青皮
炒 穗草豆蔻各半 前胡 枇杷葉 人參
半夏湯泡茯苓去皮 大腹皮 白朮 厚朴桂
各一兩 姜三片 每服四錢水煎不拘時熟服

清氣化痰丸 治上焦痰火壅盛或嗽或喘煩熱

口乾脣膈痞悶 天南星三兩半夏湯泡黃連

黃芩各二兩 茯苓 桔萎仁去殼杏仁去皮尖四兩

陳皮 枳實麸炒六兩 各二兩 甘草二兩 右為末姜汁煮麵糊丸梧子大每服七十丸食後姜湯下

清氣化痰丸 清利胃膈順氣化痰寬中健脾消導飲食治痰之聖藥也

半夏一斤 南星六兩 桔萎

黃連 紫蘇子炒 蘿蔔子炒 枳實麸炒 橘紅

茯苓 山查各四兩 乾姜生 香附子炒 甘草炙

黃芩各二兩 右將南星切作十字塊半夏每箇切作二塊皂莢六兩白礬三兩多用水將南星半夏皂莢白礬一處浸三宿煮南星透為度只將南星半夏晒乾同衆藥為末水糊丸梧子大每服七八十丸加至百丸食遠或臨茶清下 怔忡驚悸門

生生子曰怔忡者心中惕惕然動不自安也驚者從外而入或耳聞異聲目擊異物驚而懼也悸者中心畏怯動而怕驚也怔忡止于心不自

安悸則心既動而又恐恐然畏懼如人將捕之驚而駭也治怔忡之法惟當益其心血壯其神氣治驚悸則有諸經之証當分別治之

治驚之法內經曰驚者平之平常也使平日常見常聞則何驚之有張子和治衛德新之妻被盜而驚乃以平法治之良愈

黃帝曰足陽明病惡人與火聞木音則惕然而驚鍾鼓不為動聞木音而動何也岐伯曰陽明者胃也胃者土也土惡木故驚也又曰東方青

色入通于肝其病發驚駭脾移熱于肝則為驚駭卧而驚者屬肝卧則血歸于肝今血不靜血不歸肝故驚悸于卧也

仲景曰食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣

飲水多必心下悸

五飲停蓄閉于中脘最使人驚悸

痰飲驚悸皆属于脾土

東垣云六脉俱大按之空虛必面赤善驚上熱乃手少陰心之脉也此氣盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑瀉火與氣以墜氣浮以甘辛溫微苦峻

補其血熟地生地 茴胡升麻白芍丹皮川芎黃
蓍之類以防血溢上竭

謂丹砂寒鎮墜之劑

丹溪云怔忡大槩屬血虛與痰 有慮便動者屬
虛時作時止痰因火動 瘦人多是血虛 肥
人多是痰飲 真覺心跳者是血少宜四物安
神之類 又曰病自驚而得者驚則神不守舍
舍空得液則成痰也血氣入舍則痰拒其神不
得歸焉

控涎丹加辰砂遠志

豬心血丸 治勞後心跳大虛症

歸身 白芍 側柏 川芎 銀錢五 陳皮 丹草

黃連

各二錢

一錢

右用豬心血為丸

溫膽湯 治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂
致心驚膽懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸症或

短氣悸乏或自汗

此膽虛不能致脾則脾之水飲作矣

半夏

各二錢

一錢

橘紅 竹茹 枳實

炒各一兩

一兩

甘草

炙一兩

白茯苓

一兩半

每服五錢薑五片枣一枚水一盞

煎七分食前服

仲景半夏麻黃丸 治心下悸

半夏 麻黃等分為末分) 煉蜜丸小豆大飲服三丸

煎心丸

治驚悸

辰砂

用黃松節油浸

龍齒

用遠志苗醋煮

右只取辰砂龍齒等分為末猪心血為丸艾實大每服一丸以麥門冬葉菉豆燈心白蜜水煎豆熟為度臨卧湯下小兒磨化半丸量歲數與之

蜜佗僧散 治驚氣入心絡不能語者昔有為狼及大蛇所驚皆服此而安

蜜佗僧研極細末茶調下一錢七服即愈

寒水石散 治因驚心氣不行鬱而生涎結為飲

遂為大疾忪悸少遇驚則發丸宜服之

寒水石

煅滑石

飛

生甘草

各分

等

為末

每服二錢

熟則新汲水下怯寒則姜棗湯下

加龍腦

少

許

丸佳

定志丸 心氣不足驚悸恐怯

石菖蒲

炒

遠志

去心

茯苓

各分

二人參

一辰砂

五

衣

為末蜜丸梧子大每服五十丸米湯下

安神鎮心丸

治驚悸消風痰

石菖蒲

遠志

人參 茯神 川芎 山藥

麥門冬

鐵粉

天麻

半夏

南星

茯苓

各一
細辛

辰砂

錢

右為末生薑五兩取汁

入水煮糊為丸藥莖大另以硃砂為衣每服二

十五丸夜卧生薑湯下小兒減半

茯苓丸

治驚悸

方在癩門

東垣羌活勝濕湯 治卧而多驚悸多魘冒邪在少陽厥陰也加柴胡五分如淋加澤瀉五分此下焦風寒二經合病也經曰肝腎之病同一治為俱在下焦非風藥行經不可也

羌活

獨活

防風

藁本

錢

一

蔓荆子

三分

川芎

二分

甘草

一分

水

二鍾煎服

東垣硃砂安神丸

治外物所驚宜鎮平之

黃連

半
錢

甘草

炙

當歸

生地

各五分

硃砂

一錢

右為細末浸蒸餅為丸黍米大硃砂為衣每服十五丸食後津唾嚥下一
方當歸地黃各一錢

心澹澹動

綱目云澹澹因痰動也心澹澹動者謂不怕驚而心自動也驚恐亦曰心中澹澹恐謂怕驚而心

亦動也

其澹澹自動之病屬二經一屬厥陰心主經曰心
主手厥陰之脉是動則病心中澹澹大動面赤
目黃喜笑不休視盛虛寒熱陷下取之是刺灸
之法也又曰太陽司天寒淫所勝病心澹澹大
動胸脇胃脘不安治以甘熱是運氣之寒傷心
主也其二屬少陽病經云一陽發病少氣善欬
善噫其傳為心掣是也

怒

怒在陰陽為陰遏而不得伸也經云陰出之陽則
怒又云血并于上氣并于下心煩冤善怒東垣
云多怒者風熱陷下于地是也

怒屬肝膽經云在臟為肝在志為怒又云肝藏血
血有餘則怒又云膽為怒

丹溪治怒方 香附末六兩 甘草末一兩

右和勻每服五錢白湯調下

運氣怒皆屬木太過內經曰陽氣者大怒則形氣
絕而血菀于上使人薄厥又云暴怒傷陽怒則

氣逆甚則嘔血及飧泄是也

生生子曰面青善怒亦是肝氣太過當益肺金以制之母徒平木此五行勝復之理用藥之法亦當要識此意不然必不能杜根也

善太息

運氣善太息皆屬燥邪傷膽經云陽明在泉燥濁所勝病善太息又云陽明之勝太息嘔苦又云少陰司天地乃燥淒愴數至脇痛善太息是也內經善太息皆取心膽二經岐伯曰思憂則心系

急心系急則氣道約約則不利故太息以出之又曰膽病者善太息口苦嘔宿汁視足少陽脉之陷下者灸之

徐仲子士偉曰家君肄業過勞瘞屋屢北志堅不懈吐衄盈盆虛羸骨立夜卧合睫則夢爭鬪轉鬪轉負恐畏之態無可名狀呼號之聲轟然若雷而不能騰出于口家人侍睡者莫不縮首伸舌如是者十年所矣每五七夜必一發過勞則連發厥尤猛歷訪師友多作心血不足治惟補

心安神補心安神藥投之漠如也終莫識為何
症捫心苦思思每達旦更幾寒暑矣一日偶觀
素問歲氣法時篇論有曰肝病令人善怒虛則
目暎暎無所見耳無所聞善恐如人將捕之恍
然警悟乃知為魂遊症也何言之夫夜卧屬氣
于肝肝主藏血藏魂者作文既苦衄血過度則
魂失養惟是交睫若魘則夢爭鬪肝虛則膽怯
故多負多恐也非峻補不奏功又思草木之劑
不堪任重乃以鹿角膠三錢侵晨酒燉服五日

而臘卧安半月而肌肉生一月而神氣完始能
出戶厥後每見血症虛憊者崩中眩暈者投前
劑莫不响应夫人知鹿角膠補虛之功勝于
參蓍而不知鹿角膠可以峻補肝血蓋血盛而
竟自安也

恐

生生子曰恐與驚悸相似實非驚悸也張子和云
驚者為自不知恐者為自知故也蓋驚者聞響
即驚恐者心中恍恍然自知如人將捕之狀及

不能獨自坐卧必須人為伴侶方不恐惧或夜必用燈照無燈燭亦恐惧者是也

臟腑恐有四

一曰腎經云在臟為腎在志為恐又云精氣并于腎則恐是也

一曰肝膽經云肝藏血血不足則恐戴人曰膽者敢也驚怕則膽傷矣蓋肝膽實則怒而勇敢肝膽虛則善怒而不敢也

三曰胃經云胃為恐

四曰心經云心怵惕思慮則傷神傷神則恐惧失周本心年六十歲形氣俱實因大恐正月間染病心不自安如人將捕之狀夜卧亦不安兩年後欲飲以人參白朮當歸身為君陳皮為佐加鹽炒黃柏炙玄參各少許煎服月餘而安

經云恐傷腎丹溪用鹽炒黃柏炙玄參引參歸等藥入補腎足少陰絡也

治膽虛常多畏恐不能獨卧如人捕之狀頭目不利人參 枳殼 桂心 耳菊 疦神 五味子

山茱萸 柑杞子各三
柏子仁 熟地黃各一
兩

右為末每服二錢溫酒調服

治膽虛冷目眩頭疼心神恐畏不能獨處胸中悶滿

茯神一枳殼半遠志

防風

細辛

白朮

人參 前胡

桂心

甘菊

熟地黃各三分

右為末每服三錢水一盞姜三片煎六分溫服不拘老幼皆可服

治膽虛目暗喉痛數睡眼目眩冒五色所障夢見被人爭訟恐惧面色變者補膽防風湯

防風一錢

細辛

川芎

茯苓

甘草

獨活

前胡八人參分

東、二枚水煎食前服

運氣善恐皆屬肝木虛經云木不及曰委和委和之紀其病淫動注恐是也

生生子曰經云恐傷腎予在若見一友人與一女子私合正值陽敗之際為人驚破恐惧走歸精流不止而斃又觀六十家小說載一女子與一少年亦如上故事特揭附此以為好色傷生者之戒

慈悲

內經云在臟為肺在志為悲又云精氣并于肺則悲是也肺虛補母仲景云婦人臟躁喜悲傷欲哭象如鬼神所附數欠伸甘麥大棗湯主之

甘草

兩

小麥

大棗

十枚

水六升煮三升分三服

脾氣亦補

許學士治一婦人數次無故悲泣不止或謂之有祟祈禳請禱備至終不應予忽憶金櫃有一證云婦人臟躁悲傷欲哭象如鬼神靈數欠伸者宜甘麥大棗湯子急令治藥盡劑而愈古人識

病制方種：絕妙如此

運氣云悲證皆屬寒水攻心經云火不及曰伏明伏明之紀其病昏惑悲忘從水化也又云太陽司天寒氣下臨心氣上從喜悲數欠又云太陽司天寒淫所勝善悲時亥卦又云太陽之復甚則入心善忘善悲治以諸熱是也

妊娠善悲

綱目述嘗先生治一妊娠四五箇月臟躁悲傷遇晝則慘感淚下數欠象若神靈如有所憑醫與

巫皆無益與仲景大寒湯一投而愈

四十四

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

