

卷五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

蒼术

溫止痛

柴胡

經絡

行防風

黃柏

各一錢

水煎空心服

陳無擇牛膝酒

治傷風毒攻刺腰痛

不可忍

牛膝

川芎

羌活

地骨皮

甘草

薏苡

仁各一兩

海桐皮

兩生地黃

十兩

俱以綃袋盛入

好酒二斗

浸二十七日夏

三十五日

每服一杯

一日三四服常令酒氣不絕為佳

一法入杜仲

二法入桂枝

三法入芍藥

四法入丹溪治老人因跌撲腰痛

治瘻痛以二陳湯加天南星川柏蒼木歲靈仙

丹溪治老人因跌撲腰痛

脈濶者

有瘀血也

用熟大黃湯

治墮墮閉剉

腰痛

不能屈伸

大黃

剉如生姜切片各

半兩

之類

蘆木

一錢歸身頭

陳皮各一人參

黃芪

木香

木通各五分

桃仁

九枚

煎湯送下

自然銅末子

五分

治食積腰腿痛

龜板

酒側柏葉

炒香附

五錢

白芥子

凌霄花

一錢

半右酒糊丸以四物湯加陳皮甘草山楂莪术

青皮煎湯下

瘀積食積指下有勞或沉滑有力皆宜下之

治腰痛用葳靈仙此治痛之要藥為細末每服二錢以豬腰子一枚批開捲藥在內濕紙煨熟五更細嚼熱酒下

千金方用葳靈仙一錢溫酒送下逐日以微利為度病人稍虛者禁用

治腰痛不可忍

牽牛不以多少研取頭末去渣取大蒜每一瓣切開入巴豆一粒在内外用濕紙包完火煨令蒜熟去巴豆將蒜細研和牽牛末為丸梧子大每服五丸醋湯或茶空心送下量虛實服

藥棋子 治腰痛氣滯者

黑牽牛不拘多少以新瓦火燒赤便以牽牛倒
在瓦上自然一半生一半熟不得攪動取頭末
一兩入硫黃一分同研勻分三服每用白麵丁
匙水和捏如棋子樣五更初用水一盞煮熟送

下痛住即止未住明日五更再服

許學士曰予嘗有此疾每發只一服痛立止

按此二方皆濕熱痰氣壅滯不能流通故痛猛而用藥峻也此樣方法亦不可無但看病虛實用之

獨活寄生湯 治腎虛弱臥冷湿地腰腿拘急筋骨攣痛或當風取涼過度風邪流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼痛

獨活 杜仲 牛膝 細辛 秦艽 茯苓

桂心 防風 川芎 人參 甘草 血寄生各一當歸 熟地國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.C.各二一方加續斷三兩

每服三錢姜五片水煎食前服

王海藏防風湯 治傷寒後腰痛或皮肉痺及腿膝疼痛行步艱難不能俛仰

防風 川芎 附子 炮當歸 芍藥 羌活

續斷各一麻黃去桂枝去杜仲炒各牛膝

加皮 丹參錢各五每五錢姜二錢煎食前服

○此二方皆治寒溫之劑也

東垣川芎肉桂湯

臥寒溫之地腰痛不能轉側

兩脇搘急作痛月餘不愈腰痛論中所說皆為

足太陽足少陰血絡中有凝血作痛間有一二

症屬少陽膽經外絡病皆宜去血絡之凝乃愈

羌活一錢

半錢

柴胡

肉桂

蒼术

歸芍

甘草炙

川芎各一錢

另研

獨活

炒

防風

防已各三

桃仁五箇去皮

水酒

煎食遠熱服

陳無擇曰小續命湯加炒桃仁治風腰痛最妙

五積散加桃仁治寒濕腰痛

東垣羌活勝濕湯治脊痛項強腰似折項似拔
此足太陽經不行也

羌活 獨活 藁本 防風各一錢

蔓荆子三分

川芎二分甘草灸五分

水二鍾煎溫服

若身重沉然乃經中有濕熱也此方加黃柏一錢太附子五分蒼朮二錢
予嘗治一人腰下濕中宮有痰腰痛而小便白濁
身重如山乃以二陳湯合五苓散以蒼朮換白朮加羌活服之效有熱再加黃柏木通

陳無擇

桃仁酒 腎虛風勞所傷毒腫制痛藥引

小腹連腰痛 桃仁麸皮炒去皮尖研細

每服一錢熟酒調下出汗即愈

東垣地龍湯 腰脊痛或打撲傷損後高墜下惡

血在太陽經中令人腰膝痛或脛腨臂膊中痛不可忍鼻壅塞不通

中桂四分 桃仁六分

箇羌活二錢

獨活甘草黃柏各二錢

麻黃五分 地龍四分

焙蘿木六分

歸尾一分

每服五錢水煎食遠熱服

橘核酒 治打撲腰痛瘀血積蓄痛不可忍
用橘核炒去皮研細每服二錢酒調下或用猪
腰子一枚去筋膜破開入藥同葱白茴香薑以
濕紙包煨熟嚼下溫酒送之已上二方皆該入
摩腰丹 治老人腰痛及婦人白帶

附子尖

烏頭尖

天南星各一錢

半硃砂

樟腦

丁香各一錢

半乾姜一錢

射香三分

雄黃半錢

為末煉蜜

丸如圓眼大臨用以生姜汁化開如厚糊樣

火上烘熱抹掌上擦腰中候藥盡貼腰上即

皂角膏 治諸腰痛脚痛，

用皂角一斤去皮弦搗碎好酒二大碗熬去一半濾去渣再用前汁入磁瓶內熬為膏子隨痛處貼之。

如神湯 治男婦腰痛，

玄胡索 當歸 桂心 杜仲各等分

為末酒調下三錢甚者不過數服。

橘核散 治腰痛諸般滯氣，

桔核 乳香各五錢
破故紙兩山楂 玄胡索
蒼蘭 没藥 五加皮 紅麴各一
錢
為末酒調下

國立圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN ROC

舟溪治瘧疾初安因受風又發腰痛兼又白濁已
與人參白朮檳榔半夏等補藥又教以煅牡蠣
一小錢木通五分炒柏三分入前藥同煎服


○痢後腰痛兩脚無力

陳皮 半夏 白芍一錢茯苓 蒼朮 當歸

黃芩酒炒白朮二錢甘草炙乙



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



赤水玄珠第六卷目錄

水腫門

水脹通論

論水氣証治大法

脉經叙諸水形証

羅太無治許魯齊藥案

仲景治水大法

脹湍門一名皍脹


皍脹說

虫蠶

痞氣門

終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



赤水玄珠第六卷

新安生生子孫一奎集

○水脹通論

靈樞經曰水穀入于口輸于腸胃其液別為五矣
寒衣薄則為漏與氣天熱衣厚則為汗悲氣氣
并則為泣中焦胃緩則為唾邪氣內逆則氣為
乏之閉塞而不行不行則為水脹余知其然也不
知其何由生顧聞其道岐伯曰五穀之津液和
合而為膏者內滲於骨空補益腦髓而下流

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

於陰股陰陽不和則使液溢而下流于陰髓液皆減而下下過度則虛勞過度謂房故腰背痛而腫瘦陰陽氣道不通四海塞閉三焦不瀉津液不化水穀并行腸胃之中別于迴腸留于下焦不得滲膀胱則下焦脹水溢則為水脹黃帝問于岐伯曰水與膚脹鼓脹腸覃石瘕何以別之岐伯答曰水始起也目窠上微腫如新卧起之狀其頸脉動時歟陰股間寒足頸腫腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裹水

之狀此其候也帝曰膚脹何以候之岐伯曰膚脹者寒氣客于皮膚之間擊然不堅腹太脹盡腫皮厚按其股窅然而不起腹色不變此其候也皺脹何如岐伯曰腹脹身皆大大與腹脹等也色蒼黃腹筋起此其候也腸覃何如岐伯曰寒氣客于腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫癖而內著惡氣乃起瘍肉乃生其始生也大如鷄卵稍以益大至其成如懷子之状久者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候

也石瘕何如岐伯曰石瘕生于胞中寒氣客于子門子門閉塞不得通惡血當瀉不瀉血以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生于女子可導而下帝曰膚脹鼓脹可刺耶岐伯曰先刺其脹之血絡後調其經刺去其血絡也

石水脹以下腫其脹沉

本事方云脹腹四肢悉腫者為水但腹脹四肢不甚腫為蠱蠱即鼓脹也

綱目云水脹皆本于房勞過度

○水腫出素問水熱穴論

黃帝問曰少陰何以主腎腎何以主水岐伯對曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脈也故其本在腎其末在肺皆積水也帝曰腎何以能聚水而生病岐伯曰腎者胃之關也關門不利故聚水而生病岐伯曰腎者胃之關膚故為肘腫肘腫者聚水而生病也帝曰諸水皆生于腎乎岐伯曰腎者牝臟也地氣上者属于腎而生水液也故曰至陰而芳甚腎汗出

行五者此腎之街也三陰之所交結于脚也踝上各一行行六者此腎臟之下行也名曰太衝凡五十七穴者皆臟之陰絡水之所客也

尻上五行行五

脊中一	懸樞一	命門一	腰俞一
長強一	大腸俞一	小腸俞一	膀胱俞二
中膂內俞	白環俞二	胃俞二	肓門二
志室二	胞肓二		
伏菟上各二行行五			

腎汗出逢于風內不得入于臟腑外不得越于皮膚客于玄府行於皮裏傳為附腫本之于腎名曰風水所謂玄府汗孔也帝曰水俞五十七處者是何主也岐伯曰腎俞五十七穴積陰之所聚也水所從出入也尻上五行行五者此腎俞故水病下為脇腫大腹上為喘呼不得卧者標本俱病故肺為喘呼腎為水腫肺為逆不得卧分為相輸俱受者水氣之所留也肺脾之標緣此二臟乃水氣之所留故也伏菟上各二行

中注二 四滿二 氣穴二 大赫二 橫骨二
外陵二 大巨二 水道二 歸來二 横氣二

踝上各一寸行六

太衝二

復溜二

陰穀二

照海二

交信二

築賓二

甲乙經云身腫閨門主之水腫脹皮腫三里註
風水膝腫巨虛上廉註風水面附腫顏黑主解溪
風水面附腫衡陽主之水中畱飲胸脇支滿刺
陷谷出先取天牖風池立已面附腫上星主之後

水腫今中盡滿脣反者死水溝主之水腫大
脾平炎脾中無理不治考
內經曰三陰結謂之水王註云謂脾肺之脉俱寒
結也 又曰下焦溢而為水王註曰下焦為分
注之所氣窒不瀉則溢而為水

黃帝問曰有病腎風者面附龐然壅害于言可刺
否岐伯曰虛不當刺不當刺而刺後五日其氣
必至帝曰其至何如岐伯曰至必少氣時熱時
熱從胸背上至頭汗出手熱口乾苦渴小便黃

目下腫難以行月事不來煩而不能食不能正
偃正偃則咳病名曰風水論在刺法中載曰願
聞其說岐伯曰邪之所湊其氣必虛陰虛者陽
必湊之故少氣腫熱而汗出也小便黃者少腹
中有熱也不能正偃者胃中不和也正偃則效
甚上迫肺也諸有水氣者微腫先見于目下也
曰何以言之岐伯曰水者陰也目者亦陰也腹
者至陽之所居故水在腹者必使目下腫也真
氣上逆故口苦舌乾目不得正偃正偃則咳出

清水也諸水病者不得卧目則驚則咳甚也
腹中鳴者病本于胃也溼脾則煩不能食也不
能下者胃脫膈也身重難以行者胃脉在裏也
月事不來者胞脈閼也胞脈者屬心而絡于胞
中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也
針經曰肢脛者人之管以趨翔也莖垂者身中之
機陰精之候津液之道也故飲食不節喜怒不
時津溢內溢乃下流于舉血道不通日大不休
俛仰不便趨不能此榮然有水上不下也

劉宗厚曰按內經諸水氣皆諸臟本病也鍼經所引則又主飲食及七情等因皆致之可見病机之微矣但有濕腫氣腫初亦頗相似然以手按乏成凹不即起者溫也溫與水有微甚之意況有氣腫及諸水形証不同要在臨症詳審也

水腫有陽水陰水之分若脈來沉伏面色青白不煩渴小便澁而清大便溏泄為陰水治宜實脾脉來沉數面色赤黃或煩渴小便赤而難大使秘治宜疎氣蕩滌

○論水氣証治大法

內經曰不從毫毛病生于內者陰氣內盛陽氣竭絕不得入于腹中故言五臟陽以竭也溝液者水也充郭皮中陰蓄于內水氣脹滿上攻于肺肺氣孤危魄者肺神腎為水害子不救母故云其魄獨居也夫陰精損削于內陽氣耗減于外則三焦閉溢水道不通水滿皮膚身體否腫故云形不可與衣相保也凡此之類皆四肢脉數急而內鼓動于肺中也肺動者謂氣急而熱也

門也此亦發汗之別稱泄諸病在表之通例也
淨府者謂膀胱內無入孔而外有出竅為清淨
津液之府憑腎氣藏氣化水穀之精而滲入膀
中氣約成溺出也主下焦司閨闥開竅二
陰肺脾之氣通調水道下輸膀胱氣化水行而
自清淨否則便溺或濁或淋為水氣溢于腠理
為膿腫諸病若宛屬陳壅滯于身中當泄去
是物而索淨宜此二法在表者汙之在裏者泄
之權衡于治也雖然經云水病本之于肺腎二

如是者皆水氣格拒于腹膜之內浮腫施張于
身形之外欲窮標本其可得乎平治權衡謂察
脉浮沈也脉浮為在表脉沉為在裡在裏者泄
之在表者汙之故云開鬼門潔淨府也夫冤陳
壅謂去積久之水物猶如草壅之不可留于身
于身中也
劉宗厚曰按經論水氣証治至為机密故云開鬼
門潔淨府然鬼門者猶幽玄之謂有毛竅而不
見其開關邪氣感入邪與正相搏毛竅閉塞而
寒熱作為病客于表故宜發汗遣邪氣以開鬼

經而古今方論並不以治水獨瀉腎氣為說者何蓋腎陰奉行降令為生化之源而常不足至陰精損削于內生氣不能運化至為附腫其氣索矣况肺弱而母氣孤危者乎故東垣曰若治以甘淡滲泄陽藥獨陽無陰其欲化得乎此探擗已上治例之妙也如積飲雷飲傷脾若止之千兩中則為堪矣或因七情所致手足大陰俱病身浮腫似水氣用燥脾道氣之劑即愈乎則若培土之得和風暖由水溫去而陽化自然萬

物生長二則肺氣開泄滲道通利水氣不濡于脾矣此正諸濕腫滿皆屬脾土識氣膿鬱皆属于肺而與陰陽為病水氣机之不同故亦不待開鬼門索淨府而已也

原病式謂水腫為濕熱實甚故治以辛苦寒藥蓋以辛散結而苦燥溫以寒除熱而隨其利湿去結散熱退氣和而愈而謂脾虛不能制水之說非也溪以水腫由脾虛不能制水故水漬妄行當以參术補脾使脾健則自能轉運而水自行但宜

補中行溫利小便為上

劉宗厚曰按劉河間以水腫為溫熱謂在表有熱宜汗謂在裡有熱宜下治法宜開鬼門潔淨府蓋言有餘之証然也丹溪以脾虛不能制水治當補中行溫利小便蓋言不足之証然也若夫滋腎制火之說愚切以為未當蓋補腎之藥乃陰滯柔潤適以滋溫耳豈理也哉今治此証但脾虛受溫為不足所致者宜燥脾土兼利小便若非氣鬱飲食溫熱所致者禁不得妄下証雖

可下又當權其輕重不可過用芫花大戟甘遂猛峻之劑暫時快利水氣復來而無以治之也少壯充實脉洪大有力者當導去其水年老虛人得此惟當補中行溫為先設或元氣下陷者即又當升提之

古方十種証候以短氣不得卧為心水兩脇疼痛為肝水大便鴨溏為肺水四肢苦重為脾水腰痛足冷為腎水口苦咽乾為膽水有虛乍實為太陽水腹急肢瘦為膀胱水小便秘澁為胃水

卷之三

四

六

二

小腹急滿為水，腸水必此。十水為正水，外有風水皮水、石水、黃汗水、風水，又有風腫氣腫、血腫、風腫者皮粗，麻木不仁，走注疼痛，氣腫者皮厚，四肢瘦削，腹脹脹脹，至若煩躁，漱水迷忘，驚狂嘔逆，煩悶皮間有紅縷赤痕者，此血腫也。婦人經脈壅閉，敗血停腐太多，見此妊娠亦有氣遏水道，而虛腫者，此但順氣安脾，飲食無阻，既產而腫自消矣。若產後發虛，則虛退而告殂矣。

大抵浮腫之脉帶數，即是虛寒潛止其間，久必沉

伏沉伏則陽虛陰實，為水必矣。

面龐然浮腫

疼痛其色，焰黑多汗，惡風者，屬腎風。

治觀

諸辰呂黑，則傷脾，缺盆平則傷心，臍出則傷肝，足心

平則傷腎，背平則傷肺。凡此五傷，必不可治。

大凡水腫先起于腹，而後散于四肢者，坐先起于

四肢，而後入腹者，死至若鼓脹而肚上青筋脹

湍，而大便滑泄，久瘡而轉作虛浮，又兼見前五

傷，則死矣。興夫男從腳上腫而上，女從上腫而

下，或肉硬，或掌心平而無紋，皆不治。

論生死脉法

水病脉洪大者可治微細者不可治水病脹閉其脉浮大數者生沉細虛小者死水病腹大如破脈虛者死實者生

○脉經叙諸水形症原出金匱要畧

病有風水有皮水有正水有石水有黃汗寸口脉沉滑者中有水氣而目腫大有熱或身體反重而酸或惡風一身悉腫脉浮不渴續有汗出而無太熱者皆為風水風水其脉自浮外

症骨節疼痛惡風

皮水其脉亦浮外証附腫按之沒指不惡風其腹如鼓不得當發其汗皮水之為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聳動者防已茯苓湯主之

○正水其脉沉遲外証自喘

石水其脉自沉外証腹滿不喘

黃汗其脉沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必致瘤脹

心水者其身重而少氣不得卧煩而躁其腫陰

肝水者其腹大不融自轉側脇下腹痛時津液微生小便續通

肺水者其身腫小便難時鴨溏

脾水者其腹大四肢苦重津液不生但苦少氣

小便難

腎水者其腹大脅腫腰痛不得溺陰下溫如牛鼻上汗其足逆冷面瘦

裏水者一身面目黃腫其脉沉小便不利故令病水也

仲景曰諸水身半以下腫者當利小便身半以上當發汗經云身半以上天氣主之身半以下地氣主之天氣主之者其在皮也故汗而發之問肌肉之外皮膚之裏首至足一身皆腫者當作何治答曰亦宜汗之也與身半以上同法身半以上汗之者尺寸之天地也故汗之肌肉之外皮膚之裏一身盡腫者後天而汗之此表裡之浮沉凡治之法當如是也肺心肝腎中州已上俱宜汗中州以下皆宜汗如小便利而渴不

宜汎不宜下以其重亡津液故也

王海藏曰觀高低內外輕重表裡隨經補瀉要當謹察肺胃腎三經病即瘥也

夫水氣者胃主不能制胃水逆而上行傳入于肝故令人腫治者惟知泄水而不知益胃故多下之強令水出不依天度流轉故胃愈虛食不滋味則發而不能治也莫若行其所無事則為半計不可不知凡補胃不可使之壅滯如本草叙赤小荳治水腫通氣補脾胃之類是也

羅太無治許魯齋案云魯齋年五十八面白肢體浮腫大便溏多腹脹腸鳴時痛飲食減少脉得弦細而緩年少時多服牽牛大黃藥面目四肢時有浮腫今因陰雨故大發予曰營運之氣出首中焦者胃也胃氣弱不能布散水穀之氣營養臟府經絡皮毛故氣行而濇為浮腫大便溏多而腹脹腸鳴皆濕氣勝也四時五臟皆以胃氣為本五臟有胃氣則和平而安君胃氣虛弱不能運動滋養五臟則五臟脉不和平本臟

之氣盛者其脉獨見輕則病過甚則病死故經曰真臟之脉弦無胃氣則死今幸未至於甚尚可調補入知服辛牛大黃為下時之快不知其為終身之害也遂以平胃散加白术茯苓草葛芩仁數服而腹脹溏泄腸鳴時痛皆愈飲食進止有四肢浮腫以導滯通經湯主之良愈

導滯通經湯 治脾溫而氣不宣通面白手腳浮腫右每服六七錢水煎食前服
霖雨時加澤瀉一兩

陳皮 白术 糜白皮 木香鉛 五茯苓 一两

丹溪治水腫多以二陳加白术人參蒼朮為主佐以黃芩麥冬炒梔子制肝木通腹脹少佐以厚朴氣不運加木香木通氣若階下加升麻柴胡提之隨病加減必須補中行溫二陳治溫加升提之藥能使大便潤而小便長產後必須以大補血氣為主少佐蒼朮茯苓使水自降用大劑白术補脾若壅滿用半夏陳皮香附監乏有熟當清肺金麥門冬黃芩之屬
用山梔去皮取仁炒槌碎米湯送下一抄脾胃方

熱病在上者帶皮用治熱水腫山梔子五錢
木香一錢半白朮二錢半取急流水煎服水
脹用大戟香薷濃煎汁成膏丸去暑利小水

大戟為末裹肉丸十九泄小水刲實者

○綱目述丹溪治水腫得効之法十五條其法大率
以甘草佐白朮參陳苦劑補中氣為君藥通滑
石郁李仁海金沙行水為臣藥朴大腹皮蘿梗
通滯氣為佐使知氣不升浮惡寒脉沉者探吐
以提之頭面光腫加麻黃微汗之挾積氣者佐

以保和溫中抑青等丸磨之挾熱者佐以黃芩
之類清之挾瘡癰者佐以連翹犀角散之而隨
証加減也

仲景曰寸口脉沉而遲沉則為水遲則為寒寒水
相搏趺陽脉伏水穀不化膽氣衰則驚癇胃氣
衰則身腫少陰脉細男子則小便不利婦人則
經水不通經為血不利則為水名曰血分

仲景治水大法

風水脉浮身重汗出惡風者防已黃芪湯主之

防已一兩

黃芩一錢

五分

白术七錢

五分

甘草錢五

右每服五錢

生姜四片棗一枚水煎溫服良

久再服

腹痛加白芍藥

因溫為腫者前湯調下五苓散又前湯治風溫脉浮為在表其人或頭汗出外無表証惟腰以下常重而腫難以屈伸腰以上俱和者並効風水惡風一身悉腫脉浮不渴自汗出而無實熱者越婢湯主之治裏水加白术四兩
麻黃去節六兩石膏半斤生姜三兩大棗樹二甘草

右五味以水六升先煮麻黃抹去上沫入諸藥煮取三升分溫三服惡風者加大附子一枚炮古今錄驗治風水加术四兩

皮水為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聾動者防已加茯苓湯主之

防已 黃芪 桂枝 酸梅子 甘草 酸二

右五味水六升煮取三升分溫三服

壅水為病越婢加术湯主之又甘草麻黃湯亦主之甘草酸二 麻黃去節水五升先煮麻黃

去渣沫，內甘草，煮取三升，溫服，一升，被覆出
汗，汗不出再服。慎風寒。

水之為病其脉沉小屬少陰浮者為風無水虛脹者為氣水發其汗即已脉沉者宜附子麻黃湯

附子麻黃湯

附子一枚
水七升先煮麻黃去皮
二升半溫服八合日三服

陰陽結邪多陰少陽名曰石水小腹腫石水者謂
冬月水冰如石之時故曰石水也火墓于盛冬
陽氣微故石水而死也腎肝並沉為石水
黃汗之為病身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗
沾衣色其黃如蘖汁脉自沉閼曰從何得之或
汗出入水中浴汗從孔中入得之黃汗者黃蘖
芍藥桂枝苦酒湯主之

黃芪五兩
芍藥三兩
桂枝去浮皮三兩
苦酒一升
水七升煮二升溫服一升當心煩也至六七

日乃解君心煩不正者以苦酒阻故也

黃溼之為病兩頸自冷假令發熱此屬感節食已汗出又身常暮卧盜汗出者此榮氣也若汗出已反發熱者久其身必甲錯發熱不正者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久必身瞶即胸中痛有下後腰已上必汗出下無汗腰下弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利此為黃溼桂枝加黃芪湯主之

桂枝去浮生姜芍藥各三甘艸酸二黃芪

右入棗十二枚擘以水八升煮取三升溫服一升湏臾飲熟稀粥一升以助藥力被覆取汗不汗更服之

師曰寸口脉遲而澀遲則為寒澀則為虛不足趺陽脈微而遲微則氣遲則為寒寒氣不足則手足厥冷則營衛不利營衛不利則腹滿胸鳴相逐氣轉膀胱營衛俱勞陽氣不通則身冷陰氣不通則骨痛陽前通則惡寒陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行太氣一轉其氣乃散實則

失氣虛則遺溺名曰氣分氣分心下堅大如盤
如旋杯水飲所作桂枝去芍藥加麻黃附子細
辛湯主之

桂枝皮浮生姜 麻黃去節細辛芍二甘草芍
大棗枚擘附子一枚炮去

右水半升先煮麻黃去沫內諸藥煮取二升

分溫三服當汗出如虫行皮中愈

心下堅大如盤如旋杯水飲所作枳木湯主之
枳實 白朮各三右二味水五升煮取二升分

十棗湯加桂枝皮附子一枚炮去

溫三服腹中硬即當散也
商自浮腫喘嗽痰涎草薢大棗鴻肺湯主之

苦草薢 苦草薢等分大棗

腰巴下有水氣牡蠣澤瀉散

兩腸下有水氣腹中雷鳴生姜湯心湯

十棗湯

大戟

芫荽

甘遂絡等

三花神祐丸

十棗湯加牽牛

大黃

輕粉

水丸服

除湿丹

神祐丸加 乳香 没藥

玄青丹

神祐丸加 黃連 黃柏 青黛

已上四方不可輕用必看其有實候乃用之
明理趁痛丸 治水氣浮腫又治腳氣上攻風毒
走注疼痛神效

白芥子生為肥甘遂生為生大黃各末
右用白麵一兩半滴水丸作餅子燙令黃不

可過焦為末醋糊丸梧桐子大冷酒下二十
丸不拘時量虛實加減

紫苑散

木香 人參 白朮 紫苑 川芎各二

右粗末生姜烏梅煎服次日又一服

調胃白朮澤瀉散

治癰病化為水氣傳為水皰不能食

白朮 澤瀉 芳藥 陳皮 茯苓 生姜

木香 檳榔各半 一法加白朮本藥各半治

臍腹上腫如神心下痞者，加枳下盛者加檳榔治方。治支飲滯飲于二十棗湯中，加大黃甘草五兩同煎服之。故以相反之劑，欲其上下俱去也。郁李仁破滯氣能下四肢水。大抵去水藥多泄熱，當求脉之虛實，下之。

消腫散。治水氣喘呼，不得卧，煩熱燥渴，大小便不利。大黃蒸山梔炒甘草灸乾葛陳皮。麻黃川芎馬牙硝各等分，為末，蜜湯調下二錢。又方。千金子二百五十粒，姜三片，滾水煎，空心。

服以利為度。

集成尊重丸。治鹽証水腫氣腫喘急，小水赤澁，太便秘結，一切中滿單腹鼓脹。

人參沉香丁香木香檳榔車前子
草薢子錢四胡椒鷄梢滑石海金沙
赤茯苓白豆蔻錢半蘿蔔子錢郁李仁二錢
右為末，姜汁糊丸梧桐子大，每服三丸，姜湯
下，一日服三次。

簡易方。治鹽脹身乾黑瘦，多渴煩悶。

馬鞭草細剉晒乾勿見火以酒煮味出去渣溫服立効不善酒者水煎亦可六月半時採

元戎神方

烏鵲子一枚去頭取清黃汁調膩粉一大錢令
同內蔥中以蒸餅劑裹之蒸熟去殼取熟黃二
莖慈芽分炒為末與上并黃蒸餅等為丸大如
每服三五十丸車前子湯下小便澁不通瞿麥
湯下

又攻擊泄下之劑去茺陳莖之法也

許學士十腫水病并根源証狀方法

一青水先從左右肋腫起根在肝 大戟

二赤水先從舌根起根在心 莼蕘子

三黃水從腰腹起根在脾 甘遂炒

四白水從腳腫起根在肺 桑白皮

五黑水從外腎腫起根在腎 連翹

六玄水從面腫起根在外腎 芫荽 醋炒

七風水從四肢腫起根在骨 澤鴻

八石水從腎腫起根在膀胱 藜本

九高水後小腹腫起根在小腸
十氣水或盛或衰起根在腹

巴豆油去皮
赤小豆

右十般腫病各有根源種、不同者十腫病根除一味倍多餘九味等分逐味依法脩治焙為細末煉蜜丸如梧子大用赤茯苓湯吞下三丸不拘時候每日三服忌鹽一百二十日緣鹽能化水也又忌魚鰯麵食一切毒物及生冷房室其効用此方獲瘥後更服後來補藥

補藥方 肉桂皮去粗乾姜 肉豆蔻 赤茯苓去

莪朮 煎川芎

桔梗各等依法製服一方無分

茯苓莪朮有青皮白木檳榔俱等分為末每服三錢百沸湯點服空心食前日午晚各一服前項二方治水腫病甚効子試用之百

發百中獲濟無數

治腫滿小便不利茯苓散

郁李仁四錢 檳榔二錢 白朮錢 赤茯苓錢 甘遂切片陳皮一錢 右為末每服一錢姜棗湯調下

已上三方許學士試效者治水腫無逾此矣

雄黃神金散

雄黃 荚蒾梗米炒熟澤鴻 椒目減半 大戟
巴戟 茯苓 荒花醋浸一甘遂 桑皮硝一

右為末空心用井花水調服每一小錢加至五
錢以利為度忌鹽醋生冷油膩之物

從腳腫加莢蒾 肚腫加椒目 從陰腫加
澤鴻 口腫加茯苓 從心腫根在筋加雄
黃 從肢腫根在皮加甘遂 從口腫根在

小腸加巴戟 從腰腫根在腎加大戟 從
膝腫根在肝加羌荳

三白散

治膀胱蘊熱風溫相乘陰囊腫大二便不利

白丑

桑白皮

白朮

陳皮

木通各等分

為末每服二錢空心姜湯調下小兒減半

秘方

治鼓脹如神氣鼓則放屁水鼓則下水愈

大戟

白商陸

甘遂鉛

陳皮錢

大腹皮

梔榔

白朮

海帶

海藻各二

為末每

用三錢

和白麵

三兩水拌做一塊分作三小

塊每塊捍碗內大薄餅一箇共作三箇無油
鍋內烙熟空心服一餅茶酒送下過口坐臥
忌風生冷油膩鹽一箇月不能斷葷者不可
治也此藥試過每用一餅僅行水四五度並不瘦人並

一方 用乾鷄屎一升炒黃好酒三碗淬下煮作
一碗絳濾去渣飲之少頃腹中氣大轉腸鳴從
太便利下脚膝及蹄上下先皺起漸消至腹
如一次消不盡再服一劑以田螺二枚滾酒內
渫熟食之即止後以溫粥調養而安

此方治一切水氣濕發腫効

三因消腫丸

治水腫喘滿小便不利

滑石

木通

白术

黑丑炒

茯苓

半夏

陳皮

木香

瞿麥

丁香各五分

為末酒糊丸

梧子大升

每五十丸

灯心麥門湯下

葶苈丸

治涌水証如溢囊裹裡漿或遍身腫滿

按腹

不堅疾行則灌

有声或喘欬不定

葶苈炒澤鴻

椒目

桑白皮

木猪苓

杏仁各五

為末煉蜜丸

梧子大升

每十三十丸葱

白湯下不拘時服以利為度

局方神助散

治十種水氣而自四肢浮腫以至

按之隨手而起欬嗽喘急不得安卧小便赤澁

太便不利

黑丑末

澤鴻酪一撮目一兩

半兩 猪苓二兩 藁蘆

右為末葱白三莖水煎入酒調服三錢

薏苡根散 治水腫

薏苡根君

木香 檳榔 黑丑

右為末酒調服妙

聖惠氣寶丸又名順治腰腸俱病如抱一壅肌膚堅硬按之如皺脚腫不能屈伸自頭至腰中瘦脊露骨骨癟瘡悶四肢無力

木香 苗香 炒羌活 木瓜 川芎

當歸

陳皮 炒檳榔

地骨皮 酵一大黃一兩

黑丑二兩

皂角四兩

右為末熬皂角膏為丸梧子大每六

十九溫酒下

一方無木瓜生姜灯心湯下

治一切氣血凝滯風毒熾盛脚氣走注作腫或太便閉脚氣入腹滿悶寒熱往來狀如傷

寒並宜服之

簡易方 治水蠱不問年月深者

大戟 當歸 陳皮各一

水二升煮七分頻服利二三斗即愈

元戎方 治十種水氣垂死

鯉魚一頭重一斤者和葱白冬瓜羹食之

又治鼓氣方

滑石 輕粉礬一槐花半錢

右不犯鐵氣為細末生地黃自然汁生姜自

然汁停滴在藥中為丸梧桐子大一日服三丸次日服四丸五日以來早辰只一服用生地黃汁溫送下小便中水盡為度得睡後日服嘉禾散十日未不再發

○治陰水腫之劑

五皮散 治風濕客于脾經氣血凝滯以致面目

俱浮四肢腫滿心腹膨脹上氣喘促

五加皮 地骨皮 生姜皮 大腹皮

茯苓皮 水煎熱服 一方加牽牛

澹寮方無地骨皮五加皮

加陳皮桑白皮

白术木香散 治腫滿喘嗽欲變成水病者不能食不

食不_火小便秘

白术 猪苓 甘草 潤澤 赤茯苓 鎔五

木香 檳榔錢各橘紅二官桂二錢滑石三兩

右每服一兩半生姜三片水煎溫服

_{本方加木通}

拔萃聖靈丹 治肺有溫喘滿風盛小便赤澁

苦葶藶炒四兩 防已二錢 赤茯苓 麵炒木香

檳榔 木通 入參各一錢

為末以棗肉丸梧子大每服五十丸桑白皮湯下

續隨子丸

治通身虛腫喘悶不快

人參

防已

赤茯苓

麵炒

續隨子

木香

檳榔

海金沙

另炒

各苦葶藶

四兩

右為末棗肉丸梧子大每五十丸桑白皮湯下

退腫搗氣散 治積水驚水或飲水過多停積于脾故四肢腫身熱用藥惟內消其腫自退

赤豆

陳皮

蘿蔔子

甘草

五錢

鎔木香半錢

每服一兩生姜三片棗一枚水煎食前服

復元丹

治水腫皮膚盈溢心腹堅脹喘急不得

正偃正偃則咳嗽腿腹冷口苦舌乾小便不利

夢中虛驚不得安卧

附子炮木香

煨

茴香炒川

椒

姜去汗獨活

厚朴

白术

炒

吳茱萸

炒

桂心

芍藥

一澤瀉

半

肉果

煨

檳榔各五

為末

糊丸梧子大

每服

五十九粒

紫

蘿湯

下一日

三服

先便

旋利

如傾

次乃

腫潰

喘止此藥能助真火以養真土運樞機禁絕鹽半年乃不再作

當歸散 治同前

川歸 赤芍藥 牡丹皮 白术 赤茯苓
陳皮 檸榔 木香 桂心 木通各等分

脚膝頭面腫大小便不快每服二錢水一鍾
紫蘿葉二片木瓜一片同煎分溫服日三
服稍覺愈只早晚服二次但覺氣下小便長
是効臘虛去檸榔 脾凸加太腹皮豬苓
各一兩 忌鷄魚肉酸醗之物及海味

大半夏湯 治生不能制水水漬于腸胃溢于皮

膚瀧スル 有声怔忡喘息名曰水脹スル

橘紅シロク 半夏ハナツ 茯苓ブリヂン 甘草カンゾウ 桔梗カキエイ 檳榔ヒンラン

等分每服五錢姜三片水煎服

赤茯苓丸 治同上

木香五錢苦葶苈アマノコノヒ炒四防已二兩赤茯苓二兩

為末棗肉丸梧子大每服三十丸桑皮湯下人參葶苈丸治一切水腫及喘滿不可當者人參一兩苦葶苈アマノコノヒ炒四

為末棗肉丸梧子大每三十九桑白皮湯下

神秘湯 治水氣上乘于肺肺得水而浮水腫不卧サト則喘タフ

白茯苓 木香錢各五乘白皮 紫蘿葉陳皮

人參錢七姜七片水三鍾煎鍾半食後分五服

無礙丸

治脾病橫流四肢腫滿

木香醉蓬木炮去皮 三稜炮枳榔 郁李仁炮去皮 各一兩

大腹皮 二兩為末麥芽麵糊為丸梧子大每服

三十九生姜湯吞下

香蘿散 治水氣虛腫小便赤澁

香蘿散

治水氣虛腫小便赤澁

陳皮一去白防已

兩分防已

木通

紫蘇葉錢五

右為末每服二錢姜三片水煎食前服

小夢蓼丸

治腫滿腹大四肢枯瘦小便澁濁

甜夢歷炒

芥菜根等分炒熟蜜丸彈子大每服一

丸陳皮湯嚼下只三丸小便清數病愈

牡蠣澤瀉散

治脾胃氣虛不能約制腎水水溢

下焦腰以下腫

牡蠣澤瀉

蜀漆洗去夢蘿炒瓜萎根

白商陸根

海藻洗等分為末白湯調服方寸

七小便利止後服

踈鑿飲子

治水氣遍身浮腫喘呼氣急煩渴太

小便不利服熱藥不得者

澤瀉

赤小豆白商陸

大腹皮茯苓皮

羌活

椒目

木通

秦艽

檳榔等分

薑五片水煎服

大橘皮湯

治濕熱內攻腹脹水腫小便不利太

便滑泄

陳皮一兩

木香半錢滑石六錢檳榔錢茯苓一兩

半

木香半錢滑石六錢檳榔錢茯苓一兩

猪苓 白术 濤瀉 肉桂各五
生姜五片水煎服

實脾散

厚朴 白术 木瓜 附子炮 木香 桃芩
大腹子 草果仁 乾姜炮各一两 甘草錢五
姜五片棗一枚水煎服

加味枳术湯 治氣為痰飲所膈心下堅脹名曰
氣分○枳殼 白术 陳皮 檳榔 桔梗
木香 桂 紫蘇梗葉 五靈脂炒各二分 半夏

桃芩 甘草各半 姜三片水煎服

調榮散 治瘀血化為水 四肢浮腫皮肉赤紋名
曰血分 細辛 義术 桂 赤芍 川芎

川芎 玄胡索 白芷 大腹皮 來白皮

檳榔

蘿麥穗

陳皮

赤茯苓

草歷

炒

大黃根各一錢 甘草錢半 每服五錢姜棗煎食前服
大豆湯 治風水通身腫百節痛惡風自汗眼合
不得短氣欲絕其脉浮

大豆 杏仁去皮麻黃 防風 防已 猪苓

各四澤瀉

黃芩

烏頭炮半夏

茯苓

桔梗

甘遂

大戟

芫花

商陸

白术各五
甘遂炒甘艸炙各一
水二鍾酒半鍾煎一鍾服以大小便利為度
如不利加生大戟兩
桑白皮一
芩
內甘遂甘草本相反故用之以成功屢試屢
効非泛常所可測也

澤漆湯

治石水四肢瘦腹腫不喘其脉沉

澤漆洗去腥

桑白皮

六兩

射干浸泔水

黃芩

茯苓

白术各四澤瀉

防已各二

每服五錢水三鍾先用黑豆一合煎至二鍾

入藥同煎七分空心食前服一日三次

附子荳蔻湯

治寒客皮膚散然而堅腹大身

腫按之陷而不起色不變病名膿脹一劑未知

大附子大者一枚

荳蔻豆

二兩

生姜一兩

切

水二鍾煎二鍾分三服空心午晚各一服

葶苈防已丸

治面目浮腫肺氣喘咳不安赤小便

防已一兩木通

葶苈

杏仁去皮

尖貝母各一

兩右為末棗肉丸梧子大每服五十丸食遠服

兩右為末棗肉丸梧子大每服五十丸食遠服

來白皮煎湯送下

水才卷之三

方
考

10

酒腫丸 治酒腫及脾虛發腫
蘿蔔十枚皂角五枚一味用米煮乾去皂角將
蘿蔔搗爛蒸餅糊為丸芡實大蘿蔔煎湯如
意送下

犀角湯 治結陽症四肢腫滿熱癆不散或毒注
犀角 玄參 連翹 柴胡各五錢
各一沉香 射干 甘草炙七分芒硝三錢
錢分二服水煎

消腫湯 治水腫喘滿大小便不利
白朮 蘭子錢一錢
山梔錢五分 赤茯苓 蘿蔔子錢三錢
椒目 藕子錢一錢 沉香三分 木香五分
水煎服

白术
山楂錢
赤石苓
蘿蔔子錢
赤芍
方
繼前服
已上
二方神妙

又方

繼前服

丁方神効

1

椒目

蘿子錢各

一
国家

沉香於木末

四

五

分
上

水前

卷之三

二奇方

白朮五錢 滑石三錢

水煎服，七服全愈。

白芍芩湯

治水腫

開界

門索淨府機要方

白茯苓

澤瀉各二錢
郁李仁五錢

水煎臨服

入生姜自然汁服或作粥飯或和麵作糲食之五七日後俟脹下乃與白朮散

又方 大田螺大蒜生車前草和研為膏作太餅敷于脣上少頃水從小便出數日愈

病機白朮散 服前白茯苓湯利後以此補之

白朮 澤瀉各五錢為末以茯苓三錢煎湯調下或丸服亦可每三十九從少至多後以黃芪建中湯之類調補

○脹滿門二名鼓脹

內經曰諸溫腫滿皆屬於脾蓋言脾虛不能運化此脹滿之所由生者也又曰濁氣在上則生脹此清濁相干而為脹者也靈樞曰脹者皆因厥氣在下寒氣逆上榮氣留止真邪相攻兩氣相搏合而為脹又曰內虛不足中寒溫令人中滿又曰胃中寒則脹滿針經云脹取三陽三陽者足太陽膀胱寒水為脹也以皆以脹為寒也內經曰諸腹脹大皆属于熱

丹溪曰七情內傷六淫外侵飲食不節房勞致虛脾土受傷轉輸失職胃雖受谷不能運化故陽自升陰自降而成天地不交之否清濁相混隧道壅塞濕鬱為熱又生溫熱相生遂成脹滿經曰鼓脹是也以其外雖堅滿中空無物有似于鼓又名蠱者若虫侵食有蠱之義是以脹滿為熱也

陽熱為邪則身體有熱脹滿而咽乾陰寒為邪則吐不下食脹滿而自利

又有穀脹水脹氣脹血脹不可不別失飢傷飽痞悶停酸旦食暮不能食者是為脹脾土受溫不能制水漬于腸胃而溢于肌膚瀉下有声怔忡喘息是為水脹

七情鬱結氣道壅隔上不得降下不得升身腫大而四肢瘦削是為氣脹

煩躁漱水迷忘驚狂痛悶嘔惡虛汗厥逆小便多大便黑婦人尤多見之是為血脹又有五臟六腑之脹出表機脹論篇全文在医旨錯餘

靈樞曰心脹煩心短氣卧不安肺脹虛滿而喘咳肝脹脇下滿而痛引小腹脾脹善噫四肢煩悅體重不能勝衣臥不安引背央然腰髀痛胃脹腹滿胃脘痛鼻聞焦臭防于食太便難大腸脹腸鳴而痛灌冬由重感于寒則餐泄不化小腸脹小腹脹引腰而痛膀胱脹少腹滿而氣瘤三焦脹氣滿于皮膚中輕然而不堅膽脹者脇下痛脹口中善太息

夫槩有虛實之辨實者腹中常脹外堅內痛按之不陷法當鍼利虛者時脹時減虛氣留滯按之則濡法當以溫藥和之

又有五積久而成脹滿者有外感寒邪傳入于裏寒多為熱作胃實而脹滿者有痃瘧久而成脹滿者治療之法在體認詳明按而治之可也又病羸乏變為脹滿喘息不得及脹脹而肌肉崩潰足脛流水唇黑缺盆平臍突起平足心滿些數者皆為五臟損敗不治之症也

陳無擇曰：脹滿皆臟氣不平，勝乘相因，為病如怒傷肝，剋脾，氣不正必脹于胃，名曰勝冠。怒乘肺，氣不傳必脹于大腸，名曰乘冠。

丹溪戒云：醫家不察虛實，急于作効，病者苦于脹急，喜行利藥以求通快，不知寬得一日半日，其腫愈甚，病邪深矣，真氣傷矣。

脉訣舉要曰：脹滿脉弦，脾制于肝，洪數，熱脹遲弱，陰寒浮為虛滿，緊則中實浮，則可治虛，則危急。丹溪云：宜大補中氣，行溫，此乃脾虛之甚，必須起

音樂斷言：厚味大劑，入參白朮佐以陳皮，桔芩，蒼术之類。有脉實堅，人壯盛者，或可攻之，便可收補用參术為主。凡補氣必帶厚朴，寬滿，以其味辛能散其結也。須用姜汁製之。肥胖人初脹，未久，以胃苓湯服。如面白人腹脹，是氣虛，宜參术厚朴陳皮。如瘦人腹脹，是熱，宜連厚朴香附白芍。如因有故蓄血而腹脹者，宜抵當丸下死血。如因有食積而腹脹，有熱者，用木香檳榔丸，有寒者用木香厚朴丁香砂。

仁神麴香附

如因外寒束內熱而腹脹者用

藿香、麻黃升麻乾葛桂枝

因大怒而腹脹者用

宜青皮陳皮香附木香梔子仁蘆薈

實者按

之堅湏下之次消之次補之

虛者溫之升之

補之朝寬暮急血虛暮寢朝急氣虛終日急

氣血俱虛腹脹不寬滿者食肉多用黃連丁

兩阿魏半兩醋浸餅為丸同溫中丸白朮湯

下食肉多三補丸料內加香附半夏麴蒸餅

糊丸服

○鼓脹說

生生子曰脹滿之疾穀食不消小便不利腹皮脹急而光內空然如鼓是矣俗知謂之鼓脹不察其致之者有由也內經曰脹取三陽三陽者足太陽寒水膀胱經也足少陰經曰下焦溢而為水靈蘭秘典曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣歷考三書可見小便之不利由下焦原氣虛寒以致濕氣壅遏于膚裡膜外之間不得發越勢必腫滿是腫滿之疾起于下元虛寒也若非