

外科正宗卷三

海甯許 楣辛木訂

明崇川陳實功著 吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光焞寅昉校

癰疽圖形第二十

癰疽總三十圖

婦人四圖

嬰兒二圖

共三十六圖

蓮子發形如蓮子頭多突起腫高潰膿者生
平塌陰陷者死



徐曰凡瘡毒大者
必多頭最重圍藥

蜂巢發形如蜂巢頭含螺子片片腐爛孔孔
流膿紅活者生黑陷者死



楣案紅活者生黑陷者死二句徐圈凡癰疽
生死盡於此八字不獨蜂巢發然也

井疽心火妄動所發掀赤高腫者生堅硬紫黑者死



玉枕疽膀胱溼熱凝滯而成紅腫者生紫陷者死

玉枕疽




對心發心火沸騰溼熱凝之腫高腐潰者生軟陷紫黑者死

天疽陽火熾盛所發紅赤高腫者生紫黑平陷者死



徐曰此即對口惟略偏耳
楣案天疽在左耳後一寸三分觀後第二十三圖可見此圖似誤

楣案馬刀生缺盆之上由胸腋而至脅此圖在玉枕疽部位殊誤




附骨疽初起大腿筋骨作痛久則漫腫出膿膿稠者生氣敗者死

對口太陽蘊熱結聚而成高腫易潰



對口瘡

失榮症



橫疔

囊癰

手發背

失榮症生於耳前後及項間初如痰核久則堅硬漸大如石破後無膿惟流血水堅硬不消腫痛異常乃百死一生之症

耳後發



耳後發有頭高腫者
生無膿軟陷者死

形如粟米色如紅棗
生此百人百不救



脫疽

徐曰此生於足大指

生於足大指... 脫疽... 生於足大指... 脫疽...

脾肚癰乃飲食炙博厚味釀成紅紫高腫潰爛者生紫黑平塌陰陷者死



人面瘡屢積業冤一朝得此先宜修省後方醫治

人面瘡




徐日各處可生

高腫為癰沈潰為疽
有膿者生無膿者死



楣案發於兩眉棱骨及兩眉中間印堂
皆名鳳眉疽此圖在額上部位誤
又案鷹瘡各本誤作馬刀瘡



胃口疽發在心胃之旁陽者有
頭陰者無頭乃飲食炙燂所致






肩疽起肩上有頭腦起寒
熱交作胃經積熱所致



流注起於寒熱不
調氣血凝滯而生



徐曰串者彼處又生也





胸疽

魚肚疽

合谷疔生於虎口




心疽

幽癰


赫癰

小腹癰腹疼臍突者是也

發在耳後一寸三分致命之處左為天疽右為銳毒




一 癰總名臀癰



坐馬癰

下馬癰

透腦疽



氣癰

陰疽

咬骨疽

玄疽

瘡疽

餘毒更難識與臭難辨者甚多

結毒硬腫腐爛臭穢者是也




鼻疔


龍泉疽



虎鬚毒



棉花瘡卽楊梅瘡是也





鈕釦風項上如癰作痒者是也

癰瘡

乳岩中空如岩穴邊腫若泛蓮真死候也





乳癰紅腫發熱疼痛是也



乳疽堅硬腐爛者是也



赤遊丹紅如雲形者是也



疔馬疔牙根黑
腐臭爛者是也

癰疽疔毒各圖第二十一

癰疽諸名歌第二十一

背之左右謂疽癰。手膀肩背亦相同。肺疽居右癰居左。
蜂癰左右近喉嚨。耳後右爲銳毒看。天疽左耳後相逢。
左右兩肩名搭手。井疽正發在中心。楣案癰疽分陰陽不分左右
流注牽藤六七成。發於心上止臍平。脅疽生在脅肌下。
陰疽大體近箕門。穿踝疽穿股拐下。腳氣原來腳底生。
左爲便毒右魚口。鶴膝風從膝眼成。
肩下臍癰腋下疽。喉嚨上下氣癰醫。當脈兌疽君可記。
三寸相離穿骨基。紅絲疔從手上起。蛾子喉風口內隨。

腎疽當腎生左右。三里穴發附陰疽。

離臍四寸爲赫癰。再高三寸號幽癰。腸癰還從臍突起。

胸疽乳上心肺中。合谷一疔名虎口。蛇頭魚肚指頭逢。

腦後一疽名玉枕。莫作如常一樣同。

肩疽樂疽居右手。石榴離肘上三分。左元陰右襠疽發。

咬骨陰包穴上生。淵疽腎上腿附骨。佛頂疽生腦頂門。

人世毒瘡當切記。庶幾患者可全生。

顴骨爲疔脣上疽。鬢邊所發亦疽醫。眉中鳳眉防侵腦。

黑疔耳內不爲奇。鼻內生疔當速療。透腦原來髮際基。

外科正宗卷三
三
眉毛癩疽是大毒。頰疔魚眼近腮齊。
馬刀癩癧氣癭瘡。一氣生來在頸項。龍泉虎毒脣上下。
對口原來髮下藏。牙根脣上癰須記。牙下生之疽一行。
頂牙縫突爲疔治。切莫看成小小瘡。
心肝脾肺腎癰疽。當看胸中穴道醫。更有黃頭并白泡。
發無定處速如飛。左爲坐馬右下馬。尾骨頭尖鶴口疑。
此物殺人能致命。火急攻醫切莫遲。
婦人之乳有數種。高腫爲癰堅硬疽。還有乳岩眞惡症。
腫如頑石破如墟。鈕釦之風生頸項。裙帶風瘡腳下居。
又有溼癩瘡等疾。總名爛腿蔓難圖。
嬰兒走馬爛牙疔。黑腐沿開臭不堪。赤游丹毒渾身到。
鵝口瘡苔滿口漫。風瘡奶癬多搔癢。血灌膿窠痛久安。
還有心脾胎熱症。口疔重舌一般看。

腦疽論第二十二

夫腦疽者。俗稱對口是也。所發不同。其源有二。得於溼
熱交蒸。從外感受者輕。五臟蘊結。從內發外者重。溼
熱之爲病。由於天行氣候。寒暑不調節。序溫涼。陰陽
失度。體虛者易於侵襲。項後雖屬督脈。又主太陽寒

水司行之道。一經侵襲。氣血必凝。凝則必腫。此從外感受者。其患初起有頭。多生正穴。三四日間。多作掀痛。始生寒熱。口和不乾。色紅根活。瘡勢漸高。形不散大。時止時疼。易膿易腐。飲食知味。起坐如常。外勢雖可畏。而無七惡相干。此屬陽症。故雖不治可愈。其由五臟蘊結而成者。其源又有五。蓋心主血。故心緒煩擾。煽動不甯。以致火旺而沸騰。行於項間。與寒水交滯。而爲腫一也。肝統筋。故惱怒傷肝。項乃三陽統筋之所。肝傷則血脈不潮。筋無榮養。凝結爲腫。故項緊。

急強痛。不能轉側。其患未潰前。肉色紫暗。堅硬漫腫。破流血水。木痛無膿。此皆肝氣受傷二也。脾主肌肉。故思慮傷脾。脾氣日損。又或膏粱損胃。胃汁乾枯。以致中脘痞塞。氣不運行。逆於肉裏。乃生壅腫。其患外皮雖腐。而內堅不潰。口燥舌乾。飲食不進。根腳走散。膿穢色敗。此皆脾氣受傷三也。肺主皮毛。故憂鬱傷肺。肺傷則毛竅閉塞。腠理不通。氣不舒暢。縱橫經絡。結而爲腫。其形瘡多平陷。色淡不華。皮腐脂流。形如湯潑。氣麤短促。鼻煤鼻掀。漉漉生痰。殷殷發嗽。此皆

肺氣受傷。四也。腎主骨髓。故恣慾傷腎。腎傷則真陰之氣敗矣。真陰一敗。相火自生。此火最能自升自降。或動或靜。煎熬臟腑。消燬津液。更變形容。改換聲音。瘡形紫黑。脈數乖度。煩躁口乾。隨飲隨渴。此皆腎氣受傷五也。凡治此症。必內分虛實。外辨陰陽。體順天時。察其病理。七日以前。瘡勢未成者。當通竅。以汗發之。汗字徐勒七日已後。病勢已成。治當兼補。以托之。則毒不內攻。外無變症。如藥攻利太過。元氣受傷。毒多難出。又敷圍涼藥。氣血冰凝。則肌肉多死。反難腐潰。予

嘗治此。及諸發背。初起未成者。用披針當頂點入。知

痛處。出其惡血。通其瘡竅。隨插蟾酥條。直至瘡底。自未

成者以下三十字徐入批曰此必死之法誤盡蒼生其不死者亦必臥牀幾月服大補之藥而後得安

外用膏蓋。內服萬靈丹。或蟾酥丸。發其大汗。大汗二字徐入

批曰必至陽脫不救解散內蘊之毒。次日患上。或腫或不腫。或

痛或不痛。仍插仍貼。四字徐勒直至患頂腫高。根腳突起。

四圍裂縫有膿。方住插藥。輕淺者。九日後吐出病根。

堅硬不化之物。毒甚者。不能頓然脫落。亦可漸腐成

膿。為轉重就輕之良法。此句徐勒批曰轉輕為重則有之外用玉紅

膏長肉內服補托收斂之藥。不久自愈。如陽症輕淺者。候自腐潰。不用前法針刺。如不腫不疼。灸亦不痛。陰症。尤當速用。不必遲延。此爲移深居淺之大法也。徐曰。此篇泛論。乃通套之談。凡瘡皆如此。非獨腦也。其刺法則殺人之術矣。凡未成者之症。見血必危。此等議論。貽誤後人。死有餘辜。

腦疽看法

初起頂高根活。色紅皮薄。作疼掀熱。腫不開散者順。已成無論偏正。瘡形獻起。疼痛發熱。易膿易腐者順。已潰

膿稠。肉色紅活。瘀腐易脫。掀腫漸消。痛減者順。潰後腐脫。新肉便生。瘡口漸斂。結痂作癢者順。初生一點黃泡。或似疙瘩。不腫不疼。自不知覺者逆。已成不發高腫。亦不掀痛。瘡頂軟陷。根腳平散者逆。已潰膿清。肉色紫黑。外皮不腐。內生臭穢。不食者逆。腐肉雖盡。新肉不生。瘡口散大。軟陷無神。色敗者逆。

徐曰。此等看法。諸腫皆同。知其大意可耳。不必重出也。

腦疽治法

初起有頭。或無頭。大痛。或不痛。俱隔蒜灸。此句徐勒批曰頭不可灸
兼服解毒之藥。已成堅硬。發熱掀痛。口乾便秘者。邪在內也。宜泄之。堅腫不痛。發熱惡寒。頭疼。四肢拘急者。兼發表攻裏。腫硬日深。形色紫黑。外皮不腐。內膿不潰。宜行拔法。項強。頭面掀熱。口燥惡心嘔吐者。邪在上也。宜清之。掀熱腫痛。紅色光亮。疼苦有時。內膿脹痛者。急開之。將潰不潰。微熱微紅。不作腐潰者。脾胃虛也。宜補之。潰後腐肉不脫。膿水清稀。腫痛仍作者。當大養氣血。大便多澹。小便短濇。自汗食少。脈細身涼。當溫中健脾。

徐曰。法亦大同小異。

腦疽治驗

一男子生項疽十餘日。其勢頗甚。根連左右耳項並腫。

紅赤掀熱。脈浮而數。先用黃連消毒散二服。

徐曰苦寒禁用

以退大勢。根腳稍定。用托裏消毒散數服。尚不腐潰。

診其脈浮無力。詢知年過五旬。久艱嗣息。房中婢妾

多人。思慮勞慾太過。損傷元氣故也。瘡勢又大。故服

前藥。止能起發。不能培養為膿。更用十全大補湯加

桔梗白芷。倍人參白朮。以上十各三錢。外用桑木灸

法。以上四字徐勒早晚二次。又塗紫霞膏數日。病者頭面俱

腫。雙目合縫。徐曰此熱藥火灸之害形狀可畏。然後腐潰。膿出

日至數升。如此半月。因前藥尚不勝病。添出煩躁不

甯。五心煩熱。以上八字徐勒批飲食漸少等症。此乃

膿水出多。氣血走泄。致成虛火假症。隨用聖愈湯一

服。不應。此二字徐勒又進一服。加熟附子二錢。熟附子徐勒方

應。前症悉退。換用人參養榮湯。加麥冬五味。五味徐入參

朮。倍至三錢。調理月餘。腦骨腐肉連髮片片脫下。徐

此熱藥之故狀極狼狽。觀者無不驚訝。腐潰深大。尚恐藥

補不及。每日粥食中用人參三錢同煮食之。以接補

脾元。方得元氣漸醒。調理四月而愈。後一年生子。

徐曰。自己用藥大誤。以至幾死。直至毒隨腐盡。然

後蠻補得活。醫者反誇已功。病家亦信其有回天

之力。謬種相傳。害人不淺。此等醫案。可以垂戒。而

患者反奉為師法。殺人甯有量哉。

又曰。此篇乃其殺人供狀。其人不死。乃天幸耳。

一監生項瘡初起。瘡頭偏於右半。余謂不可輕視。必用

艾灸為上。徐曰不可灸隔蒜灸至十五壯。知痛乃住。彼視

為小恙。不服藥。又四日頸腫項強。紅紫木痛。徐曰火灸又害人

一便秘脈實有力。以內疎黃連湯加元明粉二錢。通

其大便。次用消毒救苦湯二服。腫勢仍甚。此內毒外

發。不可再消。換服托裏消毒散。延至二十日。因病者

肥甚。肉緊不能腐潰。余欲行針開放。此四字徐勒堅執不

肯。豈知變症一出。煩悶昏憤。人事不省。始用披針左

右二邊併項之中各開一竅。左右下十二字徐勒批曰可憐內有膿

腐處。翦割寸許頑肉。以上六字徐勒批曰自有腐肉之藥何必翦割必不得已略去

不痛之頑肉可也放出膿血碗餘。內服健脾胃養氣血托膿

補虛之藥。膿似泉流不歇。以上四字徐勒每朝夕藥與食中

共參六七錢。服至腐肉脫盡。新肉已生。又至四十日

外始漸甦。知人事。前此竟不知也。徐曰已半死去此症設禁

用刀針不加峻補。豈得生乎。幸其子在庠識道理。信

從余言。徐曰腐儒為爾所愚未百日而愈。

一男子患項瘡五六日。來就余視。頭便黃色。根亦平散。

余曰。此當急治。彼不悅而去。請他醫視之。曰小恙也。

因即用其藥。又至五日。外瘡勢堅硬。根腳開大。毒氣

已過兩肩。流注前項。胸乳皆腫。嘔吐惡心。寒熱不食。

始復請余治。已非藥力可及。乃用葱艾湯洗淨他醫之藥。連煮藥筒拔提二次。徐曰亦不可輕用以藥托為妙拔出瘀血碗餘。隨用銀針斜斜插入。透通患底數處。以蟾酥條插入孔內。解毒為膿。總以膏蓋。走散處則以真君妙貼散敷之。其毒漸漸收歸後項原處。又服內托降火化痰之藥。三四日大勢已退。內膿已通。換服十全大補湯。凡堅而不化者照之。腐而不痛者取之。新肉生遲者培之。將近三月始得完口平復。

一女人年過六旬。係宦族。素稟怯弱。項間患疽。初起頭

便如粟。所謂裏可容穀也。喜其形體不肥。徐曰學外科者須當知之雖發必易腐潰。先隔蒜灸之。徐曰亦不可灸次用蟾酥餅貼灸上四邊。以吸毒散敷之。使根腳不散。內服托裏消毒散數服。瘡勢堅硬。疼痛不止。余曰。到某日方止。今瘡不腐潰。脈細數無力。此內虛不能解毒為膿。以疼為要。豈可得止。徐曰凡瘡不疼者為惡症。疼則當止之。無令困乏。豈有聽其疼之理乎

次換益氣養榮湯。加角針。白芷三服。腫勢漸起。外用桑木灸法。腫漸軟。膿出不多。前方去角針。白芷。加香附。倍用參耆。又數服。方得膿潰。痛仍不止。徐曰無止痛之

藥所致。余曰：再三日午後可止。至期腐肉將脫，小半臨午用乳香定痛散一服，午後痛頓止，得安睡。其家喜悅。余曰：此在用藥適當其時，惟信余言則無失耳。後當某日腐盡，某日肌平，某日完口，其家以墨記之。果如期不爽。此法要在眼力精巧。徐曰：未見得害人，則有之耳。難易新腐遲速，用藥當否，乃能決期日耳。

一婦壯年患項瘡三日，徑對前口。其家以肥人生此為憂。余曰：頂高腳活不妨。彼欲內消，余曰：藥消則不能。針消則可。徐曰：用藥無害，針則有害。爾何曾有藥消之法。用披針當頂針入

六七分至軟肉方住。

以上十五字徐勒

隨去瘀血。

徐曰：未破之毒總不

宜見血見則生死不可必矣。

以蟾酥條插入孔內，得大汗。

徐曰：亦不宜。

次日瘡出微膿，漸消。

徐曰：此係淺毒，故能愈，否則已不救矣。

猶恐內毒

未盡，又用消毒清熱之藥數服，不出十日而安。

徐曰：僥倖

得生乃症本輕耳。

一男子耳後生疽十餘日，自謂小恙不治。將近半月，根

腳漸大，瘡頭惟流血水，稀惡汗穢，四邊紫黑。

徐曰：實是惡候。

不軟陷無膿，面慘鼻掀，手冷氣促，脈散大無根。余曰：治

此內敗症也，辭不用藥。另延他醫治之，曰無妨。病者

恨余不治。每見親友。必厲聲自言不死。余曰。後五日必死。果然。凡見此敗症。雖山岳之軀。無不傾倒。

一婦人患正對口四五日。自灸廿餘壯。此五字徐勒竟不知

痛。灸疤焦黑平塌。以上四字徐勒脈微數而無力。此內虛症

也。若假藥力。則致誤事。徐曰如何藥能用披針當瘡

頂刺入寸許。徐曰豈可深刺不死為幸不痛亦無血出。此毒滯而

未發。用蟾酥條插入針孔。每日一次。膏蓋其上下。七

日後。周圍裂縫出膿。內服純補之藥。至十四日。落出

瘡根一塊。如指大。長厚寸餘。徐曰此乃針傷之惡肉也方以玉紅

膏生肌。又半月。其口已平。糝以珍珠散。生皮而愈。此

症設不用針工。專假藥力攻托。雖不至死。豈能速愈。

徐曰專駁用藥豈非奇談足見此醫凡有用藥之處俱無效也

一婦人四旬肥甚。二字徐勒批曰大犯患項瘡五六日。肉腫瘡不

腫。五字徐勒批曰惡症堅硬色紫。根腳散平。兼口燥心煩。六脈

洪大。此太過症也。後必無膿。辭以不治。另延他醫。有

言外托者。有言內消者。有言年壯不妨。有言脈大易

治。紛紛不定。仍各用藥。又七八日。胸項俱腫。木悶堅

硬。徐曰此症未必不治。眾藥亂投。變此壞症。仍請余決之。余曰。此必不治。

初起肉腫瘡不腫一也。根腳平散真氣內敗不能收束毒氣二也。口燥心煩邪火內淫三也。形色紫暗血死毒滯不作腐潰四也。六脈洪大瘡毒大盛正氣受克無以抵當終變軟陷邪毒內攻五也。徐曰此皆不能言治之症人人者。能言二十七朝前後必死果然。

腦疽主治方

黃連救苦湯

黃連救苦葛升銀柴芎芎歸翹梗芩羌活防風共甘草腦疽煎服可安甯

治腦疽發鬢發頤及天行時毒初起憎寒壯熱頭面耳項俱腫服之未成者自消已成者自潰

黃連

升麻

葛根

柴胡

赤芍

川芎

歸尾

連翹

桔梗

黃芩

羌活

防風

金銀花

甘草節

各一錢

水二碗煎八分臨服入酒一杯食後服

徐曰此為寒散之劑藥味重複渾雜不成章法

又曰升提苦寒之藥宜審用上之病並非必用

升柴桔梗凡消火驅風之品皆能愈上焦之痰初

起禁用苦寒凡腫皆然即升燥之品亦禁用恐反

提火上升也總以辛涼滋潤為主則火散而毒自

解也。

又曰。丹皮犀角羚羊角枳殼天蟲元參土貝生地

蒼耳俱可擇用。別本有槐米而無枳殼

楣案以上諸條。徐氏蓋泛論治法。觀凡腫皆然一

語可見。腦疽有偏正陰陽之別。不獨苦寒當禁。卽

涼劑亦當審其非陰毒乃可用。

解毒天漿散

解毒天漿石決明 僵蠶山甲防風銀
甘草黃連花粉乳 翹羌歸尾大黃行

治腦疽積毒日深。堅腫木硬。口燥舌乾。惡心煩渴。六

脈沈實有力。大便閉結不通者。

石決明 生研

僵蠶

穿山甲 土炒

防風

連翹

羌活

乳香

甘草

金銀花

黃連

歸尾 各一錢

大黃 三錢

天花粉

新鮮未晒者四兩石

日內搗爛投水一碗攪勻絞去渣用

右花粉淨汁一碗半。同藥煎至八分。入酒一杯。空心

熱服。行過三次。方用飲食。忌食煎炒發物。

徐曰。此爲寒下之劑。亦雜而無法。天花粉乃陰寒

之藥。何得多用。此惡方也。

又曰。堅腫木硬。豈可用寒涼。

內托千金散 內托千金散芍者 白芷芍歸防桔隨 銀草參甘花粉桂 痛加乳沒不須疑

治腦疽發背諸毒惡瘡已成不消者服之易潰。

白芍 黃耆 川芎 當歸 防風

桔梗 天花粉 金銀花 人參 各一錢 肉桂

白芷 甘草 各五分 乳香 沒藥 二味痛甚加入

右水二碗煎八分臨服入酒一小杯食遠服。

徐曰方味亦雜。

又曰上焦之病不得輕用肉桂。

回毒銀花散 回毒銀花散最奇 癰疽陰毒總堪醫 借問君家何等藥 銀花甘草協黃耆

治腦疽及諸陰瘡不起色變紫黑者急服之。

金銀花 連枝葉 二兩 黃耆 四兩 生切 甘草 一兩 切

用紹酒二十兩同藥入小口砂罐內密封重湯內煮

三炷香為度取起濾清服之蓋暖患上其瘡漸漸高

腫此轉陰為陽吉矣後用托藥潰膿如服後不痛不

起瘡頭流出黑水此真陰症不治。

徐曰此藥酒方也血寒之症及冬日陰毒亦可備

用。

梅花五氣丹 梅花五氣丹輕粉 乳沒辰砂麝片酥 加上雄黃併血竭 托毒護心不可無

治腦疽發背諸般疔腫初起。寒熱交作。筋骨疼痛。有似傷風。惡心嘔吐。但未成膿者。

梅花冰片五分 當門麝香五分 輕粉 辰砂各六分

乳香 沒藥 血竭 明雄黃各一錢

真蟾酥 預於端午前尋之。至午日取酥二錢。用頭胎男乳調膏。

右前藥各研極細。對準分數。於端午日辰時製度。候至午時。將上藥丸味和入蟾酥膏內。向日丸之。如茄子大。一時內晒乾。用川椒二十七粒。燈心二十七段。同藥收於瓷罐內。養之。以蠟封口。不泄藥氣為妙。凡

遇惡瘡大毒。開器取出一枚。先用美饌食飽。次用無根水漱淨口內。再含水一口。少頃待溫。用葱白五寸。同水嚼爛。嚥下。隨將藥餅安放舌下。睡於暖處。以被覆蓋。藥化苦水。徐徐嚥之。瘡勢大者。二三餅亦可。藥盡。其汗即到如淋。諸病若失。如冬月天寒難汗。噙後將葱白湯催之。亦妙。凡治無有不效。如暗疔。人所不知覺。及知覺而失治者。毒氣入裏。人便昏沈。一中便倒。不能依法服藥。急用連鬚葱白七個。煎酒一盃。研藥五餅灌下。藥氣到心。其功如湯潑雪。患者即便甦。

醒。此為外科第一奇方也。

徐曰。此俗所謂梅花點舌丹也。為托毒護心之藥。

小保安湯

小保安湯歸藿苓
人參甘桔兼芎朮
黃耆半夏麥冬陳
薑棗同煎效若神

治腦疽諸發已潰流膿服之庶不更變。

當歸 茯苓 川芎 黃耆 麥冬

陳皮 桔梗 人參 白朮 半夏

甘草 藿香 各五分

薑三片。棗二枚。水二茶鍾煎八分。食遠服。

徐曰。此法重出。

大保安湯

大保安湯朮附歸
黃耆山藥門冬草
參苓芎芍桂丹皮
五味山萸熟地宜

治腦項諸發癰疽惡瘡大毒已潰之後膿水出多氣

血虛弱精神短少飲食少思坐臥不甯煩躁不眠晝

則安靜夜則發熱及虛陽煩渴等症。

白朮 當歸 人參 茯苓 川芎

白芍 山萸肉 黃耆 山藥 丹皮

熟地黃 五味子 肉桂 甘草

麥冬 熟附子 各五分

煨薑三片。大棗二枚。蓮肉七粒。水煎食前後服。

徐曰。此亦蠻補之方。無意義。

陽春酒

一盞陽春酒孰知人參柏子當歸遠

天冬杞朮地黃宜百補方中此最奇

治腦疽諸發已潰流膿腐盡時脾胃虛弱肌肉生遲。或氣血原不足。以致肉色淡白。不能長發收斂。宜服此酒。生長肌肉。強健脾胃。美悅顏色。滋潤皮膚。凡大瘡後飲此。不惟卻病。亦且延壽。

人參

片切

白朮

熟地黃

各五錢

歸身

片切

天門冬

枸杞子

各三錢

柏子仁

遠志

各二錢五

右藥用絹袋寬貯。以無灰好酒五斤。磁罐內浸至

一伏時。每早午晚各飲一杯。熱服。如夏月天炎易壞。不堪久服。將藥分作五分。每次用酒一斤。隨便浸服。亦效。如酒將完。藥尚有味。再添酒浸飲一次。已後藥淡無味。不必再浸。

徐曰。亦是通治之方。無意義。

桑木灸法

治諸瘡毒堅而不潰。潰而不腐。新肉不生。疼痛不止。用新桑木長七寸。劈指大。一頭燃着。向患上灸之。火盡再換。每次灸木五六條。肉腐為度。

徐曰。此神燈照之變法。

神妙拔根方

此五字
徐又

治腦疽發背陰症初起。不腫高。不掀熱。灸不疼。其病將來難治。必致壞人。十日以前。用披針當頂插入。知痛處方止。隨用蟾酥條插至孔底。用披針以下十七字徐勒每日二條。膏蓋三日後。加添插藥。其根高腫作疼。加添以下十字徐勒外用神燈照法。助陰爲陽。插照七日。其瘡裂縫流膿。至十三日。其根自脫。如日多根深蒂固。不能脫者。披針取之。內用玉紅膏。不脫者自脫。不斂者自斂。此

法百人百活。再無不愈者。

徐曰。用此法者。我目中已見殺數十人矣。卽真陰症亦不宜用。況陰症千不得一。非平塌卽爲陰症也。

又曰。凡瘡未成者。一見血。則毒走肌傷。輕者變重。重者必死。況又插入藥條。以致痛極腐爛。斷無消理。此等惡法。害人不淺。然此原云陰症當用此法。乃近人無知。不論陰症陽症。輕病重病。皆用此法。殺人無算。間有愈者。皆痛苦哀號。死裏逃生。乃皆

奉爲金科玉律。舉世皆然。無人救正。豈不傷心。楣案徐氏痛駁拔法。垂戒切至。學外科者當奉爲金科玉律。至謂眞陰症千不得一。非平塌卽爲陰症。此二句須仔細體會。修煉家言分陰未絕則不仙。分陽未絕則不死。癰疽亦然。疽雖陰毒。亦須內有陽氣。方可施補托之法。俾令高腫潰膿。眞陰症陽氣已燼。乃必死之症。故曰千不得一。非謂患疽者皆屬陽症也。合非平塌卽爲陰症句觀之。可見平塌多陰症。特恐人一見平塌。便認爲陰症。以致法當廢而不用也。

誤治。故爲揭出耳。原徐氏本意。蓋甚言拔法之不可用。惟可施諸眞陰症。而眞陰症千不得一。則此法當廢而不用也。又案腦疽之偏者。陰毒居多。初起惟犀黃丸能消之。已成平塌不疼。神思昏倦。非陽和湯不可。潰後宜貼陽和解凝膏。但犀黃丸價貴。貧人無力服。陽和湯熟地黃分兩極重。醫者不敢用。病者不敢服耳。然服此二藥而愈者。余所見非一人。故附著之。其有平塌而非陰症。如徐氏所云者。則在乎醫之

臨時識症矣。

腦疽應用方

隔蒜灸法

拔筒法

琥珀蠟礬丸

太乙膏

真君妙貼散

護心散

方俱見腫瘍門

蟾酥丸

蟾酥條

俱見疔瘡門

十全大補湯

人參養榮湯

乳香定痛散

聖愈湯

方俱見潰瘍門

楣案隔蒜灸法。蟾酥條徐勒。琥珀蠟礬丸。真君妙

貼散。護心散。乳香定痛散。徐圈。

外科正宗卷三終

外科正宗卷四

海甯許 楣辛木訂

明崇川陳實功著

吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光焞寅昉校

發背論第二十三

發背有五。一曰陽毒。先因風熱。或患熱毒消渴。或先患

傷寒。餘毒蓄積於背脊脊之間。不拘椎數。但從兩夾

脊起。滿背掀熱赤紫。或紅色如燄。膿毒難成。成後痛

不除。數日之間。忽然平塌。味者誤謂腫消。殊不知此

是內攻肉陷不可復藥矣。

此二句徐園批曰此乃始時高腫以後忽平故為險

惡若本不起發雖屬虛症反可施治

二日陰毒乃氣冷而作初如黍米

隱隱而痛直應前心頭日昏重寒熱如瘧五七日後

始覺攻腫膿毒深沈遲緩未透急宜以補氣湯藥內

托。此句徐園

外以抽膿藥貼之三日服金石燒煉藥毒初

起如丹癰之狀絜絜漸開如湯火所傷面色如硃心

膈煩躁多渴嗜冷。

此句徐園

其瘡難起起則驚人尤甚於

陰陽二毒但根柢分明須以解金石毒湯散急治其

內方保無虞四日酒食毒乃平時或飢或因飽食即

睡。或多食酒食冷熱黏滑肥鮮油膩之類積於臟腑。

兼之不慎幃幕恣意當風脾臟氣虛不能承受乃毒

發於背。

徐曰此所謂膏梁之變足生大疔者也

不問椎數初起頭如小

彈子後大如拳其堅如石痛連四肢加之拘急口苦

舌乾腹急便澀十數日後頭面手足浮腫臟腑滑泄

急痛如利是其候也初腫時急用收腫發穴潰膿湯

藥內實臟腑外泄膿水治之遲緩潰腐愈甚傷骨爛

筋復感外邪而致內敗死矣五日冒山嵐瘴氣毒其

人素歷瘴鄉觸冒嵐瘴蓄諸臟腑久而不發至氣血

衰弱及斲喪虧損之時。而後發露。初起腫色青黑。形如靴皮。附筋徹骨。頑如木石。引手加深。方覺痛處。至五七日。毒氣浮淺。腫高。色變青白。有如拳打之狀。寒戰似瘧。頭痛口歪。又若有風。手足厥逆。眼黑睛小。白多。此因內有邪氣相搏。急宜破清血三五升。方有黃白膿出。然其皮猶腫痛不止。直至青白之色退盡。方愈。此宜急急追趕膿毒出外。方爲無害。否則未有不瀕於危者也。

楣案發背乃大症。而原本無總論。但有治驗各條。列於卷二腫瘍治法之後。而統名之曰癰疽治驗。殊爲闕略失次。今取徐批瘍科選粹中發背論補于治驗之前。并載徐批。而移在腦疽之後。庶幾以類相從。其方藥原本不別出。散見於腫潰瘍諸方及腦疽門。並非專治背疽之方。故仍其舊。

發背治驗

一男子年五十餘。背心生疽十三日矣。湯水不入。煩悶不語。背堅硬如負石。皮色亦紫。瘡勢雖重。喜其根腳交會明白。毒尚結局於此。未經入內。須行拔法。使毒

氣外發。不致內攻。隨煮藥筒。提拔二次。去惡血碗許。

徐曰。最忌出血。又脈實便閉。用內疎黃連湯。及豬膽導法。徐曰。

何必。大便通利二次。使內外毒氣皆得通泄。夜卧即安。

背重。失其大半。次用托裏排膿之藥。外以桑木灸法。

腫硬漸腐。膿毒漸出。換服十全大補湯。加麥冬五味。

數服。腐肉自脫。飲食漸進。瘡口漸合。調理兩月餘而

愈。

一老婦年近七旬。背瘡已過半月。形勢可畏。其家已置

不治。整備後事。適余往看童稚瘡症。見而問之。咸言

待斃旦夕。余強請觀。半背皆腫。瘡雖不高。亦不內陷。

以手按之。外實而內腐。老年內虛。膿毒中隔。不得外

發。故也。雖飲食不進。且喜根腳兩無混雜。臟腑各無

敗色。治之可生。其家堅執不信。且言籤龜命卜。俱斷

必死。余歎曰。再三四日不治。內膜穿潰。此命死於無

辜矣。次日。余自往謂曰。余非相強。實見其可生。不忍

聽其死耳。藥金分毫不取。愈後任從酬謝。何如其家

首肯。乃先用葱艾湯淋洗。外面俱是不腐頑肉。隨用

披針利翦。取去正中二寸頑肉。放通膿管。以手輕重

之間。捺淨內蓄膿血。約有三碗。旁觀無不失色。膿血稍盡。仍換前湯洗淨。用膏封貼。內用回元大成湯二服。徐日膿已出可用以接補真氣。後用人參養榮湯倍參朮。加香附。早以八味丸。入味丸徐勒八仙餅相兼調理。使其脾健食進。腐脫肌生。此婦亦謹慎調理。並未更變。不出百日。瘡愈身健。始信余言不謬也。

一監生年過五旬。素有渴症。體又極肥。生背疽約有尺許。至十二朝後請治。視其形勢微腫。色淡微紅。根腳半收半散。此陰陽相等之症也。肥人內虛。瘡勢又大。

非補托。瘡必難起。毒必易陷。誠恐緩不及事。便以托裏散固其內。候至十五日。外用披針小小從頂放通三孔。緣勢大不可過放。走泄元氣。致膿難成。但令有路可出而已。內用參耆內托散。倍加人參黃耆各三錢。服至二十日。大膿將發。日至升許。早以參朮膏。午用十全湯。加參耆各四錢。麥冬五味子各一錢。徐日用五味子不通。所以毒氣收住而難愈也。服至月餘。肉腐通潰。膿似湧泉。間用聖愈湯。兼之八仙餅調理。保助脾胃。增進飲食。尚恐前藥不能勝病。加熟附一錢。脾健膿稠。色黃而正。

四十日外。瘡勢方得微退。時值仲夏酷熱。病者生煩。誤飲冷水二碗。瘡隨下陷。不痛無膿。身涼脈細。腹痛足冷。變為陰症。非辛熱不能回陽。急用十二味異功散。倍人參熟附各三錢。不應。徐曰用人參則寒氣不出矣。換用生附人參各五錢。人參五錢。徐曰。早晚二服。方得身溫脈起。瘡高復痛。又二服。膿似前流。徐曰此藥力做成之膿也。出至一月。約有百餘碗。竟不減少。外皮紅退。亦不腐爛。徐曰此乃大凡非反對之藥。原不能殺。此肥人外實內虛。故皮人只是病勢更大。不能愈耳。不腐而內潰也。又用玉紅膏。搽於棉花片上。推入瘡

內。膏蓋之。內腐漸脫。漸出。又十日後。出大腐一塊。約有六兩。自後腫消。身便。膿少肌生。百日外。方得平復。人參服過五斤外。人參五斤。外徐曰。附子亦用十兩餘。此句徐勒。方得全安。此症設用解毒傷脾宣利等藥。徐曰原不可用何勞。得說不用辛熱峻補。豈有生理。

一鄉官年踰七旬。背瘡已經八日。形雖微腫。色淡不紅。勢若龜形。根漫不聳。乃老年氣血衰弱之故。診其脈帶微數而有力。此根本未撥。雖老可治。隨用排膿內托散加阜刺。以潰膿托裏。服至十三日後。瘡漸高腫。

色亦漸赤。但不能潰膿。此食少脾弱。未能培養之故也。又用十全大補湯數服。徐曰：總不膿始漸出，不能快利，乃內膜中隔不通故也。不可畏其老而致誤事。隨用披針。徐曰：不可當頭取開寸許，捺通膿管，膿果隨出。以豬蹄湯洗淨膏蓋，復用照藥。每日一次。外肉亦腐為膿。病者形色枯槁，更用人參養榮湯倍加參耆。徐曰：亦托裏腐肉將脫者取之。新肉欲生者培之。但老年氣血衰，不能速效。又加服參朮膏。早晚二次。新肉方生。飲食頓倍。調理七十餘日而安。

一庠生年六十餘。患背疽已十日外。其形堅硬。色亦深

紫。頭髮甚多。含若螺子。豎長尺餘。根橫半背。喜其高

腫光亮。發熱掀痛。脈洪數有力。此膏梁醇酒溼熱交

蒸之故。雖重不妨。隨用照藥三條。相繼照畢。其內含

螺子。盡欲吐出。即用抵腳刮去。流出惡血鍾許。徐曰：總不

宜刮葱湯洗淨。搽上腐藥。用紙蓋貼。周圍根腳以吸

毒散敷之。收其毒氣。使不開大。次日仍照仍敷。三日

後。外肉漸腐。內服托藥。培助脾胃。解毒為膿。早服八

味丸。徐曰：不切以滋腎水。徐曰：亂道換洗蹄湯。仍將膏貼。候至

腐盡其深寸餘。隨用紅膏日漸生長。但此公好飲。雖病不戒。兩月後。新肉雖平。嬌嫩不能結皮。完口復將浮嫩之肉盡行翦去。以上十字徐入批曰此等法膏出於何典其人不死幸也貼數日肉平。復糝珍珠散數次。方結皮。蓋八十日而安。

一老年人患疽半月。其瘡貫脊。徧背皆腫。上至肩膊。下至腰脅。腫若瓜形。頭計數百。其家以爲不治。余診其脈微洪而不鼓。瘡形腫掀外發。飲食知味。年雖老而根本尚有餘也。先用托裏消毒散二服。其勢稍定。外

用桑木灸法。助其腐潰。根以鐵桶膏箍之。更服排膿內托散。正膿漸出。但老年氣血不充。外肉不易就腐。視其肉色變而不腐者。用針鉤利翦徐徐翦去。約四寸餘長。見紅肉。便用膏塗。新肉已生。將半時。值隆冬。其家自行開看。房中不著炭火。兼蓋護未暖。致被寒侵。瘡色淡白。膿亦清稀。飲食減少。氣體不舒。幸其瘡本屬陽症。隨用濃葱湯乘暖淋洗。將紅膏烘化。搽上。外用膏貼。以熟綿軟絹覆疊數層。綳蓋甚密。內用神功托裏散。早晚連進二服。次早復看。其瘡自回陽矣。

徐曰不蠻用參朮故易愈

以後遵法調理百日而安

一老人年過六旬患背疽十二日矣其形半腫半紅微

疼微熱發於背心之下腎俞之上高低平等廣開八

寸根腳泛腫色若水噴徐曰色若水噴最為壞症頂軟無神似腐

非腐脈浮而大重按則虛余曰此瘡易於腫潰而難

於收斂不可治也其家笑而不信復請里中老醫視

之見病者起居平和言語清利舉動如常飲食有味

以為五善俱具安若泰山其家亦喜隨用其藥日漸

有功膿潰腫退徐曰此腐盡肌生余謂其親族曰此

即陷也

病必死於收口至錢大時也眾皆不信果至口如錢

大時變症一出不四朝而死始以余言為神

一男子六旬有二發右搭手余用艾灸形勢漸高腫堅

硬不痛半月後尚未潰膿日生煩悶恐其毒陷先用

針通隨行拔法拔出惡血鍾許此六字徐勒稍得輕便日

搽化腐之藥膏蓋三日後瘡漸腐潰至二十日出正

膿壞肉漸脫新肉漸生外治之法盡矣其家與一內

科醫甚密請其開方不遵外科補托之法補托二字徐圈失

於峻補此四字徐勒又曰峻補必兼托毒亦不全在參附語終有弊每日人參不

過二錢。余曰：不及。當用五錢。兼熟附二錢。不然必變。其家與內科醫俱不信。後果肉色淡白。瘡口散大。膿水清稀。飲食減少。敗症具矣。雖強投溫中健脾大補之藥。終至形體消削。膿水臭穢。延至六十日。瀝盡氣血而亡。悔已無及。凡大瘡每日膿出一碗。用參必至三錢。以此爲則。此人日出膿三碗。用參二錢。謂之大損小補。安得不死。又外科乃破漏之病。最能走泄真氣。如損補兩不相敵。無以抵當。多致不救。徐曰：此說亦足然。補法亦儘多。此人不信補而自取敗亡。惜哉。徐曰：參固可用。若貧人亦有變。

通之法

一男子年近六旬。其孫患瘡。邀余往視。彼坐於堂。時值仲夏。余見其背生熱癩。凡二十餘。內有一瘡甚小。余謂曰：此非癩。比其毒甚大。一發卽不可治。彼笑而答曰：固無恙也。及送至門。余又謂曰：可急請他醫視之。彼仍不信。至十日。形勢稍發。命里中一醫視之。曰：癩也。又十日。形勢內陷。敗症齊出。始信前言。央親友邀余往視。彼卧於堂。帛覆瘡上。余登堂未數步。卽退。親友問故。余曰：敗氣滿前。死期速矣。何必再視。急備後

事更七日死。果如期不爽。

疔瘡論二十四

夫疔瘡者。乃外科迅速之病也。有朝發夕死。隨發隨死。有三日五日而不死。一月半月而終死。此在於毒中之淺深。各隨臟腑而見症。有曰火燄疔。其患多生唇口手掌指節間。初生一點紅黃小泡。抓動癢痛非常。左右肢體麻木。重則寒熱交作。頭暈眼花。心煩發躁。言語昏憤。此出於心經之病也。有曰紫燕疔。其患多生手足腰脇筋骨之間。初生便作紫泡。次日破流血。

水。三日後串筋爛骨。疼痛苦楚。重則眼紅目眩。指甲純青。舌強神昏。睡語驚惕。此出於肝經之病也。有曰黃鼓疔。初生黃泡。光亮明潤。四邊紅色纏繞。多生口角腮顴眼胞上下。及太陽正面之處。發之便作麻癢。綳急硬強。重則惡心嘔吐。肢體木痛。寒熱交作。煩渴乾噦。此出於脾經之病也。有曰白刃疔。初生白泡。頂硬根突。破流脂水。驟然癢痛。易腐易陷。重則腮損咽焦。毛聳肌熱。咳吐膿痰。鼻掀氣急。此出於肺經之病也。有曰黑靨疔。其患多生耳竅胸腹腰腎偏僻軟肉。

之間初生黑斑紫泡毒串皮膚漸攻肌肉頑硬如釘。痛徹骨髓重則手足青紫驚悸沈困軟陷孔深目睛透露此出於腎經之病也。以上五疔內應五臟又紅絲疔起於手掌節間初起形似小瘡漸發紅絲上攻手膊令人多作寒熱甚者惡心嘔吐遲治則紅絲至心常能壞人用針於紅絲盡處挑斷出血。此十一尋字徐圈至初起瘡上挑破俱用蟾酥條插入膏蓋。蟾酥條徐勒批日點拔毒藥為妙內服汗藥散之自愈凡治此症貴在乎早。此句徐初起即治者十全十活稍遲者十全五六失治者

十全一二初起項以上者三陽受毒必用披針刺入

瘡心四五分。徐曰必用金針挑斷疔根令出惡血隨

用回疔丹或蟾酥條插入孔內膏蓋之如項以下者

三陰受毒即當艾灸。此句灸之不痛亦須針刺插藥

方效隨後俱用蟾酥丸冬月萬靈丹發其大汗。二字徐勒

批曰發汗總不宜太過毒方得解不致稽留毒氣致生變症今

人治法不論陰陽表裏部位上下凡見是瘡便加艾

灸殊不知頭乃諸陽之首亢陽熱極所致其形雖小

其惡甚大再加艾灸火益其勢逼毒內攻反為倒陷

走黃之症作矣。既作之後。頭面耳項。俱能發腫。形如尸胖。七惡頓起。治雖有法。百中難保一二。外又有疔名數種。形狀紛紛。有舊說未及重錄。

徐曰。此篇皆是古人舊說。不可不知。但疔不可灸。以其全屬火也。

楣案徐言疔不可灸。全生集言疔藥不可用酒。皆古人未發之論。凡藥不忌酒煎。而疔獨忌之者。疔善走黃也。

疔瘡看法

初起如疥形。如粉刺。或小泡。或疙瘩。結腫不散者。順。瘡腫不作寒熱。亦不惡心。飲食有味。手足溫暖者。順。瘡腫肉不腫。四圍白色。多痛少癢。作膿者。順。已潰出膿。瘡仍高腫。肉色鮮明。根內紅活。漸平者。順。初起似疔。非疔。軟慢灰色。四邊瘡根平塌。漫腫者。凶。未發前。先作寒熱。如瘡。惡心不食。後出瘡。如蚊跡。蚤斑。或青紫黑泡。軟陷無根。腐爛深孔。氣麤足冷者。逆。瘡形似魚臍。頂凹灰白。軟漫相兼。脈細身冷者。多逆。肉腫瘡不腫。根腳走散。瘡頂空腐。血水氣穢者。死。凡疔。項以上。針刺不疼。項以下。灸

之不痛。俱死。已經走散。頭面耳項俱腫。煩躁脈細。痰動喘急者死。日久原瘡無跡。走散之處。仍復作膿。脈數唇焦。終死。病雖險惡。歲運順者可活。瘡雖微險。歲運逆者當危。

徐曰。大段與諸症同。
楣案徐批有附錄繡波公一條云。疔瘡全看部位。如部位不佳者。甚為難治。余觀其毒將走之症。用針破其四圍。插入拔疔之藥。其浮腫處。用針鑱之。出其惡血。此法甚妙。

又案他書載疔形闊如韭菜。長可寸餘。肉色紫黑者。忌行針刺。

疔瘡治法

初生在項以上者。必先針刺。

徐曰亦宜斟酌

以去惡血。庶毒不

內攻。在項以下者。必先艾灸。

此四字徐入

以殺其勢。庶不侵

良肉。發熱惡寒。身體拘急。六脈緊數。邪在表也。宜汗散之。身體發熱。口燥咽乾。脈實有力。二便秘澀者。宜下之。針刺之後。瘡不作腐。邊腫不消。仍加插藥。二字徐入內用補托。初起悞灸。致毒走黃。不住者。急當隨走處。砭去惡血。

四字發熱乾嘔心煩作渴悶亂神昏當解毒清心托裏

護膜此二句潰後氣血受傷神怯食少睡臥不甯宜助

脾胃斂神氣將愈後氣血漸復飲食當進仍作渴者急

滋養腎水徐曰宜更清

心胃之火

一監生右顴下生疔三日形如魚目麻癢不常此肺經

受毒也用針刺入四五分此句徐勒其硬如骨有聲

隨用蟾酥條插至三日猶不腐化徐曰肉已變此堅

頑結聚之病也非此藥所能勝徐曰為換用三品一

條槍插至七日以上九字徐入批曰好外用紙封蓋

至十一日脫出疔根一塊約有指許徐曰皆好肉以

長肉玉紅膏搽之先服托裏消毒散加金銀花二錢

白芷五分脫後用八珍湯加天花粉麥門冬黃耆陳

皮各一錢調理月餘肉已平用珍珠散糝上結皮而

愈

徐曰此等治法真所謂將好肉做瘡弄成大症以

見已功恐醫者亦未必知其害人也其傳授如此

耳

一監生中年縱欲。自服補腎助陽之藥。以致腎水受傷。

以上四字徐不能上制心火。左顴生一泡。先紫後黑。

圖批日是麻木不知痛癢。黑屬腎經。其毒不淺。幸四邊尚未走。

散。即用針刺。此二字徐勒以冰蠶散厚糊作條。插入患孔。

以上入字徐勒批曰仍用紙封。勿令泄氣。朝服加

減八味丸以滋腎水。八味丸徐勒批曰午服益氣養

榮湯。接補真氣。晚用琥珀蠶礬丸。護心解毒。至十一

日外。疔根與藥結成一塊。以上入字徐勒批曰凡依

期脫落。乃用生肌斂口補助調理脾胃之藥。二十日

而愈。後因不慎保養。幾及三年。復成勞瘵而歿。徐曰

仍在自然致死

一婦年近四旬。與夫不相得。懷抱鬱鬱。季夏腮發一疔。

六日後方延余治。毒已走散。頭目脣項俱腫。形色紫

赤。余曰。肉腫瘡不腫。業已走黃。不治之症。徐曰亦非

以下治法幸而生耳。婦流涕歎曰。一家皆絕也。余問其故。婦曰。

吾夫不肖。有一女二子。尙未婚嫁。我死而托命於夫。

必致流蕩。故我死則家絕矣。余聞其言。不忍棄而不

治。但瘡勢既大。非藥力可回。因先僱一貧人與飯喫。

飽再飲火酒數杯。隨用針刺腫上十餘處。以上七字徐勒令

其吸出惡血數碗。以上四字徐勒批曰自有散毒之方何必出血以空營氣又曰果有

可生之理溫湯洗淨。用蟾酥錠磨濃塗之。四圍敷金

黃散。早晚二次。內以護心散蠟礬丸清心護裏。兼服

降火化痰開鬱安神之藥。餘腫稍退。又六日。其夫言

何以不死。婦聞暴怒。腫甚於前。復用針刺約十餘處。

出血三四碗。以上十三字徐勒針孔上蓋小膏。餘腫

仍用敷藥。出血既多。其內必虛。服人參養榮湯。徐勒日

多不得加香附貝母。數日後。針口漸膿。餘腫漸消。其

不然瘡頭乃得高腫。仍用蟾酥條插化腐潰。蟾酥條外用

生肌斂口之藥。內服開鬱和中養血健脾之劑。百日

外方愈。此瘡勉強治之得生。其後二子一女俱婚配。

夫先故。婦今六十五歲矣。

一婦二十二歲。右耳垂向前一寸。生疔二日。請余視之。

約有豆大。頂陷色灰。此肺經白刃疔也。又根腳綿軟。

毒不結聚。為陷伏陰症。未及針刺。徐勒曰若針其舅曰。

何恙也。余直告曰。疔瘡彼冷笑不信。余因辭不用藥。

復請他醫視之。日不過風熱疔瘡耳。用消風散藥二

服毒氣全收昏憤喘急而死。

一少婦顙下生疔。疙瘩作癢。予欲針之。此四字徐勒批。日針亦死。其

家不信。自用灸法。次日四邊漸腫。瘡漸陷。此二句徐勒批。日灸

之害如此。又三日。頭面大腫。復請余視。灸處已結黑靨。乾

陷無膿。此毒氣內陷。外肉已死。又面目浮腫。光亮發

熱。形狀不堪。此正氣衰而邪氣實也。治必不效。其家

悔之無及。後半月而死。

疔瘡主治方

蟾酥丸

蟾酥丸用有奇功。銅綠蟾酥寒水石。

乳沒砂礬輕粉同。蝸牛原麝共蜈蚣。

治疔瘡發背。腦疽。乳癰。附骨。臀腿等疽。一切惡症。疔瘡不痛。或麻木。或嘔吐。病重者必多昏憤。此藥服之。不起發者。即發。不痛者。即痛。痛甚者。即止。昏憤者。即甦。嘔吐者。即解。未成者。即消。已成者。即潰。真有回生之功。乃惡症中至寶丹也。

蟾酥 二錢 輕粉 五分 酒化 枯礬 寒水石 煨

銅綠 乳香 沒藥 膽礬 麝香 各一

錢 雄黃 二錢 蝸牛 二十箇 硃砂 三錢

以上各為末。稱準。於端午日午時。在淨室中。先將蝸

牛研爛。再同蟾酥和研稠黏。方入各藥。共搗極勻。丸如菉豆大。每服三丸。用葱白五寸。患者自嚼爛。吐於男左女右手心。包藥在內。用無灰熱酒一茶鍾送下。被蓋。約人行五六里許。出汗爲效。甚者再進一服。修合時。婦人雞犬等忌見。

徐曰。此護心定痛之方。有狗寶丸。此等方可不合。相案。蟾酥。膽礬。蝸牛。三味。徐圈。方中無蜈蚣。而歌訣有之。

黃連解毒湯

黃連解毒湯黃連連翹甘草牛蒡子

黃柏黃芩山梔兼口乾內熱卽時捐

治疔毒入心。內熱口乾。煩悶恍惚。脈實者。

黃連

黃芩

黃柏

山梔

連翹

甘草

牛蒡子

各等分

水二茶鍾。燈心二十根。煎八分。不拘時服。

徐曰。一味寒涼。亦宜酌用。

楣案全生集有奪命湯。爲疔毒主方。余初疑其家傳祖方。後得鈔本仙傳。治疔方有之。乃知其古方也。方用羌活。獨活。防風。青皮。黃連。赤芍。藥細。辛甘。草。蟬蛻。僵蠶。草。河車。澤蘭。金銀花。各等分。鈔本防

風青皮分兩稍重。云初起急服此方。能內消也。余曾見將走黃者服之亦效。

立馬回疔丹 立馬回疔丹輕粉 雄乳硃砂金頂等 蟾硃蜈蚣麝白丁香 化疔恰似雪投湯

治疗瘡初起已用針刺後。又或候灸失治。以致疔毒走散不住。乃走黃險惡症也。急用此插。

蟾酥 酒化 硃砂 輕粉 白丁香 各一錢

蜈蚣 一條 雄黃 硃砂 各二錢 乳香 六分

麝香 一分 金頂砒 五分製法詳末卷

共為細末糊成麥子大。凡遇疔瘡針破。用此一粒插

入孔內膏蓋之。追出膿血疔根為效。

徐曰。疔有毒肉。必用此拔出。降藥亦能拔疔。

又曰總屬剛燥之藥。不宜輕用。

又曰蟾酥乃點頭必用之藥。

又曰代針丹有血竭礪砂冰片。

疔毒復生湯 疔毒復生湯牡蠣 乳沒山梔與木通 花粉連翹黃阜刺 銀花牛蒡骨皮同

治疗毒走黃頭面發腫毒氣內攻煩悶欲死者。

牡蠣 山梔 金銀花 木通 連翹

牛蒡子 乳香 沒藥 角刺 花粉

大黃 地骨皮 各八分

水酒各一茶鍾煎一半食遠服不能飲者水煎臨服入酒一杯和服亦效脈實便秘者加朴硝

徐曰此表裏兩解之方實火宜用

七星劍 疥瘡最怕七星劍 野菊河車與蒂丁 蒼耳麻黃豨薟草 如入半枝蓮有靈

治十三種疥瘡初起憎寒作熱惡心嘔吐肢體麻木痛癢非常心煩作躁甚者昏憤急宜服之

野菊 嫩頭 蒼耳頭 豨薟草 半枝蓮

蒂丁草 麻黃 一錢 草河車 二錢

用好酒一斤煎至一碗濾清熱服被蓋出汗為度冬月無鮮草宜預採陰乾臨時煎服之亦效

徐曰此所謂草頭方也

鉛粉散 鉛粉散治冷疥瘡 輕粉黑鉛澄黑粉 黃丹松脂及麝香 諸般陰爛可回陽

治冷疥生於腳上初起紫白泡疼痛徹骨漸至腐爛深孔紫黑血水氣穢經久不瘥用此大效

黑鉛 四兩鐵杓化開傾入水中取起再化如 此百遍以鉛盡為度取水澄下者三錢

松脂 一錢 黃丹 飛炒五分 麝香 一分 輕粉 五分

共研先用葱湯洗淨麻油調塗瘡口油紙蓋外

徐曰。此治溼毒之症。下體廉瘡最宜。

化疗內消散

化疗內消散山甲
甘草白芨乳河車

知母天花粉阜角
半夏銀花赤芍藥

治疗瘡初起。或已針已灸之後。服之能令內消。

阜角針 金銀花 知母 貝母 天花粉

穿山甲 白芨 乳香 赤芍 半夏

甘草 草河車 各一錢

水酒各一茶鍾。煎一半。量病上下。食前後服之。

徐曰亦通治之方。重出。

楣案天花粉徐勒。

束毒金箍散

束毒金箍散白芨
黃柏鬱金輕豆粉

白芨白芷生大黃
敷圍諸毒不開張

治疗瘡針刺之後。餘毒走散。作腫宜此藥箍之。

鬱金 蟬肚者 白芨 白薇 白芷 大黃 各四

兩 黃柏 二兩 輕粉 五錢 菘豆粉 一兩

共為細末。酸米漿調箍四邊。夏熱甚者。蜜水調。

徐曰。即圍藥意義。

解毒大青湯

解毒大青湯知母
人黃人糞麻梔桔

元參麥冬生石膏
大黃木通二便調

治疗瘡候灸。逼毒入裏。致生煩躁。譫語不定者。

元參 桔梗 知母 大青葉 升麻

石膏 山柘 人中黃 麥門冬 木通 各一

錢 大黃 便秘加 燒人糞

水二茶鍾。淡竹葉燈心各二十件。食遠服。

相案人中黃燒人糞徐俱批不入藥。陸君以括謂

人糞入藥。具載他書。功效甚著。王君士雄謂不入

藥者。不入煎劑也。以其穢惡耳。如遇火盛毒重之

證。改用陳年糞清。澄澈無穢氣者。頗有殊功。醫者

不可不知也。

消疔簡便方 消疔簡便藥二般 葱白七莖和白礬 每服三錢溫酒下 如湯潑雪勝靈丹

治疔瘡及諸惡毒初起。但未成膿者。

白礬末 三錢 葱白 七莖

右二味。同搗極爛。分作七塊。每塊用熱酒一杯送下。

服畢。用厚被蓋之。再喫葱白湯一鍾。少頃。汗出如淋。

從容去其覆物。其痛苦脫。此雖味澀難服。其效更妙。

凡居鄉村之處。倘有緊病不及請醫。只傳此方服之。

活人甚眾。誠為良便方也。

太乙紫金丹 太乙紫金丹麝香 硃砂大戟千金子 百症諸瘡應手良

解諸毒。療諸瘡。利關竅。通治百病。此藥真能起死回

生製之濟人奇效不可盡述。凡居家出入興大工動大兵。及閩廣雲貴仕宦者不可無之。

山茨菰

洗去毛皮淨焙二兩

川文蛤

一名五倍子破淨焙一兩

麝香

揀淨毛皮乾者研淨三錢

千金子

一名續隨子仁白者去油一兩

紅芽大

戟

杭州紫大戟爲上江南次之北方綿大戟色白者性烈峻利損傷元氣弱人服之有致吐血慎

之勿用取杭州之上品者去蘆根洗淨焙乾爲末一兩五錢整

硃砂

有神氣者研極細末

三錢

雄黃

鮮紅大塊者研細末三錢

以上之藥各擇精品於淨室中製畢候端午七夕重陽。或天月德天醫黃道上吉之辰。凡入室合藥之人。

三日前俱宜齋沐。更換新潔衣帽。臨日方入室中。淨手薰香。預立藥王牌位。主人率眾焚香拜禱。事畢。各將前藥七味。復戩稱準。入於大乳鉢內。再研數百轉。方入細石臼中。漸加糯米濃飲調和。軟硬得中。方用杵搗千餘下。至極光潤爲度。每錠一錢。每服一錠。病勢重者。連服二錠。以取通利。後用溫粥補之。修合時。除合藥潔淨之人。餘皆忌見。此藥惟在精誠潔淨爲效。治一切飲食藥毒。蠱毒。瘴氣。惡菌。河豚中毒。及自死牛馬豬羊六畜等類之肉。人誤食之。必昏亂卒倒。

外科正宗卷四
或生異形之症。並用水磨灌服。或吐或瀉。其人必甦。
南方山巒瘴氣。烟霧癘疫。最能傷人。感之纔覺意思
不快。惡寒惡熱。欲嘔不嘔。卽磨一錠服之。得吐利便
愈。癰疽發背。對口疔瘡。天蛇無名腫毒。蛙節紅絲等
疔。及楊梅瘡。諸風癰癧。新久痔瘡。並用無灰淡酒磨
服。外用水磨搽瘡上。日夜數次。覺癢而消。陰陽二毒。
傷寒心悶。狂言亂語。胸膈塞滯。邪毒未出。瘟疫煩亂。
發狂。喉閉。喉風。俱用薄荷湯待冷磨服。赤白痢疾。肚
腹瀉泄。急痛霍亂絞腸痧。及諸痰喘。並用薑湯磨服。

男子婦人急中顛邪。渴叫奔走。鬼交鬼胎。鬼氣鬼魘。
失心狂亂。羊兒豬頭等風。俱用石菖蒲煎湯磨服。中
風中氣。口眼歪斜。牙關緊急。言語蹇澀。筋脈攣縮。骨
節風腫。遍身疼痛。行步艱辛。諸風諸癰。並用酒磨頓
熱服下。自縊溺死。驚死壓死。鬼魅迷死。但心頭微溫
未冷者。俱用生薑續斷酒煎磨服。一切惡蛇風犬毒。
蝎溪澗諸惡等蟲傷人。隨卽發腫。攻注徧身。甚者毒
氣入裏。昏悶響叫。命在須臾。俱用酒磨灌下。再喫葱
湯一碗。被蓋出汗立甦。新久瘧疾。臨發時。東流水煎

桃柳枝湯磨服。小兒急慢驚風。五疳五痢。脾病黃腫。癰癤瘡瘤。牙關緊閉。並用薄荷浸水磨濃。加蜜服之。仍搽腫上。年歲幼者。每錠分作數服。牙痛。酒磨塗痛上。仍含少許。良久嚥下。小兒父母遺毒。生下百日內。皮塌爛斑。穀道眼眶。損爛者。俱用清水磨塗。打撲損傷。松節無灰酒研服。年深月近。頭脹頭疼。太陽痛極。偏頭風。及時瘡愈後。毒氣攻注腦門。作脹者。俱用葱酒研服一錠。仍磨塗太陽穴上。婦女經水不通。紅花湯下。凡遇天行疫症。延街及巷。相傳遍染者。用桃根湯磨濃。搭入鼻孔。次服少許。任入病家。再不傳染。又治傳尸勞瘵。諸藥不能禁忌。一方士指教服此。每早磨服一錠。至三次後。逐下惡物。尸蟲異形怪類。後得脫然。以此相傳。活人不計其數。一女子久患勞瘵。爲屍蟲所噬。磨服一錠。片時吐下小蟲十餘條。後服蘇合香丸。其病頓失。調理月餘而愈。真濟世衛生之寶藥也。

徐曰。此諸毒邪氣內外要方。無病不治。又曰。此秘藥中之第一方也。用藥之奇。不可思議。

人參清神湯

人參清神湯尤者 歸苓甘草麥冬宜 柴陳遠志黃連等 功效還同地骨皮

治疔瘡潰膿後。餘毒未盡。五心煩躁。精神恍惚不甯。言語睡卧不清。服之降火清心。保扶元氣。

人參

黃耆

當歸

白朮

麥冬

陳皮

茯苓

地骨皮

遠志

各一錢

甘草

柴胡

黃連

各五分

水二茶鍾。糯米一撮。煎八分。食遠服。

徐曰。此愈後調養方。毒未盡者不可服。

內托安神散

內托安神散尤者 麥冬五味菖蒲草

茯神酸棗志陳皮 加上人元參更宜

治疔瘡針後。已出膿時。元氣虛弱。睡卧驚悸。心志不甯。或毒未盡。流入心竅。致多健忘。亦宜服。

人參

茯神

黃耆

白朮

麥冬

元參

陳皮

各一錢

酸棗仁

遠志

甘草

石菖蒲

五味子

各五分

水二茶鍾。煎八分。臨服入硃砂末三分和勻。食遠服。

徐曰。與前方相同。可刪。

疔瘡應用方

蟾酥條

即前蟾酥丸作條捏餅用之

琥珀蠟礬丸

玉紅膏

如意金黃散

托裏消毒散

護心散

見腫瘍門

八珍湯

益氣養榮湯

加減八味丸

人參養榮湯

珍珠散

見下疳門

冰蠟散

見癰瘡門

脫疽論第二十五

夫脫疽者。外腐而內壞也。此因平昔厚味膏粱。薰蒸臟腑。丹石補藥。消爍腎水。房勞過度。氣竭精傷。兼用房術之藥。或噙舌下。化水直至丹田。或納臍中。使熱徑投內腎。為丸掌握。作香鼻嗅。或抹陰鼎。或搽陽器。圖使堅硬。希求常濟。多致陽精煽惑。淫火猖狂。徐曰下愚往往

有。其蘊蓄於臟腑者。終成燥熱火症。其毒積於骨髓者。終為疽毒陰瘡。巧人行拙。誰防禍起蕭牆。智者多愚。自謂喜從天降。直至骨枯髓涸。臟敗腑亡。方悔解脫無方。罹殃有故。凡患此者。多生於手足。手足乃五臟枝幹。瘡之初生。形如粟米。頭便一點黃泡。其皮如煮熟紅棗。黑氣侵漫。傳遍五指。上至腳面。其疼如湯潑火燃。其形則骨枯筋縮。其穢異香難解。其命仙方難活。故謂血死心敗。筋死肝敗。肉死脾敗。皮死肺敗。骨死腎敗。此五敗者。雖有靈丹。喪命而已。生此疾者。

死生付於度外。孫真人曰。在肉則割。在指則切。卽此病也。治之於早。乘其未及延散時。用頭髮十餘根。纏患指本節盡處。遶扎十餘轉。漸漸緊之。毋使毒氣攻延良肉。隨用蟾酥餅放原起粟米頭上。加艾灸至肉枯瘡死爲度。徐曰。灸而後割。不至痛極。血湧亦良法也。次日。本指盡黑。方用利刀尋至本節縫中。將患指徐順取下。血流不住。用如聖金刀散止之。餘腫以妙貼散敷之。次日倘有黑氣未盡。單用蟾酥錠研末。糝之膏蓋。黑氣自退。患上生膿。照常法用玉紅膏等藥生肉護骨完口。此爲

吉兆。內服滋腎水養氣血健脾安神之劑。若內外無變症。十中可保其三。四矣。若割取之後。黑色仍漫。痛腫尤甚。敗惡無膿。口乾舌硬。精神不爽。食不知味者。終死。凡治此不可一已專任。必與高明眾議。聽患者願割與否。因此症首尾吉凶難定。故不可輕易醫治。又有似是而實非者。詳註在後。宜參觀之。
取外徐曰。此症十死八九。卽治之得法。亦難輕計其活。出此論卻是一篇勸戒文。不獨生脫疽者然也。

外科正宗卷四
起瘡不渴。口潤舌和。性志尋常。無妄暴急。循禮爲吉。初出形如麻子。掀熱作痛。一指皆腫。根腳收束者吉。已成頭便作腐。肉不紫黑。疼痛有時。膿出腫消者吉。已潰先膿後腐。肉色紅活。毒不走散。氣不腥穢者吉。未瘡先渴。喜冷無度。昏睡舌乾。小便頻數。陽痿者逆。初起形如粟米。肉便紫色。不腫刺疼。黑氣延散者逆。已成瘡形。枯癢肉黑皮焦。痛如刀刺。毒傳好指者逆。已潰肉枯筋腐。血水臭汗。疼苦應心。零仃徹骨者逆。

脫疽治法

脫疽多生足指。少生手指。初起水窠黃泡者。卽灸之。初生如粟。裏可容穀。皮色紫赤。不作掀腫。髮扎仍灸。已灸之後。瘡受火氣。發泡作膿。外藥箍之。內兼補托。毒勢已成。瘡形稍陷。但紫色未攻。腳面者。評議割取。旣割之後。血水淋漓。疼痛不減。和氣血。補脾胃。已成飲食減少。身體倦怠。便數口乾。滋津液。壯腎水。破後氣血受傷。脾胃虛弱。自汗盜汗。惡心乾嘔。睡卧不甯。日晡發熱。疼痛苦楚。煩悶譫妄。俱宜大補氣血。富貴及膏粱素饜色慾。每於房術縱恣日久。禁行割法。

脫疽治驗
徐曰。看法與諸症同。治法前已說明。重出不必。

一男子年近五旬。右足小指初生如粟米形。漸成白泡。三日始痛。請治。頭已腐爛。一指紫腫。此脫疽也。用艾火明灸十三壯。始大痛乃止。又用針刺灸頂。貼蟾酥餅膏。蓋其餘紫腫。用披針擊刺七八處。發泄毒血。用蟾酥錠磨濃塗之。腫外以真君妙貼散敷護良肉。使不外侵。時病者脈數。身發寒熱。惡心體倦。先用人參敗毒散。人參二字徐勒解其表症。次用黃連內疎湯通其大

便而惡心煩熱亦止。又用托裏消毒散加金銀花牛

膝數服。早用八味丸。晚用蠟礬丸。相兼服之。隨又針

刺。徐曰針刺本不必。又針刺更不必。泄其毒氣。解毒為膿。腫方不散。

後用十全大補湯加山萸五味。此四字徐勒麥冬等藥。調

理月餘而愈。此疽若不針灸。發泄毒氣。專假藥力敷

圍。再加峻藥攻利。必傷元氣。豈能保乎。

徐曰。此症並非脫疽。乃溼毒也。糝解毒清火藥。卽

愈。因誤治遂成大症。

一客商右足次指生一紫泡。癢痛異常。次日指甲俱紫

欲黑。余曰。此乃肝腎二經之毒。甲乃肝之餘氣。甲紫則肝受毒也。骨乃腎之餘。腎傷則骨黑。彼問何以致之。余曰。凡人勞疲筋力傷於肝。誤服熱藥傷於腎。

徐圈批

曰名言旁人曰。情實有此。彼久客狎妓。常服興陽細

此句

丸。恣情取樂。已二年矣。余欲辭不治。彼哀告求生。冀得還鄉。余令先取妓者頂髮十餘根。撚線纏扎患指盡處。隨將艾炷在紫色處排勻三炷。每灸七壯。各貼蟾酥餅膏。蓋過夜一指皆黑。量其筋骨皮肉俱死。用利刀順節取脫患指。

徐曰此是古法

乃冰冷惡物預煎甘草

湯浸洗良久。候瘀血稍盡。以止血散糝之。次日灸處紫色不退。恐其上延。又以神燈法照之。候血散皮縐。合蟾酥丸料。多加海羊研爛敷之。早晚二次。腫不復作。紫色變紅。紅色潰膿。外用生肌止痛活血收斂之藥。又熬參朮地黃膏。朝服接補真元。午服健脾藥。以固胃氣。晚用金液丹以解藥毒。如此調理三月而愈。或問用妓髮何也。余曰。以彼心愛之髮貼肉。雖疼而不疼。

徐曰神其

說以欺人

妓又如在目前。此妙用也。

一婦中年肥胖。患渴三載。右手食指麻癢。月餘。節間生

一。小泡。隨後本指漸腫。疼脹不堪。原泡處生黑斑。半指已變紫黑。此亢陽之極。乃成脫疽。脈洪大。數而有。力。與肥人相反。如再黑色上延。壞人迅速。詢知此婦。本富室。無嗣。口縱膏梁。冬熾爐炭。又多服種子熱藥。中年喪夫。家業爲嗣子蕩盡。久懷憂鬱。後與寡母同棲。身耽寂寞。此先富後貧。所願不得。又爲失榮症。辭不可治。再三哀懇。余乃遵孫真人治法。在肉則割。在指則切。先服人參養榮湯。隨用軟絹條尺許。纏裹黑色。盡處好肉節上。以漸收緊。次用利刀放準。依節切。

下。將手浸甘草溫湯中片時。血出不多。疼亦不甚。余曰。切而不痛。此爲氣血筋骨俱死。此指雖脫。未可得。

愈。因以八味丸料。

八味丸
徐入

加入人參麥冬。大劑煎服。先

救腎水。次扶脾胃。間用金液戊土丹以解藥毒。後三日。將纏裹處漸漸放鬆。以通血脈。搽貼紅黑二膏。生肉止痛。既而手背手掌日漸發腫。勢惡之甚。惟不黑色。此內毒已出之故。仍用神燈照法。兼以豬蹄湯淋洗。其腫處又出數頭。流去膿血無數。兩月外。方得腫稍退。膿稍減。又以參朮膏人參養榮湯兼服。半年外。

始愈而指失矣。

徐曰。此脫疽之類也。

一男僕冬月嚴寒。主使赤足履地。不敢移。血凍麻木。次日十指俱紫。又數日。全變黑色。麻木不痛。請余視之。強用辛熱散寒活血熏洗等藥。不應。又延黑腳面骨節一段。甚疼。余曰。後必十指齊脫。其主疑爲脫疽。余曰。似是而非。尚可不妨。令常用桑木火灸之。取其溫暖活血。又能解散鬱毒。患處漸腐。漸脫。自不走散。內服健脾養血之藥。外用紅黑二膏生肌。百日外愈。

徐曰。此凍極血凝之症。

一侍女年十二歲。貌頗美。主嫌腳大。用布任意纏緊。以線密縫。脹痛不堪。訴主不聽。半月後。流出臭水。方解視之。雙足前半段盡皆黑腐。骨肉已死。余曰。已壞者不可復救。只救未壞者可也。先煮參粥食之。次煎葱湯。令主家僕婦將兩足浸入湯內。淋洗。再換湯浸。但腐肉不痛者。逐一翦割。連續知痛者。以花蕊石散搽之。俾將壞者復生。已壞者得脫。內服補中益氣湯。外搽生肌玉紅膏。此與前案男僕雖俱得愈。俱廢疾終

身。

一男子右足小指縫中初生一點黃粟泡。皮肉隨變紫色。陰疼不腫。有如刀刺。視其形色。真脫疽也。診其脈。又細數無力。此腎經敗症。詢知生平大飲。內有妻妾三人。精力已竭。縱治無功。遂起辭之後。延至腳面。足底皆穿。疼痛不徹。飲食日少。氣血日衰。形體日削。一月後百苦而終。

徐曰。此陰毒之症。多不治。

脫疽主治方

解毒濟生湯

解毒濟生湯。草芎。知柏。二花。兼遠志。

花粉。柴芩。歸。茯苓。冬。犀角。升麻。牛膝。同。

治脫疽初起。惡寒體倦。發熱作渴。或腫或紫。或麻或痛。四肢倦怠。心志恍惚。不甯者。

川芎

當歸

黃柏

知母

天花粉

金銀花

麥冬

遠志

柴胡

黃芩

犀角

茯苓

各一錢

甘草

紅花

升麻

手

加牛膝足指加各五分

水二茶鍾。煎八分。臨服入童便一杯。隨病上下服。

徐曰。藥味甚雜。不足法。

陰陽二氣丹 陰陽二氣麥天冬 冰柏元參青黛同人中甘草有殊功

治脫疽久服丹石補藥致虧腎水多成口燥咽乾至

飲冰雪不知其冷此孤陽獨旺宜服此解之

天冬搗膏 麥冬搗膏 五味子炒研 黃柏 人中白

小兒溺者生用研 元參湯泡去粗皮搗膏各一兩 青黛色嬌嫩者

甘草 枯礬 辰砂為衣 澤瀉各三錢 冰片一錢

各為細末同元參二冬膏子加煉蜜少許再搗千餘下軟硬得中丸如桐子大每服六十九童便乳汁各一鍾空心送下安睡一時其效如神

徐曰此方無法不可學

清神散 清神散內牛硃砂 豆粉梅花冰片加解毒更兼甘草節 諸瘡煩嘔自然瘥

治脫疽疔瘡發背毒積甚者腠理發越不盡煩躁悶亂睡則譫言嘔吐不食

甘草節五錢 菉豆粉一兩 劈砂三錢 梅花片五分

牛黃三分

右為細末每服一錢淡竹葉燈心湯調服

徐曰此治熱毒犯心經之方

雌雄霹靂火 雌雄霹靂火純陽 斷艾雙黃丁麝香陰毒陰疽陰發背 用之一灸自回陽

治脫疽及一切發背初起不疼痛者。

艾茸

錢二

丁香

雄黃

雌黃

各二分

麝香

錢一

右四味共研極細。搓入艾中。作黃豆大丸。放於患上。灸之。毋論痛癢。以肉焦為度。如毒已經走散。就紅暈。盡處排炷灸之。痛則至癢。癢則至痛。為妙。灸後仍用。提疔麥子貼上膏蓋。次服蟾酥丸。及解毒濟生湯。轉回活色。有膿為妙。

徐曰。陰症灸法。

金液戊土丹

金液戊土丹五味砂雄硝石烏梅肉

牛黃神志冰麝香石菖蒲與人中黃

治脫疽及疔瘡發背。先因縱食膏粱厚味。法酒。又或丹石補藥。勉力入房。多致積毒臟腑。久則胃汁中乾。腎水枯竭。不能上制心火。以致消渴。消中消腎。饒飲多乾。能食多瘦。九竅不通。驚悸健忘。見此諸症。後必發疽。多難治療。宜預服此。可轉重就輕。移深居淺。又解五金八石之毒藥也。

人中黃

製法在末卷

烏梅肉

茯神

胡黃連

五味子

各一兩

石菖蒲

黃辰砂

雄黃

遠志

硝石 各三錢

牛黃

冰片 各一錢

金箔

二十張為衣

各為淨末配準前數。共入乳鉢內。再研千轉。於端午七夕。或二至二分吉辰。在淨室中。先將烏梅地黃二膏搗極爛。和藥。漸加煉蜜少許。徐徐添搗。軟硬得中。每藥一兩。分作十丸。金箔為衣。每服一丸。用人乳童便。共一大杯化藥。隨病上下食前後服之。此藥最解膏梁金石藥毒。殺三尸。除勞熱。極有奇功。又治煩顛。安神志。辟瘴。辟瘟。及諸邪魅。謔語。失心喪志者。俱效。

修合之時。服藥之際。俱忌婦人。僧尼。孝服。雞犬等見之。此藥用蠟封固。收藏。不泄藥味。愈久愈效。

徐曰。此亦通治之方。此等前已有。

楣案全生集載脫疽治法。大人以陽和湯。小孩以小金丹。最很者以犀黃丸。皆可消之。如色紅者。即非脫疽。當作癰治。

又案歌有麝香而方無之。方有胡黃連而歌無之。製法有地黃膏。而歌與方皆遺之。

脫疽應用方

針刺法

蟾酥丸

蟾酥餅 見疔瘡門

蠟礬丸

神燈照法

太乙膏

眞君妙貼散

內疎黃連湯

托裏消毒散

豬蹄湯

玉紅膏 見腫瘍門

十全大補湯

參朮地黃膏

人參養榮湯

補中益氣湯

加減八味丸

見潰瘍門

桑木灸法

見腦疽門

人參敗毒散

見時毒門

如聖金刀散

花蕊石散

見金瘡門

外科正宗卷四終

