




著氏ルゲンチツレフ、ルトクド

明治十九年七月二十日出版  
28

# 新物學圖解

譯 郎 太 米 橋 岩



第廿八圖 熊



Fig. 28 Der gemeine Bär (Ursus Arctos).



第四十九圖 孤樹囊鼠  
ポコリス  
ル



Fig 49 Der Fuchs Pielanger (*Phalangeria vulpina*)

Fig 50 Der graue Koala (*Phascolartos cinereus*)

Fig 51 Das kurzschichtige Palom oder die Kanguru-Rode (*Hypsignymus murinus*)

第五十二圖 大更格盧  
第五十三圖 有囊袋鼠



Fig. 51. Das Riesen Kanguru (*Macropus giganteus*)

Fig. 52. Die gemeine Beutelmaus oder der Wombat (*Phascogale Wombat*)



第三十三圖 潤耳卷熊  
第三十四圖 貓熊



Fig. 33. Der breitohrige Mischelbar oder Kinkajiu (*Cacochelys brachyotus*).  
Fig. 34. Der Panda oder nepalische Katzenbar (*Ailuurus fulgens*).



第三十一圖 洗熊  
第三十二圖 長鼻熊



Fig. 31. Der gemeine Waschbar oder Schupp (Procyon lotor).  
Fig. 32. Der gemeine Raſchbar oder Quak (Nasua socialis).

第三十圖 有鬚熊




Fig 30. Der gemahnte Lippenbar (*Prochilus labiatus*).

東國  
雜書

第廿九圖 白熊





Fig 29. Der weisse Polar oder Eisbar (Thalassarctos polaris).





第四十二圖 有囊鼯  
 第四十三圖 有囊鼠  
 第四十四圖 之六字一



Fig 42. Der gelleckte Beutemarder (Dasyurus Maugei)  
 Fig 43. Die weißköpfige Beutetratte (Didelphys virginiana)  
 Fig 44. Der braunschwänzige Schuppi oder die Kencarratte (Ptilonider dorsiger)



第第第第  
 四四四四  
 十十十十  
 八七六五  
 圖圖圖圖  
 飛有蠅游  
 囊囊囊永  
 鼠雅鼠囊

Fig. 45. Die gebänderte Schwimmbeutelratte (*Chironectes variegatus*). Fig. 46. Das gestreifte Ameisenbeuteltier (*Marmosops fasciatus*).  
 Fig. 47. Der spitznasige Beuteldachs oder Bandikut (*Perameles nasuta*). Fig. 48. Der eichhornartige Flugbeutelbilch (*Belidens sciurus*).



第五十四圖 猴 鼠  
第五十五圖 大 鼯 鼠




Fig. 54. Der braune Affenbleh oder Fischhornmaul (*Chloromys madagascariensis*).  
Fig. 55. Das grosse Flugdohren oder der Taguan (*Pteromys Peltastes*).

第五十五  
五十六  
五十七  
五十八  
圖  
七  
惡  
之  
羅  
息  
カ  
雅




Fig 56. Der gemeine Dachs (Miles Texan.)  
 Fig 57. Der Teldak oder japanische Stinkdachs (Mydax melleus)  
 Fig 58. Die Chinga oder das Hudsonsche Stochtier (Mephitis Chinga.)

第五十九圖 紐臭  
第六十圖 蜂  
第六十一圖 雅



Fig. 59. Die afrikanische Zorilla oder der gemeine Brantiller (*Blasodogale martinica*).  
 Fig. 60. Der capische oder Honig-Ratel. (*Ratelus capensis*).  
 Fig. 61. Der Gison oder gestreifte Uron (*Galictis vittata*).



第六十二圖 貴鼬  
第六十三圖 臭鼬  
第六十四圖 小鼬



Fig. 62. Der Baumm oder Fischebärer (*Martes martes*).



Fig. 63. Der gemeine Marder (*Putorius putorius*).

Fig. 64. Der kleine Marder (*Martes vulgaris*).

第六十五圖 食蛇  
第六十六圖 水獺



Fig. 65. Der gemeine Nischass (Culo ardens),  
Fig. 66. Die gemeine Fischholler (Tetra vulgaris).

動物學圖解初編卷之二

原著者

動物博士ラヒツチンゲル氏

圖畫并翻譯

岩橋米太郎

第四科 鼯鼠類

體ハ長ク脚短シ口先モ亦短ク蹠部多クハ毛ヲ生ゼリ屢々臀ニ臭腺ヲ具フルアリ上下ニ粒頭齒アリ慘酷ナル動物ニシテ主モニ血液ヲ以テ生活ス歐羅巴、亞細亞、亞非利加及亞米利加中ノ隨所ニ棲ミ平地並ニ山地ニ居ルモノニシテ多少夜ヲ好ミ或ハ太ダ巧ミニ攀ルモノアリ或ハ泳クモノアリ多クハ食スベクノ亦タ毛皮モ甚ダ尚ブベシ

第一屬 獾

蹠部ハ毛ヲ生ゼズメ全ク地ニ抵觸スベク體ハ醜惡ニシテ前足ニ穿爪ヲ具ヘリ尾ハ短ク口先ハ尖リテ長鼻ニ稍々似タリ粒頭齒ハ太ダ大ナリ

(獾第五十六圖) 頭ハ小ク后部ハ濶ナリ舌ハ滑ニシテ頸ハ后頭ノ廣サニ同シ體ハ背方ニ向ヒテ漸々其大サヲ増シ脚ハ低ク頭ハ白ク眼上ニ黒線アリ背ハ灰白及黒色ヲ混ジ腹ハ暗色強クシ



黒褐色ヲ呈セリ此種ノ動物ニ稀レニ全ク白  
色ナルモノアリ體ノ長ハニアース、三ツオルナリ  
歐羅巴及北中亞細亞ノ靜閑ナル森中ニ棲ミ自  
カラ穿掘シタル洞中ニ居ル群ヲナサザルモノ  
ニノ夜獸ナリ根、果實、蜂蜜、無血虫、鳥、卵或ハ小哺乳  
動物類ヲ以テ食トス其甘味ヲ帶ビタル肉ハ  
以テ食スベク猛獸ノ一ニノ無害ナリ

### 第二屬 惡臭糶

足指ハ前種ノモノト異リテ游離セズ末關節ニ  
至ルマデ相互ニ密着セリ鼻ハ下唇ヨリ稍々挺  
出シ大腸中ニ開口セルニツノ分泌腺アリ腎部  
ニ腺囊ナシ蹠ハ裸ナリ

### （惡臭糶 第五十七圖）

糶ヨリハ稍々小ニシテ短耳  
ハ毛中ニ潛メリ尾ハ長毛ヲ生ジテ株狀ヲナセ  
リ上側ハ栗褐色ニシテ后頭及頂白シ背上ニ白キ  
縦線アリ「ジャワ」及「スマトラ」ノ海面上七千「フー  
ト」ノ高地ニ棲ムモノニシテ洞中ニ居ル

### 第三屬 「メフチス」

蹠ハ全部或ハ諸部ニ毛ヲ生ジ足指ハ殆ンド全  
ク相互ニ密着シ尾ハ可ナリ長キヲ以テ前種ト

### 區別スベシ

### （ヒンガ 第五十八圖）

凡ソ家猫ノ大サニ等シク黒  
色ナリ鼻ハ挺出セズ脚ハ短ク抓爪ハ長シ鼻ヨ  
リ額、頸、肩ニ向ヒテ一條ノ白線ヲ引キ背部ニ於  
テ二條ニ分歧シ后チ再ビ結合ス北亞米利加ノ  
「フンドソ」灣地方ニ棲ミ高嶺ナル寒地ニ於ケ

リ上側ハ栗褐色ニノ后頭及頂白シ背上ニ白キ  
縦線アリ「ジャワ」及「スマトラ」ノ海面上七千フー  
トノ高地ニ棲ムモノニ洞中ニ居ル

第三屬 「メフチス」

蹠ハ全部或ハ諸部ニ毛ヲ生ジ足指ハ殆ンド全  
ク相互ニ密着シ尾ハ可ナリ長キヲ以テ前種ト

區別スベシ

「ヒンガ」第五十八圖

凡ソ家猫ノ大<sup>サ</sup>ニ等シク黒  
色ナリ鼻ハ挺出セズ脚ハ短ク抓爪ハ長シ鼻ヨ  
リ額頸肩ニ向ヒテ一條ノ白線ヲ引キ背部ニ於  
テ二條ニ分岐シ后チ再ビ結合ス北亞米利加ノ  
「フンドソ」灣地方ニ棲ミ高嶺ナル寒地ニ於ケ  
ル樹洞或ハ地窟或ハ岩間ニ居ル夜獸ニシテ雜ノ  
生活法ニ同シ

第四屬 「紐臭鼬」

半蹠部ヲ以テ歩ミ蹠部ニ毛ヲ生ゼリ足指ハ殆  
ンド全ク互ニ密合シテ成長シ前足ノ指ハ抓爪  
ヲ具ヘ尾長シ

「紐臭鼬」第五十九圖

大腸中ニ開通スル臀腺ア  
リテ惡臭液ヲ分泌ス體ハ可ナリ長ク脚短シ蹠  
ハ指部ニ至ルマデ毛ヲ生ゼリ尾ハ長クノ房狀  
ヲナス黒色ニシテ光澤アリ額ニ一條ノ白紐アリ  
稀レニ切離セリ背上ニ四條ノ白キ縦線アリ全  
亞非利加及前亞細亞ニ居リ岩地及自カラ穿テ  
ル地穴中ニ棲ムモノニシテ唯々夜中ノミ奪物ヲ  
ナシ農家ノ鳥類ヲ害ス

第五屬 蜂蜜獾

全蹠ヲ以テ歩ミ蹠ハ裸ナリ足指ハ游離シ前足ニ抓爪ヲ具セリ臂ニ二腺アリテ大腸ニ開口ス  
(蜂蜜獾第六十圖) 其大小及形狀ハ太ダ獾ニ類似ス體ハ醜惡ニノ扁長ナリ脚及尾ハ短カシ上ハ灰白色ニノ下ハ黑褐色ナリ南及中亞非利加ノ自カラ穿堀セル地洞中ニ棲メリ

第六屬 「ウロン」

抓爪ナク半蹠ヲ以テ歩ミ其指ハ第一關節ニ至ルマデ膜ヲ以テ結合シ尾ハ可ナリ長キヲ以テ前屬ト區別スベシ

(アリゾン第六十一圖) 形狀及大小ハ鼯鼠ニ等

シク體ハ長クノ瘦セタリ足短ク前足ノ鈎爪ハ后足ノモノヨリ僅ニ長ク舌ハ粗糙ナリ下面ハ黒ク上面ハ汚灰白色ナリ額ヨリ肩ニ向ヒ各一條ノ白紐ヲ引ケリ體長ハ一「フー」ス六「ツォル」ナリ南亞米利加ニ棲ミ樹洞或ハ他ノ動物ノ池洞中ニ居ルモノニノ攀ル「巧」ニ晝夜共ニ奪物ヲナス

第七屬 貴鼯

前足ニ抓爪ナク蹠ニ毛ヲ生ジ歩ムニ全蹠ヲ用ユ足指ハ短膜ニ依テ互ニ結合セリ體ハ大ニ延長シテ細長ク尾ハ長シ

(貴鼯第六十二圖) 太ダ有害ナル猛獸ニノ大サ

家猫ニ同ジ背ハ屈曲シ尾ハ房狀ヲナシ真直ニ

黒ク上面ハ汚灰白色ナリ額ヨリ肩ニ向ヒ各一條ノ白紐ヲ引ケリ體長ハ一「フース六ツォル」ナリ南亞米利加ニ棲ミ樹洞或ハ他ノ動物ノ池洞中ニ居ルモノニシテ攀ル一巧ミニ晝夜共ニ奪物ヲナス

第七屬 貴鼬

前足ニ爪爪ナク蹠ニ毛ヲ生ジ歩ムニ全蹠ヲ用ユ足指ハ短膜ニ依テ互ニ結合セリ體ハ大ニ延長シテ細長ク尾ハ長シ

(貴鼬第六十二圖) 太ダ有害ナル猛獸ニシテ大サ家猫ニ同ジ背ハ屈曲シ尾ハ房狀ヲナシ真直ニ背方ニ向ヘリ上面ハ栗褐色腹ハ稍々明カニシ咽喉ハ黄色ナリ舊世界ノ北半球ニ於ケル中帶地方ニ棲ミ靜閑ナル山林樹洞或ハ猛鳥ノ空巢中ニ居ル夜中ニ種々ノ鳥類及小哺乳動物殊ニ栗鼠榛鼠ヲ奪フ或ハ亦タ果實類ヲ食トス冬期ニ於テノミ農圃ニ近ヅキ家畜ヲ害シ譬へ一片ノ肉ヲ喰ヒ欲スルモ目撃シタル家畜ハ悉皆縊殺スルモノナリ咽喉ノ白キヲ以テ家鼬ト區別スベシ

第八屬 臭鼬

蹠部ニ毛ヲ生ジ足指ハ游離シ及齒ニ因リテ前屬ト區別スベシ缺齒ハ上ニ二枚下ニ三枚ナリ故前屬ヨリ一枚少シ  
(臭鼬第六十三圖) 其形狀及行體ハ前屬ニ等シケレド稍々小ナリトス頸ハ長ク尾ハ長カラズ

末端ハ少シク房狀ヲナス側面ニハ粗毛少ナク黄色ノ細毛密生シテ栗褐色ニ光澤ヲ呈セリ口先及耳白ク全體ノ色ハ冬期ニ於テ多ク明カナリ此屬ニモ亦タ充分白キ變種アリ歐羅巴及亞細亞ノ中帶及寒帶ニ棲ムモノニシテ北部ニハ居ラズ平地及山地ニ居ルモノナレド好ンデ人家ノ近傍及古壁家蓄小屋家屋ニ居レリ冬候ニ向ヒバ殊ニ屋根裏ニ棲メリ夜獸ニシテ弱キ諸動物ヲ奪フ其他蛙、龜類ヲ捕フ雜ニハ殊ニ有害ヲナス

### 第九屬 鼯鼠

體ハ太ク細長ク下面ハ常ニ白キヲ以テ前屬トノ區別トス

(小鼯鼠第六十四圖) 鼯類中ノ最モ小ナルモノニシテ其小形ニ比シテハ最モ強猛ナルモノトス頸ハ長ク體細長クノ尾ハ短ク末端ハ尖レリ上ハ帶紅茶色ニシテ下面ハ白シ寒地ニ在テハ冬期ニ向ヒバ其色多少白色トナル體長ハ六ツオト三ナリ舊世界ノ北部ニ於ケル中帶及寒帶ニ棲ミ田野ノ樹洞、地洞中ニ居ルモノニシテ人家ノ近邊ヲ愛ス卵、鳥、小哺乳動物及水陸動物ヲ以テ

食トス貪戀ニシテ血液ヲ嗜ム半夜獸ナリ幼時ニ捕フレバ容易ニ馴レ以テ犬ノ如ク其飼者ノ后ニ從ヒ行クモノナリ

(大鼯鼠) 尾端ハ常ニ黒キヲ以テ著明ナリトス上ハ茶褐色下ハ白色ナレド冬期ニ向ヒバ全體白色トナル長サ十「ツル」ナリ歐羅巴及亞細亞ニ

ニメ其小形ニ比シテ最モ強壯ナリ  
頸ハ長ク體細長クノ尾ハ短ク末端ハ尖レリ上  
ハ帶紅茶色ニシテ下面ハ白シ寒地ニ在テハ冬期  
ニ向ヒバ其色多少白色トナル體長ハ六ツオ  
三ナリ舊世界ノ北部ニ於ケル中帶及寒帶ニ棲  
ミ田野ノ樹洞地洞中ニ居ルモノニシテ人家ノ  
近邊ヲ愛ス卵鳥小哺乳動物及水陸動物ヲ以テ

食トス貪戀ニシテ血液ヲ嗜ム半夜獸ナリ幼時ニ  
捕フレバ容易ニ馴レ以テ犬ノ如ク其飼者ノ后  
ニ從ヒ行クモノナリ

〔大鼬鼠〕 尾端ハ常ニ黒キヲ以テ著明ナリトス  
上ハ茶褐色下ハ白色ナレバ冬期ニ向ヒバ全體  
白色トナル長サ十ツオナリ歐羅巴及亞細亞ニ  
棲ム北部ノモノハ高價ナル毛皮ヲ産ス

### 第十屬 貪食鼬

體ハ僅カニ細長キヲ以テ前屬ト區別スベシ  
〔貪食鼬 第六十五圖〕 雜ヨリハ稍々大ニシテ形チ類  
似セリ頸及脚ハ短ク中腹ハ臃縮シ背ハ潤ナリ  
尾ハ短クメ房狀ヲナス上ハ栗褐色ニシテ背ニ心  
臟形ノ暗色斑紋アリ下ハ黒褐色ナリ歐羅巴及  
亞細亞ノ北部ニ棲ミ山地或ハ樹洞或ハ雜ノ空  
洞ニ居ル夜獸ニシテ生活動物屍體或ハ果實ヲ以  
テ食トス「ラップランド人ノ小屋中ニ忍ビ入り牛  
酪、乾酪、肉、魚等ヲ奪フ

### 第十一屬 水獺

足指ハ游泳膜ニ依テ互ニ結合シ尾ハ末端ニ至  
テ臃平シタリ

(水獺第六十六圖) 口先短鈍ニシテ耳ハ瓣ニ依テ閉鎖シ得ベク体ハ長ク背ハ決シテ屈曲スルナシ脚ハ太ク短ク后方ニ延バスタ得ベシ前足ノ指ハ屢々無毛ナルヲアリ上ハ帶赤褐色下ハ明カナリ舊世界ノ北中帶及寒帶ニ住ムモノニシテ各處ニ其多數ヲ見出スナシ大河小河ノ近邊ナル地下ニ居リ夜中徘徊シテ魚鳥蟹水鼯等ヲ奪フ

### 第五科 熊羆類

醜惡ナル動物ニシテ蹠ニテ歩ミ上下ノ顎ニハ二枚ノ強キ粒頭齒肉齒ノ后方ニアリ歐羅巴亞細亞及亞米利加ヨリ極地方ニ至ルマデ蔓延シ且ツ北亞非利加ノ一部ニモ棲ムモノナリ其大種ハ危害ヲナス猛獸ニシテ餓ヘタルキハ人ヲモ襲フモノナリ大抵皆ナ攀ヲ能クシ一二ハ泳クモノアリ幼時ニ捕フレバ容易スク馴ル、モ温和ナル性質ヲ見ズ

### 第一屬 熊

體ハ醜ニシテ口先短ク眼ハ小ニシテ額濶ナリ毛ハ密生シ尾ハ短ク足指ハ游離セリ唇ハ唯僅カニ

前方ニ延バスタ得ル

### (熊第二十八圖)

歐羅巴產猛獸中ノ最大且最恐

ル可キモノニシテ口先ハ圓錐狀ニシテ額ハ強ク穹窿ヲナシ耳ハ小ク尾ハ太ク短ク蹠モ亦ク短シ暗褐色ナルモ多ク帶赤或ハ帶黒セリ體長ハ六

ノアリ幼時ニ捕フレバ容易スク馴ル、モ温和ナル性質ヲ見ズ

### 第一属 熊

體ハ醜ニシテ口先短ク眼ハ小ニシテ額濶ナリ毛ハ密生シ尾ハ短ク足指ハ游離セリ唇ハ唯僅カニ

前方ニ延バステ得ル

(熊第二十八圖) 歐羅巴産猛獸中ノ最大且最恐ル可キモノニシテ口先ハ圓錐狀ニシテ額ハ強ク穹窿ヲナシ耳ハ小ク尾ハ太ク短ク蹠モ亦短シ暗褐色ナルモ多ク帯赤或ハ帯黒セリ體長ハ六半<sup>1</sup>フートニシテ二種アリ其一ハ大ナルモノニシテ多ク黒色ヲ帯ビ柔和ナルモノニシテ殊ニ植物及蟻ヲ食トス故ニ蟻熊或ハ草熊ト名ク他ノ一ハ多ク赤色ヲ帯ビ猛酷ナリ馬熊或ハ蜂蜜熊ト稱ス其他稀レニ白種ノモノアリ舊世界ノ寒帶及中帶地方ニ居リ殊ニ寂シキ山地ニ棲ムモノニシテ群ヲナサズ冬蟄ヲナス捕ヘ麩麥肉ヲ以テ飼フナリ

### 第二属 白熊

足指ハ短キ游泳膜ニ依テ結合シ蹠ニ毛ヲ生ジテ口先ハ前属ヨリ尖レリ

(白熊第二十九圖) 熊種ノ最大ナルモノニシテ長サハフート以上ナリ頭ハ長ク通常ノ熊ヨリハ著シク細シ額扁クシテ鼻ト一線中ニ在リ頸ハ細ク體ハ前属ヨリ大ニ長ガシ蹠モ亦長ク尾ハ



僅カニ毛皮ヨリ現出ス長毛密生シ色ハ一様ニ  
ノ白ロシ鼻端ハ裸ニノ黒ク舌モ亦タ黒色ナリ  
歐羅巴、亞細亞、亞米利加ノ北部地方ニノミ生活  
ス尤八十二度以北ニシテ茲ニハ最早陸獸ヲ見出  
サバルモノトス多分ハ群ヲナシ時トメハ其數  
百ニ近キトアリ殊ニ魚海豹、海豕ヲ以テ食トス  
死鯨ヲ太ダ好ムモノニシテ餓甚シキハ人ヲ襲フ

### 第三屬 有鬣熊

體ハ短クシテ太ク蹠ハ裸ニノ口先強ク延長セ  
リ唇ハ前方ニ延バシ得ベク足指ハ浮離シ頂ニ  
鬣アリ

有鬣熊 第三十圖 體形ハ爾他ノ熊類ヨリハ大  
ニ異ナリ頭ハ可ナリ扁平ニシテ延ヒテ長鼻ニ類  
スル細キ口先トナリ唇ハ顎上ニ挺出シ一管ヲ  
形成シ以テ物體ヲ嚙握スルニ便ス體ハ短脚上  
ニ靜座シ動作重キガ如シ尾ハ全ク后體ノ毛中  
ニ潛メリ毛ハ長クシテ多ク生ジ光澤アリテ黒色  
ナリ口先ハ白ロシ體長ハ五フーニシテ南亞細  
亞ノ山森中ニ棲ム大ナル哺乳動物ヲ襲ヘ得ル  
モ殊ニ植物質ヲ食ス

### 第四屬 洗熊

尾ハ長クシテ房狀ヲナシ蹠ハ裸ニシテ歩ムニ半蹠  
ヲ用エ體ハ密ニ毛ヲ生ゼズ口先ハ短クシテ尖レ

形成シ以テ物體ヲ嚙握スルニ便ス  
ニ靜座シ動作重キガ如シ尾ハ全ク后體ノ毛中ニ潛メリ毛ハ長クノ多ク生ジ光澤アリテ黒色ナリ口先ハ白ロシ體長ハ五「フ」トニノ南亞細亞ノ山森中ニ棲ム大ナル哺乳動物ヲ襲ヘ得ルモ殊ニ植物質ヲ食ス

第四屬 洗熊

尾ハ長クノ房狀ヲナシ蹠ハ裸ニノ歩ムニ半蹠ヲ用ユ体ハ密ニ毛ヲ生ゼズ口先ハ短クノ尖レリ

(洗熊第三十一圖) 獾ヨリ小ニノ尾ハ長ク耳大ナリ軟毛密生シ帶黃灰白色及茶褐色ヲ混ゼリ尾ハ帶灰黃色ニノ六條ノ黒褐色ナル横綫アリ體長ハ二「フ」トニメ北亞米利加ニ棲ミ夜中食物ヲ探ス種々ノ果實、鳥卵及小動物ヲ食トス

第五屬 長鼻熊

尾ハ太ダ長ク蹠ハ裸ニ足指ハ一部密着セリ體ハ細長クノ口先ハ長クノ下唇上ニ突出セル長鼻ニ終ル

(長鼻熊第三十二圖) 大狐ニ同ジク體ハ殆ンド

鼬ニ類似セリ鼻ノ前方ハ斜ニ垂レ太ダ運動シ易スレ耳及脚ハ短ク眼ハ小シ上ハ茶褐色ニノ下ハ黃色ナリ尾ニ帶赤黃色及黑色輪各六乃至七箇アリ其尖端ハ黒ロシ體長ハ一「フ」トニツルニノ南亞米利加ノ廻歸線地方ナル大乾涸森中ニ群ヲナシテ棲ミ行狀ハ猿ニ似テ日中ハ森

ヲ徘徊シ攀ルヲ太ダ巧ニニノ動物及果實ヲ以テ食トス

第六屬 卷熊

尾ハ太ダ長ク僅ニ房狀ヲナシ卷回ス行狀ハ鼯ニ類ス足指ハ半バ互ニ密着シ蹠ハ裸ナリ毛ハ密生セズ口先ハ短ク又尖リ耳ハ小ナリ

(濶耳卷熊第三十三圖) 頭ハ丸白ク短ク額ハ

扁平ニ急ニ短キ口先トナル攀ル片ハ尾ヲ枝ニ轉卷ス上ハ帶黄灰白色ニ茶褐色ナル影線アリ背上ニ黒線アリテ下ハ黄色ナリ體長ハ一「フース四ツォル」ニ南及中亞米利加ノ廻歸線中ナル大河ノ岸邊ニアル森中ニ棲ム夜獸ニ一日中ハ樹洞中ニ眠レリ

第七屬 猫熊

足指ハ遊離シ蹠ハ裸ニ尾ハ長ク且ツ房狀ヲナシ毛ハ密生シ體ハ可ナリ下方ニ据ヘリ

(猫熊第三十四圖) 稍々猫ニ類シ大サモ亦タ之

レニ同シ頭ハ延ビテ太ダ鈍キ口先トナリ殆ンド球狀ニ見ユ耳ハ短ク又尖リ上ハ錆赤色背ニ黄色ノ毛アリ下ハ黒ク口先白ク尾ハ狐赤色ナ

リ「ヒマラヤ山ノ南ナル山河ノ近傍ニ棲ミテ多分ハ樹上ニ居レリ

第六科 狢類

體ハ刺ヲ以テ覆ハレ前足ニ穿爪ナク臼齒ハ尖

足指ハ遊離シ蹠ハ裸ニシ尾ハ長ク且ツ房狀ヲ  
ナシ毛ハ密生シ體ハ可ナリ下方ニ据ヘリ  
(猫熊第三十四圖) 稍々猫ニ類シ大サモ亦タ之  
レニ同シ頭ハ延ビテ太ダ鈍キ口先トナリ殆ン  
ド球狀ニ見ユ耳ハ短クノ尖リ上ハ錆赤色背ニ  
黄色ノ毛アリ下ハ黒ク口先白ク尾ハ狐赤色ナ

リヒマラヤ山ノ南ナル山河ノ近傍ニ棲ミテ多  
分ハ樹上ニ居レリ

### 第六科 狒類

體ハ刺ヲ以テ覆ハレ前足ニ穿爪ナク臼齒ハ尖  
頭ヲナシテ肉齒ナク鎖骨ヲ具フ歐羅巴、亞細亞  
及亞非利加ニノミ棲ム夜獸ニノ日中ハ隱所、樹  
洞、岩間、藪中等ニ居ル諸綱目ノ小動物、果實及軟  
根ヲ食トシ非常ニ貪慾ニノ有害動物ヲ打絶ス  
ヲ以テ用アリトス

### 第一屬 狒

口先ハ下唇上ニ挺出セル鼻ニ終ハリ背ニ硬刺  
アリ腹及前頭ハ硬毛ヲ以テ覆ハレ刺ハ單溝ニ  
シ尾ハ甚ダ短ク蹠ハ裸ニシ犬齒ナシ

### (狒第三十五圖)

體ハ壓縮シ頸ハ短ク太サ體ニ

同シ背ハ扁平ニシテ脚短ク前足ハ后足ヨリ稍  
々廣シ上ハ或ハ明褐色ナルアリ或ハ暗褐色ナ  
ルアリ下ハ明灰白色ナリ體長八十<sup>ツ</sup>ナルナリ犬  
蝟ハ口先鈍ク色暗ニシ又タ豕蝟ハ明色ニシ口  
先尖レルヲ以テ此屬ト區別スベシ此屬ノ變化  
ノ全ク白色ナルモノ存在ス全歐羅巴<sup>寒地ヲ</sup>及

前亞細亞ノ一部ニ棲ム永ク冬蟄ヲナシ體ヲ縮  
卷シテ球狀ヲナス危難ニ遭フキモ亦タ同ジク  
球狀ヲナス是レ厚キ背筋膜ヲ有シ以テ之レヲ  
爲シ得ルモノナリ

第二屬 硬毛猬

背ニ軟刺アリテ硬毛ヲ混ズ尾ハ全ク無シ

(硬毛猬第三十六圖) 口先ハ甚ダ豕ニ類似ス頸ハ

短ク體ヨリハ細シ體ハ后方ニ至テ太クナリ前  
屬ヨリ足ハ稍々高シ黄色ニシテ體長ハ十<sup>ツ</sup>ツ<sup>ル</sup>  
ナリマダカスカ<sup>ル</sup>ニ棲ム水邊ニアル地洞中ニ  
居リ前屬ト同ジク夜獸ニメ雨ノ候ニ至レハ  
瞞眠ス

第七科 鼯鼠類

體ハ短キ軟毛ヲ以テ覆ハレ尾ハ長ク前足ニ穿  
爪ナシ總臼齒ハ尖頭狀ヲナシ犬齒無ク口先ハ  
長クノ長鼻狀ヲナス歐羅巴、亞細亞、亞非利加、北  
及中亞米利加ニ棲メリ多クハ乾地ニ居ルモノ  
ナレド或ハ濕地水邊ニ居ルモノアリ而メ多分  
ハ地下ニ住メド其一ニハ攀ルモノアリ暫時冬  
蟄ヲナスモノニメ殆ント全ク動物糞ヨリノミ

生活シ屢々自レノ子ヲ喰フモノナリ

第一屬 鼯鼠

口先ハ非常ニ長ク目ハ太ク小ニメ耳ハ瓣ニ依  
テ閉鎖スベシ體ノ側部ニ一ノ分泌腺ヲ具ヘ下

長クノ長鼻狀ヲナス歐羅巴亞細亞亞非利加北  
及中亞米利加ニ棲メリ多クハ乾地ニ居ルモノ  
ナレド或ハ濕地水邊ニ居ルモノアリ而メ多分  
ハ地下ニ住メド其一ニハ攀ルモノアリ暫時冬  
蟄ヲナスモノニモ殆ント全ク動物糞ヨリノミ

生活シ屢々自レノ子ヲ喰フモノナリ

第一屬 鼯鼯

口先ハ非常ニ長ク目ハ太ダ小ニメ耳ハ瓣ニ依  
テ閉鎖スベシ體ノ側部ニ一ノ分泌腺ヲ具ヘ下  
門齒ニ切目アリ

鼯鼯第三十七圖

家鼠ヨリハ小ニメ耳ハ太ダ

長ク殆ンド全ク毛皮ヲ以テ覆ヘリ后脚ハ前脚  
ヨリ僅ニ長ク足指ニ游泳硬毛ナシ尾ハ體ノ半  
長ヨリハ稍々短ク上ハ栗褐色ニ下ハ帶灰白  
色ナリ體長ハ二ツ<sup>ツ</sup>「<sup>ツ</sup>九ニメ中歐羅巴ニ住ミ谷  
及山ニ居リ游泳セザル夜獸ナリ虫、無血虫、鳥及  
小哺乳動物ヲ以テ食トス

第二屬 麝香鼯鼯

足指ハ長キ游泳膜ニ於テ互ニ結合シ口先ハ太  
ダ長ク長鼻ハ突出セリ眼ハ太ダ小ニメ外耳無  
シ尾ハ長クノ僅ニ毛ヲ生ゼリ

麝香鼯鼯第三十八圖

口先ハ尖リテ太ダ長ク

脛平シタル長キ鼻ヲ具ヘリ鼻ノ上面ニ一ノ深  
キ縱溝アリ尾ハ體ノ半長ヨリハ長ク端ニ至テ  
二條トナリ中部ハ膨大セリ上ハ帶赤褐色ニメ

下ハ帶白灰色ナリ體長ハ八「ツオル」七ニノ魯西亞ノ南部ナル水邊ニ於テ自カラ穿堀セル洞中ニ棲ムモノニソ植物性滋養物ヲ嫌フモノナリ

### 第八科 鼯鼠類

體ハ圓柱狀ヲナシ毛ハ甚ダ軟ク前足ニ穿爪アリ耳及目ハ毛皮中ニ潜メリ犬齒アリ肢部ハ全ク短シ歐羅巴、亞細亞ノ一部、南亞非利加及北亞米利加中ニ蔓延シテ存在ス牧場野原、田畑又タ屢々水岸ニ居ル「ツ」アリ日光ヲ嫌忌スル動物ニソ決シテ植物質ヲ喰スル「ツ」ナク冬蟄ヲナスモノトス

### 第一屬 鼯鼠

目ハ太ダ小ニソ耳ハ存在セズ尾ハ短シ口先ハ長鼻ニ終ハル

### 鼯鼠第三十九圖

體ハ圓柱狀ヲナシ頭ハ大ニソ體ト分視シ難シ是レ頸ハ太ク且ツ太ダ短キガ爲メナリ長鼻ニ軟骨アリテ支柱トナル脚ハ非常ニ短キ「ツ」恰モ腹ハ地上ニ抵在スルガ如シ前脚ハ后脚ヨリ遙カニ強ク前蹠ハ手狀ヲナシ其足指ハ充分ニ膜ニ依テ互ニ結合セリ天鵞絨

様黑色ニソ體長ハ五「ツオル」ナリ此屬ニソ種々ノ

變體セルモノアリ歐羅巴ノ全中帶及北部又タ

亞細亞中ニモ棲ミ地下ニ生活ス此穴洞ハ二箇

ノ稍々距リタル室ヨリ成立チ多クノ道ヲ以テ

通合ス此動物ハ蚯蚓、有害無血虫類ヲ喰ヒ盡ス

ヲ以テ亦タ用アリトス

ノ体ト分視シ難シ是レ頸ハ太ク且ツ太ク短キ  
ガ爲メナリ長鼻ニ軟骨アリテ支柱トナル脚ハ  
非常ニ短キ一恰モ腹ハ地上ニ抵在スルガ如シ  
前脚ハ后脚ヨリ遙カニ強ク前蹠ハ手狀ヲナシ  
其足指ハ充分ニ膜ニ依テ互ニ結合セリ天鷲絨

様黑色ニソ体長ハ五「ツォル」ナリ此属ニソ種々ノ  
變体セルモノアリ歐羅巴ノ全中帶及北部又夕  
亞細亞中ニモ棲ミ地下ニ生活ス此穴洞ハ二箇  
ノ稍々距リタル室ヨリ成立チ多クノ道ヲ以テ  
通合ス此動物ハ蚯蚓有害無血虫類ヲ喰ヒ盡ス  
ヲ以テ亦夕用アリトス

### 第二属 星鼯鼠

口先ハ長クノ短鼻ニ終ハル此鼻ノ周邊星狀ニ  
位セル運動シ易スキ軟骨瓣ヨリ圍マルモノト  
ス尾ハ前属ヨリ長シ

### 星鼯鼠第四十圖

體ハ長延シ尾ハ長ク及ビ

鼻ノ造構ヲ以テ鼯鼠ト區別スベシ鼻星ハ十六  
ノ大光線及四ノ小光線ヨリ型成ス毛ハ密生シ  
盤石様黑色ナリ體長ハ四「ツォル」ニノ北亞米利加  
ノ「ペンシルヴァニア」ニ棲ミ生活法ハ獨乙國産  
ノモノニ同ジ

### 第三属 黄金鼯鼠

前足ハ三、後足ハ五指ニノ目ハ皮下ニ隱在ス耳  
及尾ナク鼻短シ

### 黄金鼯鼠第四十一圖

鼯鼠ノ大サニ等シクメ



尾ナク足ハ太ダ短ク外爪ハ太ダ長ク且ツ濶ク  
ノ鎌狀ニ彎曲セリ暗褐色ニシテ美ナル鑛輝ヲ有  
シ體長ハ五ツォルナリ喜望岬ニ棲之生活法ハ鼯  
鼠ニ同ジ

#### 第四目 有囊類

乳房ハ一ノ囊中或ハ膜皺中ニ存スルモノニシテ  
此囊ハ骨盤ヨリ生ズル二箇ノ囊骨ヨリ支柱サ  
ル、モノトス多分ハ小キ夜哺動物ニシテ頭ハ尖  
リ耳ハ大ク尾ハ長ク齒ハ猛獸ノ如クニシテ鋭尖  
或ハ鈍尖ナリ而シテ屢々不完全ナルモノトス子  
ハ太ダ不充分ニシテ産マレ發育完全ナルニ至ル  
マテ腹囊中ニ抱キ徘徊ス子ハ囊中ニアリテ乳  
ヲ飲ム下顎ハ種々ニ運動スベク南亞米利加及  
新和蘭ニ住メリ

#### 第一科 有囊類

后脚ハ前脚ヨリ稍々長ク犬齒ヲ具ヘ門齒ハ小  
ナリ下顎ハ唯上ヨリ下方ニシテ運動スベシ「ア  
ウストラリオン」ニ於ケル地洞及樹洞中ニ棲ム  
夜獸ニシテ海邊ニ打ち上ゲラレタル動物小哺乳  
動物鳥及無血虫ヲ以テ食トス一二ノ肉ハ土人

ノ食用トナルモノナリ

#### 第一屬 有囊鼯

體ハ延長シテ細ク口先ハ尖リ尾ハ長ク房狀ヲ  
ナス臼齒ハ上下ニ各六枚アリ后拇指ハ或ハ圓  
柱狀ヲナスモノアリ或ハ無キモノアリ

后脚ハ前脚ヨリ稍々長ク犬齒ヲ具ヘ門齒ハ小ナリ下顎ハ唯上ヨリ下方ニノミ運動スベシアウストラリーニ於ケル地洞及樹洞中ニ棲ム夜獸ニシテ海邊ニ打チ上ゲラレタル動物小哺乳動物鳥及無血虫ヲ以テ食トス一二ノ肉ハ土人

ノ食用トナルモノナリ

第一屬 有囊鼯

體ハ延長シテ細ク口先ハ尖リ尾ハ長ク房狀ヲナス白齒ハ上下ニ各六枚アリ后拇指ハ或ハ圓柱狀ヲナスモノアリ或ハ無キモノアリ

有囊鼯 第四十二圖

口先ハ細クメ尖リ耳ハ長

ク尖リ直立ス其基礎ニ小辨アリ后拇指ハ全ク無シ鉤爪ハ強クノ彎曲セリ頸ハ延長セル體ヨリハ稍々細クシ上ハ橄欖黃色ニシテ黒キ小紋アリ下ハ灰白色ナリ耳ハ薔薇色ニシテ口先端ハ赤シ體長ハ一「フ」ス三「ツ」オ「ル」ニシテ新和蘭ニ棲ム夜獸ニシテ日中ハ穴中ニ潛ミ海岸ニアル屍ヲ以テ主食トナス

第二科 有囊鼠類

下顎ハ上顎ノ如ク運動スベク前足及后足ハ共ニ五指ニシテ后拇指ニハ爪ナク距立セリ上下ニ各七枚ノ白齒アリ各顎ニハ乃至十枚ノ犬齒アルモノトス亞米利加ノ森中ナル地下ニ居ルモノニシテ只タ其一種ハ「アウストラリー」ニ生活ス靜閑ナル夜獸ナリ

第一屬 有囊鼠

外形ハ鼯ニ類似シ卷尾ハ長ク其礎部ニノミ毛ヲ生ジ尖端ハ輪狀ヲナス亞米利加ニ棲ミ生活法ハ吾國(獨乙)産ノ鼯ニ等シ

(有囊鼠 第四十三圖) 全屬中ノ最大ナルモノニ

ノ猶大ナリ額ハ扁ク口先ハ長クノ尖レリ耳ハ全ク薄膜様ナリ體バ僅カニ延長シ動作ハ稍々重キガ如シ全蹠ヲ以テ歩ミ上ハ汚白色下ハ白色ニシテ一「フ」ス六「ツ」ルノ體長ナリ北亞米利加ノ樹上ニ居リ子ハ其始メ豌豆大ニノ五日間囊中ニアリ此時ニ至テ全ク成長ヲ遂グルモノトス

第二屬 「シ」パチ

后足ノ拇指ハ他指ニ對立シテ爪無シ卷尾ニソ尖端ハ鱗狀ヲナセリ其囊ハ軟毛ヲ生ジ不完全ナル二箇ノ膜皺ヨリ型成スルヲ以テ前屬ト區別スベシ

(「シ」パチ 第四十四圖) 家鼯ヨリハ稍々小ク頸

ハ短クメ太ク體ハ延長シ脚短シ上ハ灰白褐色ニメ下ハ帶白黄色ナリ體長ハ五ト二分ノ一「ツ」

ルナリ「ズ」リナム「グ」イアナ及「グ」ラジリーンノ東部ニ於ケル叢森中ノ樹上ニ居リ鼠小鳥卵無血虫及果實ヲ以テ食トス成育シタル子ハ母ノ背上ニアリテ各尾ヲ母ノ尾ニ纏卷ス

第三屬 游泳囊鼠

后足ノ指ハ游泳囊ヲ生ズ

尖端ハ鱗状ヲナセリ其囊ハ軟毛ヲ生レ不完全ナルニ箇ノ膜皺ヨリ型成スルヲ以テ前屬ト區別スベシ

〔シユパチ〕 第四十四圖

家鼯ヨリハ稍々小ク頸ハ短クメ太ク體ハ延長シ脚短シ上ハ灰白褐色ニメ下ハ帶白黄色ナリ體長ハ五ト二分ノ一ツオ

ルナリズリナム「グイアナ」及「ブラジリオン」ノ東部ニ於ケル叢森中ノ樹上ニ居リ鼠、小鳥、卵、無血虫及果實ヲ以テ食トス成育シタル子ハ母ノ背上ニアリテ各尾ヲ母ノ尾ニ纏卷ス

第三屬 游泳囊鼠

后足ノ指ハ游泳膜ニ依テ結合シ北ノ囊ハ完全ナリ卷尾ニノ毛ハ軟シ

〔游泳囊鼠 第四十五圖〕

殊ニ水中ニ棲ム特種ノ囊獸ニシテ其大小大凡ソ鼯ノ如ク生活法ハ水獺ニ等シ大ナル頬嚙ヲ具ヘ體ハ圓柱狀ニシテ脚ハ短シ背上ニ一ノ栗褐色線アリ其他ノ色ハ多少灰白色ニシテ「フース」三「ツォル」ノ長サナリ南亞米利加ノ東岸ニ居リ小河ノ水邊ニアル森中ニ生活ス魚及其卵ヲ以テ食トナス

第四屬 蟻囊鼠

后足ノ拇指ハ全ク缺乏シ尾ハ緩カニメ房狀ヲナシ毛ハ疎生シ蹠ニ毛アリ

〔蟻囊鼠 第四十六圖〕

此目中ノ最美ナルモノ、一ニシテ其機器及生活法ハ未ダ明了ナラズ栗鼠大ニシテ上ハ前ニ帶赤黄色ヲ呈シ遙カ后方ニ黒色

トナリ茲ニ白色ノ横紐アリ下ハ帶黄白色ナリ  
アウストラリー<sup>1</sup>ンノ森中ナル隱所ニ存生ス

### 第三科 有囊獲類

后足ハ前足ヨリモ著シク内外ノ足指ハ共ニ彎  
屈セリ臼齒ハ尖頭ヲナシ<sup>1</sup>アウストラリー<sup>1</sup>ンニ  
生活ス

### 第一屬 有囊獲

前足ノ内外指ハ共ニ彎屈シ后足ハ四指ニノ中  
立ノモノハ爪關節ニ至ルマデ密着ス尾ハ緩力  
ニノ毛ヲ生ジ耳ハ長カラズノ鈎爪ハ長マレリ  
(有囊獲 第四十七圖) 口先ハ太ダ尖リ后脚ハ前

脚ヨリ長ク體ハ延長セリ前足ノ内外指ハ唯疣  
狀ヲナスヲ以テ知ル可ク三指ハ強キ鎌狀ノ鈎  
爪ヲ具ヘ后足ノ内指ハ無爪株狀ナリ上ハ褐色  
ニノ黑色ノ小紋アリ下ハ汚黄白色ナリ體長ハ  
一<sup>1</sup>アース<sup>1</sup>ニツォル<sup>1</sup>ニノアウストラリー<sup>1</sup>ンノ高嶺ナ  
ル山地ノ洞中ニ居リ太タ多數ノモノニノ殊ニ  
根芽ヲ以テ食トス又タ無血虫及虫類ヲ喰フ

### 第四科 樹有囊鼠類

下顎ハ諸方ニ運動スベク門齒ハ大ニノ屢々下

顎ニ犬齒ナキ<sup>1</sup>アリ臼齒ハ粒頭狀ヲナス歩脚  
及飛脚ニノアウストラリー<sup>1</sup>ン及亞細亞ノ南部  
ナル一二ノ島中ニ棲ミ森中ニアリテ不斷樹上  
ニ居ルモノナリ

### 第一屬 飛囊鼠

一「フリス」ニ「ツオル」ニ「アウストラリン」ノ高嶺ナ  
ル山地ノ洞中ニ居リ太タ多數ノモノニ「殊」ニ  
根、茅ヲ以テ食トス又タ無血虫及虫類ヲ喰フ

第四科 樹有囊鼠類

下顎ハ諸方ニ運動スベク門齒ハ大ニノ屢々下

顎ニ犬齒ナキ「ア」アリ白齒ハ粒頭狀ヲナス歩脚  
及飛脚ニ「アウストラリン」及亞細亞ノ南部  
ナル一ニノ島中ニ棲ミ森中ニアリテ不斷樹上  
ニ居ルモノナリ

第一屬 飛囊鼠

前脚及后脚ハ飛膜ニ依テ結合シ耳ハ長ク后肢  
ノ拇指ハ對立シテ爪ナク二箇ノ中立指ハ爪關  
節ニ至ルマデ互ニ密着セリ

（飛囊鼠 第四十八圖）

栗鼠大ニノ形狀モ同ジク

耳ハ大ニノ突出セリ體ハ延長シ飛膜ハ前足ノ  
外指縁ヨリ生ジ后脚ノ拇指根ニ至リ止マル尾  
ハ太ダ長クノ房狀ヲナス上ハ褐色ニ下ハ黄  
白色ナリ體長ハ八ト二分ノ一「ツオル」ニノ新和蘭  
及新グイ子ヤニ棲ミ甚ダ遠ク飛ビ且ツ迅速ナ  
リ夜獸ニノ果實、葉及無血虫ヲ以テ食トス

第二屬 樹囊鼠

后足ノ拇指ハ扁爪ヲ具ヘ肢部ハ歩行ニ適シ握  
尾ニ「ア」犬齒ハ上下ニアリ

（狐樹囊鼠 第四十九圖）

大凡ソ野猫大ニノ稍々

狐ニ類似セリ口先ハ短クノ尖リ體ハ延長セリ

尾ハ長クノ叢毛ヲ生ジ尖端ニ至リ下面ニ無毛ノ縦線アリ囊ハ不完全ナリ上ハ褐色ニノ背ニ暗色ヲ帯ビ下ハ明黄色ニノ頸ニ錆赤色アリ體長ハニアリスナリ新和蘭及ファンデーメン國ニ棲ミ森中ノ樹上ニ居リ植物及動物ヲ以テ食トス

第三屬 「ゴアラ」

后足ノ拇指ハ爪ナク前足ノ二内指ハ三外指ニ全ク對立セリ犬齒ハ下顎ニ欠レ尾及耳ハ短カシ

（「ゴアラ」第五十圖）

形狀及行狀ハ若熊ノ如ク口先ハ短クノ稍々圓形ヲナス體ハ醜クノ壓縮シタリ前足ノ指ハ二束ニ分岐ス牝ハ完全ナル囊ヲ有ス上ハ灰白色ニノ下ハ黄白色ナリ體長ハニアリスニノ新和蘭ノ森中ナル樹上ニ棲ムモノナリ柔和ナル動物ニノ殊ニ植物ヲ以テ食トス

第五科 飛囊兔類

大且ツ強ナル動物ニノ甚ダ大ナル切齒ヲ具ヘ上顎ニ小犬齒アリ或ハ上下ニ無キアリ其他鈍

臼齒ヲ有ス飛脚ニノ多クノモノハ反芻シ唯アウストラリオンニノミ棲メリ

第一屬 「ボトル」

后足ニ拇指ナク長尾ハ鱗狀ヲナシ僅ニ毛ヲ生ゼリ上顎ハ犬齒ヲ具ヘ其二枚ノ中門齒ハ爾他

モノナリ柔和ナル動物ニシテ殊ニ植物ヲ以テ食  
トス

第五科 飛囊兔類

大且ツ強ナル動物ニシテ甚ダ大ナル切齒ヲ具ヘ  
上顎ニ小犬齒アリ或ハ上下ニ無キアリ其他鈍

臼齒ヲ有ス飛脚ニシテ多クノモノハ反芻シ唯「ア  
ウストラリオン」ニシテ棲メリ

第一屬 ホトル

后足ニ拇指ナク長尾ハ鱗狀ヲナシ僅ニ毛ヲ生  
ゼリ上顎ハ犬齒ヲ具ヘ其三枚ノ中門齒ハ爾他  
ノモノヨリ長シ

（ポトル 第五十一圖） 南京兔大ニシテ耳短ク口先

ハ薄ク尖リ上唇ハ割分シ肢部太ク長シ足指ハ  
長キ鎌狀ニ彎屈セル鈎爪ヲ具フ上ハ褐色ニシテ  
下ハ汚白色ナリ體長ハ一「フ」ス三「ツ」ナルナリ新  
南ウ「レス」及「ファン」ト「メン」ス國ニ小群ヲナシ  
地上ニ居ルモノニシテ夜中ハ幹洞中ニ潛メリ

第二屬 更格廬

后足ハ拇指ナク其第二、第三指ハ鈎爪ニ至ルマ  
デ密着セリ第四及第五指ハ鈎爪ハ蹄狀ヲナス  
尾ハ毛ヲ生ジ犬齒ハ全ク無ク門齒ハ九テ同長  
ナリ

（大更格廬 第五十二圖） 最大囊動物又タ「アウス

トラリオン」ノ最大陸哺乳動物ニシテ后體ハ前體  
ヨリ著シク膨大セリ頭ハ相應ニ小ク口先ハ鈍



レ上唇ハ割レタリ耳及頸ハ可ナリ長ク短キ前脚ハ分岐シタル五指ヲ有ス后脚ハ數倍長レ上ハ灰白褐色ニシテ側面ハ明色トナリ下ハ白色ナリ體長ハ三「フース」十一「ツォル」尾ノ長ハ二「フース」十「ツォル」ナリ牝ハ著シク小ナリ新和蘭ノ禾本類ノ生殖スル野原ニ棲ミ森ニ居ルハ僅少ナリ不  
斷狩驅スルヲ以テ既ニ今日ニ至テハ以前ヨリ減少スルニ至レリ飛ブ「十五」フースヲ越ユ特  
リ禾本及樹葉ノミヲ以テ食トシ反芻ス獨シニ  
アツテハ其肉ヲ食用ニ供ス

第六科 有囊鼯鼠類

下顎ハ唯前ヨリ后方ニ運動スベク兩顎ニ犬齒  
ナク門齒ハ長ク臼齒ハ鈍ナリ后脚ハ前脚ヨリ  
稍々長ク歩行ニ適ス「アウストラリオン」ニ住居  
ス

第一屬 有囊鼯鼠

前足及后足ハ五指ニシテ后足ノ拇指ハ爪ナク前  
足ノ鈎爪ハ穿掘ニ適シ尾ハ株狀ヲナスノミナ  
リ

有囊鼯鼠 第五十三圖

醜クシテ大サ凡ソ權ニ同

ジク齒ノ構造ハ啮齒類ニ似タリ口先ハ短ク大  
キク且ツ鈍ク上唇ハ割レタリ后脚ハ前脚ヨリ  
僅ニ長ク上ハ帶黃褐色ニシテ下ハ白色ナリ體長  
ハ一「フース」ニ「ツォル」ニシテ新和蘭及其近傍ノ一二  
島中ニ棲ム森中ニ在テ深路ヲ地中ニ穿ツモノ

第一屬 有囊鼯鼠

前足及后足ハ五指ニメ后足ノ拇指ハ爪ナク前足ノ鈎爪ハ穿掘ニ適シ尾ハ株状ヲナスノミナリ

有囊鼯鼠 第五十三圖

醜クメ大サ凡ソ權ニ同

ヅク齒ノ構造ハ啮齒類ニ似タリ口先ハ短ク大キク且ツ鈍ク上唇ハ割レタリ后脚ハ前脚ヨリ僅ニ長ク上ハ帶黃褐色ニメ下ハ白色ナリ體長ハ一「フース」ニ「ツォル」ニメ新和蘭及其近傍ノ一二島中ニ棲ム森中ニ在テ深路ヲ地中ニ穿ツモノニメ夜獸ナリ

第五目 啮齒類

上顎及下顎ニ每二枚ノ四稜ニメ彎屈セル突出門齒即チ啮齒アリテ若シ摩滅スレバ直チニ再生ス犬齒ナクニ乃至六枚ノ種々ニ型成スル臼齒ヲ具フ唇ハ太ダ運動シ易スク口腔ニ屢々頬嚙アリ菜食哺乳動物ニメ太ダ小ク生活法ハ種々ナルヲ以テ之ニ適スル肢部ノ外型及構造ヲ有シ全地球上ニ蔓在シ増殖ハ太ダ強シ

第一科 猴鼠類

下顎ノ門齒ハ太ダ強ク壓縮シ尖刃ヲ具ヘ上顎ノモノ、如ク口ヨリ突出セリ脚ハ歩行ニ適シ前脚ヨリ后脚長シ唯「マダカスカル」ニメ棲ム

第一屬 猴鼠

后足ノ拇指ハ自他ノ指ニ對立シ扁爪ヲ具ヘ白

齒ハ上ハ四下ハ三粒頭狀ヲナス耳ハ大ニシテ尾ハ太ダ長クノ房狀ヲナス

(猴鼠 第五十四圖)

擬猴類 及 啮齒類ノ間ニ中立

スルモノニシテ大サ家猫ニ同ジク形チ栗鼠ニ同シ頭ハ大圓ニシテ口先ハ太ダ短クノ尖レリ上唇ハ割レズ大眼ハ前方ニ在リ耳ハ大且ツ潤ナリ而シテ半透明ナリ后足ハ真ノ手ニシテ側面ニ二箇ノ乳房アリ手及足ノ下側ハ裸ナリ上ハ帶赤褐色ニシテ下ハ帶黃白色ナリ體長ハ一「フース」六ツ「ル」ニシテ「マ」ダカスガ「ル」ノ西岸ナル森中ニアリ日中ハ不斷隱所ニ在テ眠ルモノナリ

第二科 栗鼠類

多分ハ小キ動物ニシテ尾ニ長キ毛アリ毛皮ハ軟ク頭ハ廣潤ニシテ眼ハ大ナリ門齒ハ口ヨリ僅カニ突出ス下顎ノ門齒ハ強ク壓縮シ尖刃ヲ有ス臼齒ハ上ニ五枚下ニ四枚アリテ多分ハ粒頭狀ヲナス歐羅巴、亞細亞、亞非利加 及 亞米利加ノ諸部ニ棲メリ

第一屬 鼯鼠

肢部ハ體ノ側面ニアリテ毛ヲ生ジタル一ノ緊

張膜ニ依テ互ニ結合セリ

(大鼯鼠 第五十五圖)

此科中ノ最大ナルモノニ

シテ「フース」十ツ「ル」ノ體長ヲ有シ眼ハ遙ニ突出シ而シテ大ナリ口先ハ尖レリ手及足ノ根ニ固着スル飛膜ハ飛行スルニ當リ風傘トナリ落ツル

ヲ方グモノナリ尾ハ房狀ノ一ノ緊

臼齒ハ上ニ五枚下ニ四枚アリテ多分ハ粒頭狀  
ヲナス歐羅巴、亞細亞、亞非利加及亞米利加ノ諸  
部ニ棲メリ

第一屬 鼯鼠


肢部ハ體ノ側面ニアリテ毛ヲ生ジタル一ノ緊

張膜ニ依テ互ニ結合セリ

(大鼯鼠 第五十五圖)

此科中ノ最大ナルモノニ

ノ一「フース十ツ」<sup>ツオル</sup>ノ體長ヲ有シ眼ハ遙ニ突出  
シ而シテ大ナリ口先ハ尖レリ手及足ノ根ニ固着  
スル飛膜ハ飛行スルニ當リ風傘トナリ落ツル  
ヲ防グモノナリ尾ハ房狀ヲナシ殆ンド體長ニ  
同ジ上ハ黑色ニシテ下ハ灰白色ナリ東印度ノ森  
中ナル樹上ニ居ル夜獸ナリ



明治十九年四月二十一日版權免許  
明治十九年六月 日出版

定價金八錢

譯者出版人

東京府士族

岩橋米太郎



東京糀町區永田町壹丁目  
廿四番地

發兌元


文會

舎


東京京橋區南鍋町壹丁目

五番地







10



10







457-4



明治十九年七月二日 内務省贈付 28

新刊



五

