



EFB/B 54265/B Vol II

N 2011
18/V

459 ff.
See. 73.





51380

SVMMA PLANTARVM
QVÆ HACTENVS INNOTVERVNT
METHODO LINNÆANA
PER GENERA ET SPECIES
DIGESTA ILLVSTRATA DESCRIPTA
A FVLGENTIO VITMAN

A.B. VALLUMBROS.
IN R. MEDIOL. LYC. PVBL. BOTANICES FRQF.
ET PLVR. ACAD. SOC.


TOMVS II.



MEDIOLANI. MDCCCLXXXIX.

TYPIS IMPER. MONAST. S. AMBROSII MAJORIS.
SYPERIORVM PERMISSV.

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library


https://archive.org/details/b28770584_0002

CLASSIS V.

CONTINUATIO.

PENTANDRIA
MONOGYNIA.

303. CES-
TRUM. **C**Or. infundibulif. Stam. denticulo in medio.
Bacca 1-locul. polysperm.
Differet a Lycia bacca 1-locul.
- 1. nocturnum.** C. fl. pedunculat: fol. ovat-acutis. *Syst. veg. ed. 14.*
Jasminoides &c. *Dill. elth. tab. 153. f. 185.*
Jasminum &c. *Sloan. Jam. 2. tab. 204. f. 2.*
Syringa &c. *Pluk. alm. tab. 64. f. 3.*
Parxu. *Few. peruw. 2. tab. 32. f. 1.*
In Jamaica, Chilli &c. ♂.
Dens inter lacinias singulas cor. Frutex 2-cubit.
& ultra, ramis longis, superne in latera ver-
gentibus. Fol. alterna, breviter petiol. Citri-
form. margine involuto, supra læte virid. sub-
tus dilutiora. Fl. axill. & terminal. racemosi,
intus albidi, extus virescent. odori, per diem
clausi. Fruct. atro-cœrul.
- 2. vespertinum.** C. fl. lateralibus, subspicat: fol. elliptic. *Syst.*
veg. ed. 14. Nov. comm. Gætt. Vol. V. tab. 8.
Ixora alternifolia. *Jacq. amer. piç. tab. 16.*
Jasminum &c. *Plum. ic. tab. 157. f. 1.*
C. fruticosum. *Aubl. Guian.*
In Antillis ♂.
Arb. 2-orgyal. Rami infer. patentiss. superior.
adscenden. alterne undiq. dispersi, 1-2-ped.
viridi-grisei: ramulosi. Propagines foliosæ.
Fol. alterna, vel solitar. conferta, breviter
petiolat. repanda, integerr. utrimq. viridia,
subtus venis transversalibus fere paralellis,
convexis, varie flexa, nitida. Fl. axill. con-
ferti, bini-terni-quaterni (per Linn. 6-9.) ve-
luti umbellati, sessil. divergentes, mane, &
vespere expansi. Cor. fere pollic. extus virid.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

margine apice inflexo, ad latera, & intus alba.

3. diurnum. C. fl. sessilibus. Syst. veg. ed. 14.

Jasminoides &c. Dill. eth. tab. 154. f. 186.

Laureola &c. Pluk. alm. tab. 95. f. 1.

Hediunda &c. Few. per. tab. 20. f. 3.

In Chilli, Havana &c.

Frutex 8-10-ped. post 3. a satione annos, superne in ramos 1-2-ped. divisus. Fol. Laureola semper virentis, nervo medio albicante; contrita odorem foetidum olen. Fl. in summis aliis 8-9. colecti, breviores quam in priorre, non ita odorii, virescent. Differt a laurifolio, peduncul. longioribus; limbo cor. latiore; filamentis nudis; fol. lanceol. nec ovalibus; fl. albis, nec luteis.

4. tomentosum. C. fl. terminalibus, confertis, sessilibus: ramis foliis, calycibusq. tomentosis. Syst veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In Amer. meridion. &c.

Fig. foliorum, florumq. ut in *C. diurno*, sed calyc. rami, foliorumq. pagina inter. tomentosa: calyc. ma: cor. coloratæ; tubo breviori, limbo magis ampliato.

laurifolium. C. filamentis denticulatis, nudisve: fol. ellipticis, coriaceis, nitidissimis: pedunculis petiolo brevioribus. Herit. Stirp. nov. fasc. 4. tab. 34.

Laureola &c. Pluk. phyt. tab. 95. f. 1.

In America &c.

Frutex semperflorens, lucidus. Rad. ramosa, rugosa, cinerea. Caul. erectus, teres, rugosus, cinereus, ramosus. Rami suberecti, alterni, teretes. Fol. sparsa, breviter petiolata, elliptica, seu ovata, obtuse acumin. acuminis reflexo, integerrima, uninervia, costa utrinque prominente, glaberrima, virentia, subitus pallidiora, patentia, reclinata, perennantia, 2-3. poll. longa, 1.½ poll. lata. Petioli suberecti, fol. sexies breviores, hinc teretes, inde plani, atropurpurasc. Pedunc. axillar. & terminal. secus apicem ramulorum, erecti, breviss. subcorymbosi, multifl. vix bracteati. Fl. conferti, sessiles, luteoli, 6. lin. long. 4. lin. lati. Bracteæ, dum adiunt, lineares, sub-fl.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

5

Diagnosis. Genitalia inclusa. Pedunc. breviss.
Fol. perennantia, nitentia.

auriculatum. C. filamentis edentatis: stipulis lunatis. Herit. Stirp. nov. fasc. 4. tab. 35.

Hediunda &c. Feuill. Obs. 3. tab. 20.

In humidis Limæ H.

Frutex 2-orgyal. foetidissimus. Rad. ramosa, spadiceo-albida. Caul. saepe pl. erecti, teretes, subramosi, cinerei. Lignum odore viroso. Rami erecti, alterni, cinerei, verrucis adspersi. Turiones teretes, virides, pubescentes. Fol. alterna, petiolat. oblong-lanceol. acuminata, basi acuta, integra, plana, vel subundulata, glabra, costa subtus tantum prominente, nervulis alternis, laxis, patentissimis, virentia, subtus pallidiora, patentia, 5 poll. longa, 20-lin. lata. Petioli foliis quater breviores, hiuc teretes, inde planiusculi. Stipul. axill. fol. similes, ramulum cingentes. Paniculæ terminal. basi constantes spicis alaribus, erectæ, foliaceæ, bracteatæ, villosæ, 3-poll. longæ. Pedunc. axillar. alterni, patuli, multifl. Fl. conferti, vix pedicellati, herbacei, 8-lin. longi, 4-5-lin. lati. Bract. rariores, lineares.

Diffr. a C. vespertino, fol. planis, nec margine conniventibus; stipulis auriculatis, nec nullis; fl. paniculatis, nec tantum corymbosis. A C. Parqui, caul. minus paniculato; stipul. lanceol. nec linearibus; tubo cor. cylindrico, nec clavato; limbo linear-lanceol. nec revera lanceol: filament. brevissim. edentulus.

Parqui.

C. filamentis denticulatis, nudisve: caul. florifer, paniculato: stipul. linearibus. Herit. Stirp. nov. fasc. 4. tab. 36. Feuill. Obs. 3. tab. 32.

Habitat Conceptionis Ciles in humidis H.

Frutex orgyal. foetidus. Rad. stolonifera, exalbida, foetens. Cotyled. binæ, ovatæ, obtusæ, vix petiol. Caul. plurimi, erecti, ramosi, teretes, rimosi, cinerei. Rami patuli, alterni, teretes, tuberculis subadspersi. Turiones virides, glabri. Fol. alterna, petiolat. lanceol. seu angusto-lanceol. aut utrimq. acu-

tissima, integerrima, subundulata, glabra, subtus costa elevata; patentia, læte viridia, concolora, 4-poll. longa, 1-poll. lata. Petiol. breviss. hinc teretes, inde planiusculi. Stipul. instar foliorum nascentium axillares. Paniculæ terminal. erectæ, foliaceæ, bracteatae, glabrae, compositæ spicis axillaribus, simplicibus, vel compositis, patulis, 2-poll. longis. Fl. congesti, subsessil. obscure lutei, noctu odo ri, 8-lin. long. 6-lin. lati. Bractea linearis, acuta, sub calycibus patens.

304. LYCIUM. Cal. 5-dent. Cor. tubulosa, fauce clausa filamentorum barba. Baccæ 2-locul. polysperma.

1. japonicum. L. inerm: fol. ovat. nervosis, planis: fl. sessilibus. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. tab. 17.

In Japonia H.

Frutex erectus, vix orgyal. ramosiss. Fol. opposita, subsessil. inferne attenuata, obtusa cum acumine, integerr. nervosa, patentia, glabra, supra sature virid. unguicular. minoribus intermixtis. Fl. in ramulis e fasciculo fol. solitar. vel. adgregati, erecti, sessil. decidui. Cor. tubo viridi-albo; limbo incarnato. Var. fl. pleno.

2. barbatum. L. inerm. glabrum: fol. oblong. glabris: fl. adgregatis, pedunculat: stipulis barbatis. Syst. veg. ed. 14.

L. inerme. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei H.

3. afrum. L. fol. linearibus. Syst. veg. ed. 14. Trew. chret. tab. 24. Mill. did. tab. 171. f. 1.

Jasminoides &c. Niss. ad. 1711. tab. 12. Mich. gen. tab. 105. f. 2.

In Africa, & in regno Valentino H.

Frutex rectus, rigidus. Spicæ confertiores quam in L. europæo. Fl. atro-purpurasc. Baccæ magnæ, globosæ, atro-rubræ.

4. ruthenicum. L. spinosum; fol. fasciculat. linearibus: ramis dependeuntibus: Syst. veg. ed. 14. Comm. Got tin. 1779. Vol. 2. tab. 2.

Frutex 6-ped. Spinæ axill. solitar. alterne, 2-lin. longæ. Fol. quina-novena, plura, obtusa, succosa, subglaucæ, patent. Fl. 2-4. peduncul. inter fol. spinis min. Cal. apice purpur. Cor. extus viridi-purpurasc. intus purpur.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 7

fauce pallida, striis 15. saturationibus. Bacca depressa, umbilic.

5. *fætidum*. L. fol. opposit. ovat-lanceol. stipul. interfoliac. setaceo-spinescentibus : fl. axillar. sessilibus.
Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In China, Japonia.

Fol. trita odorem stercoris olen.

6. *terrandrum*. L. spinosum ; fol. ovatis, acut. carnosis: ramis angulatis, glabris: cor. 4-fid. tetrand. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Simil. L. afro. An satis distinctum reddant carnositas, & num. flam. quaternarius?

7. *Boerhaaviae*- L. spinosum ; fol. ovat. integerr. acutis, glaucis : fl. paniculatis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ehretia halim. fol. Herit. Stirp. fasc. 3. tab. 23.

In Peru H.

Frutex pulcherrimus, caul. spinoso, ramis inermibus. Fol. pollic. Fl. L. barbata, coerulea, odorata. Fl. Lycii staminibus barbatis. Fruct. Ekretiae.

8. *heterophyl-* L. fol. ovat. flexuosis, glaucis ; ramis horizontalibus : spinis gemmaceis. Syst. veg. ed. 14. Comm. Gott. 1783. tab. 2.

9. *barbarum*. L. spinosum ; fol. lanceol. calyc. sub-2-fid. Syst. veg. ed. 14.

Jasminoides &c. Duham. arb. I. tab. 121. Trew. Ehret. tab. 68.

In Europa, Asia, Africa H.

Frutex debilis, ni substantetur, decumbens. Cortex ramorum exalbidus. Fl. e singulis gemmis solitar. raro bini, intus pallide rubicundi. Bacca ovata, coccin.

10. *europaeum*. L. spinosum ; fol. obliquis ; ramis flexuosis, teretibus. Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 105. f. I.

In Europa australi H.

Frutex ramosiss. Fol. 5-6. ex eadem gemma prodeunt. Fl. e singulis gemmis 2-5. Cal. 5-fid. Cor. limbo patente, fauce pallida, nigro-striata, intus purpurasc.

Differ a L. barbaro, quod per se recta stare valet; quod fol. non plana, sed obliqua, seu flexuosa: quod ramuli flexuosi, minime angulati, ulla linea a petiol. decurrente; superficie non glabra,

PENTANDRIA MONOGYNIA :

sed subtomentosa; & quod spinæ ex omni gen-
ma. A. L. afro, fol. lanceol. ramis flexuosis,
teretibus; fructu parvo.

ii. capsulare. L. spinosum; f. l. lanceolat. tenuibus, glabris:
 pedunc. calycibusque pubescentibus: pericarp.
 capsularibus. Syst. veg. ed. 14.

In Mexico ♂.

Frutex rainis teretibus. Spinæ simpl. patentes.
 Fol. subpetiolat. Pedunc. axill. 1-fl. Caps.
 ovata, mucronata.

indicum.

L. inerm. fol. ovat. utrimq. acutis, nervosis.
Retz. Obs. fasc. 2. Kæmph. am. acad.

Frutex lævis, strictus, ramis brevibus, patentibus.
 Fol. parva, opposita, in petiol. tenues
 desinentia, integerr. subtrus pallidiora. Stip. 2.
 spiniform. molles, fuscæ. Fl. ad apices ramorum,
 sessil. obscure purpur.

305. JACQUINIA. Cor. 10-fid. Stam. receptaculo inserta.
 Baccæ 1-sperm.

1. armillaris. J. fol. obtusis cum acumine. Syst. veg. ed. 14.
Jacq. amer. tab. 39. ed. 2. piæt. tab. 56.

In America ♂.

Arbusc. sub 5-ped. ramis verticillat. patentibus.
 Fol. verticillata, in petiol. breviſſ. attenuata,
 subrot-oblong. interdum emarginata, integerr.
 margine quandoque revoluto, coriacea, rigida,
 nitida. Racemus terminal. 2-pollic. laxus,
 sub-7-fl. pendulus, pedunculis ramosis. Fl.
 parvi, albi, odore Jasmini. Baccæ pīsform.
 ex aurantio-rubentes. Sem. cartilagin. flavo-
 subfuscæ: quibus perforatis armillas efformant
 incolæ.

2. ruscifolia. J. fol. lanceol-acuminat. Syst. veg. ed. 14. Jacq.
 ed. piæt. tab. 57.

Fruticulus &c. Dill. elth. tab. 123. f. 149. optima.
In Amer. merid. ♂.

Habitus prioris. Frutex 3-ped. Fol. breviora,
 rigidiss. pungentia. Pedunc. penduli, 1-fl.

3. linearis. J. fol. linearibus, acuminat. Syst. veg. ed. 14. Jacq.
 amer. tab. 40. f. 1. ed. 2. piæt. tab. 58.

In America ♂.

Habitus priorum, sed minus concinnus. Frutex 2-
 ped. ramosiss. Fol. 4. verticillata, subsessil. pol-
 licar. saepe contorta, pungent. Pedunc. termini-

PENTANDRIA MONOGYNIA. 9

nal. penduli, 1-fl. Fl. rigidiusc. inodori. Petal. aiba, lacin. convexis.

306. CHIRONIA. Cor. rotata. Pistill. declinatum. Stam. tubo cor. infidentia. Anth. demum spiral. Peric. 2-locul.

1. *trinervia*. C. herbacea; calycin. foliol. membranaceo-cari-natis. Syst. veg. ed. 14.

Lysimachia &c. Burni. Zeyl. tab. 67.

Ad cap. b. Spei ⊖.

Tota planta amarissima. Caul. 4-gon. acutus: Fol. opposita, lanceol. acumin. integerr. trinervia, glabra. Fl. ex summis alis oppositi, pedunculat. solitar. Cor. anpla, cœrul.

2. *Jasminoides*. C. herbac., caul. 4-gono; fol. lanceol. Syst. veg. ed. 14.

Ad cap. b. Spei.

Caul. altus, lœvis. Fol. opposita, sessilia, erecta, integerr. glabra. Panicula terminal. erecta, dichotoma, paucifl. Bract. oppositæ, subulat. Cor. magnitudine Tabaci.

3. *Lychnooides*. C. caul. simplic. fol. linear-lanceol. Syst. veg. ed. 14.

Ad rad. montium cap. b. Spei.

Caul. 2-ped. strictus, teres. Fol. opposita, con-nata, lœvia, erecta. Peduncul. terminal. 3. quorum lateral. instructi bractearum pari subulato. Cor. purpur. magnitudine Gladioli.

4. *campanulata*. C. herbac., fol. lanceol-linearibus: calycibus longitud. cor. Syst. veg. ed. 14.

In Canada.

Caul. pedal. teres, ramis longis. Fol. lœvia. Fl. terminal. solitar. purpur. longe pedunculati.

5. *angularis*. C. herbac., caul. acutangulo: fol. amplexicaulibus, ovatis. Syst. veg. ed. 14.

In Virginia.

Facies Cent. min. Caul. pedal. alis membranac. Fol. opposita. Fl. congesti ut in Hyperico.

6. *linoides*. C. herbac., fol. linearibus. Syst. veg. ed. 14.

Rapuntio &c. Breyne. cent. tab. 90.

In cap. b. Spei herbidis 24.

Caul. suffruticos. ramosus. Fol. pollicar. opposita, sessil. succulenta, glabra. Fl. peduncul. solitar. Cal. semi-2-fid. obtusus. Cor. coccinea.

7. *nudicaulis*. C. herbac., fol. oblongis, obtususc. caulis sub

2-phyll. simpliciss. 1-fl. calycibus dentibus se-
taceis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Fol. saepe in cespitem radicata.

8. *tetragona*. C. fruticosa; fol. ovat. obtusiuscul. trinerviis: fo-
liol. calycin. obtusiusc. carinatis. *Syst. veg. ed.
14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Flos maior, luteus. *Differet a C. trinervia, quod
nostra sit fruticosa; fol. breviora obtusiora.*

9. *baccifera*. C. frutesc. baccifera. *Syst. veg. ed. 14.
Centaurium minus &c. Comm. rar. tab. 9.
In Æthiopia ♂.*

*Simil. C. Linoidi. Frutex ramosus, 4-gon. Fl.
terminal. solitar. Calyc. breves, subulati. Cor.
rubicunda.*

10. *frutescens*. C. fruticosa, fol. lanceol. subtomentosis; calyci-
bus campanulat. *Syst. veg. ed. 14. Mill. dict.
tab. 97.*

*Centaurium &c. Comm. rar. tab. 8. Burm. Afric.
tab. 74. f. 1.*

In Æthiopia ♂.

*Frutex ramis cinereis. Fol. sub-2-pollic. oppo-
sita, sessil. obtusa, carnosa. Pedunc. axill. fo-
liol. binis, 2-3-fl. Rami corymbosi. Calyc. fo-
liol. ovat. obtusa, subtoment. tubo cor. multo
latiora. Fl. quadruplo ma. priore. Cor. rubra.*

307. **CORDIA**. Cor. infundibulifor. Styl. dichotomus. Drupa
nucleis 2-locular.

1. *Myza*. C. fol. ovatis, supra glabris: corymb. lateralibus:
calycibus 10-striatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Sebætæna. Black. tab. 398. Comm. hort. I. tab. 72.

Prunus &c. Pluk. alm. tab. 217. f. 3.

Vidi-maram. H. Mal. 4. tab. 37.

In Ægypto, Malabarica ♂.

*Arbor grandis, ramosa, cortice fusco. Gemmæ
prætuberant. Folia Alni, petiolis contortis,
sparsa, basi minimo spatio angustata, apice a-
cuminato, subtus scabra, undulata, exsucea,
fere coriacea, supra sature, subtus dilute vi-
rentia, quandoq. nervis albido-ferrugin. Cor.
lutea. Drupa globoso acumin. pedicellat. ca-
lyce cincta. Nuclei dulces, adstringentes.*

2. *spinescens*. C. fol. ovat. acutis, serratis, scabris; petiolis
subspinescentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In India Orient. ♂.

Rami stricti, tomentosi, ferruginei. Fol. alterna, petiolat. tomentosa, supra magis scabra, magnitudine fol. *Cerasi*. Pedunc. breviss. Racemus axillar. simpl. vel 2-fid. filiform. Cor. 5-dent. calyce duplo ma. Fruct. sparsi, sessil. nigri, magnitudine *Ribeos*.

3. *Sebestena*. C. fol. oblong-ovat. repandis, scabris. Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. ed. 2. pict. tab. 44. Plum. ic. 105. Dill. elth. tab. 255. f. 331.

Cornus sanguinea. Forsk. Æg. Vahl.

Caryophyllus &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 64. Catesb. car. 2. tab. 91.

Novella nigra. Rumph. amb. 5. tab. 75.

In India ♂.

Arbusc. 10--ped. erecta, foliosa. Fol. maxima, quandoq. subrotunda, iuniora serrata, adulta vix repanda, suprema certe integerr. Stipul. nullæ. Racemi errecti, primo terminales, dein elongatis ramis laterales. Fl. plurimi, speciosi, leviter odori. Cal. oblong. 3-fid. Cor. figuræ *Mirabilis*, fulvo-lutea, aestivatione rugosiss. *Papaveris*.

4. *Gerascanthus*. C. fol. lanceol-ovat. scabris; panicula terminal. calycibus 10-striat. Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 175. f. 16. ed. 2. pict. tab. 259. f. 12. Brown. Jam. tab. 29. f. 3.

In Jamaica ♂.

Arb. 30-ped. erecta, superne ramosa. Fl. corymb. gemelli. Cor. 5-fida, alba, lacin. oblong. Fruct. turbinatus, carnosus.

5. *macrophylla*. C. fol. ovat. villosis, sesquipedalibus. Syst. veg. ed. 14.

Prunus &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 221. f. 1.

In Jamaica ♂.

Arb. 50-ped. ramis incurvis. Fol. petiolat. rugosa, late viridia. Racemi umbellati. Fructus Fabæ maioris magnitudine, rubri.

6. *Callococca*. C. fol. cordat-ovat. integerr. fl. corymbosis: calycibus interne tomentosis. Syst. veg. ed. 14.

Ceraso &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 203. f. 2.

Ceresa &c. Pluk. phyt. tab. 158. f. 1.

In Jamaica ♂.

Arb. 6-pedal. superne ramosa, ramis sparsis; ramul. pilis ferrugineis. Fol. verticillata, 3-4-

inæqual. sessil. utrimq. pilis fuscis. Fl. axill. & terminal. Cor. subalbida. Fruct. albus.

tetrandra. C. fol. ovatis, subtus asperis: fl. corymbosis, parvis: fructu albo, tetrapyreno. *Aubl. Guian. tab. 57.*

In Guiana H.

Arb. 50-ped. superne ramosa, ramis sparsis. Fol. alterna, petiolat. acuta, undulata, integerr. supra glabra, subtus aspera, basi inæqual. pallide virentia. Corymb. ampliss. axill. & terminal. quasi umbellati. Cor. subvirid. Bacca globosa, alba.

tetraphylla. C. fol. verticillat. fructu Olivæform. *Aubl. Guian. tab. 88.*

In Guiana H.

Arb. 7-ped. superne ramosa, ramis, & ramulis sparsis. Fol. quaterna, breviter petiolat. oval. integerr. glabra. Fl. axill. corymb. Fruct. luteus.

flavescens. C. fol. ovat-oblong. acuminat. fructu Cerasiforma, e viridi-flavesc. *Aubl. Guian. tab. 89.*

In Caïenna, & Guiana H.

Frutex, 8-9-pedal. caulis sarmenotosis supra arbores sparsis. Fol. alterna, breviter petiol. integerr. glabra. Fl. axillar. racemosi. Bacca exfusca.

Toquerè. C. fol. cordatis, acuminat. villosis: fl. racemosis. *Aubl. Guian. tab. 90.*

In Caribæis H.

Frutex 6-ped. Caul. erecti, ramis tomentosis, ferrugin. Fol. alterna, breviter petiol. supra hirsuta, aspera, subtus tomentosa, pallide virid. Fl. axillar. & terminal. Pedunc. longus, nudus, villosus. Cor. alba. Nux carnosa, sublutea.

Juglandifolia. C. fol. oblong. scabris. *Jacq. amer.*

In Domingo H.

Arbusc. erecta, 12-pedal. inelegans. Fol. 4-5-pollic. acuta, integerr. utrimque scabra. Racem. axill. sesquipollic. paucifl. Cor. tubo cæteris triplo breviore.

303. PATAGONULA. Cal. fructiferus maximus. Cor. rotata. Stylus declinatus.

3. *americana*. P. fol. partim serratis, partim integris. Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 226. f. 293.
In Patagonia Amer. austr. H.
Cordiis adfinis: an istis associanda? Frutex facie inter *Ligustrum*, & *Alaternum*; post tertium a satione annum cubital. cortice e ciner-virente, punctis albis adspersus, superne hirsutus. Fol. *Alaterni*, dilute virid. modice cava, cum venis obliquis, utrimq. glabra, margine piloso. Fl. terminal. racemosi, albi, aut ex herbaceo-albidi, odore fl. *Sambuci*.
309. EHRETIA. Bacca 2-locular. Sem. solitaria, 2-locul. Stigm. emarginatum.
1. *tinifolia*. E. fol. oblong-ovat. integerr. glabris: fl. paniculatis. Syst. veg. ed. 14. Trew. Ehret. tab. 25. Brown. Jam. tab. 16. f. 1.
Cerafo &c. Sloan. Jam. 2. tab. 203. f. 1.
In Jamaica H.
 Arb. 20-30-ped. coma oblonga, densa. Fol. sub 4-pollic. alterna, breviter petiol. Racem. terminal. magni, oblong. Fl. multi. Pet. reflexa, alba, subgraveolent. Fruct. flavus, edul. dulcis.
2. *spinosa*. E. *spinosa*. Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 80. f. 18. ed. 2. pict. tab. 259. f. 14.
In America H.
 Arb. 25-30-ped. Spinæ subaxill. crassissimæ. Fol. 3-4-pollic. breviter petiol. oblon. obtusa, basi attenuata, integerr. quandoq. repanda, nitida. Racemi breves, subcorymbosi. Fl. plurimi, parvi. Cor. flava. Fruct. pisiform. ruber.
3. *Bourreria*. E. fol. ovat. integerr. lævibus: fl. subcorymbos. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obj. 2. tab. 26. amer. pict. tab. 45.
Bourreria &c. Brown. Jam. tab. 15. f. 2.
Mespilus &c. Comm. hort. 1. tab. 79.
Pittoniae &c. Catesb. carol. 2. tab. 79.
Jasminum &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 204.
In Jamaica H.
 Arbuscul. sub 15-ped. Fol. alterna, petiol. varia, lævia. Fl. terminal. Cor. alba, laciniis subrotun. Bacca 4-gona, crocea, aut aurantiaca, succulenta, nitida, edulis, dulcis.
- Adfinitas cum Cordia.*
4. *exsucca*. E. fol. cuneiformi-lanceolat. margine reflexis. Syst. veg. ed. 14.

PENTANDRIA MÖNÖGYNIA.

Bourreria &c. Jacq. amer. tab. 173. ed. 2. piæ.
tab. 259. f. 13. quoad fl. & fructum.

In Amer. meridion. H.

Arbusc. 15-pedal. Fol. 2-pollic. alterna, glaberrima. Racemi subterminal. subcorymb. Fl. maius priore. Cor. alba, leviter odora, laciniis cordatis. Bacca 4-gona, leviter 4-sulcata, exsuccta, viridis, dein e nigro-rufescens.

dubia.

E. pedunc. 1-fl. adgregatis. Jacq. Obs. 1. p. 19.
In Jamaica.

Fol. magnitudine varia, oblong-lanceol. acuta, alterna, petiolat. integerr. glabra. Fl. parvi, sordide albentes.

internodis.

E. fol. ovatis, integris: fl. lateralibus paniculat. Herit. Stirp. fasc. 3. tab. 24.

Subria s. Soubriisia. Commers. MSS.

In saxosis montibus Mauritiae H.

Frutex sesquiorgyal. Caul. erect. teres, reticulato-rimosus, cinereus. Rami sparsi, diffusi, teretes, reticulati, punctis exalbidis tuberculati. Turiones scabriuscui, virid. mox rufescens. Fol. alternatim sparsa, petiolat. acuta, patentia, basi saepe subinæqualia, nervosa, rugosa, venosa, glabra, virentia, subtus pallidiora, reclinata, lateribus conniventia, 3-poll. longa, 20-24-lin. lata. Petiol. scabri. Paniculae alis vix remotæ, peduncul. patulæ, laxæ: pedunc. solitar. apice ramosi. Fl. pedicellati, albi, suaveolent. 3-lin. lon. & lati.

Dignoscit. paniculis lateralibus, alari-internodibus.

310. VARRONIA. Cor. 5-fid. Drupa nucleo 4-locul.

1. *lineata.* V. fol. lanceol. lineatis: pedunc. lateralibus, petiolo adnatis: spicis globosis. Syst. veg. ed. 14. Ulmi &c. Pluk. alm. tab. 328. f. 5.

In America H.

Frutex ramis subpilosus. Fol. alterna, petiolis brevibus, articulatis innixa, remota, utrimque attenuata, nonnullis crenis ferrata, nutantia, scabra, subtus tomentosa. Pedunc. attenuati, filiform. Capitul. axill. subrotundum. Cor. parva, flava.

2. *bullata.* V. fol. lanceol-ovatis, venoso-rugosis: spicis globosis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 33. ed. 2. piæ. tab. 43.

In America H.

Altitudo sub-12-ped. Fol. 2-pollic. alterna, scabra. Fl. *Mirabilis Jalapæ*, pulchri, candidi, inodori. Drupa rubra.

3. *martinicensis*. V. fol. ovatis, acuminat: spicis oblongis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 32. ed. 2. piçt. tub. 42.

In Martinica H.

Altitudo humana. Fol. 3-pollic. utrimq. scabra. Spicæ 1-2-pollic. Fl. ut in priore. Drupa pisiiform. rubra, pulpa dulci. Nux depreßa.

4. *globosa*. V. caul. dichot. fol. lanceol-oblong. pedunc. axillaribus, elongat. nudis: spicis globosis. Syst. veg. ed. 14.

In America H.

Differt a priore spicis globosis: cor. laciniis emarginatis: stigmate obtuso, quadruplici.

Calyc. dentes recurvati, longi.

5. *curassavica*. V. fol. lanceolat: spicis oblong. Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 221. f. 3.

In America H.

Frutex 15-ped. ramis senioribus ferrugineis. Fol. alterna, petiolat. acuta, ferrata, rugosa, venosa, odora, supra scabra. Spicæ terminal. densæ, peduncul. Fl. parvi, inodori. Cal. inflatus. Cor. alba, limbo brevi, & emarginato. Drupa parva, rubra.

6. *alba*. V. fol. cordatis: fl. cymosis. Syst. veg. ed. 14. Mespilus &c. Comm. hort. I. tab. 80.

In America H.

Arb. 30-ped. coma ampla. Fol. 4-5-pollic. subrotundo-ovata. Cymæ amplæ. Fl. numerosi, albi, inodori. Cor. limbo campanul. Drupa oblongiusc. semipollic. subpellucida, albescens, edulis. Nux oblonga, striata, nigra. Pulpa albida, dulcis.

macrostachya. V. spicis oblong. fol. lanceol-oblongis. Jacq. amer. In *Carthagenæ fruticosis* H.

Arbusc. erecta, 12-ped. Fol. semipedal. angusta. Spicæ semiped. Reliqua ut in *V. curassavica*.

humilis. V. spicis subrotund. fructibus dispermis. Jacq. amer. Brown. Jam. tab. 13. f. 2.

In maritimis Caribœarum H.

Frutex 4-ped. ramosus, similis *V. globosæ*, ut forte var. sed nuces 2-locul.

16 PENTANDRIA MONOGYNIA.

311. LAUGIERIA. Cor. 5-fida. Drupa nucleo 5-locul.

I. odorata. L. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 177. f. 21.
ed. 2. piæ. tab. 256. f. 16.

In America ♂.

Frutex erectus, 10-ped. ramosus. Fol. 2-pollic.
opposita, petiolat. subovat. acuta, integerr.
glabra. Racemi axillar. paniculati, laxi. Fl.
tristes, sordide rubentes, noctu odoratiss. Fru-
ctus Piso ma: molles, aterrimi. Variet spinosa,
& inermis.

312. BRUNSFELSSIA. Cor. infundibulif. longiss. Bacca 1-locul.
polysperma.

I. americana. B. fl. albo: fructu croceo, molli. Syst. veg. ed.
14. Plum. ic. 65.

In Amer. meridion. ♂.

Est didynama angiosperma.

Planta frutesc. Fol. petiolat. oblonga, obtusa,
seu obverse ovata, integerr. venosa. Fl. ter-
minal. pl. Cor. speciosa, 5-fid. tubo villoso.
Anth. extra cor. tubum. Pistil. longiss. Bacca
globosa, carnosa.

313. CHRYSOPHYLLUM. Cor. campanul. 10-fida, lacin. al-
ternis erectis; alternis patulis. Bacca 10-sperm.

I. Cainito. C. fol. ovat. paralello striatis, subtus tomentoso-
nitidis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 37.
ed. 2. piæ. tab. 51. Pluk. phyt. tab. 262. f. 4.

b. C. fol. oblong-ovatis, superne glabris, subtus
ferrugineis: fl. alaribus, corymbosis. Mill. dic.

y. C. jamaicense, fructu purpur. Jacq. amer.
Anona &c. Sloan. Jam. 2. tab. 229.

d. C. cœruleum &c. Jacq. am. tab. 37. ed. 2. piæ.
tab. 52.

e. C. microphyllum &c. Jacq. am. piæ. tab. 53.
In Martinica ♂.

Aib. cortice subrufo. Fol. 5-pollic. alterna, bre-
viter petiol. acuta, integerr. subcoriacea, u-
trumq. striata, supra nitida, & sature virent.
subtus tomento col. aurei fulgentis, & Cinna-
momum imitantis. Pedunc. adgregati, breves,
sparsi, vel paucifl. Fl. parvi, albidi, inodori.
Fructus depressusc. rosei, cum lævi flavedine,
& virore mixti, edules. Sem. fusca.

Var. y. Fruct. subovat. viridi-purpur., carne purpur.

— d. Fruct. globosus, totus cœrul. triplo mia. Pulpa
cœrul.

2. argen-

PENTANDRIA MONOGYNIA. 17.

2. *argenteum*. C. fol. falcato-ovat. subtrus tomentoso-nitidis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 38. f. 1. ed. 2. pict. tab. 54.
In Hayana, & Martinica ♂.
Habitus prioris var. e. Fol. alterna, breviter petiol. integerr. supra virid. glabra. Fruct. subrotundi, sordide e purpureo-ciner. magnitudine Pruni mediocris, edules, carne molli, cœrulefsc.
3. *glabrum*. C. fol. utrimque glaberrim. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 38. ed. 2. pict. tab. 55.
In sylvis Martinicæ ♂.
Arb. erecta, 15-ped. ramosa. Fol. vix pollic. alterna, petiolat. ovata, acuta, subcoriac. integerr. utrimque nitida. Fruct. cœrul.
-
- Mocoucou.* C. fol. ovat-oblon. acuminat. utrimque glabris: fructu pyrifor. luteo. Aubl. Guian. tab. 92.
In Caribæis ♂.
Arb. excelsa, 30-ped. superne ramosa. Fol. alterna, breviter petiolat. integerr. utrimq. pallide virent. Fruct. corymbosi, aurantiaci; caro sublutea, edulis. Sem. nitida, rufescentia; amygdala alba, dulcis.
314. SIDEROXYLON. Cor. 8-10-fida, lacin. alternis, incurvis. Stigm. simpl. Baccæ 4-5-sperma.
1. *mite*. S. inerme, fl. sessilibus. Syst. veg. ed. 14.
An Laurifolia &c. Comm. hort. I. tab. 100. ? sed fl. absque dentibus inter stam.
In Africa ♂.
S. inerme; fol. obovat. perennantibus: pedunc. teretibus. Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 265. f. 344.
In Æthiopia ♂.
Planta arborea. Fol. breviter petiolat. obsolete retusa, subtrus venoso-rugosa, subpubescent. virid. glauca, oblique nervosa. Fl. axillar. & lateral. aggregati, pedicellati. Cor. rotata, herbaceo-albicans.
3. *melanophle-* S. inerme; fol. lanceolat. perennantibus: peduncul. angulat. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. I. tab. 71.
Padus &c. Burm. Afric. tab. 84. f. 2.
Laurifolia &c. Comm. hort. I. tab. 109.
Ad cap. b. Spei ♂.

Habitus Lauri nobilis. Cortex fuscus, nitidus. Fol. alterna, obtusa, subundulata, coriac. integerr. sature virid. Petiol. purpurasc. Fl. axill. glomerati. Cal. colorat. Cor. lacin. obtusis, concavis, patentibus, sature carnea.

Diffr. a S. inermi ramis non striatis, aut punctis verrucosis; peduncul. non teretibus &c.

4. *fœtidissimum.* S. inerm. fol. suboppositis: fl. patentiss. Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. piæ. tab. 32.

In Domingo, in sylvis montosis H.

Arbusc. 12-ped. Fol. 4-pollic. petiolat. lanceol-oblong. obtusa, undulata, nitida. Pedunc. axill. multi, 1-fl. Fl. albi, fœtidiss. Fructus Cerasi magnitudine.

5. *cymosum.* S. inerm. fol. opposit. petiolat: cymis compositis, & decompositis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei H.

Frutex parvulus.

6. *tenax.* S. subinerm: fol. lanceol. subtomentos. deciduis: peduncul. filiformibus. Syst. veg. ed. 14.

C. carolinense. Jacq. Obs. 3. tab. 54.

In Carolinæ siccioribus H.

Arb. 20-ped. cortice albicante, ramis tenacissimis. Pedunc. multi, policar. 1-fl. Fol. intra pedunc. 5-6. petiolat. obtusiusc. integerr. digital. Fl. parvi. Nectar. in fauce cor. 5-part. foliol. 3-fid. media fere longiore. Drupa ovalis. Nux ovata, nitida, basi foraminibus 2. septo arcuato distinctis. Var. spinis brevissim.

7. *lycoides.* S. spinosum; fol. lanceol. deciduis. Syst. veg. ed. 14. Duham. arbr. 2. tab. 68.

In Canada H.

Facies Lycii. Altitudo humana. Fol. alterna, petiolat. obtusa, undulata, integerr. virid. Spina axill. brevis.

8. *decandrum.* S. spinosum; fol. elliptic. deciduis. Syst. veg. ed. 14.

In Amer. Septentr. H.

Simil. priori, sed ab eo specie, aut cultura nimis varians.

Arbor. Spinæ axillar. solitariæ. Fol. alterna. Pedunc. axill. multi, 1-fl. Nect. 5-phyll. serratum, breve, ad singulam cor. laciniam singulo lobo adnato. Bacca globosa, nigra, 3-5. locul.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 19

9. *spinosum*. S. spinosum; fol. perennantibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Lycii &c. Comm. hort. I. tab. 83.

Lycium &c. Pluk. alm. tab. 202. f. 2.

Caro-mælli. H. Mal. 5. tab. 39.

In Malabaria H.

Frutex 4-5-ped. ramulis aculeatis. Fol. oblong-rotunda, crassia, densa, vix crenata, nitida, atro-virent. subtus dilutiora, nervosa. Fl. subvirid. graveolent. Baccæ primum virid. dein rubræ, tandem nigræ, acidæ.

pauciflorum. S. inerm. fol. alternis: fl. patentissim. *Jacq. amer. p. 55.*

In Domingo H.

Arb. erecta, 20-ped. Differt a *S. foetidiss.* fol. semper obtusis, planis, vereque alternis: peduncul. ternis-quaternis: fl. minus foetidis: cor. tubo breviss. lacin. apice concavis: ita minibus cor. æquantibus.

315. RHAM- Cal. tubulosus, 4-5-fid. intus coloratus; squa-
NUS. mis stamina munientibus. Petal. 4-5. Baccæ
2-3-locul. Dantur etiam fl. sexu distincti.

* *spinosi.*

1. *catharticus*. R. caul. erecto: fol. ovato-lanceol. spinis terminalibus: fl. 4 fid. dioicis. *Syst. veg. ed. 14.*

Fl. Dan. tab. 850. Duham. arbr. I. tab. 135.

Spina infectoria. Matth. 158. Lob. ic. 181.

In Europæ sepibus H.

Arbuscula ramosa, & frondosa, ramis senescentibus in spinam terminatis. Fol. petiol. subtiliter ferrata, nervis convergentibus. Fl. axill. fasciculati, herbidi, aut sublutei. Baccæ nigrae, nitidæ.

2. *infectorius*. R. caulibus procumbentibus: spinis terminalibus: fl. 4-fid. dioicis. *Syst. veg. ed. 14.*

R. cathart. minor. *Arduin. mem. I. tab. 14.*

Lycium gallicum. Bauh. hist. I. p. 58.

Spina infectoria I. Clus. hist. I. p. 111.

In Europa H.

Differt a priore caulis procumb. cor. laciniis longitud. tubi, nec longioribus.

Fol. subtus villosa. Cal. cyathiform. edentulus.

3. *lycioides*. R. fol. linearibus: spinis terminalibus. *Syst. veg. ed. 14.*

B ij

PENTANDRIA MONOGYNIA:

R. tertius &c. *Clus. hist.* I. p. 110.

In Hispania &c. H.

Fol. carnosæ, viridia. Fl. conferti iuxta fol. nascuntur. Cor. herbac. Baccæ nigrae.

4. *oleoides*. R. fol. oblong. integerrim. spinis terminalibus.

Syst. veg. ed. 14.

In Hispania H.

Simil. R. *cathartico*, sed min. Fol. ad gemmas 2-3. Oleæ simil. & min. lævia, consistentia,

breviter petiolat. obtusifl. reticulato-venosa.

Fruct. solitar. simil. R. *cathartico*.

5. *saxatilis*. R. spinis terminalibus: fl. 4-fid. hermaphroditis.

Syst. veg. ed. 14. *Jacq. Austr.* I. tab. 53. *Arduin.* tab. 14.

Spira infectoria, pumila 2. *Clus. hist.* I. p. III.

In Italia, Helvetia in or saxa.

R. *cathart.* humilior. Fol. breviter petiolat. lan-

ceol. vel ovata, obtusa, vel acutifl. ferru-

lata. Pedunc. aggregati, 1-fl. Baccæ pisiform.

nitidæ, atræ.

6. *theezans*. R. spinis terminalibus: fol. ovat. serrulat: ramis

divaricatis. *Syst. veg. ed.* 14.

R. *Thea*. *Osb. it.* 232. 161.

In China, pauperibus Theæ succedaneum H.

Arbusc. farmentosa. Fol. alterna, petiol. obtu-

siusc. lævia. Spicæ terminal. Fl. interrupto-

glomerati, minuti, sessil. Cor. 5-fid.

7. *pentaphyllus*. R. spinis lateralibus: fol. solitariis, quinatisque.

Syst. veg. ed. 14.

R. *siculus* &c. *Bocc. Sic.* tab. 21.

In Sicilia, Africa H.

Flutex ramis ferrugineis, spinis validis, vix

pollicar. Fol. *Buxi*, petiolat. covoat-oblon.

integerr. lævia, venosa, decidua. Fl. axillar.

conferti, sessil. 5-fid. hermaphrodit. Squamæ

binæ, ovatæ singulum fl. vestiunt. Cor. cam-

panul. 5-part. Nectar. suburceolat. Drupa ovat.

glabra. Nux ovata.

An huius generis?

** *Inermes*.

8. *Sarcophaga-* R. inerm: fol. ovalibus, coriaceis, integerr.

lus. emarginat. *Syst. veg. ed.* 14.

In America H.

Fol. maiusc. rigidula. Corymb. axill. breves,

rigiduli.

- 9. volubilis.** R. inerm. caul. volub. fol. ovatis, striatis, integrerrim. Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.
In America ♂.
 Caul. fruticosus, rufesc. lævis. Fol. alterna, petiolat. oblongiusc. repanda, lævia.
- 10. tetragonus.** R. inerm: fol. ovat. integris, glabris, sessili-
 bus: ramis 4-gonis. Syst. veg. ed. 14. Lin.
Suppl.
Ad cap. b. Spei ♂.
- 11. micranthus.** R. ineru: fol. ovat-lanceolat. obliquis, (subtus)
 pubescentibus: stipul. lanceol. acuminatis,
 deciduis. Syst. veg. ed. 14. Brown. Jam. tab.
 12. f. 2.
 Muntingia &c. Plum. gen. ic. 206. f. 1.
In America ♂.
 Fol. palmar. alterna, petiolat. trinervia, supra
 scabra. Stipul. ferrugineæ. Racem. axill. bre-
 ves, veluti parvæ umbellæ. Baccæ parvæ.
- 12. eubensis.** R. inerm: fl. hermaphrodit: fol. rugosis, integ-
 gerr. tomentosis: caps. 3-locul. Syst. veg. ed.
 14. Jacq. hort. 3. tab. 49. am. piæ. tab. 75.
In fruticetis maritimis Cubaæ ♂.
 Habitus *Viburni Lantanæ*. In sylvis arbusc. 7-
 ped. Fol. alterna, breviter petiolat. ovata,
 obtusa, venosa; juniora argentea, nitida.
 Rami iuniores sericei. Pedunc. axill. ramosi,
 tomentosi, primo plerumq. 2-fidi, dein ulte-
 riusr divisi. Cal. (per Linn. cor.) lanugino-
 sus, ferrugineo-ciner. Petala (per Linn. squa-
 mulæ nectarii) ochroleuca. Fruct. capsularis.
- 13. colubrinus.** R. inerm: fl. monogynis, hermaphroditis, ere-
 ctis: capsulis tricoccis: petiol. ferrugineo-to-
 mentosis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab.
 50. am. ed. 2. piæ. tab. 74.
 Arbor baccifera &c. Comm. hort. I. tab. 90.
In America ♂.
 Arbusc. 4-ped. Fol. magna, alterna, breviter
 petiolat. ovata, acutiusc. integerr. glabra, supra
 lète virent. cum venis pallidis, & lucida.
 Pedunc. axill. breves, umbellati, sub 7-fl.
 Fl. magni, virescent. Caps. subrotund. Ramuli
 pedunc. petiol. & fol. nervi subcus sunt ferrugi-
 neo-toment.
- 14. alpinus.** R. inerm: fl. dioicis: fol. duplicato-crenat. Syst.
 veg. ed. 14. Hall. að. Gætt. 2. tab. 16. Hist.
 helv. tab. 40.

Alnus nigra &c. *Bauh. Hist.* I. p. 562.

In Helvetia, Carniolia &c. H.

Frutex 10-ped. Fol. magna, ovat-lanceol. glaberr. Fl. axill. & intra fol. Cal. 4-fid. segment. demum reflexis. Petal. 2-fid. rubra. Bacca nigra.

15. pumilus. R. inerm. repens: fl. hermaphrod. fol. serratis. Syst. veg. ed. 14.

R. rupestris. Scop. Fl. Carn. tab. 5.

In monte Baldo, Pedemontio, & summaram rupium fissuris H.

Differit a *Frangula* caulis saxis adhaerentibus; fol. serratis: a *R. alpino* fl. hermaphroditis.

16. Frangula. R. inerm. fl. monogynis, hermaphroditis: fol. (plerumque) integerimis. Syst. veg. ed. 14.

Fl. Dan. tab. 278. Black. tab. 272. Duham. arbr. I. tab. 100. Ludw. ed. tab. 82.

Frangula. Matth. 1271.

In Europæ nemoribus humidiusculis H.

Frutex 10-ped. Fol. alterna, petiolat. ovat-acumin. venosa, quandoq. minutissime serrata. Fl. axillar. peduncul. racemosi. Cor. albo-viridis. Bacca primum rubra, dein nigra.

17. lineatus. R. inerm. fl. hermaphrodit. fol. ovat. lineatis, repandis, subtus reticulatus. Syst. veg. ed. 14. Osb. it. tab. 7. Burm. Zeyl. tab. 88.

Acaciæ &c. Pluk. phyt. 122. f. 4.

In Chinæ, Zeylonæ elevatis H.

Frutex ramul. subpubescentibus. Fol. parva, alterna, petiolat. Cal. 5-part. albus. Petala 5. fig. cal. Bacca calycis rudimento insidens.

18. Alaternus. R. inerm. fl. dioic. stigmate triplici: fol. serratis. Syst. veg. ed. 14.

Aluernus I. 2. Clus. hist. I. p. 50.

In Europa australi H.

Alia individua mar., alia hermaphrodita fem.

Arbuscula. Spinæ geminæ, deciduæ. Fol. lanceol. Fl. axillar. racemosi, pedunculati.

*** *Aculeati.*

19. Paliurus. R. aculeis geminatis; inferiore reflexo: fl. trigynis. Syst. veg. ed. 14.

Rhamnus, seu Paliurus &c. Bauh. hist. I. p. 35. Dod. pempt. 576.

Ramno 3. Matth.

In Europa australi H.

Frutex fol. petiolat. ovatis, trinerviis, subserrat.
dilute viridibus. Pedunc. axill. 2-3-4-fl. Petal.
parva, flava. Fruct. clypeiform. siccus.

20. *Lotus*. R. aculeis geminatis: altero recurvo: fol. ovat-
obl. *Syst. veg. ed. 14.*

Zigiphus sylvestris. *Shaw. afric. f. 631.*

In regno Tunetano ♂.

Frutex ramulis teretibus. Fol. omnia *Ziziphi*,
fig. nervis, glabritie, marginidine; at margo
obsolete, & rarius crenatus.

21. *Iguaneus*. R. aculeis subgeminat. altero patente: fol. nu-
dis: racemis axillar. monoicis. *Syst. veg. ed. 14.*
Juiube &c. Comm. hort. I. tab. 73.

In America ♂.

Arbusc. ramis longiss. reclinatis. Spinæ breves,
fortes. Fol. alterna, petiolat. disticha, lan-
ceol-acumin. glabra, subserrata. Racem. axil-
lar. parvi, solitar-bini-terni. Cor. exigua,
flava. Drup. subrotund. vel ovata, Piso duplo
ma: flava, pulpa dulci. Nux crassa, rugosa,
alba, 1-locul.

22. *Napxa*. R. aculeis subgeminat. recurvis: fol. serratis, u-
trime lœvibus: peduncul. corymbosis: fl. se-
midigynis. *Syst. veg. ed. 14.*

Juiuba &c. Pluk. alm. tab. 216. f. 2.

Vidara littorea. *Rumph. amb. 2. tab. 37.*

In Zeylona ♂.

Arb. ramis subvillosis. Fol. alterna, petiolat. di-
sticha, ovata, obtusa, crenulata, trinervia,
flavescent. Pedunc. lateral. Aculei breves, ni-
gri. Stipul. setaceæ.

23. *Juiuba*. R. aculeis solitar. recurvis: fol. retusis, subtus
tomentosis: pedunc. adgregatis: fl. semidigyn.
Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 388.

Malus indica. *Rumph. amb. 2. tab. 36.*

Perim-toddal. *H. Mal. 4. tab. 41.*

In India ♂.

Arbor ramis teretibus. Fol. petiol. subrotundo-
ovata, basi altero latere angustiore, tenuissi-
me ferrata, supra glabra. Pedunc. axill. Acu-
leus minimus, vel nullus.

24. *Enoplia*. R. aculeis solitar. recurvis: fol. (ovatis) subtus
tomentosis: pedunc. adgregat. subsessilibus.
Syst. veg. ed. 14.

Juiuba &c. Burm. Zeyl. tab. 61.

In Zeylona ♂.

Arbor ramis alternis. Fol. alterna, petiol. ovat-acumin. non raro obliqua, trinervia, glauca, subitus sericea. Pedunc. axill. Fl. minimi.

25. circumscis- R. aculeis solitar. recurvis, oppositifol. fol. oppositis, bifariis, obcordatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Lin. Suppl.

In India Orient. dumetis Ȑ.

Rami patentiss. simplic. oppositi, angulati, lèves, Fol. obsolete denticulata. Stipul. 2, minutissimæ ad folia. Fructificat. laterales, umbellatæ, simplic. Petal. ciliata, nivea.

26. Ziziphus. R. aculeis geminat. altero recurvo: fol. ovatoblon. fl. digynis. *Syst. veg. ed. 14.*

Giuggioleno, o sia Zizole. *Matth.*

In Europa australi Ȑ.

Fol. trinervia, serrata, lutescentia. nitida. Pedunc. conferti. Petal. flavescent. Fruct. ovati.

27. spina Chri- R. aculeis geminatis, rectis: fol. ovatis. *Syst. sti.* *veg. ed. 14.*

Enoplia &c. *Clus. hist. 2. p. 313.*

Nabca &c. *Alp. Ægypt. tab. 19.*

Juiubæ &c. *Pluk. alm. tab. 197. f. 3.*

In Æthiopia, Palæstina Ȑ.

Arbusc. pubesc. Fol. ovata, acuta, acute serrata, non nitida. Spinæ horizontal. apice nigrantes.

Xylopyrus. R. caul. aculeato; aculeis recurvis: fol. ovat. subitus tomentosis: fl. corymbosis. *Retz. Obs. fusc. 2.*

In India Orient. Ȑ.

Arbor vix homine altior, ramosa. Fol. late ovata, sèpe ad cordatam fig. accendentia, non raro obliqua, inæqualiter serrata, superne obscura. Corymb. axillar. Cal. tomentosus. Drupa secca, Ceraso maior, insipida.

An huius generis propter Drupam?

Hydriensis. R. Hacq. *Pl. alp. Carniol. tab. 2. f. 2.*

In Carniolu Ȑ.

Arb. 3-4-orgyal. parum ramosa, inermis, cortice cinereo-fusco, verrucoso. Rami apice tantum foliosi, in orbem positi. Fol. ovalia, unico, vel dupli dente prælita, glabra, supra fusco-virentia, subitus albida. Fl. cymæ sub 30-fl. Cal. viridis. Baccæ rotundatæ, molles, pellucidæ, maturæ nigrescentes.

- scandens*. R. Hill. *hort. Keven.* tab. 20.
In Carolina ♂.
dauuricus. Frutex 12-ped. Fol. lanceol. Fl. viridi-albicantes.
R. Pall. *it. 3.* Gmel. *apud Amman.* tab. 33.
In Dauuria ♂.
erythroxylum. Statura R. *cathartici*. Lignum pallide rubrum.
Rami recti, nusquam spinescent. Fol. multo
longiora R. *cathartico*, longius petiolat. ovat-
acumin. argute serrulata. Cor. virescens. Bac-
cae pisiform. fuscæ.
Myrtinus. R. Pall. *it. 3.* tab. I. f. I.
In Dauuria ♂.
Nummularia. Statura *lycioidis*. Altitudo humana. Frutex iner-
mis, tortuosus, ramis paucis, fuscis. Fol.
longiss. lanceol-linear. subtiliter serrata. Pe-
dunc. floriferi inter fol. fasciculati, crebri. Fl.
pirvuli, masculi flavescent; fem. virescens.
Bacca pisiformis, fusco-lutescens.
heterogeneus. R. inermis, fol. ovat-oblongis, integerrim. subtus
lucidis. *Burm. Ind.*
In Zeylona, & Java ♂.
surinamensis. R. inermis, fruticosus: fol. perennantibus, ellip-
ticis, acute dentatis, glabris, nitidis. *Scop.*
Delic. Insub. fasc. 3. tab. 5.
Habitat Surinami ♂.
Fruticul. erectus, ramis patentiusculis, sparsis,
ramulosis. Fol. fere *Buxi*, alterna, brevipe-
tiolat. supra obscure viridia, subtus flavescentia,
margin'e cartilagineo, dentibus rarioribus
rubellis. Fl. ex summis folior. alis 3-5, par-
vi, luteo-virides.
316. PHYLICA. Periant. 5-part. turbinatum. Pet. nulla. Squa-
mæ 5. stamina munientes. Caps. tricocca, in-
fira. Fl. plurimi, in discum, vel capitulum
collecti.
I. ericoides. P. fol. linearibus, verticillatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Alaternoides &c. Comm. hort. 2. tab. I.
In Aethiopia ♂.

- Caul. fruticos. sesquiped. fuscus, pubesc. Fol. inordinata, mucronata, rigida, tomentosa, supra glabra. Fl. terminal. solitar. sessil. vix magnitudine *Pisi*, albi.
2. *bicolor*. P. fol. linearibus, pubescentibus: calycibus communibus cor. brevioribus. *Syst. veg.* ed. 14.
Ad cap. b. Spei, in campis arenosis \ddot{h} .
 Caul. ramis virgatis, rufescentibus, albo-pubescentibus. Fol. sparsa *Taxi*, margine revoluto, patula, subtus albo-toment. Capitula terminal. solitar. Cal. comm. reticulato-venosus, squamis lanceol. rubro carinatis, pilosus. Cor. pilis albis praedita.
3. *plumosa*. P. fol. linearis-subulat., summis hirsutis. *Syst. veg.* ed. 14.
Ricinus &c. Seb. thes. I. tab. 23. f. 4. 5.
Alaternoides &c. Comm. prael. tab. 13.
Chamælea &c. Pluk. mant. tab. 342. f. 3.
In Æthiopia \ddot{h} .
 Caul. 2-ped. ramosus, foliorum vestigia diu servans. Fol. parva, pilis albicantibus, supra viridia, subtus albicant. Fl. in apice ramorum in orbem dispositi, albo-lutei.
4. *imherbis*. P. fol. linearibus, obtusis, scabris: fl. terminalibus, pubescentibus. *Syst. veg.* ed. 14.
Sanamundæ &c. Breyn. cent. 18. tab. I.
Erica &c. Seb. mus. 2. tab. 49. f. 5.
Ad cap. b. Spei \ddot{h} .
 Caul. fruticos. ramosus. Fol. subpetiolat. patula, subhirsuta, subtus sulco tomentoso. Fl. solitar. sessil. magnitudine *Pisi*. Cal. foliol. ciliatis.
5. *stipularis*. P. fol. linearibus, stipulat. fl. quinquecornibus. *Syst. veg.* ed. 14.
Chamælea &c. Burm. Afric. tab. 43. f. 2.
Ad cap. b. Spei, in arenosis \ddot{h} .
 Caul. prolifer, nudus, seu scabriusc. a casu fol. Fol. sparsa, teretia, obtusiusc. lœvia, patula, margine revoluto. Stipulæ geminæ, minimæ, subulatæ. Capitula cal. polyphyl. a squamis nudis, obovatis, 2-part. lana contextis. Cor. infundibulif. lacin. 5. linearibus, longis, extus albo-lanatis.
Differet a P. ericoide cor. laciniis corniformibus, cor. lutea longioribus.
6. *dioica*. P. fol. cordat. fl. dioicis. *Syst. veg.* ed. 14.
Ad cap. b. Spei.

- . Calyc. squamæ hirtæ pilis glauco.-griseis. Cor. pilis albis. *Var. fol. revoluto-linearibus.*
 - 7. *callosa*. P. fol. cordat. lanceol. supra papillosis, subtus tomentosis, apice pungentibus: fl. capitat. villosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
Distincta a P. cordata, cum qua fig. fol. convenit.
P. fol. cordato-sagittat. lanceol. subtus toment. supra glaberrim. acuminat. pungentibus: spicis lanatis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
Differt a cæteris capitul. elongato in spicam villosam.
 - 8. *spicata*. P. fol. ovatis, sparsis, ternisque, subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Chainælea &c. Burm. Afric. tab. 44. f. 1.
In Æthiopia ♂.
Frutex racis longis. Fol. breviter petiolat. crassa, venosa, supra virid. glaberr. nitentia. Fl. terminal. in capitulum subrotund. parvum dispositi. Fl. parvi, herbac.
 - 9. *buxifolia*. P. fol. ovat. glabris: fl. simplicibus, paniculato-racemosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Juxta cap. b. Spei fossas ♂.
*Frutex 5-ped. ramis rufescensibus, subpubescentibus. Fol. conferta, alterna, sessil. acuta, integerr. glabra, similia *Peneæ mucronatae*. Panicul. terminal. e spicis compositis, fl. minutis, alternis, sessilib., simplicibus. Cor. a'ba.*
An distincti generis?
 - 10. *racemosa*. P. fol. ovat. glabris: fl. simplicibus, paniculato-racemosis. *Syst. veg. ed. 14.*
In cap. b. Spei summis montibus ♂.
 - 11. *pinifolia*. P. fol. acerosis, utrimq. planis, glaberrim. fl. paniculato-racemosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
In cap. b. Spei campis arenosis ♂.
 - 12. *parviflora*. P. fol. subulat. acutis, scabris, subpilosis: ramis paniculato-multifl. *Syst. veg. ed. 14.*
In cap. b. Spei campis arenosis ♂.
*Frutex 2-ped. simil. *P. ericoidi*, sed raro multifl. fl. minoribus.*
- * *Omissa in Syst. veg. ed. 14.*
- 13. *cordata*. P. fol. cordato-ovat. patentibus: caul. prolifico.
Syst. veg. ed. 13.
Alaternoides &c. Comm. rar. tab. 12.
Ad cap. b. Spei ♂.
*Differt a *P. buxifolia*, quod fol. non ovata, sed*

cordata, exquisite apice attenuata. Caul. pro-lifer, nec capitula lateralia.

- strigosa*. P. fol. linear-lanceol. ramorum glabriuscule; ramulor. hirsuto-substrigosus: capitul. terminalibus, solitar. sessilibus, strigosis. *Berg. Fl. cap.*
Ad cap. b. Spei H.
- Caul. fruticosus, ramis inferne purpurascensibus, superne cinereo-tomentosis. Fol. brevia, semi-unguicul. breviter petiol. disticha. Capitula magnitudine fructus *Cerasi*, albo-substrigosa.
- eriophorcs*. P. fol. linearibus, acutis, subpubescentibus: ramulis corymbosis: capitul. terminalibus, lana-to-hirsutis. *Berg. Fl. cap.*
Ad cap. b. Spei H.
- Caul. fruticos. Rami longi, ramulosi. Fol. breviter petiolat. margine revoluto, subtus tomentosa, unguicular. Capitula magnitudine *Pisi*, subrotunda, alba. Cor. extus albo-hirsuta.
317. CEANOTHUS. Petal. 5. saccata, fornicata. Bacca sicca, 3-locul. 3-sper.
1. *america-nus*. C. fol. trinerviis. *Syst. veg. ed. 14. Duham. arbr. 1. tab. 51.*
Evonymus &c. Comm. hort. 1. tab. 86. Pluk. alm. tab. 28. f. 6. phyt. tab. 63. f. 2.
In Virginia, Carolina 24. H.
 Frutex ramis rarioribus. Fol. *Corni fem.* simii. sed min. opposita, & alterna, breviter petiol. ovoato-acumin. crenata, dilute virentia. Racemi terminal. Fl. parvuli, triangul. albicantes, aut spadicei, inodori.
2. *asiaticus*. C. fol. ovatis, enerviis. *Syst. veg. ed. 14. Grossularia &c. Burm. Zeyl. tab. 48.*
In Zeylona H.
 Arbor. Fol. *Pyri*, alterna, petiolat. ovat-acumin. obtusiusc. ferrata, lævia, venosa. Racemi axillar. sæpe 2. parvi. Fl. pl. caduci. Bacca magna, calyc. inclusa.
3. *africanus*. C. fol. lanceol. enerviis: stipul. subrotundis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 126. f. 1.*
Alaternoides &c. Comm. præl. tab. 11.
Ricinoides &c. Seb. thes. 1. tab. 22. f. 6.
In Æthiopia H.
 Frutex 4-ped. ramosus. Fol. alterna, breviter

petiol. acumin. crenata, supra nitida, subtus
albo-virid. petiolis rubris. Cal. semi-5-fid.

Petal. calyci inserta. Stylus ex 3. coadunatis.
Thee succedaneum. Gesner.

318. ARDUINA. Cor. 1-pet. Stigm. 2-fidum. Bacca 2-locul.
Sem. solitaria.

Facies inter Randiam, & Penæam media.

1. *bispinosa*. A. Syst. veg. ed. 14.

Lycium &c. Mill. ic. tab. 300.

Ad cap. b. Spei h.

Frutex dichotomus. Spinæ 2. bigeminæ, erectæ.

Fol. opposita, subseßil. cordata, integerrima,
perennia. Fl. terminal. conferti, albi. Bac-
cæ rubræ.

319. BUT- Cor. 5-pet. Filam. apice petalis connata. Caps.
TNERIA. 5-cocca, muricata.

1. *scabra*. B. fol. lanceolat. costa, petiolisq: aculeat. Syst.
veg. ed. 14. Aubl. Guian. I. tab. 96.

In Amer. merid. h.

Frutex 4-5-ped. farmentosus, quaquaversum dif-
fusus, ramis alternis, longis, angulatis. Fol.
4-5-uncial. inferior. petiol. super. sessil. al-
terna, oblonga, petiolo, costaque aculeata;
iuniora min. lanceol-acumin. seniora ovata,
acuta: glabra, integerr. vel rariter ferrata.
Racem. axill. & terminal. oblongi, aggregati.
Fl. parvi, albicantes, inodori.

2. *carthage-nensis*. B. fol. ovatis, in costa, petiolisq. aculeatis.
*Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. piat. p. 41. qui
eam diversam a priore declarat.*

In Carthagena h.

3. *microphylla*. B. fol. inermibus: ramis flexuosis, lœvibus.
Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. I. tab. 29.

In America h.

Habitus singularis. Spinæ caul. solitar. laterifol.
horizontal. Fol. remota, alterna, seu gemi-
na, subseßil: ovalia, obtusissima, patentia.
Pedunc. lateral. axillar. folior. capillar. Cal.
5-phyll. patens. Petal. linearia, basi utrimq.
lobata.

320. MYRSI- Cor. semi-5-fid. connivens. Germ. corollam
NE. replens. Bacca nucleo 5-locul.

*Effentia Generis sita est in stigm. maximo, sim-
briato-plumoso, extra florem exporrecto.*

1. *africana*. M. Syst. veg. ed. 14.

Vitis idaea &c. Comm. hort. I. tab. 64.
 Buxus &c. Pluk. alm. tab. 80. f. 5.
 Frutex &c. Breyn. cent. 9. tab. 5.
In Æthiopia B.

Fl. axillar. 2-3. breviter peduncul. nutantes.
 Cor. pallida, punctis testaceis scabra, ciliata.
 Stam. lacinis cor. opposita, nec alterna.
 Bacca fig. & magnitudinæ *Uvae Ursi*, coœrul.

321. BLAD- Cor. rotata, decidua. Baccæ 1-sperm. Sem.
HIA. arillatum.

1. japonica. B. fol. serratis, glabris. Syst. veg. ed. 14.
Thumb. Jap. tab. 18. Ad. Medic. Svec. T. I. tab. 16.

Tadli-banna. *Kæmph. exot. Fasc. V. p. 775.*

In Japonia. B.

Radix repens. Caul. fruticos. palmi-ped. erectus,
 flexuosus, raro ramosus. Fol. in apice fre-
 quentia, pollicar. superiora parum maiora,
 opposita, petiol. ovata, acuta, patentia. Fl.
 axillar. umbellato-racemosi; peduncul. cernui.
 Cor. alba, suaveolens.

2. villosa. B. fol. serratis, villosis. Syst. veg. ed. 14. *Thumb. Jap. tab. 19.*

In Japonia.

Caul. digital. erectiusc. filiform. tomentosus. Fol.
 unguicul. opposita, petiolat. ovata, acuta,
 remote serrata, ciliata, villoso-scabra. Fl.
 lateral. pedunculati. Pedunc. paucifl. tomen-
 tosi. *Priore longe min. & tota villosa.*

3. crispa. B. fol. oblong. crispis, glabris. Syst. veg. ed. 14.
Thumb. Jap.

Fanna Tadli-banna. *Kæmph. am. exot. Fasc. V. p. 776.*

In Japonia.

Caul. erectus, spitham. & ultra, simpl. teres,
 glaber. Fol. spitham. superior. longiora, al-
 terna, petiolat. valde oblonga, apice atte-
 nuata, sed obtusiusc. erecta, nervosa, subtus
 pallidiora. Fl. lateral. paniculati. Bacca pis-
 form. rubra.

322. CELA- Cor. 5-petal. patens. Caps. 3-angul. 3-locul.
STRUS. Sem. calyprata.

1. bullatus. C. inerm. fol. ovat. integerimis. Syst. veg. ed.
 !4.

Evonymus &c. Pluk. alm. tab. 28. f. 5.

In Virginia.

Frutex fol. alternis. Fruct. coccineus, eleganter bullatus.

2. *scandens*. C. inerm: caul. volubili. *Syst. veg. ed. 14.*
Evonymoides &c. *Duham. arbr. I. tab. 95.*
In Canada b.

Frutex ramis alternis. Foll. 3-poll. longa, 2-lata, alterna, petiol. supra obscure virid. sub-tus dilutiora, oblique nervosa. Fl. terminal. racemosi, albo-virescent. Fruct. lutei.

3. *myrtifolius*. C. inerm. fol. ovat. ferrulat: fl. racemosis: caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14.*

Myrtifolia &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 193. f. 1.*
In Virginia, Jamaica b.

Frutex cortice incano. Fol. alterna, petiolat. ovata, acuta, utrinque glabra. Fl. ex summis alis, parvi, albi.

4. *procumbens*. C. inerm: procumb. fol. ovat. serratis: fl. axillar. subsolitar. *Syst. veg. ed. 14.* *Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.

5. *filiformis*. C. inermis: fol. lanceol. integris: ramis filiformibus: pedunc. axillar. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*
Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

6. *acuminatus*. C. inermis: fol. ovat. acuminat. ferratis: pedunc. axill. 1-fl. caul. erecto, laxo. *Syst. veg. ed. 14.* *Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

7. *microphyllus*. C. inerm: fol. ovatis, obtusis, integris: cymis terminalibus, dichotomis. *Syst. veg. ed. 14.*
Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

8. *orbiculatus*. C. inerm: fol. rotundat. acuminat. ferratis: pedunc. axillaribus, sub trifid. *Syst. veg. ed. 14.*

C. auriculatus. *Thumb. Jap.*

In Japonia b.

Caul. erectus, fruticos. Rami ferrugin. punctis albis adspersi. Fol. semipollic. alterna, petiol. patentia, ferrata, glabra, nervosa. Fl. axillar.

9. *punctatus*. C. inerm: ramis scandentibus, punctatis: fol. ovat. ferratis. *Syst. veg. ed. 14.* *Thumb. Jap.*
In Japonia b.

Caul. fruticos. ramosus: Rami elongati, ramulosi. Fol. pollic. in ramulis alterna, petiolat.

acuta, glabra, subitus, pallidiora. Fl. sparsi, solitar. peduncul. Sem. arillo flavo, rugoso.

- 10. striatus.** C. inerm: ramulis erectis, striatis: fol. ovat. acuminat. ferratis: pedunc. sparsis, 1-fl. Syst. veg. ed. 14. Tumb. Jap.

In Japonia Ȑ.

Caul. fruticos. Rami subrugosi, cinerei. Ramuli oppositi, divaricato-erecti. Fol. pollic. opposita, breviter petiol. patentia, glabra. *Differet a priore, ramis non punctat. nec scandentibus; & fol. subsessilibus.*

- II. alatus.** C. inerm: ramis alatis. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.

Nisi kingi. Kæmph. am. exot. Fas. V. p. 796.
In Japonia Ȑ.

Caul. fruticos. orgyal. Rami oppositi, erecti, laxi, glabri. Ramul. oppositi, breves, patentiss. alati. Fol. pollic. alterna, breviter petiol. elliptica, acuminata, patentia, tenuissime ferrata, glabra. Fl. in ramulis sparsi, peduncul. Sem. arillata.

- 12. buxifolius.** C. spinis foliosis: ramis angulat. fol. obtusis. Syst. veg. ed. 14.

Lycium &c. Pluk. alm. tab. 202. f. 3.

In Æthiopia Ȑ.

Fol. obovata, acute ferrata. Cymæ axillar. peduncul.

- 13. pyracanth-** C. spinis nudis: ramis teretibus: fol. ovali-lanceolat. Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 126. f. 2. 3.

Lycium &c. Comm. hort. I. tab. 84.

In Æthiopia Ȑ.

Frutex 3-ped. & ultra, ramosus. Fol. inordinata, Pyracantha similia, superne serraturis acuminatis, ut fere spinosis, perennantia. Cymæ lateral. peduncul. Fl. multi, albidi.

- 14. lucidus.** C. fol. ovalibus, integerr. marginatis, nitidis. Syst. veg. ed. 14. Herit. Stirp. tab. 25.

Evonymus &c. Pluk. alm. tab. 280. f. 3.

Ad cap. b. Spei Ȑ.

Frutex erectus, ramis fuscis, duris. Fol. alterna, obtusiusc. brevissime petiol. venosa, lucida, margine reflexo. Pedunc. axillar. conferti, simplic. fol. breviores. Petal. concava. Stigm. 3. divergent.

Differet

*Differt a priore, fol. rotundioribus, concavis,
que si cymbæformibus; & ramis inermibus.*

15. *linearis*. C. spinis foliosis: fol. linearibus, integris. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spec.

16. *integrifolius*. C. spinis foliosis: fol. ovat. obtusis, integerim.
cymis lateralibus. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spec.

ovata. C. Hill. hort. Kevens. tab. 16.

In Baharmia H.

Frutex 8-ped. Fol. ovata. Fl. albidi.

323. EVONY-Cor. 5-petal. Caps. 5-gona, 5-locul. 5-valv.
MUS. colorata. Sem. calyprata.

Fruſificatio in quibusdam speciebus auferit 5.^m numeri partem.

1. *americanus*. E. fl. omnibus 5-fid: fol. sessilibus. Syst. veg. ed. 14. Pluk. aln. tab. 115. f. 5.

Rhus &c. Comm. hort. I. tab. 81.

In Virginia H.

• Frutex superne ramosus. Fol. opposita, latolanceol. acumin. terrulata, sature virid. Fl. axill. 1-2. Cor. luteo-viresc. cum rubidine. Caps. verrucosa.

2. *tobira*. E. fl. 5-fid. fol. oblong. retusis, integris. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Japon.

Tobera. Kæmph. aln. exot. Fusc. V. f. 797.

In Japonia H.

Caul. erectus, fruticos. vix orgyal. ramosus, aphyllus. Rami erecti, alterni, teretes, aphylli, fusci. Ramuli foliosi, virid. Fol. in ultimis ramulis adgregata, 1-2-pollic. alterna, & opposita, petiolat. obliqua, erecta, crassifusc. reticulata, marginibus deflexis, supra virid. nitida, nervo longitudinali albo, glabra. Petioli compressi, pallidi. Fl. terminal. adgregato-subumbellati, errecti, pedunculati. Cor. 5-raro 6-petal. alba, odore fl. Ciuri. *Tota planta sublaetescens, tetra.*

3. *latifolius*. E. fl. plerisque 5-fid: capsul. alato-angulatis, in pedunculis fol. longioribus. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 289. Clus. hist. 2. p. 56.

In Austria, Helvetia &c. H.

4. *europæus*. E. fl. plerisque 4-fid. Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 3. p. 202.

Tom. II.

C

Evonimo. Matth.

In Europa H.

Arbusc. 10-pedal. Fol. opposita, petiol. ovatianceol. Petal. ovat-oblonga, subvirid. Caps. roseo, & purpur. col. mixta.

Var. cortice leproso. Jacq: *Austr.* I. tab. 49.

Planta hybrida. Petal. virose flavescente suffusa, cum col. sordide sanguineo.

E. verrucosus. Syst. veg. ed. 14.

5. *atro-purpu-* E. fl. omnibus 4-fid: ramis glabris: fol. petiolat. acutis. Syst. veg. ed. 14. Jacq: *hort.* 2. tab. 120.

Altitudo humana. Fol. opposita, petiol. oblong-lanceol. acuminata, tenuissime serrulata, utrimq. glabra, petiolis, & margine purpurascensibus. Pedunc. 2-4-fl. Petal. atro-purpur.

7. *japonicus*, E. fl. 4-fid: fol. ovat. obtusis, serratis. Syst. veg. ed. 14. Lin. *Suppl. ThUMB. Jap.*

Iso kuroggi. Kämpf. am. exot. Fasc. V. p. 790.
In Japonia H.

Caul. fruticos. orgyal. nudus, strictus, cinereus. Rami oppositi, erecto-patent. parum foliosi, virides. Ramuli breves, decussati. Fol. in ultimis ramis pollicar. adproximata, opposita, petiolat. serraturis obtusis, inferne integra, crassa, nervosa, glabra, erecto-patentia, subtus pallidiora. Fl. axillar. paniculati. Panicula subfastigiata, trichotoma, decomposita, divaricata. Cor. alba. Caps. subglobosa, 3-4-locul. 4-valv. *Var. fol. albo-maculatis.*

inermis, E. fol. alternis, ovaris, serrulatis. Forsk. *Suppl. Æg.*

In Arabia H.

Caul. fruticos. Fol. parva, sessil. nitida, venis reticulata. Cal. 5-part. ruber. Baccæ 3-5. intra calyc. maturæ nigrescentes.

324. DIOSMA. Cor. 5. petal. Nectar. 5. supra germen. Caps. 3-5. coalitæ. Sem. calyprata.

1. *oppositifo-* D. fol. oppositis, subulatis, acutis. Syst. veg. ed. 14.

Spiræa &c. Comm. rar. tab. I.

Hypericum &c. Seb. thes. 2. tab. 40. f. 5.

Ad cap. b. Spei H.

Caul. vix pedal. fuscus, ramulis cruciatis. Fol.

- parva, sessil. Rami compositi, in quorum apice fl. pl. albantes. Caps. 5. subvirid. 2. *hirfusa*. D. fol. linearibus, hirsutis. Syst. veg. ed. 14. Spiræa &c. Comm. rar. tab. 3.
Ad cap. b. Spei H.
Odor totius plantæ Anisi stellati. Fruticul. vix altitudinem humanam attingens. Caul. simpl. rufescens. Fol. sparta, breviter petiol. imbricata. Fl. pauci, subumbellati. Petal. alba.
Valeat in Hemicrania.
3. *rubra*. D. fol. linearibus, mucronatis, glabris, carinatis, subtus bifariam punctatis. Syst. veg. ed. 14. Spiræa &c. Comm. rar. tab. 2.
Erica &c. Pluk. mant. tab. 347. f. 4.
In Æthiopia H.
Habitus Juniperi. Fol. breviter petiol. subimbricato--patentia, subtriquetra, glabra, subtus punctis pertusa. Fl. subaggregati. Petal. obverse ovata, alba.
4. *ericoides*. E. fol. linear-lanceol. subtus convexis, bifariam imbricatis. Syst. veg. ed. 14.
Ericæformis &c. Pluk. amalh. tab. 279. f. 5.
In Æthiopia H.
Fruticul. pedal. Fol. sparsa, breviter petiol. obtusa, carnosa, teretia, glabra. Pedunc. sub 2-fl.
5. *capensis*. *Hæc valde fragrans in Emplasiris Hottentotorum.* D. fol. linearibus, triquetris, subtus punctat. Syst. veg. ed. 14.
Ad cap. b. Spei H.
Fol. opposita. Stam. sterilia huic fere petaloidea sunt.
6. *capitata*. D. fol. linearibus, imbricat. ciliatis, scabris: fl. capitato-spicat. Syst. veg. ed. 14.
Ad cap. b. Spei H.
Facies omnino Ericæ, seu Bruniae nodifloræ. Caul. 2-ped. erectus, prolifer, fuscus. Fol. conferta, sparsa, octofariam imbricata, extus convexa. Fl. purpur. sessil.
7. *unicapsularis*. D. fol. lineari-lanceolat. capsul. 1-locular. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei H.
Caul. ramis virgatis, lævibus. Fol. alterna, subpetiol. supra lævia, subtus rugosa, glabra, integerrima, sed quasi ferrata, cum punctis

pellucidis. Pedunc. lateral. paucifl. Fl. minuti. Capit. sæpius solitar. incurvata.

8. *latifolia*. D. fol. ovat. crenatis: caul. villoso: pedunc. axillar. solitariis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei H.

Frutex ramis subpubescentibus. Fol. petiol. obtusiusc. vix acuta, margine punctis pellucidis crenulata, lævia, non disco punctata.

9. *marginata*. D. fol. cordato-attenuat. membranaceo-marginalis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei H.

Frutex erectus, ramulis vix pubescentibus. Fol. remota. Fl. ex summis alis solit-bini.

10. *burbigera*. D. fol. amplexicaul. cordatis: petal. barbatis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei H.

Frutex ramosus. Fol. opposita, mucronata, lævia, subtus punctata. Corymb. terminal. subfessil. Cal. 5-gon. Petal. albo-barbata.

11. *tetragona*. D. fol. cordat. retusis, complicato-carinatis, ciliatis: ramis 1-fl. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.

Dignoscitur fol. confertis, ut caulis totus foliosus sit: & fl. magno.

Fol. latiora, quam longa, erecta, carinata, acumine patente.

12. *cupressina*. D. fol. ovat. imbricat. triquetris: fl. terminalibus, solitar. sessilibus. Syst. veg. ed. 14.

Ericæformis &c. Pluk. alm. tab. 279. f. 2.

Ad cap. b. Spei H.

Rami erecti, filiform. alterni. Fol. parva, Ericæ, erecta, sessil. apice calloso, colorato. Cal. membranac. Petal. sæpe 4. obovat.

13. *imbricata*. D. fol. ovat. imbricat. mucronat. ciliatis. Syst. veg. ed. 14.

Ad cap. b. Spei H.

Simil. D. ciliata, sed petal. purpur. subrotund. unguibus calyce triplo longioribus.

14. *lanceolata*. D. fol. elliptic. obtusis, glabris. Syst. veg. ed. 14.
In Æthiopia H.

Fol. utrimq. pilis ratis.

15. *ciliata*. D. fol. lanceolat. ciliat. rugosis. Syst. veg. ed. 14. Spirææ &c. Seb. mus. 2. tab. 17. f. 5. Pluk. alm. tab. 411. f. 3.

Ad cap. b. Spei H.

Caul. fruticos. superne ramosus. Fol. sparsa, breviter petiol. patentia, carnosa, margine, & carina ciliata. Fl. subumbell. pedicel. 1-fl. hirsutis. Umbell. breves, simplices, densæ, sessiles. Bract. 2. ciliatæ. Petal. alba, oblong. unguibus vix calyce longioribus.

16. crenata. D. fol. lanceol-ovalibus, oppositis, glanduloso-crenatis: fl. solitar. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei.

Frutex facie *Betulae nanæ*, ramis rubentibus. Fol. breviter petiolat. obverse ovata, subtus punctis adspersa. Fl. racemosi. Calyc. foliol. subulata, crenata. Petal. alba.

17. uniflora. D. fol. ovat-oblong. fl. terminalibus, solitariis. *Syst. veg. ed. 14.*

Cistus &c. Pluk. mant. tab. 342. f. 5.

Ad cap. b. Spei ♂.

Fruticulus. Fol. longe maiora, & rigidiora quam: in priore, sparsa, imbricata, integerr. carnosa, utrimq. glabra, nitida, luteo-viridissima. Fl. 1-2. Calyc. foliola magna, ovata, foliisque fere latiora. Petala carnea.

18. pulchella. D. fol. ovat. obtusis, glanduloso-crenatis; fl. axillar. geminis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Æthiopia, ad cap. b. Spei ♂.

Caul. fruticos. pedal. & ultra, ramis dichotomis. Fol. ultra lineam longa, sparsa, patentia, carnosa, subtus nitida. Bract. minimæ, ovatæ, obtusæ. Petal. 5. ovat-oblong. obtusa, erecto-patentia, pulchre cœrul. vel alba.

succulenta. D. fol. opposit. carnosis, supra canaliculat. inferior. semi-teretibus, superior. triangularibus; aculeato-ciliat. *Berg. Fl. Cap.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. fruticos. ramis foliosis. Ramuli paniculati. Fol. subsessil. subpatent. Fl. terminal. Pedunc. sub 2-fl. Bract. ternatæ, ciliatæ. Petal. subtus minutissime ciliata.

villosa. D. fol. ovat-oblong. acutiuscul. subsessilibus, villosis: fl. terminalibus, congestis. *Berg. (Hartogia) Fl. Cap.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. fruticosi, ramis umbellatim ramulosis. Fol. vix semi-unguicul, subtus hirsuta, subciliata,

frequentia, patentia. Fl. 6-7. Cal. hirsutus.
Cor. villosa, tenuissime ciliata.

325. HOVENIA. Cor. 5-pet. petal. convolutis. Stigm. 3-fid.
Caps. 3-locul. 3-valv.

1. *dulcis*. H. Syst. veg. ed. 14. *Thumb. Jap.*
Kenpokonna. *Kæmph. am. exot. Fasc. V. p. 808.*
f. 809.

In Japonia ♂.

Caul. fruticos. sesquiorgyal. crassus. Fol. palmaria, alterna, petiolat. subcord. ovata, acumin. dependente. ferrata, nervosa, glabra. Petioli reflexi. Fl. axill. & terminal. paniculati. Panicula dichotoma, compressa. Pedunc. carnosí, carne rubente, eduli, dulci, sapore fere *Pyri*, Cor. aibæ.

326. BRUNIA. Fl. adgregati. Filam. unguibus petalorum inserta. Stigm. 2-fid. Sem. solitar. 2-locular.

1. *nodiflora*. B. fol. imbricat. acutis, triquetris. *Syst. veg. ed. 14.*
Cupresso-pinulus &c. Breyn. cent. 2. tab. 10.
Erica &c. Pluk. mant. tab. 346. f. 4.

In Aethiopia ♂.

Caul. fruticos. ramosus. Fol. parva, obtusiusc. subcompressa, carinata, incurva, basi adnata, persistentia, 5-farium laxe imbricata, squarrofa. Fl. capitati. Capitulum magnitudine fructus *Cerafi*. Cor. comm. discoidea. Cal. 5-part. Pet. 5. linear. rubra.

Hæc videtur a reliquis aliena, styl. 2. fructuq. supero, 2-locul.

2. *paleacea*. B. fol. quinquefariam imbricat. adpressis: corymbo terminali; paleis capitulorum exsertis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Frutex simil. priori, sed fol. min. ramos tegentia.
Caul. fuscus. Fol. parva, lanceol. gibba, acutiusc. apice calloso-fusca, supra plana, subtus carinata, basi adnata, glabra. Petala 5. lanceol-linear. obtusiusc. erecta, tenera, calyc. longiora, alba. *Congener B. nodifloræ.*

3. *lanuginosa*. B. fol. linearibus, patulis, apice callosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Tamariscus &c. Pluk. alm. tab. 318. f. 4.

In Aethiopia ♂.

Simil. B. Abrotanoidi. Rima nectarifera ut in illa.

Caul. fruticos. plusquam palmar. inferne nudus.

Fol. sparsa, sessil. disticha, obtusiusc. utrimq. carinata, apicibus nigris, glabra. Capitul. pendunculat. Cor. com. æqualis. Petal. 5. minima, ovata, concava, erecta, alba. Ramuli lanugine aranearum instar implexi.

4. *abrotano-ides.* B. fol. linear-lanceol. parentibus, triquetris, apice caelosis. Syst. veg. ed. 14. Burm. afric. tab. 100. f. 1.

Levisanus &c. Pet. gaz. tab. 5. f. 7.

Erica &c. Pluk. mant. tab. 346. f. 7.

In Æthiopia ♂.

Caul. fruticos. Fol. petiol. sparsa, obtusiusc. patentiss. glabra. Capitula subumbellata, glabra. Cor. uniform. alba. Petal. 5. obtusa, patentia. Germ. superum. Styl. 1. emarginatus.

5. *ciliata.* B. fol. ovat. acuminat. ciliatis. Syst. veg. ed. 14. *In Æthiopia.*

Germ. superum. Styl. 2-fidus.

6. *radiata.* B. fol. linearibus, triquetris; cal. radiante, foliol. intinis coloratis. Syst. veg. ed. 14.

Chrysanthemum &c. Breyn. cent. tab. 82. Pluk. mant. tab. 454. f. 7. Moris. hist. 3. f. 6. tab. 3. f. 43.

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. fruticos. plusquam pedal. subtrichotom. pilis longis, raris adspersus. Fol. sparsa, breviter petiol. obtusa, sature virid. summa pilosa. Fl. terminal. sessil. paniculati. Cor. comm. parum convexa. Pet. 5. obl. obtusa.

7. *glutinosa.* B. fol. linearibus, triquetris, calyce radiante: foliol. omnibus coloratis. Syst. veg. ed. 14.

Muscus &c. Pluk. mant. tab. 431. f. 1.?

Ad cap. b. Spei ♂.

Similis priori: differt disco fl. ampliore, glutinoso; fol. confertioribus; sed præcipue calyc. (ex bracteis congesto) fol. omnibus elongatis in radium coloratum.

8. *verticillata.* B. fol. triquetris, obtusis, glabris: ramulis fastigiatis, verticillatis: capitul. terminalibus, glabris. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Capitula parva, nec globosa.

327. CYRILLA. Petal. acuta, receptaculo inserta. Styl. 2-fid. persistens. Caps. 2-locul.

9. *racemiflora.* C. Syst. veg. ed. 14.

In Carolinæ pinetis humentibus ♂.

Frutex orgyalis . Rami compositi . Fol. alterna , petiol. lanceolata (Ligustri), exstipulata , integrerr. glabra , supra subtilissime venosa . Racemi pl. terminal. penduli , spitham. bract. setaceis . Fl. albi . Petala disco villosa .

328. ITEA. Petala longa , calyci inserta . Caps. 1-locul. 2-valv.

I. virginica. I. Syst. veg. ed. 14. Duham. arbr. I. tab. 126.
Pluk. phyt. 339-23-4.

In Virginia ♂.

Frutex humanæ altitudinis . Fol. alterna , petiol. ovata , serrata . Racemi terminal. albi . Facies Padi .

329. GALAX. Cal. 10-phyll. Cor. hypocraterif. Caps. 1-locul. 2-valv. elastica .

I. aphylla. G. Syst. veg. ed. 14.

In Virginia ♂.

Caul. simpl. nudus . Spica laxa , alba . Caps. colorata .

330. CEDRELA. Cal. marcescens . Cor. 5-petal. infundibulif. basi ad $\frac{1}{3}$ receptaculo adnata . Caps. lignosa , 5-locul. 5-valv. Sem. deorsum imbricata , ala membranacea .

I. odorata. C. fl. paniculatis . Syst. veg. ed. 14. Brown. Jam. tab. 10. f. 1.

Cedrus &c. Pluk. alm. tab. 157. f. 1.

Pruno &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 220. f. 2.

In Amer. meridion. ♂.

Arbor magna , ramis in coma sparsis , oblongis . Fol. 2-3-petal. alterna , pinnata : foliol. oblongo-acuta , mucrone angusto , integrerr. glabra . Racemi compositi , ramis patentibus ; ramulis 2-3-fl. Cor. Liliacca , fere Hyacinthi , albescens , carnea . Lignum odoratum .

331. ELÆODENDRUM. Cor. 5-pet. Drupa ovata , nuce 2-locul.

I. orientale. E. Syst. veg. ed. 14. Ad. helv. vol. 9. tab. f. 2.

332. CALODENDRUM. Cor. explicata , 5-petal. Nect. 5-phyll. Caps. 5-locul.

I. capense. C. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Diff. nov. pl. gen. p. 43.

333. ESCALLONIA. Petal. 5. distantia , lingulata . Stigm. capitatum . Bacca 2-locul. polysperma .

I. myrtilloides. E. Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.

In Amer. merid. ♂.

Frutex glaberrim. ramulis 1-fl. Fol. ramea , approximata , brevissime petiol. alterna , paten-

tia, linguæformi. apice tenuissime ferrata, glaberrima. Flos terminal. erectus.

Planta siccata nigrescit.

334. CORYNOCARPUS. Nectar. 5. petaliform. cum petalis alternantia, basi glandulifera.

1. *levigata*. C. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen.

In nova Zeylanda H.

Fol. alterna, petiolat. obovata, seu cuneiform. integerr. subemarginata, venosa, glaberr. panicula terminal. magna, sessilis, rugosa. Fl. albi.

335. ARGOPHYLLUM. Petala 5. Nectar. pyramidale, 5-angul. longitudine cor.

1. *nitidum*. A. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen.

In nova Caledonia.

Planta sericeo-tomentosa, nitida. Fol. alterna, petiol. ovata, utrimq. acumin. integerr. supra viridia, glabra. Pedunc. axillar. solitarii, elongati.

336. MANGIFERA. Cor. 5-petal. Drupa reniform.

1. *indica*. M. fol. simplicibus : fl. pentandris. Syst. veg. ed. 14.

Manga &c. Rumph. amb. I. tab. 25.

Mao &c. Hort. Mal. 4. tab. I. 2.

In India H.

Arbor 40-ped. ramis in orbem longe, lateque diffusis, cortice nitente; succo fusco, amaro. Fol. 2--3--4. simul ex eodem pedunc. ramis inhærent, spithamam longa, palmum, & ultra lata, oblong-rotun. integerr. densa, nervosa, glabra, supra viridi-fusca, nitida, subitus dilutiora, costa flavescen. odore suavi, aromatico; iuniora rubra. Racemus compositus, brachiatus. Fl. parvi. Pet. candida, macula flavescente. Drupa magna, matura aurea, gratissima.

2. *pinnata*. M. fol. pinnatis : fl. decandris. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In India H.

Fol. pedal. impari-pinnata. Foliol. oblong. integrerrima.

amba.

M. Forsk. Suppl. Æg.

In Arabia.

Fol. conferta, sparsa, alterna, spitham. lanceol. Fructus magnitudine ovi anserini, flavus, edulis.

337. HIRTELLA. Petal. 5. Filam. longiss. persistentia, spiralia. Stylus lateral. Bacca 1-sperm.

Eft triandra monogyna. Hompton. Journ. des Scavans. 1785.

I. americana. H. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 8. ed. 2. piçt. tab. II.

In Brasilia, Martinicæ sylvis ad ripas torrentum h. Arbor 20-ped. Fol. 5-pollic. alterna, petiolat. ovalia, oblonga, acumin. integerrima, nitida, subtus pube grisea. Racem. terminal. semiped. laxi, villoso. Petal. alba.

338. PLE-
CTRONIA. Petal. 5. calycis fauci inserta. Bacca 2-sper. in-
fera.

I. ventosa. P. Syst. veg. ed. 14.

Rhamnus &c. Burm. Afric. tab. 94.

Ad cap. b. Spei h.

Arb. spinosa, ubi fol. destituitur ramis 4-gonis, Fol. 4-pollic. longa, 3. circiter lata, opposita, petiol. ovat-acumin. integerrima, lævia, virid. Corymb. axillar. capillar. brachiati, fol. breviores. Petala reflexa, flava. Baccæ virid.

339. RIBES. Petal. 5. & stam. calyci 5-fido inserta. Styl. 2-fid. Bacca globosa, umbilicata, polysper. in-
fera.

* *Ribesia inermia.*

I. rubrum. R. inerme; racemis glabris, pendulis; fl. planiuscul. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 285.
Ludw. ed. tab. 92. Knorr. del. I. tab. I. 5.

Ribes vulgare. Matth.

In Sylvis alpestribus h.

Frutex 4-10-ped. Fol. vitiginea, alterna, petiolat. lobis incisis, subtus subcanescens. Fl. axillar. racemosi. Petal. 2-fid. viridia. Baccæ parvæ, rubræ, vel albæ.

2. petraeum. R. inerme; racemis florentibus erectis; fructescientibus pendulis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. ic. rar. tab. 39.

Habitat

Frutex 3-4--ped. cortice ex rubro-nigricante, tandem cinerescente, aculeis nuspian armatus. Racemi per truncum, & ramos undiq. sparsi, ex gemmis propriis solitariis. Fl. respective magni, elegantes, per racemos sparsi, brevi-

ter pedunculati. Cal. coloratus, speciosus, roseus, quandoq. sanguineus, pelvifor. Petal. exigua, semiovat. alba, latiora quam longa, rotunda. Fol. in apice ramorum, & inter racemos multo ampliora *R. alpini*, plerumq. 3-loba, lobis magis, minus acutis, ferratis, nuda, læte virid. tum ex virore nigricantia, petiolis longis pilis ciliatis. Baccæ magnæ, globosæ, saturæ rubræ, nitentes, læves, minus farinosæ, quam in *R. alpino*.

3. *alpinum*. R. inerme; racemis erectis; bracteis flore longioribus. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. I. tab. 47. Gunn. norv. II. tab. 2. f. 1. 2. Bauh. hist. 2. p. 93. Besl. hort. vern. fol. 14. f. 1.

In Europa sepiibus, sylvis montanis H.

Fol. priore plusquam dimidio min. saturatius viridia, magis lucida, supra subpilosa, subtus glabra. Petal. flavo-virid. Baccæ minus rubræ, saturæ. Var. fl. angustioribus, acutioribus, ultra dinidium fere trilobis.

4. *nigrum*. R. inerme; racem. pilosis: fl. oblong. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 556. Ludw. etd. tab 91. Knorr. delic. I. tab. I. 6. Black. tab. 285. Lob. adv. ic. 202.

b. Ribesium &c. Dill. elth. 244. tab. 315.

In Europa, Pensylvania &c. vallibus, & montibus H.

Frutex etiam 10-pedal. Fol. semitrilobata, lobo medio acuto, lateralibus semiquadratis. Racemi rariores. Pedunc. subhirsuti. Petala ex albo-rubent. Baccæ solitar. maiores nigrae. Odor urinæ felinæ. Thee succedaneum. Gesn.

** Grossulariæ aculeatæ.

5. *diasantha*. R. fol. incisis; aculeis geminis ad geminas. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Pall. it. 2. tab. I. f. 2.

In Dauuria H.

Frutex erectus, sesquiulnar. striatus. Rami recti: aculei divergentes. Fol. fasciculata, cuneiform. trilobato-incisa, subtrinervia. Racemi inter folium solitar. multifl. ramento linearis ad singulum fl. parvi, virescenti-flavi. Baccæ rubicundæ, dulces.

6. *reclinata*. R. ramis reclinatis, subaculeat: peduncul. bractea triphyllis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Germania, Helvetia ♂.
Baccæ obscure purpurascens.
7. *Grossularia*. R. ramis aculeatis; petiolorum ciliis pilosis: baccis hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 2. tab. G.*
In Europæ montibus, ad vias in lapidosis ♂.
Fol. ampliora. Spinæ longiores, & validiores.
Petal. rubicunda, extus pilosa, intus hirsuta.
Baccæ grandes, albantes, hirsutæ. Bract. 2-fida.
8. *Uva crispa*. R. ramis aculeat: baccis glabris; pedicellis bract. 1-phylla. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 546. Black. tab. 277.*
Grossularia &c. Duham. arb. I. tab. 109.
Uva spina. Matth.
In Europa boreali ♂.
Frutex 6-ped. Fol. semitriloba. Petala alba, aut rubella. Bacca magna, umbilicata, alba, cum lineis viridis.
9. *oxyacanthoides*. R. ramis undique aculeatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Grossularia &c. Dill. elth. tab. 139. f. 116.
In Canada ♂.
Differt a priore fol. profundius incisis, glabris, subtus pallidioribus. Baccæ R. vulg: magnitudine, atro-purpur.
10. *cynosbati*. R. aculeis subaxillaribus: baccis racemosis, aculeat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq: hort. 2. tab. 123.*
In Canada ♂.
Facies priorum. Fol. parum fissa. Pedunc. saepius 5-fl. Cor. R. Grossularia. Germ. in fl. hispidum, nec aculeatum. Bacca magnitudine nucis Coryli, undique armata aculeis robustis.
-
- prostratum*. R. inerme; baccis hirsutis. *Herit. Stirp. nov. tab. 2.*
In Terra-nova ♂.
Frutex humil. Radix fusca, læsa fragrantiss. Caul. cubital. reclinatus, rimosus, cinereus. Rami alterni, nunc erecti, nunc prostrati, ramulosi. Turiones spadicei, nitidi. Gemmæ erectæ, ovatæ, rubicundæ. Fol. alterna, petiol. membranac. patent, cordata, 5-loba, lobis

summis minus divisus, acuta, inæqualiter serrata, revoluta, 5-nervia, venosa, rugosa, iuniora pubescent. adulta glabra, 3-4 pollic. longa, & lata. Racemi lateral. hispidae, bracteati, 1 $\frac{1}{2}$ poll. longi. Flos pedicellat. patens, purpurasc. 2-3. lin. latus. Pedicel. purpureo-hispidae, uti racemos, qui 3-4. lin. longus. Bract. sub pedicel. linear-lanceol. concava, subhispida. Bacca hispida 5-6. lin. longa, 4-lin. lata, edulis, sed contemnenda.

Differet a congeneribus, ramis repentibus, & glandulæ pedicellatis in exterioribus inflorescentiæ partibus: ab inermibus, fructibus hispidis. Gemmæ magis divaricatae, rubrae, nec pubescent. ut in R. nigro.

floridum.

R. inerme; racemis pendulis: fl. cylindricis: bracteis fl. vix brevioribus. Herit. Stirp. nov.

Ribesiæ &c. Dill. elth. tab. 244.

In Pensylvania H.

Racemi numerosi, villosi, valde penduli. Fl. ventricoso-cylindrici, lacin. longioribus, revolutis. Baccæ nigræ.

Fol. utrimq. glandulæ fulvis adspersa: in R. nigro glandulæ in pagina inferiore tantum; in ceteris nulla. Bract. linear. pedicello longiores: in R. nigro bract. minutissimæ, pedicello breviores. Gemmæ cinereæ, nec rubræ.

340. GRO-
NOVIA. Petal. & stam. calycis incisuris inserta. Caps. monosper. infera.

I. scandens. G. Syst. veg. ed. 14. Martyn. cent. I. tab. 40.
In vera Cruce.

Planta cucurbitac. cirrhis scandens, graveolens. Caul. altissim. ramosiss. Fol. pampinea, urentia. Fl. parvi, tristes.

341. AQUILICIA. Est Leea æquata.

342. HEDERA. Petal. 5. oblonga, patentia, apice non coatta. Bacca 5-pler. calyce cincta, globosa. Fl. in umbella simplici. Frutex volubilis.

I. Helix. H. fol. ovatis, lobatisque. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 188.

Hedera arborea. Matth.

In Europæ arboribus putrescentibus, & sepibus H.
Caul. fruticos. volubil. Fol. alterna, petiolat. infer. triangular. summa solum ovata: dura, nervosa, integerr. nitida. Fl. terminal. glo-

merato-racemosi. Petala virescent. Baccæ subrot. apice dilatatae, nigræ, intus purpureæ.

- 2. quinquefo-** H. fol. quinatis, ovalis, ferratis. Syst. veg. ed. 14. Corn. Canad. tab. 100.
lia.

In Canada ♂.

Arb. farmentosa, scandens, ramosiss. Fol. longe petiol. Racemi 3-fid. bis dichot. ultimò unbellat. Cal. brevisl. obtuse dentat. apice rubicundus. Petal. oblon. obtusa, apice fornicata, virid.

- 343. VITIS.** Cal. 5-dentat. Petala apice cohærent. emarcida. Bacca 4-5-sperm. superia. Fl. racemosi.

- 1. vinifera.** V. fol. lobatis, sinuat. nudis. Syst. veg. ed. 14. Duham. arb. fruit. 2. Black. tab. 154. Ludw. ed. tab. 125.

- b.** V. apyrena. Bauh. hist. 2. pag. 72.

Colit. in totius Orbis locis temperatis. Labrusca, seu sylvestris, ad sepes, & dumeta sponte nascitur ♂.

Frutex debil. capreolat. Fol. 3-lobat. lobis profunde divisæ. Fl. racemosi. Cirrus oppositi-fol. racemifero-floriferus.

- 2. indica.** V. fol. cordat. dentat. subtus villosis: cirrhis racemiferis. Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 59. f. 2. Scembra-valli. H. mal. 7. tab. 6.

In India ♂.

Magnitudo V. vulg. tota villis griseis adspersa.

Frutex farmentosus. Fol. alterna, petiol. ovat-acumin. Cirri dependent. Racemi corimbosi, subumbellati. Baccæ subrot. acumin.

- 3. Labrusca.** V. fol. cordat. subtrilobis, dentat. subtus tomentosus. Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 259. f. 1. Pluk. phyt. 249. f. 1. Sloan. hist. 1. tab. 210. f. 4.

In Amer. septent. ♂.

Sarmentosa, prorepens. Cirri axill. ramosi. Fol. profunde dent. venosa. Racemi longi, ex nodis dependent. Baccæ coalitæ, min. nigricant.

- 4. heterophyl-** V. fol. simplicibus; inciso-3-5-lobis, ferratis, la. nudis. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.

In Japonia.

Caul. scandens, ramosus, nodosus, articulatus, subangulat. glaber. Rami alterni, patentes. Fol. alterna, petiol. suprema indivisa, ferrata, supra sature virid. lævia, subtus pallidiora,

venis scabris. Cirrhi peduncul. oppositi, 2--fidi. Panicula subdichotoma, glabra. Cor. alba. Bacca globosa, magnitudine *Pisi*, viridis.

5. *vulpina*. V. fol. cordat. dentato-serratis, utrinque nudis.
Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 249. f. 1.

In Virginia ♂.

Stirps, & crescendi modus ut in *V. vinifera*. Rami lanuginosi. Fol. supra viridia, subtus alba. Baccæ R. *vulg.* magnitudine, sature purpureæ.

6. *trifolia*. V. fol. ternatis; foliol. subrotund. serratis. *Syst. veg. ed. 14.*

Folium &c. *Rumph. amb. 5. tab. 166. f. 2.*

In India ♂.

Sarmentosa. Rami breves, nodosi. Cirrhi spirales. Racemi corymbosi, subumbell. Baccæ turbinatæ.

7. *laciniosa*. V. fol. quinatis; foliol. multifidis. *Syst. veg. ed. 14. Corn. Canad. tab. 183.*

In Canada ♂.

Sarmentosa. Flores evanidi. Bacca grano min. albida.

8. *japonica*. V. fol. quinatis, subpedatis, glabris; foliol. crenatis, crenis aristatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Japon.*

In Japonia 24.

Caul. decumbens, herbac. parum ramosus, angulatus, glaber. Fol. alterna, petiol. 5-part. patentia: foliol. petiol. glabra, nervosa, supra viridia, subtus pallidiora; intermedium maius, longius, petiolatum, acutius: infer. duplo min. semipoll. obtusiora, petiolo 2-fido insidentia. Cirrhi oppositifol. angulati, 2-fidi. Fl. axill. paniculati. Panicul. fastigiata, supradecomposita, primo trichotoma, dein dichotoma, tandem racemosa. Petal. 4. viridia.

9. *pentaphyl-* V. fol. quinatis: foliol. indivisis, serratis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia.

Caul. scandens, herbac. filiform. sulcatus, glaber. Fol. alterna, petiol. foliol. ovalia, acuminata, tenuia, glabra; lateralia min. subpollicar. Racemi axillar. fol. longiores, flosculis remotis, minimis.

XO. heptaphyl- V. fol. septenar. ovatis, integerr. Syst. veg. ed. la. 14.

In India Orient. ♂.

Simil. Hedera quinquefol. Caul. scandens. Fol. alterna, longe petiolat. Foliol. 5-8. petiolul. elliptica, glabra, consistent. mucronata. Racem. terminal. maximus e spicis alternis. Spicæ simplic. subiomentosæ; fl. verticillis remotis.

II. arborea. V. fol. supra decompositis; foliol. lateralibus pinnatis. Syst. veg. ed. 14. Ad. Bon. 3. part. 2. tab. 24.

Frutex &c. Pluk. mant. tab. 412. f. 2.

In Carolina, Virginia ♂.

Frutex ramis remotis. Fol. alterna, petiol. capitulo preolata. Corymbi parvi, & rari. Bacca pa- rum acumin. rubra.

344. LAGOCIA. Involuc. univers. & partiale. Petal. 2-fid. Sem. 2. infera; nuda.

I. Cuminoides. L. Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 55.

In Creta, Lemno, Lycia, Galatia ☽.

Fol. impari-pinn. basi dilatata, vaginantia; foliol. profunde incisis, & veluti spinosis. Capitula glomerata, e villosis, candidis pedicell. quibus sem. adhaerent. Petal. bicornia.

345. RORIDULA. Cal. 5-phyll. Cor. 5-petal. Anth. basi scro- tiform. Caps. 3-valv.

I. dentata. R. Syst. veg. ed. 14.

Ad cap. b. Spei ♂.

Habitus Droseræ. Caul. fruticosi. Fol. subulata, dentibus filiform. ciliata. Scapus ramosus in pedunculos.

tetrandra. R. fol. orbiculatis, setoso-clavatis: staminibus inæqualibus. Forsk. Æg.

In Arabia ♂.

Caul. fruticos. diffusus, ramosus, teres. Petiol. & calyc. hispidae setis albidis, apice capitulo flavo, ut in *Drosera rotundifol.* Fol. vix remota, alterna, patentia, nervis 3. profundis. Pedunc. axillar. filiform. 1-fl. hispida, rufescens. Cor. 4-fid. flava. Stam. 4. rubra. Anth. flavæ. Speciat ad aliud genus.

346. SAUVA- Cal. 5-phyll. Cor. 5-petal. fimbriata. Nectar.

GESIA. 5-phyllosum cum petal. alternans. Caps. 1-locul. erecta.

1. *erecta*. S. fol. oblong. angustis: fl. solitar. brevi pedunc. insidentibus. *Syst. veg. ed. 14.* *Jacq. am. tab. 51. t. 3. ed. 2. pict. tab. 77.*
Ireon &c. Brown. Jam. tab. 19. f. 2.
In Domingo, Jamaica, Surinamo ⊖.
Habitus Hyperici, vel Corchori. Caul. herbac. erecti, subpedal. teretes. Fol. alterna, ovat-lanceol. obtuse serrata. Pedunc. lateral. Fl. albi. Stipul. ciliatæ.

2. *adima*. S. fol. oblong. serratis: fl. longe peduncul. *Aubl. Guian. tab. 100. f. 2.*

In Guiana 24.

Caul. pl. 2-pedal. ramosi, angulati. Fol. alterna, ovat-lanceol. denticulis rubris serrata, glabra, nitida, venosa. Stipul. 2. oblong. cum ciliis rufescentibus. Fl. axillar. solitarii, vel gemini.

347. CARO-XYLON. Cor. 5-petal. Nectar. 5-phyll. connivens, cor. insertum. Sem. tunica vestitum.

1. *Salsofa*. C. *Syst. veg. ed. 14.* *Thumb. Diff. nov. plant. gen.*

348. CLAYTONIA. Cal. 2-valv. Cor. 5-petal. Stigm. 3-fid. Caps. 3-valv. 1-locul. 3-sper.

1. *virginica*. C. fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Ornithogalo &c. Pluk. alm. tab. 102. f. 3. *Rudb. Obs. 2. f. 6.*

In Virginia, Siberia 24.

Caul. dodrant-palm. inferne rubent. Fol. radicalia, multa, *Chamaenerii* vulg similia: caulinæ 1-2. par. breviora, & angusta. Pedunc. tam e summo caule, quam secundum longitudinem. Fl. albi, rubro lineati.

2. *sibirica*. C. fol. ovatis. *Syst. veg. ed. ed. 14.*
Limnia. Ad. Stock. 1746. tab. 5.

In Siberia 24.

Cauliculi 1-pl. declinati, cubital. teretes, succulenti, flexiles, pallide virent. Fol. radicalia petiol. nervosa, glaberrima: caulinæ duo, opposita, sessil. Racemi axillar. duo, secundi, altero 2-phylo. Fl. rubri. Stam. unguibus petal. inserta.

3. *Portulacaria*. C. caul. arbore erecto. *Syst. veg. ed. 14.*
Crassula &c. Dill. elih. tab. 101. f. 120.

In Æthiopia 3.

Caul. 1--2-cubital. ramis oppositis, ramulosis.
Tom. II. D

Fol. opposita, obverse ovata, crassa, lète
virent. nitida, avenia, succosa.

349. HELI- Spatha universal. partialesque. Cal. o. Cor. 3-
CONIA. petal. Nectar. 2-phyl. Capsul. 3-cocca.

1. *Bihai*. H. fol. nervosis, reticulat. basi attenuatis; ne-
tar. hastato, libero. *Syst. veg. ed. 14.*

Folium &c. *Rumph. amb. 5. tab. 62. f. 2.*

b. *Bihai* &c. *Plum. gen. 50. ic. 59.*

3. *Bihai* &c. *Plum. gen. 50.*

In Amer. calidiore Ȑ.

Habuus Musæ. Herba 8-10-ped. Fol. ampliss.
radical. oblong. utrimque acuta, longitud. pe-
tiolor. Scap. erectus. Spath. membranac. ru-
bellæ. Petal. 2. superius simplex, intra quod
petal. minutum, acuminate: inferius apice 3-
fido. Cor. crocea, macula cœrul.

2. *alba*. H. folior. nervis simpliciss. glaberrim. basi ovat-
rotundata: nectar. hastato, libero. *Syst. veg.
ed. 14. Lin. Suppl. Rumph. amb. 5. tab. 63.
f. 2.*

Ad cap. b. Spei 24.

3. *psittacorum*, H. fol. glaberr. nervosis, basi rotundat: inflores-
cent. glaberrima: spadice erecto, ebracteato:
nectar. lanceol. adnato. *Syst. veg. ed. 14.
Lin. Suppl.*

In Surinamo 24.

Caul. simpl. teres, lèvis. Fol. radical. pedal.
statura *Cannæ*, petiol. lanceol. caulinæ parva,
remota, alterna, sessil. conduplicata, *Tra-*
deschiantiæ, 3-4-lanceol. Pedunc. 4-5. axill.
breves, 1-fl. Fl. col. luteo, & roseo varie-
gati. Petal. lanceol. triquetra; superius æqual.
triplo latius, dorso plano, utrimq. carinato,
apice 2-fido: inferius angustius, carinatum,
apice macula fusca. Nectar. intra petalum su-
perius, longitudine petali, ovat-lanceol. dor-
so fere ad apicem petalo adnatum.

4. *hirsuta*, H. fol. basi rotundatis, simplicissime nervosis,
glaberr: inflorescentia hirsuta: spadice flexuo-
so: nectario-lanceol. adnato. *Syst. veg. ed. 14.
Lin. Suppl.*

In Amer. merid. 24.

Habitus ceterarum specierum. Spadix spitham.
hirsutus, articulis versus proximam spatham
increasatis. Spathæ alternæ, lanceol-subul. ca-

rina hispida. Pedunc. 9-12. in alis spatharum, breves, aphylli, hirsutiss. Cor. curva. Petal. superius complicatum, hispidum, apice 2-fid. Inferius latius, complicatum, hispidum, oblong: interius apice macula fusca notatum. Nectar. lanceol. Peric. hispidum.

350. ACHYRANTHES. Cal. 5-phyll. Cor. o. Stigm. 2-fid. Sem. solitar.

1. *aspera*. A. caul. fruticoso, erecto: calycibus reflexis, spicæ adpressis. *Syst. veg. ed. 14.*

b. A. fuscula.

Amaranthus &c. Bocc. Sic. tab. 9. Pluk. phyt. 260. f. 2.

y. A. indica.

Amaranthus &c. Burm. Zeyl. tab. 5. f. 3. Pluk. alm. tab. 10. f. 4.

Auricula &c. Rumph. amb. 6. tab. 12. f. 1.

Cadeli. H. Mal. 10. tab. 78.

In Sicilia, Zeylona, Jamaica b.

Altitudo humana. Rami patentes. Fol. cuneiformi-acumin. subtus lanugine argentea. Spicæ pedal. Fl. maturi contra caulem reflexi. *Arabica var. fol. utrimq. glabris, viridibus; similibus Plumbaginis Zeylunicæ, quam Sicula latioribus, subtus punctatis.*

2. *lappacea*. A. caul. fruticoso, diffuso, prostrato: spicis interruptis, floscul. lateralibus utrimque fasciculo setarum uncinato. *Syst. veg. ed. 14.*

Blitum &c. Burm. Zeyl. tab. 18. f. 1.

Centaurium &c. Pluk. alm. tab. 82. f. 2.

Wellia-codiveli. Hort. mal. 10. tab. 59.

In India.

Caul. 4-goni, obtusi, inermes. Fol. opposita, lanceol-ovata, acuta, integerr. Rami axill. longi, strictissimi. Spicæ longæ, solitar. Fl. 3. transverse positi. Ad latera fl. lateralium utrimq. penicillus purpur. e setis rigidis uncinatis, sensim se pandentibus in pilulam lappaceam.

3. *muricata*. A. caul. fruticoso, patulo: fol. alternis: fl. spicatis, remotis, ovatis; calyc. squarrofis. *Syst. veg. ed. 14.*

Blitum &c. Rumph. amb. 5. tab. 83. f. 2.

In Ægypto, Arabia 24 b. O.

Planta erecta, facie Celosiae. Fol. alterna, pe-

tiol ovata, seu cordata, lævia, petiolis subciliatis. Pedunc. axill. 5-goni, fol. longiores. Pet. 3. interiora erecta, purpur: super. & inferius patent. pallidiora. Corpus breve, truncatum, callosum, viride, 3-dent.

4. *patula*. A. caul. fruticos. patulo, pubescent: fl. spicis orbiculat. echinato-uncinatis. Syst. veg. ed. 14. *Lin. Suppl.*

In India Orient. B.

Caul. erecti, 3-pedal. brachiati. Fol. opposita, petiol. ovata, acuta, pubescent. Spica terminal. Fl. distantes, bracteati, albidi.

5. *alternifolia*. A. caul. herbac. erecto: fl. echinis subglobosis. Syst. veg. ed. 14. *Lin. Suppl. Pluk. alm. tab. 260. f. 1. Burm. Zeyl. tab. 4. f. 2.*

In India Orient.

Caul. flexuosus, ramosus, angulatus, purpurasc. Fol. reniota, alterna, petiolat. subflexuosa, lanceol. lævia, consistentia, desinectia in petiolos longos, purpurasc. Capitul. solitar. subfessil. oppositifolia.

6. *corymbosa*. A. fol subquatern. linearibus: panicula dichotomo-corymbosa. Syst. veg. ed. 14.

Paronychia &c. Burm. Zeyl. tab. 65. f. 2.

Amaranthus &c. Bocc. Mus. tab. 39.

Eichryso &c. Pluk. alm. tab. 86. f. 6.

In Zeylona.

Caul. pedal. teres, pubescens, articulat. Stipul. paleaceæ. Fol. *Linariae*, aut *Molluginis*. Cal. albus, nitidus. Petal. vix conspicua.

7. *dichotoma*. A. caulis suffrutic. fol. opposit. linearibus, acutis, planis; cyma dichotoma. Syst. veg. ed. 14.

In Virginia.

Caul. diffusi. Fol. margine scabra, stricta, patula. Stipul. oppositæ, membranac. lanceol. fol. latiores, intrafoliaceæ. Cyma 4-part. *Simil. priori.*

8. *prostrata*. A. caulis prostratis, fruticosis: spicis oblongis; floscul. binatis, utrimque fasciculo setarium uncinato. Syst. veg. ed. 14.

Auris &c. Rumph. amb. 6. tab. II.

Verbena indica Bont. iav. tab. 150.

In India 24.

Caul. sæpe repente. sesquipedal. divaricati, atro-

purpur. pilosi. Fol. opposita, subpetiol. obovata, acuta, subpilosa, margine purpurasc. Spicæ solitar. peduncul. virides, apice purpurasc. Fl. minuti. Fruct. reflexi, ovati, obtusi.

polygonoides. A. caul. decumben. 4-gono : fol. ovat-cordat: spicis laxis, levibus. Retz. Obs. fasc. 2.

Digera arvensis. Forsk. Æg.

In Arabia.

Similis *Polygono Orient.* foliis, & spicis; licet minus compactis. Diversa ab *Illecebro sanguineo*.

altissima. A. caul. scandente. Jacq. amer. Sloan. Jam. 2. tab. 91. f. 2.

In sylvis Domingensibus H.

Caul. 20-ped. Fol. semiped. alterna, petiolat. ovata, acuta, integerr. glabra. Spicæ axill-terminal. paniculatæ: partiales sub 2-fl. Cor. e viridi albicans.

decumbens. A. caul. decumben: panicul. axillaribus, terminalibus. Forsk. Æg.

In Arabia.

Caul. angulati, rubentes. Rami erectiusc. spitham. Fol. remota, alterna, petiolat. ovat-lanceol. integerr. glabra. Panicula saepe 2-pollic. fl. conglomerat. albido-membranaceis.

polystachia. A. spicul. axillaribus, confertis, brevibus, albis: caul. decumbente. Forsk. Æg.

In Arabia H.

Fl. capitati. Spicæ alternæ. Stam. rubro-violac.

A. fol. alternis, crassiuscul. linear-i-cuneatis, obtusis. Forsk. Æg.

In Arabia H.

Caul. fruticos. spicis axillaribus. E longinquo speciem habet papporum, ob fl. fasciculos utrimq. lanatos.

capitata. A. fol. oppositis, petiolat. ovat-oblong. capitul. terminalibus, confertis, inermibus. Forsk. Æg.

In Arabia.

A. capitul. lateralibus, paniculatis. Forsk. Æg.

In Arabia.

Fol. alterna, petiolat. Stipulæ binæ, lunatæ. Peduncul. longiss. Filam. basi lata.

- 351. CELO-SIA.** Cal. 3-phyll. cor. 5-petalæ facie. Stam. basi plicato coniuncta. Caps. horizontaliter dehiscens.
- 1. argentea.** C. fol. lanceol: stipul. subfalcata: pedunc. angulatis: spicis scariosis. Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. I. tab. H. 7.
Amaranthus &c. Mart. cent. 7. tab. 7. Pluk. phyt. tab. 118. f. 1.
Tsiera-belutta &c. Hort. mal. 10. tab. 39.
In China ⊙.
 Caul. sesquiped. Fol. basi attenuat-petiol. glabra. Spica oval-oblon. erecta, densi, parte florifera carnea, fructifera pallescente.
- 2. margarita-** C. fol. ovat. stipul. falcatis: pedunc. angulat. spicis scariosis. Syst. veg. ed. 14.
Amaranthus &c. Mart. cent. 7. tab. 7.
Belutta &c. Hort. Mal. 10. tab. 38.
In Malabarria ⊙.
 Simil. priori, ut forte variet. sed fol. fere ova-ta. Stam. purpur.
- 3. cristata.** C. fol. oblong-ovat. pedunc. teretibus, substria-tis: spicis oblong. Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. I. tab. H. 5. 6.
In Asia ⊙.
 Fl. rubri, & flavi. Var. fol. angustis, & latis.
- 4. paniculata.** C. caul. ad surgente, paniculato: fol. ovat-oblong: spicis terminalibus, remotis, alternis. Syst. veg. ed. 14.
Blitum &c. Sloan. Jam. hist. I. tab. 91. f. 2.
In Jamaica.
 Caul. prostrat. ramosus, teres. Fol. alterna. Spi-cæ terminal. sæpe ramosæ. Fl. alterni, di-fincti.
- 5. coccinea.** C. caul. sulcato: fol. ovatis, strictis, inauriculat. spicis multiplicibus, cristatis. Syst. veg. ed. 14.
Amaranthus &c. Bauh. hist. 2. p. 969.
In India.
 Differt a *C. cristata*, fol. triplo crassioribus, fra-gilibus: fl. penitus purpur. non rubicundis, carina purpur. staminibus cor. brevioribus, nec longioribus.
- 6. castrensis.** C. fol. lanceol-ovat. acuminatiss. linearis: stipul. falcat. spicis cristatis. Syst. veg. ed. 14.
Amaranthus &c. Barr. rar. tab. 1195. Bocc. mus. 2. tab. 66. Rumph. amb. 5. tab. 84.
In India ⊙.

Caul. 2-ped. ex viridi, & purpur. col. mixtus.

Rami lateral. ex singulis alis. Fol. subtus venis rubris striata; infer. s^ep^e terna. Stipul. dimidiatae, falcatae. Spic. maximae, palmam latae, coccineae. *Monstrositas* C. crista^ta.

7. *trigyna*. C. fol. ovat-oblong. racemo laxo; pistil. 3-fido.
Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 15.

In Senegallia ⊙.

Caul. erectus, 3-5-ped. herbac. simplex, subangulat. striatus, strictus. Fol. alterna, petiol. acuta, l^evia. Stipul. 2. amplexantes, horizontal. lunatae. Racemus longus, terminal. fl. aliquot passim congestis, subpedicellat. albis. Bract. distantes, ovatae, scariosae, argenteae. Pet. alba, vel carnea.

8. *lanata*. C. fol. lanceol. obtus. tomentosis: spicis confertis; staminibus lanatis. Syst. veg. ed. 14.

Ærva tomentosa. Forsk. Æg. Vahl.

In Zeylona.

Facies Halimi. Planta tomentosa, incana. Rami lignosi. Fol. alterna, subsessil. Racemi terminal. ex spicul. sessilibus, alternis, ovatis.

9. *Gnaphalo-ides*. C. frutic. lanata: fol. oppositis, ovatis, subtus albis: capitulo globoso, peduncul. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In Brasilia.

Simil. ob lanatam superficiem albam, *Celosii*, & *Illecebris lanatis*: sed differt fol. opposit. & capitul. solitar. terminal. peduncul. globo^so..

10. *nodiflora*. C. fol. cuneiform. acutiusc: spicis lateralibus globosis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 98.

Amaranthoides &c. Burm. Zeyl. tab. 5. f. 2. Pluk. alm. tab. 133. f. 2.

In Zeylona.

Caul. sesquiped. flexuos. punctul. albis adspersus. Rami alterni, horizontaliter patentes. Fol. subundul. integerr. glabra, glauco-viridia. Pedunc. axillar. breves. Spicæ solitar. peduncul. Fl. ex albo-virent. Calyc. loco bract. 1-3-linear. Var. fol. oblong. capitiulis peduncul. & fol. brevibus, subrotun. capitul. sessilibus.

11. *procumbens*. C. Vid. *Gomphren. interrupt.* Herit.

polygonoides. C. caul. hispido: fol. cordat. racemo spicato, laxo; fl. trigynis. Reiz. Obs. fasc. 2.

In Tranquebaria.

- Caul. herbac. erectiusc. striatus. Fol. alterna,
petiol. obtusa, scabia. Racemi simpl. glomerul.
remotis, alteratis, sessilibus, sub 2-fl. lævibus.
Cal. scariosus. Caps. urceol. opercul.*
- monsonia.* *C. caul. prostrato, divaric. tomentoso; fol. filiformibus: spicis cylindricis. Retz. Obs. fasc. 2.
Pluk. phyt. tab. 334. 4.*
Habitat . . .
*Habitus Achyranthes. Radix lignosa, subramosa.
Cau!. ramis brachiatis. Fol. nuda. Stipul. si
quæ, fol. similes. Spicæ numerosæ, solitar.
plerumq. peduncul. albæ, rubore sæpius tin
ctæ. Flosc. imbricati, exitus lanati.*
- pyramidalis.* *C. fol. infer. lanceol. undulat. superior. linearibus:
spicis pyramidalibus. Burm. Ind. tab. 25. f. I.
In Java.*
Caul. orgyal.
352. *CHENOLEA.* *Cal. 1-phyll. globosus. Caps. 1-sper. 1-valv.
1. diffusa.* *C. Thumb. nov. pl. gen. pag. 19.*
353. *II LECE-BRUM.* *Cal. 5-phyll. cartil-gineus. Cor. nulla. Stigm.
I. brachiatum.* *I. caul. erect. herbac. brachiat. fol. oppositis, læ
vibus. Syst. veg. ed. 14.*
*Amaranthus &c. Pluk. alm. tab. 334. f. 5.
In India Orient. ☽.*
*Caul. pedal. nudus, obsolete angulat. Fol. petiol.
lanceol-ovata. Spicæ pl. parvæ, villosæ, albæ,
glomeratæ.*
2. *sanguino
lentum.* *I. frutesc. fol. opposit. spic. composit. congestis.
Syst. veg. ed. 14.*
*Verbena &c. Rumph. amb. 7. tab. 27. f. 2.
In India 24.*
*Caul. sæpe prostrat. ramosiss. Fol. utrinq. rubra,
supra obscuriora. Spic. laxæ, alternæ, sessiles,
tomentosæ. Cal. virid. pubesc. Anth. luteæ.
Pistil. purpur.*
3. *canariense.* *I. fruticos. fol. elliptic. acutis: stipul. bracteisque
ovat. brevioribus: panicul. terminalibus, dichotom.
Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
In Tanariffa ♂.*
4. *lanatum.* *I. caul. subherbac. erecto: fol. altern. fl. latera
libus. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. app. tab. 85.
Achyranthes &c. Mill. dict. tab. II. f. I.
Chenopodium &c. Burm. Zeyl. tab. 26. f. I.
Amaranthus &c. Pluk. alm. tab. 75. f. 8.*

Scherubala. *Hort. mal.* 10. tab. 29.

Achyranthes villosa. *Forsk. Æg.* *Vahl.*

In India.

Caul. rigidus, subpilos. basi tantum ramosus.

Fol. petiol. acutiusc. integerr. nuda, subrufus pubescent. Pedunc. breviss. spicis 3-4-fessilibus, parvis, inæqualibus, cum foliolo, villosis, albis. Sem. reniform. atrum, nitidum. *Var. caud. erecto; spicis ereditis, ramosis, pl. & caud. prostrato, spicis subsolitar. breviss. simplicibus.*

5. *javanicum*. I. caud. herbac. erecto, albo, tomentoso: fol. alternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Iresine &c. *Burm. Ind. tab. 65. f. 2.*

Amaranthus &c. *Pluk. alm. tab. 10. f. 1.*

In Java.

Caul. orgyal. Fol. (*Mercurialis tomentosæ*) obovata-lanceol. ut caulis albo-tomentosa, supra cinerea. Spicæ terminal. adproximatæ. Cal. hyalinus, viridi car'natus. Cor. albida, pilis ex sericeo-splendentibus. Germ. globosum. Stigm. 2. rubra.

6. *Monsonia*. I. caulis prostrat. fol. subulat. spicis terminalibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Pluk. alm. tab. 334. f. 2.*

In India Orient. 24.

Caul. ramosi, terminati ramis magis elongatis, spitham. canescensibus. Fol. infer. fere in cespitem conferta; reliqua verticillata. Spicæ opposit. cylindricæ, subincarnaçæ, albican. pulcherrimæ.

7. *verticillatum*. I. fl. verticillat. nudis: caulis procumbentibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 335.*

Paronychia &c. *Vaill. paris. tab. 15. f. 1.*

In Europæ pascuis udis.

Habitus Herniarix. Fol. Serpylli. Cal. albus, nitidus.

8. *suffruticosum*. I. caud. suffrutic. fl. lateralibus, solitar. *Syst. veg. ed. 14.*

In Hispania ♂.

9. *cymosum*. I. spicis cymosis, secundis: caud. diffuso. *Syst. veg. ed. 14. Morif. hisp. 2. f. 5. tab. 29.*

Polygonum &c. *Bocc. Sic. tab. 20. f. 3.*

Monspelii, in Lusitania ♂.

Planta facie Sedi, aut Polygoni. Caul. filiform. brachiatus. Fol. subquaterna, linear. crassiu-

- scula. Calyces colorati, apice fornicati, aristati.
- 10. Paronychia.** I. caulibus procumbentibus: fol. laevibus: floribus bract. nitidis obvallatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Paronychia &c. Clus. hist. 2. p. 183.
In Hispania, Narbona &c. locis sterilibus 24.
 Caul. valde ramosus. Fol. minima, opposita, fessil. ovat-acuta, integerrima.
- 11. capitatum.** I. caulibus erectiusc: fol. ciliatis, subtus villosis: fl. bract. nitidis occitantibus capitula terminalia. *Syst. veg. ed. 14.*
Polygonum &c. Lob. ic. 420.
In Gallia narbon. agro Niceænsi &c. locis arenosis montuosis 24.
 Differt a priore caulibus brevioribus, erectis: capitul. ma.
- 12. bengalense.** I. caul. erecto, herbac: fol. alternis, oppositisq: lanceol. pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14.*
In Ind. Orient. Bengala, Java &c. ⊙.
 Caul. 1-sesquiped. subpubesc. Fol. subfessil. lat-lanceol. acumin. utrimq: virid. Spicæ parvæ, hirsutæ, albæ, axillar. & terminales, ubi absque fol. glomeratae.
- 13. arabicum.** I. caulibus procumbentibus: fl. sparsis, congestis, bracteas nitidas æquantibus. *Syst. veg. ed. 14.*
In Arabia.
 Simillim. I. *Paronychia*; at fl. non in capitula terminal. sed haec per totum caulem sparsa; bract. non fl. longiores. Fol. *Paronychia*, sed angustiora.
- 14. Achyrant.** I. caulibus repentibus, pilosis: fol. ovat. mucronata. oppolito minore: capitul. subgloboso, subspinoso. *Syst. veg. ed. 14.* *Dill. elth. tab. 7. f. 7.*
In Turcomannia ⊙.
 Caul. pedal-cubital. Capitul. axillar. paleac. Fl. minutiss. vix conspicui.
- 15. polygonoides.** I. caulibus repentibus, hirtis: fol. petiolat. lat-lanceol: capitul. orbiculat. nudis. *Syst. veg. ed. 14.*
Amaranthoides &c. Herm. Parad. tab. 17. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 86. f. 2.
b. Amaranthoides &c. Plum. ic. tab. 21. f. 2.
In Americae littoribus maris.

Simill. sequenti, sed caul. non fl. villoso.

Caul. dichotom. Fol. opposita, acuta, integrerr. laevia, venosissima. Fl. axill. albi.

16. *ficoideum*. I. *caulibus repentibus, glabris: fol. petiol. (cuneiformi-ovat.) capitul. orbiculat. pubescen. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 60. f. 4. ed. 2. pict. tab. 90.*

In marinis litoribus Americæ, nunc Hispaniæ 24.

Planta radicans. Fol. sessil. acuta. Capitui. plura, parva, sessil. subrotunda. Cor. acutis oculis pubescent. sunt. Nectar. radiis 5. apice laceris.

17. *sessile*. I. *caulibus repentibus, bifarie tomentosis: fol. subsessilibus, lanceolat. capitul. oblong. glabris. Syst. veg. ed. 14.*

Amaranthus &c. Burm. Zeyl. tab. 4. f. 2.

Amaranthoides &c. Pluk. alm. tab. 133. f. 1. phyt. tab. 132. f. 6.

Olus squillarum. Rumph. amb. 6. tab. 15. f. 1.

Coluppa. Hort. Mal. 10. tab. 9.

Alternaanthera. Forsk. Æg. Vahl.

In India Orient.

Caul. procumb. radicans, purpur. bifariam anceps, linea villosa (ut in Veron. Chamædry). Fol. laevia; tenella ferrata, adulta vix manifeste. Spicæ alternæ.

*Mire variat magnitudine totius plantæ: caul. eret-
diusc: fol. ovat. lanceolat. oblong: elliptic. ses-
silis, petiolat: capitul. solitar. & compositis.*

18. *vermicula-* I. *caulibus repentibus, glabris: fol. subtereti-
tum. bus, carnosis: capitul. terminalibus, oblong.
glabris. Syst. veg ed. 14.*

*Amaranthoides &c. Herm. par. tab. 15. Pluk.
alm. tab. 75. f. 9.*

In Brasilia, Curaçao.

*Caul. seimpedit. & ultra, rufescent. Ad singulos
nodos fol. 2-4. Hyssopi æmula, opposita. Ca-
pitul. album.*

19. *alpinifo-* I. *caulibus diffusis: fol. ovat: fl. congestis: bra-
cteis nitidis. Syst. veg. ed. 14. Scop: Delic.
Ins. fasc. 3. tab. 13.*

In India ☽.

*Caul. primo erectus, dein a ramorum, florumq.
pondere depresso, teres, pilosus, a terra
ramosus, 2-3-ped. Rami primi oppositi, pa-*

tuli; cæteri alterni. Fol. opposita, brevipediol: deflexa, ima acutiora, ramea obtusiora; omnia in senio luteo-rubra. Capitula lateralia, parva, sessilia, ovata, obtusa, bracteis oblongis, villosis, albis; ex quorum sinu fl. parvi, involucro ex foliol. quinis, cartilagineis, supra medium luteis, apice truncatis, aut inciso-dentat.

Kapela.

I. *Hacq: pl. alp. Carn. tab. 2. f. 1.*

In Carniola 24.

Caul. repent. 2-pollic. ramosi, verrucosi. Fol. 2-3. linear. alterna, sessil. ovata, lanceol. integerr. Stipul. cum fol. alternantes, integerr. glabræ, albissimæ, pellucidæ. Fl. terminal. capitati, ovati, bract. nitidis occultati. Simil. *I. Paronychia*, & *capitato*.

frutescens.

I. caule fruticoso, diffuso, dichotomo: fol. oppositis, pulverulentis. *Herit. Stirp. nov. fasc. 4. tab. 37.*

In aridis Limæ 5.

Planta prostrata, tota pulverulenta. Rad. fibrosa, ramosa, grisea. Caul. ramis undiq. alternis quasi dichotomus, teres, cinereus. Ramæ flexuosi, anulati, nodis purpurascens. Fol. breviter petiolata, ovalia, seu subrotunda, obtusa, vix manifeste acuminata, in petiolum brevissimum desinentia, subnervosa, subtus cinerea, patentia, demum dependentia, 1. poll. long. 8-lin. lata. Spicæ solitariae, dichotomales, axillaresq. sessiles, dum fructiferæ pedunculatae, ovatae, imbricatae, 3 lin. longæ. Fl. imbricati, confertissimi, sessiles, ex herbaceo-albicantes, 2. lin. longi.

354. *GLAUX*. Cal. 5-fid. coloratus. Caps. 1-locul. 5-valv. 5-sperm.

I. maritima. G. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 548. Sabb. hort. I. tab. 31.*

Alsine &c. Locsil. pruss. tab. 3.

In Europæ maritimis, salmis 24.

Rad. geniculata. Caul. erect. digital. ramis opposit. Fol. sessil. linear-lanceol. obtusifl. integerr. subcarnosa, late virid. glabra: infer. opposita; floralia alterna. Fl. axill. sessiles, solitar. ex albido-dilute purpur.

355. THE- Sem. unicum calyci adnascitur, ita ut segmenta cal.
SIUM. ex summo sem. nasci videantur. Segmenta cal.
triangularia, 5-4. intus colorata. Stam. tot,
quot segmenta floris. Tuba simpl. apice glo-
boso.

1. *linophyllum*. T. caul. erecto, paniculato; fol. linear-lanceol.
T. panicul. foliac. fol. linearibus. Syst. veg.
ed. 14. Mont. in Zann. tab. 34. f. 2.
Sesamoides &c. Moris. hist. 3. f. 15. tab. I. f. 3.
Anonymos &c. Clus. hist. I. p. 324.
In Europæ siccis montosis, cretaceis; & in Oriente
24.

Caul. sesquiped. Gemmæ radical. Fol. sparsa; ra-
dical. longe petiolat. elliptica, circumferrata,
trinervia, ad caulem frequentia; *Lini* simil
mucronata. Panicula sparsa. Cal. extus viri-
dis, intus albicans. Sem. oblong. Flos sæpe
5-fid.

2. *alpinum*. T. caul. diffuso: fol. linearibus: fl. axillaribus.
T. racemo foliato: fol. linearibus. Syst. veg. ed.
14. Jacq: Austr. 5. tab. 416. Ger. prov. tab.
17. f. 1.

In alpibus Italæ, & in Germaniæ &c. collibus ⊖.
Habitus prioris. Planta tota glabra. Caul. 3-9-
unc. Gemmæ ex antiquis stipitibus prodeunt.
Fol. sparsa, sessil. integerr. enervia, paucio-
ra, patentiora, rigida. Panicula heteromall.
Fl. subsessil. sæpe 4-quandoq. 3-fid: Sem.
oval.

3. *Frisea*. T. floribus subspicat. secundis, ciliato-lanat: fol.
subulat. Syst. veg. ed. 14.

Ad cap. b. Spei.

Caul. palm. simpl. duriusc. Fol. alterna, paten-
tia. Fl. alterni, sessil. adproximati. Bract. pro-
priæ 2. lateral. Cal. 5-fid. Sem. ovat. valde
rugosum, magnitudine sem. *Coriandri*, apice
calyce persistente, intus villoso.

4. *spicatum*. T. fl. spicat. laevibus: fol. subulatis, breviss. re-
motissim. Syst. veg. ed. 14.

In cap. b. Spei montibus.

Caul. erect. 3-ped. crassitie pennæ, strictus, sub-
angulat. prolifer. Fol. minutissima, ut fere
nulla. Spic. oblong. crassitie digitæ tenuioris.
Fl. distincti bract. 3. acumin. margine mem-
branac.

5. *capitatum*. T. fl. capitat. terminalibus, sessilibus: fol. triquetris, lœvibus: bract. ovat. Syst. veg. ed. 14.
In Æthiopia ♂.
 Caul. duri. Rami alterni, remoti, super. sensim longior. Fol. parva, alterna, subulata, mucronata. Sub capitul. ramus excrescit. Fl. laciniæ valde acumin. & interne villotæ.
6. *strictum*. T. fl. umbellat. fol. linearibus, decurrentibus.
Syst. veg. ed. 14.
Ad cap. b. Spei.
 Caul. ramosus, angulat. Fol. alterna, remota. Umbellæ peduncul. compositæ, involucratæ. Cal. intus lœvis.
7. *umbellatum*. T. fl. umbellat: fol. oblong. *Syst. veg. ed. 14.*
 Centaurium &c. Pluk. mant. tab. 342. f. 1.
In Virginie, Pensilvaniæ pastuis siccis 24.
 Fol. alterna, ovali-lanceol. integrerr. Rami alterni, in apice caul. Umbellæ terminal. racemosæ, involucr. 4-phyl. parvo; fl. 5-3.
8. *scabrum*. T. capitul. pedunculat. fol. triquetris, margine, carinaq. scaberrimis. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei ♂.
 Simil. T. *capitato*, sed capitula longo pedunc. nudo: fl. obtusiusc. tantum ad apices interne villosi.
9. *paniculatum*. T. totum paniculatum. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei ♂.
 Caul. pedal. sublignos. Fol. minuta, alterna, linear. suprema subulata. Fl. minutæ, peduncul. Cal. 3-4-5-fid. spatio remotus. Fruct. facie *Coriandri*.
10. *amplexicaule*. T. fl. subspicat. secund. ciliato-lanatis. *Syst. veg. ed. 14.*
In cap. b. Spei montibus altis ♂.
 Caul. 4-ped. erect. sublignos. sub-angulat. lœvis. Fol. alterna, sessili-ampexicaul. cordata, acutiusc. integer. lœvia, crassiusc. pollic. Fl. minutæ, mixti bract. ma. ovatis.
11. *euphorbioi*- T. pedunc. terminalibus, 3-fl. fol. subovat. carnosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei.
Facies Euphorbiæ. Rami superne dichotomi. Fol. alterna, rotundata-ovata, carnosa, lœvia. Fl. pedicellati.
12. *Colpoon*. T. fol. opposit. petiolat. obovat. planis, inte-

gerr: corymb. terminal. aphyl. *Syst. veg. ed.*

14. *Lin. Suppl. Berg. Fl. cap. tab. I. f. I.*

Ad cap. b. Spei \ddot{h} .

Arb. ramulis compressis, ancipitibusq. Fol. glabra.

13. *spinosum*. T. fol. subulat. mucronat: fl. axillar. solitar.

Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Dignoscitur fol. patentibus, subulat. canaliculat. apice spina terminatis.

14. *triflorum*. T. caul. angulato: fol. lanceol. pedunc. axillar.

trichotom. compositis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

15. *fragile*. T. caul. angulato: fol. ovatis, triquetris, decurrentibus, carinatis: fl. axillar. sessilibus.

Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Habitus Salsolæ. Fol. brevissima, ut nulla appareant.

16. *squarrosum*. T. caul. tereti: fol. linearis-subulat. recurvato-reflexis: fl. axillar. sessilibus. *Syst. veg. ed.*

14. *Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Fol. recurvatis valde squarrosa.

17. *lineatum*. T. caul. tereti, angulat. inferne aphyll: fol. linearibus: ramis rectis, divaricatis: fl. axillar. pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

356. RAUFOLFIA. Contorta. Bacca succulenta, 2-sperm.

1. *nitida*. R. glaberrima, nitidissima. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 236. f. I.*

In Amer. merid. \ddot{h} .

Arbusc. 12-ped. lacte candido, & glutinoso scatens. Fol. ad nodos quaterna, petiol. lanceol. utrimq. acuta, integerr. quorum proxima duo 5-pollic. reliquis 2. duplo longiora. Racemi terminal. Fl. parvi, albi. Fruct. maturi atropurpur.

2. *canescens*. R. subpubescens. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. ed. 2. piæt. tab. 259. f. 17. quoad florem.*

Plum. ic. tab. 236. f. 2.

Solani &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 211. f. 1.

Arbor &c. Pluk. phyt. 266. f. 1.

In Jamaica \ddot{h} .

Frutex 1-8-ped. lactescens. Rami subtoment. Fol. ut in priore, sed obovat. acuta, subtus potius toment. quam hirsuta. Pedunc. terminal. ramosi, quaterni. Fl. parvi, subrubent. Fruct. obsolete 2-fid. ruber, dein ater. Nucæ 2.

3. tomentosa. R. tomentosa. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 2. tab. 35. amer. ed. 2. piætab. 46.

In Carthaginæ rupestribus ♂.

Frutex 3-ped. lactescens. Fol. ut in prioribus, sed lanceol. acuta, utrimq: tomentosa. Racem. axill. & terminal. Fl. parvi, candidi. Fruct. pifiform. ruber, dein niger.

357. PÆDE- RIA. Contorta. Styl. 2-fid. Bacca vacua, fragilis, 2-sperm.

1. fœtidæ. P. Syst. veg. ed. 14.

Convolvulus fœtid. Rumph. amb. 5. tab. 160.

In India ♀.

Caul. volubil. lœvis. Fol. opposita, petiolat. cordata, oblong. integerr. lœvia, fœtida, subtus tomentosa. Panicul. axill. brachiatæ. Fl. parvi, extus pallide ciner; intus purpur. vel fuscæ, lanuginosæ. Bacæ maturæ flavescent.

Var. vel species distincta ramis striat. fol. oblong. linear-lanceol. obtusis, glabris; panicula dense. Retz. Obs. fasc. I.

358. CARISSA. Contorta. Bacæ 2. polysperm.

1. Carandas. C. fol. elliptic. obtusis. Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. 7. tab. 25.

Lycium &c. Pluk. alm. 305. f. 4. sed cordata, non 4-fid.

Antura Forsk. Æg. Vahl.

In India ♂.

Arb. ramis dichotom. Fol. opposita, petiol. integerr. lœvia. Spinæ axillar. opposit. fol. breviores, patent. Pedunc. subterminal. gemini, 3-fl. Fl. Jasmini facie, albi.

2. spinarum. C. fol. ovat. acutis. Syst. veg. ed. 14.

Spina spinarum. Rumph. amb. 7. tab. 19. f. 1.

In Ind. Orient. ♂.

Arb. ramis horizontalibus. Spinæ 2. ad singulas ramificat. oppositæ, altera supra, altera infra ramum; pollic. patentiss. robustæ, teretes, apice rubræ, nitidæq. ut in priore. Fol. opposita, subsessil. coriacea, integerr. lœvia, pari

pari uno ad singulam dichotomiam; pariq.
unico inter singulas dichotomias. Pedunc. ter-
minal. breviss. Fl. 5-6. parvi.

359. CERBERA. Contorta. Drupa 1-sperin.

I. Ahovai. C. fol. ovatis Syst. veg. ed. 14.

Ahovai. Pif. Bras. 49.

In Brasilia ♂.

Arbor altitud. Pyri. Fol. 2-3. pollic. longa,
2. lata, Malo vulg. similia. Rami amputati
humanum sterlus olen. Fruct. magnitudine
mediocris Castaneæ, triquetri, deltoidei su-
perficie inæquali. In summo apice, in quo
foramen pervium, 4. ducuntur sulci, in to-
tidem quadrantes fructum dividentes. Planta
venenata.

2. Manghas. C. fol. lanceolat. nervis transversalibus. Syst.
veg. ed. 14. Mont. in Zann. tab. 9. Peuv. gaz.
tab. 16. f. 4. Burm. Zeyl. tab. 70. f. 1.

Arbor lactaria. Rumph. amb. 2. tab. 81.

Ocollam. Hort. Mab. 1. tab. 39.

In Indiis, ad aquas ♂.

Arb. lactescens. Fol. alterna, sparsa ad apices
ramorum, petioiat. late-lanceol. glabra, inte-
gerr. pedal. Racemi terminal. ramosi, inæ-
qual. Cor. alba. Drupa ovata, magnitud. ovi
anserini, viridis, punct. albis, minutiss. ad-
spersa. Sem. 2. veluti 2. Castaneæ magnæ.
Planta venenata, vomitoria.

3. Thevetia. C. fol. linearibus, longissim. confertis. Syst. veg.
ed. 14. Jacq. amer. tab. 34. ed. 2. piæ. tab.
47.

Ahovai &c. Plum. ic. 18. Pif. bras. l. 3. ad fi-
nem.

Nerio &c. Pluk. alm. tub. 207. f. 3.

In Cuba; & Martinica rarius ♂.

Planta succo venenata. Arbusc. 12-ped. Fol. sub
4-pollic. integerr. glabra. Pedunc. axill. 1-
multifl. Fl. magni, lutei, odoratiss. Drupa
oblong. virid.

360. GARDE-Contorta. Bacca infera, 2-4-locul. polysperm.
NIA. Cor. 1-petal. Anth. tubo cor. absq. filament.
insertæ.

* Inermes.

I. radicans. G. inermis; caul. radicante: fol. elliptic: cal.
Tom. II.

E

angulato: cor. obtus. Syst. veg. ed. 14. Thumb.
Jap. tab. 20.

Djuped. Dissert. de Gardenia. Ups. 1780. tab. 1.
f. 1. Act. Medic. Soc. T. 1. tab. 11. f. 1.

Kurtjnas &c. Kæmph. am. exot. p. 808.

In Japonia 24.

Dissert a G. florida, quod multoties minor sit;
caul. tenui, frutesc. decumbent. radicante; fo-
liisq. angustis, ellipticis.

Caul. subped. glaber. Rami oppositi, erecti,
flexuosi. Fol. in apice ramorum confluentia,
1--2-polli. erecta, subsessil. integerr. paralel-
lo-nervosa, glabra. Stpul. iotratoliac. vagi-
nant. membranac. Fl. terminal. solitar. sub-
sessil. Cor. saepius plena, coriacea, alba:
limbi laciniæ oblong. obtusæ, planæ.

2. *florida*. G. inermis; fol. ovat. acutis: cal. angulato: cor.
obtusis. Syst. veg. ed. 14. Ellis. Act. angl.
Vol. 51. tab. 23.

Jasminum &c. Ehrei. piæ. tab. 15. optime. Burm.
Zeyl. tab. 59.

Jasminum capense. Mill. ic. tab. 180. Rumph.
Amb. 7. tab. 14. f. 2.

In Ind. Orient. Suratte, Amboina, cap. b. Spei
b.

Caul. 3--4-ped. valde frondosus, glaber. Rami
oppositi, incurvi. Fol. subsessil. 2-polli. longa,
poll. lata opposita, nitida, glabra. Fl. dia-
metro sub 5-digit. odori, albi. Pétal. 22. ro-
facea. Cor. raro simpl. saepe plena.

3. *Thumber-* G. inerm. fol. ovat. utrimq: acutis: cal. tere-
gia. ti: cor. obtusis. Syst. veg. ed. 14. Thumb.

Diss. de Garden. tab. 2. f. 7. quoad fructum.

Thumbergia capensis. Act. Stock. 1773. tab. 11.
Sonner. Guin. tab. 17. 18.

Ad cap. b. Spei, & in Guinea b.

Caul. arboresc. orgyal. ramosiss. Fol. brevit. petiol.
verticillata 3-4. integerr. glabra, oblique stria-
ra, concava, subundulata, inæqualia, poris
secretoris pilosis in axill. nervorum pag: in-
fer. Fl. terminal. solitar. erecti, sessil. longi,
albi, speciosi, suaveolent. numero partium
variantes 5-10. Cal. coronatus foliol. 4-6,
petiolat. Cor. tubo longo, limbo plano, 7-9-
10 part. Simill. priori.

4. *gummiifera*. G. inerm. fol. oblong. obtusis; cal. hirto: cor. obtusis. Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. tab. 2. f. 3. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 12. f. 3.

In Zeylona 24.

Refert G. floridam magnitudine, & fig. limbi cor. sed cor. tubus longior, magis filiform. pilis tenuioribus testus.

Ex rimis corticis caul: & ex fol. sudat Gummi resina, Gummi Elimi sinillima.

5. *Mussenda*. G. inerm., fol. ovat. acutis; cal. hirto: cor. acutis. Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c.

Mussænda formosa. Syst. veg. ed. 13. Jacq. amer. piæt. tab. 70.

In Amer. australi, & Guiana H.

Frutex 5-ped. ramis teretibus, hirtis. Fol. pollic. breviss. petiolat. opposita, glabra. Stipul. interfoliaceæ. Fl. axill. & terminal. solitar. sessil. Cor. alba, tubo elongato, filiformi, basi sursum curvo, dein recto; limbo 5-part. lacinias carnosis.

6. *Rothmannia*. G. inerm., fol. oblong. acutis: cal. glabro: cor. subcampanulat. acuta. Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c.

Rothmannia capensis. Ad. Stock. 1776. tab. 2.

Ad cap. b. Spei H.

Lignum durissimum. Fl. albi, suaveolent. præcipue nocte, terminales, solitar. sessiles.

** *Spinosæ*.

7. *spinosa*. G. spinosa; fl. sessilibus, hirsutis. Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. tab. 2. f. 4. Pluk. phyt. tab. 304. f. 4. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 12. f. 4.

In Madrass. H.

Frutex spinis horridus, ramis rigidiss. glabris. Fol. parva, opposita, glaberr. ovata, obtusa, inæqual. pollicar. Ramuli axill. breviss. 1-fl. Spinæ pollic. horizontal. decussitæ, rectæ, rigidissimæ. Fl. in apice ramorum solitar. Cor. vix calyce ma: extus hirsuta, 5-part. alba.

8. *micranthus*. G. spinosa; fl. sessilibus, glabris. Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. tab. 1. f. 2. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 11. f. 2.

Ad cap. b. Spei H.

Caul. fruticosus, ramosus. Rami villosi, parum ramulosi, spinosi. Spinæ suprafoliae. oppositæ,

acutæ, semiunguicul. Fol. e gemmis intra spinas opposita, petiolat. ovata, acuta, integerr. glabra, nervosa, parentia, unguicular. Fl. axill. 2-3, magnitudine sem. *Oryza*. Cor. subcampanul. 5--part. laciniis ovatis, acutis, reflexis.

- g. *scandens*. G. *spinosa*, scandens; fl. pedunculat. *Syst. veg.* ed. 14. *Thunb. l. c. tab. 2. f. 5. Act. Medic. Svec. T. 1. tab. 12. f. 6.*
Ad cap. b. Spei H.
Ad hoc genus spectat Tocoyena longifl. *Aublet. Guian. tab. 50.*

- jasminoides*. G. *Retz. Obs. fasc. 2.*
In China.

Frutex opposite, alterneque ramosiss. spinis supraxillaribus, brevibus. Fol. opposita, sparsæq. ovata, integerr. Fl. terminal. subsolitar. peduncul. omnino *Jasmini odorat.* sed stam. & pist. *Gardenia*.

- dumetorum*. G. *Retz. Obs. fasc. 2.*
In Ind. Orient.

Frutex ramis teretibus: spinis pollic. oppositis, simplicibus, subaxillar. Fol. *Buxi* paulo min. obovata, integerr. Fl. parvi, solitar. breviter peduncul. Cor. limbo 5-part. lacin. rotundat. utrimq. hirsuta. Bacca exsucca, umbilic. 3-locul. 1-valv.

- uliginosa*. G. *Retz. Obs. fasc. 2.*
In India paludosis.

Frutex ramis sub 4-gon. fuscis; ramulis brevibus, oppositis, apice foliosis, & bispinosis. Fol. elliptica, obtusa, glabra. Cor. tubo brevi, intus hirsuto; laciniis rotundatis, cavis.

361. ALLA- Contorta. Caps. lentiform. erecta, echinata, 1-MANDA. locul. 2-valv. polysper.

- I. *cathartica*. A. *Syst. veg. ed. 14.*

Apocynum &c. Plum. ic. 29.

Orelia grandiflora. *Aubl. Guian. tab. 106. f. bona.*

In Guiana, Surinami, iuxta fluvios H.

Planta frutesc. scandens, lactescens. Caul. pl. farmentosi, ramosi, nodosi. Fol. verticill. subquaterna, subsessil. ovat-oblong. obtusa cum acumine, integerr. nitida. Fl. corymb. Flos magnus, luteus, lunatus. Cor. insfundibul. limb.

patent. 5-fid. lacin. amplis, subrotun. acut.
Capl. ovata.

Ad Colicam pectorum infusum fol.

362. VINCA. Contorta. Folliculi 2-erecti. Sem. nuda, remota.
Cor. hypocrateritor. 5-fida, lacin. extrorsum
latioribus.

1. minor. V. caulibus procumbentibus: fol. lanceol-ovat. fl.
pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Ludw. et al. tab. 75.*
Black. tab. 59. Dod. Pempt. 405.

Clematis 1. Matth.

Ad Europæ sepes ubique vulgarissima 24.

Fol. opposita, integerr. pulchre virent. nitida,
glabra; min. obtusiora, margine lævia. Pe-
dunc. curvati. Cal. breves. Var. fl. albis, cœ-
rul. rubentibus; & pleno, rubente; necnon fol.
variegat.

2. maior. V. caulibus erectis: fol. ovatis: fl. pedunculat.
Syst. veg. ed. 14.

Pervinca &c. *Garid. Aix. tab. 81.*

In Europa 24.

Var. prioris. Caul. cubital. Fol. petiolat. ovat-
cordata, acumin. marginie tenui tomento ci-
liata, glabra, tenera, læte virent. Cor. ma-
gna, amæne cœrul.

3. lutea. V. caul. volub. fol. oblong. *Syst. veg. ed. 14.*
Apocynaum &c. *Catesb. Car. 2. tab. 53.*

In Carolina 3.

Caul. 10--15--ped. Fol. opposita, petiol. Salici-
form. rudia, dilute virid. Fl. terminal. race-
mosi, 6-8. lutei.

4. rosea. V. caul. frutesc. erecto: fol. ovat-oblong. petiolis
basi bidentat. fl. geminis. *Syst. veg. ed. 14.*
Mill. dict. tab. 186.

In Madagascär, Java 3.

Caul. rigidulus, teres, lævis. Fol. opposita,
coriacea, rachi alba. Fl. axill. sessil. Cal. in
setas 5. subulatas. Cor. rosea, pulcherrima,
plana, umbil. atro-purpur.

5. pusilla. V. caul. herbac. fl. geminis pedunculat. *Syst. veg.*
ed. 14. Lin. Suppl. Comm. Gotting. 1776. tab.
2. f. 1.

In Tranquebariae hortis 3.

Simil. priori, ut vix sp. diversa. Caul. spitham.
4-gon. Fol. ad latera, & saepe ad apicem.
Cor. magnitud. & col. *Lithospermi officin.*

363. NERI- Contorta . Follic. 2. erecti . Sem. plumosa . CAL-
UM . parvus , 5-fidus . Cor. tubus terminatus coro-
na lacera , villosa ; laciniis magnis , profundis .
1. Oleander . N. fol. ternis , linear-lanceol. cor. coronatis .
Syst. veg. ed. 14. *Black.* tab. 53. *Burm.* Zeyl.
tab. 77. *Lob.* ic. 364.
Areli . *Hort. mal.* 9. tab. 1. 2.
Nerio . *Mutit.*
- b. N. latifolium . Herm. *Lugd.* tab. 449.
In Ind. Orient. locis subhumidis ; Italiæ &c. col-
libus ♂ .
Arbusc. ramis , & surcul. dichotom. Fol. petiol.
integerr. nervosa , rigida . Fl. terminal. race-
mosi . Cor. alba , rosea , quandoque duplex .
2. zeylanicum . N. fol. oppositis , lanceol. ramis rectis . *Syst.*
veg. ed. 14.
Apocynum &c. *Burm.* Zeyl. tab. 12. f. 2.
In India ♂ .
Arbusc. ramis longis , purpurascens . Fol.
subpetiol. acumin. laevia .
3. divaricatum . N. ramis divaricat. fol. lanceol-ovat. *Syst. veg.*
ed. 14.
In India ♂ .
Arbusc. ramis crassis , rugosis . Fol. petiolat. u-
trumq. acumin. integerr. glabra . Fl. candidi .
4. antidyseente- N. fol. petiolat. ovatis , acuminat. *Syst. veg. ed.*
ricum . 14. *Burm.* Zeyl. tab. 77.
Codaga pala . *Hort. mal.* 1. tab. 47.
In Malabarria , Zeylora , Russia ♂ .
Arbusc. fol. suboppositis , latis . Fl. terminal. Pe-
tal. alba , odora . Follic. longiss. angusti .
-
- obesum . N. fol. sparsis , oblongis : ramis Ioriformibus .
Forsk. Suppl. Aeg.
In Arabia ♂ .
Caudex mollis , bulbum referens supra terram ,
volumine cipit. humani .
364. ECHI- Contorta . Follic 2. longi , recti . Sem. papposa .
TES . Cor. infundibulif. fauce nuda .
1. biflora . E. pedunc. (plerumq.) biflor. *Syst. veg.* ed. 14.
Jucq. amer. tab. 21. ed. 2. piñ. tab. 28.
Apocynum &c. *Plum. amer.* tab. 96.
In America ♂ .
Frutex etiam 20-pedal. Caul. partim volub. par-
tim erecti , late niveo scatentes . Fol. 3-pol-

lic. oblong. basi attenuata, obtusa cum exiguo acumine. Fl. speciosi, candiss. fauce lutea. Cor. limbo truncato.

2. *s.-angula-* E. fol. ovat. acutis: pedunc. racemosis. *Syst. veg.*
ris. ed. 14. *Jacq. amer. piæt. tab. 32.*

In Amer. meridion. ♂.

Planta non lactescens. Caul. fruticos. volub. scabriusc. Fol. 3-pollic. Racemi simpl. Fl. sub 16. magni, virentes, limbo flaviusc. margine tubi s-gon. albo. Cor. anulo elevato circa umbilicum.

3. *subereæta.* E. fol. subovat. obtusis, mucronatis: pedunc. racemosis. *Syst. veg.* ed. 14. *Jacq. amer. tab. 26.*
ed. 2. piæt. tab. 33.

Apocynum &c. Sloan. Jam. hist. I. tab. 130. f. 2.
In Jamaica ♂.

Habitu a congeneribus differt. Planta in fruticetis 10-ped. in pratis 3-vix 1-ped. lacte candido scatens. Fol. quandoque subtus sabra. Fl. pauci, magni, speciosi, flavi, tubo hirsuto. Follicul. fusc.

4. *adglutina-* E. fol. ovat. emarginat. cum acum. pedunc. ra-
ta. cemosis. *Syst. veg.* ed. 14. *Jacq. amer. tab.*
23. ed. piæt. tab. 30. Burm. Ind. tab. 27. f. 1.

In Domingo fruticetis montosis ♀.

Caul. volub. Fol. 4-pollic. Pedunc. saepe difform. quandoq. 2-fidi. Fl. parvi, candidi. Cor. la-
ciniis acuminat.

5. *torulosa.* E. fol. lanceol. acuminat: pedunc. subracemosis.
Syst. veg. ed. 14. *Jacq. amer. tab. 27. ed. piæt.*
tab. 34.

Nerium &c. Brown. Jam. tab. 16. f. 2.

In Jamaica ♂.

Tota planta glutine lacteo scatet. Caul. frutic. vo-
lub. teretes. Fol. 2-pollic. Pedunc sub 6-fl.
Fl. parvi, flavi. Follic. filiform. longiss. tor-
ulosi.

6. *umbellata.* E. pedunc. umbellat. caul. volub: fol. ovat. ob-
tusis, mucronatis. *Syst. veg.* ed. 14. *Jacq. amer.*
tab. 22. ed. piæt. tab. 29.

Apocynum &c. Sloan. Jam. hist. I. tab. 131.
f. 2.

In Jamaica ♂.

Caul. fruticosi, volubil. 15-ped. succo glutinoso
scatentes. Fol. 3 pollic. subcord. Stipul. non-

nullæ. Fl. 47. magni, pulchri, tubo extus virid. limbo candido.

7. trifida. E. pedunc. trifid. multifl: fol. ovat-oblong: acuminat. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 24. ed. piçt. tab. 31.

In America H.

Tota planta laetescit. Caul. fruticos. volub. 12-ped. Fol. 3-politic. Pedunc. breves, pedicell. distortibus. Fl. magni, pulchri. Cor. tubo sordide purpur. limbo sordide virenti.

8. repens. E. pedunc. multifl. divisus: fol. lanceol-oblong. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 28. ed. piçt. tab. 35.

In Domingo, locis rupestribus H.

Planta elegans, fruticosa. Caul. sarmentosi, iuiores suberecti, ad folia in nodos discoideos incrassati. Pedunc. saepius 2-fid. Fl. elegantes, rubri.

9. corymbosa. E. racemis corymbos. fol. lanceol-ovat. staminibus eminentibus. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 30. ed. piçt. tab. 37.

In Sylvaticis Domingo H.

Caul. fruticos. volub. 20-ped. lacte candido scatens. Fol. multa, varia, ovat. oval. ob-ovat. acuta, 2-pollic. Fl. multi, parvi, rubri.

10. spicata. E. spicis axillar. brevibus: fol. subovat. staminibus eminentibus. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 29. ed. piçt. tab. 36.

In sylvis Carthagene H.

Caul. volub. sarmentos. etiam 60-ped. Fol. semi-ped. disticha, oblong. glabriusc. venosa. Spicæ oppositæ, densæ. Fl. multi, parvi, candidi, subsessil. vix odori.

11. caudata. E. cor. infundibulifor. apicibus eminentibus. Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 26.

In India H.

Arbor caul. volub. striato. Fol. opposita, petiol. lanceol-ellipt. integerr. nudæ. Fl. axill. peduncul. erecti, magnitudine Nerii.

12. scholaris. E. fol. subverticillat. oblong: umbellis compositis: follicul. filiformibus, longiss. Syst. veg. ed. 14.

Lignum scholare. Rumph. amb. 2. tab. 82.

In India H.

Arb. ramis ad genicula tantum foliatis. Fol. ad

genicula 5-7. ovali-lanceol. coriacea, transverse striata, integrir. petiolat. Pedunc. aliquot interfoliacei. Fl. parvi. Follicul. bini, sesquiped.

13. anularis. E. caul. volub. cor. hypocraterifor: tubo anulo elevato. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In Surinamo.

Fol. pedal. opposita, petiol. Racem. axill. peduncul. 2-tidi.

14. siphilitica. E. fol. subpetiol. ovatis, glaberrim. costatis: panicul. dichotom. fl. sp. catis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In Surinamo H.

Fol. magna, dodrant. & ultra, opposita, acuta. Pedunc. axill. Cor. magna, alba, simil. reliquis speciebus; limbo magno, piano

Decodum herbae in siphilitide usitauissimum Surinamensibus.

15. succulenta. E. aculeis 2. extrafoliac: fol. linearibus, subtus tomentos: cor. infundibulifor. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei H.

Filamenta haibata.

16. bispinosa. E. aculeis 2. extrafoliac: fol. lanceol. globris: cor. hypocraterifor. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei H.

nummularia. E. fol. cordat. acuminat: pedunc. 2-fl. Burm. Ind. tab. 28. f. 1.

In India H.

365. PLUME-Contorta. Folliculi 2: reflexi. Sem. membranæ RIA. propriæ inserta.

1. rubra. P. fol. ovat oblong: petolis biglandulosis. Syst. veg. ed. 14. Ehret. piæ. tab. 10. Trev. Ehret. tab. 40. Catesb. Carol. 2. tab. 92.

Nerium &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 185. f. 1. & tab. 186. f. 1.

Jasminum &c. Merian. Surin. tab. 8.

Clematis &c. Pluk. alm. tab. 207. f. 2.

In Jamaica, Surinamo H.

Arbor. procera, coma ampla, sed rara. Fl. multi, speciosi, rubri, suaveolent. Laðe niveo scat.

2. alba. P. fol. lanceolat. revolutis: peduncul. superne

tuberosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 174. f. 12. ed. pict. tab. 38. Plum. ic. 231.*

Apocynum &c. Comm. hort. 2. tab. 24.

In Jamaica.

Arb. sub 15-ped. parum ramosa, lacte candido scatens. Fol. longe petiol. decidua. Pedunc. vertical. longiss: superne 3-sid. Fl. magni, candidi, fauce flavesc. odore suavi. Folliculi acinacifor.

3. *obtusa*. P. fol. ovali-lanceol. petiolat. obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Cates. Cor. 2. tab. 93. Plum. ic. 232.*

In Amer. calidiore \ddagger .

Caudex cicratizatus. Fol. in orbem posita, subfessil. integerr. Pedunc. ramosi. Fl. 2-3. pulchri, nivei.

4. *pudica*. P. fl. limbo clausis. *Syst. veg. ed. 14.*

In America \ddagger ?

Arbusc. 5-ped. lactescens. Fol. frondosa, oblong. plana, venosa. Fl. multi. Cor. flavesc. odora.

inodora. P. arborescens, caudice vix diviso. *Jacq. amer. In Carthagena sylvaticis* \ddagger .

Arbusc. 8-ped. erecta, in paucos, brevesq. ramos divisa. Fol. P. rubræ. Fl. albi, inodori, congeneribus duplo ma.

366. CAME- Contorta. Follic 2. horizontal. Sem. membranæ propriæ inserta.

RARIA. *I. latifolia*. C. fol. ovat. utrimq. acut. transverse striatis. *Syst. veg. ed. 04. Jacq. amer. tab. 182. f. 86. ed. pict. tab. 39. Plum. ic. 72. f. 1.*

In Amer. calidiore \ddagger .

Arb. procera, elegans, ramosa, comosa, lacteo niveo scatens, ramul. plerumq. dichotomis. Fol. multa, opposita, petiol. integerr. nitidiss. rigidusc. Pedunc. axill. aut in ramorum dichotomiis, longi, 1-multipl. Petal. candida. Follic. fusi.

2. angustifolia. C. fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. tab. 72. f. 2.*

In Amer. calidiore \ddagger .

Caul. frutesc. ramosus. Fol. opposita, integerr. nervo medio decurrente. Fl. & fructus ut in priore, sed min. ut tota planta.

- Tamaquarina*. C. fol. ovat-oblong. acuminat: fl. amplis, lutes, odoratis. *Aubl. Guian. tab. 102.*
- In Caribæis.*
- Frutex 4-5-ped. superne ramosus. Fol. opposita, breviter petiol. longe acumin. integerr. glabra. Fl. terminal. & intra bifurcationem ramulorum, racemosi.
- guianensis*. C. fol. ovat-acumin. fl. axillar. parvis, odoratis. *Aubl. Guian.*
- In Guiana* H.
- Diffr. a priore fol. & fl. min. axillar.*
- zeylanica*. C. fol. ovat-lanceolat. transverse venosis. *Retz.*
Obs. fusc. 4.
- Apocyno-Nerium. *Lin. Fl. Zeyl. 404.*
- In Zeylona* H.
- Arb. Fol. opposita, petiol. acuminata, integerr. Pedunc. axillar. brevis.
357. TABER-Contorta. Follic. 2. horizont. Sem. pulpæ immæMONTANA. mersa.
1. *citrifolia*. T. fol. opposit. ovat-lanceol. fl. lateralibus, glomerato-umbellatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 175. f. 13. ed. piæ. tab. 40. Pium. ic. 248. f. 2.*
- In America* H.
- Arbusc. 8-ped. erecta, ramosa, tota lactesc. Fol. integerr. nitidiss. per venas contrahentes undulata, virent. quidem, sed ita ut lac, quibus scatent, transparere videantur. Racem. floriferi, axill. oppositi. Cor. candida, suaveolens. Follic. acuti, semper virid. Pulpæ mollis, aurantiaca.
2. *laurifolia*. T. fol. opposit. ovalibus, obtusiusc. *Syst. veg. ed. 14.*
- Nerium &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 186. f. 2.*
- In Jamaica, ad ripas fluviorum* H.
- Arbusc. 5 ped. erecta, ramosa, lactescens, habitu prioris. Cor. lutea, odora. Follic. virides.
3. *grandiflora*. T. caul. dichotomo; fol. oppositis; calycibus inæqualibus, latissim. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 31. ed. piæ. tab. 41.*
- In Cartagena* H.
- Arbusc. 8-ped. erecta, lactescens. Fol. petiol. ovalia, acuta, integerr. nitida. Pedunc. sub 3-fl. Fl. congenerum maximi, inodori. Calyc.

folio!. scariosa , alba , exter. 2. cordata ; reliqua angusta . Cor. limbo ampliss. tubo contorto .

4. *cymosa* . T. foi. opposit. fl. cymosis . Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 181. f. 14. ed. piæt. tab. 259. f. 10.

Habitat Carthagenaæ ♂.

Arbusc. 12-15-ped. Fol. ovat-lanc. acuta , integrerr. subundulata , semiped. Cymæ axill. amplæ , densæ , convexæ . Fl. sordide albescens. aut rufescent. Follic. magni , rubescent. pulpa auranti ca.

5. *amygdalifolia* . T. staminibus extra tubum cor. eminentibus . Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 181. f. 15. ed. piæt. tab. 259. f. 11.

In Guiana ♂.

Arbusc. 6-ped. ramosa , lactescens . Fol. opposita , ovali-lanceol. acuta , plana , nitidiss. Pedunc. paucifl. Cor. candida , odora . Follic. acumin. virid. nitentes , pulpa aurantiaca .

6. *alternifolia* . T. fol. alternis : caul. arborecente . Syst. veg. ed. 14.

Curutu-pala . Hort. mal. I. tab. 43.

In Malabarria ♂.

Frutex 1-2-orgyal. Fol. breviter petiol. ovalia , solida , supra fature , subtrus dilute virent. Fl. terminal. grandes , albi . Fruct. adgregati , oblongo-rotundi , cuspidati , inflexi , flavo-aurei .

7. *Amsonia* . T. caulis subherbaceis : fol. alternis . Syst. veg. ed. 14.

Apocynum &c. Pluk. phyt. tab. 115. f. 3.

In Virginia ♀.

Adfinis Cameraria , & *Tabernemontanae* . Fol. subfissil. lato-lanceol. lævia . Rami alterni . Racem. terminal. compositus . Petal. pallide cœrul. Follic. 2. longi , acumin. teretes , reflexi . Stigm. capitat. supra orbiculum membranac. Sein. cylindrica , scabra .

8. *elliptica* . T. herbacea : fol. subternis , lanceol. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.

In Japonia ♀.

Adfinis priori : differt fol. angustioribus , elliptic. caul. tereti , nec angulato .

Caul. pedal. & ultra , simpl. sensim attenuatus , teres , glaber . Fol. inferior. sparsa , bina-ter-

na-quaterna, subpetiol. elliptica, integerr. nervosa, glabra, subtus parum pallida. Petiol. breviss. sensim dilatati in folium, subverticillato-quaterni. Fl. terminal. racemosi, bracteati. Cor. vix unguicul. cœrul.

- echinata*. T. fol. opposit. ovat-oblong. acuminat. fructu echinato. *Aubl. Guian. tab. 163.*
In Guiana 3.
- Caul. pl. lignosi, 5-6-ped. ramosi, nodosi. Fol. subsessil. undulata, supra glabra, virid. subtus tomentosa, alba. Fl. terminal. & intra bifurcationem ramulor. corymbosi. Corymb. breviter peduncul. ad basin membranula involuti. Cor. flavescent. odora.
- 368. CERO-PEGIA.** Contorta. Folliculi 2. erecti. Sem. plumosa. Cor. limbus connivens.
- 3. candela-brum*. C. umbell. pendulis; fl. erectis. *Syst. veg. ed. 14.*
Niota &c. Hort. mal. 9. tab. 16.
In Malabarica 24.
- Caul. volub. genicul. rubentibus. Fol. opposita, petiol. ovat-acut. crassa, solida, glabra, subtus costa media. Fl. pl. adgregati, instar candelabri pensilis, collo oblong. rubro-purpureo-fusco, & nitente; ventre inflato, albicante. Follic. oblong. angusti.
- 2. biflora*. C. pedunc. (plerumq.) bifloris. *Syst. veg. ed. 14.*
In Zeylona 24.
- Caul. volub. Fol. opposita, ovata, integrerr. Pedunc. axill. Fl. recta extensi.
- 3. sagittata*. C. fol. sagittat. umbell. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Cynanchum &c. Burm. Afric. tab. 15.?
In cap. b. Spei arenosis 24.
- Caul. volub. filifor. tomentosus. Fol. opposita, breviss. petiolat. sagittata, seu cordato-linear. margine revoluta, utrimq. tomentosa, subtus pallidiora. Umbell. axill. multifl. Cal. 5-part. linear. tomentos. acutus. Cor. subcylind. coccinea, lacin. breviss. mucronat. conniventibus.
- 4. tenuifolia*. C. fol. linear-lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*
Apocynum &c. Plak. mant. tab. 335. f. 5.
Naru nindi. Hort. Mal. 10. tab. 34.
Ad cap. b. Spei.
Planta repens. Caul. tenues, primum virid. dein

rubri , seu spadiceo-rubri . Fol. opposita , breviter petiol. in cuspide longum , angustissimata terminata , viridi-fusca . Fl. 2 3-4. exstus viridi-flavescens. intus ex rufo-rubent. dein magis rufi , orificio rubro , subcœrul.

D I G Y N I A .

- 269. PERGULARIA.** *C*ontorta . Nectarium ambiens genitalia cuspidibus 5. sagittat. Cor. hypocraterif.
1. *glabra* . P. fol. ovatis , glabris . Syst. veg. ed. 14. Flos &c. Amb. 5. tub. 29. f. 2.
In India.
Frutex Syringam albam referens . Caul. volub. lœvis . Fol. opposita , petiol. acuta , integerr. Pedunc. axill. alterni , subdivisi . Cor. alba .
 2. *tomentosa* . P. fol. cordat. tomentosis . Syst. veg. ed. 14. *Asclepias cordata* . Burm. Ind. tab. 27. f. 2. Forsk. *Æg. Vahl*.
In Arabia . Caul. volub. lignosus , teres , tomentos. Fol. opposita , petiol. acuta , integerr. Umbell. axill. alternæ , peduncul. Cor. fig. *Kalmia* , purpur.
 3. *japonica* . P. fol. cordat. glabris . Syst. veg. ed. 14. *Thumb. Japon.*
In Japonia.
Caul. volub. simpl. teres , glaber. Fol. pollic. opposita , petiol. acuta , integerr. patula , nervosa . Fl. axill. umbellati , erecti , peduncul. Umbel. simplex .
- 270. MELODINUS.** Contorta . Faux cor. coronata . Nectar. in medio tubi stellatum . Baccæ 2-locul. polysperm.
1. *scandens* . M. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen.
In nova Caledonia.
Adfinitus magna cum Rauwolfis . Frutex glaberrim. Caul. scandens . Fol. opposita , oblong-ovat. integerr. glaberr. venosa .
- 371. PERIPOLOCA.** Contorta . Nectar. ambiens genital. filam. 5. exserens .
1. *græca* . P. fl. terminalibus , interne hirsutis . Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. tab. 1. f. 2. Duham. arb. tab. II. *Apocynum* 2. Clus. hist. 1. pag. 125.
In Syria , Sibiria 24 .

Caul. longus, farmentosus, geniculat. fuscus.
Fol. opposita, lanceol-ovat. venosa. Fl. in extremitate ramulis lateralibus, sub-5. Cor. lacin. expansis, intus luteo-virescent. supra obsolete purpur. cum macula viridi.

2. *Secamone*. P. fol. lanceol-elliptic. fl. paniculat. interne hirsutis. Syst. veg. ed. 14. Alp. Ægyp. tab. 134. In Ægypto ♂.

Differt a priore primo intuitu fl. copiosis, minutis.
Caul. volub. fruticos. laevis. Fol. opposita, petiol. laevia, subtus pallidiora, transversè venosa. Panicul. axill. alternæ, dichotomæ, fol. breviores. Fl. minuti, albi.

3. *indica*. P. spicis imbricat. Syst. veg. ed. 14. Burm. Zeyl. tab. 83. f. 1.

Apocyni &c. Pluk. mant. tab. 359. f. 2.
In Zeylona ♂.

Caul. volub. teres, tuberculat. cinereus. Fol. opposita, breviter petiol. ovata, acuta, glabra, integerr. venosa, supra læte virid. subtus pallida. Spicæ axill. simplic.

4. *africana*. P. caul. hirsuto. Syst. veg. ed. 14.
Apocynum &c. Comm. rar. tab. 18. Pluk. alm. tab. 137. f. 4. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 3. f. 62.

b. Cynanchum &c. Burm. afric. tab. 14. f. 2.
In Africa 24.

Caulic. pl. humifusi. Fol. opposita, breviter petiol. subovata cum acumine. Pedunc. axill. 7-8-fl. Fl. multifidi, & inversi. Cor. rubens.

5. *esculenta*. P. glabra; fol. linearis-subulat. racemi elongatis, simplicibus: fl. interne nudis. Syst. veg. ed. 14.
Lin. Suppl.

In Zeylona, & Malabaria.

Caul. volub. Fol. opposita, longa, basi rotunda-
ta. Racemi paucifl. Fl. pedicellati. Cor. lutea,
striis ferrugin. a centro excurrentibus. Genital. lutea. Follic. inflati.

Indigenis esculenta.

emetica. P. caul. frutic. diffuso: fol. linear-lanceol. Retz.
Obs. fasc. 2.

In Tranquebaria ♂.

Fol. opposita, breviter petiol. integerr. glabra,
Pedunc. breves, multifl. squamosi bracteolis.
Fl. parvi, glabri. Radix adhibetur loco Ipecacuanhae.

- tunicata*. P. fol. cordat. fl. umbellatis. *Retz. Obs. fasc. 2.*
In Tranquebaria.
- sylvestris*. Caul. volub. lævis. Fol. opposita, petiol. obl-
 cordat-acumin utrinq. glabra. Stipul. petiol.
 cordatæ. Umbel. axill. paucifl. 2-5.
- 372.CYNAN-* *Contorta*. Nectar. cylindric. 5-dentato differt ab
 CHUM. Asclepiade.
- 1. viminalis*. C. caul. volub. perenni, aphyollo. *Syst. veg. ed. 14.*
Felsel Taul. Alp. Æg. tab. 190.
In Africæ maritimis B.
- Caul. 3-6-ped. crassitie pennæ anserinæ, viridis,
 ramis raris, longissim. Cal. minimus, 5-part.
 Cor. rotata *Asclepiadis*, alba, odora. Nectar.
 5. petaloid. erecta, intus grano luteo, perfo-
 rato cum unguiculo, in orbem posita. Styl.
 cylindr. capitatus. Anth. minutæ, fuscæ, in-
 sidentes capitulo.
- 2. acutum*. C. caul. volub. herbac. fol. cordat-oblon. glabris.
Syst. veg. ed. 14.
Apocynum 3. latifol. *Cluf. hist. I. pag. 125.*
In Sicilia, Hispania &c. 24.
- Sarmenta longa, geniculata. Fol. opposita, pe-
 tiolat. subalbida. Fl. axill. subumbell. parvi,
 albi.
- 3. planiflo-
 rum*. C. caul. volub. fol. cordat. glabris, subtus to-
 mentos. pedunc. subracemos. *Syst. veg. ed. 14.*
Jacq. amer. tab. 55. ed. 2. piæt. tab. 81.
In Carthagena 24.
- Fol. sub-4-pollic. opposita, petiol. ad petiolor.
 ortum ciliis ferrugineis. Pedunc. lateral. vix
 pollicar. sub 5-fl. Fl. plani. Cal. ex albo-virens.
 Cor. venosa, æruginea.
- 4. racemosum*. C. caul. volub. fol. cordat. acut. glabris: race-
 mis simplicibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer.*
tab. 54. ed. piæt. tab. 80.
In Carthagena 24.
- Fol. 4-pollic. opposita, petiolat. subundul. su-
 pra læte virent. subtus æruginosa. Fl. parvi,
 albi, inodori.
- 5. maritimum*. C. caul. volub: fol. cordat. hirsut. subtus tomen-
 tos.

tos: pedunc. adgregatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq.*
am. tab. 56. ed. pict. tab. 82.

In Terra Bomba ♂.

Planta hirsuta. Fol. opposita, petiolat. acumin.
Pedunc. pl. Cor. atro-purpur.

6. *suberosum*. C. caul. volub. inferne suberofo, fisso: fol. cor-
dat. acumin. *Syst. veg. ed. 14.*

Periploca &c. Dill. elth. tab. 229. f. 296.

In Amer. calidiore.

Caul. sub. 3-ped. vix hirsutus. Fol. opposita,
lobis ad basin fere incumbentibus, subtus pal-
lidiora, nitida, & fere argentea; si terantur,
fœtida.

7. *hireum*. C. caul. volub. fruticoso, inferne suberofo, fis-
so: fol. ovat-cordat. *Syst. veg. ed. 14.*

Apocynum &c. Morif. hisp. 3. f. 15. tab. 3. f. 61.

In America ♂.

Tota planta tetterime olet. Caul. villosus. Fol.
acumin. pendula, integerr. Fl. ampli, pulli.

8. *monspelia-* C. caul. volub. herbac: fol. reniformi-cordat.
cum. acutis. *Syst. veg. ed. 14.*

Apocynum 4. &c. Clus. hisp. 1. p. 126.

In Hispaniae, Narbonæ maritimis &c. 24.

Radix, & caul. lactiferi. Fol. opposita, longe
petiol. integerr. crassa, subalbida. Fl. axill.
fasciculat. parvi, albi.

9. *extensum*. C. caul. volub. herbac. fol. reniformi-cordatis,
acutis: petal. hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq.*
misc. 2. ic. rarior.

Habitat

Caul. 12--ped. valde ramosus, teres, villosus,
asper, glaucus, adultior purpurasc. sicuti ra-
mi. Fol. opposita, longe petiolat. integerr.
utriusq. fere glabra. Peduncul. inter petiolos
oppositos, semi-etiam pedal. teretes, paten-
tes, aphylli, scabri, villosi. Pedicelli fescun-
cial. Fl. penduli, odori, cum virore pallen-
tes. *Tota planta lacte niveo scatet.*

10. *undulatum*. C. caul. volub: fol. lanceol-ovatis, glabris:
umbell. globosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. am.*
tab. 58. ed. pict. tab. 84.

In Carthagena ♂.

Planta glabra. Fol. 4-pollic. opposita, petiol.
utrinque acumin. undulata, pinguia. Umbella
parva, densa. Cor. intus sordide purpur.

- 11. capense.** C. caul. volub. undique conformi : fol. subcordato-ovat. pedunc. multifl. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
 Caul. altus, minime suberosus. Fol. opposita, petiol. laevia; iuniora ovata, adultiora emarginata cum mucrone. Pedunc. axill. simpl. denticulati. Cal. breviss.
- 12. obtusifolium.** C. caul. volub. herbac: fol. oblongis, apice rotundatis cum acumine: umbell. lateralibus. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
- 13. tenellum.** C. caul. subvolub. herbac: fol. ovat-oblong. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
In nova Granada.
 C. ul. fil.form. ramis alternis. Fol. opposita, petiol. mucronata, laevia, magnitudine *Alfines*. Umbel. irregul. sessil. fol. breviores. Fl. magnitudine *Galii*. Follic. longitudine digiti, subulati.
- 14. erectum.** C. caul. erecto, divaricato : fol. cordatis, glabris. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. I. tab. 38. Apocynum I. &c. Clus. hist. I. p. 124.
In Syria '4.
 Frutex 5-6-ped. lacte niveo scatens, ramosus, glaber. Fol. opposita, breviter petiol: acuta, integerr. glauca. Cymæ axill. compositæ. Cor. alba, odora.
- 15. filiforme.** C. caul. erecto, simpliciss. fol. linearibus: fl. axillar. verticillatis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
Distinctum a C. filiformi Jacq. cuius pl. sp. in Hist. Stirp. amer.
-
- cordifolium.** C. caul. volub. hirti: fol. cordat. acutis, utrimque gl. bris: fl. cynosis. Retz. Obs. fasc. 2.
 Caul. ramosus. Fol. opposita, longe petiol. subrotundo-cordata, raro subangul. Cyma longe petiol.
- reticulatum.** C. caul. volub. inferne suberofo, rimofo: fol. ovat. acutis. Retz. Obs. fasc. 2.
 Caul. lignosus, coriace albo, ramis volubilibus. Fol. longe distita, petiol. glabra, apice lanceol. Pedunc. axill. Fl. parvi, extus hirti.

alissimum. C. caul. volub: fol. cordatis, utrimq. tomentos: fl. umbellatis. *Jacq. amer. tab. 57. ed. piæt. tab. 83.*

In Carthagenæ sylvaticis ♂.

Planta 50-ped. scandens, fruticosa, lactesc. Fol. primum 2-pollic. tandem semiped. opposita, petiol. acumin. integerr. crassula. Umbel. lateral. solitariæ, densæ, hemisphæricæ, involuc. polyphyl. inæquali. Fl. crassi, inodori. Cal. cinereo-virens. Cor. sordide purpur.

longiflorum. C. caul. volub: fol. obovat. oblong. acutis, villosis: fl. umbellat. *Jacq. amer. tab. 59. ed. piæt. tab. 85.*

In Carthagenæ sylvis ♂.

Planta lactesc. Caul. 15-ped. scandens. Fol. semiped: petiolis brevibus, & pilosis innixa, opposita, cordata, integerr. crassula, venis, nervisq. pilosis. Umbel. lateral. solitar. plurimq. 7-fl. involuc. polyphyl. inæquali. Fl. 2-pollic. inamæni, inodori. Cal. pallide virens. Petal. extus pallent. intus pilis fuligineis argenteis.

filiforme. C. caul. volub: fol. ovat. acumin. planis, nitidis: umbell. globosis. *Jacq. amer. tab. 60. f. 1. ed. piæt. tab. 86.*

In Carthagenæ sylvaticis ♂.

Planta lactescens. Caul. numerosi, filiform. ramosi. Fol. vix sesquipoll. opposita, petiolat. integerr. plana. Umbel. lateral. erectæ, alternæ, parvæ. Fl. exigui, inodori. Petal. & nectar. nivea. *Diversum a C. filifor. Lin. Suppl.*

clausum. C. caul. volub: fol. lanceol-oblong: revolutis: fl. umbellatis. *Jacq. amer. tab. 60. f. 2. ed. piæt. tab. 87.*

In Carthagenæ fruticosis ♂.

Planta lactescens. Caul. numerosi, glabri. Fol. 2-3-pollic. opposita, breviss. petiol. integerr. venosa, nitida. Umbel. lateral. solitar. Fl. inodori. Petal. & nectar. nivea.

Pyrotechnicum. C. caul. frutic. nudo: pedunc. axill. solitar. tuberculosis: fl. capitat. pedicellat. *Forsk. Æg.*

In Arabia ♂.

Caul. numerosi, alti, brachiati, articulati, glabri. Pedunc. ad basin articuli, 1-2-3. semi-pollic. Fl. subdeni. Cor. supra flava, basi, &

- subtus viridis . Nectar. campanulat. viride .
Follic. curvi , bafi adtenuati .
- arboreum.* C. caul. volub. cor. rotata . *Forsk. Æg.*
In Arabia ፩ .
Arb. procera . Fol. variantia in eodem subiecto ,
sæpe ovata , vel linear-i-lanc. aut subhaftata .
Cor. virid. *Plantu non laðescens.*
- 373. APOCY-** Cor. campanulata . Filam. ᷂. utpote crastata cum
NUM . staminibus alterna .
- 1. sibicum.** A. caul. erecto , herbaceo : fol. oblong: umbell.
terminalibus . *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3.*
tab. 66.
Simil. A. cannabino . Planta , glabra , laðescens.
Caul. sesquiped. ramosi . Fol. opposita , sub-
fessil. acutiusc. integerrima , ore non revolu-
to . Pedunc. umbellati . Fl. parvi . Cor. alba ,
inodora , limb. ḡ-fid. obtuso .
- 2. androscemi-** A. caul. erectiusc. herbac: fol. ovat. utrimq.
folium. glabris : cymis terminalibus . *Syst. veg. ed. 14.*
Dodar. Mem. 4. tab. 59. Morif. hist. 3. f.
15. tab. 3. f. 16.
In Virginia , Canada ፪ .
Caul. ramis purpurasc. maculis nigris adspersi .
Fel. opposita , breviter petiol. supra sature
virid. subtus albicantia . Fl. Liliiconvall. rosei ,
odori .
- 3. cannabi-** A. caul. erectiusc. herbac: fol. oblong: panicu-
latis terminalibus . *Syst. veg. ed. 14. Morif. hist.*
3. f. 11. tab. 3. f. 14. Pluk. alm. tab. 13. f.
1. & tab. 260. f. 4.
In Canada , Virginia ፪ .
Caul. sublignosi . rubri . Fol. pollicar. opposita ,
breviter petiol. integerr. glabra . Cor. albida .
Follic. linear. oblong.
- 4. venetum.** A. caul. erectiusc. herbac: fol. ovat-lanceol. *Syst.*
veg. ed. 14.
Esula &c. Lob. hist. 201.
In Adriatici maris insulis , & in Sibiria ፪ .
Fl. purpurei .
- 5. minutum.** A. caul. prostrato : fol. hastatis . *Syst. veg. ed.*
14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei .
Caul. filiform. vix spitham. raro scandentes . Fol.
unguicul. opposita , vix petiol. lanceol. utrimq;
dente laterali . Umbel. simpl: sub. 6-fl.

6. *filiforme*. A. caul. prostrato, herbac. fol. filiformibus: fl. umbellat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
7. *frutescens*. A. caul. erect. frutesc. fol. lanceol-ovalibus: cor. acutis, fauce villosa. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Zeyl. tab. 12. f. 1. Pluk. phyt. tab. 96. f. 7. & tab. 421. f. 6.*
In Zeylona ♂.
 Fol. opposita, breviter petiol. utrimq. acuta, subtus pallescent. integerr. glabra, lucida. Pedunc. axillar. longi, opposite ramosi. Cor. purpur. limbo magno.
8. *reticulatum*. A. caul. volub. perenni: fol. ovat. venosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Olus crudum. Rumph. amb. 5. tab. 40.
In India ♀.
 Fol. opposita, petiol. rara, 3-4. poll. longa, 3-lata, atrovirent. nitida, reticulata, venis lacteis praedita, subtus nervosa. Racemi axill. Petal. reflexa, albida.
9. *lineare*. A. caul. volub. herbac. fol. linearibus, planis: umbell. axillar. compositis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
10. *triflorum*. A. caul. volub. herbac. fol. lanceol. umbell. axill. 2-3-fl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.

- Acouci.* A. fol. oblong-ovat. acuminat. fl. minim. albis.
Aubl. Guian. tab. 107.
In Guiana ♂.
 Frutex caulibus pl. farmentosis, nodosis, supra arbores sparsis. Fol. opposita, breviter petiol. longe acumin. petiolis amplexicaulibus, integerr. glabra. Fl. axillar. & terminal. paniculati. Corymb. oppositi.
- umbellatum*. A. fol. ovat-acuminat. subtus tomentosis: fl. purpurascens. *Aubl. Guian. tab. 108.*
In Guiana.
 Frutex ramis pl. volubilibus, supra arbores scandentibus. Fol. opposita, breviter petiol. integerr. supra glabra, viridia. Fl. terminal. corymbosi: pedunculi partiales bracteis binis muniti.

374. ASCLE- Contorta. Cor. plana, vel reflexa, 5-fida. NEPIAS. Etar. 5. ovata, concava, corniculum exserentia. Folliculi bini. Sem. papposa.

* *Fol. oppositis, planis.*

1. *undulata*. A. fol. sessilibas, oblong. lanceol. undulat. glabris: petal. ciliatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Apocynum &c. Comm. rar. tab. 16.

In Africa 4.

Caulic. pl. Fol. opposita, vix spithamam longa, viridia, costa albicante. Fl. terminal. virid. margine pilis albicantibus.

2. *crispa*. A. fol. cordato-lanceol. undulatis, scabris, oppositis: umbel. terminali. *Syst. veg. ed. 14.*

Apocynum &c. Comm. rar. tab. 17.

Ad cap. b. Spei.

Caul. erectus, inferne ramosus, pubescens. Fol. 2-pollic. breviter petiol. acuta. Umbel. terminali. si npl. hispida, purpur. Cor. reflexa, flavescens.

3. *pubescens*. A. fol. ovatis, venosis, nudis: caul. fruticos. pedunculisque villosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Apocynum &c. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 3. f. 35.

Pluk. phyt. 139. f. 1.

Ad cap. b. Spei 5.

Caul. erectus, simpl. Fol. opposita, breviss. petiol. confertinacula, mucronata, venosiss. villosa. Umbel. villosæ. Fl. purpurasc.

4. *volubilis*. A. caul. arbor. volub. fol. ovat. acuminat. integrerrim. planis: umbell. erectis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Zeylona.

Umbell. simplic. peduncul. Fl. viridescent.

5. *asthmatica*. A. caul. fruticos volub. hispido: fol. opposit. petiolat. cordat-ovat. integrerr. supra glabris: umbell. paucifl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Zeylona.

Tota planta villosa, excepta pagina super. fol. Fol. adproximata, magnitudine, & fig. *Lauri nobilis*, acuta. Umbel. axill. sæpe proliferæ. Fl. parvi.

Radix egregia in asthmate seroso.

6. *gigantea*. A. fol. amplexicaulibus, oblong--ovalibus, basi pilosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 3. tab. 89. amer. ed. piæt. tab. 88.*

Apocynum &c. Pluk. alm. tab. 175. f. 3.

Beidel ossar. Alp. Æg. tab. 86.

Ericu. Hort. mal. 2. tab. 31. Seb. thes. I. tab. 26. f. 1.

Zia rack. Brun. it. tab. 184.

In India, Ægypto 24.

Arbusc. homine duplo altior. Rami pauci, longi, crassi, inferne nodosi. Fol. molli tanagine obsita. Basis petiol. supra barbata. Pedunc. axill. racemosi. Cal. ex flavo-albicans. Cor. alba cum macula purpur. Nectar. alba prominunt non cornicula subulata, sed laminas solidas conn. ventes.

Occidit inadsueta Pecora, ut Anemone nemorosa.

7. *syriaca.* A. caul. simpl: fol. ovalibus, subtus tomentos. umbell. nutantibus. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 521.

Apocynum syriac. Clus. hist. 2. pag. 87.

In Virginia, & circa Astrakan. 24.

Altitudo humana. Fol. lata. Fl. parvi, obsolete purpurasc. odori.

8. *amæna.* A. caul. simplici: fol. ovatis, subtus pilosiuscul. umbellis, nectariisque erectis. Syst. veg. ed. 14.

Apocynum &c. Dill. elth. tab. 27. f. 30.

In Amer. sep'entrion. 24.

Caul. pl. 2-cubital. & ultra, glabri. Fol. 3-4. unc. longa, 2-3. lata, opposita, mucrone obtusiore, inferior. min. & rotundiora, crassiusc. rigida, supra glabra, & subnitent. quandoq. luteo-virid. subtus alblicant. nervo medio purpur. Fl. terminal. amæne purpur.

9. *purpurea-* scens. A. caul. simpl. fol. ovatis, subtus villosis: umbell. erectis: nectariis resupinatis. Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 28. f. 1.

In Carolina 24.

Adfinis valde A. syriacæ. A priore vero differt fol. longioribus: petal. obsolete herbaceis; cornicul. colore pallidiore, & horizontaliter sitis.

10. *variegata.* A. caul. simpl. fol. ovatis, rugosis, nudis: umbell. subsessilibus; pedicell. tomentosis. Syst. veg. ed. 14.

Apocynum &c. Pluk. alm. tab. 77. f. 1.

In Amer. boreali 24.

Adfinis A. syriacæ. Radix tuberosa. Caul. obscure purpur. Fol. lata, rigidiora, excavata. Fl. terminal, albi, intus purpur.

PENTANDRIA DIGYNIA:

- 11. curassavi.** A. caul. simplic. fol. lanceolat. glabris, nitidis: ca. umbell. lateralibus erectis, solitar. *Syst. veg.* ed. 14.
Apocynum &c. *Dill. elth. tab. 30. f. 33. Herm. par. tab. 36.*
In Curassao 24. †.
Caul. 2-3-ped. Fol. subtus pallidiora. Petal. coccinea, corniculis erectis, croceis. Folliculi ad latera quandoque denticulati.
- 12. nivea.** A. caul. simplici: fol. ovat-lanceol. glabriuscum. umbell. lateralibus, erectis, solitar. *Syst. veg.* ed. 14.
Apocynum &c. *Dill. elth. tab. 29. f. 32. Plum. sp. ic. 30.*
In Virginia, & Amer. calidiore ♂.
Fol. opposita, vix petiol. venosa. Fl. reflexi. Cor. virid. nectariis niveis.
Differt a priore fol. minime nitidis, parumper scabris, sed basi magis rotundatis, nec perfecte lanceolat. *Follic. edentuli.*
- 13. incarnata.** A. caul. superne diviso: fol. lanceol. umbell. erectis, geminis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 107.*
Apocynum &c. *Barr. rar. tab. 72.*
In Canada, Virginia 24.
Tota planta lâete niveo scatet. Caul. pl. 3-ped. basi cœrul-purpur. ubi dividuntur, fol. e reione 3. producunt. Fol. opposita, petiol. integerr. Rami florigeri terminal. Umbell. densæ. Involuc. foliolis subulat. constans. Petal. reflexa, purpuro-rubent. Nectar. purpuro-pallens. Fl. Vanillam parumper olen.
- 14. decumbens.** A. caul. decumbente, fol. villosis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Virginia 24.
Caul. hirsutus. Fol. subsessil. ovat. obtusa.
- 15. lactifera.** A. caul. erecto: fol. ovatis: umbell. breviss. proliferis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Zeylona 24.
Simil. A. *Vincetoxicum*. *Differt* fol. minus cordatis: corymb. compositis, vix petiolis longioribus).
- 16. Vincetoxi-** A. caul. erecto: fol. (cordato-acuminat. basi barbatis: umbell. proliferis. *Syst. veg. et. 14. Ludw. et. tab. 25. Mill. ic. tab. 53. Black. tab. 96. Fl. Dan. tab. 849. Lab. ic. p. 630.*
Vincetoxicum. *Marth.*
In Europea glareosis 24.

Caul. sublignos. articulat. teres, subhirsut. Fol. opposita, petiol. integerr. dura, oris, nervisq. tomentos. Racem. axil. Petal. alba. *Var. fol. ternis; & fl. flavescentibus.*

17. *nigra*. A. caul. superne subvolub. fol. cordatis (nudis). *Syst. veg. ed. 14.*

Vincetoxicum &c. Camer. epit. 560.

Habitat Monspelii &c. in collibus 24.

Fl. conferti, patentiss. Petal. nigra.

** *Fol. later. libus, revolutis.*

18. *arbore-scens*. A. fol. ovat. revolutis: caul. fruticoso, subvilloso. *Syst. veg. ed. 14.*

Apocynum &c. Burm. afric. tab. 13. Pluk. phyt. tab. 320. f. 1.

In cap. b. Spei montibus ♂.

Caul. erectus, hirtus, crassitie digit. Fol. opposita, breviss. petiol. obtusiusc. mucrone minuto, laevia. Pedunc. e summitate caul. umbellif. villosi. Cor. alba. Fl. & fruct. sequentis.

19. *fruticosa*. A. caul. fruticoso: fol. linear-lanceol. revolutis. *Syst. veg. ed. 14.*

Apocynum &c. Herm. parad. tab. 24. Mill. dict. tab. 45. Pluk. alm. tab. 138. f. 2.

- b. A. crassifolia huic adfinis.

In Æthiopia ♂.

Altitudo humana. Fol. saepe terna. Petal. alba.

- b. *Differ latitudine fol. & hirsutie.*

20. *undulata*. A. fol. revoluto-repandis, pilosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Apocynum &c. Comm. rar. tab. 17.

Habitat . . .

Caulic. pl. 2-3--ped. quandoque lanuginosi. Fol. opposita, breviter petiol. digitum longa, acuta, margine subsinuato. Fl. terminal. umbellati, reflexi, e viridi-flavescens.

21. *sibirica*. A. caul. decumbente: fol. opposit. ternisq. linear-lanceolat. revolutis. *Syst. veg. ed. 14.*

Comm. Gotting. tab. 7.

In Sibiria 24.

Planta albido-tomentosa, succo lacteo turgens.

Radix repens. Caul. spitham. ascendens, ramis patentibus, ultra caulem elongatis. Fol. multæ. Racemi 2-fidi. Bract. exiguae, setaceæ. Cor. patens; adulta contorta, viridi-alba, odore *Tilia*. Nectar. cor. quadruplo brevius.

22. *verticilla*. A. caul. erecto : fol. verticillat. linearibus, revolutis. Syst. veg. ed. 14.
Apocynum &c. Pluk. mant. tab. 336. f. 4.
In Virginia 24.
 Fol. sœpe quaterna. Peduncul. umbellif. sunt oppositifolii. Fl. albi.

*** *Fol. alternis.*

23. *rubra*. A. fol. alternis, ovat: umbellis ex eodem pedunc. comm. pl. Syst. veg. ed. 14.
In Virginia.
 Caul. erectus, simplex. Fol. acuminata. Fl. rubri.
24. *tuberosa*. A. fol. (inferior.) alternis, lanceol. caul. divaricato, piloso. Syst. veg. ed. 14.
Apocynum &c. Herm. Lugd. tab. 647. Dill. elth. tab. 30. f. 34.
In Amer. boreali 24.
 Radix tuberosa. Caul. sub 2-ped. obscure rufi, superne ramosi. Fol. super. bina-quaterna, longa, arcte circumdata. Fl. umbellati, aurantiaci. Folliculi longi.

25. *filiformis*. A. caul. erecto : fol. filiformibus : umbellis lateralibus, elongato-peduncul. Syst. veg. ed. 14.
Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
Obs. A. filiform. & Cynanchum filiform. primo visu simill. eadem planta saltem fol. fig. diversis fl.
26. *grandiflora*. A. caul. erecto, simpl. hirto : fol. petiolat. oblong: pilosis: fl. axillar. pedunculat. Syst. veg. ed. 14. *Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
Umbella nulla. Flos maximus, col. Fritillaria meleagridis tessellato.
27. *carnosa*. A. fol. ovatis, carnosis, glaberrim. Syst. veg. ed. 14. *Lin. Suppl.*
In China.
 Fol. vix palmar. petiol. avenia. Umbella simpl. solitaria. Cal. minutus. Cor. minus divisa, vix semi 5-fid. plana. *Valde a reliquis diversa.*

- quadrifolia.* A. caul. simpl: fol. quaternis, ternisq: infimis oppositis. *Jacq. Obs. 2. tab. 33.*
In Virginia ¶.
An A. sibir. vel verticillata? Fol. oblong. utrimque acumin. Fl. dilute rubentes, odori.
- spiralis.* A. caul. fruticoso: fol. petiolat. ovali-oblong: fl. axillar. solitar: petal. linearibus, spiralibus, introrsum hirsutis. *Forsk. Æg.*
In Arabia ¶.
Fruticul. non lactescens. Fol. brevia, opposita, quandoq. verticillata. Pedunc. axill. vel lateral. 1-fl. Cor. viridi-flava. Fruct. edulis.
- radians.* A. fol. petiol. cordat. acutis, undulatis: umbellis terminalibus: cor. limbo erecto, spirali. *Forsk. Æg.*
In Arabia ¶.
Caul. erect. spitham. simpl. vill. sus. Fol. brachiatim oppolita, patentia. Fol. lamina vix pollic. villosa, obscure virid. venis albidis. Pedunc. interfoliacei. Fl. bracteati. Cal. ferrugin. villosus. Cor. tubo fusco-violac: laci-niis extus violac. intus obscure flavis. Nectar. cylindr. album. Folliculi ovati, villosi.
- aphylla.* A. caul. aphyll. volub. racemis coniugatis, globosis. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
Caul. articulati, carnosí; ramis ad genicula oppositis. Peduncul. ad genicula corymbosi. Cor. alba.
- stipitacea.* A. caulis fruticoso-diffusis, aphyll. articulat: umbellis ramulorum terminalibus. *Forsk. Æg.*
In Arabia ¶.
Tota planta lactescens. Frutex 2-cubital. erecto-diffus. ramosiss. Caul. obscure coerul. farina tenui albicante: articul. ramosi, non volubil. ramis oppositis. Pedunc. ramuli breves, adpositi vel ad genicula, vel ad apicem caulinum, undique floriferi. Cal. parvus. Cor. patens, marginibus reflexis, viridibus. Nectar. album. Follic. 3-pollic. subulati.
- setosa.* A. fol. margine revolutis. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
Caul. erectus. Fol. opposita, linearia. Umbell. lateral-terminal. Cor. virid. Follic. inflati, setiferi.

- laniflora*. A. fol. linear-lanceolat. *Forsk.* *Æg.*
In Arabia.
Valde laetescit. Fol. opposita, plana, nitida.
 Pedunc. axill. lateral. umbellati. Cor. intus
 hirsuta. Follic. nec inflati, nec hispidi, sed
 striati, subrugosi.
Succus cum butyro mixtus, in unguento contra
scabiem.
375. STAPE-*Contorta*. Nectar. dupli stellula tegente geni-
 LIA. talia. Planta carnosa, succosa.
1. *variegata*. S. denticul. ramorum patentibus. *Syst. veg. ed.*
14. Knorr. del. I. tab. F. 4.
Asclepias &c. Bradl. succ. tab. 22. Moris. hist.
3. f. 15. tab. 3. f. 4.
Apocynum &c. Herm. Lugd. tab. 53.
Ad cap. b. Spei ḫ.
Caul. tereti-4--gon. fuscus, nebulis albis, car-
nosis, farinosis. Fol. nulla. Cal. albo-viresc.
punctis ferrugin. Cor. grisea, rugosa, punctis
purpureis picta. Fruct. flavus.
2. *hirsuta*. S. denticul. ramorum erectis. *Syst. veg. ed. 14.*
Mill. ic. 258.
Asclepias &c. Comm. rar. tab. 19. Bradl. succ.
tab. 23.
Ad cap. b. Spei ḫ.
Scapi maiores, & erectiores priore, per æta-
tem subpurpur. Cor. col. sordidiore, purpura
lanugine ornata.
3. *mammilla-*
ris. S. denticul. ramorum obtusis, mucronatis. *Syst.*
veg. ed. 14. Burm. afric. tab. II.
Ad cap. b. Spei ḫ.
Scap. crassus, ramosus, aphyllos, variegat. ex
meris nodis subrotundis, sibi invicem arcte
iunctis constans. Loco folior. squamæ oblong.
acutæ, ex albo-rubentes. Fl. e medio tuber-
cularum, pusilli, purpuro-rubri. Follic. digi-
tum longi, crassi, cinerei.
4. *pilifera*. S. caul. tereti, mammillose tuberculato; mam-
 millis apice piliferis. *Syst. veg. ed. 14. Lin.*
Suppl.
Ad cap. b. Spei.
Caul. simpl. raro ramosus. Fl. inter tubercula,
parvi, purpur.
5. *incarnata*. S. quadrangul. dentibus horizontaliter truncatis,

callosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Burm.*
Dec. tab. 7. f. 1.
Ad cap. b. Spei.
Fl. parvi, incarnati. Editur ab Afris.

quadrangula. S. foliol. subulat. coniugatis. *Forsk. Æg. tab. 6.*
In Arabia.

Caul. cubital. 4-gon. ramosas, obscure virid.
 angul. subdentat. Fl. terminal. conferti, parvi,
 sessil. viridi-flavescent. sem. papposa. *Succus*
non laetus, sed aqueus.

376. LINCO-Petal. 5. foveolæ nectarii basi insculpta. Caps.
 NIA. seminifera, 2-locul.

1. *alopécuroidea.* L. *Syst. veg. ed. 14.*

Coridis folio &c. Burm. afr. 7.

In cap. b. Spei montosis aquosis ♂.

Frutex ramis virgat. inæqualibus, a basi deci-
 duorum fol. omnino ut in *Abiete*. Rami pau-
 ci, determinati. Fol. sparsa, subverticillata,
 5-6, subpetiol. linear. triquetra, rigidula, ni-
 tida, pollic. angulis scabra, suprema ciliata.
 Fl. ad apices ramorum, lateral. sessil. longitu-
 dine folior. Calyc. foliola non in orbem, sed
 per paria alternatim opposita, digesta, mar-
 gine villosa. Cor. tenaces, incarnatæ, aut
 albæ.

377. HER-
 NIARIA. Cal. 5-part. Cor. o. Stam. 5. sterilia. Tuba bi-
 fida. Caps. 1-sperm.

1. *glabra.* H. glabra (glomerulis multifl.). *Syst. veg. ed.*
14. Fl. Dan. tab. 529. Black. tab. 320. Bauh.
hist. 3. p. 378.

Anthyllis &c. Lob. ic. 421.

Polygono minore. Matth.

In Europæ apricis, glareosis, siccis ☽.

Planta minima, vix semiped. Caul. procumb. Fol.
 opposita, sessil. integerr. ovat-lanc. e viridi-
 flavescent. Glomeruli axill. sessil. virentes. Bra-
 ctea fl. minor, ovat-lanceol. siccata.

2. *hirsuta.* H. hirsuta (glomerul. paucifloris). *Syst. veg. ed.*
14. Zanichel. it. 284. Bauh. hist. 3. p. 379.

In agris glareosis Italiæ &c. 24.

Differt a priore rad. perenni; & fol. hirsutis.

H. caul. frutic. fl. 4-fid. *Syst. veg. ed. 14.*

Polygonum &c. Bauh. hist. 3. p. 378. Lob. ic. 85.

In Hispania ♂.

PENTANDRIA DIGYNIA.

Radix crassa. Caul. erecti, vel procumbent. tortuosus, etiam spitham. ramosiss. ramis patentibus, fol. a eratum onustis. Fol. opposita, brevia, minutiss. oblong. obtusa, plana, glabra: fol. min. axillar. stipul. interfoliac. parvae, oppositae, subalbæ. Fl. copiosi, terminal. glomerati, conferti, sessil.

4. lenticulata. H. Syst. veg. ed. 14. Est *Cressa cretica*, monente Vahl.

378. CHENO-PODIUM. Cal. 5-phyl. 5-gonus. Cor. o. Sem. 1. lenticulare, superum, calyce si-co involutum. Fl. glomerato-racemosi.

* *Fol. angulosi.*

1. Bonus Henricus. C. fol. triangulari-sagittat. integerr. spicis axill. compositis, aphyll. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 579. Ludwig. ed. tab. 185.

Mercurialis. Black. tab. 311.

Bonus Henricus. Bauh. his. 2. p. 965. Trag. 317.

In Europæ montium ruderatis 24.

Caul. 2-ped. ad terram foliosus, superne floriger. Fol. longe petiol. petiolo basi dilatato-amplexicaul. ora undulata, subtus albo farinaceo polline adspersa. Spicæ alternæ, sessil.

2. urbiculum. C. fol. triangular. subdentat: racemis confertis, strictissim. cauli adproximatis, longiss. Syst. veg. ed. 14. Buxb. hall. 69. tab. I.

In Europæ borealis plateis ⊖.

Caul. erect. 2-3--ped. glaber, ramis alternis. Fol. alterna, petiol. sœpe flavo-virid.

3. Atriplicis. C. caul. erecto: fol. (*inferioribus*) deltoideis, subtus coloratis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Juss. in demonstr. H. R. P.

C. purpurasc. Jacq. H. 3. tab. 80.

In China, & Sibiria ⊖.

Altitudo humana. Tota planta col. sanguineo notata. Fol. adulta lividum viorem induunt. Caul. medullosum. Fol alterna, longe petiol. plerumq. obtusa, sinuato-dentata, utriusque glabra; superior. ovata. Fl. racemosi, in pl. glomerulos collecti.

4. rubrum. C. fol. cordato-triangularibus, obtusiusc. dentat. racemis erectis, compositis, subfolios. caul. brevioribus. Syst. veg. ed. 14.

Atriplex &c. Morif. 2. tab. 31.

Pes anserinus. Dalech. tab. 542. Fuchs. hist. 653.

Bauh. hist. 2. pag. 975. Dod. 616.

In Europæ cultis, ruderatis ⊖.

Caul. cubital. & ultra, decumbens, ramosiss. striis rubris. Fol. firmusc. nitida; iuniora subtus farinosa, adulta utrimq. viridia; dentibus alterne majoribus, acutis.

5. *murale*. C. fol. (subtriangularibus) acutis, dentat. nitidis: racemis ramolis, nudis. *Syst. veg. ed. 14.*

C. 1. *Tabernem. hist. f. 1.*

Atriplex &c. Bauh. hist. 2. pag. 975.

In Europæ muris, aggeribusque ⊖.

Caul. erecti, 2-pedal. ramosiss. patuli, angulati, striis purpur. Fol. alterna, petiol. crassusc. glabra. Fl. subpaniculati. *Color viridis.*

6. *serotinum*. C. fol. deltoideis, sinuato-dentat. rugosis, glabris, uniformibus: racemis terminalibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Blitum &c. Petiv. tab. 8.

In Europæ ruderatis, & cultis ⊖.

7. *album*. C. fol. rhomboideo-triangularibus, erosis, postice integris; summis oblong. racem. erectis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 553.*

Atriplex &c. Fuchs. hist. tab. 119. Bauh. hist. 3. pag. 972.

In agris Europæ ⊖.

Planta matura albicans. Caul. etiam seped. erectus, minus sparsus. Fol. petiol. subtus farinacea; summa simplic. lingulata. Racem. axill. recti, conglobati; spicis alternis, sessilibus, confertis. Calyc. farinosi.

8. *viride*. C. fol. rhomboideis, dentato-sinuatis: racemis ramosis, subfoliatis. *Syst. veg. ed. 14. Vaill. paris. tab. 7. f. 1.*

Atriplex &c. Bauh. hist. 2. pag. 972.

In Europæ cultis oleraceis ⊖.

Caul. erect. viridis, angulis purpurascens. Fol. ramea lanceol. integerr. vix uno, altero dente. Racemi filiform. longi. *Difficile a priori re sciungi potest.*

9. *hybridum*. C. fol. cordat. angulato-acuminat. racemis ramosis, nudis. *Syst. veg. ed. 14. Vaill. paris. tab. 7. f. 2. Tabern. 428.*

Solanum IV. Trag. 304.

PENTANDRIA DIGYNIA.

Atriplex &c. Barr. ic. 540.

In Europæ cultis ⊖.

Planta odore Srramoniæ, noxia. Caul. cubital.

Fol. sature virid. absq. polline, venosa, dentibus 7-9. magnis. Racemi valde ramosi. Cal. albus, ore virente. Glomeres maturi purpurasc.

10. *Botrys.*

C. fol. oblong. sinuatis: racem. nudis, multifid. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 314. Luaw. ed. tab. 32.*

Botrys. Matth. Fuchs. Camer.

In Europæ australis arenosis ⊖.

Planta viscidæ, odore aromatico. Caul. ped. Fol. longe petiol. hirsuta, venis rubris.

11. *ambrosio-*

ides. C. fol. lanceol. dentatis: racem. simplicibus, fo-

liatis. *Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zann. tab. 50.*

Botrys &c. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 35. f. 8.

In Mexico, Lusitania ⊖.

Caul. 2-ped. subruber. Fol. inordinata. *Odor a-*

romaticus ad Cuminum accedens.

12. *multifid-*

dum. C. fol. multifid. segment. linearibus: fl. axillar.

sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 66.*

f. 77.

In Bonaria ♂.

Caul. 2-ped. toti ramosi. Fol. alterna, lète

virent.

13. *anthelmin-*

ticum. C. fol. ovat-obl. dentat. racem. aphyll. *Syst. veg.*

ed. 14. Dill. elth. tab. 66. f. 76.

In Pensylvania, Bonaria ♀.

Simil. C. ambrosioidi. Caul. erectus, 3-cubit. ad

medium ramis paucis, aliunde multis. Fol.

utrimq. virid.

Planta odora, contra vermes.

14. *glaucum.*

C. fol. oblong. sinuat. subtus incanis.

C. fol. ovat. oblongis, repandis: racem. nudis, simplicibus, glomerat. *Syst. veg. ed. 14.*

Atriplex &c. Bauh. hist. 2. tab. 473. Tabern. ic. 427.

Ad Europæ simeta ⊖.

Caul. humifusi, pedal. & ultra. Fol. ex viridi-

glaucia, subtus incana, petiol. 3. utrimq. den-

ticul. obtusis. Pedunc. axillar. breves. Variat

fol. integerr. & quandoq. subulatis.

** *Fol. integris.*

15. *Vulvaria.* C. fol. integerr. rhomboideo-ovat. fl. axillaribus,

glomeratis. *Syst. veg. ed. 14.*

Atriplex

Atriplex &c. *Bauh.* *hist.* 2. p. 974. *Moris.* *hist.* 3. *tab.* 31. f. 6.

Vulvaria. *Black.* *tab.* 100. *Dalech.* *hist.* 543. *Ta-*
bren. *hist.* pag. 438.

In Europæ cultis oleraceis, & ad muros, locis
meridiano sole percussis ⊖.

Caul. procumb. Fol. alterna, fœtida, polline fa-
rinaceo adspersa.

16. *polysper-* C. fol. integerr. ovat. caul. decumben. cymis a-
num. xillaribus, dichot. aphyll. *Syst. veg.* ed. 14.

Blitum &c. *Moris.* *hist.* 2. *tab.* 30. f. 6. *Camer.*
epit. pag. 237.

In Europæ cultis, & ruderatis ⊖.

Caul. erectus, & decumb. cubital. Fol. alterna,
petiol. ovata, sensim obtuse mucronata, sub-
hirsuta. Racem. axillar. ramosi, nudi; iunio-
res cylindrici, adulti paniculato-divaricati.

17. *scoparia.* C. fol. linear-lanceolat. integerr. planis. *Syst.*
veg. ed. 14.

Linaria &c. *Bauh.* *hist.* 3. pag. 462.

Osyris. *Dod.* *pempt.* 151.

In Græcia, Japonia, China, Carniola, Comitatu
Nicæensi ⊖.

Altitudo humana. *Caul.* glaberrimus, albicans.
Fol. villis ciliata, subtus nervosa.

18. *mariti-* C. fol. subulat. semicylindric. *Syst. veg.* ed. 14.
mum. *Fl.* *Dan.* *tab.* 489.

Kali &c. *Moris.* *hist.* 3. f. 5. *tab.* 33. f. 3. *Lob.*
ic. 394.

In Europæ maritimis ⊖.

Fol. alterna, glauca. Rami alterni. Fl. in alis
superioribus, conferti, sessil.

19. *aristatum.* C. fol. linear-lanceol. subcarnos. integerr. corymb.
dichotom. aristat. axillaribus. *Syst. veg.* ed. 14.
Gmel. *Sib.* 3. *tab.* 15. f. 1.

In Sibiria ⊖.

Caul. subpalm. ramosi, expansi, raro rubri. Fol.
sessil. læte viridia, quandoq. rubra. Panicul.
magna, divaricatiss. cessante dichotomia fl. al-
terni, sessil. subiecta his arista.

20. *oppositifo-* C. fol. opposit. breviss. lanceol-subulat. *Syst. veg.*
rium. ed. 14. *Lin.* *Suppl.*

Salsola oppositifol. *Pall.* *it.* 2. *tab.* O.

In Dauria, & Sibiria.

Facies Kali vulg. *Caul.* diffusus, ramosissim. sed
Tom. II.

taimen erectior, sublignesc. Rami oppositi, rubicundo-striati. Fol. ad genicula opposita, subcarnosa, pubgentia. Spicul. floriferæ axillar. Calyc. squamæ griseo-pellucidæ, vel rubentes.

triangulare. C. fol. triangularibus, æquilateris, postiæ integris: racem. axillaribus, & terminalibus, de-composit. tubnudis. *Forsk. Suppl. Æg.*

In Ægypto.

Fol. sesquipallic. subtus subfarinosa, latiora magis quam longiora, erosa, saepe integra, petiol. Racemi raro suffulti bractea lanceol. ramis compo-sitis.

(*Sericeum*,) C. fol. subulat. sericeis: fl. glomerulis geminis. *Hali. Hist. n. 1575.*

In Helvetia.

Diffr. a C. maritimo, fol. & cal. sericeis: fl. maiore.

punctulatum. C. fol. albo-punctulatis; imis rhombeo-ovatis, sinuatis; supremis ellipticis: racenis laterali-bus, spicatis, foliosis. *Scop. Delic. Insub. fase. I. tab. II.*

Habitat ☽.

Caul. erectus, 2-ped. & ultra, teres, striatus, rigidus, ruber, basi flave-scens, ubique adspersus punctulis albis. Fol. alterna, remota, petiolis brevibus, rubris, rariter obiterque sinuata; summa minime sinuata. Racenuli inferiores foliosi, supremi aphylli. Cal. rubens, albo polline adspersus. Sem. lucidum, tenui membrana tectum. *An C. Atriplicis? sed fol. & aliæ notæ non convenient.*

379. BETA, Cal. 5-phyll. Cor. o. Sem. reniforme, intra substantiam baseos calycis.

1. *vulgaris*. B. fl. congestis. *Syst. veg. ed. 14.*

B. rubra. *Black. tab. 235.*

Ad Europæ australior. maritima ♂.

Fol. alterna, magna, subcordata, integerr. dilute viridia, petiol. & costa alba, nitida. Fl. axillar. & terminal. glomerato-ramosi. Calyc. foliol. basi dentata.

2. *Cicla*, B. fl. ternis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Lusitania ad Tagum ☽.

Fol. radical. petiol. caulinæ sessilia. Spicæ lateral.
longiss. Calycis foliol. basi inermia.

3. *maritima*. B. fl. geminis. *Syst. veg.* ed. 14.

In Anglia, Belgia &c. litoribus maris ♂.

*Differet a B. vulg. quod primo anno floreat: quod
fol. obliqua, seu vertical: quod calyc. foliol. sua
carina æqualia, nec unidentata.*

380. SALSO. Cal. 5-phyll. quodammodo coloratus. Cor. o. Caps.

LA. 1-sperma, globosa. Sem. I. cochleatum.

Totum Genus Suedæ Forsk. huc pertinet. Vahl.

1. *Kali*. S. herbac. decumb. fol. subulat. spinosis, scabris;
calycibus axillar. marginatis. *Syst. veg.* ed. 14.
Fl. Dan. tab. 818.

Kali &c. Moris. hist. 3. s. 5. tab. 33. f. II.

Tragum. Cam. epit. 779.

Trago Matth.

In Europæ litoribus maris ⊖.

*Planta spinosa. Fol. crassa. Cal. cinctus margine
foliac. Styl. 3-fidus.*

2. *Tragus*. S. herbac. erecta: fol. subulat. spinosis, lœvibus:
calycibus ovat. *Syst. veg.* ed. 14.

Drypis &c. Tabern. hist. 423.

Var. prioris. Planta 3-pedal.

3. *rosacea*. S. herbac. fol. subulatis, mucronatis: calycibus
explanatis. *Syst. veg.* ed. 14.

Kali. Buxb. cent. I. tab. 14. f. 2.

Ad Asie septentr. salinas ⊖.

*Caul. subped. Fol. teretii, acuta, crassa, pleraq.
apice infra flexa. Sem. magnum. Calyx. pur-
pur. fl. rosaceum mentientes.*

4. *Soda*. S. herbac. patula: fol. inermibus. *Syst. veg.* ed. 14.
Jacq. hort. tab. 68. Lob. ic. 394.

Kali Matth.

In Europæ australis salis ⊖.

*Planta nitida. Caul. ped. subruber. Fol. infer.
opposita; super. alterna, primum longa, &
angusta, dein brevia; carnosa, subulata, su-
pra plana, subtus teretia, leviter sulcata, cum
spinula innocua, cinerescent. supra lineis 3.
viridibus, angustis exarat.*

5. *sativa*. S. herbac. diffusa: fol. teretibus, glabris: fl. con-
glomeratis. *Syst. veg.* ed. 14.

In Hispaniæ australis maritimis ⊖.

*Caul. undiq. diffusi, ramosiss. ramis, & ramulis
alternis. Fol. alterna, carnosa, supra linea
G ij*

- longitudinali fusca picta, vix ungue longiora, plano-concava; infima basi latescunt. Bracteæ fol. longiores, succulentæ. Fl. axillar. sessil. Glomeruli breves, crassi, fastigiato-truncati.
6. *altissima*. S. herbac. erecta, ramosiss. fol. trifloribus, acutiuscul. basi pedunculiferis. Syst. veg. ed. 14. Chenopodium &c. Buxb. cent. I. tab. 31. f. 2. Sueda fruticosa. Forsk. Vahl.
Ad salinas Italæ, Saxonæ, Astracani ⊖.
 Altitudo quandoq. humana. Fol. uncial. & longiora, succulenta, glauca. Pedunc. 3-fl. lateribus ad basin intermedii enatis, ex basi fol. ipse enatus, ut in *Thestio*, & *Turnera*. Styli 3.
7. *Salsa*. S. herbac. erectiusc. fol. linearibus, subcarnosis, muticis: calyc. succulentis, diaphanis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hori. 3. tab. 83.
 Chenopodium &c. Buxb. cent. I. tab. 31. f. 1.
Ad Ajacianum ⊖.
 Caul. basi adscendens, pedal. purpurasc. Fol. sparsa, supra plana. Fl. axill. sessil. terni. Calyc. foliola maxime fornicata, convexa, clausa, in trudu hyalina. Styli 3. apice 2-fid.
8. *hirsuta*. S. herbac. diffusa: fol. teretibus, obtus. tomentotolis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 187.
Keli parvum &c. Bauh. Hist. 3. p. 702.
In Danicæ, Monachelij maritimis ⊖.
 Planta succulenta, ramis incurvis.
9. *polyclonos*. S. sublignosa, diffusa: fol. oblong. calyc. marginat. glomeratis, colorat. Syst. veg. ed. 14.
Anthylloides &c. Bocc. mus. 2. tab. 34.
Pedicularis &c. Barr. rar. tab. 275.
In Siciliæ, Hispaniæ maritimis.
 Caul. ramosiss. diffusus. Fol. mutica, carnosa. Fl. axill. & terminal. glomerati, sessil. Cal. infundibulif. 5-part. membranac. limbo parvo, plano, colorato.
10. *prostrata*. S. frutesc. fol. linearibus, pilosis, inermibus. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 294. Pall. it. I. tab. C. Gmel. Sib. 3. tab. 18. f. 2. & 19. f. 1. & tab. 20. Buxb. cent. I. tab. 15. & tab. II. f. 2.
Chenopodium Augustanum. Allion. Fl. Ped. tab. 38. f. 4.
In Asia boreali, Hispania, Sibiria, Austria, Helvetia &c. b.

Ad Chenopodium spectat. Caul. pl. sub 2-ped. prostrati, vel adscendent. inferne virent. superne sanguinei. Fol. sessil. crassula, mollia, glauco-virentia. Fl. parvi, pauciq. aggregati, axillar. longe spicati. Cal. hirsutus.

11. *vermicula-* S. frutesc. fol. ovatis, acutis, carnosis. *Syst. veg.* ed. 14.

Kali geniculatum &c. *Barr. rar. tab.* 215.
In Hispania ♂.

Caul. multi, breves, basi varie divisi, tortuosí, depresso. Rami consimiles. Fol. sparsa, brevia, linear. inermia. Fasciculi fol. axillar. Bract. sub singulo fl. 3. Fl. spicati, sparsi, alterni, sessil.

12. *fruticosa*. S. fruticosa, erecta: fol. filiformibus, obtusifusc. *Syst. veg.* ed. 14.

Chenopodium &c. *Duham. arb.* I. *tab.* 62.

Kali species &c. *Bauh. hist.* 3. p. 704.

Chamæpithis &c. *Lob. ic.* 381.

In maritimis Gallix, Hispaniae, Persiae &c. ♂.

Ad Chenopodii genus spectat. Caul. erecti. Fol. teretia, supra planiusc. carnosa, glabra. Fl. axillar. 3. sessil. Cal. subrufesc. concavus. Anth. flavæ. Styl. 3. purpur.

13. *muricata*. S. fruticosa, patula; ramulis hirsutis: calyc. spinosis. *Syst. veg.* ed. 14.

S. *monohydræa*. *Forsk. Æg. Vahl.*

Bassia muricata. *Allion. aliis* 177. *tab.* 4. f. 2.

Chenopodium &c. *Buxb. cent.* 3. *tab.* 49.

In Europa australi, Ægypto ♂.

Planta valde ramosa. Caul. erectus, pilosus, cinereus. Fol. sessil. linearia, compressa, subcarnosa, hirsuta, cinerea. Fl. axillar. sessil. Calyc. bini, congesti.

14. *laniflora*. S. suffrutic. erecta: fol. obtus. carnosis: anth. coloratis. *Syst. veg.* ed. 14. *Lin. Suppl.*

S. *sedoides*. *Pallas. it.* I. *tab.* M. f. I. 2.

S. *lanata*. *Pall. it.* 2. *tab.* P.

In Dauria humidis saltis.

Caul. 2-ped. iunior lanuginos. sed circa fructificationem nudus. Fol. teretia, parcius lanata. Fl. axill. terni, flavi. Anth. roseæ, quoniam statim dignoscitur.

15. *arbore-* S. frutescens: fol. semicylindric; inferioribus coniugat. *Syst. veg.* ed. 14. *Lin. Suppl.*

In Sibiria ♂.

G iii

Caul. adscendent. albi. Fol. lævia; super. alterna. Spica terminalis. Calyc. scarioso-rosacei.

16. aphylla. S. fruticosa, subaphyll. ramis floriferorum rudimentum coopertis. Lyft. veg. ed. 14 Lin. Suppl. Ad cap. b. Spei ♂.

Altitudo humana. Frutex valde inæqual. Fl. sessil. limbo expanso, membranac.

arbuscula. S. Pall. it. 1. tab. G. f. 1.

In Dauuria ♂.

Frutex sub-ped. diffusus, asperimus, rigidus, valde ramosus. Fol. fasciculata, obtusa, inferne attenuata, teretia, carnosa, decidua. Fl. 1-2. ex una gemma. Calyc. fructus flavescens, raro rubicundus.

hyssopifolia. S. Pall. it. 1. tab. H. f. 1.

In Dauuria ⊖.

Caul. cubital. & ultra, erecti, parum lanuginosi. Rami crebri, alterni, patentes, subsimplices, magis lanuginosi. Fol. alterna, oblongo-linear. plana, lanuginosa. Fl. axill. glomerati, lanuginosi.

monandra. S. Pall. it. 3. tab. 1. f. 1. A. B. C. D. d.

In Dauuria ⊖.

Facie, & fl. triglumis, monandris a congeneribus differt.

Caul. digital-cubital. erectus; in planta min. subsimpl: in maiore ramosissim. Fol. radical. bina, obtusa, cylindrica, carnosa; reliqua teretia, *Salicornia* instar, succulenta, glauca, alterne ramosa. Maturante semine tota planta evadit pallida, & exsucca.

longifolia. S. fruticosa, prostrata: fol. teretibus, inermibus, glabris, farinosis. Forskal. Æg.

In Ægypto ♂.

Fol. opposita, longa, linear. tereti-subtrigona, aculeata, carnosa. Fl. conferti, sessil. tribistratei, limbo lato, atro-rubente.

articulata. S. caul. fruticoso, decumben. aphylo: ramis floriferis, articulatis: fl. opposit. ad apicem articulorum. Forsk. Æg. tab. 8. A.

In Ægypto ♂.

Caul. olivaceo-cinereus, teres, inæqual. Rami, & ramuli oppositi. Fl. sessil. Cor. pallide rufa.

- mucronata*. S. fruticosa, ramulis mucronatis: fol. subulatis, ineribus. *Forsk. Æg.*
- In Ægypto.*
- Caul. diffusus. Rami patentes, mucronato-albidi. Fl. axillar. & ramei, conferti, alterni, sessil. tribracteati. Cal. corolliform. limbo magno, violac.
- inermis*. S. fruticosa, aphylla, ramis inermibus: bracteis farinoso-villosis. *Forsk. Æg. tab. 8. B.*
- In Ægypto* ♂.
- Caul. procumbens. Rami diffusi, conferti, alterni, villosi. Fl. lateral. sessil. in ramis viridibus alterni, tribracteati. Bracteæ orbiculato-acumin. Fl. plurimi. Petal. viridia.
- imbricata*. S. fruticosa, diffusa, inermis; ramis villosis, ramulis imbricatis: bracteis obtusis, nudis. *Forsk. Æg. tab. 8. C.*
- In Ægypto* ♂.
- Diffr. a priore caul. diffuso: ramis rigidis, tomentosis: bracteis obtusis, nudis, imbricatis: fl. rosaceis.*
- tetrandra*. S. fruticosa, decumb. inermis: fl. opposit. brachiatis, tetrandris. *Forsk. Æg.*
- In Ægypto.*
- Fol. tomentosa, opposita, sicuti & rami. Fl. omnes tetrandri.
381. ANABA- Cal. 3-phyll. Cor. 5-petal. Bacca 1-sperm. cassis. lyce cincta.
- i. *aphylla*. A. aphylla, articulis emarginatis. *Syst. veg. ed. 14.*
- Salsola &c.* *Gmel. Sib. 3. tab. 18.*
- Kali &c. *Buxb. cent. I. tab. 18.*
- Ad maris Caspii litora, & circa Tripolin.* ♂.
- Simil. Ephedræ.* Caul. semiulnar. brachiati: rami, & ramuli binati, articulati. Fl. oppositi, sessil.
2. *foliosa*. A. fol. subclavatis. *Syst. veg. ed. 14.*
- Kali &c. *Buxb. cent. I. tab. 19. f. I.*
- Ad maris Caspii litora* ⊖.
- Caul. semiped. plus, minus ramosi. Fol. apice obtusa, & quasi abscisso parvam clavam referentia, succulenta, subglaucia, alterna, & ternata; quorum duo lateralia min. cincta florcul. luteis. Bacca rubra.

3. *Tamarisci-folia*. A. fol. subulatis: pericarpiis exsuccis. *Syst. veg.*
ed. 14.
- In Hispania* ♂.
 Frutex ramulis albis, glaberrim. Fol. triquetra,
 Tamarisci. Fl. axillar. subspicati, solitarii.
4. *spinofissima*. A. frutescens; ramis nudis, spinosissim., *Syst.*
veg. ed. 14. Lin. Suppl.
- Habitat* . . .
 Caul. lævis, ramosiss. Fl. circum spinas pl. conferti, sessiles, tenaciter adhærentes. Petala hyalina, vix calyce longiora. Semen cochleatum, vesica pellucida cinctum.
-
- cretica*. A. *Pall. it. I. tab. K.*
In Dauuria ♂.
 Caudex curiosissim. crassus, strigosus, per ætatem multipartitus, surculis deciduis verrucosus, acetabulis albidis. Surculi sesquipollic. conferti, simplic. erecti. Articuli oblong-cylindrici, succulenti, virides, per ætatem rubri. Surculi raro fructificantes, & tunc 1-fl.
382. CRES- Cal. 5-phyll. Cor. tubulosa, inferne ventricosa,
 SA. 5-fida. Filam. tubo insidentia. Caps. 2-valv.
 1-sperma.
- I. eretica*. C. (cor. imberibus: capsul. 1-spermis). *Syst.*
veg. ed. 14.
 Anthyllis. *Alp. exot. tab. 156.*
 Lysimachiæ &c. *Pluk. alm. tab. 43. f. 6.*
 C. indica *Retz. Obs. fasc. 4. differt cor. niveis,*
extus pilosis. Caps. 4-sperm.
In Cretæ litoribus silvis; Romæ ad ostia, & in
agro Nicæensi ⊖.
Planta parva, humifusa, incana. Caulic. do-
dant. ramosi, subrubentes. Fol. minima, al-
terna, sessil. ovata, vel lanceol. Fl. inter fol.
pusilli, ex albo-purpurasc.
-
- arabica*. C. fol. ovat-oblong: sessilibus, villosis: caul. fru-
- ticoso. *Forsk. Æg.*
In Arabia ♂.
 Caul. spitham. glaber. Fol. semipollic. alterna,
 obtusa cum mucronulo, patentia, plana. Pe-
 duncul. axill. filiform. solitarii, patentes, 1-fl.
 Cor. diametro semipollic.
383. STERIS. Cal. 5-part. Cor. rotata. Bacca 1-locul. poly-
 sperm,

1. *javana*. S. Syst. veg. ed. 14.
Nama zeylanica. Syst. veg. ed. 13.
In India 4.
Facies Capsici minoris. Caul. herbac. ramosiss.
 lœvis. Fol. alterna, petiol. ovali-oblon. acutiusc. integerr. lœvia. Pedunc. nunc oppositifol. nunc axillar. nunc terminal. subdivisi,
 aut 1-fl. Cor. cœrul. magnitudine *Capsici*.
384. GOM-
 PHRENA . Cal. coloratus, exterior 3-phyll: foliol. 2. con-
 niventibus, carinatis. Petal. 5. rudia, villo-
 sa. Nectar. cylindric. 5-dent. Styl. semi-2-fid.
Caps 1-sperm.
1. *globosa*. G. caul. erecto: fol. ovat-lanceol: capitul. soli-
 tar. pedunc. 2-phyll. Syst. veg. ed. 14.
Amaranto &c. Breyn. Cent. tab. 51. Comm. hort.
 1. tab. 45.
Flos globosus. Rumph. amb. 5. tab. 100. f. 2.
Wadapu. H. mal. 10. tab. 37.
In India ④.
Caul. 2-ped. ramosus, pilis brevibus obsitus,
genicul. purpur. longioribus. Fol. opposita,
quandoq. plura simul ad ramorum divaricatio-
nies, superior. brevius petiol. subtus dilute
virescentia. Fl. terminal. in summis ramulis,
squamis bicomposit. nitentibus, albis, purpu-
reis, variegatis: Flotcul. stelliform. albicant.
2. *perennis*. G. fol. lanceolat: capitul. diphyll: flosculis peri-
 anth. proprio distinctis. Syst. veg. ed. 14.
Amaranthoides. Dill. elth. tab. 20. f. 22.
In Bonaria 5.
Caul. sub 2-ped. sublignosi, incani, ramul. axil-
laribus. Fol. opposita, col. prioris. Fl. ter-
minus. verticillati, pallide flavescent. Cal. al-
bus. Petal. 2-fid. Nectar. coccineum.
3. *hispida*. G. caul. erecto: fol. crenat. capitul. 2-phyll.
Syst. veg. ed. 14.
Nin-angani. H. Mal. 9. tab. 72.
Caul. sesquicubit. lignosi, pilis albidis obsiti,
ramis decussat. Fol. parva, opposita, oblong.
angusta, mollia, tereta, pilis rarioris obsita.
Capitul. terminal. oblongo-rotunda. Fl. pri-
mum candidi, dein cœruleo-argentata. Sem. albo-nig-
ricant.
4. *brasiliensis*. G. caul. erecto: fol. ovat-oblong: capitul. pe-
 dunculat. globosis, aphyllis. Syst. veg. ed. 14.

Amarantho &c. Breyen. cent. tab. 52.

In Brasilia.

5. *serrata*. G. caul. erecto, brachiato: capitul. terminalibus, solitariis, sessilibus: calycibus serratis. Syst. veg. ed. 14.

In America.

6. *interrupta*. G. caul. erecto: spica interrupta. Syst. veg. ed. 14. *Murray. Comm. Gott. 1782. tab. 5. Heritier. Stirp. nov. tab. 3.*

Celosia procumbens. Jacq. fascic. 2. tab. 60. monent. Heritier. l. c.

In America.

Caul. nonnulli, a basi ramosi, prostrati, mox erecti, flexuosi, articulati, nodis gibbosis, superne sensim remotis, 1. sesquicubital. Rami oppositi. Fol. opposita, inferne adproximata, superne sensim remota, tandem remotissima, subsessil. ovat-lanceol. argute acumin. integra, nervosa, 1 $\frac{1}{2}$. pollic. longa, 10. lineas lata, sericeo-tomentosa, praesertim subtus. Infra valde min: caulinis sensim ma: summa interdu duplo longiora. Spica terminal. erecta, longe peduncul: 6. pollic. longa, composita, articulata, lanata. Spicul. opposit. sessil. inferne remotæ, superne sensim adproximatæ, 6-8. lin. longæ, 4-fariæ, lanatæ, bracteatæ.

7. *flava*. G. pedunc. oppositis, 2-fid. tricapitatis; capitulo intermedio sessili. Syst. veg. ed. 14.

In vera Cruce.

Planta scandens. Fol. Lychnidis, glabra. Capitul. globosa, flavescens.

8. *arborescens*. G. arboresc. subvolub. pilosa. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In nova Granada.

Planta a congeneribus valde diversa, tamen genuina. Caul. simpl. Fol. opposita, breviter petiol. ovalia, obtusa, coriacea, integrerr. Capitulum bracteatum, magnitudine fructus Juglandis. Floscul. innumeri, sessil.

385. BOSEA. Ad polygamias est relata.

386. ULMUS. Cal. 5-fid. Cor. o. Bacca exsucca, compresso-membranac. ovalis. Sem. 1.

1. *campestris*. U. fol. duplicato-serrat. basi inæqualibus. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 632. Lob. ic. 2. p. 89. Dod. pentpt. 837.

Olmo. *Matth.*

In Europa ♂.

Arb. procera. Fol. alterna, petiol. oblonga, scabriusc. vel glabra; interdum variegata, longiora, lata, angulosa, calyculata.

Ulmum campestre, *scabram*, *sativam*, *hollandicam*, & min. Mill. sub *Ulmus campestris* comprehendit Linn. sed ut species distinctae considerantur sunt, cum cultura non mutent faciem.

Du Roi. *harph.* 2. pag. 495.

2. *americana*. U. fol. æqualiter serratis, basi inæqualibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia ♂.

Differet a priore fol. simpliciter serratis; & fructu margine pubescent.

3. *pumila*. U. fol. æqualiter serratis, basi æqualibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Sibiria ♂.

Arbuse. pumila. Fol. parva. *Var. caulis erectis, & procumbentibus.*

387. NAMA. Cal. 5-phyll. Cor. 5-part. Caps. 1-locul. 2-valv.

1. *zeelandica*. N. caul. erecto, glabro: fol. linearibus: fl. racemosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Fl. Zeel. tab. 2. Alsinæ &c. Pluk. atm. tab. 130. f. 2.*

In India ☽.

Caul. semiped. herbic. ramosus. Fol. alterna, petiol. integerr. glabra. Racem. axill. simpl. erecti. Fl. alterni.

2. *jamaicensis*. N. caul. decumbent. fol. ovat. fl. solitar. *Syst. veg. ed. 14. Brown. Jam. tab. 18. f. 2.*

In Jamaica.

Planta villosa. Fol. petiol. apice subrotund. Fl. axillar. Cor. 1-pet. cylindrica, 5-crenata, longitudine calyc.

388. HYDRO-CAL. 5-phyll. Cor. rotata. Filam. basi cordata.

LEA. Caps. 2-locul. 2-valv.

1. *spinosa*. H. *Syst. veg. ed. 14. Aubl. Guian. tab. 110.*

In Amer. merid. 24.

Caul. lignosi, erecti, 3-ped. ramis alternis. Fol. alterna, subfessil. lanceol. subundul. pubescent. viscosa. Spinæ axillar. patentes. Fl. terminal. pauci, subfessil. corymbosi, conferti. Cor. cœurul.

389. SCHRE-BERA. Cal. 5-part. Cor. infundibulif. Filam. in fauce cor.

BERA. squamis totidem baseos.

1. *schinoides*. S. *Syst. veg. ed. 14. Nov. act. Ups. I. tab. 5. f. 1.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. suffruticos. ramis determinate ramosis, teretiuscul. tomentos. nodosis, cicatricibus a casu foliorum. Fol. conferta, alterna, lanceol. nitidusc. serraturis ad apicem 3-5. petiol. brevissim. subtomentos. Pedunc. conferti, plurimi ex eodem punto ad basin ramorum, filiform. longiss. ramosi. Fl. albi.

390. HEUCHERA. Petal. 5. Caps. 2-rostris, 2-locul.

1. americana. H. scapis subnudis: thyrsso elongato: fol. radicalibus longe petiolat. bis acute crenatis. Syst. veg. ed. 14.

Cortusa &c. Herm. parad. tab. 131.

Sanicula &c. Pluk. alm. tab. 58. f. 3.

In Virginia 24.

Scapus sesquiped. Fol. lobata; quandoq. fol. caulinum, etiam lobatum. Racemus ramis dichotomis, alternis. Cor. squallide purpur.

2. dichotoma. H. caul. ramoso: fol. opposit. linear-lanceol. integris, caulinis: pedunc. axillaribus 2-fl. Syst. veg. ed. 14. Comment. Gottin. 1772. tab. 1.

391. VELEZIA. Cal. filiform. cylindric. 5-dent. Cor. parva, 5-petal. Stam. etiam. 6. Caps. 1-locul. cylindrica, polysper. Sem. serie simpl.

1. rigida. V. Syst. veg. ed. 14.

Knavel. Buxb. cent. 2. tab. 47.

Lychnis &c. Barr. rar. tab. 1018. 1017. Bocc. mus. 2. tab. 43.

In Europa australi ⊖.

Caul. sesquipalm. ramosiss. duri. Fol. connata, subulata, integerr. pilosa. Fl. axillar. solitar. sessiles. Cor. limbus minimus, ad basin notatus lunula purpur. ut in Caryophyllæis. Stam. quandoque 6.

392. SWERTIA. Cor. rotata. Nectariferi pori ad basin lacin. cor. Caps. 1-locul. 2-valv.

1. perennis. S. cor. sfid. fol. radicalibus ovalibus. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 243.

Gentiana &c. Barrel. ic. 91.

Gentiana XII. Clus. hist. 1. pag. 316.

In alpibus Italiæ, Helvetiæ, Germaniæ &c. 24.

Caul. subped. subpaniculat. rufescens. Fol. nervosa, integerr. glabra, nitide virent. inferior. obverse ovata, obtusa, petiol. super. opposita, sessil. acuta. Fl. racemosi. Cor. plana, patens, coerulea. punctulis nigris adspersa.

2. *diformis*. S. cor. 5-fid. terminali 6-fid. pedunc. longissim. fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14.*
In Virginia.
 Pedunc. oppositi, nudi, 1-fl. Cor. alba.
3. *rotata*. S. cor. 5-fid. fol. lanceol-linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 4. tab. 52. f. 2.*
In Siberia, Islandia.
 Caul. 2-unc-semiped. ramosi, genicul., multifl. 4-goni. Fol. remota, sessil. utrimq. glabra. Fl. cœrul. speciosi.
4. *carinthia-*
cus. S. cor. 5--fid. caulis 1-fl. basi foliolosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 6.*
In Carinthia.
 Planta glabra, subnitens. Caulicul. 1-pl. Fol. ad radicem per binas coniugationes opposita, sessil. ovat-obl. aut lanceol. & obtusa, integerr. patentia. Caul. 2-3-pollic. ex tereti-subancipites, supra fol. atrocœrulei. Flos terminalis, magnus ratione plantæ, ante efflorescentiam globosus. Cor. patens, laciniis lanceol. integerr. supra cœlestino-cœrul. extus primo sature violac. tum ex cœrul-virentibus, faucenectarifera. Raro una pars num. in fl. deficit.
5. *cornicula-*
ta. S. cor. 4--fid. quadricornibus. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 4. tab. 53. f. 4.*
In Siberia, Canada ⊖.
 Caul. dodrant-ped. angulosi, striati, non raro intorti. Fol. sessil. 3-nervia, lète virid. extremo caul. plerumq. 6. Fl. axillar. peduncul. pyramidis quadratæ forma, e viridi, & luteo-albent. subclausi, singula lacinia non procul a fundo calcarata. Interdum planta ramosa.
6. *dichotoma*. S. cor. 4-fid. ecornibus. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 4. tab. 53. f. 3.*
In Siberia ⊖.
 Caulic. pl. ad exortum rubentes, sæpe erecti, 2-3-geniculati. Fol. oblonga, latiuscula, longitudinaliter venis distincta. Pedunc. axillar. ramosi, pedicell. incurvis. Petal. sæpe albo-lutescent.
393. GEN-
 TIANA. Cor. 1-petal. (varia). Caps. oblonga, conica
 2-valv. 1-locul. Receptaculis 2. longitudinali-
 bus. Fol. simplicia, opposita, glabra.

* Cor. 5-fid. & sub 5-fid. campaniformibus.

- 1. lutea.** G. cor. sub 5-fid. rotatis, verticillat. calycibus spathaceis. Syst. veg. ed. 14. Subb. hort. I. tab. 12. Barr. ic. 63.
Asterias. Reneal. tab. 63.
Genziana maggiore. Mæth.
In alpibus Helveticis, Norvegicis, Apenninis &c. 4.
Radix extus nigra, intus flavescens. Caul. 2--cubital. Fol. Plantaginea, amplexicaul. ovata, nitida, subtus nervosa. Fl. dense verticill. penduncul. Cor. rotata, flava, punctis sparsis, creberimis.
- 2. purpurea.** G. cor. sub 5-fid. campanulat. verticillat. calyc. truncatis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 50. Jacq. Obs. 2. tab. 39. Mont. in Zann. tab. 82.
In alpibus Helveticis, Pyrenæis, Norvegicis &c. 4.
Radix flava. Caul. vix 2-ped. Fol. palmari. Ovata, lanceol. nervosa. Verticilli 2. in supremis alis. Cor. tubo viridi-luteo; limbo purpur. rubent. albo, aut obsoleti col.
- 3. campanula-** G. cor. campanulat. 7-fid. striatis, immaculat. calyc. 7-fid. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. app. tab. 29.
In alpibus Carniolæ 4.
Caul. 2-spitham. atro-coeruleum. Fol. similia G. pannonicæ; magis acumin. quam in G. punctata, nervis subtus 5-7. Fl. verticilli 2-3. Fl. axill. subsessil. 1-3. Cor. magna, sulphur. col. Guttigummæ, tota nitens.
- 4. punctata.** G. cor. sub 5-fid. campanulat. punctatis; calyc. 5-dentat. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. app. tab. 28. Obs. 2. tab. 39.
In Helvetiæ, Italiæ, Austria &c. alpibus 4.
Differt a G. pannonica fol. magis ovatis, strictioribus: calyc. magis pelviformi: cor. subtili. ex virore straminea.
Petala purpur. punctis sparsis, vel lutea. Solo fl. col. differt a purpur. Var. cor. 6-fid.
- 5. pannonica.** G. cor. campanulat. 6-7-fid. punctatis; calyc. sub 6-fid. fol. caulinis lanceol. acuminat. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 136. Fl. Carn. cum fig.
In subalpinis, & alpinis. 4.
Simil. G. purpureæ, sed flos min. & diversi col. fol. caulina ovata, & acutiuscula, numquam in acumen elongata.

6. *asclepiadea*. Cor. magna, atro-purpur. punctis saturationibus.
 G. cor. 5--fid. campanulat. oppositis, sessilibus:
 fol. amplexicaul. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 328. Knorr. del. I. tab. E. 4. Barr. ic. 70. Dasystephana. Reneal. tab. 68.*
In Helvetiæ, Italiæ &c. alpibus 24.
 Caul. 1-2-ped. Fol. cruciatim posita, ovat-lanceol. Fl. axillar. Cor. cœrul. vel alba. *Var. cor. 6-fid.*
7. *pneumonanthe*. G. cor. 5-fid. campanulat. opposit. pedunculat. fol. linear-lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 269. Lob. ic. 309. G. IV. Clus. hist. p. 313. Burr. ic. 51. 52.*
In Europæ pascuis humidiuscul. 24.
 Caul. cubital. vix ramosus, fuscus. Fol. quandoq. ellipt. vel obtusa, pallide virent. Fl. axillar. sessil. solitar. Cor. magna, cœrul.
8. *saponaria*. G. cor. 5-fid. campanul. ventricos. verticillat. fol. trinerviis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 186. f. 1. Moris. hist. 3. f. 1. tab. 5. f. 4. Cutesb. car. I. tab. 70.*
In Virginia 24.
 Fol. Saponariæ simil. 2-unc. long. semiunc. lata.
 Cor. ampla, inflexa, ochroleuca.
9. *villosa*. G. cor. 5--fid. campanul. ventricos. fol. villosis.
Syst. veg. ed. 14.
In Virginia 24.
 Fol. oblong. acumin. leviter pilosa. Cor. extus pallida, intus lineato-varia.
10. *acaulis*. G. cor. 5-fida, campanul. caulem excedente.
Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 135.
 Gentianella &c. *Bocc. mus. tab. 6. Lob. ic. p. 310. Icones Barrel. 105. 106. 110.*
 b. Thylacitis. *Reneal. Sp. tab. 68.*
In alpibus Italiciis, Helveticis &c. 24.
 Flos tota planta maior. Caul. 1-2-unc. Fol. sessil. Ovat-lanceol. firma. Flos terminal. solitar. sessilis. Cal. atro-virens. Cor. sature purpur. intus pallidior.
- II. *nana*. G. cor. 5-fida, campanul. in fauce barbata: fol. caulinis ovat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. miss. I. tab. 18. f. 3.*
In Carinthiæ alpibus &c. ⊙. 24.
 Fol. radical. quaterna ex 2. oppositionibus, & summa in tellure in rosulam patentia oriuntur:

suntq. obovata, in petiolum veluti decurrent. integerr. glabra, piana, læte virent. Caul. subtemipollis. erecto-procumb. virid. aut nigro-cœrul. genicul. 3-4 sæpe rotus veluti in cespitem absorptus, 1-2-raro 3-fl. Fol. caulinæ opposit. sessil. ovata, integerr. plana, viroris graminei. Cor. fature violac. seu cœrul. tubuloso-campanul. l. nbo 4-5-fid.

12. exaltata. G. cor. 5-fid. coronatis, crenatis: pedunc. terminal. longiss. dichotomo. *Syst. veg. ed. 14.*

Centaureum &c. Plum. ic. 81. f. 1.

In America ☽.

13. decumbens. G. cor. 5-fid. campanulat. caul. decumbent. fol. radicalibus longiss. lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*
Lin. Suppl. Gmel. Sib. 4. tab. 51. A.

In Siberia ♂.

Primo intuitu similis G. pneumonan. sed caules decumbent. Fol. radical. trinervia; caulinæ parce linear. Caul. spitham. filiform. Fl. subverticill. sed inferiores ramulis elevatis. Cal. latere super. dehiscens. Cor. cœrul.

14. saxosa. G. cor. 5-fid. campanul. fol. spathulat. *Syst. veg. ed. 14.* *Lin. Suppl. Ad. Holm. 1777. tab. 5.*

In nova Zeylandia.

** Cor. 5-fid. & sub 5-fid. infundibulif.

15. verna. G. cor. 5-fid. infundibulif: caulem excedente: fol. radical. confertis, maioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

Gentianella &c. Clus. hist. 315. Bauh. hist. 3. p. 527.

Ericoila. Rencal. sp. tab. 68.

In alpibus Italæ, Helvetiae &c. 24.

Primulæ proprietor, vix amara. Caul. 2-unc. semper 1-fl. Fol. semi-amplexicaul-canalicul. opposita, & cruciata, ovat-lanceol. nervosa, ad 6-paria, in terra sibi vicina, deinde paria 3-2. caulinæ distantia, & supremum calyc. vicinum, sed etiam unicum. Cal. 5-tapterus. Cor. crenulata, fature cyanæa. Stigm. 1. magnum, orbiculare, scutellato-concavum.

16. pyrenaica. G. cor. 10-fid. infundibulif. æquali, lacin. exterioribus rudioribus. *Syst. veg. ed. 14.* *Gouan. Illust. 7. tab. 2. f. 2.*

In Pyrenæis 24.

Simill.

Simill. G. verna, sed. cor. non 5-fid. sed aquatiter 10-fid. lacin. obtusis, exterioribus subitus viridibus: omnibus intus cœrul. Foli. linear. seu linear-i-lanc. Caul. procumb. ramis erectis, 1-fl. flore longitudine rami.

17. *pumila*. G. cor. 5-fid. infundibul. subserrata: fol. lanceol-linearibus. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 302. Obs. 2. tab. 49.

In alpibus Austriae &c. 24.

Caul. 1-fl. Cor. vix serrata. A *G. verna* non differre videtur nisi fol. angustioribus.

18. *bavarica*. G. cor. 5-fid. infundibulif. serrata: fol. ovat. obtusis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 3. tab. 71.

Gentianella &c. Comm. rar. tab. 15. f. 2.

In alpibus Helvetiae, Bavariae, Sveviae &c. 24.

Fol. obtusa, nec ut in *G. verna*, acuta.

Fol. radical. humifusa. Caul. triental. & ultra, sæpe prostratus. Fol. 8-10. paria. Cal. sæpe violac. Cor. limbo ovato, cœlesti, vel albo.

19. *auræa*. G. cor. 5-fid: iufundibulif. acuminatiss. fauce imberbi, muticaque: ramis opposit. Syst. veg. ed. 14. Barr. ic. tab. 104. f. 1.

In alpibus Burdegalensibus, & Lapponiae ⊖.

Caul. erect. spitham. Rami ad radicem pl. parvi, & lateral. oppositi valde erecti. Fol. radical. parva, ovata, glabra: caulina simil. maiora, sessil. obtusiusc. Fl. terminal. pauci, in capitulum. Cal. angusti, subpedunc. Cor. limbo flavo.

20. *nivalis*. G. cor. 5-fid. infundibulif. ramis alternis, 1-fl. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab 17. Hall. helv. 1. tab. 7. f. 5. Lob. adv. ic. 310. G. V. Clus. hist. p. 315.

In summis alpibus Helvetiae, Pannoniae, Pyrenæis &c. ⊖.

Caul. sæpe ramosus. Fol. radical. pauca, ova-ta, obtuse lanceol. caulina longiora ad 8-paria, ovat-acum. Cor. extus subvirid. intus sa-ture cœrul. virore mixta, etiam alba.

21. *aquatica*. G. cor. 5-fid. infundibulifor. terminal. sessilibus: fol. margine membranaceis. Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 4. tab. 53. f. 1. Amm. ruth. 4. tab. 1. f. 1.

In Siberia ⊖.

Tom. II.

PENTANDRIA DIGYNIA.

Caulic. 2-4 - pollic. Fol. radical. 2. opposita, subrotun. acuta, crassiusc. non nervosa; caulinia cruciata. Fl. terminal. solitar. Cor. intus dilute cœrulesc. & alba; extus e viridi, & cœrul. alba, fimbriis in medio fl. dilute cœrul. & albis: quandoq: tota alba. *In montanis ramosiss. fol. latioribus, plicatis.*

22. utriculosa. G. cor. 5-fid. hypocraterifor: calyc. plicato-carinatis. Syst. veg. ed. 14. Colum. ecphr. tab. 221. Gentianella &c. Barr. rar. tab. 48.

In alfibus Italiæ, Helvetiæ, Austriæ &c. 24.

Caul. ramis 1-fl. dodrant. Fol. in rosam 4-gonam super terram congesta, ovat-acumin. caulinia 7. & ultra paria, lanceol. Cor. extus subvirid. intus cœlestis; vel tota alba.

23. exacoides. G. cor. 5-fid. hypocraterifor: calyc. membranaceo-carinatis: caul. dichotomo: fol. cordat. Syst. veg. ed. 14.

Centaurium &c. Burm. Afric. tab. 74. f. 5. Pluk. alm. tab. 275. f. 4. Seb. mus. I. tab. 22. f. 1.

Ad cap. b. Spei ⊖.

Caul. erectus, digital. simpl. angulosus. Fol. parva, perfoliata, 2-3. paria subrotun. lata, venosa. Flos amplius. Cor. lutea.

24. Centaurium. G. cor. 5-fid. infundibulif: caul. dichotomo: pilosil. simpl. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 617. Black. tab. 542. Sabb. hort. I. tab. 99. Knorr. del. hort. I. tab. 9. Vaill. paris. tab. 6. f. 1.

Erithræa. Renelm. tab. 76.

Centaurea min. Muttb.

In Europæ apricis ⊖.

Caul. ped. ramosiss. 4-gonus. Fol. ima humifusa, trinervia, pallide virent. glabra: caulinia sessil. ovat-lanceol. Stipul. breves, triangular. Fl. fere umbellati, rubelli, aut albi.

25. pulchella. G. cor. 5-fid. infundibulif. tubo elongato; stylo simpl. caul. simpliciss. Syst. veg. ed. 14. Ad Stock. 1783. tab. 3. f. 8. 9.

26. 8-flora. G. cor. 5-fid. infundibulif. verticillat. (sæpe) octonis.

G. verticillata. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In India 24.

Caul. sublignos. vix palm. teres. Rami oppositi, simpl. compressi. Fol. opposita, subsessil. lanceol. lævia. Cor. fulva facie G. Centaurii.

Cum adsit alia G. verticillata, hanc 8-fl. nom. triviali dicendani duximus.

27. *maritima*. G. cor. 5-fid. infundibulif: stylis geminis: caul. dichotomo, paucifl. *Syst. veg. ed. 14.*
Centaurium &c. *Bocc. mus. 2. tab. 76. Barr. ic. 468. 469.*

In Italiæ, Galliæ maritimis ⊖.

Simil. G. Centaurio, sed fl. pedunculati, lutei.
Fol. uni-nec trinervia.

28. *spicata*. G. cor. 5-fid. infundibulif: fl. alternis, sessil.
Syst. veg. ed. 14.
Centaurium &c. *Bauh. prod. tab. 130. Tabern. ic. 780.*

In Italiæ, & Monspelii pratis humidis ⊖.

Caul. plerumq. unicus, subdodrant. Fol. oppo-
sita, Hyperici ma. Fl. terminal. albi, vel ru-
belli.

29. *verticilla*-ta. G. cor. 5-fid. infundibulif: fl. verticillat: caul.
simpliciss. *Syst. veg. ed. 14.*
Centaurium &c. *Plum. sp. ic. 81. f. 2.*

In America 24.

Planta Indiæ Or. vix diversa. Rad. perenn. Caul.
pl. palmar. articul. Fol. lanceol. Fl. verticill.
sessil. lutei, limbo acuto. Nectar. e squama
subrotun. basi singuli filamenti, intra tubum
cor. annexa. Stylus stigmate capitato. Caps.
semibiloc.

30. *quinque-flora*. G. cor. 5-fid. infundibulif. caul. acutangulo: fol.
ovatis, amplexicaul. *Syst. veg. ed 14.*

In Pensylvania.

Planta magnitudine, & statura G. *anmarellæ*.
Caul: indivisus, 4-gonus, angulis membranac.
Fol. acuta, 3-nervia. Pedunc. 5-fl. oppositi,
Cal. breviss. angustus. Cor. subcoerul. limbo
parvo, fauce pervia.

31. *scilloides*. G. cor. 5-fid. infundibulif. bract. binis: caul.
1-fl. prostrato, ramoso: fol. obovat. obtusis,
trinerviis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Insulis Azoreis.

Planta pedal. tenera, glaberr. ramis pauciss. Fol.
parva, opposita, subpetiol: superiora remotio-
ra. Pedunc. terminal. longus. Cor. limbo
luteo.

32. *aphylla*. G. cor. 5-fid. hypocraterif: caul. aphylo. *Syst.*

veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 60. f. 3. ed. piæt.
tab. 89.

In Martinicæ sylvis montosis ⊖.

Caul. parvus, 4-pollic. filiform. vix ramosus,
nitidus, 1-fl. Stipul. oppositæ, breviss. Flos
pollic. erectus, flavescens.

33. *Amarel-* G. cor. 5-fid. hypocraterifor. fauce barbatis.
la. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 328.

In Europæ pratis ⊖.

Caul. spitham. ramosus, totus foliosus, com-
pressius, ruber. Fol. amplexicaul. ovar-acumin.
dura, glabra, nervosa, flavo-virentia. Pe-
dunc. multifl. Fl. magni, expansi, purpuro-
cœrul. vel albi. Cor. tubo calyc. duplo lon-
giore, limbo barbato, sine plicis.

*** Cor. non 5-fidias.

34. *campestris*. G. cor. 4-fid. fauce barbatis. Syst. veg. ed. 14.
Column. ecphr. 1. tab. 221. Barr. ic. 97. f. 2.
b. G. cor. 4-fid. &c. Fl. Dan. tab. 318.

In Europæ pratis siccis ⊖.

Caul. breves, ramosi, purpur. Fol. brevia, ses-
sili-amplexicaul. venosa, glabra, sature virent.
fusto tincta. Floral. lata, ovata. Flos ma-
gnus, purpuro-cœrul. vel albus. Priori nimis
adfinis, & forte var. aut hybrida.

G. tenella. Ad. Hoffn. Vol. X. tab. 2. f. 6.
Caul. non 4-gonus, sed 4-alatus. Fol. magis
oblonga, minime bisi soluta.

35. *ciliata*. G. cor. 4-fid. margine ciliatis. Syst. veg. ed. 14.
Fl. Dan. tab. 317. Jacq. Austr. 2. tab. 113.

Gentianella &c. Column. ecphr. 1. tab. 221. f. 1.

G. detonsa. Ad. Hoffn. Vol. X. tab. 1. f. 3.

In Europæ montibus, & Canada 4.

Cat. 2--unc. subdecumb. Fol. erecta, sessil.
lineari-lanceol concava, firma, infima brevio-
ra. Flos sessil. Cal. punctul. rubris. Cor. vel
sature violac. vel cœrul. Var. angustifol.

Fl. in America maxime ciliati; in Italia medio-
criter; in Islandia, & Norvegia tantum ferrati.

36. *Cruciata*. G. cor. 4-fid. imberbibus: fl. verticillat. sessil.
Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 372.

Tretorrhiza. Renealm. Sp. tab. 73.

Genziana minore Matt.

In Helvetia, Pannonia, & Apenninis 4.

Caul. pedal. Fol. connata, lanceol. trinervia. Fl. ex alis inferior. pauciores; ex spice caul. confertiores. Foliol. 2. ad singulos florum glomerul. Cal. brevis, truncatus, dentibus remotis, brevibus. Cor. cœruleo-purpur.

37. *sefilis*. G. cor. 4-fidis: fol. ovatis: fl. acaulibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Gentianoides. *Fewil. peruw. 3. tab. 14.*
In Chilli.

Caul. 2-pollic. Fol. 3-4. pollic. longa, 2. lata, crassa, 5-nervia. Cor. lutea.

38. *filiformis*. G. cor. 4-fid. imberb. caul. dichotomo, filiformi. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 524.*

Centaurium &c. *Vaill. paris. tab. 6. f. 3.*
In Gallia, Dania ☽.

Caul. 4-unc. fuscus. Fol. linear-lanceol. tenuis, glabra, pallide virentia. Fl. parvuli, longe peduncul. flavicantes.

39. *heteroclitia*. G. fl. 4-fid. irregularibus: caul. brachiato. *Syst. veg. ed. 14.*

In Malabarica agris ☽.

Planta facie G. Centaurii. Caul. erectus, spitham. dichotom. 4-gonus. Fol. opposita, sessil. ovata, integerr. subcarnosa, glabra, infer. subrotund. summa breviss. subulata. Fl. sessil. solitar. in dichotomiis caul. purpur. Cal. subincurvus, dentibus 4. subulat. Cor. tubo longitud. calyc. limbo 2-part. lacin. 2-fid. 2. superioribus erectis, 2. deflexis, externe patentibus. Stam. 4. inæqual. Caps. calyce brevior.

(*fimbriata*.) G. fl. solitar. longiss. peduncul. faucibus fimbriat. *Hall. Helv. n. 652.*

In Helvetia.

Caul. cespit. 3-unc. 1-raro 3-fl. Fol. radical: ellipt. lanceol: caulina 2-3. paria, ovat-lanceol: floralia 4. lanceol. sublivida. Pedunc. curvuli, qua nota solum a cæteris differt. Cor. parva, plerumq. inaperta 4-5-fid. ciliata.

Terglovenfis. G. Hacquet *Fl. alp. Carn. tab. 2. f. 3.*

In Carniola.

Habitus G. *pumilæ*, & *acaulis*.

Planta glabra, inodora. Caul. sub-nullus: si adest, erect. gracilis, subrotundus, 1-fl. Fol.

radical. alterna, sessil. 2-3. lineas longa, ovalia, integerr. pinguia. Fol. 2. ad cal. opposita, lanceol. subacuta. Flos pollicar. Cal. 4-linear. acuminat. 5-gonus. Cor. laciinis 5. rotundis, integerrim. cœrul. cum interiectis squamulis semi-2-fid.

394. VAHLIA. Ad. *Russelliam* est relata.

395. RUSSELIA. Cal 5-phyll. Petal. 5. supera. Caps. 1-lokul. polysperm.

I. capensis. R. Syst. veg. ed. 14. Lin Suppl.

Vahlia *capensis*. Thumb. Dissert. nov. pl. gen. cum fig. Vahl.

Ad cap. b. Spei.

Planta statura *Silenes*, semi-vix 1-pedal. Caul. herbac. teres, enodis, inferne brachiat. subpubescens. Fol. opposita, sessil. angustolanceol. sub-pubescent. Stipul. nullæ. Fl. ex summis alis 2-3. peduncul. lutei.

396. BUMALDA. Cor. 5-petal. Styli villosi. Caps. 2-lokul. 2-rostris.

I. trifolia. B. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.

In Japonia H.

Caul. fruticos. dense ramosus, glaber. Rami geniculati, teretes, purpur. Ramuli oppositi, filiform. patentiss. foliosi. Fol. opposita, petiol. ternata. Foliol. unguicul. breviter petiol. ovat-acumin. tenuissime serrata, subtus pallida. Petiol. patentiss. vel reflexi. Fl. terminal. racemosi, pedunculis capillar.

397. PHYLLIS. Fructificat. sparsæ. Stigmata hispida.

I. Nobla. P. stipul. dentatis. Syst. veg. ed. 14.

Valerianella &c. Dill. elth. tab. 299. f. 386.

Bupleuroides &c. Walth. hort. 2. tab. 6.

In Canariis H.

Caul. fruticos. 1.-2--cubital. superne ramosus. Fol. petiol. tereta, longa, ovalia, integerr. nitidiss. laevia, venosa, supra sature, & pulchre virid. subtus pallidiora. Pedunc. paniculato-trichot. pedicell. 1-fl. Fl. pusilli, herbac. dein fusi. Fruct. turbinat-oblone. angulati.



* UMBELLATÆ.

398. ERYNGIUM. **F** L. capitati. Cal. commun. 5-phyll. foliol. longiss. acutis, rigidis. Petala introrsum flexa. Thalamus paleac. Sein. 2. latere plano contigua.
1. *fastidium*. E. fol. radical. lanceol. serratis: floralibus multifidis: caul. dichot. Syst. veg. ed. 14. Herm. Lugd. tab. 237. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 156. f. 3. 4.
In Virginia, Jamaica, Mexico, Surinamo 3.
 Fol. radical. obtusiusc. serraturis spinos. innocuis. Caul. pedal. patens, dichotom. subangulat. viridis, ramis ultimis flexuosis. Fol. ramea opposita, amplexicaul. subconnata, cuneata, margine dentata, semitrifid. lacin. lanceol. angulis spina purpurasc. terminatis. Peduncul. e dichotomia rectus, triangulus, lateribus striatis. Involucra horizontal. sub 6-phyll. foliol. spinosis. Flos cylindric. Petal. ex albida, involuta. Odor totius plantæ valde teter. *Decoctum antifebrile*.
2. *aquaticum*. E. fol. gladiatis, serrato-spinosis: floralibus indivisis. Syst. veg. ed. 14. Plak. alm. tab. 175. f. 4. Moris. hist. 3. f. 7. tab. 37. f. 21.
b. Eryngium &c. Plak. alm. tab. 369. f. 3.
In Virginia 24.
 Facies, & fol. Bromeliæ min. sed hæc ciliata spinis capillaribus, flexilibus, mitibus. Paleæ fl. maiores sunt. Involucræ, & paleæ integerr.
 Caul. erectus, cubital. Fol. radical. pedal. canalicul. Capitul. plura, terminal. Fl. albi.
3. *planum*. E. fol. radical. cordato-ovat. planis, crenat. capitul. peduncul. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 391. Knorr. del. hort. I. tab. M. 5. Clus. hist. 2. pag. 158.
In Russia, Polonia, Austria 24.
 Caul. sub 2-ped. albidus, superne plerumq. 3-fide ramosus. Fol. radical. petiol. obtusa; super. sessil. lobata, incisa, spinuloso-serrata. Involucr. sub 6-phyll. Capitula, & petal. cœrul.
4. *pusillum*. E. fol. radical. oblong. incisis: caul. dichot. capitul. sessil. Syst. veg. ed. 14. Clus. hist. 2. p. 158.
In Hispania, Oriente,

PENTANDRIA DIGYNIA.

- Caul. subped. ramosus. Fol. humifusa: caulinæ multifid. serrata, aculeata.
- 5. tricuspidatum.* E. fol. radical. cordatis: caulinis palmat. auriculæ retroflexis: paleis tricuspidatis. Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zann. tab. 74. Moris. hist. 3. f. 7. tab. 37. f. 13.
In Hispania, Sicilia, Oriente ♂.
 Caul. valde paniculati, toti ramosi, ramis longiss.
 Fol. adultiora supra albescens. caulinæ breviss. amplexicaul. Fl. primum albi, dein cœruleasc.
- 6. maritimum.* E. fol. radical. subrotund. plicatis, spinosis: c. pitul. pedunculat. paleis tricuspidat. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 875. Clus. hist. 2. pag. 169. Cam. epit. 448. Matth.
Ad Europæ littora arenosa maritima 24.
 Fol. carnosæ, glauca. Fl. cœruleasc.
- 7. campestre.* E. fol. radical. amplexicaul. pinnato lanceol. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 155. Flor. Dan. tab. 554. Black. tab. 297. Clus. hist. 2. p. 157.
 Eryngio montano. Matth.
In Europæ incultis 24.
 Caul. 1-2-pedal. Fol. glabra, firma, serrato-spinosa, flavo-virent. varia per ætatem. Capitul. subrotunda. Cal. herbidus. Cor. albida.
- 8. amethystinum.* E. fol. radical. 3-fid. basi subpinnat. Syst. veg. ed. 14. Besl. ejst. o. II. tab. 8. f. 4. Moris. hist. 3. f. 7. tab. 25. f. 2.
 b. Eryngium &c. Barr. ic. 36. Bocc. mus. tab. 71.
In Styria &c. montibus 24.
 Fol. linear. semitrifid. Involuc. lanceol. capitulo longiora, basi obvallata setis subulat. interiectis.
Var. b. minor, involuc. foliol. 3-fid. distincta.
- 9. alpinum.* E. fol. suborbicul. digitatis, laciniat. capitul. oblong. polyphyllo, paleis setac. 3-fid. Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. I. tab. M. 4. Bouh. hist. 3. P. I. p. 88. Lob. ic. 2. p. 23.
 Spina alba Dalech. hist. 1462.
In alpibus Italiæ, Helvetiæ 24.
 Planta nitida, cœrul. Caul. erect. cubital. capitul. solitar. Fol. 5-part. lacin. subdichotom. sparsis, planis; inferior. longe petiol. suprema amplexicaul. Calyx cor. longior, aristatus. Petal. alba.
-
- Bourgatii.* E. caul. simpl. sol. ternatis, lacin. 2-3-part. re-

troflexis ; rameis oppositis : receptac. paleis lanceol. integerr. *Gouan. Illust. tab. 3. f. 1. 2. 3.*
In herbidis.

An idem cum E. alpino? Differt ab E. tricuspidato fol. digitat. biernat. non vero palmatis : paleis integerr. non tricuspidat.

Caul. ped. & ultra, levissime striatus, glaber, apice præsertim cœrulesc. Fol. primordial. petiol. ovata, apice dilatata, fere semi-3-fid. lobis 3-dentat. margine spinosis: subsequa digitata, 3-part. foliol. 2-3-fid. lacin. divaricat. decurrentibus, paululum squarroso, aristat. fol. summa, & ramea plerumq. opposita, palmato-3-fid. minus laciniata. Involuc. exterius minus, subulat. interiora maxima, lanceol-linear. Cor. cœrul.

399. HYDRO- Umbella simpl. parva, irregular. involuc. 4-phyll. COTILE. Petal. integra. Sem. semiorbiculato-compressa. 1. *vulgaris*. H. fol. peltatis: umbell. 5-fl. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 90. Linder. Alsf. tab. 12.*

Cotyledon &c. Lob. ic. 387.
In Europæ inundatis 4.

Fol. radical. longe petiol. orbiculat. subplicata, glabra, nitida, læte virent. Pedunc. radical. Umbel. simpl. e centro prolifera. Fl. albidi. Styl. 2. distantes.

2. *umbellata*. H. fol. peltatis: umbel. multifl. *Syst. veg. ed. 14. Acaricoba. Pis. Bras. 90.*

In America.

Differt a priore scapo foliis duplo longiore; & floscul. pl.

3. *mericana*. H. fol. reniform. sublobat. crenatis. *Syst. veg. ed. 14. Loefl. it. 281.*

In Amer. & in India Or.

Facies H. vulg. Fol. antice sinu vix hiante, ad centrum usq. dissecta, margine in 9. lobos obsoletos divisa. Umbel. 5-fl.

4. *asiatica*. H. fol. reniform. dentato-crenatis. *Syst. veg. ed. 14. Valerianella &c. Herm. parad. tab. 238.*

Ranuncolo &c. Pluk. alm. tab. 106. f. 5.

Pes equinus. Rumph. amb. 5. tab. 169. f. 1.

Codagam. Hort. mal. 10. tab. 46.

In Jamaica.

Differt a priore crenis æqualibus: consistentia fol. duplo crassiore, & fere incana: petiol. pl. ad genicula caul. cum in priore fol. sint solitar.

5. *chinensis*. H. fol. linear. umbell. multifl. Syst. veg. ed. 14.
In China.
Magnitudo priorum. Caul. repens. Fol. obtusa,
 plana, laevia, saepius bina ad articulos. Scap.
 longitud. folii.
6. *villosa*. H. tomentosa; fol. cordat. integerr. tomentos. seu
 villosis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
 Radix fibrosa. Fol. petiol. *Violæ odoratæ* simil.
 mucronata. Caul. prostrati, apice foliosi, flo-
 riferiq. Pedunc. ex apice caulinum pl. filiform.
 1-fl. Fl. parvi.
7. *glabra*. H. glaberr. fol. obovat. seu lanceol. acutis, tri-
 nerviis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
 Caul. serpentes. Fol. alterna, petiol. stipul. li-
 near. acumin. Fl. axillar. peduncul.
8. *virgata*. H. glaberr. fol. linear. semiteretibus, fulco ex-
 aratis, internodiis longioribus. Syst. veg. ed. 14.
 Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
9. *linifolia*. H. canescens; fol. linearis-subspathul. internodiis
 brevioribus. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
 Simil. priori, sed fol. multo longiora: pedunc.
 longiores, tenuiores.
10. *Solandra*. H. tomentosa; fol. cuneiform. obovat. retusis,
 septemdent. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
Planta tota incano-tomentosa. Radix caulescens,
 ramosa in superficie terræ. Caul. pollic. vix
 ramosi. Fol. alterna, petiol. Pedunc. laterales
 inferiores fol. Fl. receptac. atro-purpur. Pe-
 tala alba.
11. *tridentata*. H. tomentosa; fol. linearis-cuneiform. apice 3--
 dent. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
 Simil. H. *Solandra*, sed differt caulinis. breviorib.
 herbac. lunatis, nec lignosis, pollicar. prostratis:
 fol. linear. ad basin angustioribus, apice dentib.
 3. æqualib. nec ovatis, 5-7. dentat. peduncul.
 fol. multo brevioribus.
- Flos centralis huic certe est hermaphrod.
12. *Ranuncu-* H. fol. 5-partit. incisis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
loides. *In Mexico.*

Caul. repens; genicul. Fol. 1-2. omnino Ranunculi. Scapi caulinis pollicar. Umbell. simpl. Petal. alba.

13. erecta. H. fol. cordat. crenatis: scapis paucifl. longitudo petiolor. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Jamaica.

Fol. pollic. obtusa: petioli spitham. apice piloso. Scapi erecti.

400. SANICULA. Unibellæ confertæ, subcapitat. Involuc. fere 5-phyll. trilobat. aut certe dentat. involucel. ex 5. foliol. lanceol. Sem. oblonga, hirta, & aspera, calyce proprio coronata.

1. europæa. S. fol. radical. simplicibus, trilobat. lobis lateral. 2-part. floscul. omnibus sessil. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 283. Sabb. hort. 4. tab. 100. Black. tab. 63. Riv. tab. 30.*

In Europæ sylvis montosis 24.

Caul. erecti, cubital. nudi. Fol. palmata, crassifusc. nitida, læte virentia; radical. longe petiol. foliola quina, ovali-lanceol. Umbellæ diffitæ. Fl. albidi. Sem. lappacea.

2. canadensis. S. fol. radical. cocompositis; foliol. ovat. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia 24.

Simill. priori, sed decuplo maior. Fol. radic. plurimq. ternata, ferrata; lateral. 2-3-loba, facie Africana. Caul. 2-ped. & ultra, fol. oppositis, sœpe ternatis, sessil. lanceol. Pedunc. intra bifurcationem caul. longi. Fl. sessil. Sem. magna, lappacea.

3. marilandica. S. floscul. mascul. pedunculat. hermaphrodit. sessil. *Syst. veg. ed. 14.*

In Marilandia, Virginia 24.

Caul. & ramuli dichot. Fol. 3-fid. serrata. Ex angulis divaricationum pedunc. uncial. apice fl. gestantes. Sem. lappacea.

401. AS-TRANTIA. Involuc. magnum, polyphyll. coloratum. Sem. non alata, quinque costata, sed membrana transversim plicata tecta. Sem. si hac membrana, quæ facile separabilis est, exuantur, ad Ligulifaci sem. accedunt.

1. maior. A. fol. 5-lobis, lobis 3-fid. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 83. Dod. pent. 357. Black. tab. 470.*

b. A. min. Morif. umb. 2. hist. 3. s. 9. tab. 4.

PENTANDRIA DIGYNIA.

Helleborus &c. *Bocc.* *rar.* *tab.* 5. *f.* 3.

In alpibus Italix, Helvetix, Pyrenxis &c. 24.

Caul. cubital. Fol. radical. petiol. caulinata plerumq. 2. sessil. Involuc. asteriforme.

2. *carniolica*. A. fol. 5-lobis. *Syst. veg.* *ed.* 14. *Jacq. Austr.* 5.
app. tab. 10. *Scop. Carn.* 1. *tab.* 7.

In Carniola 24.

Rad. odore aromatico, balsamico. Caul. semiped. & ultra, teres tere aphyllus. Fol. caulinum simplex, vel 3-lobum. Umbellarum num. a 6. ad 20. Bract. exiguae, ovat. obtusae, pallidæ. Involuc. foliol. 2-5. integris, vel 2-3-fid. Involucel. foliol. 6-12. integris, albis, cum linea virente. Petal. ob apicem valde inflexum cordata, alba. Sem. oval. hinc glabra, & planiusc. cinerea; illinc convexa, & muricata, albescent.

3. *minor*. A. fol. digitat. serratis. *Syst. veg.* *ed.* 14. *Fl. Carn.* 2. *tab.* 7.

Helleborus &c. *Bocc. Sic.* *tab.* 6.

In alpibus Italæ, Helvetiæ &c. 24.

Differit ab A. ma: parvitate; foliol. distinctis, senis, novenis, longis, angustis, non trilobis.
Involuc. semper album.

4. *ciliaris*. A. fol. lanceol. serrato-ciliat. *Syst. veg.* *ed.* 14.
Lin. Suppl.

Jasione capensis. *Nov. Act. Upsal.* *Vol.* 3. *tab.* 10.

Ad cap. b. Spei 24.

Caul. erectus, ped. simpl. iunceus, substriat. apice divisus. Fol. lœvia; radical. petiol. caulinata 4-6. semiamplexicaul. Umbel. elongata, subtriradiata. Umbellul. breviss. multiradiatae. Involuc. 2-3-phyll. Involucc. subdecaphylla, lato-lanceol. acuta.

5. *epipactis*. A. fol. 5-part. obtusis, serratis. *Syst. veg.* *ed.* 14. *Lin. Suppl. Jacq. Austr. app. tab.* 11. *Scop. Fl. Carn.* *tab.* 6.

In Carniola 24.

Fol. radical. semiped. petiol. rotundum, glabrum, subtus purpur. Caul. glaber, terminatus involuc. plerumq. 5-phyll. Huius foliol. sessil. obverse ovata, obtusa, supra medium ferrata, pallide virid. Umbel. parva, densa. Petal. sublanceol. flava.

402. BUPLEU- Involucra umbellulæ maiora, (*si ad sint*) 5-RUM. phyll. Fl. æquales, flavi. Petala involuta. Sem. in variis speciebus varia, oblong: ovata, ovat-acum. costata, aut simpliciter striata. Fol. in nostris simplicia, integerrima.

* *Herbacea.*

1. *rotundifolium*. B. involucris nullis: fol. perfoliat. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 78. Black. tab. 95.*
Perfoliata. *Dod. pempt. 104. Riv. tab. 45. Matth. Inter Europæ australis segetes* ⊖.
Caul. diffusus, ramosiss. Fol. ovat-lanceol. obtusa, integerr. firma, glaberr. nitida. Involucel. 5. ovata, mucronata, 3.ma: 2. min.
Var. humilis.
= *crispa*.
2. *stellatum*. B. involuccell. coadunatis: involucro sub. 3-phyllo. *Syst. veg. ed. 14. Hall. Helv. tab. 18. In alpibus Helveticis &c. 24.*
Caul. ped-cubital. Fol. radical. longiss. pedal. obtusa, vel lanceol: caulina vix ulla; nisi unum sub ramo, sessile, amplexicaul. Involuc. 8-9-fid. colorata, floscul. longiora.
3. *petraeum*. B. involuccel. coadunatis; involucro 5-phyl. *Syst. veg. ed. 14.*
Sedum &c. Pon. bald. 247.
In alpibus Helvetiæ, Baldi; in Sibiria 24.
Var. B. Ranunculoid. Rad. tuberosa. Caul. sub-nudus. Fol. sessil. linear.
4. *angulosum*. B. involuccel. orbiculat. 5-phyll: involucro ovat. 3-phyllo: fol. amplexicaul. cordato-lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Vill. prosp. tab. 6. f. 5.*
In Pyrenæis &c. 24.
Var. B. Ranunculoid. Dignoscitur involuc. aristatis: universal 3-phyll. ovat-lanceol: partial. 5-phyll. ovali, longitudine umbellul.
5. *longisolum*. B. involuccel. ovatis, 5-phyll. involucro sub 5-phyll: fol. amplexicaulib. *Syst. veg. ed. 14.*
Perfoliata. *Cam. hort. tab. 38.*
In Germania, Helvetia &c. 24.
Caul. cubital. simplex. Fol. longa; inferior. ex gracili petiolo in ovatam figuram dilatata, modice acumin.
6. *falcatum*. B. involuccel. 5-phyll. acutis: involucro sub-5-phyll: fol. caulinis apice latioribus, falcatis:

PENTANDRIA DIGYNIA.

caul. flexuoso. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 158.*

B. angustifol. *Tabern. ic. 872.*

Auricula &c. *Bauh. hist. 3. p. 200. f. 1.*

In Helvetia, Vallesia, Austria &c. 4.

Caul. cubital. totus paniculat. purpurasc. Fol. radical. longe petiol. petiolis compressis, foliac. semiped. obverse ovata, vel acuta: caulinis sessil. quandoq. incurva, Umbellæ sature luteæ. Umbellul. saepius 7. Involuc. saepe 2-phyll. inaequale. Petal. lutea.

7. *odontites*. B. involucel. 4-5-phyll. acutis: involucro 5-phyll. flosculo centrali altiore: ramis divaricat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. app. tab. 91.*

Perfoliata &c. *Column. ecphr. 1. tab. 247.*

In alpibus Vallesiae, Italiae &c. ④.

Maius sequenti. Planta vix palmar. Caul. ramosiss. angulatus, divaricatus, ramis basi nodosis. Fol. sessil. linear. acumin. Umbellæ 4-5-6-rad: interioribus minoribus Centralis umbella sessil. Petal. oblong. apice 2-fid. lutea. Involucel. aequalia, quod non in involucro.

8. *semicompositum*. B. umbell. compositis, simulque simplic. *Syst. veg. ed. 14. Gouan. Illus. tab. 7. f. 1.*

In Hispania, Monspelii &c. ④.

Ad fine B. Odontiti, vix tamen var. Planta media inter B. Odontitid. & tenuissimum.

Caul. a basi ramosiss. ut in priore, sed minores, Fol. ex linearis principio in ovata, aut ellipticam formam desinunt, aristata, triuervia. Umbel. axillar. duplo mai: terminalibus: in singulis umbellis 5-6. flores. Involucel. viridia, striata, non transparent. Petal. longe min. priore, alblicantia.

9. *ranunculoi-* B. involucel. 5-phyll. lanceol. longioribus: indes. *Syst. veg. ed. 14.*

Perfoliata minor &c. *Bauh. hist. 3. p. 199.*

Perfoliatum &c. *Park. theatr. tab. 338.*

In Helvetia, Pyrenæis &c. 4.

Rad. repens. Caul. palm. simplex. Fol. graminea, stricta. Umbell. inaequalis. Involuc. breve, ovat. acutum, quandoq. 2-4-phyll. semper inaequale. Umbellul. parvæ, æquales,

longitudine involuccelli. *Cum B. anguloso co-niungit Hall.*

10. rigidum. B. caul. dichotom. subnudo; involucris minimis, acutis. *Syst. veg. ed. 14. Dod. pempt. 633.*

Habitat Monspelii &c. 24.

Caul. 2-ped. Fol. omnia lanceol. nervosa, rigida, petiol. Involucr. 3-phyll. subulatum: involucc. setacea.

11. Gerardi. B. caul. erecto, panicul: fol. lanceol-linearibus: involucr. & involuccel. 5-phyll. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 256. Gerar. Gallo-Prov. tab. 9.*

In lapidosis, & ad vineas ⊖.

An satis differt a B. iunceo? Caul. erectus, sub 2-ped. totus ramosus, ramis patulis. Fol. graminea, alterna, sessil. acumin. integerr. Umbel. peduncul. Involucr. foliol. 5-raro 3-4. inæqualibus. Involucc. 5-phylla.

12. tenuissimum. B. umbell. simplic. alternis, 5-phyll. sub 3-fl. *Syst. veg. ed. 14. Column. ecphr. I. tab. 247. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 14. f. 4.*

In Italia, Germania &c. ⊖.

Caul. pedal. decumbens, ramosiss. ramis alternis. Fol. linear. acuta, glauca. Involucr. breve, 3-phyll. Involuccel. brevia, setacea. Umbellul. axill. parvæ. Petal. lutea.

13. iunceum. B. caul. erecto, panicul. fol. linear. involucris 3-phyll. involuccel. 5-phyll. *Syst. veg. ed. 14. Dod. pempt. 474.*

In Italia, Helvetia &c. ⊖.

Differt a priore involuccel. brevibus. A. B. falcato, quod. veras umbellas non. producat.

Caul. 6-ped. iunceus, flexuos. lævis, ramis alternis, erectis. Fol. graminea, bifaria, lævia, lactescens. Involucr. lanceol. longitud. umbellæ. Involuccel. min. Umbella radiis 4. Umbellul. 5-6. fl. luteis.

** Frutescentia.

14. fruticosum. B. frutesc. fol. obovat. integerr. *Syst. veg. ed. 14.*

Sefeli æthiopicum. Dod. pempt. 312.

In Galliæ austral. & Orientis saxosis maritimis Ḥ. Caul. 2-3--cubital. Petal. ex luteo-herbac.

15. frutescens. B. frutesc. fol. linear. involucris utrisq. 5-phyll.

*Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 80. Barr.
rar. tab. 1255.*

In Hispania collibus ♂.

16. différme. B. frutesc: fol. vernalibus decompositis, planis, incisis; aestivalibus filiform. angulat. 3-fid. *Syst. veg. ed. 14. Burm. afric. tab. 71. f. 1?*

In Aethiopia ♂.

Fol. hyemalia *Petroselini*: aestivalia *Spartii*. Involucr. foliol. pl. subulatis, basi connexis, marcescentibus: Involuccel. foliol. 5. Umbellæ aliæ simpl. aliæ compositæ.

17. spinosum. B. frutesc: ramis paniculæ senilibus nudis, spinescentibus: fol. linear. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Gouan. Illust. tab. 2. f. 3.*

In Hispania ♂.

Caul. humilis, genicul. creberrim. ramis retroflexis. Fol. radical. linear-lanceol. acuta, trinervia: caulina similia: rainea breviss. acutiora. Umbel. 3-fid. Umbellulæ 5-fid. Involucr. foliol. brevissimi. 3-5. Involuccel. foliolis 5.

pyrenæum. B. involucr. obverse ovat. emarginatis, inæqualibus: universali 3-phyll. aurito, connato: fol. lanceolat. *Gouan. Illust. tab. 4. f. 12.*

In iugis Pyrenæorum.

Caul. pl. 1-2 cubital. simplic. levissime striati. Fol. radical. pedal. pollicem lata, in longum petiol. attenuata, aristata: caulina cercat-lanceol. fere opposita. Umbellæ radii 4-5. inæqual. Involucr. foliol. 3. inæqualibus, ova-tis, hinc auritis, basi coalitis. Involuccel. foliol. obverse ovatis, inæqualibus, basi sub-coalitis. Fl. pl.

Var. vix palmar. & fol. tantum caulinō uno, vel altero.

baldense. B. involuccel. 5-phyll. acuminat. involuc. 4-phyll. ramis, foliisque alternis. *Turra Gior-nal. di Venezia tab. I.*

In Baldo ⊖.

Caul. digital. ramosus, divaricat. erectus, rigidus. Fol. linear. ramea sessil. Involuc. raro 5-phyllo, erecto-lanceol. acuminat.

B. fol. (radicalibus) linear. *Forsk. Eg.*

In Arabia.

Caul.

Caul. erectus, pedal. dichotom. pene nudus. Fol. caulinæ sessil. lanceol-linear. Involuc. 5-phyl-lum, lanceol-latum, mucronat. 3--carinatum. Involuccel. 5-phyll. umbella duplo longius.

403. ECHI-NOPHORA. Involuc. paucorum folior. involucc. monophyll. multifidum. Fl. radiati, petalis inæqual. Sem. sessilia, coronata in involucro indurato.

1. *spinosa*. E. foliol. subulato-spinosis, integerr. Syst. veg. ed. 14. *Turre farset*. 7.

Crithmum &c. Dod. pempt. 705.

Ad litora maris, præsertim mediterranei 24.

Caul. cubital. ramosus, striatus, subvillosus. Fol. alterna, 2-pinnatifida, subvillosa, lacin. linear. apice spinosis. Pedunc. lateral. subvilloso. Petal. alba, subtus purpurasc.

2. *tenuifolia*. E. foliol. incisis, inermibus. Syst. veg. ed. 14. Pastinaca. *Column. ecphr.* I. tab. 101.

In Apulia maritimis apricis 24.

Fol. bipinnatifida, carnoſa, glauca. Petal. alba, subtus purpurasc.

404. CO-PROSMA. *Flos hermaphrodit.* Cal. 5-part. Cor. 5-7-fid. Stam. 5 ad 7. Styli 2. longi. Bacca disperma. Sem. planiusc. Flos femin. & mascul. ut in hermaphrodito.

2. *lucida*. C. pedunc. compositis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen.

In nova Zeylandia.

Simil. Phyllitidi. Planta glaberr. Fol. opposita, petiol. ovata, utrimq. acumin. integerr. stipula interfoliac. solitar. acuta, combinans fol. Pedunc. axill. solitar. oppositi, 2-phylli, divisi in pedicellis. Fl. capitati. Cal. & cor. viridesc. Pistil. longiss. extra florem.

2. *fætidissima*. C. fl. solitariis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen.

In nova Zeylandia.

Intensissime foetens.

405. HAS-SELQUISTIA. Cor. radiat. cordatæ. Sem. ambitus geminata, margine crenata (ovalia, plana, medio convexa); disci solitar. urceolata, hemisphær.

1. *ægyptiaca*. H. fol. pinnatis: foliol. pinnatif. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. I. tab. 87.

Pastinaca Or. &c. Buxb. cent. 3. tab. 87.?

In Arabia ⊖.

Caul. erect. sesquiped. teres, albo-hirtus, dein Tom. II.

muricato-scaber. Rami ex axillis superior. simplic. Fol. remota, alterna, petiol. obtusa, subtus costis scabra. Vaginæ ventricosæ, basi, & margine super. albo-lanatæ, margine interior. purpur. Pedunc. terminal. muricati. Umbel. patens. Umbellul. 10. quarum 5. in ambitu. Involuc. minimum 5-phyl. subulat. reflexum. Involuccel. dimidiata; exteriorum 3-phylla, subulat. nutantia, umbellula breviora. Fl. albi. Umbel. fructifera connivens.

2. *cordata*. H. tol. cordatis. *Syst. veg. ed. 14.* *Jacq. hort. 2.*
tab. 193.

Habitat ⊖.

Caul. sesquiped. a basi ramosus, teres, striatus, cavus, pilis breviss. obtusus. Fol. vicia; plurimq. ternata, summa, & infima quædam simplic. petiolis hispidul. cum brevi vagina innixa, obtusa, crenata, utriusq. villosa: lateralia sessil. & subovata. Involuc. foliol. sub 12. setaceis, simplic. reflexis, hirsut. Involuccel. similia, sed pauciora, patentia. Umbella plana, densa. Petal. exter. ma. obverse ovata, patentiss. alba.

406. TORDY-Cor. radiata, omnes hermaphrod. Fruct. suborbicularium. biculat. margine crenatus. Involuc. longa, indivisa.

1. *syriacum*. T. involuc. umbella longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*
Jacq. hort. I. tab. 54. *Moris. hist. 3. f. 9. tab. 16. f. 7.*

In Syria ⊖.

Tota planta pilis breviss. incanis tecta. Caul. 1-2-palm. Foliol. infima, & summa 3. reliqua 5. obtusiss. crenato-incisa, foliol. terminal. maiore. Involuc. foliol. lanceol. vel spathulat. Fl. in qualibet umbella pauci. Petal. alba. Sem. magna.

2. *officinale*. T. involucell. longitudine fl. foliol. ovatis, laciniat. *Syst. veg. ed. 14.* *Jacq. hort. 3. tab. 2.*

Seseli creticum. Dod. pempt. 314.

In Italia, Narbona ⊖.

Caul. hirsut. Fol. longe petiol. pinnata, rudia, villosa. Petal. alba.

3. *peregrinum*. T. semin. fulcatis, rugosis, plicatis: involuc. 1-phyl. sub. 3-fid. *Syst. veg. ed. 14.*

Caucalis &c. Cam. hort. tab. II.

In Oriente.

Caul. ramosus, lœvis. Fol. *Cerefolii*. Umbel. radiis sub 3., umbellul. sub 7. Involucc. foliol. 5. Sem. ovata, subcompressa, sulcis 3. profundis, qui lateribus lamellato-plicati sunt.

4. *apulum*. T. umbell. remotis: fol. pinnat. pinnis subrotund. laciniat. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. I. tab. 53. Col. ceph. tab. 124.

In Italiae, Apuliae in cultis.

Caul. sesquiped. Fol. radical. decumbent. pluri-ma, pinnata: foliol. breviss. petiol. opposita, subpubescent. 4-iuga, cum impari: caulinæ acuta, glabra. Petal. alba. Umbellul. floscul. marginalibus 3. ma.

5. *maximum*. T. umbell. confertis, radiatis: foliol. lanceol. inciso-serrat. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 142.

Caucalis ma. Clus. hist. 2. p. 101.

In Italiae, Helvetia, Austria ruderatis ⊖.

Caul. pilis rigentibus, reflexis. Foliol. 7. pubescent. impari duplo ma. Umbell. paucæ, scarbræ. Umbellul. sæpius 9. Involuc. 5-phyll. subulatum, patens, umbella brevius. Involuccel. 5-phyll. subulata, longitudine umbellulæ: 2. foliol. interioribus min. Cor. alba, subtus rubra, dein ochroleuca. Sem. orbicul. compressa, hispida, margine inciassato, muricato, rubro.

6. *Anthriscus*. T. umbell. confertis: foliol. ovat-lanceol. pinnatifid. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 261.

Caucalis &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 14. f. 8.

In Europæ arvis ruderatis ♂.

Caul. 1-3-ped. striatus, scaber, pilis retroflexis. Fol. sub 2-pinn. hispida, obscure virid. Umbellæ radii 5-8. Petal. alba, vel pallide purpur. Sem. aspera. *Diversa a Scandice infesta.*

7. *nodosum*. T. umbell. simplic. axillar. sessil. semin. exterior. hispidis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. App. tab. 24.

Caucalis &c. Bauh. hist. 3. pag. 83.

In Italia, Gallia &c. ⊖.

Caul. pedal. plerumq. ad terram strati, parum ramosi. Fol. circumscriptione oblonga, sub 2-pinn. pinnul. laciniat. acutis, tenuiter divisa, utrimq. villosa. Umbell. exiguæ, purpurasc. Sem. interiora verrucosa.

- Syfolium*. **T.** fol. pinnat. pinnis sessilibus, oblon. ferrat. petal. rubris, uno maximo in fl. exterioribus. *Scop.*
Fl. Carn. tab. 8.
In Carniola.
Caul. ped. simpl. sulcatus, fere nudus. **Fol.** radical. semiped. vaginantia, villosa; pinnar. paribus 2. Primum par ad basin auctum 2. lobis: folium impar caeteris maius, & semitrifid. Involuc. uno, altero ve foliol. Involucc. polyphyll. linearia. **Cor.** rubra ut in *Caucalide grandiflora*.
407. **CAUCA-** **Cor.** radiatae, disci mascul. **Petal.** inflexo-emargin. **LIS.** **Fructus** setis hispidus. **Involuc.** integra.
I. grandiflora. **C.** involucro (plerumq. 5-phyllo) foliolo unico duplo ma. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. I. tab. 54.* *Echinophora &c. Colum. ephr. tab. 94.*
Inter Europæ austral. segetes ⊖.
Caul. tuber-ct. brachiat. lævissim. **Fol.** (*Dauci*) pinnata, foliol. exiguis, linear. tenuiter subdivis; supra lævia, subtus scabra. **Umbella** lata, radiata, plana. **Fl.** magni, albi. **Involuc.** margine aiba.
- 2. daucoides.** **C.** umbel. 3-fid. aphyll. umbellul. 3-sperm. 3-phyll. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 157.*
Fch nophora Colum. ephr. I. tab. 97.
In Italia, Helvetia, Gallia, Germania ⊖.
Caul. divaricatiſſ. diffusus, augulat. striatus, hispidus, purpureo-viresc. **Fol.** Dauci rariora, multiplicato-pinn. infer. petiolo canalicu'. super. vaginant. **Pedunc.** longiss. læves. **Umbel.** 3-5-fid. **Umbellul.** sæpius 3. sessil. **Involuc.** nullum. **Involucc.** 3-phylla. **Flosc.** æqual. (non radiati) rubentes, tandem albi. **Fructus** umbellul. plerumq. 3. divaricati, coronati periant. oblongi, aculeis uncinat. remotis, lævibus.
- 3. latifolia.** **C.** umbell. 3-fid. umbellul. 5-sperm. fol. pinnat. ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 128.*
Lappula &c. Bauh. hist. I. pag. 81.
In Germania, Gallia &c. inter segetes ⊖.
Planta sylvestris semiped. culta 2-ped. **Caul.** angulatus, ut tota planta, scaber. **Fol.** vaginæ albentes. **Pinnæ** utrimq. 4 cum impari, oppositæ, lanceol. ferratae. **Umbel.** 3-4. radiata. **Umbellul.** sessiles. **Involucra** ovat-lanceol. radiis

æqual. Universale foliol. 3-5. partial. 5. Floscul.
æqual. albi, cum rhedine mixti. Fruct. con-
ferti, ovati, scabri, acul. purpurascens. acu-
leolis reflexis.

4. *mauritani-* C. involucr. 1-phyllo: involuccel. 3-phyl. Syst.
ca. veg. ed. 14. Walth. hort. 127.

In Mauritania ☽.

Caul. sub 2-ped. ramis alternis, diffusis, angu-
losis, pilis adspersus. Fol. alterna, semiamplexicaul. infer. petiol. super. sessil. pinnis de-
compositis, pinnul. linear. profunde incisis,
petiol. membranac. Umbel. inæqual. patens,
fere plana, radiis 3-4-5. Umbellul. inæqual.
Petal. dilute purpur.

5. *orientalis*. C. umbell. patentibus: foliol. partialibus supra-
decomposit. laciniat. lacin. linear. Syst. veg.
ed. 14. Moris. hist. 3. s. 9. tab. 14. f. 5. Bellon.
it. l. 3. tab. 200.

In Oriente ♂.

Caul. 2-cubital. brachiat. Fol. fernacea, pal-
mar. & dodrant. petiol. basi lata. Umbell.
amplæ, rotundæ. Fl. æquales, absque radio.
Petal. alba. Sem. setosa, pallida.

6. *leptophylla*. C. involucr. subnullo; involuccel. sub 5-phyl.
umbella plerumq: 2-fid. Syst. veg. ed. 14. Jacq.
hort. tab. 195.

Lappula &c. Moris. hist. 3. s. 9. tab. 13. f. 3.
Inter Italæ, Helvetiæ, Germaniæ &c. segetes ☽.

Caul. diffus. semiped. teres, retrorsum scaber.
Fol. nitida, venosa, pilis scabra, 2-pinn. lan-
ceol: radical. longe petiol. superior. petiol.
vaginantibus. Umbellul. 5-fl. non radiatæ,
albo-purpurasc. Involucc. parva. Fruct. ovat.
aculeis verticillato-hispidis apice triglochid.

7. *helvetica*. C. involucr. sub-nullo: involucc. a 3. ad 5. um-
bel. a 3. ad 10-fid. ramis stricte divaricat.
Syst. veg. ed. 14. Hall. helv. n. 2742. Jacq.
hort. 3. tab. 16.

In Helvetia.

Simil. *Tordylio Anthrisco*. Caul. subped. teres,
superne asper, rainis patentiss. Fol. 2-pinnat.
petiol. membranac. canaliculata, subaspera,
sature virent. Pinnul. pinnatifid. acutæ, lacin.
lanceol. acutis. Umbell. planæ. Petal. inflexæ
cordata, patent. albo-carnea, exter. paulo

ma. Fruct. immaturus fuscescit, dein cinereus evadit. Sem. ovat. pilis ramosis hispida.

maritima. C. umbella 2-fida; umbellul. 2-spermis: involucris semine brevioribus, linear. *Gouan. I. hist. p. 135. n. 1. Ger. Gallo-prov. tab. 10.*

In agro Nicæensi &c. ♂.

glabra. C. fol. 3-pinnat. glabris: involucro 3-dent: fl. omnibus pedicellat. *Forsk. Ægyp.*

In Arabia.

Villi vix manifesti in planta. Sem. hispida.

angustifolia. C. fol. multifid. angustis, Chærophylliform. involucris, germine, & semin. hispidis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

408. ARTE- Involucra pinnatifida. Flosc. disci masculi. Fructus squamis hispidus.

I. squamata. A. semin. squamatis. *Syst. veg. ed. 14. Gingidium &c. Camer. hort. tab. 16.*

In Libano ♂.

Caul. pedul. parum ramosus. Fol. Scandicis, tenuissime divisa. Umbel. magna, plana; utraq. multiplex. Petal. cordata, alba, exter. ma: Sem. oblong. ovalia, compressa, membranac.

muricata. A. foliol. ovato-serrat. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Caul. hispidus. Involucr. utraq. ramosa. Fl. disci abortivi. In medio cuiusvis umbellæ eminet longiori petiolo foliolum crispum, rubrum, velut umbellula parva.

409. DAU- Involuc. universale fol. profundissime pinnatifid. Umbella in senio connivens, concava. Cor. subradiat. omnes hermaphrodit. Fruct. pilis hispidus. Sem. ovalia, costata, aut striata.

I. Carota. D. semin. hispidis: petiol: subtus nervosis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 723. Sabb. hort. 4. tab. 74. Clus. hist. 2. p. 108.*

b. Pastinaca &c. Black. tab. 546. Ludw. ed. tab. 9.

In Europeæ campis exaridis ♂.

Planta villosa. Caul. 3-ped. ramos. striatus. Fol. pallide virent. Petal. alba, vel rubent. *Var. umbella tota atro-rubente.*

2. mauritani- D. semin. hispidis: floscul. centrali sterili, carnos: receptac. comm. hemisphærico. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 61. f. 1.*

Pastinaca &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 13. f. 3.
In Italia, Hispania, Mauritania ♂.

Adfisis valde priori. Caul. totus hispidus. Involuc.
umbella brevius, 5-fido-pinnat. Involucc.
3-dent. Petal. inflexo-2-fid. alba.

3. *Vifnaga*. D. semin. lævibus: umbell. universali basi coa-

lita. *Synt. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 26.*

Gingidium &c. Dod. pempt. 792.

In Europa australi, Mauritania, Libano.

Planta nitida. Cal. 2-3-ped. ramos. striatus,
 lævis. Fol. alterna, amplexicaul. triplicato-
 pinn. foliol. linear. acutis. Umbel. basi est
 receptac. comm. subrotun. solidum. Involuc.
 (tamquam basi 1-phyl.) polyphyl. foliol. 3-
 fid. Involuc. polyphyl. simplic. Umbellul. nu-
 merosiss. Petal. inflexa, biloba, alba. Anth.
 purpurasc. Receptac. propria fusco-purpurasc.
 Fruct. compressus transverse, oblong striatus,
 lævis.

4. *Gingidium*. D. radiis involucri planis; lacin. recurvis. *Syst.*
veg. ed. 14.

Gingidium. Matth. comm. tab. 373.

Habitat Monspelii.

Caul. ramosus, striatus. Fol. alterna, amplexi-
 caul. sature virent. sublucida, pinnata, pinnul.
 pinnato-multifid. Petal. alba.

5. *muricatus*. D. semin. triglochidi-aculeatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Jacq. hort. I. tab. 10.

Caucalis &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 14. f. 4.
Herm. par. tab. 11.

Echinophora &c. Col. ecphr. I. tab. 94.

b. *D. maritimus*.

Caucalis &c. Ger. prov. tab. 10.

Lappula &c. Bauh. hist. 3. p. 81.

In Mauritania; b. in littoribus mediterranei ♂. ⊖.

Caul. semiped. ramosus, brachiat. Föl. cum pe-
 tiol. hirsutis, firma, concinna, triplicato-pinn.
 laciinis ultimis obtusiusculae 3-fid. & 2-fid.
 Umbell. parvæ, raræ, albæ, Involuc. 0-1-2-
 fol. sed mere pili; involucc. inæqual. 3-5-fol.
 Petal. rubra, radio parvo. Fructus magni,
 5-7. sem. aculeis flavescent. triplicis seriei,
 compressis, apice glochidibus.

b. *humilis, hirsutus*. Caul. fere aphylli. *Germi-*
na hirsuta.

- s. lucidas.* D. fol. lucidis, petiol. lævibus: caul. hirto. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
In Mauritania ♂.
 Statura D. *Carotæ*, sed multo ma. Fol. grossiora, lævia.
-
- gummifer.* D. semin. aculeat: flosc. centrali sterili, nullo: caul. nitido. *Gouan. Illus.*
 D. *hispanic.* *All. Fl. Ped.*
Pastinaca &c. Bocc. Mus. 2. f. 20.
Ad mare, & in agro Niceænsi ♂.
 Altitudo sæpe humana. Caul. striatus, sæpe purpurasc. inferne hispidus, dein calvescens, ramosiss. nitidus. Fol. radical. ampla, ex vagina non emargin. viridi; pedal. ambitu fere triangulari, lucida, 3-pinn. Foliol. lobato-pinnatif. lobulis ovat. mucronat. integris-2-3-fid. glæberr. Umbell. terminal. longæ, peduncul. confertiss. radiis multis, hispidis. Involuc. foliolis sub 12. uncial. pinnatis, foliol. quinis lanceol. mucronat. Involucc. foliol. sæpe 8. lanceol. profunde 3-fid.
Sapor Crithmi maritimi. Odor Carotæ citratus.
Excisis ramis, manet Gummi albidum, odore subcitrato, non fetido.
- polygamus.* D. semin. hispidis: umbellul. floscul. marginalibus pl. mascul. *Gouan. Illustr.*
Pastinaca &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 9. f. 10.
Habitat . . .
Habitus D. sylvest: sed humilior. Radix saepe Carotæ. Caul. 2-ped. striatus, non hispido-aculeat. sed retrorsum scaber. Fol. ambitu lanceol. 3-pinn. Foliol. parva, acute integræ-2-3-fid. subtus nervo hirsuto, petiol. hispidis: fol. summa pinnata.
- 410. AMMI.** Involucra pinnatif. Cor. radiatæ, omnes hermaphrod. Fruct. exiguis. subrotund. lævis. Sem. intus planum, dorso tenuius striato.
- i. maius.* A. fol. inferior. pinnat. lanceolat. serratis; superior. multifid. linear. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 65. Black. tab. 447.*
In Europæ austral. Orientis vineis, arvis ☽.
 Fol. alterna, amplexicaul. oblonga, angusta, pinnula impari. Umbel. terminal. ampliss. longe peduncul. alba. Sem. villos. ex cinereo-spadic. amaricantia, odora.

2. *copticum*. A. fol. supradecomposit. linear. seminibus mucicat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 196.*
In Ægypto ⊖.

Statura *Anethi*; viridis. Caul. striat. lœvis. Fol. 3-pinn. oblong. lœvia. Umbella, & umbellul. radiis 10. non magna. Involuc. foliol. 5. linear. variis, 3-fid. Involucc. foliol. 7. acutis, linear. indivisis; interior. 4. breviss. Petal. æqual. alba, 5-angula. Fruct. ovatus. Sem. striata, 5. torulis, magis gibba, quam lata, aromatica.

3. *glaucifolium*. A. folior. omnium lacinulis lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*

Daucus &c. Bauh. hist. 3. p. 58.

In Gallia 24.

Caul. sœpe unicus, pedal-cubital. quandoq. in 3. ramulos divisus. Fol. tenuiter secta, glauca, raro glabra: radical. breviter petiol. caulinæ petiolis caulem amplectent. Flosc. parvi. Sem. parva, subrubent.

dauclifolium. A. fol. 2-pinnat. pinnis pinnat. 3-fid; primis costæ comm. verticillatim adnatis. *Scop. Fl. Carn. tab. 10. Pluk. phytol. tab. 11. f. 1. huic proximum.*

In Carniola &c.

Caul. 2-3-ped. ramosus, sulcatus. Fol. pedal. glabra, subtus pallidiora. Involuc. foliol. linear. patulis, dein reflexis, apice pinnatifid. Involucc. polyphylla, setacea, indivisa. Petal. cordat. albida. Fruct. elliptic. Sem. marginatum.

Cancri specificum. Störck.

4 II. BUNIUM. Cor. uniform. Umbelia conferta. Petala cordata, reflexa. Fruct. ovali-longior, fere cylindricus. Sem. subtiliter striata, nuda. *Rad. carnosso-tuberosa.*

1. *Bulbocastanum*. B. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 220. Sabb. hort. 4. tab. 73.*

Nucula &c. Morif. hist. 2. f. 9. tab. 2. f. 5.

Enante. I. Matth.

In Europæ montosis 24.

Radix tuberosa, rotunda, nigricans. Caul. cubital. subramosus, infirmus, striatus, subfuscus, uno plerumq. fol. adnato, antequam in

ramos dividatur. Fol. alterna, amplexicaul. 3-pinn. obscure virid. nitida, firma, glabra, pinnul. linearis-multifid. caulina tenuius incisa. Umbella ampla. Petal. alba. Rad. cocta comeditur ab alpicol.

Duo distincta Bulbocastana tradit Gouan, quorum primum *B. minus* = fol. uniformibus involuc. polypyphyllo: fruct. subcylindric. apice crassioribus: styl. reflexis, deciduis. Alterum *B. majus* = fol. caulin. angustiss. involuc. nullo: fruct. ovat. acuminat. stylis persistent.

412. CONI- Involucc. dimidiata, subtriphylla. Petal. inflexo-
UM. emarginata. Fruct. subglobosus, 5-striat. utrimq.
crenatus.

1. *maculatum*. C. semin. striatis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr.
2. tab. 156. Sabb. hort. 4. tab. 70. Black. tab.
451. & 573. a. b.

In Europæ cultis, & ruderatis ♂.

Odor plantæ foetidus. Caul. orgyal. ramosus,
fistulosus, maculis rubent. adspersus. Fol. al-
terna, amplexicaul. maxima, atrovirent. nitida,
triplicato-pinn. pinnul. oblong. inciso-
ferratis. Umbella plana. Petal. alba. Var.
proceritate, & rad. perenni. Pallas.

2. *rigens*. C. semin. submuricat. pedunc. sulcatis: foliol.
obtusis, canalicul. Syst. veg. ed. 14.

Ad cap. b. Spei littora maris ♂.

Simil. C. africano, sed magis erectum, rigens.
Caul. brevis, rigens. Rami longior. patentiss.
remoti. Pedunc. sulcati (*C. Afric.* læves).
Fol. 2-pinn. conduplicata, obtusa, crenulata,
dura, *Rut*e col. Umbell. brevis, conferta,
rigida. Involuc. 5-phyll. foliol. uno, vel al-
tero foliac. diviso. Involucc. 7-phyll. foliol.
paucis, crenatis. Petal. æqual. lanceol. invo-
luta, alba. Sem. muricata.

3. *africanum*. C. semin. muricat. petiol. pedunculisq. lævibus.
Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 194.

Caucalis &c. Boeruh. Lugd. 1. tab. 63.

In Africa ♂.

Odor Opii. Caul. vix pollic. aphyll. Fol. longe
petiol. multiplicato-pinn. Pinnul. multæ, par-
væ, linear. planiusc. obtusiusc. Involuc. foliol.
sub 6. brevibus lanceolat. concavis, patentibus.
Umbel. convexa. Pedunc. oppositifol.

non sulcati. Petal. oval. patentiss. alba. Fruct. centralis sessilis.

4. *Royeni.* C. semin. radiato-spinosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Caucalis. Buxb. cent. 3. tab. 28.

In Ægypto.

Habitu simil. priori. Laciniae fol. latiores. Involuc. foliol. maioribus, & latioribus. Petal. purpur.

suffruticosum. C. semin. angulato-striat. caul. suffrutic. *Berg.*

Fl. cap.

Ad cap. b. Spei Ḫ.

Caul. spitham. superne divisus, vaginatus. Fol. petiol. duplicato-pinn. pinnis oblong. obtusiusc. incisis; glabra, succulenta. Umbel. radiis 9-12. umbellul. radiis brevibus, sub-æq. Involuc. brevia, 3-5-phyl. Petal. alba.

413. *SELI-* Fruct. ovali-oblong. compressio-planus, in medio NUM. striat. striis eminent. & subulat. margine alato, ala magna membranacea. Involuer. reflexum. Petal. cordata, æqualia.

1. *sylvestre.* S. radice fusiform. multiplici: styl. erectis: corollul. explicatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 412. Sabb. hort. 4. tab. 98.*

Thysselinum &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 17. f. 2.
In Italia &c. 24.

Planta sublaetesc. Caul. numerosi, 4-7-ped. læves, nec striati, bæsi purpur. Fol. multiplicato-pinn. in planta culta purpurascent. foliol. linear. Umbella patula. Umbellul. remotæ. Involuc. foliol. 8-12. acutis, umbella duplo brevioribus, margine membranac. albo. Involucc. externe longiora, umbellul. æqualia. Petal. lata, alba. Sem. oval--oblon. sulcis 3. elevatis, obtusis, adproximatis: immatura rubescunt, dein parum fuscescunt.

2. *palustre.* S. sublaetescens: rad. unica. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 152. (ob caulem striatum).*
Crantz. Austr. tab. 4. f. 1. Fl. Dan. tab. 257.

Thysselinum &c. Riv. tab. 13.

In Europæ septent. paludibus 24.

Radix præcipue laetesc. & urens. Caul. 3-4-ped. crassus, ramosus, sulcat. Fol. ampla, 4-duplicato-pinn. Fol. oblong--linear. subcrenata, venis nigrant. foliol. terminal. elongata. Um-

bella densa. Involucra magna, reflexa, ciliata. Pet. ex albore-lutea. Sem. emarginata.

3. austriacum. S. caul. striato, sulcato: foliol. ovatis, incisis. Syst. veg. de. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 71.

S. argenteum. Crantz. Austr. tab. 4. f. 2.

In asperis herbidis montosis Austriae, Pedemontii 24.

Caul. 2-3-ped. saepe simpl. nitidus. Petioli basi vaginant. membranac. radical. saepe pedales. Fol. multiplicato--pinn. glabra, supra sature virid. subtus dilutiora. Foliol. varia, pinnatifide incisa, mucrone exiguo. Involuc. foliol. sub 10. lanceol-linear. integris, reflexis, ora membranac. alba. Umbrella ampla, patens, convexa. Umbellul. densæ, & convexiores. Petal. alba.

4. carvifolia. S. caul. sulcato, acutangulo: involuc. evanido: styl. erectis: petal. connivent. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 16. Fl. Dan. tab. 667. Gmel. Sib. 1. tab. 48.

Angelica tenuifol. Riv. pempt. tab. 18.

Carvifolia. Bauh. hist. 3. pag. 171. Vaill. paris. tab. 5. f. 2.

In Germania, Helvetia, Sibiria &c. 24.

Tota planta nitida. Radix foris fusca, intus candida, semiped. Caul. plerumq. unicus, rectus, 2-ped. medullosus, pallide virens, subramos. membranis albis alatus; quæ plerumq. extant ad exortum umbellæ, quandoq. ad principium petiolor. Fol. triplicato--pinn. petiolo comm. striato; in radicalibus longo, & antice sulcato; in caulinis dilatato, sed vix vaginante. Pinnæ latiuscul. simpl-2-3-fid. Pinnul. ultimæ ex oblon-ellipt. mucronat. apice albidae, planæ, quædam confluentes. Umbel. densa, & parum convexa. Involuc. 0-1-raro fol. pl. Involucc. foliol. angustis a 5. ad 10. Petal. oblong. cordat. æqualia, alba, subtus rubore perfusa. Semina ala lata, membranac. Culta multo ramosior evadit.

5. Chabriæ. S. vaginis fol. caulinorum planis, flaccidis, pendul. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 72. Crantz. Austr. tab. 3. f. 2. Vaill. paris. tab. 5. f. 2.

In collibus, & pratis alpium; in sylvis, & pratis subhumidis ♂.

Tota planta glaberrima. Radix fusiform. simpl. vel ramosa, semiped. albida, quandoq. extus flavescentia, aut rufa. Caul. pl. 2--5--ped. striati, teretes, superne ramosi, virentes, vel purpurasc. Fol. radical. & caulina omnium infima longe petiol. circumscrip. oblonga. Foliol. opposita, pinn. vel pinnatifida, basi folio simili aucta; pinnul. lanceol. linear. acutis, planis. Fol. caulina constant ex foliol. minus divisis, sed plerumq. longioribus: summa simpliciter pinn. Petioli membranac. plani, & intus albidii, debiles, idcirco fol. pendula sunt. Involucr. nullum. Involucr. nulla, aut 1--fol. setaceum. Umbella plana, & rara. Umbellul. magis densae, sed radiis divergent. Petal. oblong. inflexa, vix cordata, æqualia, intus albida, extus purpurascens. Sem. subovat. & compress. hinc plana, albida, illinc in medio striis 3. elevatis insignita, margine membranac. sapore ingrato, & subacri.

6. *Seguieri*. S. involucr. nullo: pistill. divaricatiss. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. I. tab. 61.

Ligusticum alpinum &c. Segu. ver. 2. tab. 13. Till. pis. tab. 39. f. 2.?

In Italia, Helvetia, Austria 24.

Planta glabra. Caul. 3-ped. ramosus, striatus. Fol. infer. longe petiol. ampla, sesquiped. petiolo lato, sed non vaginante. Foliol. angusto mucrone albido, & innocuo; super. min. Umbel. plana, densa: umbellul. convexæ. Involucr. 0-1-fol. Involucr. polyphyll. Petal. parva, alba, odora. Fruct. subrotund. ovat. nitidus. Sem. membranac.

7. *Monnierii*. S. umbell. conferta; involucr. reflexo: semen. costis 5. membranac. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. I. tab. 62.

In Gallia australi ♂.

Sem. strudura *Lasertitii*; sed habitus, & reliqua *Selini*. Caul. 2-ped. inferne rubens. Folia 2-pinn. foliol. profunde pinnatifid. segment. oblong. subacutis, planis. Involucr. setacea. Umbell. parum convexæ. Petal. alba. Sem. parva.

sibiricum:

S. fol. 3-pinn. involucr. utrisq. enneaphyll. de-coloribus. Retz. Obs. fasc. 2.

Habitat . . . ♂.

PENTANDRIA DIGYNIA.

Planta facie singulare involucc. albis. Rad. fusiform. odore Dauci recentis. Caul. erect. 3-ped. fistulosus, striat. glaucus. Fol. pinnæ laciniat. acutæ, apice albo, petiol. compressis, supra canalicul. vaginis superiorum albis. Pedunc. sulcati. Involuc. fol. lanceol. membranaceo-albis, pellucid. Involucc. latiora, & fl. superantia. Umbel. radiis 20-30. Petal. alba. Sem. oblongo-rotunda, costis 3. dorsal. præter alas marginales.

414. ATHA- Fruct. ovat-oblong. striat. Petal. inflexa, emarginata. **MANTA.** ginata.

Pl. sp. spectante ad Selini genus.

1. Libanotis. A. fol. 2-pinn. planis (pinnis latiuscul.) : umbella hemisphær. semin. hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 392. Fl. Dan. tab. 754.* *Apium petræum &c. Bauh. hist. 3. pag. 105. ic. Daucus &c. Pluk. ait. tab. 173. f. 1. Riv. pempt. tab. 37.*

In Germaniæ, Helvetiæ &c. pratis siccis, apricis 24.
A. pyrenaica Jacq. hort. tab. 197. sere var. huius.
Planta pallide virens. Caul. a dimidio ad 4. pedes; in subalpin. simpl. vix pedal. Fol. in ma- var. ampla: petiol. incani: vagin. purpur. Fo- liol. subovat. lucida, glabra. Umbel. densa. Involucr. ex foliol. integris. Petal. pallide ochroleuca. Sem. villo tecta, non setis rigidis, aut uncinatis.

2. Cervaria. A. fol. pinnat. decussat. inciso-serrat. semin. nudis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 69.*

Selinum &c. Crantz. Austr. tab. 3. f. 1.
Libanotis &c. Tabern. 108.

Cervaria. Riv. pempt. 12.

Oreoselinum &c. Garid. Aix. tab. 72.

In Germaniæ, Helvetiæ &c. montibus 24.

Specificæ durities, & firmitas. *Planta glabra, o- dora. Caul. 1-5-ped. Fol. ampla: radical. 3- caulinæ 2-pinn. 6-iuga, subitus glauca, pleraq. sessil. elliptic. acumin. dent. terminalibus ple- rumq. 3-lobis, & in petiolum decurrent. In- volucr. foliol. sub 10. reflexis, membrana alba. Umbella ampla, subconvexa. Petal. ante ex- plicationem purpur. dein alba, inflexo-cordata, pene æqualia. Sem. ovata, nucleo modice sic- co, trifulco, ala membranac. conspicua.*

3. *sibirica*. A. fol. pinnat. inciso--angulat. *Syst. veg. ed. 14.*
Gmel. Sib. 1. tab. 40. f. 1. 2.
- In Siberia 24.*
- Simil. A. Cervarice.* Caul. quandoque orgyal. Fol. sunima bina--terna--quaterna, ex quorum alis rami. Involuc. foliol. sub--12. incanis. Petal. subtus rubra. Fruct. parvi, fere cylind. incani.
4. *condensata*. A. fol. sub-2-pinn. foliol. deorsum imbricat. umbell. lentifor. *Syst. veg. ed. 14.* *Gouan. Illus. tab. 26.*
- A. Libanotis ma. Hall. Helv.*
- In Siberia 24.*
- Caul. ped. simpl. lævis, inferne angulat. superne sulcat. Rami 2--3. floriferi, ex summis alis. Petiol. canalicul. basi membranac. subtus angulati. Foliol. alterna, pinnatif. lobo infimo ma: unde quasi cruciata, subtus nitida. Umbel. densiss. utrimq. convexa, antequam floret rufescens. Petal. inflexa, alba, anth. fuscis. Involucr. plerumq. o. & tantum rudimenta. Involucc. longitud. umbellul. foliol. imbricat. nec remotis.
5. *Oreoselinum*. A. foliol. (triplicato--pinn.) divaricat. *Syst. veg. ed. 14.* *Jacq. Austr. 1. tab. 68.*
- Oreoselinum &c. Clus. hist. 2. p. 195. Riv. pempt. 8.*
- In Europæ collibus apricis 24.*
- Rad. crassa, longiss. fetis coronata, amara. Caul. cubit. vix striat. Fol. longe petiol. petiolis vagina lata, intus purpur. Fol. glabra, lacin. latiuscul. refractis, aristat. Involucr. simpl. varians num. foliolor. per ætatem reflexum. Involucc. plura. Umbell. axill. & terminal. amplæ, raræ, compositæ. Radii inæqual. Umbellul. densæ. Petal. exigua, integra, inflexa, alba, aut ex albo-rosea. Sem. alata, emargin.
3. lineis exarata.
- Ad Selini Genus spectat.*
6. *sicula*. A. fol. inferior. nitidis: umbell. primordial. subsessil. semin. pilosis. *Syst. veg. ed. 14.*
- Daucus &c. Moni. in Zann. tab. 48.*
- In Sicilia 24.*
- Simil. sequentii, sed minus incana, & sextuplo ma.* Caul. cubital. & ultra, pubescens. Fol. multifida, super. subvillosa. Petal. alba.
7. *cretensis*. A. foliol. linear. planis, hirsut. petal. 2--part.

PENTANDRIA DIGYNIA.

semin. oblong. hirsut. Syst. veg. ed. 14. Jacq.
Austr. I. tab. 62.

Daucus creticus. Black. tab. 271.

Libanotis rupestris. Scop. Fl. Carn. tab. 9.

Dauco primo. Matth.

*In Helvetia, Austria, Carniola, Pedemontio, e
rupium fissuris, locis alpinis* 24.

*In alpibus tota planta villosa: in hortis (semini-
bus exceptis) glaberrima, & nitida.*

Caul. palm. striatus. Fol. cinerea, triplicato-pinn.
radical. ex vaginis latis, purpurasc. ultimis li-
near. planiuscul. at in culta succulentis, fra-
gilibus, nitidiss. Umbel. planæ. involuc. o-
parvifol. Involucc. foliol. a 4. ad 7. Petal.
alba. Sem. oblong. albo, & denso villo cane-
scent. sapore fragranti. Involucr. ex foliol.
integris.

8. *annua*. A. fol. multipart. lacin. linear. teretuscul. acu-
minat. Syst. veg. ed. 14.

Myrrhis annua &c. Moris. Umb. 67.

In Creta ②.

Caul. ped. Fol. *Dauci vulg.* divisura, tenui la-
nugine obsita. Petal. alba. Sem. alba lanugine
pubesc. obsita.

9. *chinensis*. A. fol. supradecomposit. multifid. lævibus: semin.
membranaceo-striat. Syst. veg. ed. 14.

Habitat

Caul. erect. parum flexuosus, angulat. lævis. Fol.
Chærophylli, lævia. Umbell. minus expansa,
alba. Sem. 5. alis longitudinal. parvis. *Statuta*
Selini monnierii.

pyrenaica. A. Jacq. hort. 2. tab. 197.

In Pyrenæis 24.

Videtur var. A. *Libanotidis*, et si habitus diversus,
cum in nostra sit patentiss. & diffusus. Caul. 2-
ped. angulat. sulcat. subvillosus, ramis patulis.
Fol. radical. circumscript. ovata, multiplicato-
pinn. vagina membranac. & striata. Pinnul.
ultimæ lanceol. acum. planæ, integerr. con-
fluentes in foliol. anibitu ovatum, & sessile.
Umbel. ampla, convexa: umbellul. densiss. he-
misphær. Involucra utraq. foliol. linearibus.
Petal. patentiss. ovata, subcord. ochroleuco-
albida. Fruct. ovat. obtusus. Sem. subovata,
cinerea.

Dauco-

Daucoides. A. (Libanotis). Scop. Fl. Carn. ed. 2.

In Carniola 24.

Caul. cubital. striat. subvillos. polline adspersus. Fol. pinnata, piunis pinnatif. segment. plerisq. 3-fid. 3-4-uncial. pinnis uncia vix longioribus. Umbel. densiss. Radii ad 40. Involuc. linear. Petal. alba.

Golatta. A. Hacquer. Pl. alp. Carniol tab. 5.

In Carniola 24.

Planta glaberr. sapore ingrato, excepta rad. Rad. subcarnosa, sapore aliquo *Oreoselini*. Caul. unicus, suberectus 2-3-4-ped. superne ramosus. Fol. radical. ex petiol. membranac. & amplexicaul. oriuntur 3-pinn. sicuti superior: summa incisa; in planta ma: 2-pedal. Membranæ caulinum superior. 3-4-fid. Umbel. ampla. Involuc. foliol. 8-9. lanceol. incisis, reflexis, undulat. Umbellul. 15-25. inæqual. Involucc. foliol. 3-5. sublinear. integerr. Petal. æqual. ovat. inflexa, alba. Fruct. ovat. oblong. nitidus, clavatus, fuscus.

416. PEUCE- Fruct. ovat. utrimq. striat. ala cinctus non pel- DANUM. lucida. Involucra breviss.

1. *officinale*. P. fol. quinques 3-part. filiform. linear. Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 96. Gmel. Sib. 1. tab. 41. Bauh. hist. 3. p. 36.

b. P. italicum minus &c.

In Europe austral. pratis pinguibus 4.

Planta succo luteo scatens. Caul. 2-4-ped. Fol. alterna, vaginant. nitida, glabra. Petal. flavescent.

2. *japonicum*. P. fol. quinques 3 part: foliol. cuneifor. 3-fid. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.

Jamima Bofu. Kæmph. am. exot. Fasc. V. p. 825.

In Japonia.

Planta tota glabra. Caul. erect. vix ped. flexuos. ramosus, teres. Rami alterni, divaricati, ramulosi. Fol. petiol. vaginant. Umbell. terminal. subfastigiat. compositæ, multiradiat. Sem. ovata, compressa, lineis elevatis exarata, margine parum alata.

3. *alpestre*. P. foliol. linear, ramosis. Syst. veg. ed. 14.

Habitat

Umbella ampla.

Tom. II.

4. *minus*. P. fol. pinnat: foliol. pinnatif. lacin. linear. opposit. caul. patulo, ramosiss. *Syst. veg. ed. 14.*
Selinum &c. Bauh. hist. 3. p. 17.
In Britolia Anglorum, Pedemontio 24.
 Caul. ped. ramosus, fistulosus, olivac. striat.
 Fol. undulata, pallide virent. glabra. Petal. alba.
5. *silaus*. P. foliol. pinnatifid: lacin. opposit. involucr. (tandem) 2-phyllo. *Syst. veg. ed 14. Jacq. Austr. I. tab. 15.*
Seseli pratense. Crantz. Austr. tab. 6. f. 1. Riv. tab. 59. Lob. ic. 738.
In Italiae, Helvetia &c. pratis montanis 24.
Ad Ligustici genus spectat.
 Plantæ tota glaberr. Rad. crassa, profunde, & recte descendens, vaginis, villisq. obsita. Caul. 3-ped. ramosus, angulat. fistulosus, e luteo-virens; inferne sœpe purpur. Fol. odore peculiari, forti, sapore ingrato, & subacri, triplicato-pinn. Foliol. opposit. ex angusto-lanceol. mucronata, spinula exigua, albida, quasi carinata, extimis coadunat. Umbel. inæqual. & rara. Involuc. 0-1. phyll. Umbellul. sub-10. planiuscul. Involucc. polyphylla. Petal. lutea, extus alba, aut pallide flavescens. seu albida, apice inflexo. Sem. ovat. aut multo longiora, 4-sulc. seu striis 3. clavatis notata, non alata, fusca, apice viridi-flavesc.
6. *alsaticum*. P. fol. pinnatif. lacin. (3-4-pluries incisis, oblong. acutis, planis). *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. I. tab. 70. Ad. Palat. vol. 2. tab. 3. f. 11.*
Umbelliifera alsatica &c. Bauh. hist. 3. p. 106.
In Alsatiæ, Austræ, Italæ &c. dumetis humidiusc. & in collinis apricis 24.
 Rad. digitum crassa, ramosa, nigra, folior. reliquiis capillata. Caul. 1-2-3-cubit. omnium ramosiss. ut paniculat. videatur, striatus, plus, minus angulat. atro-purpur. Rami quandoq. ex infima parte caul. oriuntur. Fol. multiplicato-pinn. in ipsa planta magnitudine varia: radical. sesquipedal. super. sensim min. Costæ striatæ, antice canalicul. purpur: caulinæ superior. mere membranac. fol. dependentibus: nervi canalicul. Umbell. raræ, & planæ. Involucr.

fol. sub- δ . brevibus, patulis. Petal. pallide flava, integra, inflexa. Sem. compressa, nigra, striis 3. pallidis.

7. *nodosum*. P. foliol. alternatim multifid. Syst. veg. ed. 14.
In Creta.

Caulis nodosus.

417. CRITH-Fl. æquales, fertiles. Sem. ovale, intus plenum, tota superficie cohærens, dorso 3. obscuris costis percurso.

1. *maritimum*. C. foliol. lanceol. carnosus. Syst. veg. ed. 14.
Jacq. hort. 2. tab. 187. Sabb. hort. 4. tab. 94.
Fœniculum &c. Lob. ic. 392.

Critmo I. Math.

In muris vetustis locorum calidiorum 24.

Planta glauca, odore Apii. Caul. 2-ped. simplissim. læves. Fol. tritern. medio sæpe 5-phyl. Foliol. linear. acuta, lucida. Petiolus crassitie folioli. Involuc. 5-phyll. Involucc. brevia, 7-phyll. Petal. alba.

2. *pyrenaicum*. C. foliol. lateralibus bis trifid. Syst. veg. ed. 14.
In Pyrenæis.

Essè Athamantam Libanotidem senescentem putat Hallerus.

3. *latifolium*. C. fol. pinnat. foliol. sessil. obovat. lobat. dentat. glabris. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In maritimis Taneriffæ.

Planta sesquiped. Caul. erect. teres, sulcat. Fol. petiol. Foliol. 2-3-iuga, opposita, sessil. margine exterior. decurrente, sensim dilatata. Involuc. foliol. 7-8. lanceol. Involucc. simil. Fl. lutei. Sem. sulcata, margine elevato, glabra.

418. CACHRYS. Fruct. subovat. angulat. suberofo-corticat. (magnus).

1. *Libanotis*. C. fol. 2-pinn. foliol. linear. acutis, multifid. semin. sulcat. lævibus. Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 1. f. 3. 6.

In Sicilia, Monspelii 24.

Rad. carnosa, aromaticæ. Caul. leviter striatus, paniculato-sphæric. virens cum nitore, ad apicem ramis sæpe ternis-quaternis, subverticillat. Fol. ferulacea, pinnis, pinnulifsq. oppositis. Petioli inferne crassiores. Vaginæ nervosæ. Umbel. terminal. maxima, subiecto ad quemlibet ramum folio. Involuc. varium. Petal. flava.

2. *sicula*. C. fol. 2-pinn. foliol. linear. acutis : semen. sulcatis, hispidis. *Syst. veg. ed. 14.* *Moris. hist. 3. f. 9. tab. I. f. 3.*
Hippomarathrum &c. Bocc. Sic. 37.
In Sicilia, Hispania.
 Caul. 1 2 cubit. fungosus. Fol. suprema opposita. Umbel. terminal. sessil. Involucra utraq. ramosa. Reliquæ umbel. peduncul. utroq; involuc. simplici. Sem. crassiss. sulcata, hispida.
3. *odontalgica*. C. fol. radical. supradecomposit. tomentoso-canis: caul. nudo umbellif. semen. cortice suberoso, lœviss. *Syst. veg. ed. 14.* *Lin. Suppl. Pall. It. 3. tab. G. f. 1. 2. 3.*
In Dauuria.
 Rad. acerime aromatica. Caul. erect. dodran-3-spithami. subnud. Fol. radical. terna, supradecomposita, patentia, subpubesc. foliol. extremis digitato-multifid. obtusis, sursum incurvulis. Rami quasi in thyrsus dispositi. Foliol. ad exortum ramiorum inferior. stipuliform. apice laciniosa. Involuc. e ramentis paucis, exilibus, deciduis. Radii umbell. 4-6. Umbellul. copiosior. confertiores. Fl. flaviss. Fruct. magnus *C. Libanotidi* simil.
419. FERULA. Fruct. magnus, oval. compresso-planus, striatus, cinctus ala magna, solida, non membranacea.
1. *communis*. F. foliol. linear. longiss. simplic. *Syst. veg. ed. 14.* *Dod. pempt. 321.*
In Europa australi 24.
 Altitudo humana. Radix crassa, lactescens. Fol. alterna, amplexicaul. 2-pinn. Umbell. rotund. Petal. parva, reflexa, lutea.
2. *glauca*. F. fol. supradecomposit: foliol. lanceol-linear. planis. *Syst. veg. ed. 14.* *Bocc. hist. 3. p. 45.*
In Italia 24.
 Altitudo humana. Fol. magna, glauca, præser-tim subitus, succo lacteo turgentia, lacin. latioribus priore, odore gravi. Petal. sublutea. Sem. nigra.
3. *tingitana*. F. foliol. laciniat: lacinul. 3-dent. inæqual. nitidis, (caul. lœvi, pulverulento; fol. vaginis amplissimis.) *Syst. veg. ed. 14.* *Herm. par.*

tab. 165. Scop. Del. Insub. fasc. 3. tab. 9.
10.

In Hispania, Barberia ♂.

Rad. humani brachii crassitie, admodum ramosa, extus fusca, intus flavescens; quarto anno caulescens, florens, & fructicans. Caul. plurimq. unicus, 6-8-pedal. teres, tenuissime striat. glaber, albo polline adspersus, rigidus, ad basin virescens, supra rubens, intus albus, superne ramosus, inter ramos flexuosus. Fol. supradecompos. 2-pedal. & longiora; ramis primis hinc rotundat. illinc in angulis adtenuatis. Foliol. profunde dissecta segment. leniter falcatis, glabris, planis, sulco exaratis, supra obscure virid. acumine rubello terminatis, subtus pallidioribus. Vaginæ amplexicaul. tumidae, striatae, rubra fascia ad basin notatae: harum superiores tria folia bis pinn. proferunt; inter quas supremæ aphyllæ, saepius oppositæ. Ex harum sinu rami spitham. recti, vaginati, rigidi; & ex vaginar. alis umbell. minores, nudæ, ultra maiorem, terminalemque elongatae. Involuc. nullum: involuc. ex squamul. exiguis, fuscis, deciduis. Petal. oblonga, integra, subinflexa, lutea. Sem. 7-lin. longa, 3 lata, compressa, gibbosula, lineis quinis, laevia. In fructu semimatuoro stylis divericati, deflexi, rubelli. *Ex abscessis ramis exsudat resina acris, cerascea, odore.*

4. *Ferulago*. F. fol. pinnatif. pinnis linear. 3-fid. planis. Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. s. 9. tab. 15. f. 1.

In Sicilia 24.

Altitudo humana. Radix lactesc. Caul. crassus, fungosus. Fol. ampliss. Fœnicul. longe petiol. glauca, præsertim subtus. Umbell. rotund. Petal. lutea. Sem. subnigra.

5. *orientalis*. F. fol. pinnis basi nudis: foliol. setaceis. Syst. veg. ed. 14. Tourn. it. 3. tab. 239.

In Oriente.

Caul. 3-ped. medulloso. purpurasc. Fol. 1-2-pe-
dal. caulina breviora, rariora. Vaginæ amplæ.
Umbell. axill. & terminal. peduncul. Petal.
lutea.

6. *meoides*. F. fol. pinnis utrimq. appendicul. foliol. setaceis. Syst. veg. ed. 14.

In Oriente.

Fol. Mei. Petal. lutea.

7. *nodiflora*. F. foliol. appendicul. umbell. sessilibus. *Syst. veg.*
ed. 14. *Jacq. Austr.* 5. tab. 5.

Panax Asclepium &c. Lob. ic. 783.

In Europa austral. Istria &c. 24.

Altitudo humana. Fol. imia alterna; subsequ
opposita; summa verticill. foliol. linear. inte
gerr. F singulis nodis caulinis prodeunt um
bellæ. Involucra breviss. & reflexa. Petal.
revoluta, lutea.

8. *canadensis*. F. lucida, canadensis. *Syst. veg.* ed. 14.
In Virginia.

Foliola linear. ramosa, nitida.

9. *Affa fœtida*. F. foliol. alternatim sinuat. obtusis. *Syst. veg.*
ed 14. *Kæmph. am.* tab. 536.

In Persia 24.

Radix nigra, succo albido scatens, fœtido. Caul.
orgyal. & ultra, subramosus, folior. rudimen
tis obsitus. Fol. cubital. radical. 6-7. *Pæonia*
instar divisa, sed segment. surrectis, tenuiori
bus, dilute virent. odore debiliore. Umbell.
composit. Sem. fusco-rubra.

420. LASER-
PITIUM Involuc. utraque. Petal. inflexo-emarginata,
patentia. Fruct. oblong. duabus plerumq. raro
pl. alis dorsalibus, & duabus marginalibus.

1. *latifolium*. L. foliol. (oblique) cordat. inciso-serrat. *Syst.*
veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 146.

Libanotis &c. Lob. ic. 704.

Seseli &c. Dod. pempt. 312.

In Europæ nemoribus montanis 24.

Caul. cubital. brachiat. glaucus. Fol. ampla, du
plicato-pinn. 2-3-loba, vaginis amplis, & tu
nidis, caulem amplexant. Umbel. ampla. Radii
umbel. ad 60. Petal. albo-rosea.

Var. caul. aphyll. & involucr. longiss. Variat etiam
statura, & asperitate, cum glabra evadat.

2. *trilobum*. L. foliol. 3-lob. incisis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Gargano monte, Austria 24.

Foliol. basi cordat. acuta, & acute serrata, in
quo differt a *L. aquilegifol.*

3. *aquilegifo-* L. foliol. obtus. basi ovat. lobatis. *Syst. veg. ed. 14.*
rium. *Jacq. Austr.* 2. tab. 147.

In asperis montosis, calcareis 24.

Tota planta glaberr. Rad. ped. & ultra, superne
valde capillata, foris nigricans, intus alba,

meditullio flavescent. Caul. erectus, 4-6-ped. non sulcatus, nitidus, rore glauco adspersus, senescens etiam atro-purpur. brachiat. Vag. folior. longa, concava, amplexicaul. connivens, striata. Fol. radical. & caulina inferior. ampliss. ac veluti triternata, longe petiol. Caulina summa sessil. subternata, foliol. plerumq. trilobis, & incisis, acutis, cum dentibus subrubent. foliol. hæc lata, nec linear. Caulina intermedia subbiternata, petiolo comm. carentia. Omnia folior. pinnæ amplæ, lobatæ, incisæ, subitus glaucæ, reticulatæ, supra virides. Involuc. aut o, aut uno, altero ve fol. lanceol. concavo, membranac. viridi, ora rubente. Involucc. aut o, aut ex paucis foliol. Umbel. ampla, rara, plana; radii 2-3-unc. a 10-ad 20. Umbellul. densior. convexior. Petal. parva, inflexo-cordata, alba, æqual. patentiss. Fruct. ovat-oblön. obtusus, compressus. Sem. fusca, odore, & sapore aromat.

4. *gallicum*. L. foliol. cuneiform. ferratis. Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 3. pag. 137. Pluk. phyt. tab. 198. f. 5. Garid. Aix. tab. 58.

In Europa australi 24.

Caul. sulcatus, scaber. Fol. alterna, amplexicaul. pinnata: foliol. sessil. lacin. alternis, acutis, *Oxycanthæ æmulis* Fol. variant longitudine, & latitudine.

5. *filaifolium*. L. caul. glabro: radice multiplicite; foliol. pinnatifid. lacin. lanceol. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 44.

In collibus saxosis 24.

Caul. subspith--4--ped. erecti, flexuosi, striati, glabri. Fol. petiol. membranac. multiplicato-pinn. glabra. Pedunc. oppositifol. erecti, striati. Umbell. densæ, planiuscul. ex pl. radiis constantes. Umbellul. similes. Involucr. foliol. 1-paucis, linear. rarius pinnatifid. umbella duplo brevioribus. Involucc. plura, linear. umbellul. longitudine. Petal. inflexa, alba, seu albo-flavesc. Sem. elliptica, glabra.

6. *angustifoli-* L. foliol. lanceol. integerr. sessil. Syst. veg. ed. 14. Morif. hist. 3. f. 9. tab. 19. f. 9. Pluk. alm. tab. 198. f. 4.

In Europa australi 24.

PENTANDRIA DIGYNIA:

Caul. 1-2-cubital. Fol. plerumq. opposita, petiol.
hirsutis. Petal. alba.

7. *prutenicum*. L. foliol. lanceol. integerrim. extimis coalitis. Syst.
veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 153. Breyn.
cent. tab. 84. Riv. pent. tab. 29.

*In Borussiae, Liriae, Italiae dumetis, & sylvis ad
alpium radices ♂.*

Planta pilosa. Rad. tenuis, ramosa. Caul. 2-4-
ped. basi saepe purpur. pilis albis, praesertim
ad basin. Fol. facie *Cicutae virosae*, hirsuta pe-
tiolis, & costis. Foliol. cuneiformi-lanceol.
confluentia, breviter mucronata, adulta saepe
ex fusco maculata. Umbell. plana. Umbellul.
convexae. Involucr. ex foliol. 6-9. margine
membranac. albo. Involucc. simil. Petal. alba,
ob apicem valde inflexum cordata, subodora.
Sem. pubescent. acri-aromat.

8. *dauuricum*. L. caul. maculato: foliol. pinnatifid. acumin. Syst.
veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 38.

Ligusticum ferulaceum. All. tab. 60. f. 2.
In Dauuria, & in alpibus Pedemontii 24.

Planta glabra, trita subodora. Rad. odore Apii.
Caul. erectus, ramosus, fistulosus, lineatus,
nitidus, maculis circa medium atro-purpur.
Fol. infer. 3--pinn. summa pinnata, vaginant.
Foliol. lacin. plerisq. integerr. inaequal. supra
fature virent. Umbell. convexula. Involucr.
foliol. sub 6. Umbellul. parvae, convexulæ,
distantes: involucc. simil. Petal. oval-inflexa,
æqualia, alba, aut subpurpur. Sem. subovat.
glabra, fusca.

9. *peucedano-* L. foliol. linear-lanceol. venoso-striatis, distin-
ctis. Syst. veg. ed. 14. Segu. ver. 3. tab. 7.
Pluk. alm. tab. 96. f. 2.

In Baldi valle Vaccaria 24.

Caul. pedal. 2-3. ramuscum. donatus; folio in
exortu apposito. Fol. longe petiol. segmentis
2-3. uncial. divisa ad instar Peucedani. Petal.
alba.

10. *Siler*. L. foliol. ovat-lanceol. integerr. petiolat. Syst.
veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 145. Black.
tab. 426.

Siler montanum. Moris. hist. 3. s. 9. tab. 3. f. 2.
Ligustico Matth.

In Austria, Helvetia, Gallia 24.

Planta glabra. Caul. 6-ped. Vaginæ amplæ. Fol. 3-pinn. lata, lobata, glauca. Divisiones folior. patulæ, & angulum fere rectum cum costa facientes. Involucr. brevia. Umbella lata, convexa. Petal. alba. Sem. magna, aromaticæ. Sem. Sileris sulcata absque membranulis; unde media inter Laserpitium, & Silerem Aquilegæ-folium. Scopol.

11. Chironi- L. foliol. oblique cordat. petiol. hirsutis. Syst. um. veg. ed. 14. Crantz. Austr. 3. tab. 1. f. 2. Folium. Panax &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 17. f. 1. Panaces &c. Dod. pempt. 309.
Monspelii 24.

Simil. Pastinaca opopon. Planta tota hirsuta. Altitudo fere humana. Rad. sapore acerrimo. Fol. ampla, ut in Angelica Archangelica, obtusa, crenata, subtus glauca. Involuc. utraq. parva; universale foliol. coloratis, reflexis; partiale filiformibus. Umbel. ampla, hemiphær. conferta: umbellul. convexæ, confertæ. Petal. alba, patentia.

12. ferulace- L. foliol. linear. Syst. veg. ed. 14.
uni. Cachrys &c. Tourn. it. 2. tab. 121.
In Oriente 24.

Caul. erectus, 4-ped. solidus. Fol. inferior. 3-ped. Fœniculac. foliol. 5-pinn. angustiss. lævia, laxa: caulina 2-3. min. Pedunc. axillar. Umbella radiis inæqual. Umbellul. subrotun. Petal. lutea, inflexa. Fruct. magnus. Sem. alis exarata.

13. simplex. L. scapo nudo, aphylllo, simplici: fol. pinnat. multifid. acutis, linear. umbell. semiglobosa. Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 71. f. 2.
Vill. prosp. tab. 8. f. 3.

In alpibus Austriacis, Helveticis, Pedemontii &c. 24.

Ad Ligustici genus spectat.

Rad. magna, setosa. Fol. firma, glabra, nitida, triplicato-pinn. ultimæ pinnæ argute lanceol. dimidiæ fere lineam latæ, longiuscul. simplici-2-3-fid. Caul. semiped. rectus, sulcatus. Fol. caulina radicalibus simil. sed parva, simpliciora. Umbel. densiss. Involuc. utraque. Petal. purpur. Sem. 4. alis percursum, grande, ovatum.

14. *Aciphyl-* L. caul. vaginato: petiol. folior. dilatat. fol. digitat. linear. elongatis, mucronatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Aciphylla squamosa. Forst. gen.

In nova Zeylandia.

Umbell. axillar. pl. vix petiolis ma.

Halleri. L. fol. triplicato-pinn. lobulis lanceol. *Hall. helv. n. 795. tab. 19. All. Fl. Ped.*

In alpium pratis 24.

Diffr. a *Ligustico ferulaceo*, fol. 4-pinn. non 3-pinn. pinnularum segment. brevioribus, & confertioribus, sursum erectis, conniventibus, asperiusc. & subtiliter in costa, & aversa folior. parte pilosis. Caul. plerumq. simplices. Umbel. densiss. Involucra foliol. simplic. & latioribus.

421. HERA- Fructus elliptic. compressus, striatus, vix emarc-
CLEUM. gin. Cor. radiata, inflexo-emargin. Involuc.
caducum.

1. *Sphondyli-* H. foliol. pinnatifid. fl. uniform. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 540. Riv. tab. 4.*

Sfondilio. *Math.*

In Europæ pratis 24.

Altitudo humana. Caul. crassus, sulcatus, fistulosus. Fol. per ampla, fordide virent. duriora, scabra, utrimq. subhirsuta, pennis semi-5-7-lobis. Umbell. maximæ. Involucr. mire ludit. Petal. alba, vel subrubra.

Datur vera var. angustifolia ab H. angustifol. Lin. diversa, quam habet Haller. & pingit Kniphof. cent. 5. n. 41. = altera fol. criso.

2. *angustifo- lium.* H. fol. cruciato-pinn. foliol. linear. cor. flosculos. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 173. ? Pluk. phyt. 63. f. 3. Riv. pent. 5.*

In Svecia, Anglia 24.

Statura prioris, sed foliol. angustiss. linear. ad petiol. comm. pinnata cruciatim, idest quaterna ad singula genicula, a steriore foliolo basi lobato. Fl. uniformi. virides, albi, aut luteo-virid.

3. *longisoli- um.* H. folior. piunis longiss. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 174.*

Sphondylium &c. Riv. tab. 5.

In alpinis 24.

Caul. 2-4-ped. pilis albidis adspersus, striato-sulcatus. Fol. pinn. semi-1-ped. lanceol. oblon.

acutæ, supra glabræ, subtus asperæ. In tenuella planta fol. palmata in longas lacin. involucr. aut o. aut foliol. linear. acutis. Petal. alba, exter. ma.

4. *sibiricum*. H. fol. pinnat. foliol. quinis, intermediis sessil. corollul. uniformibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Sibiria ♂.

Caul. profunde sulcatus, hispidus. Fol. convexa, lævia. Petal. virid. incurvata, non emarginata. Involuc. o. Fol. vaginæ basis barba alba, densa.

5. *Panaces*. H. fol. pinnat. foliol. quinis; intermediis sessil. fl. radiat. *Syst. veg. ed. 14.*

In Apenninis, Sibiria ♂.

Caul. paulo humilior vulg. Fol. lacin. latiores, & minus asperæ, pallidior. quandoq. pene integræ, subtus tomentosæ. Petal. alba.

6. *austriacum*. H. fol. pinnat. utrimq. rugosis, scabris: fl. subradiat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. I. tab. 61. Crantz. Austr. tab. 1. f. 1.*

In alpibus Austriacis.

Diffr. a priore fol. utrimq. scabris, venoso-rugosiss. virid. & pedunc. scabris.

Fol. variantia. Fol. radical. magis rotundata; caulina lanceol. extimo in plerisque subtrilobo. Involuc. foliol. alternis, min. Petal. alba.

7. *alpinum*. H. fol. simplic. fl. radiat. *Syst. veg. ed. 14. Sphondylium &c. Bauh. prodr. tab. 83. Barr. ic. 55.*

In Helvetiæ alpibus 24.

Videtur var. prioris, cum Austriacum spontaneum fol. scabris: alpinum satum fol. supra lævibus evadat.

Caul. ped. Fol. radical. cordat. sublobata, dentata, glaberr. petiol. caulem amplectente, ruberrimo, sulcato: summa brevius petiol. subcuneifor. serrata. Petal. semper alba.

- elegans*.

H. *Crantz. Austr. tab. 2. f. 1.*

H. *angustifolium*. *Jacq. Austr. 2. tab. 175. Bocc. mus. tab. 99.*

In Austria, Pedemontio 24.

Caul. 1-4-ped. Fol. lacin. angustæ, non longæ, confluentes. Fol. plerumq. ternata. Fructificatio H. *longifol.*

422. LIGU- Fruct. ovat-acum. 5-costatus, costis subalatis,
STICUM. non rostratus. Involucr. utraq.
 1. *Levisticum*. L. fol. multiplicibus: foliol. superne incisis. Syst.
veg. ed. 14. Black. tab. 275. Ludw. et. tab.
164. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 3. f. 1.
In apenninis Liguriæ 4.
 Altitudo humana. Fol. 2-pinn. Selleri æmula,
lobata, angulata: foliol. opposita, sessil. odo-
re valido. Petal. lutea. Sem. alatum, ala la-
terali membranacea, & costæ 3 in dorso su-
bulatæ, lateralibus ma.
Ad Angelicæ genus spectat.
 2. *scoticum*. L. fol. binternatis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan.
tab. 207. Pluk. alm. tab. 96. f. 2.
Seseli &c. Herm. par. tab. 227.
Ad litora maris in Anglia, Svecia, Dania, Ca-
nada 4.
Sapor Apii. Caul. ped & ultra, ramosus, pau-
cifl. Fol. infer. longe petiol. lâete virent. gla-
bra, firmiora, lacin. subrotund. subtus luci-
da. Fl. parvi, albo-flavescent.
 3. *peloponense*. L. fol. multiplicato-pinn. foliol. pinnatim incisis.
Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 13. Gmel.
Sib. I. tab. 45.
Cicutaria &c. Moris. umb. tab. 6.
Seseli &c. Cam. epit. 514. Math. 753.
In Peloponesiacis, Sibiricæ, Carniolicis &c. mon-
tibus nemorosis ♂.
 Fol. circumscript. ampliss. infer. 3-pinn. cauli-
num superius 2-pinn. summa opposita, terna,
quina, firma: pinnæ longe lanceol. crassæ,
striatæ, fistulosæ. Umbel. terminal. ampla,
densa, convexa: cæteræ min. Pedunc. paten-
tiss. Involuc. utraq. reflexa; universale ex 5-6
foliol. partiale ex 2-3. Petal. alba. Fruct. ob-
longus, non rostratus, profunde sulcatus, seu
striatus, glaber.
 4. *austriacum*. L. fol. bipinn. foliol. confluentibus, incisis,
integerim. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr.
2. tab. 151. All. Fl. Ped. tab. 43.
Seseli I &c. Clus. hist. 2. p. 193.
In Italiæ, Austriae &c. alpinis.
Nimis ad fine priori. Caul. 2-3-ped. fistulos. su-
perne ramosus. Fol. radical. ampliss. supra ob-
scura, subtus pallidiora. Involuc. polyphyll.

ora alba, membranac. involucc. foliol. sub
6. Umbel. magna, radiis sub 40. Fl. magni,
albi, odori.

5. *cornubicense*. L. fol. (caulinis) decomposit. incisis: radical.
ternatis, lanceol. integerr. *Syst. veg. ed. 14.*

Smyrnium &c. Raii angl. 3. tab. 8.

Saxifraga &c. Pet. herb. tab. 26. f. 9.

In Cornubia.

Caul. sesquiped. striatus, fistulos. pallidus. Fol.
læte virid. fusco varieg. Petal. alba.

6. *peregrinum*. L. umbellæ primariæ involucr. subnullo; latera-
lium basi membranaceo; radiis subramosis. *Syst.
veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 18.*

In Lusitania ♂.

*Simile Petroselino, etiam odore, & sapore, sed
omnia crassiora, & rigidiora.* Caul. 2-ped. an-
gulat. rigidus, lævis. Fol. supradecomp. sum-
ma ternata: foliol. 3-part. lacin. cuneatis, inci-
sis, glabris *Petroselini*, sed ma. Petioli la-
teribus membrana alba. Involuc. umbellis tri-
plo brevius. Involucc. linear. longitudine um-
bellul. Petal. flavescent.

7. *baleanicum*. L. fol. pinnat. folioli. intimis auctis foliolo. *Syst.
veg. ed. 14.*

In Balearibus; Romæ ♂.

Caul. ratione umbell. parvus, ped. unica umbel-
la, teres, substriat. Fol. radical. spitham. Folio-
liol. 5-7. sessil. subcord. obtusa, serrata,
glabra, subitus nitida; impari latiore, vix
lobato (Fol. *Sisari.*) Fol. caulina 2-3. parva,
petiol. 3-part. laciniat. linear. Umbel. magna,
rigidula: umbellul. sub 13. Involuc. poly-
phyll. lineare, subulat. reflexum. Involucc.
similia. Petal. lutea. Sem. oblon. subcylind.
striata.

pyrenæum. L. fol. 4-duplicat-pinn: foliol. aristat. integris,
multifidisive. *Gouan. Illus. tab. 10. f. 2.*

In Pyrenæis, & alpibus Valdensium ♀.

Caul. 2-cubit. paniculat. statim a radice ramo-
sus, ramis retroflexis, unde habitus plantæ
veluti sphæricus, rigidus, sulcato-angulat. Fol.
circumscript. 3-angul. 2-ped. Pinnæ utrinq. 9
totidemq. pinnul. Petiol. compressi. Vaginæ
amplæ. Caulina fol. minus composita. Rami

summi confluunt. Umbell. densæ. Involuc. sæpe o. Involucc. integra, aut dimidiata. Petal. alba. Fruct. Conii maculati, costis 3. in dorso membranac.

(Retzii.) L. peloponense. Retz. Obs. fasc. 2. L. S. N. ed. 13. p. 233.

Habitat . . .

Caul. 3-ped. flexuos. teres, leviter striatus, glaber. Fol. radical. 2-3. tripinn. Petiol. fistulosus, teres, 3-fid. petiol. partial. 2 pinn. pinnis 3-4-iugis, intimo pari petiolat. reliquis sessil. Pinn. oblong-lanceol. acum. ad nervum usque incisæ, cæterumq. profunde dentatæ. Fol. caulin. 1-2. Pedunc. terminalis; ad huius vero basin 4. aiii verticillatim positi. Infra hos demum alii bini, remoti, alterni cum fol. 2-pinnato. Umbel. hemisphær. Involuc. 2-3-phyll. incisum. Sed illud umbel. terminalis 6-8-phyll. lineare. Umbellul. 24-30-peduncul. subglobosæ. Involucc. sub 3-fl. linear. vel linear. lanceol. Petal. lanceol. involuta, integerr. carinata, candida. Fruct. 3-gonus, lucidus. Odor debilis *Cherophyl. syl.* sed seminum odor, & sapor *Angelicae Archangelicæ.* Cum *Ligustico Gmelin.* Sib. 1. tab. 45. quod ad L. peloponense Lin. fuit relatum, nil certe comm. habet.

423. ANGE- Fruct. subrotun. angulatus, solidus, alis 2 mar-
LICA. ginalibus. Cor. æqual. petalis incurvis.

1. Archange- A. folior. impari lobato. Syst. veg. ed. 14. Fl.
lica. Dan. tab. 206. Black. tab. 496.

Smyrnium Cordi, Lob. ic. 699.

Angelica domestica. Matth.

In alpibus Lapponiae, Austriae &c. ad rivulos ♂. Altitudo etiam humana. Succus lacteus, per siccitatem flavescens. Fol. magna, 2-pinn. Foliol. opposita, sessil. subtus dilutiora, in parima. Umbel. ampla, copiosa, radiis angulatis. Vagin. maximæ, ventricosæ. Involuc. sæpe 1-fol. Umbellul. globosæ. Involucc. polyphyll. linear. reflexa. Petal. subvirid. ovata, acuta, caduca. Stam. alba.

2. sylvestris. A. foliol. æqualibus, ovat-lanceol. serratis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 152. Sabb. hort. 4. tab. 85. Ludw. ed. tab. 178. 179. Riv. tab. 17.

Angelica salvatica. *Matth.*

In Europæ frigidioris subhumidis, sylvaticis 24.

Ad Selini genus spectat.

Fol. non lobata, sordide virentia, glabra. Petal. rubella. Sem. margine subrubro.

3. *verticillaris*. A. sol. divaricatiss. foliol. ovat. ferratis: caul. pedunculis verticillato. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 130. Pluk. alm. tab. 134. f. 1?*

In Italia, secus torrentes ♂.

Odor A. *sylvestris*. Altitudo humana, & ultra. Caul. rore glaucescen. Rami floriferi verticill. 4-5. idque bis, vel ter, aliis peduncul. supra alios in apice caul. Fol. decomposita; petiol. farctis, ramification. divaricatiss. basi nodosis. Fol. radical. ampliss. 2-ped. & ultra, supra sature virent. nitida. Foliol. glabra, 2-3-lobata, extimo non decurrente. Petal. parva, inflexa, integra, cum flavedine virescent. Sem. cordato-orbicul. obtusa, valde compressa, lævia.

4. *atropurpurea*. A. fol. extimo pari coadunato: foliol. terminali petiol. *Syst. veg. ed. 14. Corn. canad. tab. 199.*

In Canada.

Caul. orgyal. crassitie vix brachii, fistulos. articulat. lævis, atropurpur. rore glauco. Petiol. vaginant. striati. Foliol. oblon. sublobata, serraturis apice albis, venosa, nuda, subtus pallida, pleraq. sessil. Umbel. terminal. 3. vaginis 2. purpur. apice foliosis. Involuc. o. Involucc. foliol. 12. subulatis, longitud. umbellæ. Umbellul. hemisphær. Petal. incurva, stamin. breviora, extus ferrugin. intus purpurasc. Sem. convexa, tricarinata.

Vehemens est venenum.

5. *lucida*. A. foliol. æqual. ovat. inciso-serrat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 24. Corn. Canad. tab. 197. Morif. hist. 3. s. 9. tab. 3. f. 8.*

In Canada ♂.

Radix sapore Apii. Caul. 1-2-ped. fistulos. nitidus. Vaginæ amplæ, virent. Fol. radical. 3-pinn. cætera 2-pinn. supra lucida, atrovirent. subtus nitida, extimo cum proximo pari confluente. Umbel. densæ, convexæ. Petal. sordide pallent.

Razulii.

A. fol. 2-pinn. foliol. lanceol. serratis, decurrent. *Gouan. Illus. tab. 6.*

Panax alpina &c. Bocc. tab. 99.

In Pedemontii pratis 4.

Habitus A. Archangel. Caul. 3-ped. angulato-striatus, lævis, ramis 3-4. Fol. primordial. semipalm. facie *Sambuci*, ambitu triangul. ternata, pinnul. 2. inferior. opposit. quinatis: summo foliol. lanceol. serratis, subtus pubescent. Radical. & caulina infer. etiam ambitu triangul. fere pedal. pinnul. sæpius 5. In infermis pinnul. foliol. ex quolibet latere 4 cum impari. In secundis pinnulis 2-3. In terminal. pinnul. foliol. uniform. sessil. lanceol. serrata, cristata. Hæc foliol. per paria ad nervum coailita decurrent per petioli longitudinem usq. ad infer. Fol. supra virid. subtus cinerea, pubesc. Umbel. ampliss. hemisphær. radiis pubescentibus, cinereis. Involucr. foliolo setaceo. Involucc. foliol. 4-5. Cor. primum purpurasc. dein alba. Fruct. ovat-oblong.

424. SIUM. Involuc. polyphyll. Fl. æquales, fertiles. Petal. cordata. Fruct. oblongo-ovatus. Sem. ovata, leviter striata, intus plana, calyc. minimo coronata.

1. latifolium. S. fol. pinnat. umbella terminali. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. I. tab. 66. Fl. Dan. tab. 246. Sabb. hort. 4. tab. 75. Riv. tab. 78. fig. optima.*

S. medium. *Bauh. hist. 3. pag. 173.*

In Europæ rivulis, & ad ripas paludosas 4.

Planta glaberrima. Altitudo sæpe humana. Foliol. lanceol. elliptica, utrimq. 3-4. cum impari, argute serrata, lète virentia, glabra; aliquando varia. Fol. sub aqua quandoq. capillaria. Umbel. ampla. Involuc. 5-8-phyll. margine membranac. albido; involucc. paucifol. Fl. maiusc. albi.

2. angustifoli- S. fol. pinnat. umbell. axillar. pedunculat. involucro pinnatifid. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. I. tab. 67.*

S. nodiflorum. *Fl. Dan. tab. 247. fig. optima.*

S. minus. *Riv. pent. tab. 79. fig. optima.*

S. verum. *Math. Dalech. hist. 1012.*

In Europæ austral. aquosis; nec extra aquas ascendit 4.

Planta

Planta glaberr. trita odora. Caul. 2-3-raro 4--ped. potius diffusi, ramosi, fistulosi, s^ep^e purpur. Fol. vaginant. minora. Foliol. sessil. lanceol-oblong. aut subovata, acuta, quandoque laciniata, aut profunde ferrata, numero, & forma varia. Fol. prima caulinis simil. sed auriculæ nullæ. Umbell. convexa: umbellul. hemisphær. Involuc. lanceol. Sem. odorata, acria.

3. *nodiflorum*. S. fol. pinnat. umbell. axillar. subsessil. Syst. veg. ed. 14. Morif. hist. 3. f. 9. tab. 5. f. 3.

In Europa ad ripas fluviorum.

Caul. ramosi, diffusi. Fol. aliqua pinnata, pinnis simplic. vel auriculat. caulinæ appendicul. pallide virent. dentata, glabra. Fol. impar non 3-fid. Involuc. magna, latifol. 3-dent. universale s^ep^e deest. Fl. parvuli, albi.

4. *Sisarum*. S. fol. pinnat. floralib. ternat. Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 76. Morif. hist. 3. f. 9. tab. 4. f. 8.

In China? 4.

Radice e Napiform. pl. ab uno cespite pendentes, crassitie digit. cortice albido, pulpa candida, sapore dulci, aromat. Caul. 2--ped. ramosi. Fol. minutim ferrata. Petal. alba. Sem. fusca.

5. *Ninfi*. S. fol. pinnat. serratis; rameis ternatis. Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 29. f. 1. Black. tab. 514. Kœmpf. amœn. tab. 818.

In China 4.

Rad. fasciculata. Caul. sesquiped. Vaginæ amplexicaul. Fol. primum solitar. rotunda, cordata, dentat. uncial. dein *Sisari* fol. simil. pinuis sesquiunc. ovat-acut. dense serratis. Petal. alba. Sem. obscure rubescent.

Est S. Sisarum in hortis japonicis fraude chinen-sium cultum.

6. *rigidius*. S. fol. pinnat. foliol. lanceol. subintegerr. Syst. veg. ed. 14.

Enanthe &c. Morif. hist. 3. f. 9. tab. 7. f. 1.

In Virginia 4.

Rad. fasciculat. Caul. 2-3-ped. inferne ramosus, rigidulus. Fol. ampla, 5-6-iuga cum impari, rigidula, ad apicem dentata. Petioli canalicul. Umbell. amplæ, planæ. Fl. parvi, albi.

7. *japonicum*. S. fol. pinnat. foliol. incisis: umbell. terminalibus. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.

In Japonia.

Caul. erectus, flexuosus, superne ramosus. Fol. glabra; infima maxima: pinnæ difform. oblong, ovatæ, integræ, incisæ, patentes: superior. minuta; foliol. lanceol. Umbell. compositæ.

8. Falcaria. S. foliol. linearib. decurrentibus, connatis. *Syst. veg. ed. 14.* *Jacq. Austr. tab. 257.* *Riv. pent. tab. 47.*

Anni &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 8. f. 1.

In Europa 24.

Caul. 1-2-ped. diffusus. Fol. dura, glauca, simplic. ternata, aut difformiter pinnatifid. lacin. longis, angustis, dentatis, & pallide viridib. Umbell. plana, non densa. Petal. alba.

9. græcum. S. foi. omnibus 2-pinnat. *Syst. veg. ed. 14.*

In Græcia.

Caul. rectus Fol. radical. semi-vel pedal. Pinnul. lanceol. seriatæ. Petal. lutea.

10. siculum. S. fol. radicalibus ternatis; caulin. 2-pinnat. *Syst. veg. ed. 14.* *Jacq. hort. 2. tab. 133.*

Daucus &c. Mont. in Zann. tab. 128.

In Sicilia.

Planta niida. Caul. cubital. Fol. crassa, supra læte virent. subtus albescens. Petal. crocea. Fol. variant, etiam radical.

11. repens. S. caul. repente; foliol. subrotund. dentato-an-gulat. *Syst. veg. ed. 14.* *Lin. Suppl. Jacq. Austr. 3. tab. 260.*

In præsis uidis.

Non est Sison inundatum. Caulic. herbac. nitidi, undiq. diffusi. Fol. impari-pinn. foliol. opposit. sessil. ovat-subrotund. terminal. 3-lobo. Umbel. oppositifol. Umbellul. hemisphær. densæ. Pe-tal. lanceol. alba.

12. decumbens. S. caul. decumben. fol. 2-pinnat. *Syst. veg. ed. 14.* *Thumb. Jap.*

In Japonia.

Caul. pusillus. Fol. radicalia, longe petiol. gla-bra: foliol. 3-fida. Umbell. terminal. sub simpl. Sem. ovata, obtusa, stylis persistentibus, stria-ta, glabra.

425. SISON. Involucra paucifol. sub 4-phyll. Petal. cordata æqualia. Fruct. ovat-oblongus, parvus. Sem. subtiliter striata.

Carum, Bunium, & Sison ad finia sunt genera ut ægre distingui possint.

1. *Anomum*. S. fol. pinnat. umbel. erectis (pedunculat.) Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 17. Black. tab. 442.
Petroselinum &c. Dod. pempt. 697.
In Anglia humectis lutoſis; in Carniola, & Pedemontio, ad ſepes ♂.
Caul. erect. 2-ped. filiform. striatus, glaber.
Fol. petiol. late virid. tenera, glabra, 4-iuga.
Foliol. ovata, obtusa, incisa, serrata: ſumma tenuius divifa; terminale 3-fidum.
2. *ſegetum*. S. fol. pinnat. umbell. cernuis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 134. Morif. hift. 3. f. 9. tab. 5. f. 6.
In Anglia, Helvetia &c. ♂.
Caul. pl. 3-ped. Fol. appendicul. Pinnæ ovatæ, argute, & cum breviff. aristis ferratae. Umbel. pauciflora. Petal. late ovat. alba, vel purpur.
Ad Sefeleos genus ſpectat.
3. *canadense*. S. fol. ternatis. Syst. veg. ed. 14.
Myrrhis &c. Morif. hift. 3. f. 9. tab. 11. f. 4.
Riv. pent. tab. 53. Pluk. phyt. tab. 383. f. 2.
In Amer. Septentrion. 24.
Rad. fascicul. fibrillosa. Caul. erect. 2-ped. & ultra, parum ramosus, teres, glaber. Fol. petiol. subtus pallidiora, glabra. Foliol. argute ferrata, intermedium subpetiol. cætera ſeffil. radicalia folio medio 3-fid. lateralibus 2-fid. Umbell. 4-fid. inæqual. involuc. nullo. Umbellul. sub 7-fl. involucc. minimis. Petal. alba, æqualia. Sem. glabra.
4. *Ammi*. S. fol. 3-pinn. radicalibus linear. caulin. ſetaceis: stipularibus longioribus. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 200.
Fœniculum &c. Shaw. Afr. tab. 232.
Amini &c. Lob. ic. 724.
In Lufitania, Apulia, Ægypto ⊖.
Planta tota glabra, & trita aromatica, Caul. ped. subdichot. nitidus. Vagin. margine membranac. Foliol. ſeffil. replicato-imbricata. Umbel. inæqual. planiuscul. & raræ. Involuc. nulla. Petal. albida. Fruct. parvus, compresso-subrotund. Sem. hinc plana, inde gibba, s. striata, e rufo-spadicea, odore sem. Apii,
5. *inundatum*. S. repens; umbell. 2-fid. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 89.

PENTANDRIA DIGYNIA.

Sium &c. Morif. hist. 3. f. 9. tab. 9. f. 5. Pluk. phyt. 61. f. 3.

In Europæ inundatis ♂.

Planta parva. Fol. immersa capillac. fusca: super. 1--2--iuga, medio ma: semitrilobo: caulinum: sessile 3--lobat. Umbell. minimæ, 8-fl. Petal. alba. Sem. fusca.

6. *verticillatum.* S. foliol. verticillat. capillaribus. Syst. veg. ed. 14.

Daucus pratensis Dalech. hist. 718.

In Gallia, Pyrenæis ♀.

Rad. fasciculata. Caul. cubital. ramosus, paucifol.. Involuc. utraq. Petal. primum rubra, dein alba ..

7. *salsum.* S. fol. radical. compositis, foliol. subverticillato-
fascicul. lanceol. caul. aphylllo: ramis umbel-
liferis, dichotom. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In salsis limosis circa Wolgam.

Fol. radicalia, brevia. Pinnæ oppositæ, oblong.
par primum decompositum; reliqua vero non.

Fol. margine membranac. alba. Umbell. par-
væ, erectæ. Involuc. parva, subulata.

426. BUBON. Frukt. ovatus, striatus, villosus.

1. *macedonii.* B. foliol. rhombeo-ovat. crenat. umbell. nume-
ratosiss. Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 60.
Black. tab. 382.

Petroselinum &c. Lob. ic. 708.

In Macedonia, Mouritania ♂.

Caul. villosus, apice albicans. Fol. incana: infer.
2-pinn. super. pinnata. Umbel. ex 10-radiis.
Petal. alba.

2. *Galbanum.* B. foliol. rhombeis, dentat. striatis, glabris: um-
belli. paucis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3.
tab. 36.

Ferula &c. Herm. par. tab. 163.

Anisum &c. Pluk. alm. tab. 12. f. 2.

In Æthiopia ♂.

Caul. frutesc. 5-ped. & ultra, rore glauco ad-
spersus, nodosus, inferne aphyllus, ramis
subpurpur. Fol. alterna, petiolat. pinnato-tri-
ternata, vaginant. Foliol. sub 3-loba, argute-
serrata, inferne integerr. rigidula. Umbell.
magnæ, dense. Involuc. polyphylla. Petal.
cum virore flavescent. Odor aromaticus.

3. *gummiferum.* B. foliol. glabris; inferior. rhombeis, serratis; su-
perior. pinnatifid. 3-dent. Syst. veg. ed. 14.

Ferula &c. Comm. hort. 2. tab. 58.

In Æthiopia ♂.

- Caul. 6-7-ped. frutescens subramosus. Umbell.
expansæ. Fl. parvi, lutei.
- 4. rigidius.* B. foliol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Ferula &c. Bocc. mus. 2. tab. 76. Barr. rar. tab. 77.
In Sicilia 24.
- 427. CUMI-* Fruct. ovatus, striatus. Umbellul. 4. Involuc.
NUM. 4-fid.
- 1. Cyminum.* C. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. s. 9. tab. 2.*
Riv. pent.
C. *sativum. Cam. epit. 518. fig. optima.*
In Ægypto, Æthiopia ⊖.
- Caul. ped. a basi ramosus, flexuosus, divaricato-
panicul. Fol. pauca, capillacea, linear. rara,
2-fid. impari foliol. 3-fid. Umbel. inæqual.
paucifl. radiis 4-6. patentibus: rotundæ. Petal.
alba, seu purpurasc. Sem. ex cinereo-subflava.
- 428. QNAN-* Fl. radiati, disco sterili. Petal. inæqualia. Fruct.
THE. ovatus, cal. insigni, 5-dent. coronatus. Sem.
ovatum, non acuminat. striatum, intus planæ.
- 1. fistulosa.* Φ. stolonifera: fol. caulinis pinnat. filiform. fi-
stulosis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 846.*
Φ. aquatica &c. *Moris. hist. 3. s. 9. tab. 7. f. 8.*
Riv. pent. tab. 66. Camer. epit. 611. fig. exterior.
In Europæ paludibus 24.
- Rad. quandoq. bulbifera. Caul. 1--sesquiped, de-
bilis, brachiat. subnudus, fistulosus. Fol. glau-
ca, glaberr. infer. 2-pinn. folioi. ovatis, pro-
funde incisis. Umbellæ disiunctæ. Involuc. o-
1-fol. Involucc. dimidiata. Petal. alba, extus
subrubella.
- Var. fol. latis, obtusis.*
Diversa adparet in æstate.
- 2. crocata.* Φ. fol. omnibus multifid. obtusis, subæqual. *Syst.*
veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 55. Black. tab.
575.
- Φ. cicutæ facie &c. Act. Angl. 1747. tab. 3.*
In Europæ paludibus 24.
- Caul. 2-ped. ramosiss. striatus, rufus. Fol. pal-
lide virent. succo flavo, venenato scatentia;
alia pinnata, alia sèpius 2-pinn. Foliol. cu-
neata, incisa, lineata, lèvia. Pedunc. angu-
lati, striati. Involuc. nullum. Petal. alba, in-
flexa, tamen acuta. Anth. fuscæ.
- 3. prolifera.* Φ. umbellarum peduncul. marginalibus longiori-
bus, ramosis, mascul. *Syst. veg. ed. 14. Jacq.*

hort. 3. tab. 62. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 7.
f. 5.

In Sicilia, Apulia 24.

Rad. ex pl. tuberibus conflata. Caul. erect. sesquiped. subramos. angulato striat. Fol. subtriplicato-pinn. vaginant. foliol. (circumscript. subovata, aut magis subrotunda) obtusis, incisis. Umbell. radii laterales 3-4. divaricati, horizontal. Disci floscul. subfessil. conferti in hemisphærium. Involuc. subnullum. Umbellul. in principio densiss. parvæ, convexæ.

4. *globulosa*. ♂. fructibus globosis. Syst. veg. ed. 14. Gouan. Illus. tab. 9.

In Lusitania, & herbidis subhumidis agri Nicæensis 24.

Facies sequentis, sed caulis minus ramosus, & fol. lanceol. circumscript. non triangul.

Rad. tuberosa pendula. Caul. pedal. & ultra, basi angulatus, & sæpe purpurasc. Fol. radical. priora ternata quinata; foliol. aliis lanceol. aliis cuneiform. integris-2-3-lobis, venosis, glabris. Fol. subsequā 2-pinn. foliol. opposit. lanceolat. 2-3-fid. acuminat. summa pinnata, foliol. angustioribus. Sem. Coriandro ma.

5. *pimpinello-* ♂. foliol. radical. cuneatis, fissis: caulinis linear. integris, longissim. simplicibus. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 394. Sabb. Hort. 4. tab. 83.

♂. aquatica &c. Pluk. alm. tab. 49. f. 4. mala. Enante II. Matth.

In Europa australi 24.

Caul. sub pedal. angulatus. Fol. radical. omnino Petroselini, sed crassiora, lata, ex virore penne lucida. Umbell. inæqual. Involuc. subulato-setac. Cor. albæ, parum radiatæ. Fol. valde variant.

peucedanifolia. ♂. fol. omnibus linear. radicalibus 2-pinn. caulinis pinnat: involuc. nullo: radicum napulis ovatis, fessil. Pollich. pal. f. 3.

An ♂. fol. radicalibus duplicato-pinn. linear. recurvis? Hall. helv. n. 756.

Rad. ex pl. albis glomerulis, cylindrico-ovat. constans. Caul. cubital. erectus, sulcatus, basi

rubellus, geniculat. dichotomus. Fol. alterna, vaginantia, triangular. late viridia, glabra. Umbell. radiatæ. Petal. alba.

Karsthia. *Œ. Hacquet. pl. alp. Carn. tab. 3.*

In Carniola 4.

Sapor *Œ. pimpinelloidis*, cui similis. Rad. subcarnosa, extus fusca, intus albida, tortuosa. Caul. sicuti tota planta, glaberr. solitar. 2-ped. rotundat. substriatus. Fol. radical. 2-pinn. costa ad basin vaginante, semiamplexicaul. subtritata, circumscript. oblonga, vel elliptica; pinnae sessil. lanceolat. subovat. acutiuscul. ferrato-incisis: caulinæ pinnata: summa ternata; pin-nul. integris, linear. aut lanceol-acut. Umbell. convexæ, ex 10-12. radiis: involucr. paucifol. Umbellul. parvæ, subrotun. densæ; radiis exterioribus paulo longioribus: involucc. setacea. Petal. alba. Fruct. subrotun. striati.

429. PHEL- Involucr. universale nullum. Petal. cordiformia. LANDRIUM. Floscul. disci minores. Fructus ovat. lœvis, obiter 5-striat. coronatus perianth. & pistillo. *I. aquaticum.* P. folior. ramificationibus divaricat. Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 72. Black. tab. 570. Riv. pent. tab. 64.

Cicutaria &c. Lob. ic. 735.

In Europæ fossis ♂.

Caul. 3-ped. crassissim. dichotom. fistulosus, glaucus. Fol. ampla, alterna, amplexicaul. triplicat-pinn. super. 2-pinn. cinereo-virescent. glabra; foliol. pinnatifid. Fl. parvi, albi.

2. Mutellina. P. caul. subnudo: fol. pinnat. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 56. All. Fl. Ped. tab. 60. f. 2. Bauh. hist. 3. pag. 66.

In Helvetia, Italia &c. 4.

Ad Ligustici genus spectat.

Caul. pedal. pene nudus, glaucus, genicul. crassis. Fol. Chærophylli, longa magis quam lata, multifid. duriuscula, sature virent. glabra. Involuc. varium. Petal. parva, subrubent. inflexa. Fructus maturus alam foliaceam deponit.

430. CICUTA. Fructus subovat. sulcatus.

1. virosa. C. umbellis oppositifol. petiol. marginatis, obtusis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 208. Gunn. Fl. norv. tab. 2. Blackv. tab. 574. a. b. c.

Cicutaria. Riv. pent. tab. 75.

Sium aquaticum. Moris. umb. tab. 5.

In paludibus Europæ sterilibus 24.

Rad. grandis. Caul. teres, fistulosus. Fol. ampla, alterna, amplexicaul. circumscript. elliptica, duplicito-pinn. obscure virent. glabra. Foliol. ad 7. paria, lanceol. acute serrat. simplic-2--3--5--fid. Umbell. patens, basi rubra. Involucc. polyphyl. setacea, brevia. Petal. alba. Fruct. compressus, truncatus.

2. *bulbifera*. C. ramis bulbiferis. Syst. veg. ed. 14.

In Virginia, Canada.

Caul. angulatus. Fol. lacin. capillaceæ. Petal. alba.

3. *maculata*. C. folior. ferraturis mucronat. petiol. membranac. apice 2-lobis. Syst. veg. ed. 14.

Angelica &c. Pluk. alm. tab. 76. f. 1.

In Virginie aquosis.

Caul. altus, fusco--purpurasc. sicuti & petiol., inferne maculatus. Foliol. lanceol-acumin. Umbell. planæ. Petal. alba. Sem. odore, & sapore Cumini.

431. *AETHU-* Involuc. o. Involucc. dimidiata, 3-phyll. pendula. SA. Fruct. subrotund. Sem. ovatum, intus planum, maxime gibbum, 5-costatum.

1. *Cynapium*. A. fol. conformibus. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 517. Riv. pent. tab. 75.

Cicutaria &c. Bauh. hist. 3. p. 179. Lob. ic. 280.

Inter Europæ olera, & sepes hortorum ⊖.

Tota planta Allium olet. Caul. 1-4-ped. ramosi, striati, glauci, ad basin sæpe purpur. Fol. 2-pinn. nitida, tenera, supra atro-virent. subtus pallidiora; pinnis pinnatifid. pinnulis ovat. acutis: ad Petroselinum accendentia. Umbel. patens, radiis interioribus gradatim brevioribus. Fl. numerosi, albi. Sem. subrotun. pallide fusca. Involucr. o.

2. *Bunius*. A. fol. radical. ternatis, quinatisque: caulinis 2-pinn. linear. summis setaceis: umbell. 7-fidis.

A. fol. radicalibus pinnat. caulinis multi--partito--setac. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 198.

Saxifraga &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 2. f. 16.

Bunius. Dalech. hist. 774. Bauh. hist. 3. p. 29.

In Pyrenæis, & Pedemontio ⊖.

Planta glabra, odore ingrato. Caul. 2-ped. diffusus, ramosus, purpur. Prima fol. simplic.

cordato-subrotund. semitriloba, ferrata: caulinis (*Carvi*). Petioli vaginantur, margine involuti. Involucra lateris exterioris saepius terna, setacea, flosculis longiora. Umbellul. 7-fl. Fl. aequal. albi. Sem. oblongiusc. sulcata, costis 3. dorsalibus membranaceo-compressis.

Ad Carum spectat.

3. *Meum.*

Æ. fol. omnibus multiplicato-setaceis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 303. Sabb. hort. 4. tab. 82.

Meum. Riv. tab. 62. Dod. purg. tab. 62. Black. tab. 525. Ludw. ed. tab. 66.

In alpibus Europæ 24.

Ad Ligustici genus spectat.

Rad. fetis coronata. Caul. ped. uno, vel altero fol. donatus. Fol. alterna, amplexicaul. pinnat. Foliol. brevia, in fasciculos circa nervum collecta, odore medicato. Umbel. convexa. Involuc. o-raro 1-phyll. Involucc. lateral. ut in toto genere. Petal. ex albo-virid.

432. CORI- ANDRUM. Cor. radiata. Involucr. 1-phyll. Involucc. dimidiata. Petal. inflexo-emargin. Fruct. sphaericus, aut didymus.

1. *sativum.* C. fructibus globosis. Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 92. Black. tab. 176. Ludw. ed. tab. 37.

In Italiam agris ○.

Caul. 1-2-ped. Fol. obscure virent. infer. duplicito-pinn. pinnul. latis: superior. tenuiter incisa. Involucc. 3-phyll. Petal. maiuscul. ex albo-purpurasc.

2. *testicula- tum.* C. fructibus didymis. Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 169. f. 2.

C. minus, odorum. Bauh. hist. 3. pag. 91.

In Europæ austral. agris ○.

Odor priore virosior. Caul. angulatus. Pinnul. fol. angustiores, magisq. divaricatae, quam in priore. Umbell. saepius simpl. Involucc. nulla. Petal. non radiata. Anth. purpurasc. Germina inferne didyma. Sem. ma: priore.

433. SCAN- DIX. Cor. radiata. Petal. emarginata. Floscul. disci saepius masculi. Fruct. subulatus.

1. *odorata.* S. semin. fulcatis, angulatis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. app. tab. 37. Black. tab. 243. Riv. tab. 56. Dod. pent. 701.

In alpibus 24.

- Caul. 4-5-ped. ramosus, villosus. Fol. circumscript. triangular. ampla, triplicato--pinn. villosa, mollia, albida, odore *Anisi*. Involuc. caducum. Petal. albida, exter. maiora. Sem. nigricant. nitida.
2. peden. S. semin. rostro longiss. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 263. Fl. Dan. tab. 844.*
Scandix Riv pent. tab. 37. Bauh. hist. 3. p. 71. Inter Europæ austral. segetes ♂.
- Caul. pedal. Fol. multiplicato--pinn. firmiora, subhirsuta, sordide virent. Involucc. apice incisa. Fl. pauci, albi. Sem. *Geranii*, longiss.
3. Cerefolium. S. semin. ovat-subulat. nitidis: umbell. ad nodos sessil. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 390. Sabb. hort. 4. tab. 88.*
Chætophyllum &c. Black. tab. 236. Knorr. del. hort. 2. tab. C. 8. Riv. tab. 42.
In agris, & arvis Europ. austral.
Sapor aromaticus. Caul. sesquiped. Geniculi distantes, turgescens. Fol. 3-pinn. molliss. subvillosa. Umbell. rariores. Involuc. o. Involucc. 2. foliol. rubris. Fl. pauci, albi.
4. Anthriscus. S. semin. ovatis, hispidis: cor. uniformibus: caul. laevi. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 154. Fl. Dan. tab. 863.*
Caucalis folio &c. Riv. tab. 34.
Myrrhis &c. Colum. ceph. I. tab. 112.
In Europæ aggeribus ♂.
Odor fætidus. Caul. 1-3-ped. ramosus: vaginæ magnæ. Fol. triplicato-pinn. mollia, tenera, hirsutula, late virent. nitida. Umbel. parvæ, & raræ. Fl. multi, albi. Sem. e fusco nigricant.
5. australis. S. semin. subulat. hispidis: fl. radiatis: caulis laevis. *Syst. veg. ed. 14.*
Anisomarathrum. Col. ceph. I. tab. 90.
In Gallia narbonensi, Italia, Creta ♂.
An var. Sc. peccinis? Caul. vix semiped. Foliol. capillaria. Umbell. saepius terminal. duæ.
6. nodosa. S. semin. subcylindricis, hispidis: caul. hispido: genicul. tumidis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 25.*
Ceresolium &c. Morif. hist. 3. f. 9. tab. 10. f. 4.
In Sicilia &c. ♂.
Caul. sesquiped. scaber, aculeis mollibus reflexis; articulis superne incrassat. Fol. patula, scabra,

vaginant. subtriplicato-pinn. foliol. inciso-serrat.
et am pinnatifid. lobis obtusis. Involuc. o. In-
volucc. parva, 2-3-phyll. subulata. Petal. alba.
Fruct. hispida, pilis adscendentibus.

7. *trichosperma*. S. semin. hirsutissim. pilis sem. duplo-longioribus.
Syst. veg. ed. 14.

In Ægypto ☽.

Caul. pl. obliqui, semiped. ramosi, flexuosi, fere
glabri. Fol. 2-pinn. glabra, subtus pallidiora:
foliol. ovat-lanceol. inciso-serrata, margine
scabra, petiol. subpilosus. Pedunc. oppositifol.
Umbel. radiis 3-4. inæqual. Umbellul. rad. 10-
12. subæqualibus. Involucc. foliol. 7. subulat.
longitudine umbellul. Fl. uniform. carnei.

8. *infesta*. S. sem. exter. hispido: umbell. confertiss. hemi-
sphæricis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. I.*
tab. 46.?

Habitat . . .

Caul. erect. subped. scaber. Fol. S. *Cerefolii*. Um-
bell. 5-fida. Involucc. 7--phyll. subulata, non
reflexa. Fl. subradiati, albi. Sem. 2. interius
non hispidum, sed tantum scabrum.

9. *grandiflora*. S. semin. peduncul. villoso brevioribus. *Syst. veg.*
ed. 14.

In Oriente.

Cor. maxima.

S. semin. ovat-subulat. nitidis: fol. decompositis.
Syst. veg. ed. 14.

Cerefolium &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. II. f. ult.

In Virginia.

Caul. procumb. pedal. Fol. *Fumaria*. Umbell.
raræ, plerumq. ex 3. radiis. Petal. alba. Sem.
nigricantia.

434. CHÆ- Involucc. reflexa, conicava. Petal. inflexo-cordat.
ROPHYLLUM. Fruct. oblong. lævis.

1. *sylvestre*. C. caul. lævi, striato; genicul. tumidiuscul. *Syst.*
veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 149.

Cerefolium sylv. Riv. tab. 43.

Cicutaria &c. Bush. hist. 3. p. I I.

In Europæ pratis montanis 24.

Caul. 3-ped. subsulcat. Fol. magna, multiplicato-
pinn. nitentia, flaccida, pallide virent. Vagi-
narum oræ albæ, & denso villo pubescent.
Umbell. planæ, non dense. Petal. alba. Sem.
nigra, nitida, non striata.

2. *bulbosum*. C. rad. bulbosa : caul. maculato, inferne hispido, superne glabro.
 C. caul. lœvi, geniculis tumido, basi hirto. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. I. tab. 63.*
Cicutaria bulbosa. *Bauh. hist. 3. p. 183.*
Myrrhis &c. *Pluk. alm. tab. 206. f. 2.*
In Germania, Helvetia &c. ⊖.
 Rad. turbinata, seu obovata. Caul. seped. rufomaculatus. Fol. multipicat-pinn. pinnis pinnatifid. supra glabra, petiol. & carina pilis albis, vagie subtus adspersa. Invol. foliol. 5-7. inæqual. subulat. Petal. inæqual. obcordata, alba.
3. *aristatum*. C. caul. lœvi, geniculis tumido: semin. hirtis, 2-aristatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. In Japonia.*
Diffr. a C. bulbosa, fol. hirtis, scabris: semin. villosis, aristatis. Caul. erectus, teres, striatus, glaber. Fol. 2-pinn. villosa, vaginis petiolor. ciliatis. Umbell. terminal. compositæ. Utraq. involuc. subulata, reflexa. Sem. oblong. stylis divaricatis, albo-villosa.
4. *temulum*. C. caul. scabro (maculato) geniculis tumidis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. I. tab. 65.*
Myrrhis &c. *Moris. hist. 3. s. 9. tab. 10. f. 7.*
In Europæ sepibus, viis &c. ♂.
 Caul. 1-3-pedal. Fol. tenera, hirsutula, sordide virent. duplicito-pinnat. Pinnul. subrot-obtusæ, lobato-incisæ. Umbell. cernuæ. Involuc. sæpe nullum. Petal. inæqual. alba.
5. *hirsutum*. C. caul. æqual. foliol. incisis, acutis: fructibus biliaristat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 148.*
Cerefolium &c. *Moris. hist. 3. s. 9. tab. 10. f. 6.*
Cicutaria. *Bauh. hist. 3. pag. 182.*
Myrrhis palustris. *Riv. pent. 50. bene.*
In alpibus Germanicæ, Helvetiæ &c. 24.
Planta pubescens odore fetido, viroso. Rad. prælonga. Caul. sesquiped. teres, fistulosus. Fol. tripli-c-pinn. nudiuscul. subtus scabra, venis ciliatis. Foliol. in singulis folior. ramulis vix ultra 5. Umbel. densa, convexa, ante anthesin nutans. Involucc. 5-phyll. lanceol. acumin. reflexa, viridia, longitudine umbellul. Fl. non radiati. Petal. inflexo-cordata, albo-virent. aut subpurpur. Stam. cor. longiora. Fruct. subcylindrici, leviter striati. *Var. glabritie.*

6. *aromaticum*. C. caul. æquali : foliol. cordat. serratis, integris : fructibus biaristat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 150.*
Cerefolium &c. Bocc. mus. 2. tab. 19.
In Austria, Lusatia &c. 24.
 Caul. 1-3-ped. una cum petiolis hirtus, inferne punctis atro-purpur. Fol. *Ægopodii Podagrariae*, subbitern. vaginis pilosis. Umbell. plana, non densa. Involuc. o-paucifol. Involucc. foliol. 7--8. lanceol. reflexis. Fl. non radiati. Petal. alba, odora.
7. *coloratum*. C. caul. æquali : fol. supradecomposit. involucc. coloratis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 51.*
Myrrhis &c. Moris. hist. 3. s. 9. tab. 10. f. 6.
Pluk phytol. 100. f. 5. forte.
In Illyria 24.
 Caul. teres, hirsutus, præcipue inferne. Fol. *Selini Thysselini*, adspersa pilis raris; infima hirsuta; media minus; summa nitida. Umbel. C. *sylvestris*. Involucc. ovata, acumin. lutea. Petal. cordata, lutea. Fruct. C. *aurei*, nitidi, sed tenuius striati, a quo differt omnino foliol. pilisq. diversis.
8. *aureum*. C. caul. æquali : foliol. incisis : semin. coloratis, fulcatis, muticis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 64.*
Cerefolium. Rupp. ien. 3. tab. 5.
Myrrhis &c. Lob. ic. 734.
In Germania, Helvetia &c. 24.
 Planta pubesc. Caul. 3-4-ped. angulat. striatus, farctus, maculatus, incanus, aut purpur. inferne hirtus. Fol. odore aromatico, sed debili in senectute, pallida, supra glabra, subtus hirsuta; varia in diversis: radical. multo latiora; foliol. oblon-lanceol. extrema confluent. Umbell. planæ. Involuc. o-1-fol. Involucc. foliol. 5-6. lanceol. acuminat. reflexis. Petal. extima ma: alba, extus subrubra. Fruct. fusiformi-cylindr. Sem. oblon. glabra, 4. linear. extus obsolete angulata, fuscescens. cum angulis pallidioribus in nostris, non certe col. aureo. Var. fol. *hirsutioribus*, & *hirsutiss.*
9. *scabrum*. C. caul. æquali : foliol. incisis, acutis, hirtis : pedunc. scabris. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. Jamna Ninsin. Kœmpf. Am. exot. Fasc. V. p. 822.*
In Japonia.

PENTANDRIA DIGYNIA.

Differt a C. hirsuto = foliol. min. & magis divis., nec vaginis dilatatis: umbell. min.

Rad. fibrosa. Caul. erectus, ped. & ultra, subflexuos. angulat. striatus, inferne glaber, superne hirsutus. Ramuli subfastigiati, alterni, patuli. Fol. 2--pinn. Umbel. terminal. Sem. ovat-oblon.

10. arborescens. *C. fruticosum.* *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia \ddagger .

Caul. frutesc. Fol. Chærophyll. sylv. ampla, supradecompos. pinnis patentiss. lævia, inciso-ferrata. Umbell. tenues, albæ.

435. IMPE-RATORIA. *Fruct. subrotun. compressus, medio gibbus, margin. cinctus. Petal. inflexo-emargin.*

I. Obstruthi- *I. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 279. Riv. pent. um.*

tab. 7. Camer. epit. 532. Garid. aix. ic. 55. Matth. Ad radices alpium Italiæ, Helvetiæ &c. ad rivulos præcipue \mathfrak{U} .

Rad. obliqua. Caul. usque 6-ped. crassus, ramosus, fulcatus, fistulos. Fol. 3-ternata, sordide virent. venosa, glabra: foliol. lata, longe dent. impar 3--lobum. Fol. floral. opposita. Stipul. petiolaris, membranac. ventricosa. Umbell. ampla, plana, laxa. Involuc. o-uno, alterove foliol. tenuiss. Umbellul. inæqual. concavæ. Involucc. brevia, polyphyll. Petal. albida, vel subflavescent.

Ad Selini genus spectat.

436. SESELI. *Umbell. globosæ. Involuc. foliolo uno, alterove: involucc. polyphyll. Petal. cordata, reflexa. Fruct. subrotund. aut ovatus. Sem. ovatum, acuminat. intus planum, gibbum, 5-costatum.*

I. pimpinello- *S. caul. declinato: umbell. nubilibus nutantibus. ides.*

Syst. veg. ed. 14.

In Europa australiore \mathfrak{U} .

Caul. pedal. teres, ante florescentiam decumb. dein suberect. foliol. uno, alterove, petiolo membranac. spathæform. oblong. e quo pedunc. simpl. Fol. radical. pinnata, pinnis multifid. segment. alternis. Involuc. o. Involucc. linear. angusta. Sem. 3. striis elevatis.

2. montanum. *S. petiol. ramiferis membranac. oblong. integris; fol. caulinis angustiss. Syst. veg. ed. 14.*

S. multicaule. Jacq. hort. 2. tab. 129.?

In Italiæ &c. collibus \mathfrak{U} .

Rad. sapore *Dauci*. Fol. *Petroselini* sapore : radical. pinnis pinnat. ab invicem distantibus. Vaginæ petiolar. undique caulem, & ramos ambientes. Umbel. seq. magis confertæ, radiis sub 13. inæqualibus. Fructus pubescens, duplo ma: sequenti.

3. *glaucum*. S. petiol. ramiferis membranac. oblong. integris: foliol. singularibus, binatisq. canalicul. levibus, petiolo longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 144. Ger. prov. 253.*

In Gallia &c. 24.

Planta glauca, & nitida. Caul. 2-4-ped. foliarius, quandoq. purpur. Fol. radical. 2-pinn. superior. pinnat. tandem simplicia. Foliol. longa, linear. uncial. terminalibus ad basin usque 3-fid. Umbella rara, convexa. Involuc. o. Umbellul. densæ, hemisphær. Involucc. foliol. sub 8. Fl. ante explicationem purpurasc. dein albi; anth. purpur.

4. *annuum*. S. petiol. rameis membranac. ventricosis, emarginat. (fol. triplicato-pinnat. linear.) *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 55.*

Fœniculum &c. Vaill. parif. tab. 9. f. 4.

Pimpinella &c. Riv. irr. tab. 82.

In Gallia, Germania &c. ⊙.

Planta adulta rubens. Caul. spitham. & ultra, strictus, striatus. Foliol. profunde 3-fid. Umbell. convexa, & densa. Involuc. o-1-phyll. Involucc. foliol. pl. lanceol. umbellul. longioribus. Petal. albicanti-subviolac.

5. *Ammoides*. S. fol. radicalibus: foliol. imbricatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 52.*

Ammi &c. Mathioli Daleeh. Lugd. 695.

In Italia, Lusitania ⊙.

Differt a Sif. ammi, cum quo convenit in multis = involucc. polymorphis, setaceis, spathulat. aut 3-fid. Planta nitida. Caul. 2-pedal. ramosiss. Fol. 2-pinn. multifid. radical. oblonga, Millefolio simil. cætera magis subrotun. Umbell. multæ, radiis 4-5. divaricat. in ambitu; & 2-3 parvis in disco, absq. involuc. Involuc. radiis 2-3. parvis. Petal. alba, retusa. Anth. subviolac. Sem. parva, striata, sapore acri.

6. *tortuosum*. S. caul. alto, rigido: foliol. fasciculatis, linear, *Syst. veg. ed. 14. Lob. ic. 685.*

Fœniculum &c. *Bauh. hist.* 3. p. 16.

In Europa australi ad rupes 24.

Caul. 2-pedal. quasi lignosus. Umbell. radiis inæqual. umbellul. exiguae, conglobatae. Fl. parvi, albi.

7. *Turbith.* S. involucro 1-phyll. semen. striatis, villosis, stylatis. *Syst. veg. ed.* 14.

In Europa australi 24.

Caul. semiped. Fol. supradecompos. Foliol. linear. divaricata. Involuc. polyphyll.

8. *Hippomara-* S. involucell. connato-monophyll. (pelviformibus). *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. Austr.* 2. tab. 143.

S. articulatum. *Crantz. Austr. Fasc.* 3. tab. 5. f. 1. 2. *Riv. pent.* 66.

In Austria, Carniola, Pedemontio 24.

Fol. 2-pinn. pinnis 3-fid. linear. Caul. subped. juncus, glaucus, ut tota planta. Suprema fol. tantum vagina constant. Umbellul. inæqual. Involuc. o. Umbellul. breviss. densæ. Cor. alba, saepe subpurpurasc.

9. *pyrenæum.* S. fol. duplicat-pinn. foliol. incisis, acutis, involuc. setaceis, umbellul. longioribus. *Syst. veg. ed.* 14.

Selinum &c. *Að. Helv.* VII. tab. 12.

Carvi alpinum Moris. hist. 3. s. 9. tab. 9. f. 2.

In Pyrenæis.

Caul. pedal. teres, striatus, ad basin purpurasc. Fol. ambitu fere ovali: radical. longe petiol. vagina ampla, purpur. duplicato-pinn. laxa, parum divaricata. Foliol. pinn. acumin. cuneiform. Folium in caule saepe unicum, ex cuius ala exit ramus. Umbell. oblong. nuda, radiis sub 8. Umbellul. breviss. confertæ, uniform. Involuc. polyphyll. setacea. *Facies aliena a Seleos genere.*

10. *saxifragum.* S. caul. filiform. divaricato: fol. duplicato-ternat. linear. umbell. sub 6-fid. *Syst. veg. ed.* 14.

Pimpinella &c. *Riv. pent.*

Ad lacum Genevensem &c.

Videtur var. Seleos annui. Caul. 3-4-ped. ramosus. Fol. parva, raro lobata. Umbel. convexa, nuda. Umbellul. involucr. Involuc. setacea. Petal. alba.

11. *elatum.* S. caul. elongato, genicul. callosis: fol. 2-pinn.

pinnis

pinnis linear. distantibus. Syst. veg. ed. 14.
Gouan. Illus. tab. 8.

In Austria, Gallia, Pedemontio, pascuis sterili-
bus, saxosis montium, & alpium 24.

Rad. napiformis, setosa. Caul. sesquiped. sub-
dichot. ramis divaricatis; summis angustiss.
Fol. radical. & caulina inferior. 2-pinn. me-
dia pinn. summa foliolo unico ad apicem va-
ginæ. Foliol. teretia, rigida, mucronata,
subcarnosa, supra sulco exarata: foliol. inter-
medium cæteris longius. Vagin. latæ, margi-
ne membranac. apice bilobæ. Umbell. 3 fida.
Umbellul. confertæ, sub 8-fl. Involucc. bre-
viss. integra. Petal. alba. Sem. tuberculata.

fragile.

S. fol. articulatis, fragilibus: foliol. linear. in-
tegris, binatisque; vaginis 2-lobis. Gouan.
Illiustr.

Habitat . . . ♂.

Diffr. a S. montano & glauco. Sap. dulcis, &
aromaticus. Caul. 2-ped. ramosus, striatus,
glaucus. Fol. ambitu triangulari, palmar. ar-
ticulata, tactu decidua, 3-pinnat. Caulina in-
fer. foliol. simplic. triplo long.oribus: summa
minus composita, longiora. Vaginæ amplæ,
longæ, membranac. Umbell. terminal. & op-
positifol. Involuc. nullum. Involucc. foliol.
7-9. umbellul. triplo breviora.

437. THAP- Involut. nulla. Fl. æquales, petalis lanceolat.
SIA. integris. Fructus oblongus, membrana cin-
ctus, quæ supra, & infra ampliter truncata est,
& emarginata.

1. *villosa*. T. foliol. dentat. villosis, basi coadunatis. Syst.
veg. ed. 14.

Thapsia 1. Clus. hist. 2. pag. 192.

In Hispania, Lusitania &c. 24.

Caul. cubit. & ultra, brachiatus. Fol. crassiusc.
& aspera, in alas oppositas subiecta, segment.
longioribus, semunc. Umbell. lata. Petal. lutea.

2. *fœtida*. T. foliol. multifid. basi angustatis. Syst. veg. ed. 14.
Black. tab. 459. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 18.
f. 7.

In Hispania 24.

Fol. longa, lata, hirsuta, venosa, segment. non
Tom. II.

oppositis, sed singularibus. Petioli hirsuti, rubent. Petal. lutea.

3. *Asclepium*. T. fol. digitat. foliol. 2-pinnat. setaceo-multifid.
Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 18.
f. 9.

Panax Asclepium &c. Colum. ephr. 1. tab. 86.
In Apulia, Oriente 24.

Sapor acer. Caul. 2-3-ped. Fol. in orbem sparfa, segment. minutis, densis, *Millefolii* æmulis, hirsuta; petiol. 5-6. radiatim adnatis. Umbel. ampla. Petal. lutea.

4. *garganica*. T. fol. pinnat. foliol. pinnatifid. lacin. lanceolat.
Syst. veg. ed. 14. Gouan. Illust. tab. 10. Pluk.
tab. 67. f. 2. Bauh. hist. 3. p. 50. Magn. monsp.
tab. 286.

In Barbaria, monte Gargano Apuliæ 24.

Caul. 1-2-cubit. glaucus, glaber, nitens. Fol. decurrent, glabra: radicalia priora sesquiunc. longe petiol. ovat-lanceol. integerr: secunda ternata, quinata, lobis raro 2-fid. caulina ambitu triangulari, 3-pinn. Foliol. venosi, supra glauca, subtus pallide virentia, sessil. lacinias distantibus, parum refalcatis. Rami axillar. ad angulum acutum, glaberrimi. Umbell. ampla.

5. *trifoliata*. T. fol. (caulinis) ternatis, ovatis. *Syst. veg.*
ed. 14.

In Virginia.

Habitus Sii Ninsi. Fol. crenata; infimum cordatum. Petal. atro-purpur. Sem. Selini Carvisol.
seu Monnierii, sed involuc. nulla.

438. PASTI- Fructus ellipticus, compresso-planus, vix emarginat. NACA. striatus. Petal. involuta, integra. Fl. æquales.

1. *lucida*. P. fol. radicalibus cordat. lobatis: caulinis ternatis, quinatisq. rameis cuneiformibus. *Gouan.*
Illust. tab. 11. 12.

- P. fol. simplic. cordatis, lobatis, lucidis, acute crenatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 199.*

In Europa australi: in insulis balearicis 24.

Odor aromaticus. Sapor acerrimus. Caul. sesqui-ped. & ultra, lævis; excisus gummi fœtidum, rutaceum, album præbet. Fol. lucida, rigidula, rugosa, serrata, obiusa, crassia, atro-virent longe petiol. 3--5--lobata, impari petiolato.

Rami pl. panicul. Umbell. convexa. Involuc. subnullum. Involucc. semper nulla. Petal. acuta, integra, inflexa, lutea. Sem. orbicul. compressa.

2. *sativa*. P. fol. simpliciter pinnat. *Syst. veg. ed. 14. Riv. tab. 6. Black. tab. 379.*

P. domestica. Matth.

In Europæ austral. ruderatis, & pascuis ♂.

Caul. 6-ped. Pinnul. subsessil. oblique ovatæ.

Petal. lutea. *In sylvestri pinnul. petiol. lobatae, hirsute.*

3. *Opopanax*. P. fol. pinnat. foliol. basi antica excisis. *Syst. veg. ed. 14. Gouan. Illust. tub. 13. 14.*

Panax Heracleum. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 17. f. 2.

In Italia, locis umbrosis, & montanis rupestribus 24.

Altitudo etiam humana. Radix crassa. Caul. ramosus. Fol. ampla, costa crassa, saepius glabra: primaria simplic. cordata, dein ternata-quinata, tandem pinnata, acute crenata; foliol. terminali maiore: lateralibus oblique cordatis, lobo super. breviore. Caulina infima magis composita, ambitu triangul. bipedal. 2--pinn. pinnul. utrimque 5. pinna infima pinnata, foliol. saepè 5, ultimo cordato, cæteris sessilibus, oblique cordatis. Pinnul. cæteræ ternatæ, deum simplices sunt. Cor. lutea.

439. *SMYRNIUM*. Involuc. nulla. Petal. acumin. Fruct. subrotund. magnus. Sem. carinata, dorso sabrotunda, & tribus costis obtusis, & veluti funiculis percurso; interiore facie veluti triangulari; neque idcirco tota plana, & contigua.

1. *perfoliatum*. S. fol. caulinis amplexicaulibus. *Syst. veg. ed. 14.*
S. amani mortis. *Dod. pempt. 698.*

In Italia, Creta ♂.

Rad. napiformis. Fol. primordial. *Apium palustr.* caulinata circinnata. Sem. subnigra.

2. *egyptiacum*. S. fol. floralibus binis, simplicibus, cordat. integrerr. *Syst. veg. ed. 14.*

In Ægypto.

Magnitudo S. *Olusatris*. Fol. infra pedunc. comm. bina, opposita, amplexicaul. ovata, integrerr. Petal. lutea.

3. *Olusatrum*. S. fol. caulinis ternatis, petiolat. serratis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 408.*

Hipposelinum. *Dod.* pempt. 698.

Smyrnio. *Matth.*

In Europa ♂.

Fol. radical. triternata: summa opposita: vaginis lacerato-ciliat. Foliol. magna, firma, venosa, glauca. Involuc. breviss. Petal. albido-virescent. Sem. nigra.

4. *aureum*. S. fol. pinnatis, serratis; posticis ternatis: floscul. omnibus fertilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Angelica acadeiensis. *Dodart. Ad. 55. tab. 4. 247. cum fig.*

In Amer. boreali ♀.

Caul. 2--ped. & ultra. Fol. *Podagrariae* æmula, trifariam divisa, acuta, æqualiter, & non alte serrata. Umbell. planæ. Pet. parva, lutea. Sem. brunnea.

5. *integerri-mum*. S. fol. caulinis duplicato-ternatis, integerr. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginin. ♀.

Caul. sesquiped. lævis, parum ramosus. Fol. fere *Aquilegiae*, tri-ternata, oblong--ovat. glabra, glauco-virid. odore grato.

nodiflorum. S. *All. Fl. Ped. tab. 72.*

Ligusticum &c. *Vill. prosp. tab. 23. f. 2.*

In sylvis, & pratis montosis Pedemontii &c. ♀.

Caul. 3-ped. brachiat, subnudi, striati, læves. Juxta ramorum longitudinem, atque in ipso caule 2--3--4. etiam unial. pedunc radiatim nascuntur, umbellas substinetes. Ad peduncular. ortum adest foliol. integrum, lanceolat. umbellæ etiam terminales. Involuc. 1-phyll. lineare, aristatum, simile foliolo umbellæ subiecto. Umbellulæ 3-4 cum fl. uno solitar. in medio umbellæ, 3-4--floræ. Petal. cordata, inflexa, herbacea. Sem. magna, nigra, incurva, non acuminata, dorso potius costata, quam striato. Petioli fol. striati, rotundi, breviter vaginantes. Petiol. in 3 dividitur, medio longiore; quorum quilibet fol. tria petiolata, ovato-lanceol. profunde dent. dentibus quandoque aristat. venosa, glabra, subtus pallent. *Ex formâ sem. media planta inter Smyrnium;* & *Ligusticum*, sed ad primum potius accedit.

440. ANE- Fruct. subovat. compressus, striatus. Petal. in-
THUM. voluta, integra.
1. *graveolens*. A. fructibus compressis. *Syst. veg. ed. 14.* *Sabb. hort. 4. tab. 95.* *Black. tab. 545.*
Aneto. Matth.
Inter Lusitaniz, & Hispaniz &c. segetes: circa Astracan ♂.
- Odor totius plantæ graveolens*. Caul. pedal. Fol. 2-pinnat. linear. planiuscul. glauca. Petal. lanceol. lutea. Sem. ex flavo-pallescent.
2. *segetum*. A. fol. caulinis tribus: fructibus ovalibus. *Syst. veg. ed. 14.* *Jacq. hort. 2. tab. 132.*
In Lusitania ♂.
Odor prioris. Caul. spitham. teres, lævis, glau-
cus. Rami 3-4. alterni, patentes. Fol. petiolat.
basi membranacea, 2-3--pinn. filiform. linear.
lævia, plana, foliol. alterne subcivisis. Folii
summi foliol. indivisa. Loco involuc. utriusq.
rudimentum. Umbell. convexa, patula, dis-
perma. Umbellul. 9. Cor. flosculosa. Petal. in-
voluta, flava. Fruct. oval. convexiuscul. striis
3. elevatis.
3. *Fænicu-
lum*. A. fructibus ovat. *Syst. veg. ed. 14.* *Black. tab. 288.* *Riv. tab. 60.* *Cam. epit. 534.*
Finocchio. Matth.
In Narbonæ, Maderæ rupibus cretaceis ♂.
Altitudo humana. Fol. ampliss. Foliol. magna,
setacea, nigro-virent. glabra. Umbella lata.
Involuc. nulla. Petal. flavidant. Sem. sapore
acuto, oblong. parum gibba, nihil arcuata,
intus plana, dorso 5-costato.
441. CARUM. Fructus ovat-oblong. striatus. Sem. intus pla-
na. Petal. carinata, inflexo-emarginata. In-
voluc. nulla.
1. *Carvi*. C. *Syst. veg. ed. 14.* *Jacq. Austr. 4. tab. 393.*
Black. tab. 529. *Ludw. ed. tab. 156.*
In Europæ borealis pratis montanis ♂.
Caul. striatus, in alpibus spitham. in hortis 2--
cubit. Fol. longa, angusta, petiolis membran.
dilatatis, 3-pinnat. nigro-virent. rigid, glabra,
lacin. linear. Umbell. peduncul. raræ, planæ.
Involuc. 0--1--phyll. Petal. alba, inde rubra,
extima parum ma. Sem. fusca, sapore aroma-
tico.
442. PIMPINELLA, Fl. subradiati, fertiles. Involuc. nulla.

Petal. cordata. Fruct. subrotund. aut subovat.
Sem. intus plana, paulisper acuminata, dorso
gibbo tricostato.

1. *Saxifraga*. P. fol. pinnat. foliol. radical. subrotund. summis
linear. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab.
395. Fl. Dan. tab. 669. Black. tab. 472. Moris.
umb. tab. 5.

In Europa pascuis siccis 24.

Radix Hirci sapore. Caul. 2-ped. sæpe ramosus,
angulatus, quandoq. diffusus. Foliol. dentata,
nitida. Umbell. raræ. Petal. alba.

2. *magna*. P. foliol. omnibus lobat. impari trilobo. Syst. veg.
ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 396.

P. saxifraga. Camer. epit. 775. ic-Barr. ic. 213.
Dod. pempt. 315.

b. P. saxifraga. Riv. tab. 60.

In Europa australi, in pinguibus alpium nratis 24.
Huius Var. est P. Orientalis Gouan. Illust. tab.
15. Jacq. Austr. 4. tab. 397.

*Differet a priore glabritie: umbell. ma: petal. non
semper albis.*

Caul. 3-ped. Fol. fere cubital. petiol. vaginante.
Foliol. latiora, quam longa, ferrata, venosa,
quasi oleo inuncta, facie Sifari. Petioli com-
pressi.

3. *glauca*. P. foliol. supradecompos. caul. angulato, ramo-
siss. Syst. veg. ed. 14.

In Gallia, Italia.

Fol. Peucedani, sed longe min. pinnul. ultimis
3-partit. caulinorum vaginæ longæ, striatæ,
margin. albidis. Involucc. nulla, quorum de-
fectu a Sefel. differt.

4. *peregrina*. P. fol. radical. pinnat. crenatis: summis cuneiform.
incisis: umbell. nubilibus nutantibus. Syst. veg.
ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 131.

Daucus &c. Column. ecphr. 1. tab. 109.

In Italia pascuis sterilibus 24.

Caul. 2-ped. paucifol. Fol. radical. p. prodeunt
simplicia; dein ternata; subsequa pinnata: fo-
liol. utrimq. bina, terna, cum impari, subro-
tunda. Umbella plana. Umbellul. convexæ.
Petal. alba.

5. *Anisum*. P. fol. radical. (subrotund.) 3-fid. incisis. Syst.
veg. ed. 14. Black. tab. 374. Clus. hist. 2. p.
202.

In Ægypto ①.

Caul. pedal. striatus, hirsutus. Fol. pinnata; super. multifida. Involuc. depauperata. Petal. alba. Sem. e viridi-fusca, fragrantia.

6. *dichotoma*. P. peduncul. oppositifol. fol. floriferis 2-trifid. petiolis alato-membranac. Syst. veg. ed. 14.

In Hispania.

Caul. semiped. ramosiss. dichotomi. Fol. infer. triternata: superior. 2-ternata, fere linear. breviora, acuta. Petoli membrana alba. Umbell. radiis 5-6. Petal. alba, incurvo-emargin. Fruct. subglobosi, striati.

7. *dioica*. P. pumila; umbell. numerosiss. compositis, simplicibusque. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. I. tab. 28.

Seseli &c. Clus. hist. 2. pag. 200.

In Austria, Helvetia &c. vallibus, & saxosis apricis ♂.

Caul. palmar. divaricat. striatus, laevis, parum foliac. Fol. ternata, seu 2-ternata, linear. Umbell. terminalis, & laterales 2. oppositae. Petal. longe lanceol. incurva, non emarginata. Involuc. nulla. Stam. longa, alba. Datur planta mascula, & hermaphrodita.

diflecta.

P. fol. omnibus pinnat. pinnis multipart. segment. subfalcata. acutis. Retz. Obs. fasc. 3. tab. II.

Pimpinella &c. Moris. Hist. plant. T. I. tab. 5. Tragoselinum. Hall. Helv. 787.

Habitat

Fol. primi anni omnino pinnat. pinnis subrotund. In horto culta procerior evadit, & magis stricto caul. surgit.

443. CUSSO- Petal. 3--gona. Margo receptaculi dilatatus in NIA. calyc. 5-dentat.

1. *thyrsiflora*. C. fol. digitat. foliol. sessil. cuneiform. truncatis, 3-dentatis: fl. racemosis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Thumb. Að. Ups. vol. 3. tab. 12. fig. bona.

Ad cap. b. Spei 24.

Caul. frutesc. inæqual. crassitie digitii, inferne scaber, superne simpliciss. Fol. in apice caul. adproximata, quinata, alterna, petiolat. Foliol. inæqual. consistentia, Menyanthes, longe petiolata. Stipul. interfoliac. Racemi terminal. umbellati. Radii 4. simpliciss. racemo cylindrico.

PENTANDRIA DIGYNIA:

Var. fol. articulatis, articul. infimo apice in lobos min. dilatato; unde foliol. quasi prolifera.

- 2. spicata.** C. fol. digitat. foliol. petiolellat. spatulat. ligula 3-5-palmata, anguste serrata: fl. spiat. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Thumb. Ad. Ups. vol. 3. tab. 13. f. bona.

Ad cap. b. Speci.

- 444. APIUM.** Involucr. 1--phyll. vel nullum. Petal. æqualia, integra, inflexa. Fruct. minimus, subrotund. Sem. ovatum, intus planum, dorso tenuissime striato.

- 1. Petroseli-** A. fol. (inferioribus subrotund.) caulinis linear. num. involucel. minutis. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 172. Dod. pempt. 694.

In Sardinia iuxta scaturigines ♂.

Caul. 2-cubit. sulcatus. Fol. alterna, amplexicaul. 2-pinn. Petal. pallescent. Sem. cinerea, glabra.

- 2. graveolens.** A. fol. (inferioribus quinato-pinnat.) caulinis cu- neiformibus. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 740. Sabb. hort. 4. tab. 67. Ludw. ed. tab. 180. Black. tab. 443.

Apio palustre. Mauth.

In Europa humedis, præsertim maritim. ♂.

Altitudo humana. Caul. sulcatus. Fol. lète vi- rentia, firma, nitida; inferior. petiol. 3-fid. superiora subsessil. Umbell. paucifl. aliæ petio- latæ, aliæ sessiles.

- 445. ÆGO- PODIUM.** Fl. exteriores inæqual. inter. æqual. petalis pro- funde cordat. Involucra o. Sem. magna, ob- longa, convexa, profunde striata, nuda.

- 1. Podagra-** Æ. fol. (imis biternat.) caulinis summis ternatis. ria. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 607. Riv. tab. 46.

Herba Gerardi. Dod. pempt. 320.

In Europa ad sepes, & in pomariis ♀.

Caul. 3-ped. brachiat. angulat. Fol. magna, lète virent. glabra. Vaginæ grandes. Foliol. ob- verse ovata, acuta, ferrata. Umbell. magna, convexæ. Umbellul. planæ. Fl. albi, maiusc. extus subrubri. Sem. oblonga.



TRIGYNIA.

446. SEME-CARPUS. **C**Or. 5-petala. Drupa cordata, cellulosa, 1-sperm.

I. Anacardium. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Anacardium verum Or. Offic..

In India versus Zeylonam H.

Arb. grandis, cortice cinereo, fusco: ramis subhirtis. Fol. magna, adproximata, alterna, cuneiform. acutiusc. integerr. glabra, pilis rarioribus conspersa. Racemus erectus, pedunculat. Bracteæ ad peduncul. & pedicellos. Cal. carnosus, hirsutus, persistens. Drupa extus nigra, intus succus mucilaginosus, causticus, niger.

Succus diploës ad linteæ, sericea, bombacinæ, literarum notis nigris numquam delendis insignienda usurpatur. Hæc nigrities adeo inhæret, ut Sapone artificiali, vel salibus detergi nequeat; linteæ tamen non corrodit, et si ut causticum in cute agat.

447. RHUS. Cal. 5-part. Petal. 5. Bacca 1-sperma, coriacea.

I. Coriaria. R. fol. pinnat. obtusiuscule serratis, ovalibus, subtus villosis. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 486. Ludw. ed. tab. 122.

Dod. pempt. 776.

Sumach. Offic.

Rhu. Matih.

In Europa australi, Syria, Palæstina H.

Altitudo humana, & ultra. Frutex subramosus: Fol. alterna. Foliol. 13-15. opposita, sessil. basi integerr. ad apicem serrata, subtus subrubra. Fl. racemosi. Cor. ex albo-lutesc. Caps. subvirid. villosæ.

2. typhinum. R. fol. pinnat. lanceol. argute serratis, subtus tomentosis. Syst. veg. ed. 14. Duhamel. arbr. 2.

In Virginia H.

Rami Cervi cornua referunt. Fol. magna, longa. Foliol. sæpe utrimq. 9. cum impari. Panicul. conglomerata, crassa, villosa. Cor. subrubra. Fruct. rubri,

3. javanicum. R. fol. pinnat. ovat. acuminat. serratis, subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*

In China ♂.

Foliol. sub 7-iuga, pollicar. sensim maiora, opposita, sessil. parallelo-nervosa, supra glabra, subtus ferrugineo-tomentosa. Petiol. alari. Panicula terminal. composita, tomentosa. Fl. minutti.

4. glabrum. R. fol. pinnat. lanceol. serratis, utrimq. nudis. *Syst. veg. ed. 14. Gisech. ic. fasc. 1. tab. 5. Dill. elth. tab. 243. f. 314. Catesb. Car. 3. tab. 4.*

In Amer. Septent. ad agros, & sepes ♂.

Frutex sub 3-cubit. cortice cinereo, ramis alternis, expansis. Fol. alterna, longa, foliol. terminal. ma. supra sature viridia, subtus glauco-albicant. Panicula pyramidal. pedal. sparsa. Petal. e luteo-virid.

5. Vernix. R. fol. pinnat. integerr. annuis, opacis; petiol. integro, æqual. *Syst. veg. ed. 14.*

Toxicodendron &c. *Duhamel. arbr. 2. tab. 99. Dill. elth. tab. 145. f. 1.*

Arbor amer. &c. *Pluk. alm. tab. 145. f. 1.*

In Amer. Septent. Japonica ♂.

Cortex cinereus. Foliol. 4-5--plura, ovat-lanceol. utrimq. surrecta, supra virid. & glabra, subtus pallida, & sublanuginosa. Fl. racemosi, pedunc. purpur. Petal. minima, herbaea. *Dioicum. Diversum a Vernice offic.*

6. succedaneum. R. fol. pinnat. integerr. perennantibus, lucidis; petiol. integro, æqual. *Syst. veg. ed. 14.*

Arbor vernicifera &c. *Kæmph. am. 795.*

In Japonia, China ♂.

Ad fine priori, sed differt potissimum magnitudine fol. quæ rigida sunt, utrimq. nitida, raro utroq. margine æqualia, odore foetido muris. In priore vero opaca, viridia. Fruct. huic magnitudine Cerasi, nec albi; in priore magnitudine Pisi, ovinino albi.

7. copallinum. R. fol. pinnat. integerr. petiol. membranac. articulato. *Syst. veg. ed. 14. Duham. arbr. 7.*

R. obsoniorum &c. *Pluk. alm. tab. 55. f. 1.*

In Amer. Septent. ♂.

Arb. gummifera. Foliol. utrimq. 5-6. costa, & nervis rubentibus. Fl. racemosi.

8. *semialatum*. R. fol. pinnat. serratis, petioli extimis interno-diis membranaceis. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gottin. 1784. c. tab. M.*
Habitat . . .
9. *Metopium*. R. fol. pinnat. quinatis, subrotund. integerrim. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Brow. Jam. tab. 13. f. 3.*
Terebinthus &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 199. f. 3.
Borbonia Plum. ic. 61.
In America ♂.
Arb. 50-ped. valde ramosa. Fol. longe pinnata.
Foliol. 2. unc. longa, dilute virent. nitida.
Fl. in summis ramulis corymbosi. Petal. fu-
sco-purpur. Fruct. Olivæform. rubri.
10. *pauciflo-* R. fol. pinnat. foliol. alternis, decurrent. cu-
rum. neiform. apice serratis: panicula sessili, paucifl.
Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
11. *digitatum*. R. fol. pinnat. foliol. oblong. integerr. glaberr.
caul. scandente. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
12. *radicans*. R. fol. ternatis; foliol. petiolat. ovat. nudis, in-
tegerr. caul. radicante. Syst. veg. ed. 14.
Toxicodendron &c. Du Ham. arb. 2. tab. 98.
Dill. elth. 390.
b. Toxicodendron &c. Dill. elth. tab. 292. f.
375.
In Virginia, Canada ♂.
Dioicum. Minus venenatum quam R. Vernix.
Stolones pl. 3-cubital. Fol. latiora, & longiora,
vel breviora, & obtusiora, supra lâte virid.
subtus pallidiora. Fl. axillar. racemosi, her-
bacei, vel luteo-albidi. Fructus Coriandri.
b. Differt caudice erecto, absq. stolonibus.
13. *Toxicoden-* R. fol. ternat. foliol. petiolat. angulat. pube-
dron. dentibus: caul. radicante. *Syst. veg. ed. 14.*
Hedera trifolia &c. Cor. Canad. tab. 97. Barr.
ic. 228.
In Virginia, Canada ♂.
Dioicum. Fol. nunc integra, nunc sinuata. Fl.
racemosi, parci, dilute lutei.
14. *Cominia*. R. fol. ternatis: foliol. petiolat. ovat. subtus to-
mentos. remotiss. ferrat. Syst. veg. ed. 14.
Baccifera &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 208. f. 1.
Malago maram. H. Mal. 5. tab. 25.
In Indiis ♂.

Arb. procera, ramis e viridi--flavescent. & tomentos. Petiol. longi, & tomentosi. Racemi terminal. peduncul. lanuginosis. Petal. minima. Baccæ rotundæ, p.^o atro-virent. dein viridi-albescent.

15. Cobbe. R. fol. (plerumque) ternat. foliol. ovat. acuminate. serratis, peduncul. tomentosis. Syst. veg. ed. 14.

Rhois trifoliae &c. Pet. mus. 678.
In Zeylona Ȑ.

Frutex facie Rhois Afric. Fol. alterna, longe petiol. quandoq. quinato-digit. Foliol. magna. Spicæ axill. saepe simpl. Fl. multi, minimi, breviter peduncul. Fructus nigri.

16. tomentosum. R. fol. ternatis: foliol. subpetiolat. rhombeis, angulatis, subtus tomentosis. Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 219. f. 7.

Vitex &c. Comm. hort. I. tab. 92.

Ad cap. b. Spei Ȑ.

Frutex cortice fusco. Foliol. acuta, serrata, dura, crassa, supra sature virid. nitida, subtus dilutiora. Fl. decussati, aut binatim positi, peduncul. Petal. purpuro-cœrul.

17. angustifolium. R. fol. ternatis: fol. petiolat. linear-lanceol. integerr. subtus tomentos. Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 219. f. 6. Burm. afric. tab. 91. f. 1.

In Aethiopia Ȑ.

Frutex ramis sparsis. Racemi terminal. fol. longiores. Bacca subrotun. rubra, glabra.

18. lœvигatum. R. fol. ternatis; foliol. sessil. lanceol. lœvibus. Syst. veg. ed. 14.

Ad cap. b. Spei Ȑ.

Simile R. lucido, sed foliol. lanceol. minus lucida. Panicul. longa, tenuissima.

19. lucidum. R. fol. ternatis: foliol. sessil. cuneiform. lœvibus. Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 219. f. 9. Burm. afric. tab. 91. f. 2.

Vitex &c. Comm. hort. I. f. 93.

Ad cap. b. Spei Ȑ.

Altitudo humana. Frutex ramis 2-pedal. virid. vel purpurasc. Fol. petiolat. Foliol. crassa, venosa, variantia glabritie, hirsutie, glaucidine &c. Fl. axillar. racemosi. Bacca subrotunda.

20. villosum. R. fol. ternatis: foliol. sessil. ovatis, integris, pubescenti-villosis: caul. pubescente. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei ♂.

Differt a reliquis canitie.

21. *incisum*. R. fol. ternatis : foliol. sessil. cuneiform. inciso-pinnatifid. subtus tomentos. venosis : calyc. tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Foliol. parva, & exquisite divisa, ut folia *Myrica quercifoliae*.

22. *cuneifoli-* R. fol. ternatis : foliol. sessil. cuneiform. glaberr. um. 7-dent. dentibus mucronat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

23. *lanceum*. R. fol. ternatis : foliol. lanceol. subulat. elongat. utrimq. glaberrim. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Differt a R. lavigato fol. longioribus, angustioribus, utrimque glaberr.

24. *cirrhiflo-* R. scandens, fol. ternatis : foliol. integerr. gla- rum. bris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

25. *tridenta-* R. scandens ; fol. ternatis : foliol. incanis, serrat. tum. serraturis 3-5. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

26. *Cotinus*. R. fol. simplic. obovatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq.*

Austr. 3. tab. 210. Du Hamel. arbr. I. tab. 78. Cocconilea. Clus. Hist. rar. p. 16. ic. Lob. ic. 99. Cotino. Matth.

In Lombardia Italiæ ; ad rad. apenninorum &c. ♂.

Odor balsamicus. Frutex humilis, nodosus, cor- tice e fusco-rubro. Fol. alterna, longe petiol. petiolis rubellis, apice rotundo, integerr. firma, glabra, nervis sœpe rubent. Panicula terminal. inferne rara, superne densior, bracteis filiform. pilosis, longioribus quam pedicelli. Petal. subvirid. Bacca glabra, compressa, sili- culam *Bursæ pastoris* per medium quasi dissectam referens.

sæneb.

R. fol. longo-lanceol. serratis, subtus tomentos. albis. *Forsk. Suppl. Æg.*

In Arabia ♂.

Baccæ sessil. in ramis sub fol. confertæ, globo- sœ, subspicat. hispidæ.

448. VIBUR- Cal. 5-dent. superus. Cor. 5-fid. campanul. Bacca NUM. 1-sperm,

1. *Tinus*. V. fol. ovat. integerr. ramification. venarum subtus villoso-glandulosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Tinus 1. 2. 3. *Clus. hist. 1. p. 49.*
Laurus Tinus &c. Bauh. hist. 3. p. 418.
In Lusitania, Hispania, Italia, sylvis opacis ♂.
Arbusc. sempervirens. Fol. opposita, petiol. firma, nitida, obscure virent. Fl. terminal. rameosí, primum rubri, dein albi. Cymæ involucrat. Fructus in maturitate rubri.
2. *Tinoides*. V. fol. elliptic. glabris, integerr. ramis, cymisque teretibus, hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
In Amer. meridion. ♂.
Simile V. Tino; at fol. Tini exacte ovat. petioli longiores: pedunc. caulisque angulati, glaberr.
3. *scandens*. V. fruticosum, scandens; fol. oblong. ferrat. cymis terminal. radiis terminatis fl. maximo. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
In Zeylona ♂.
Fol. breviter petiolat. oblong. angustiora, utrimq. acumin. Radii patentes. Fl. parvi, sursum versi, albi.
4. *virens*. V. fol. oblong. acuminat. medio serratis, scabris: ramis scandentibus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*
In Japonia.
Caul. frutesc. ramosus. Fol. sesquipoll. æqual. opposita, petiolat. basi, & apice integræ, medio tenuiss. ferrata, tenuia, glaberr. læte virid. subtus pallidiora. Fl. terminal. umbellati, radiati. Cal. reflexus. Differt a V. cassinoidae, petiol. minime carinatis, & fol. serratis.
5. *serratum*. V. fol. oblong. dentato-serrat. basi integris, subtus pallidis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*
In Japonia ♂.
Fol. opposita, petiol. acumin. inferne attenuata, glabra. Cymæ terminal. fl. radiantibus.
6. *nudum*. V. fol. lanceol-ovat. integerr. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. 274.*
In Virginia ♂.
Cymæ nudæ. Petal. alba. Fruct. atro-purpur.
7. *prunifolium*. V. fol. subrotund. crenato-serrat. glabris. *Syst. veg. ed. 14.*
Mespilus &c. Pluk. alm. tab. 46. f. 2.
In Virginia, Canada.

Fol. Pruni. Fl. cymosi, albi. Fruct. oblong. atro-purpur.

8. *dentatum*. V. fol. ovatis, dentato-serrat. plicatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 36.*

In Virginia ♂.

Frutex cortice fusco. Fol. opposita, petiol. supra glabra, subtus leviter pubescent. primum plicata, dein expansa, & planiora. Cymæ terminal. Petal. alba.

9. *Lantana*. V. fol. cordat. serratis, venosis, subtus tomentos. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 4. tab. 341.*

Viburnum. *Du Ham. arb. 2. tab. 103. Cam. epit. 122.*

Lantana. *Dod. pempt. 701.*

Viburno. *Matt.*

In Europæ austral. sepibus argillosis ♂.

Arbusc. 6-ped. Fol. opposita, petiol. Cymæ densæ. Fl. sessil. odori. Cor. albido-lutea. Fruct. primum albi, dein rubri, tandem nigri.

10. *acerifolium*. V. fol. lobatis; petiolis lævibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia ♂.

Baccæ rubræ, umbilicat.

11. *Opulus*. V. fol. lobatis; petiolis glandulos. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 661.*

Sambucus. *Pal. Dod. pemp. 846.*

Sambuco acquatico. *Matt.*

b. V. roseum. *Knorr. del. hort. 2. tab. S. 6.*

In Europæ pratis humidiusculis ♂.

Frutex 6-ped. Fol. opposita, inferne nervosa, lobis dentat. lateralibus 2-partit. Cymæ latæ, nudæ, planæ; in var. globosæ. Cor. alba. Baccæ rubræ.

12. *Lentago*. V. fol. ovatis, serrulat. acuminat. glabris; petiolis marginatis, undulatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Canada ♂.

Rami propendent. Fol. crassa *Tini*, glabra, denticulis minim. serrulata. Gemma terminal. subulata, basi ventricosa.

13. *tomentosum*. V. fol. ovat. acuminat. serratis, venosis, subtus tomentos. umbell. lateralibus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

Te Marikwa. *Kämp. am. exot. Fasç. V. p. 854.*

In Japonia ♂.

Differt a V. Lantana = fol. ovat. nec cordatis: umbell. lateralibus, confertis. Rami ramulosi, divaricati, teretes, glabri, rubent. Fol. opposita, petiol. nervosa. Petioli, ramuli, & peduncul. tomentosi. Cymæ lateral. in apice ramulor. floscul. radiantibus.

- 14. erosum.** V. fol. ovat. acuminat. erofo-serrat. glabris: petiol. tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia ほ.

Caul. fruticos. erectus, ramis patenti-erect. oppositis, augulatis, glabris, cinereis. Fol. inæqual. 2-pollic. superior. ma. opposita, breviter petiol., infima basi integra, tenuia, glabra, subtus pallida. Fl. in apice ramulorum paniculati, non radiati. Panicula decomposita, umbellata. Bract. setaceæ, villosæ. *Differt fol. ovatis, longius acuminat.*

- 15. hirtum.** V. fol. ovat. serratis, villosis: petiol. hirtis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia ほ.

Caul. flexuoso-erectus, teres, glaber. Rami, & ramuli alterni, basi glabri, apice hirti. Fol. pollicar. opposita, petiol. (Urticæformia) acuta, profunde, & æqualiter ferrata, venis hirtis, pilis albis decumbentibus. Petiol. & pedunc. hirti, pilis horizontal. Umbellæ terminal. compositæ. Fl. minuti, non radiantes. Stigm. 2-lobum.

- 16. dilatum.** V. fol. obovat. acuminat. inæqualiter serratis, villosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia ほ.

Caul. erectus, fruticos. subangulat. cinereus, villosus. Fol. 2-pollic. inferiora min. opposita, petiol. nervosa. Fl. paniculati, non radiati. Panicul. axillar. supradecomposita, patentiss. 4-fid. 3-chotom. Pedunc. & pedicelli tomentosi.

- 17. macrophyllum.** V. fol. obovat. acuminat. dentatis, glabris. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia ほ.

Planta tota glabra. Caul. & rami teretes. Fol. palmam lata, & paulo longiora, opposita, petiol. nervosa, glabra, subtus pallidiora. Umbell. terminal. composita; fl. radiantibus.

18. cuspi-

18. *cuspida-* V. fol. ovat. cuspidat. serrat. villosis. Syst. veg. ed. 14. *Thum. Jap.*

In Japonia ♂.

Fol. palinam fere lata, & paullo longiora, æqualiter, acuteq. ferrata, pilis spartis. Umbell. terminal. supradecomposita, fl. radiantibus.

19. *Cassinoi-des.* V. fol. ovat. crenat. glabris; petiolis carinat. eglandulat. Syst. veg. ed. 14.

Cassine. Mill. dict. tab. 83. f. 1. *Angl. hortul.* tab. 20.

In Amer. Septent. ♂.

Frutex. Fol. opposita, infima obovata; proxima ovata; super. lanceol.

lanceolatum. V. Hill. hort. Kewens. tab. 19.

In Virginia ♂.

Frutex 6-ped. Fol. 3-unc. Petal. alba.

449. CASSINE. Cal. 5-part. Petal. 5. Bacca 5-sperm.

I. capensis. C. fol. petiol. ovat-obl. retusis, crenatis. Syst. veg. ed. 14.

Celastrus &c. Burm. Afric. tab. 85.

Phylliræa &c. Dill. elth. tab. 236. f. 305.

Frutex &c. Seb. mus. I. tab. 29. f. 5. Pluk. phyt. tab. 97. f. 8.

Ad cap. b. Spei ♂.

Simil. sequenti, sed differt fol. forma. Fol. venis eminentibus. Petiol. marginati, nudi. Ramuli 4-goni. Corymb. breviif. ut in *Maurocenia*.

2. *Peragua.* C. fol. petiol. elliptic. acutiuscul. serratis: ramul. ancipitibus. Syst. veg. ed. 14.

C. corymbosa. Mill. dict. ie. tab. 83. f. 1.

In Carolina, Virginia ♂.

Rad. longa, lutea, vel rosea. Caul. subnulli.

Fol. opposita, crassa. Petioli dorso decurrentes. Corymb. axillar. breves. Bacca globosa.

3. *Maurocenia.* C. fol. sessil. obovat. integerr. coriaceis. Syst. veg. ed. 14.

Frangula &c. Dill. elth. tab. 121. f. 147.

Cerasus &c. Pet. gaz. tab. 57. f. 4. Pluk. alm. tab. 158. f. 2.

In Æthiopia ♂.

Frutex 3--cubit. a medio ad summum ramosus, ramis ramulos. Fol. plerumq. opposita, crassa, valde rigida, utrimq. glabra, & subnitent. margine subreflexo, quandoq. emargin. supra sa-

ture, subtus viridi-lutescent. costa pallide vi-renti. Fl. axillar. fascicul. parvi, primum fla-vescent. dein albidi, *Oxyacunthæ* simil. odori. Baccæ oblong-rotund. rubent.

450. SAMBU- Cal. 5-fid. Cor. 5-fid. rotata; concava. BACCA-CUS. 2-3-sperma. Fol. pinnata. Fl. in nostris, cymosi.

1. Ebulus. S. cymis 3-partit. stipul. foliac. caul. herbac. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 488. Mill. ic. tab. 226. Fuchs. hist. 65. Cam. epit. 979.

Ebulo. Matth.

In Europa 4.

Caul. 1-2-cubit. Fol. impari-pinn. 3-4-iuga. Foliol. longiora, angustiora, magisque dentata. S. nigra. Flos speciosior. Petal. segment. lanceolat. extus subrubris.

2. japonica. S. fruticosa, cymis 3-part. stipul. nullis. Syst. veg. ed. 14. Thunb. Jap.

In Japonia 3.

Caul. ramis patulis, oppositis, glabris, teretibus, inanibus. Fol. opposit. & ultra, opposita, impari-pinn. petiol. Foliol. 3-5-7-iuga, ovata, acuta, saepe acumin. ferrata, margine cartilagin. albo, glabra. Fl. terminal. Cymæ supra-decompos. patens, nuda, absque bracteis, glabra. Cor. alba.

3. canadensis. S. cymis 5-part. fol. sub 2-pinnat. caul. frutesc. Syst. veg. ed. 14.

In Canada 3.

Media inter S. Ebolum, & nigram. Habitus S. nigra, at fol. pinnat. foliol. inferioribus ternat. omnibus magis ovat. Fruticat, sed plerumq. perit supra terram hyeme. Cymæ ut in nigra. Stipul. filiform. truncatae, ut in nigra, nec in foliol. expansa, ut in Ebulo. Baccæ rubicund. & edules, magnitudine sem. Coriandri.

4. nigra. S. cymis 5-part. fol. pinnat. foliol. subovat. serratis: caul. arboreo. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 545. Black. tab. 151. Knorr. del. 1. tab. H. Du Ham. arb. 2. tab. 65.

Sambuco montano. Matth.

In Europa, & in Japonia 3.

Arb. pumila. Fol. impari-pinn. Foliol. ovat-lanceol. acute ferrata, odore foetido. Petal. alba. Baccæ nigræ, quandoq. virid. vel albæ.

PENTANDRIA TRIGYNIA.

195

5. *laciniata*. S. cymis 5-part. fol. 2-pinn. pinnis ternatis; foliol. lanceol. incisis; caul. arboreo. *Syst. veg.* ed. 14. *Retz. Obs. fasc. 3.*
 Var. *S. nigræ*. *Syst. veg. ed. 13.*
In Europa ♂.
6. *racemosa*. S. racemis composit. ovat. caud. arboreo. *Syst. veg. ed. 14.* *Du Ham. arb. 2. tab. 66.* *Bauh. hist. I. pag. 549.*
S. montana. *Lob. ic. 163.*
In Europæ austral. montibus ♂.
 Frutex 6-ped. Fol. longiora, angustiora, firmiora. Gemmæ caulinae. Fl. racemosi. Cor. ochroleuca. Baccæ rubræ.
451. SPA-
 THELIA. Cal. 5-phyll. Petal. 5. Caps. 3-gona, 3-locul.
 Sem. solitar.
1. *simplex*. S. *Syst. veg. ed. 14.*
Aceri &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 171.
In Jamaica ♂.
 Arb. 40-ped. ab imo ad semipedal. usque a summitate distantiam nudus, Palmarum more, cortice albicante. Fol. in orbem disposita, peramplia, pinnata, costa media 3-4-pedal. albicante, lanuginosa. Pinnul. longitudine 6-unc. latitudine unc. Fl. terminal. multi, pu. pur. stamin. luteis. Vesicæ membran. glabræ.
452. STA-
 PHYLEA. Cal. concavus, 5-fid. marcescens. Petal. 5, elliptica. Styli 2-3. Caps. vesicæform. membranac. 3-locul. Sem. oslea, globosa, cicatrizada.
1. *pinnata*. S. fol. pinnatis. *Syst. veg. ed. 14.* *Knorr. del. hort. 2. tab. S. I.*
Staphylodendron. Dalech. hist. 102. *Duham. arb. I.*
Pistacia sylv. Cam. epit. 171.
Nux vesicaria. Dod. pempt. 818.
In Europæ austral. succulentis ♂.
 Arbuscul. etiam 15-20-ped. Foliol. 5-7. oval. acuta, margine cartilagin. argute ferrata. Stipul. flavescent. Racemi longitudine fol. penduli. Petal. alba cum rubore. Caps. magna.
2. *trifolia*. S. fol. ternatis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Virginia ♂.
 Dignoscitur fol. ternatis, & semin. parvis.
453. TAMA-
 RIX. Cal. campanif. 5-part. Petal. 5. Caps. 1-locul. 3-valv. Sem. papposa. Stam. etiam. 10.
1. *gallica*. T. fl. pentandris: (fol. tenuioribus). *Syst. veg.*

*ed. 14. Mill. ic. tab. 262. f. 1. Black. tab. 331.
f. 2. Loh. ic. 218.*

In Gallia, Hispania, Italia, Russia 24.

Arbusc. cortice cinereo. Fol. Cupressiform. tenuiss. imbricata, dilute virid. Fl. terminal. racemosi. Differt a sequenti fol. multo minoribus, acutioribus, densius imbricat. virid. ramis florigeris horizontal. folio fl. singulis subiecto, albidu, pellucido, aristato.

2. germanica. T. fl. decandris : (fol. crassioribus). Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 262. f. 2. Fl. Dan. tab. 234. Black. tab. 331. Loh. ic. 218.

Myrica. Cam. epit. 74.

In Germania locis inundatis 3.

Fol. maiora, glauco--cinerea, & crassiora quam in priore. Rami florigeri recti. Fl. duplo majorius peduncul. Cal. ex 5 foliol. imbricatis, viridibus &c.

orientalis. T. ramis, & ramul. articulat. ramorum vaginis cylindric. acumine unico squamiformi. Forsk. Æg.

In Arabia 3.

Differt a *T. gallica*, cuius rami squamati, squamis alternis, sessilibus, lanceolat. ramuli breves imbricat. foliol. confertis, lanceol.

454. XYLO- Cal. 5--part. colorat. Cor. o. Stigmata lacera.

PHYLLA. Caps. 3-locul. Sem. gemina.

Fl. hermaph. & fem. in eodem caul. Hompton. Journ. des Scavans. 1785.

1. longifolia. X. fol. linear. ramis 4-gonis. Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. 7. tab. 12.

In India Orient. 3.

Caul. suffruticos. laevis. Rami alterni, stricti, angulis acutis. Fol. alterna, saepe bina, striata, laetitia, subcarinata, alterne, & remotiss. ferrata, ferraturis floriferis. Fol. summa, longa, angusta, acumin. primaria 14--18--pollic. longa, semidigit. lata. Primarium folium dividitur in lateralia. Fl. ad apices prope crenas folior. Cal. ruber. Caps. ut bacca Lauri, oblong--rotun. virid.

2. latifolia. X. fol. lanceol. ramis teretibus. Syst. veg. ed. 14. Phyllanthus &c. Comm. hort. I. tab. 102. Seb. thes.. I. tab. 13. f. 2. Catesb. car. 2. tab. 25.

Filicifolia &c. Pluk. alm. tab. 247. f. 4. & tab. 36. f. 7.

In Amer. calidiore, Surinamo &c. ♂.

Frutex 2--ped. ramosus. Fol. ad plurimum spithamam longa, lata ad dimidiam unc. sessil. mucronata, sature virent. nitida, rigida, magna ex parte arcuata, seu falcifor. rariter crenata, & præcipue ad apicem. Fl parvi, sanguinei, cum punctul. albicantibus.

455. TURNE-Cal. 5--fid. infundibul. exter. 2--phyll. Petal. 5. RA. calyci inserta. Stigm. multifida. Caps. 1-locul. 3-valv.

1. *ulmifolia*. T. fl. sessil. petiolaribus: fol. basi biglandulos. Syst. veg. ed. 14. Hort. Cliff. tab. 10. Mart. cent. tab. 49.

Cistus &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 127. f. 4. 5.

b. *T. frutescens*. Mart. cent. tab. 49. Mill. ic. tab. 268. f. 2.

In Jamaica, & Amer. calidiore ♂.

Caul. 1-2-ped. frutesc. scaber. Fol. alterna, subpetiol. ovat-lanc. Ulmiformia, serraturis alterne profundioribus, utrimq. pubescent. Fl. lutei in medio petiolor. Var. b. cor. minor, petalis mucronatis. Bract. absque glandulis. Fol. obtusiora. Anth. fulvae, nec flavae.

2. *Pumila*. T. fl. sessil. petiolaribus: fol. eglandulos. Syst. veg. ed. 14.

Chamæcistus &c. Pet. gaz. tab. 38. f. 9. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 227. f. 6.

In Jamaica ☽.

Caul. vix pollic. simpl. albo-pilosus. Fol. alterna, petiol. lanceol. semipinnatif. serraturis profundis, utrimq. 5-6. integris, acutis, pilis raris adspersa. Cal. bract. 2. linear. Petal. lutea. Anth. non ultra faucem calyc. elevatae.

3. *fidoides*. T. pedunc. axillar. bisetis: fol. obovato-cuneat. serratis. Syst. veg. ed. 14.

In Brasilia.

Caul. palm. simplic. pilosi. Fol. alterna, subsessil. profuude serrata, ad basin integerr. utrimq. levissime tomentosa, subtus venis, margineq. pilosa. Fl. solitar. Bract. in peduncul. 2. oppositæ, linear. hirtæ. Cal. turbinat. pilosus. Petal. obovat. Convenit cum sequenti caul. piloso, sed illa caret bracteis, tomentoq. foliis.

4. cistoides. T. pedunc. axillar. aphyll. fol. apice serratis. Syst. veg. ed. 14.

Helianthemum &c. Pium. sp. 7. ic. 150. f. 1.

Chamæcistus &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 127. f. 7.

In Amer. meridion. Jamaica &c. O.

Diffrerit a priore bracteis nullis, & fol. non tomentosis. Caul. erect. digital. simpl. pilosus. Fol. alterna, subpetiol. lanceolat. ad apicem paucis crenis notata, scabra, punctata, subitus tomentosa. Pedunc. solitar. 1-fl. geniculo notati. Cal. tomentosus. Petal. lutea. Caps. subrotund.

5. racemosa. T. racemis terminal. elongatis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 94.

Habitat . . .

Diffrerit a T. cistoide latitudine fol. & racemo florigerio. Caul. erectus, ramosus, teres, una cum petiol. ramis, & peduncul. pilis longis obsitus. Fol. alterna, petiol. longe ovata, vel lanceol. obtusa, vel acuta, rugosa, ad nervum subitus subhirsuta. Pedunc. axill. longi, solit.r. 1-fl. Petal. obverse ovata, obtusiss. patentia, lutea. Caps. subrotund. depressa, villosula.

rupestris. T. fol. linearibus, serrat. Aubl. Guian. tab. 113. f. 1.

In Guiana H.

Fruticul. 3-ped. ramosus. Fol. alterna, sessil. Fl. axill. solitar. exigui. Cor. lutea.

frutescens. T. fol. lanceol. serrat. Aubl. Guian. tab. 113.

In Coribæis H.

Frutex 8-ped. ramosus. Fol. alterna, subsessil. acuta, e luteo-virent. Fl. axill. solitar. exigui. Cor. lutea.

Guianensis. T. fol. linearibus, serratis: fl. spicat. Aublet. Guian. tab. 114.

In Guiana H.

Caul. 2-ped. subhirsuti. Fol. alterna, sessil. Fl. terminal. breviter peduncul. Cor. flava. Caps. sub 3-gon. 3-valv. Sem. rugosa.

456. TELE- Cal. 5-phyll. Petal. 5. recep'tac. inserta, æqualia. PHIUM. Caps. 1-lokul. 3-valv. polysper.

I. Imperati. T. fol. alternis. Syst. veg. ed. 14. Clus. hist. 2. pag. 67.

In Gallo-provincia, Helvetia &c. 24.

Caul. procumbent. toti foliosi. Fol. obverse ovata, glauca, nervis in caulem decurrent. imma rotundiora. Fl. terminal. umbellati, albi.

2. oppositifolia. T. fol. oppositis. Syst. veg. ed. 14. Shaw. afric. lumen. f. 572.

In Barbaria.

Apices ramulorum. *Heliotropii* instar reflectuntur. Petal. parva.

457. CORRI- Cal. 5-phyl. Petal. 5. Sem. 1. triquetrum, nudum, calyc. conuentum.

GIOLA. C. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 334. Polygonifolia. Dill. giss. app. tab. 3. Ephem. N. C. cent. V. VI. app. tab. 9. f. 20.

Alsine &c. Lind. als. tab. 2. C.

Polygonum &c. Bauh. hist. 3. pag. 379. Moris. hist. 2. f. 5. tab. 29. f. 1.

In Galliae, Germaniae, Helvetiae arenosis, mari proximis ☺.

Caul. prostrati, vix palmar. ramosi. Fol. alterna, sessil. lanceol. integerr. Stipul. binatæ, acutæ, argenteæ. Fl. racemosi, in ultimis ramis congesti; interdum axill. Calyc. segment. ala membranac. alba, vel fusca aucta. Petal. oval. alba.

repens.

C. fol. ovat-lanceol. fl. capitatis. Forsk. Suppl. Aeg.

In Arabia.

Caul. repentes, articulati. Fol. ad genicula verticillata, crassa, setula terminata, semipollig. numeri incerti. Squam. membranac sub foliis. Rami axill. floriferi. Fl. subquini. Petal. calyce breviora. *Omnia signa nori gen. habet.*

albella.

C. fol. oppositis: stipul. hyalinis. Forsk. Aeg.

In Arabia.

Tota planta alba adparet. Caul. prostrati, dichotomi. Fl. conferti, sessil. Petal. mucrone setiformi, extus sub apice.

458. PHARNACEUM. Cal. 5-phyl. Cor. o. Caps. 3-locul. polysper.

1. Cerviana. P. pedunc. subumbellat. lateralibus, folia linearia æquantibus. Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 20. f. 2.

Alline &c. Pluk. mant. 9. n. 332. f. 11.

Spergula &c. Buxb. cent. 3. tab. 62. f. 2.

PENTANDRIA TRIGYNIA:

P. umbellatum. *Forsk.* *Æg.* *Vahl.*

In Russia, Hispania, Asia ⊖.

Caulic. palm. raro longiores, simpl. vel ramosi, 3-4. articulati. Fol. ex infer. geniculo 10-14. sessil. obtusa, crassiusc. plana, glauca: secundum genicul. fol. 5. inæqual. in superioribus geniculis numerus fol. minuitur. Ramuli axill. Fl. clausi. Fruct. 3-gonus.

2. *Mollugo*. *P. pedunc.* 1--fl. lateralibus: fl. longitudine fol. caul. depresso. *Syst. veg. ed. 14.*

Mollugo &c. *Burm. Ind. tab. 5. f. 4.*

Al sine &c. *Burm. Zeyl. tab. 7. Herm. Lugd. tab. 21.*

Rubia &c. *Pluk. man. tab. 331. f. 4.*

In India orient. ⊖.

Caul. procumb. herbac. dichotomi, articulati, teretes, fere læves, Fol. verticillata, 4-5. inæqual. subpetiol. elliptico-lanceol. acutiuscul. subcarnosa. Pedunc. ad verticill. fol. 4-5. 1--fl. albi. Cal. supra albus. Petal. minutiss. linear. angustiss. semi 2-fid. *Planta tota facie simil. Illecebrosa ficoideo.*

3. *depressum*. *P. pedunc.* 1-fl. lateralibus: fol. lanceol. pubescens. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 334. f. 4.*

Lœflingia indica. *Retz. Obs. fasc. 4.*

In India orient.

Planta Mollugini simil. Caul. numerosi, prostrati, spitham. depresso, simplic. teretes, pubesc. Ramorum rudimenta axill. alterna. Fol. quaterna, aut bina, ex axill. plura, subsessil. basi angustiora. Stipul. solitar. parvæ, membranac. Panic. fere terminal. dichotomæ, inæqual. Fl. subsessil. (purpurei. *Retz.*) cinerei, scarioso-membranac.

4. *serpyllifolium*. *P. pedunc.* 1--fl. fol. ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Planta tenera, fol. & caud. Herniaria glabra minor.

Caul. filiform. articulati, glabri, ramosi, dichotomi. Fol. opposita, & plura, petiol. internodiis multo breviora. Pedunc. lateral. capillares, longitudine fol.

5. *incanum*. *P. pedunc.* commun. longiss. fol. linear. stipul. pilosis. *Syst. veg. ed. 14. An Pluk. phytog. 304. f. 4.?*

In Africæ.

Caul. erectus, prolifer. Rami albidi. Fol. sparsa, solitar. lævia, patula. Stipul. albae. Pedunc. terminal. Umbella composita, prolifera. Fl. albi, extus virid.

6. *difllichum*. P. racem. 2-partit. flexuosis: fol. sublinear. pubescentibus. Syst. veg. ed. 14.

Alsine &c. Pluk. mant. tab. 33. f. 4. alm. tab. 130. f. 6.

In India orient.

Fol. angusta.

7. *cordifoli-um*. P. racem. 2-partit. terminalibus: fol. obcordat. Syst. veg. ed. 14. Am. acad. 6. aſr. 6.

Ad cap. b. Spei.

Caul. pedal. prostrati, articulati; squamul. membranac. congestis. Rami alterni. Fol. plurima, verticill. integerr. glabra. Fl. albi, magnitudine *Spergula arvensis*.

8. *lineare*. P. umbell. inæqualibus: fol. linear. oppositionibus remotis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Planta Spergula arvensis maior. Caul. prostratus, articulat. lævis, dichotome ramosus. Fol. plura, verticill. obtusa, lævia, pollic. Umbell. lateral. & terminal. solitar. peduncul.

9. *glomeratum*. P. caul. flexuoso: fol. linear. fl. glomerat. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Pluk. mant. tab. 331. f. 4.

In Æthiopia. ☽.

Caul. herbac. læves. Fol. plurima, verticillata; acuta, lævia, glabra. Fl. ad verticillos, parvi, minutiss. peduncul. præter umbellam glomeratam, foliosam. *Facies Molluginis*.

10. *quadrangulare*. P. subfruticos. fol. linear. 4-fariam imbricatis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei ♂.

Facies Ericæ. Fol. minuta, acerosa, lævia. Panicul. terminal. parvæ, conglomeratæ. Fl. albi, extus virides.

11. *microphyllum*. P. tomentosum: fol. ovat. teretiuscul. obtusis, lana intertextis: peduncul. umbellat. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

12. *dichotomum*. P. fol. verticillat. linear. pedunc. axillar. elongatis, dichotomis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

- 13. albens.** P. fol. linear. exstipulat. peduncul. communibus longiss. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei ♂.
 Fruticul. caulis albis. Fol. opposita, patentia, oppositionibus remotis. Stipul. nullæ.
- 459. ALSI-
NE.** Cal. 5-phyll. Petala 5. bipart. æqualia. Caps. 1-locul. 3-valv. polysper.
- 1. media.** A. petal. 2-part. fol. ovat-cordat. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 525. 438. Black. tab. 164. Dod. pempt. 29. Loef. ic. 460. Matth.*
In Europæ cultis ♂.
 Caul. ped. debilis, ramosus. Fol. opposita, imma petiolat. super. sessil. connata, integerr. succulenta. Pedunc. axill. 1-fl. Petal. plana, alba. Caps. conica. Stam. num. varia.
Ad Stellariam pertinet, cum styli semper 3.
- 2. segetalis.** A. petal. integris: fol. subulat. *Syst. veg. ed. 14. Vaill. Paris. tab. 3. f. 3.*
Habitat Parisus, & in Pedemontio ♂.
 Fol. unilateral. Stipul. vaginant. membranac. Fl. umbellati. Petal. alba.
- 3. mucronata.** A. petal. integris, brevibus: fol. setaceis: calyc. aristatis. *Syst. veg. ed. 14. Hall. Helv. tab. 17.*
In Helvetia, Gallia.
Planta difficillima ob similes, uti Arenaria fasciculata, & Minuartia montana. Caul. cespitosi, pedal. ramosi, subhirsuti. Fol. fasciculata, longa, connata, acutiss. Fl. in iunioribus plantis axillar. in adultis quasi umbellati. Cal. albus, stria viridi. Petala ovata, alba.
-
- graminifolia.** A. (Arenaria) fol. lanceol. rigidis, hirsutis: caul. erecto, (plerumq.) 3-fl. *Arduin. Specim. 2. tab. 10.*
In altissim. montibus Feltrinis Vette.
 Caul. plurimi, simpliciss. subincani, 5 plerumq. genicul. Fol. radical. plurima, in cespitem imbricata, sesquiuic. longa: caulina opposita, lanceol. amplexicaul. Cor. alba. Styl. 4-5.
- prostrata.** A. caul. prostrato, dichotomo: fol. oblong. fl. pentandro, trigyno. *Forsk. Suppl. Æg.*
In Arabia.
- 460. DRYPIS.** Cal. 5-dentat. Petal. 5. Caps. circumscissa, 1-sperma.

- 1. spinosa.** D. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 49. Mich. gen. tab. 23. fig. mala, cum sit erecta. Dalech. hist. 1480. Lob. ic. 789. Tabern. ic. 144. Bauh. hist. 3. pag. 388.
Carduus &c. Moris. hist. 3. f. 7. tab. 32. f. 8.
In Italia, Hispania, Mauritania ♂.
 Caul. primi procumbent. 4-goni, ramosiss. brachiati, superne dichot. cubital. Fol. Juniperina, subulata, subtrigona, mucronata, dichotomiae lanceolat. utrimq. 3-dent. Cor. ex carneo-albescens.
- 461. BASEL-** Cal. o. Cor. 7--fid. lacin. 2. opposit. latioribus;
LA. tandem baccata. Sem. 1.
- 1. rubra.** B. fol. planis: peduncul. simplicibus. Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 2. tab. 98. Hort. mal. 7. tab. 24.
Gandola rubra. Rumph. amb. 5. tab. 154.
In India ♂.
 Caul. volubil. ruber. Fol. longe petiol. ovata.
 Cal. crassis, albus, apice purpurasc.
- 2. alba.** B. fol. ovatis, undatis: peduncul. simplic. folio longioribus. Syst. veg. ed. 14.
Gandola alba. Rumph. amb. 5. pag. 417.
Mirabiri &c. Pluk. alm. tab. 63. f. 1.
In China, Amboina ♂.
 Caul. herbac. perennis, viridis. Flos albus.
- 3. lucida.** B. fol. subcordat. peduncul. conferitis, ramosis.
 Syst. veg. ed. 14.
In India ♂.
 Color plantæ lucidus. Adfines sunt hæ 3 sp., sed constantes reperiuntur in hortis.
-
- japonica.** B. fol. rhomboeo-ovat. peduncul. simplic. subdichot.
Burm. Ind. tab. 39. f. 4.
In Japonia ♂.
 Reliquis triplo min. Fol. ut in *Chenopodium Vulvaria*. Peduncul. semipollis. 1-fl. raro dichotomi.
- 462. SARO-** Cal. 5-part. Cor. 5-petal. Caps. 1-loc. 3-valv.
THRA. colorata.
- 1. Gentiano-** S. Syst. veg. ed. 14.
ides. *Centaurium minus &c. Pluk. mant. tab. 324. f. 4.*
In Virginie, Pensylvaniæ apricis glareofis ♂.
 Caul. erectus, palmar. brachiatus, ramosiss. Fol. mitiima, opposita, subulata. Fl. solitar. alterni, sessil. flavi. Fructus parvi, elliptici, rubri.
Odor Pini graveolens. Vis vulneraria.

TETRAGYNIA.

463. PAR-
NASSIA. **C** Al. 5-part. Petal. 5. Nectar. 5. cordata , ci-
liata , apicibus globosis . Caps. 4-valv. 4-locul.
loculis polysper.
Effentia gen. in nectariis.
1. *palustris*. P. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 584. Ludw.
ed. tab. 110.
Pyrola &c. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 10. f. 3.
In Europæ uliginosis , & ad rivulos 24.
Scap. ped. simpl. parum contortus , angulosus ,
rigidus . Fol. radical. multa , petiol. rubentibus ,
cordat-acuta , integerr. glabra , pallide virent.
Fol. caulinum plerumq. solitar. Flos terminalis ,
unicus , albus ; quandoq. plenus .
-
- polynectaria*. P. fol. linear-lanceol. Nectar. 10-setosis . Forsk.
Suppl. Aeg-Arab.
In Arabia.
Caul. decumbent. pedal. ramosi , inferne violac.
superne virides . Fol. semipollic. opposita , sessil.
Pedunc. 1-fl. Cor. alba , nervis violac. subtus
in medio violacea .
464. EVOL-
VULUS. Cal. 5-phyll. Cor. sub 5-fid. rotata . Caps. 3--
locul. Sem. solitar.
1. *nummularius*. E. caul. repente : fol. subrotund. fl. subsessilibus .
Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. pict. tab. 260. f. 23.
Convolvulus &c. Sloan. Jam. hist. I. tab. 96. f. 2.
In Jamaicæ , Barbados pratis .
Caulicul. longi , radicant. Fol. unc. longa , se-
munc. lata , alterna , petiol. fuscis , apice cre-
nata . Fl. axillar. solitar. dilute coeruleo. carnei ,
vel albi . Caps. fusca .
2. *gangeticus*. E. caul. diffuso : fol. cordat. obtusis , mucronatis ,
villosois , petiolat. pedunc. 1-fl. Syst. veg. ed. 14.
In India.
. Caul. 2-ped. ramosi . Fol. tenella , & fl. villosiss.
Pedunc. breves , capillar.
3. *alsinoides*. E. caul. diffuso : fol. obcordat. obtusis , pilosis ,
petiolat. pedunc. 3-fl. Syst. veg. ed. 14.
Anagallis &c. Burm. Zeyl. tab. 6. f. 1. & tab. 9.
f. 1. Pluk. alm. tab. 9. f. 1.
Visnū-clandi . H. Mal. II. tab. 64.
In Malabarica , Zeylona &c. ♂.

Tota planta hirsutie rufa. Caul. ramosus. Fol. alterna, breviter petiol. Fl. axillar. longe peduncul. pro plantæ ratione magni, cœrul.

4. emarginatus. E. fol. reniform. repandis, emarginatis. Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 30. f. 1.

In India ⊖.

Caul. radicant. filiform. glaberrimi. Fol. alterna, petiol. Fl. axillar. parvi, solitar. Caps. glaberrima.

5. linifolius. E. caul. erecto: fol. lanceol. sessil. villosis: pedunc. longis, 3-fl. Syst. veg. ed. 14.

Convolvulus &c. Brown. Jam. 10. f. 2.

In Jamaica ⊖.

Facies Lini. Cor. cœrul.

6. 3-dentatus. E. fol. linearis-cuneiform. tricuspidat. basi dilatata, dentat. pedunc. 1-fl. Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 16. f. 3.

Convolvulus &c. Pluk. mant. tab. 167. f. 5.

Sendera--Claudi. H. Mal. 11. tab. 65.

b. C. indicus &c. Pluk. alm. tab. 276. f. 6.

In India.

Caul. pl. volubil. 5-angulati, glabri, viridi-fuscous. Fol. alterna, glabra. Fl. axillar. longe peduncul. Cor. ex albo-flavesc. ad umbilicum purpuro-rubra. Caps. cuspidata.

hederaceus. E. fol. cordat. repandis: pedunc. sub 3-fl. Burm. Ind. tab. 30. f. 2.

In Java.

Caul. volubil. Fol. infer. cordat-acumin. super. obtusa. Pedunc. infer. 1-fl. superior. 3-fl. Cor. parva, lutea. Caps. subglobosa, glaberrima.

PENTAGYNIA.

465. ARALIA. Involuc. umbellulæ. Cal. 5-dent. superus. Cor. 5-petala. Bacca 5-sperm.

i. arborea. A. caul. arboreo: fol. simplic. umbell. universal. radiis uniglandulos. Syst. veg. ed. 14.

Hedera &c. Plum. ic. 148.

In Jamaica ♂.

Arb. 15-ped. odore ingrato. Fol. alterna, petiol. ovalia, acumin. ferrata, utrimq. nitida. Stipul. lanceol. Racemi terminali. erecti. Involuc. 1-phyll. Fl. parvi. Petal. sordide albescentia. Baccæ globosæ, sulcatæ, & coronatæ.

2. spinosa. A. arborescens; caule, foliisq. aculeatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Angelica &c. *Comm. hort. I. tab. 47.*

Chrystophoriana &c. *Pluk. alm. tab. 20.*

In Virginia ♂.

Fol. ampla, impari-pinn. ad instar *Angelicæ*, sicuti & foliol. quæ breviter petiol. ovalia. Fl. in acervis sparsi, parvi, herbacei. Baccæ 3-gon.

3. pentaphyl- A. arborea, aculeata: fol. quinatis. *Syst. veg. la. ed. 14. Thumb. Jap.*

Dara. *Kæmph. am. exot. Fusc. V. p. 895.*

In Japonia ♂.

Rami flexuosi, aculeati, cinerei. Aculei axillar. solitarii, horizontal. Fol. e geminis 3-4-plura, petiol. Foliol. subpetiol. ovata, acuta, superius ferrata, inferius integra, attenuata, inermia, glabra; infer. min. intermedium maximum, pollicar. Petoli patentes, palmar. Fl. inter fol. umbellati. Umbella simplex, pedunculata.

4. chinensis. A. frutesc. caul. petiolisq. aculeatis: foliol. inermibus, villosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Nalugu. *H. Mal. 2. tab. 26.*

Frutex &c. *Rumph. Amb. 4. tab. 44.?*

In China ♂.

Caul. simpl. apice tantum foliosus. Petoli 3-part. Fol. partialia pinnata, & insuper foliol. 3 ad ramificationes petoli. Pinnæ ovatæ, ferratæ, subtus præsertim villosæ, duplo ma: quam in *spinosa*. Panicul. ramosa, umbellul. numerosis.

5. japonica. A. frutesc: fol. lobatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

Jaats Ta. *Kæmph. am. exot. Fusc. V. p. 790.*

In Japonia ♂.

Caul. fruticos. erectus, orgyal. inerm. Fol. in apice frequentia, alterna, petiol. inciso--7--lobat. iuniora 5-loba, adultiora 3-4. duplo ma: nervosa, reticulata, supra virid. subtus pallida: lobi digital. incisuris rotundat. a medio ad apicem ferrati, acuti. Petiol. amplexicau!. Bract. plurimæ. Fl. terminal. paniculati. Pa-

nicul. composita. Umbell. simplex, subrotund.
Petal. lineam longa, alba.

6. *racemosa*. A. caul. folioso, herbac. lœvi. *Syst. veg. ed. 14.*
Panaces. *Corn. Can. tab. 75. Barr. ic. 705.*
Chystophoriana &c. Morij. hist. 3. f. 1. tab. 2.
f. 9.

In Canada 24.

Rad. tuberosa, crassa, aromatica. Caul. articulat.
obscure purpur. Fol. bina, terna, petiol. mu-
cronata, ferrata. Fl. axillar. racemosi. Petal.
alba. Baccæ fature rubentes.

7. *nudicaulis*. A. caul. herbac. subnudo: fol. binis, ternatis.
Syst. veg. ed. 14.

Christophoriana &c. Pluk. alm. tab. 238. f. 5.

In Virginia 24.

Radix repens, aromatica. Caul. brevissim. & fere
nullus. Fol. decomposit. petiol. longis. Foliol.
pinnata: pinnæ 5. ferratæ. Scapus inter 2. fol.
ortus, 3. umbellulas ferens.

cordata.

A. herbacea, caul. angulato, inermi: fol. sim-
plicibus, cordatis. *Thumb. Jap.*

Dosjen. Kœmph. am. exot. Fasc. V. p. 826.

In Japonia 24.

Caul. suffruticos. adscendens, parum ramosus,
angulatus, villosus. Fol. 2--pollic. inæqual.
alterna, petiol. acuta, ferrato--dent. utrimq.
glabra, subtus pallida, nervosa. Fl. axill. um-
bellati. Pedunc. trichotomi, & pedicelli to-
mentosi.

capitata.

A. caul. arboreo: fol. simplic. fl. in capitula con-
gestis. *Jacq. Amer. tab. 61.*

In sylvis Martinicæ 3.

Arb. altitudine varia, ramosa. Fol. magnitudine
varia, in ramulorum apice alterne sparsa,
petiolat. coriacea, rhombeo--ovata, vel obo-
vata, acumin. basi attenuata, integerr. nitida.
Panicula terminal. erecta. Ultimi fl. in capi-
tulum globosum collecti.

466. COM- Cal. 1-phyll. corollifer. Petal. 5. Nectar. 5-part.
MERSONIA. Caps. 5-locul. echinata.

1. *echinata*. C. *Syst. veg. ed. 14. Forst. Gen.*

Restiaria alba. Rumph. 3. Amb. tab. 119.

In Tahiti 3.

Arbor fol. alternis, oblique ovat. acuminat. ser-

ratis, subtus canis. Fl. paniculati, minutti, cani. Fruct. simillim. *Spermanniæ* tam quoad fig. quam superficiem.

467. STATI- Involuc. universale varium. Cal. proprius infundibuliform. limbo integro, plicato. Petal. 5 sensim dilatata, & iuxta se posita, infundibulum referentia. Fruct. stellatus, 1-sperm. ex calyce persistente.

1. Armeria. S. scapo simpl. capitato: fol. linear. *Syst. veg.* ed. 14.

Limonium &c. Moris. hist. 3. f. 15. tab. I. f. 29. In Europæ, & Amer. septentrion. campis, & colibus saxosis 24.

Scapus semiped. nudus. Fol. radical. conferta, integerr. nervo simplici, lète virid. Capitul. terminal. globosum, convexum. Fl. amæni, dilute purpurasc.

2. Pseudo-armeria. S. scapo simpl. capitato: fol. longe lanceol. *Syst. veg.* ed. 14.

S. plantaginea. *All. Fl. Ped.*

S. armeria ma: *Jacq. hort. I. tab. 42.*

S. Lusitan. *Scorzonera* fol. *I. R. H.*

Habitat in Pedemontii vallibus, & montibus 24. Priore quadruplo maior. Fol. nervosa, subincisa. Cal. squamis lanceol. acuminat. Cor. alba, antr. cœrul.

3. Limonium. S. scapo paniculato, tereti: fol. enerviis, lèvibus, subtus mucronatis. *Syst. veg.* ed. 14. *Fl. Dan. tab. 315. Black. tab. 481.*

Limonio. Matth.

In Europæ, & Virgin. maritimis 24.

Rami simplic. Fol. radical. sessil. lanceol: integerr. glabra. Fl. numerosi, secundi, purpurasc. *Mire variat, præsertim fol.*

4. incana. S. scapo paniculato: fol. lanceol. trinerviis, subundulat. apice mucronatis: panicul. ramis triquetris. *Syst. veg.* ed. 14.

In Arabia 24.

Fol. radical. elliptico-lanc. incana. Scap. teres. Cal. acutus, albus, striis 5. virid. Bract. 3-4. subulatæ, breves, patulæ. Fl. albi.

5. cordata. S. scapo paniculato: fol. spathulat. retusis. *Syst. veg.* ed. 14.

Limonium &c. Barr. ic. 805.

Ad maris Mediterran. littera 24.

An Var.

An Var. S. Limonii? Caulicul. spitham. Cal. albus, angulis rubent. Cor. purpuro-cœrul.

6. *reticulata*. S. scapo prostrato, paniculato: ramis sterilibus, retroflexis, nudis: fol. cuneiform. muticis. *Syst. veg. ed. 14.*

Limonium &c. Bocc. Sic. tab. 44. Pluk. alm. tab. 42. f. 4.

In Melita.

Caul. reticulat. fusco-rubens. Fol. obscure vi- rent. glabra, duriora. Rami retiformiter se invicem implicati. Fl. parvuli, purpurasc.

7. *echioides*. S. scapo paniculat. tereti, articulato: fol. scabris. *Syst. veg. ed. 14.*

Limonium &c. Magnol. Monsp. tab. 2. f. 4.

In squallidis, & saxosis montibus Monspelii ⊖.

Caul. erect. palm. nudus, squamosus, sæpe ru- bens. Fol. in rosulam disposita, obovata, ob- tusa, quædam emarginata, rubentia. Fl. alterni, remoti, sessiles, secundi. Cor. parva, purpur-cœrul.

8. *speciosa*. S. scapo dichotomo, ancipi: fol. ovat. mucro- nat. fl. adgregatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Limonium &c. Gmel. Sib. 2. tab. 91. f. 1.

In Tataria ♂.

Caul. palm-cubital. subramos. sæpe alatus, sæpe nudus. Fol. in orbem disposita, supra obso- lete virid. subtus purpur. utrimq. albo-punctata, quandoq. lanceol. in spinam terminata. Cal. integer, albus. Cor. purpur. linea saturore.

9. *tatarica*. S. scapo dichotomo: fol. elliptico-oblong: mu- cronat. fl. alternis, distantibus. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 2. tab. 92.*

Limonium &c. Boerh. Lugd. 1. tab. 76.

In Tataria ♂.

Caul. ab exortu ramosus. Fol. longa, petiol. glaberr. in spinulam mollem terminata. Cal. pli- catus. Cor. primum rubella, dein alba.

10. *Echinus*. S. scapo paniculato: fol. subulat. mucronat. *Syst. veg. ed. 14.*

Limonium &c. Buxb. cent. 2. tab. 10.

b. Echinus &c. Alp. exot. tab. 56.

In Græciæ, & Mediæ desertis.

Scap. simpl. Fol. imbricata, subulata, supra plana, margine scabra; inferior. reflexa: Cor. amæ- ne purpurasc.

11. flexuosa. S. scapo flexuoso, ramoso: fol. nervosis: corymbis terminal. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 2. tab. 89. f. 1. male.*

In Siberia.

Rad. palmo longior, extus fusca, intus alba. Fol. radicalia, in orbe in positâ, 2-3. unc. longa, quandoq. verticaliter ovata, & tunc ultra dimidiâ unc. lata, quandoq. oblonge ellipt. omnia obtusa, læte virid. cæteris speciebus tenuiora. Scap. dodrant. dichotome divisus, squamosus. Capitul. 1-2-3. subrotunda. Cal. maiusc. totus albus: squamæ vero huic subiectæ rubenti-albo colore mixtæ. Cor. minim., atro-cœrul.

12. purpurata. S. caul. subfoliat. fol. obovato-cuneat. mucronat. trinerviis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cop. b. Spei 24.

Simil. *S. Limoniu.* sed fol. obtusiora. Fol. caulinæ nonnullæ. Fl. duplo m: colorati. Scap. spitham. dichotomo-radiosus. Fol. radical. obovato-lanc. obtusa, mucrone terminali, petiolat. lævia. Scap. ramatus. Bract. solitar. ovatæ. Cal. purpurasc. radiis 5. sanguini. Cor. purpurasc.

13. minuta. S. caul. suffrutic. folioso: fol. confertis, cuneat. muticis, glabris: scapo paucifl. *Syst. veg. ed. 14.*

Limonium &c. Bocc. Sic. tab. 34. & tab. 13. f. 3. Pluk. alm. tab. 200. f. 5.

Ad mare Mediterran. h.

Caul. vix digital. Fl. pallide rubent.

14. suffrutico-sa. S. caul. fruticoso, superne nudo, ramoso: fol. lanceolat. vaginantibus: capitul. sessil. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 2. tab. 88. f. 2. 3.*

In Siberia h.

Caul. multi, semiped-dodrant. procumb. dein erecti, ramosi. Capitul. alterna. Cal. albido-fuscus. Cor. pallide cœrul.

15. monopeta- S. caul. fruticoso, folioso: fol. lanceol. vaginantibus: fl. solitar. *Syst. veg. ed. 14.*

Limonium &c. Bocc. Sic. tab. 16. 17.

In Sicilia h.

Caul. spitham. multigenicul. dichotom. Pedunc. erecti, sæpe bini, spicati. Bract. puniceæ. Spic. alternæ, sessil. 3-fl. Cal. violac. Cor. 5-

fid. violac. *Gallas* s^æpe fert ex *Phalæna*. *Reaum.* *Ins.* 3. *tab.* 39. *f. 1.* 4.

16. aurea. S. caul. frutic. folioso, ramoso: fol. (caulinis) subulat. *Syst. veg. ed.* 14.

Limonium &c. Amm. ruth. tab. 18. f. 2.

In Dauriæ campis montosis.

Fol. radical. petiol. ovata. Fl. corymboso-fascicul. Cal. aureus.

17. ferulacea. S. caul. fruticoso, ramoso, ramulis imbricat. paleis apice pilo terminatis. *Syst. veg. ed.* 14.

Limonium &c. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 1. f. 23. Pluk. alm. tab. 28. f. 4.

In Barbaria, Lusitania, Hispania ♂.

Caul. sublignosi, teretes, nudi, paleis alternis, paniculati. Fl. subimbricati, adscendent. secundi, lutei.

18. linifolia. S. caul. fruticoso, prostrato: fol. linear. fl. paniculat. secundis. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Suppl.* *Ad cap. b. Spei.*

19. pruinosa. S. caul. flexuoso, ramoso, furfurac. *Syst. veg. ed.* 14.

S. aphylla. *Forsk. Æg. Vahl.*

In Palæstina, & Arabia.

Planta tota furfuracea. Rami ramulis geminis, obtusis, paniculat. Stipula sub singulo ramo lanceol--subulata.

20. sinuata. S. caul. herbac: fol. radical. alterne pinnato-sinuatis: caulinis ternis, triquetris, subulat. decurrentibus. *Syst. veg. ed.* 14.

Limonii &c. Rauw. it. tab. 314.

Limonium &c. Clus. cur. tab. 33.

b. L. africanum &c. Mart. cent. tab. 48.

In Sicilia. Palæstina, Africa ♂.

Cal. coeruleus. Cor. nivea. *b. Fol. minus sinuata:*

21. mucronata. S. caul. crispo: fol. elliptic. integris: spicis secundis. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Suppl. Hertier.*

Stirp. nov. fasc. 2. tab. 13.

In Barbaria 24.

Adfinis priori, præcipue caul. crispis: & fl. secundis. Fol. radical. pollic. petiolat. valde mucronata, laevia, atomis albis adspersa. Caul. palmar. aphylli, membranulis longitudinal. decurrentibus ad proximam bracteam, angustis, undulat. apice mucronat. superne ramis simplic. spicatis. Spicæ dimidiatae, fl. confertis, sessil.

gluma exceptis. Cal. albi. Cor. rufesc. lacin.
emarginatis.

- 22. lobata.** S. caulis teretibus, aphyll. fol. sinuatis. *Syst. veg. ed. 14. Lia. Suppl.*

In Africa.

Planta minor S. *sinuata*, sed caul. ramique teretes. Bract. simil. sinuatæ. Cal. albus. Cor. cœrul.

- axillaris.** S. caul. fruticoso, folioso : paniculis axillaribus, dichotom fl. confertis, erectis. *Forsk. Æg.*

In Arabia Æ.

Absq. fl. simili na S. *monopetal*. Caul. erecto-difus., spiculat. squam. ti, ferrugin. Fol. alterna, petiolis vaginant. digitum transversum longa, oval. obtusa, ruda, crassa, plana. Fl. in summis alis. Cal. ferrugin. Cor. membranac. alba, radiis 5. angularibus, ferrugineis.

- olæfolia.** S. fol. lanceol. subaristat. margin. albo : caulis dichotomis, flexuosis, subnudis. *Scop. Detic. Insul. fasi. I. tab. 10. Barr. ic. 790.*

In Amboina &c. 24.

Fol. radicalia, in petiolum decurrent. acumin. integra, marginata. Caul. erecti, unico fol. prope basin donati. Fl. terminal. dense spicati, 3 simul, unilateral. Bractea singulo flori laterali subiacens. Cor. subrubra.

- 468. LINUM.** Cal. 5-phyll. Petal. 5. æqualia. Caps. 5-valv. 10-locul. Sem. solitaria.

Filam. 5. basi membranosa communi inter se connecta.

* *Foliis alternis.*

- 1. usitatissimum.** L. calyc. capsulifsq. mucronatis : petal. crenatis : fol. lanceol. alternis : caul. subsolitar. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 2. tab. L. 9. Ludw. ed. tab. 144. Black. tab. 160.*

Inter segetes Europæ austral. ⊖.

Caul. pedal-cubit. Fol. angusta, sessil. integerr. mollia, glabra. Fl. laxe paniculati. Petal. subrotund. cœrul. albi, rosea.

- 2. perenne.** L. calyc. capsulifsq. obtusis : fol. alternis, lanceolat. integerr. *Syst. veg. ed. 14. Mill. did. tab. 166. f. 2.*

In Siberia, Cantabrigia, & Pedemontio 24.

Duplo ma. priore. Caul. magis ramosus. Fl. ma. Cor. stricta, cœrul. ut in priore, sed integra.

- 3. viscosum.** L. fol. lanceol. pilosis, 5-nerviis. Syst. veg. ed. 14.
L. sylvest. Fl. Carniol.

In montibus Italiæ &c. 24.

Fol. paulo latiora vulgari. Cor. incarnata, lituris sanguin. notata. Est eadem plantu cum sequenti.

- 4. hirsutum.** L. calyc. hirsutis, acumin. sessil. fol. alternis; rameis oppositis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 31. Scop. Fl. Carn. tab. 11. Moris. hist. 2. f. 5. tab. 26. f. 5. Clus. hist. 1. pag. 317.

In Austria, Italia, Tartaria.

Simile L. nodifloro. sed caul. teres. Fol. latiora, hirsuta. Planta hirsuta. Caul. subpedal. Fol. lanceol. aut ovata. Calyc. longi, ciliati. Petal. obtusiss. lineata, cœrul. vel albida.

- 5. narbonense.** L. calyc. acuminat. fol. sparsis, lanceolat--acumin. strictis, scabris: caul. tereti, basi ramoso. Syst. veg. ed. 14. Mont. in Lan. tab. 191.

In Gallo-provincia, Helvetia &c. 24.

Caul. pedal-cubit. Fol. variæ latitudinis, glauca, duriora quam in vulgari. Cal. magnus, lanceolat. latere membranac. apice exquisite acuminat. & quasi mucrone subulato instructus. Petal. ampla, cœrul.

- 6. tenuifoliun.** L. calyc. acuminat. fol. sparsis, lineari-setaceis, retrorsum scabris. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 215. Clus. hist. 1. pag. 318.

In Europa aridis herbosis 24.

Caul. subped. striati. Fol. firma, nitida. Fl. subpanicul. Petal. rosea, purpur. alba.

- 7. gallicum.** L. calyc. acutis, subulatis: fol. lineari-lanceol. alternis: paniculæ peduncul. 2-fl. fl. subsessil. Syst. veg. ed. 14. Ger. prov. tab. 15. f. 1.

Habitat Monspelii &c. ○.

Petal. lutea. Pistil. quandoq. 3. saepius 5.

- 8. maritimum.** L. calyc. ovatis, acutis, muticis: fol. lanceol. inferioribus oppositis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 154. Bauh. hist. 3. p. 454. Dod. pempt. 534.

In Austria, Italia, Gallia &c. locis maritimis ○.

Ad fine priori. Planta rotunda glaberr. ma. Caul. pl. pedal. & ultra, superne ramosi, toxi foliosi, ○ iii

glauci. Fol. glauca. Cor. lutea. Caps. subrotunda, acuta, glabra, apice dentata.

9. alpinum. L. calyc. rotundat. obtusis: fol. linear. acutiuscul. caulibus declinatis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 321. Clus. hist. I. p. 318. Zan. tab. 107.

In Austria &c. alpinis ⊖.

Planta tota laevis. Caul. subpedal. teretes, simplic. apice multifl. & saepe diviti. Fol. sparsa, adscendent. sessil. inferior. imbricatum reflexa, cinerea, subpilosa, mollia. Fl. non parvi. Cal. foliol. aristatis, inaequal. ora alba. Petal. aristata, non emarginata, crenulata, dilute purpur.

10. austriacum. L. calyc. rotundat. obtusis: fol. linear. acutis, recluscul. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 418. Tabern. ic. 822.

In Austria infer. Palatinatu.

Caul. diffusi, subped. teretes, apice ramosi, L. usitatiss. breviores. Fol. sparsa, glabra. Fl. ante anthesin nutantes. Petal. magna, integrerr. striata, facie L. usitatissimi, venis satirioribus, subtus pallidiora. Anth. albæ. Pistil. reflexa extra stam. Stigm. capitata.

11. virginianum. L. calyc. acutis, alternis: capsul. muticis: panicula filiform. fol. alternis, lanceol. radicalibus ovatis. Syst. veg. ed. 14.

In Virginia, Pennsylvania.

Caul. pedal. filiform. Fl. alterni, breviter peduncul. Cor. lutea. Caps. globosa.

12. flavum. L. calyc. subserrato-scabris, subsessil. lanceol. panicula ramis dichotom. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 214.

L. latifolium &c. Bauh. hist. 3. p. 454.

L. sylv. 3. Clus. hist. I. p. 317.

In Austria, Pedemontio 4.

Caul. subped. glabri, striis eminentibus angulati. Fol. sparsa, sessil. lanceol. acumin. crista, glabra, cum puncto utrimq. ut in L. campaniulata. Petal. ampla, flava, lineis croceis.

13. strictum. L. calyc. subulatis: fol. strictis, lanceol. mucronat. margine scabris. Syst. veg. ed. 14.

Passerina &c. Bauh. hist. 3. p. 454.

In Monspelii, Hispania, Sicilia &c. squallidis ⊖.

Planta corymbosa, stricta. Caul. semiped. Fol. cauli adpressa, nervo, & margine scabra, Linifulg. similia. Cor. lutea.

14. *suffruticosum*. L. caul. suffruticoso : fol. linear. acutis, scabris. Syst. veg. ed. 14. In regno Valentino ♂. Fol. aculeata.
15. *arboreum*. L. caulibus arborescentibus : fol. cuneiformi-lanceol. Syst. veg. ed. 14. Alp. exot. tab. 13. In Creta, Italia ♂. Frutex ramis angulat. Fol. alterna, sessil. avenia, glabra. Fl. magnitudine *L. vulgaris*, peduncul. Cal. foliol. aristat. Petal. subrotund. lutea. Caps. acumin.
16. *campanulatum*. L. fol. basi utrimque punctata, glandulosa. Syst. veg. ed. 14. Campanula &c. Lob. ic. 414. Bauh. hist. 2. p 817. In Gallo-provincia, Monspelii &c. montibus 4. Caul. digital. simplic. angulato-striati, saepe 5-gon. Fol. non ferrata inferior. spathul. super. *L. vulgaris*. Fl. terminal. saepe 3. magni, peduncul. Calyc. lanceol. acumin. Petal. crocea.
- ** Fol. oppositis.
17. *africanum*. L. fol. oppositis, linear-lanceol. fl. terminal. penduculat. Syst. veg. ed. 14. In Africa ♂. Caul. pedal. suffruticos. strictus, teres, ramis simplic. Fol. sessil. erecta, laevia. Umbel. terminal. 4-5-fid. radiis dichotomis. Cal. acuminat. margine scaber. Petal. lutea, unguibus villo-sis, demum fulva.
18. *nodiflorum*. L. fol. floriferis oppositis, lanceolat. fl. alternis, sessil. calyc. longitudine fol. Syst. veg. ed. 14. *L. luteum* &c. Morif. hist. 2. f. 5. tab. 26. f. II. Column. ephr. 2. tab. 80. In Italiæ pratis argillosis. Caul. angulat. laevis, 2-3-fid. Fol. utrimq. ad basin glandula ovata fusca : caulina alterna, lanceol. Cal. linearis, foliac. Cor. flavesc. Caps. globosa, acumin.
19. *catharticum*. L. fol. oppositis, ovat-lanceol. caule dichot. cor. acutis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 851. Black. tab. 368. Ludw. et. tab. 143. Chamælinum &c. Barr. ic. 1165. Spergula bifolia &c. Loef. pruss. tab. 86. Alline verna &c. Bauh. hist 3. p. 55. In Europæ pastuis succulentis ☽.

Caulic. dodrant. rubri. Fol. parva, sessil. integrerr. ima obiusa, super. lanceol. Fl. laxe panicul. ante anthesin penduli. Petal. alba, ungue luteo. Var. fl. tetrant. tetragynis.

20. Radiola. L. fol. opposit. caule dichot. fl. tetrant. tetragyn. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 178.

Radiola. Dill. giess. app. tab. 9. Eph. N. C. cent.

V. VI. app. tab. 9. Raii. Angl. 3. tab. 15. f. 3.

Chamælinum &c. Vaill. paris. tab. 4. f. 6.

Linocarpum &c. Mich. gen. tab. 21.

In Europæ fabulo inundato ⊖.

Diffr. ex habitu a priore, longe min. ramis brevioribus, crebrioribus; & fol. brevioribus. Caul. decumbent. ramosiss. Fol. ex rotundo-lanceol. Fl. terminal. fasciculati. Petal. 4. minima, ovat. emargin. Caps. 8-locul.

21. quadrifoli- L. fol. quaternis. Syst. veg. ed. 14. um. In Aethiopia.

Caul. semi-1--ped. erecti, superne ramosi. Fl. ampli, cœrulei.

22. verticilla- L. fol. verticillatis. Syst. veg. ed. 14. Bocc. mus. tum. 2. tab. 42. Barr. rar. tab. 1226.

In Italia ⊖.

Caul. pedal. Calyc. & fol. super. villosa. Flos cæsius.

laeve.

L. fol. nullibi scabris: cal. lacin. 5-dentat. Scop. Fl. Carn.

In Carniola.

Caul. basi procumb. spitham. apice ramosus, striatus. Fol. densa. Cal. minime attenuatus in acumen, neque glandulosus, ut in *L. tenuifolio*.

469. ALDO- Cal. campanifor. 5-part. Petal. 5. Caps. 5-valv. VRANDA. 1-locul. 10-sperm.

1. vesiculosa. A. Syst. veg. ed. 14. Að. Bon. 2. p. 3. tab. 12. Lenticula &c. Pluk. alm. tab. 41. f. 6.

In Italiæ, & Indiæ paludosis 24.

Utriculos gerit fere ut *Utricularia*, sed confertos.

Caul. dodrant. & ultra, simpl. plerumq: articulis crebris. Fol. 7-8-9. verticill. cuneiformi-retusa, crassiuscula, intus veluti spongiosa, in 6. virid. barbulas desinentia. In quarum medio follicul. oblique appenditur ex orbicul. membrana in semicircular. formam sic complicata, ut ventricosus adpareat. Petal. ovata,

vix calyce ma. sordide alba , conniventia , raro
expansa . Fruct. globosus , Pisi magnitudine .

470. DROSE. Cal. tubulosus , 5-fid. Petal. 5. Caps. 1-locul. api-
RA . ce dehiscens , 5-valv. polysperm.

1. *acaulis* . D. fl. radicali e scapo solitar. fol. oblongis . Syst.
veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

2. *cuneifolia* . D. scapis radicatis : fol. cuneat-rotundat. Syst.
veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Fol. sessilia .

3. *rotundifolia* . D. scap. radicatis : fol. orbiculat. Syst. veg. ed.
14. Black. tab. 432.

Rorida . Lob. ic. 811.

Ros solis . Barr. ic. 251.

Salsirora . Thal. herc. tab. 9. f. 1.

In Europæ , Asiac , Amer. paludosis , & montibus
○ .

Fol. radical. integerr. concava , setis rubent. ci-
liata . Scap. nudus , subruber . Spica terminal.
paucifi. , subunilateral. Cor. alba .

4. *longifolia* . D. scap. radicatis : fol. ovali-oblong. Syst. veg.
ed. 14.

Ros solis &c. Barr. ic. 251. n. II. Dod. 474.
fig. exterior.

Salsirora &c. Thal. herc. tab. 9. f. 2.

In Europæ pratis spongiosis , & ad fontium scatu-
rigines ○ .

An var. prioris , cum differat tantum fol. ellip-
ticis ?

5. *capensis* . D. scap. radicatis : fol. lanceolat. subtus scabris .
. Syst. veg. ed. 14. Burm. Afric. tab. 75. f. 1.

In Æthiopia .

Radix emittens fila spiralia . Scapi pl. spitham.
Fol. 3-pollic. obtusa , ciliata , supra hirsuta ,
petiolat. radicalia . Fl. racemosi , pedicellat. se-
cundi . Cor. violac.

6. *lusitanica* . D. scap. radicatis : fol. subulat. subtus convexis :
fl. decandris . Syst. veg. ed. 14.

Ros solis &c. Moris. hisp. 3. f. 15. tab. 4. f. 4.
Pluk. alm. tab. 117. f. 2.

In Lusitania.

Planta dubii generis . Scap. aliquot foliis . Fl.
2-4. terminal. peduncul. Fol. dodrantal. supra
sulcata , pilosa . Fl. magni . Caps. calyce du-
plo longior .

218 PENTANDRIA PENTAGYNIA.

7. *cistiflora*. D. caul. simplici, folioso: fol. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Afric. tab. 75. f. 2.*
Ros folis &c. Breyen. prodr. tab. 22. f. 2.
Ad cap. b. Spei.
 Caul. pedal. herbac. simpl. pubescens. Fol. alterna, hispida, pilis glutinosis. Fl. terminal. 1-2-3. pedunculati, magri, fundo atro. Stam. nigra. Anth. luteæ. Pistil. nigrum.
8. *indica*. D. caul. ramoso, folioso: fol. linear. *Syst. veg. ed. 14.*
Ros folis &c. Burm. Zeyl. tab. 94. f. 1.
Araca-puda. H. Mal. 10. tab. 20.
In India.
 Caul. semiped. herbac. Fol. alterna, petiol. versus medietatem villosa.
471. GISEKIA. Cal. 5-phyll. Cor. o. Caps. 5. adproximatæ, subrotun. 1-spermæ.
1. *pharnacioides*. G. *Syst. veg. ed. 14.*
Köelreutera &c. Comm. nov. Gott. 2. T. 2. tab. 2. f. 1. Pluk. phyt. tab. 130. f. 5.
Pharnaceum occultum. Forsk. Æg. Vahl.
In India orient. ♂.
 Caul. decumbent. herbac. glabri, pedal. teretes, exarsti latere superiore linea, genicul. remotis. Rami baseos, alterni. Fol. opposita, petiol. elliptico-lanceol. integerr. obtusa, patentia, laevia. Pedunc. axillar. solitar. teretes, nudi. Umbell. simplex, multifl. Fl. extus virid. intus albi, deorsum penduli, excepto die florescentiæ. Herba Illecebri ficoidei.
472. CRAS- SULA. Cal. 5-phyll. Petal. 5. Squamæ 5. nectarifer. ad basin germinis. Caps. 5. Staminibus 5 a sedo differt. *Folia carnosa, succosa.*
- * *Frutescentes.*
1. *coccinea*. C. fol. ovat. planis, cartilagineo-ciliat. basi conato-vaginant. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. B. 2.*
Cotyledon &c. Comm. rar. tab. 24. Bradl. succ. 5. tab. 50. Breyen. prodr. 3. tab. 20. f. 1.
In Æthiopia ♂.
 Caulis erectus, fruticosus, rubens. Fol. confertim opposita, ut quasi 4-faria, pollicar. & ultra, acutiuscul. succulenta. Fascicul. terminal. bis dichotom. fl. sessil. alternis, coccineis, 1-petal. limbo 5-par.

2. *cymosa*. C. fol. linear. cartilagineo-ciliat. connato-vaginant. caul. fruticoso: cyma terminal. *Syst. veg.* ed. 14.
Ad cap. b. Spei 24.
 Caul. erecti, spithem. glabri, annui. Fol. opposita, glabra. Cyma parva, densa, 2-fid. squamosa. Cor. lacin. revolutis.
3. *flava*. C. fol. planis, connato-perfoliat. lævibus: fl. corymboso-paniculat. *Syst. veg.* ed. 14. *Burm. afr. tab.* 23. f. 2.
Sedum &c. Pluk. alm. tab. 314. f. 2.
Ad cap. b. Spei 5.
 Caul. erectus. Fol. non ciliata. Fl. singuli pedicell. Petal. erecta, flava.
4. *pruinosa*. C. fol. subulat. pruinofo-scabris: fl. corymbosis. caul. fruticoso. *Syst. veg.* ed. 14.
Ad cap. b. Spei 5.
 Pianta tota adspersa pruina crystallina. Frutex pedal. dichotom. ramulis teretibus, sanguineis. Fol. opposita, carnosa, supra plana, obsolete connata. Corymb. terminal. inæqual. parvi. Petal. lanceol. patentia, alba.
5. *scabra*. C. fol. oppositis, patentibus, connatis, scabris, ciliatis: caul. retrorsum scabio. *Syst. veg.* ed. 14. *Dill. elth. tab.* 99. f. 117.
Cotyledon &c. Mart. cent. tab. 24.
Ad cap. b. Spei.
 Caul. diffusus, spitham. Fol. linearis lanceol. plana. Corymb. breves, 2-fid. Cor. lacin. revoluto-patent. herbaceo-flavescens.
6. *perfoliata*. C. fol. lanceol-subulat. sessil. connatis, canalicul. subtus convexis. *Syst. veg.* ed. 14. *Mill. ic. tab.* 108. *Dill. elth. tab.* 96. f. 113.
Aloe &c. Comm. paxl. tab. 23.
In Æthiopia 5.
 Fol. decussata, crassa, glauca. Petal. alba, unguibus minimis. Stam. receptaculo inserta.
7. *fruticulosa*. C. fol. oppositis, subulat. acutis, patent. subrecurvat. caul. fruticoso. *Syst. veg.* ed. 14.
Ad cap. b. Spei 5.
 Caul. ped. subdivisus, lævis. Fol. foliis *Juniperi* non maiora, sessilia, teretia, carnosa. Peduncul. terminal. filiform. solitarii, uno, altero-ve fol. pari, subumbell. Bract. oppositæ, minutæ. Fl. parvi, campanul. albi.

8. *tetragona*. C. fol. subulat. subincurvis, obsolete 4-gonis, patentibus: caul. erecto, arborecente, radicante. *Syst. veg. ed. 14.*

Cotyledonooides &c. *Bradl. succ. 5. tab. II. f. 41.*

In Æthiopia.

Caul. 3--4-ped. ramosus, rufescens, erectus, fibris radicans. Fol. cruciatim posita; crassitie pennæ a. s. rinæ, sursum leviter arcuata. Peduncul. terminal. teres, nudus. Cyma fastigiata, ramosiss. 3-fid. Cor. alba. Anth. purpur.

9. *dichotoma*. C. fol. connatis, tereti-subulat. integris, remotis: caul. fruticoso, erecto, ramoso: corymb. composito. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

10. *obvallata*. C. fol. opposit. sublanceolat. cultratis, approximatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei H.

Simil. sequenti, & præcipue fl. Differt caul. breviore, palmari: fol. ma. duplo longioribus, minime basi contractis, confertiss. nec spatio remotis, marginibus (præcipue recentiorum) tenuissime crenulat. minime obliquis, ut in sequenti.

11. *culturata*. C. fol. oppositis, obtuse ovat. integerr. subcultratis, obliquis: paribus connatis, remotis.

Syst. veg. ed. 13. Dill. elth. tab. 97. f. 114.

In Æthiopia H.

Caul. ped-cubital. parum ramosi, tortuosi, nisi sublententur procumbent. usque ad medium nudii, subfuscii. Rami geniculati. Fol. crebra, decussata, crassa, glabra, rigida, utrimq. læte virent. *Anacampt. similia.* Fl. racemosi, parvi, muscosi, albidi, odore mellis, qui non explicantur.

12. *Cotyledon*. C. fol. subrotund. carnosis, supra punctat. caul. arboreo. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Misc. 2. tab.*

19.

Habitat . . .

Tota planta glabra. Truncus carpi crassitie, fuscens, teres, in ramos inconcinnne divisus plurimos, teretes, fusco-virent. Truncus, & rami articulati, articulo superiore obtuso, pyxidato. Fol. opposita, subsessil. spatulato-ro-

tun. crassa, integerr. glauca, patentia, alia obtusiss. alia minimo mucrone acuta. Cymæ terminal. in omnibus ferme ramulis, dichotomæ. Pedunc. compressi, glauco-virent. Bract. ad divisionem peduncul. parvæ. Fl. numerosi, odori. Cal. parvus, glaucus, lacin. concavus, apice ferrugineo-rubris. Pet. magna, lanceol. acuta, plana, in principio alba, demum rosea.

13. *pinnata*. C. fol. pinnat. caul. arboreo. *Syst. veg. ed. 14.*
Lin. Suppl.

In China ♂.

Frutex rufescens, lævis, ramis alternis. Fol. alterna, impari-pinn. Foliol. 7-9. petiolul. cordata, acuta, integerr. lævia. Panicul. axillar. fol. brevior, rubicunda. Fl. rubri.

** *Herbaceæ*.

14. *centauroides*. C. caul. herbac. brachiato: fol. cordatis, sessil. pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

In Æthiopia.

Caul. palm. tereftiuscul. subpubesc. Fol. sæpius opposita, carnosa, lucida, supra punctis excavata. Fl. corymbosi, purpur. *Fol. latiora* C. dichotomæ. Fl. min.

15. *dichotoma*. C. caul. herbac. dichotomo: fol. ovat-lanc: pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

Sedum &c. Herm. Lugd. tab. 553.

In Æthiopia ☽.

Caul. vix palm. simplex, rotundus, superne ramosus, pallide viresc. Fol. opposita, crassiuscul. succulenta. Fl. stellati, purpur. intus crocei, fundo maculis cordiform.

16. *glomerata*. C. caul. herbac. dichotomo, scabro: fol. lanceol. fl. ultimis fasciculat. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei ☽.

Caul. erectus, palm. teres, purpurasc. Fol. opposita, sessil. carnosa, acutiusc. patentiss. Fl. e dichotomia solitar. subpeduncul. magnitudine *Polycarpi*. Terminal. ut in *Valeriana locusta*. Petal. alba. *Folia passim basi subciliata*. *Planta* *adulta rufescens, exceptis petiolis*.

17. *strigosa*. C. caul. herbac. erecto, dichotomo: fol. obovat. strigosis: pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

In Æthiopia ☽.

Caul. spitham. subhispidus. Fol. opposita, acuta, lineata, integerr: inferior. s̄epe petiolata. Petal. ovata.

- 18. muscosa.** C. caul. herbac. prostrato: fol. opposit. ovatis, gibbis, imbricatis: fl. sessil. solitar. Syst. veg. ed. 14.

In Æthiopia ⊖.

Caul. filiform. raro ramosi. Fol. minima, sessil. obtusifusc. carnosæ. Fl. axillar. solitar. præ cæteris speciebus minutiss. longitudine folior.

- 19. ciliata.** C. fol. oppositis, ovalibus, planiuscul. distinctis, ciliatis: corymb. terminal. Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 98. f. 116.

In Æthiopia 4.

Fol. Sempervivi vulg: sed min. ciliis albis obsita; radicalia cruciata. Caul. breves, surculis dorantal. in geminos plerumq. peduncul. divisi. Fl. C. perfoliatæ min. luteoli.

- 20. punctata.** C. fol. oppositis, ovatis, punctat. ciliatis: inferioribus oblongis. Syst. veg. ed. 14.

In Æthiopia.

Caul. teres, simpl. laevis. Fol. disticha, sessil. carnosæ, subtus convexa. Corymb. axillar. breviss. fastigiati. Cor. campanul. alba, limbo reflexo. Anth. purpureæ.

- 21. subulata.** C. fol. subulat. teretibus, patentibus: caul. herbac. Syst. veg. ed. 14.

Spiræa &c. Pet. gaz. tab. 89. f. 8.

Sedum &c. Herm. Lugd. tab. 552.

Ad cap. b. Spei ⊖.

Caul. dodrant. 2-fid. tectus vaginis folior. truncat. ciliatis. Fol. uncial. alterna, obtusa, carnosæ, cartilagineo-ciliata. Spicæ terminal. capitatae, subsessil. involuc. imbricato. Petal. alba.

- 22. alternifo-** C. fol. ferrato-dent. planis, alternis: caul. simpliciss: fl. pendulis. Syst. veg. ed. 14. Burm. afr. tab. 24. f. 1.

In Æthiopia.

Caul. 2-pedal. laxi, purpur. hirsuti. Fol. sessil. ovat-cuspid. Fl. axillar. solitarii, breviter peduncul. Cal. magnus, latus. Cor. flava.

- 23. rubens.** C. fol. fusiform. subdepressis: cyma 3-4-fid. foliosa: fl. sessil. staminibus reflexis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 82.

Sedum annum, minimum &c. *Magnol. Monsp.*
cum ic.

In Europa australi, pascuis saxosis ⊖.

Caul. digital. pilis raris viscosis, sæpe ramosus.
Fol. sparsa, oblong. obtusa, carnosa, cinerea,
apice rubente, patentia; infer. quaterna. Cyma
ramis recurvis. Fl. tessil. Cor. alba, subtus
linea villosa, rubente. Fruct. purpurasc. stel-
latus, ex filicul. 5, aristatis.

Statura simil. Sedo annuo.

24. *verticillaris.* C. caul. herbac. fol. patentibus: fl. verticillat.
aristat. *Syst. veg. ed. 14.*

Sedum &c. Magnol. Monsp. tab. 237.

In Europa australi ⊖.

Caul. diffusus, digital. opposite ramosiss. subin-
carnatus. Fol. conferta, opposita, sessil. oblong-
ovat. gibba, minutissime papulosa, apice sca-
bra. Fl. axillar. sessil. minutiss. sæpius 5. Cal.
subulat. Petal. 5. calyce breviora, medio ru-
bra. Stam. breviss. apice rubra. Stigm. rubra.

25. *nudicau-* C. fol. subulat. radicalibus: caul. subnudo. *Syst.*
lis. *veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 98. f. 115.*

In Æthiopia 24.

Caul. herbac. dodran--pedal. 4. fol. cinctus. Fol.
multa, cespitosa. Pedunc. terminal. verticilla-
ti, plerumq. 4. Fl. capitati, parvi, muscosi,
herbacei.

26. *orbicula-* C. fermentis proliferis, determinate foliosis: fol.
ris. imbricat. patentiss. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth.*
t.b. 100. f. 118.

In Æthiopia 24.

Fol. radical. rosulas formantia, ovata, acutiuscul.
gibba, carnosa, lævia, retrorsum ciliata, ciliis
tenuissim. cartilagin. Rad. emittit fila lateralia,
decumbent. propagines apice formantia. Scap.
erect. vix fol. longior. Spica brachiato-verticill.
Fl. parvi. Petal. rubro-albiant. Stigm. purpur.

27. *pellucida.* C. caul. repente, flaccido: fol. oppositis. *Syst.*
veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 100. & 119.

In Æthiopia.

Caulic. palm-ped. teretes, glabri, dilute rubent.
geniculati. Fol. *Poriulacæ*, crassa, succulenta,
sed acutiora, dilute virid. inferior. arcte sibi
imposita; in florescente planta exarescunt, &
decidunt. Fl. terminal. cymosi, axill. 2-3. al-
bido-purpur.

28. *columna-* C. caul. pollic. fol. imbricat. rotundis : fasciculo
ris. subrotun. terminali. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Burm. afric. tab. 9. f. 2.
Ad cap. b. Spei.
Fol. horizontal. imbricata, carnosa. Cor. tubu-
lofa, limbo 5-fid. linearis, patente.
29. *barbata*. C. fol. connat. articulat. barbatis, imbricatis, he-
misphaer. caul. subrotun. fl. verticillat. *Syst. veg.*
ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
30. *argentea*. C. fol. connat. ovatis, integris, argenteis : caul.
tecto : corymb. supradecompos. *Syst. veg. ed. 14.*
Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
31. *vestita*. C. fol. connatis, deltoidibus, obtusis : caul. tecto :
fl. terminal. capitatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
32. *corallina*. C. fol. connatis, deltoidibus obtusis : caul. tecto :
fl. umbellat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
C. *vestita*, & *corallina*, mira structura folior. si-
miles corallinis Zoophytorum.
33. *retroflexa*. C. fol. connat. oblong. remotis, planis : caul.
simpl. cyma composita, pedicell. retrofract. *Syst.*
veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
Var. fl. rubro, & luteo.
34. *deltoidea*. C. fol. connat. deltoidibus, acutis, patulis : caul.
tecto : fl. corymbosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin.*
Suppl.
Ad cap. b. Spei.
Fig. foliorum ut in *Mesemb. deltoideo*.
35. *cordata*. C. fol. petiolat. cordatis : caul. folioso : fl. ter-
minal. solitar. pedunculat. *Syst. veg. ed. 14.*
Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
36. *montana*. C. fol. connat. ovatis, acutis, ciliat. caul. sub-
nudo : fl. aggregatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin.*
Suppl.
Ad cap. b. Spei.
37. *mollis*. C. fol. connatis, tereti-triquetris, glabris, mol-
libus : caul. erecto, simplici : corymb. tricho-
tomo, suprave composito. *Syst. veg. ed. 14.*
Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.

38. *crenulata*. C. fol. connat. lanceolat. punctato-crenulat. caul. folioso : corymb. decomposito . Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
39. *alpestris*. C. fol. connat. ovatis , acut. quadrifariam imbricat. capitul. pedunculat. caul. folioso . Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
40. *pyramida-* C. fol. connat. ovatis , acutis , quadrifariam imbricat. capitul. sessilibus . Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
Planta pulchra.
41. *spicata*. C. fol. connatis , lineari-subulat. scap. subnudo : spica verticillata ; verticill. inferioribus remotoribus . Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
42. *turrita*. C. fol. connat. quadrifariam imbricat. ovat-oblong. acutis , ciliat. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
43. *rupestris*. C. fol. connat. ovatis , integris , glabris : corymb. supradecompos. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
44. *thyrsiflora*. C. fol. perfoliat. ovatis , ciliat. patulis : corymb. composito , attenuato . Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
45. *capitella*. C. fol. connat. oblongis , cartilagineo-ciliat. patulis : capitulis verticillat. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
46. *pubescens*. C. fol. connat. ovatis , acutis , villosis : caul. ramoso : fl. corymbosis . Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
47. *cephalo-* C. fol. connat. lineari-oblong. obtusis , integris : phora . capitul. lateralibus , pedunculat. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
48. *tomentosa*. C. villoso--scabra : fol. connatis , lanceolat. villosis , ciliatis : caul. subnudo , terminato spica verticillata . Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
49. *Cotyledonis*. C. fol. connat. oblong. tomentosis , ciliatis : caul. subnudo : fl. corymbosis , adgregatis . Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Distincta a C. Cotyledone Jacq. supra ralata.

30. tecta.

C. fol. connatis, ovatis, obtusis, cinereo-lamellois: scapo nudo: capitulo terminali. Syst. veg. ea. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

31. perforata. *C. fol. opposito-perfoliat. ovatis: caul. simplic. fl. pedunculato-subverticillat. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Caul. sesquiped. nudiuscul. teretes, ruficundi. Fol. quandoq. cordata, acutiusc. margine æquali, lævia; radical. adproximata, superne sensim min. Racemus terminal. longus. Fl. glomerati, parvi.

Inscius, Crassulæ numerosæ novæ, in Suppl. relata utrum ad frutescent. aut herbaceas referendæ sint, paucis exceptis, omnes, & singulas iunctim huc colloco.

alba.

C. fol. oppositis, vaginantibus, lanceol. Syst. veg. ed. 14. Forsk. Æg.

In Arabia.

Caul. spitham. simpl. Fol. conferta, sesquipollis. plana, virid. margine cartilagineo ciliata, papillis hyalinis, filiform. adproximat. unius seriei, fere perpendicular. ad folium. Pedunc. terminal. rufelcent. squamosi, dichot. articulat. bracteis 2. linear-lanceolat. sub quavis dichotomia. Fl. corymbosi, pedicell. Cor. alba.

perfilata.

C. fol. subrotund. in medio a caule perfilatis, adproximatis, rubro-punctul. Scop. Delic. Insub. fusc. 3. tab. 6.

Habitat . . . 4.

Caul. fruticosus, tenuis, basi nudus, mox supra radicem parce ramosus. Fol. carnosa, supra plana, subtus convexa, patentia, solitaria, sibi vicina, ut distantia unius ab alio vix lineam geometricam superet; a tenui caule, tamquam a filo acus ope traiecta videantur. Racemus terminal. densus, 2--unc. ramis primis oppositis, ex vagina parva prodeuntibus: quorum ramifications dichotoma. Ramuli squamosi. Flosculus inter binos quosque ramulos. Fl. alterni, sessiles. Cal. semi 5-fid. Cor. late-

campanul. luteola, in senio rufo--rubra. *An C. perforata*. *Lin. Suppl.* ? sed caul. non simplic. nec fl. glomerati.

473. MA- Cal. 5--dentat. Petal. 5. Nectar. 5. obcordata, HERNIA. filamentis supposita. Caps. 5-locul.

I. *verticillata*. M. fol. verticillat. linear. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei Ȑ.

Caul. fruticosus, diffusus, ramis filiform. Fol. saepe 8-10. vix divisa, aut pinnatifid. *Modus fructificandi Hermanniæ*, *terminalis*, *peduncul.* saepe 2-fl. Petal. lutea.

2. *pinnata*. M. fol. tripartito-pinnatifid. *Syst. veg. ed. 14.*

Ketmia &c. *Comm. rar. tab. 7.*

Cistoides &c. *Pluk. mant. tab. 344. f. 3.*

In Aethiopia Ȑ.

Caul. procumb. fruticosus, glaber, fusco-spadic. Fol. linear. angusta, acuta, integerr. & 3-fid. mixta, verticillata 6-8-unguicular. sessil. patent. glabra. Peduncul. lateral. & terminal. 2--fl. Bract. subulatæ. Fl. penduli, sulphurei. *An eadem cum priore? Hermanniæ adfinis*, sed *necaria diversum genus exposcunt.*

474. SIBBAL- Cal. 10-fidus. Petal. 5. calyci inserta. Styli e DIA. latere germin. Sem. 5.

I. *procumbens*. S. procumb. foliol. 3-dent. *Syst. veg. ed. 14.* Fl. *Dan. tab. 32.*

Fragariæ &c. *Sibb. Scot. 2. tab. 6. f. 1.*

Pentaphylloides &c. *Pluk. alm. tab. 212. f. 3.*

In alpibus Lapponiæ, Scotiæ, Sibiria, Helvetiæ &c. 24.

Caulicul. pl. humil. 3-unc. 1-3-fl. vaginosi. Fol. radicalia, iuniora sericea, adulta calva, ternata, apice retuso, & tridentato. Cal. glaber, lanceolat. connivens, venosus. Petal. acumin. calyce non maiora, flava. *Habitus Potentillæ.*

2. *erecta*. S. erecta; foliol. linear. (plerumq.) multifid. *Syst. veg. ed. 14.*

Pentaphylloides &c. *Amm. ruth. tab. 15.*

In Siberia.

Fol. quandoq. 3-fid. Flos purpurascens, vel albus. *Var. fl. ampliore.*

3. *altaica*. S. fol. tricuspidat. fl. solitariis. *Syst. veg. ed. 14.* *Lin. Suppl. Act. Petrop. an. 1773. tab. 18. f. 2.*

In alpibus Altaicis.

Fol. linear. Cal. cylindr. Cor. purpur.

POLYGYNIA.

- 475. MYO-** **C**al. 5-phyll. basi adnatus. Nectar. 5. subus-
SURUS. lata, petaliform. Sem. numerosa.
i. minimus. M. fol. gramineis, integerrim. Syst. veg. ed. 14.
Gmel. it. 2. tab. 31. Fl. Dan. tab. 406.
Cauda muris. Dod. pempt. Lob. ic. 40.
In Europe collibus apricis, aridis ☽.
Caul. 3-unc. nudus, simpl. fragilis. Fol. subcre-
nate-inflexa, plana, tenera, glabra, lâete vi-
rent. Capitul. spicatum, viridi-subfuscum. Cor.
flavo-virescens.
-
-
-
-

NOVA GENERA.

MONOGYNIA.

LICANIA.

- Cal.** Periant. 2-phyll. minimum.
Cor. 1-petal. turbinata, limbo patente, 5-dent.
denticul. acutis.
Stam. Filam. 5. fauci cor. inserta. Anth. 2-locul.
Pistil. Germ. subrotund. villosum. Styl. longus,
setaceus, incurvus. Stigm. obtusum.
Peric. Drupa mollis, carnosa, ovata, fibrosa,
glabra, 1-locul.
Sem. Nux 1-sperm. lignosa, coriacea, fibrillis
cooptera.
incana. L. Aubl. Guian. tab. 45.
In Carib. his Ȑ.
Arb. 4--5-ped. superne ramosa. Fol. alterna,
subsessil. ovata, acumin. integerr. supra virid.
subtus incana, stipulata. Spicæ axill. & ter-
minal. Cor. alba. Drupa candida, cum punctis
rubris, edulis.

R A P A N E A.

- Cal.* Perian. 1-phyll. minimum, 5-6-dentat.
Cor. 1-petal. tubo breviss. receptaculo pistilli inserpto; limbo 5-fid. lacin. subrotund.
Stam. Filam. 5-6. tubo ad basim singulæ laciniæ inserta. Anth. oblong. 4-gon. 2 locul.
Pistil. Germ. subrotund. Styl. brevis. Stigm. obtusum.
Peric. Bacca sphærica, 1-locul.
Sem. 1. sphæricum.
Guianensis. R. Aubl. Guian. tab. 46.
In Caienna, & Guiana H.
 Frutex 5-ped. superne ramosus. Fol. alterna, petiol. ovata, crassa, integerr. glabra. Fl. fasciculati, subsessil. sparsi supra corticem ramorum, & ramuscular. Cor. alba. Bacca violac.

P O R A Q U E I B A.

- Cal.* Perian. 1-phyll. minimum, 5-dent.
Cor. 1-petal. 5-part. lacin. oblong. ovat. acutis, supra concavis, subtus convexis.
Stam. Filam. 5. crassa, subtus convexa, intus concava, utrimq. marginata.
 Anth. quasi articulatæ, oblong. 4-gonæ, 2-locul. & sic coalitæ rotam molendinam referunt.
Pistil. Germ. subrot. Styl. brevis. Stigm. 3. ovata.
Peric.
Sem.
1. Guianensis. P. Aubl. Guian. tab. 47.
In Guiana H.
 Arb. 50-ped. superne ramosa. Fol. alterna, petiol. ovata, acuta, glabra. Fl. axillar. spicati, minimi, albi.

T A P U R A.

- Cal.* Periant. 1-phyll. 6-part. lacin. ovat. concavis.

Cor. 1-petal. 2-labiat. lab. super. oblon. erecto, concavo, apice 3-dent. lab. infer. 2-part. lobis brevibus, obtusis; receptac. pistilli inserta.

Stam. Filam. 5. duo ad latera lab. superior. 2-breviora tubo cor. sub lab. superior. quintum longiss. ad basin lab. inferioris.

Pistil. Germ. ovatum, 3-gonum. Styl. longus, incurvus, hirsutus. Stigm. 3-lobum.

Peric. :

Sem. . . : : : : :

I. *Guianensis*. T. Aubl. Guian. tab. 48.

In Guiana.

Frutex 12-ped. ramosus. Fol. alterna, petiol. ovata, acumine obtuso, glabra. Stipul. breves, deciduae. Fl. congesti ad basin folior. supra petiolum, sessil. parvi. Cor. flava.

B A C O P A.

Cal. Perian. 2-phyll. 5-part. lacin. 2. oppositis, oblong. acutis, concavis: 2-inferior. reflexis, subrotun. acutis; unica super. latiore, subrotun. undulata.

Cor. 1-pet. tubus brevis, ad faucem ampliatus, calyc. parieti interno insertus: limb. 5-fid. lacin. oblong. ovat.

Stam. Filam. 5. ad faucem tubi intra divisuras cor. inserta. Anth. longae, cuspidatae, 2-locul.

Pist. Germ. ovatum, basi calyc. fundo adnatum. Styl. brevis. Stigm. capitat. convexum.

Peric. Caps. membran. 1-locul.

Sem. numerosa, minutiss.

I. *aquatica*. T. Aubl. Guian. tab. 49.

In Caïenna.

Caul. pl. cylindrac. nodosi, succulenti: e nodis excent radiculae capillar. Fol. opposita, sessili-amplexicaul., oblong. acuta, concava, crassa, glabra, virid. Fl. alterne axillar. solitar. peduncul. Intra cal. bract. 2. carnosae. Cor. violac.

POSOQUERIA.

Cal. Perian. 1-phyll. turbinat. 5-dent. denticul. acutis.

Cor. 1-petal. Tubus longiss. disco supra germen insertus, paulo supra basin incurvus; reliqua sua parte pendulus: faux ventricosa, villosa: limb. 5-fid. lacin. oblong. angustis, obtus. reflexis.

Stam. Filam. 5. brevia, lata, apice incurvo, intra divisuras cor. inserta.

Anth. oblon. utrimq. acutæ, incurvæ, 2-locul. basi filament. adnexæ.

Pistil. Germ. calyc. fundo adnatum, disco coronatum.

Peric. Bacca ovata, carnosa, calyc. coronata, 1-locul.

Sem. Plurima, subrotun. angulosa, in pulpa rubra dulci nidulantia.

I. longiflora. P. Aubl. Guian. tab. 51.

In Caribæis ♂.

Frutex 5-6-ped. ramosus. Rami oppositi, nodosi, tomentosi. Fol. opposita, petiol. ovat. oblonga, acuta, integerr. glabra. Stipul. ad basin petioli. Fl. terminal. corymbosi, peduncul. Cor. alba. Bacca lutea.

MOUROUCOA.

Cal. Perian. 1--phyll. turbinat. 5--part. lacin. subrotun.

Cor. 1-petal. infundibulif. tubus oblong. disco germinis insertus: limbus patens, 5-fid. lacin. amplis, subrotun.

Stam. Filam. 5. fauci tubi inserta, lobis opposit. Anth. oblon. obtus. incumbent.

Pistil. Germ. conicum, disco cinctum. Styl. longus. Stigm. bilamellat.

Peric. Caps. ovat-oblön. fibrosa, coriacea, calyce ad basin tecta, 2-3. locul.

Sem. unicum, oblong. rufescens, extus convexum, intus planum, in quolibet loculo.

M. Aubl. Guian. tab. 54.

In Caribæis ♂.

Frutex farmentis longiss. supra altissim. arbores expansis, & propendentibus. Fol. alterna, petiol. ovata, acuta, semiplicata, integerr. rigida, glabra. Fl. axillar. corymbosi, longe peduncul. ampli. Cal. violac. Cor. cœrul. Caps. striata, rufesc.

S I P A N E A.

Cal. Periant. 1-phyll. turbinat. striatum, ad apicem contractum; limbo 5-part. lacin. angustis, acutis.

Cor. 1-petal. hypocraterif. tubus long. disco supra germen insertus: faux ventricosa: limbus 5-fid. expansus, subrotund.

Stam. Filam. 5-brevia, tubo inserta.

Anth. oblon. 2-locul.

Pistil. Germ. subrotund. calyci adnatum, disco coronatum. Styl. longus, filiform. Stig. 2.

Peric. Caps. orbiculata, striata, infera, 2-partibil. lacin. calycin. coronata, singulo loculo 2-valv. valvul. dissepsimento oppositis.

Sem. plurima, minutiss.

S. Aubl. Guian. tab. 56.

In Caienna, & Guiana 24.

Caul. pl. 1-2-ped. ramosi, nodosi, partim erecti, partim supini, radicantes. Fol. opposita, subsessil. lanceol. acuta, integerr. asperiuscula. Stipul. ad basin petiolor. ovatae, acutæ. Fl. terminal. corymbosi, 5-6-7. Cor. carnea.

R O N A B E A.

Cal. Perian. 1-phyll. turbinat. 5-dentat.

Cor. 1-petal. tubus longus, ad faucem ventricosus, disco supra germen insertus: limbus 5-fid. lacin. acutis, patulis.

Stam. Filam. 5. brevia, tubo inserta. Anth. oblong. 2-locul. intra faucem reconditæ.

Pistil. Germ. ovat. calyci adnatum disco coronatum. Stylus longitudine tubi. Stigm. 2-lamellatum.

Peric. Bacca ovata, striata, umbilicata, 1-locul.

Sem. Ossicula oblong. striata, hinc convexa, inde plana, 1-sperm.

pratensis.

- latifolia*. R. caulibus flexuosis : fol. ovatis , acutis , e videri , & cœruleo variegatis : fruct. striato , nigricante . *Aubl. Guian. tab. 59.*
- In Guiana* ♂.
- Frutex* . Caul. pl. 2-3-ped. simpl. tortuosí , nodosi . Fol. opposita , breviter petiol. integerr. Stipul. utrimq. intra basin petioli , lata , acuta . Fl. 2-3-4-5-6. axill. subsessil. Cor. alba .
- erecta* . R. caulibus tenuioribus : fol. ovat. acutis , tenuioribus : fl. min. e luteo-virentibus . *Aubl. Guian.*
- In Guiana* .

T A P O G O M E A .

- Cal. comm.* Vagina biloba , lobis retroflexis , 5. squamis violac. latis , subrotund. concavis ; una quinta interiore , & acutiore .
- Cal. proprius* . Perian. 1-phyll. 5-dent. denticul. acutis .
- Cor.* 1-petal. tubus oblong. fauce ventricosus , disco biglandulosó , supra gerimen insertus : limbus patens , 5-fid. lacin. subrotun.
- Stam.* Filam. 5. breviss. tubo ad basin inserta .
- Anth.* oblon. 4-gon. 2-locul.
- Pistil.* Germ. minimum , angulatum , inferum , calyci adnatum , disco biglandulosó coronatum .
- Styl. longitudine tubi cor. ad apicem 2-part.
- Stigm. 2. obtusa .
- Peric.* Bacca angulosa , 1-locul..
- Sem.* Officula 2. hinc plana , inde convexa .
- Recept. comm.* fl. paleaceum , planum , paleis numerosis , angustis , violac. persistent. Fl. in capitulum collecti .
- violacea* . T. capitulo fl. globoso , squamoso : fl. & fructu violac. *Aubl. Guian. tab. 60.*
- In Sylvis Guianæ* 24.
- Caul. 1-2-ped. ramis oppositis , nodosis . Petioli vagina breviss. amplexicaul. Fol. opposita , ovat-oblong. acuta , nervis purpurascens. integerr. glabra , & reflexa .
- tomentosa* . T. fl. capitatis , involuc. amplo , purpuro-violac. obvolutis . *Aubl. Guian. tab. 61.*
- In Caribæis* ♂.

- Fruticul. 3-4-ped. erectus, ramosus, nodosus, tomentosus. Fol. ampla, longe petiol. ovata, acuta, integerr. villosa. Stipul. amplexicaul. 2-lobæ, villosæ, lobis 2-fid. Fl. terminal. corymbosi. Involuc. 1-phyllo, patens, concavum, villosum. Reliqua ut in priore.
- purpurea.* T. caulis repentebus: fol. lanceolat. linea alba supra notatis, subtus hirsutie rufescent. *Aubl. Guian. tab. 63. f. 3.*
- In Guiana 24.* Caul. decumbent. villosi. Fol. opposita, subsessil. ovata, acuta, supra glabra, virent. venis rubris. Stipul. utrimq. ad basin petiolor. Fl. terminal. capitati. Cal. villosus. Cor. & bacca purpurae.
- alba.* T. caulis decumbentibus: fol. ovatis, supra partim virid. partim rufescent. subtus cinereis. *Aubl. Guian. tab. 62. f. 4.*
- In Guiana 24.* Differt a priore fol. petiolat. subrotund. glabris &c. fl. purpur. aut albis: fructu rubro.
- glabra.* T. fol. ovat. acutis, glabris: capitulo fl. hirsuto. *Aubl. Guian. tab. 63.*
- In Guiana 3.* Fruticul. erectus, ramosus, glaber, ramul. villosi, rufescent. Fol. opposita, petiol. integerr. subtus pallide virent. Stipul. amplexicaul. oblonga, biloba, lobis 2-fid. Capitul. terminal. longe peduncul. Fl. coeruleo-rosa. Bacca oblong. ovata, striata, coerulea. Receptacul. paleaceum.

CARAPICHEA.

- Cal.* Perian. minimum, 1-phyl. turbinat. 5-dentat.
- Cor.* 1-petal. infundibulif. tubus oblong. disco supra germe insertus: limbus 5-fid. lacin. brevibus, acutis.
- Stam.* Filam. 5. longa, extra cor. prodeuntia, fauci tubi infra lacin. inserta. Anth. subrotun. 2-locul.
- Pistil.* Germ. inferum, minimum, calyc. fundo adnatum, disco coronatum. Styl. longiss. 2-part. Stigm. 2. acuta.

Peric. Caps. angulosa, 2-partibil. 2. locul. singulo locul. 1-sperm.

Semi. 2. oblonga.

Capitulum terminale, involucrat. pedunculat. Involuc. 4-phyll. foliol. 2. inferior. latis oppositis, concavis: 2. super. opposit. acutis.

Guianensis.

C. Aubl. Guian. tab. 64.

In Caribæis ♂.

Frutex 5-6-ped. ramulis nodosis. Fol. opposita, petiol. ovata, acuta, integerr. glabra. Stipul. 2. utrimq. ad basim petiol. Cor. alba.

S I M I R A.

Cal. Perian. 1-phyll. turbinat. 5-dent.

Cor. 1-petal. tubulosa, disco supra ovarium inserta: limbus 5-fid. lacin. subrotun.

Stam. Filam. 5. tubo cor. inserta. Anth. 2-locul.

Pistil. Germi. ovatum, calyc. denticulat. disco coronatum. Stylus longus, tenuis, apice 2-part. Siigm. obtusa.

Peric. Bacca ovata, cal. denticulat. coronata, 2-locul.

Sem. solitaria.

S. Aubl. Guian. tab. 65.

In Guiana ♂.

Arb. 10-12-ped. superne ramosa, cortice extus rufescente, intus rubente. Fol. ampla, opposita, subsessil. ovata, acuta, integerr. glabra, subitus pallide virent. nervis transversal. purpurascens. Stipul. 2. oppositæ, longæ, acutæ. Fl. terminal. racemosi. Cor. alba.

O U R O U P A R I A.

Cal. Perian. 1-phyll. tubulosum, 5-dent. basi subrotun. crassiuscul.

Cor. 1-petal. hypocraterif. tubus longus, angustus, disco supra germen insertus: limbus 5-fid. lacin. subrotund. extus villosis.

Stam. Filam. 5. breviss. ad faucem tubi inserta. Anth. oblon. 2-locul. in tubi orificio.

Pistil. Germ. disco coronatum, subrotun. calyc. fundo adnatum. Stylus tenuis, longissim. Stigm. capitatum, oblong. bisulcum.

Peric. . . . 2-locul.

Sem. plurima.

Guianensis. O. Aubl. Guian. tab. 68.

In Guiana H.

Frutex farmentosus, supra arbores scandens. Fol. opposita, petiol. ovata, acutu, integerr. glabra. Stipul. utrimq. ad basin petioli triangularis. Supra folia aculei 2. incurvi. Capitul. sphæric. axillar. & terminalia. Cor. varii col. albi, viridis, rubri, lutei, nigricantis, odora.

B E R T I E R A.

Cal. Periant. turbinat. 5-dent.

Cor. 1-petal. tubus brevis, disco supra germen insertus: limb. 5-fid. lacin. æqualibus, oblong. acutis.

Stam. Filam. 5. breviss. tubo ad faucem inserta. Anth. oblong. 2-locul.

Pistil. Germ. inferum, subrotun. calyc. fundo adnatum, disco coronatum. Styl. longitudine tubi. Stigm. bilamellatum.

Peric. Bacca orbiculata, calyc. denticul. corona, 2-locul.

Sem. plurima, subrotun. septo medio utrimq. adfixa.

Guianensis. B. Aubl. Guian. tab. 69.

In Guiana H.

Frutex 6-7-ped. ramis, & ramuscul. tomentosis. Fol. opposita, breviter petiol. adnexa, ovata, acumin. supra virid. subtus tomentoso-ciner. Stipul. amplexicaul. 2-lobæ Fl. terminal. racemosi. Cor. alba.

N O N A T E L I A.

Cal. Perian. 1-phyll. turbinat. 5-dent. denticul. acutis.

Cor. 1-petal. tubulosa, disco supra germen inserta; limbo 6-fid.

Stam. Filam. 5. tubo inserta. Anth. oblon. 2-locul.

Pistil. Germ. inferum, calyc. fundo adnatum, disco coronatum. Styl. longus, 2-part. Stigm. 2. obtusa.

Peric. Bacca sphærica, 5-locul.

Sem. Officula 5. angulata.

N. fol. ovatis, acutis; calyc. involucro 3-phyll.

Aubl. Guian. tab. 70. f. 1.

In Caienna ♀.

Caul. 2-3-ped. ramosus, nodosus. Fol. opposita, subsessil. basi petiol. connexa, vagina amplexicaul. ovat-lanceol. integerr. glabra. Fl. terminal. corymbosi. Bacca violac. Sem. nigra.

N. fol. ovatis, acutis: fl. calycibus nudis. *Aubl.* Guian. tab. 70. f. 2.

In Caienna ♀.

Caul. ped. ramosus, nodosus. Fol. opposita, petiol. vaginæ amplexicauli adnexa, integerr. glabra. Fl. terminal. paniculati. Cal. nodosus. Cor. alba. Bacca violac.

longiflora. N. fol. lanceol. glabris: cor. tubulosa: fructu rufescente. *Aubl.* Guian. tab. 71.

In Guiana ♀.

Caul. pl. 2-3-ped. ramosi, nodosi, tubulati. Fol. opposita, petiol. lato-lanceol-acuta, integerr. glabra, luteo-virent. Stipul. amplexant. 4-lobæ. Fl. terminal. corymbosi. Cal. nudus. Cor. ventricosa, purpurasc. Bacca purpur. 10-striata.

N. fol. ovat. acutis, petiolat. involuc. calyc. 4-phyll. *Aubl.* Guian. tab. 72.

In Guiana ♂.

Frutex 2--3--ped. ramosus. Fol. glabra, supra atro-virent. subtus pallidiora. Stipul. amplexicaul. 4-lobæ. Fl. terminal. racemosi. Cor. alba. Bacca 10-striata, nigra.

racemosa. N. fol. amplis, ovatis, acutis; calyc. involuc. 4-phyll. fructu violac. *Aubl.* Guian. tab. 75.

In Guiana ♂.

Frutex 4-5-ped. superne ramosus. Fol. ampla, breviter petiol. integerr. glabra. Stipul. 2. oppositæ. Fl. terminal. racemo violac. Cor. alba. Bacca 10-striata, violac.

violacea. N. fol. ovat. acutis; tubo fl. prælongo. *Aubl.* Guian. tab. 74.

In Guiana ♂.

Frutex ped. & ultra, superne ramosus. Fol. pe-

tiol. ovata, acuta, integerr. glabra. Stipul. amplexicaul. 2-lobæ. Fl. terminal. racemosi. Cor. lutea.

S A B I C E A.

Cal. Perian. 1-phyll. turbinat. villosum, apice contracto: limb. 5-fid. lacin. oblon. acutis.

Cor. 1--petal. hypocraterifor. tubus longus, tenuis, disco supra germen insertus: limb. 5-fid. lacin. oblong. acutis.

Stam. Filam. 5. brevia, tubo cor. inserta ad apicem.

Anth. oblon. 2-locul.

Pistil. Germ. inferum, calyci adnatum. Styl. longus, filiform. Stigm. 5. oblong.

Peric. Bacca orbiculata, villosa, calyc. laciniis coronata.

Sem. plurima, minutiss. coronata.

cinerea. S. caul. volubil. fol. ovat. acutis, subtus albidis: tubo fl. prælongo. *Aubl.* *Guian.* tab. 75.

In Guiana, & Caïenna H.

Frutex. Caul. ramosi, villosi. Fol. opposita, petiol. integerr. supra virid. villofa, subtus tomentoso-incana. Stipul. utrimq. ad basin petiol. subrotun. Fl. axillar. 4-5. & ultra, sessiles. Quilibet flos intra 2. fol. alba. Cor. alba, extus villofa. Bacca rubra.

aspera. S. caul. volubil. fol. ovat. acutis, subtus villosis, asperis. *Aubl.* *Guian.* tab. 76.

In Guiana H.

Differt a priore caulis asperis, villosis: fol. lanceol. acutis, supra punctatis, virid. cor. 4-5-fid.

P A T I M A.

Cal. Perian. 1-phyll. limbo integro, sub 5-sinuato.

Cor. .

Stam. .

Pistil. Germ. inferum, calyc. fundo adnatum. Styl. . . . Stigm.

Peric. Bacca subrotun, calyc. margine coronata, 4-5-6-locul.

Sem. plurima, minutiss. in pulpa molli nidulantia.

Guianensis. P. Aubl. Guian. tab. 77.

In Caribæis 2.

Caul. pl. 3-ped. recti, simpl. tubulosi. Fol. opposita, longe petiol. ovat-oblon. acuta, integrerr. glabra. Stipul. brevis ad basin petioli. Fruetus pl. axillar. peduncul. virides.

R O P O U R E A.

Cal. Perian. 1-phyll. 5-dent. lacin. subrotun.

rufescensibus: extus glabrum, intus villosum.

Cor. 1-petal. 5-fid. lacin. subrotun. tubus brevissim. receptaculo pistilli insertus.

Stam. 5. villosa, cor. inserta intra divisuras.

Anth. 2-locul.

Pistil. Germ. subrotun. villosum Styl. longus. Stigm. 3--4.

Peric. Bacca 4--locul. villosa.

Sem. plurima, in pulpa lutea, dulci, eduli nidulantia.

Guianensis. R. Aubl. Guian. tab. 78.

In Caribæis 3.

Frutex 12--15--ped. Fol. ad nodos verticillata, plurima, impari-pinn. declinata: foliol. 6. ampla, alterna, ovat--oblong. acumine obtuso, subsessil. integerr. glabra. Aculeus brevis, paulo supra axillam singuli folioli. Fl. cespitosi, numerosi, sessil. supra, & intra basin folior. Bacca lutea.

V O Y R I A.

Cal. Perian. 1-phyll. turbinat. 5-dent.

Cor. 1-petal. hypocraterifor. tubus longus, basi, & apice ventricosus, disco pistilli insertus: limbus patens, 5-fid.

Stam. Filam. 5. breviss. fauci tubi inserta.

Anth. oblong. sulcatæ, 2-locul.

Pistil. Germ. conicum. Styl. longitudine tubi cor. Stigm. capitatum, obtusum, concavum.

Peric. Caps. oblon. 1-locul. 2-valv. Sem. numerosa, minutissima.

- rosea.* V. fl. geminatis, lacin. cor. acutis. *Aubl. Guian.*
tab. 83. f. 1.
In Guiana 24.
 Radix tuberosa. Caul. simpl. in terra delitescens,
 4-gon. nodosus. Squamul. amplexicaul. acutæ.
 Pedunc. 2-3-4-5-raro 1-fl. Cor. incarnata.
- caerulea.* V. fl. geminatis; lacin. cor. rotundat. *Aubl. Guian.*
tat. 83. f. 2.
In Guiana 24.

BASSOVIA.

- Cal.* Perian. 1--phyll. 5-part. lacin. subrotund.
 acutis.
- Cor.* 1-petal. tubus breviss. disco germinis inser-
 tus: limbus 5-fid. patens, lacin. ovat. acutis.
- Stam.* Filam. 5. tubo cor. inserta.
- Anth.* crassæ, 2-locul.
- Pistil.* Germ. subrotund. disco insidens. Styl. bre-
 vis. Stigm. crassifol. obtusum.
- Peric.* Bacca ovata.
- Sem.* plurima, minuta, in pulpa nidulantia.
- sylvatica.* B. *Aubl. Guian. tab. 85.*
In Guiana.
 Caul. 3-4-ped. Rami pl. erecti, brachiati, ramo-
 si, radicales. Fol. ampla, alterna, petiol. ovat-
 acuta, integerr. glabra. Fl. axill. corymbosi,
 exigui, subvirid. Bacca viridis.

MARIAPA.

- Cal.* Periant. 1--phyll. profunde 5-part. lacin.
 subrotund. concavis, mutuo incumbentibus.
- Cor.* 1-petal. tubulosa: tubus longus, basi am-
 pliatus, receptaculo germinis insertus: faux
 patens, ventricosa: limbus 5--fid. lacin. patu-
 lis, subrotund. crenatis.
- Stam.* Filam. 5. brevia, tubo inserta.
- Anth.* longæ, 2-locul.
- Pistil.* Germ. ovatum. Styl. longus. Stigm. pel-
 tatum.
- Peric.* 2-locul.
- Sem.* 2. angulata, in quolibet locul.
- scandens:* M. *Aubl. Guian. tab. 91.*
In Caribæis ♂.

Frutex sarmentis longiss. supra arbores scandentibus; ramulis propendentibus. Capreolus spiraliter intortus, lignosus. Fol. alterna, petiol. ovata, acuta, integerr. glabra. Fl. terminal. panicul. Cal. cinereus. Cor. alba.

R I N O V E A.

Cal. Perian. 1-phyll. villosum, 5-part. lacin. oblongis, acut.

Cor. Petal. 10. concava, ovat-oblonga; 5. infer. ma. 5. super. interiora min.

Stam. Filam. 5. brevia, petal. superioribus ad basin inserta.

Anth. oblong. 2-locul. 2-valvæ, valvul. basi ad apicem dehiscentibus.

Pistil. Germ. subrotun. villosum. Styl. oblong. villosus. Stigm. obtusum.

Peric. .

Sem. .

R. Aubl. Guian. tab. 93.

In Guiana H.

Arb. 6-7-ped. superne ramosa, ramul. alternis, Fol. alterna, petiol. erecto-oblong. acuta, dentata, glabra, stipulata. Fl. axillar. & terminal. racemosi, Cor. alba,

R I A N A.

Cal. Periant. 1-phyll. 5-dent. lacin. subrotun. acutis.

Cor. Petal. 10. ovata, acuta, receptac. pistilli inserta; 5. infer. 5. super. min. intermedia.

Stam. Filam. 5. breviss. basi petalorum inferior. inserta.

Anth. ovat-oblon. 2-locul.

Pistil. Germ. ovatum, 5-striatum, villosum. Styl. carnosus. Stigma capitatum, obtusum.

Peric. .

Sem. .

R. Aubl. Guian. tab. 94.

In Guiana H.

Frutex 10-ped. Rami erexit, nodosi. Fol. oppo-

Tom. II.

Q.

sita, petiol. ovat-obl. acuta, denticul. rigida,
glabra. Stipul. 2. breves, oppositæ. Fl. alter-
ni, in spica terminali. Cor. alba.

CONOHORIA.

Cal. Perian. 1-phyll. 5-part. lacin. oblong. acutis.
Cor. Petal. 5. erecta, ovat-oblong. lateribus mu-
tuo sibi incumbentia, tubuniq referentia, apice
5-laciniatata, lacin. acutis, reflexis. Ad basin
singuli petali foliol. concavum.

Stam. Filam. 5. breviss. ad basin petalor. inserta.
Anth. oblon. 2-locul.

Pistil. Germ. subrotun. Styl. flexuosus, tenuis.
Stigm. capitata,

Peric. .

Sem. .

C. Aubl. Guian. tab. 95.

In Caribæis H.

Furcæ 3-4- ped. superne ramosus, ramis undiq.
sparsis, nodosis. Fol. opposita, breviter petiol.,
ovata, acuta, integerr. glabra. Fl. terminal.
spicati, alterni, Cor. flavescens.

TOURROU BEA.

Cal. Perian. 5-6-phyll. foliol. subrotun. carnosis.
Bract. carnosæ, 3-lobæ.

Cor. Petal. 5. subrotun. carnosa, reflexa, recep-
tacul. pistilli inserta.

Stam. Filam. 5. basi lata, singula singulis petal.
incumbent. receptaculo inserta.

Anth. subrotun. minim. 2-locul.

Pistil. Germ. ovatum, 5-striatum. Styl. brevis.
Stigm. crassiuscul. planum, 5-radiat. radii acutis..

Peric. 5-locul.

Sem. .

T. Aubl. Guian. tab. 97.

In Guiana H.

Arbuscul. ramis farmentosis. Fol. alterna, petiol.,
ovata, emarginata, apice acuto, crassa, inte-
gerr. glabra. Fl. spicati, remoti, alterni, pe-
nducul. Bract. coccinea. Cal. luteus. Petal.
sulphur. Filam. lutea. Anth. nigræ.

PAYPAYROLA.

Cal. Perian. 1-phyll. 5-part. lacin. subrotun. acutis.

Cor. Petal. 5. oblong. angusta, erecta, tubum mentientia, apicibus reflexis, uno ma: emarginato; disco infra germen inserta.

Stam. Filam. 5. erecta, disco inserta.

Anth. oblong. coalitæ, 2-locul.

Pistil. Germ. subrotun. disco insidens. Styl. longus. Stigm. 2-lob.

Peric. 2--locul.

Sem.

P. Aubl. Guian. tab. 99.

In Caribæis H.

Frutex 12-15-ped. ramosus. Fol. ampla, alterna, petiolat. ovat. acuta, integerr. glabra, stipulata. Fl. axillar. & terminal. spicati. Cor. flava.

AMANO A.

Cal. Perian. minimum, 1--phyll. 5--part. lacin. ovat. subrotund. concavis.

Cor. nulla.

Stam. Filam. 5. breviss. receptaculo germinis inserta.

Anth. crassæ, 2-locul.

Pistil. Germ. triangulare. Stigm. 3-gon. concavum, fimbriatum.

Peric.

Sem.

A. Aubl. Guian. tab. 101.

In Guiana H.

Arb. 60-ped. superne ramosiss. Fol. breviter petiol. ovat-acuta, integerr. glabra. Stipul. 2. exiguae, lanceol. Fl. in axilla squamul. in spicam flexuosam, axillar. & terminalem alterne dispositi, congesti, minimi, sessil. virescent.

AMBELANIA.

Cal. Perian. breviss. 1-phyll. 5-part. carnosum, lacin. acutis.

Cor. 1-pet. tubus cylindrac, basi ampliatus, re-

Q ij

ceptacul. germinis insidens: limbus 5-fid. pa-
tens, lacin. inæqualibus, subrotun. undulatis,
acutis.

Stam. Filam. 5. breviss. versus fundum tubi in-
ferta.

Anth. sagittatæ, 2-locul.

Pistil. Germ. subrotun. Stylus oblong. 4-gonus.

Stigma crassum, capitato-ovat. striatum, orbi-
culo plano insidens, ad apicem bicuspidatum.

Peric. Bacca ovat-oblong. acuta, rugosa, glabra,
2-locul.

Sem. subrotunda, compressa, aspera, dissepimen-
to adfixa.

A. Aublet. Guian. tab. 104.

In Caienna, & Guiana Ȑ.

Arb. 8-ped. superne ramosa, ramis rectis, oblong.

Fol. opposita, breviter petiol. petiolis semi-
amplexicaul. ovat-oblong. undulata, integerr.
glabra. Fl. axillar. corymboi. Corymb. sub-
sessil. 3-4-fl. Cor. subalbida. Bacca flava, in
aqua macerata edulis. Sem. ferruginea.

PACOURIA.

Cal. Perian. 1--phyll. 5--part. lacin. subrotund.
acutis, carnosit.

Cor. 1--petal. tubus brevis, receptacul. pistilli
insertus: limbus 5-fid. lacin. subrotun. undu-
latis, mutuo sibi incumbentibus.

Stam. Filam. 5. breviss. tubi versus basin inserta.
Anth. cuspidatæ.

Pistil. Germ. subrotund. Styl. brevis, 4-gonus.

Stigma crassum, capitato-rotund. striatum, or-
biculo plano insidens, ad apicem bicuspidatum.

Peric. Bacca ampla, carnosa, crassa, pyriform.
1-locul.

Sem. plurima, crassa, durissima, in pulpa nidu-
lantia.

Guianensis. P. Aubl. Guian. tab. 105.

In Caribæis Ȑ.

Frutex. Rami oblongi, sarmentosi, volubil. no-
dosi. Fol. opposita, breviter petiol. petiolis
subamplexicaul. ovat-acuta, undulata, inte-
gerr. glabra. Fl. axillar. racemis volubil. Cor.
flava. Bacca, & pulpa flava. Succus plante-
viscosus.

GERUMA.

Cal. 1-phyll. *Cor.* 5-petal. *Pericarp.* 4-locul.
2-spermum.

G. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

Fol. alterna, ovali-oblong. subferrata. *Petal.*
alba.

ARNEBIA.

Cal. Perian. 5-part. erectum, lineare, acutum,
persistens.

Cor. 1-petal. tubus cylindric. limbus 5-fid. pa-
tens, obtusus, fauce aperta.

Stam. Filam. 5. Anth. 3. longiores in fauce cor.
2. breviores.

Pistil. Germ. 4. Stylus filiform. longitudine tubi.
Stigm. 4-fid.

Peric. nullum. *Cal.* erectus, fovens sem.

Sem. 4. extrorsum plana, verticalia triangular.
introrsum convexa, tota glabra.

Hac nota, & stigmatis radiis differt a Litespermo,
cui similis.

A. fol. linear-lanceol. hirsutis: caul. erecto.
Forsk. Æg.

In Arabia.

Radix extus rubra, cutem tingens. Caul. semi-
spitham. basi ramosus, hirsuto-hispidus, teres,
rufescens. *Fol.* infer. ma. pollicar. sessilia,
caulin. minus hirsuta. *Spicæ terminal.* secun-
dæ: bractæ filiform. *Cal.* villosus. *Cor.* ca-
lyce longior, obscure violac.

CATHA.

Cal. Perian. 1-phyll. 5-dent. crateriforme, mar-
gine villoso, fuscum, obtusum, cor. duplo
brevius.

Cor. 5-petal. infera, erecto-patens ovalis obtu-
sa. Nectar. cyathiform. inter stam. & germen,
breve, anulatum, viride, a germine diver-
gens, margine undulato.

Stam. 5. erecta, cor. breviora.

Pistil. Germ. globosum. Styl. brevis. Stigma acutum.

Peric. Caps. oblong-cilindric. 3-locul.

Sem. 1. in quolibet loculo.

• • • • C. Forsk. Æg.

In Arabia ♀.

Arbor. ramis axillar. alternis, ramulos. Fol. 2-pollic. breviter petiol. opposita, in ramis magnis alterna, ovat-lanceol. patentia, ferrata, plana, rigida, nitida, glabra. Pedunc. axillar. oppositi, terminal. solitarii, ad angulos rectos dense dichotomi, flosculo parvo, pedicellato ex singula dichotomia. Petal. alba.

spinosa.

C. fol. ovatis. Forsk. Æg.

In Arabia.

Fol. alterna, ovata, obtusiusc. subcrenata, glabra. Spinae in ramis recentibus nullæ; in veterioribus axillar. solitariæ. Pedunc. axillar. dichotomi. Fl. parvi, albi.

M E L H A N I A.

Cal. Perian. duplex: exterius 3-phyll. foliol. 2. oppositis: tertium ad alterum latus, ovat-acuminat. basi margine reflexa. Interius 5-phyll. foliol. lanceol. extrorsum villosis, cor. adpressis, æqualibus.

Cor. Petal. 5. cuneata, retusa, longitudine calycis, campaniform. Nectar. corona circa basin gemina cui inserta filamenta, emitens 5. lacin. patenti linear. obtusas, cor. breviores, flavescent.

Stam. Filam. 5. filiform. flava.

Anth. erectæ, lanceol. longitudine filament. fulvæ.

Pistil. Germ. superum, globoso-ovatum, villosum, albidum. Stylus filiform. longitudine germin. viride. Stigm. 5. stylo breviora, filiform. patentia.

Peric. Caps. globosa, villosa, calyc. cincta, 5-locul. 5-valv. 4-sperm. angulis dehiscens.

Sem. 4. in quovis loculo, cuneata, punctata, punicea.

M. Forsk. Æg.

In Arabia ♀.

Frutex diffusus, cubit. Rami iuniores tomentosi.

velutina.

Fol. alterna, petiol. ovat-lanceol. serrata, mollia, utrimq. villosa, subr. venis elatis valde reticulata. Stipul. 2. villosæ, cinereæ. Pedunc. axillar. solitar. villoso, cinerei, in umbella 4-fl. terminati. Pedicell. 1-fl. Cor. flava.

MÆSA.

Cal. Perian. duplex; exterius inferum, 2-phyll. minimum, peritens: interius gemini adhaerent, conicum, 1-phyll. peritens, limbo 5-dent.

Cor. 1-petal. supera, campanulata, 5-fid. lacin. subrotund. concavis, patentibus.

Stam. Filam. 5. breviss. filiform. cor. inserta.

Anth. ovatæ, erectæ, didimæ.

Pistil. Germ. globosum, calyc. immersum. Stylus crassus, teres. Stigm. truncatum.

Peric. Bæcca infera, globosa, 1-locul. polysperca'ye coronata.

Sem. subrotunda.

Mæsa. Forsk. Æg.

In Arabia H.

Arb. medioc. magnitudinis, ramis striatis, verrucosis. Fol. 4-pollic. alterna, petiol. lanceol. patent. serrata, glabra. Racemii compositi. Cor. alba.

HYPERANTHERA.

Cal. Perian. 1-phyll. 5-part. tubo breviss. campanul. lacin. 5. coloratis, concavis, glabris, ciliatis.

Cor. Petal. 5. inæqual. calyc. suturæ inserta, obtusa, petalo uno maiore, superne sita, plano: 4. min. æqual. sunt, versus latus interius sita, in apice cochleariform.

Stam. Filam. 5. antherifera, subulata; superiora longiora. Filam. 4. alia subulata, reliquis breviora, sine anth.

Pistil. Germ. subulatum, 6-gonum, villosum, superum. Stylus inferne attenuatus, villosus, superus, teres. Stigm. acutum, 3-dentat.

Peric. Legum. spitham. teres, subcarinat. articulatum incrassatum.

248 PENTANDRIA MONOGYNIA.

monodynamia. H. Forsk. Æg.

In Arabia Ḫ.

Cuffiam æmulatur staminibus, cor. irregulari, & leguminibus. Arbor magna. Rami tomentosi. Fol. ad ramorum apices propinqua, pedal. 2-pinn. Rachis comm. pedal. pinnæ 5-iugæ cum impari: rudimentum foliolor. cochlearifor. petiolatum inter par singulum: pinnæ spitham. exterior. breviores, teretes: foliol. 6-8-iuga, opposita, petiolo filiformi, ovata, plana, integra, glabra. Cor. alba, medio violac.

C A D A B A.

Cal. Perian. 4-phyll. lacin. ovato-acumin. concavis, patentibus, deciduis.

Cor. 4-petal. unguis patentes, filiform. lamina lanceol. undulata, quandoq. nulla. Nectarium inter receptaculum, & laciniam calyc. superiorem, tubulosum, apice lingulatum, planum.

Stam. Filam. 5. inæqual. filiform.

Anth. lanceol. acumin.

Pistil. Pedicellus filiform. incurvus, staminibus longior, elevans germen cylindric. Styl. nullus. Stigm. obtusum, villosum.

Peric. Caps. pedicellata, cylindrica, 1.locul. 2-valv. valvulis revolutis.

Semi. plura, reniform. pulpa triplicis seriei imbricata.

rotundifolia. C. fol. orbiculat. glabris. Forsk. Æg.

In Arabia Ḫ.

Arbor grandis. Fol. alterna, petiol. basi crassa, quandoq. subrepanda, plana, glabra, saepe apice emarginata. Cor. o Nectar. curvum, basi latius, viride, lingua supra fulva, subtus flava. Fructus 2-pollic. glaber, pennæ anserinæ crassitie, torulosus, virid. valvulis post dehiscentiam intus rubris. Sem. nigra, pulpa rubra.

farinosa. C. fol. ovat. oblong. Forsk. Æg.

In Arabia.

Fol. alterna, semipollic. obtusa, integra, plana. Racemi terminal. Nectar. parvum, album, lin-

gua tubo angustiore revoluta. Petal. 4. undulata.

glandulosa. C. ramis, foliis, calyc. pistill. glandulis villosis. Forsk. $\mathcal{A}g$.

In Arabia.

Fol. semipollic. oval-acut. non emarginata, scabra. Peduncul. terminal. subramosi. Caps. semipollic. pedicell. ovat-oblong. hispida, setis clavatis.

CHIMARRHIS.

Cal. Perian. margine integro, coronante germen, persistens.

Cor. infundibulif. tubo breviss. limbo 5-fid., lacin. lanceolat. concavis, obtusis, inferne lineola longitudinali media hirsutis, patentibus.

Stam. Filam. 5. subulata, basi hirsuta, infra divisuras limbi, longitudine cor.

Anth. erectæ, ovales.

Pistil. Germ. subrotun. inferum. Syl. filiform. longitudine staminum. Stigm. obtusum, 2-fid.

Peric. Caps. subovata, obtusa, coronata, 2-lokul. 2-valv. valvis sæpe 2-fid.

Sem. solitar.

C. Jacq. Amer. p. 61.

In Martinica \mathfrak{H} .

Arbor procera, comosa. Rami primarii horizontali. Fol. in apice ramorum plerumq. 8-10-petal. opposita, petiol. lanceol-oblonga, utrimq. acuminata, integerr. nitida. Fl. racemi cymosi, axillar. oppositi, & solitar. terminales plerumq. quaterni, numerosi, parvi, albidi, inodori. Caps. parvæ.

VISCOIDES.

Cal. Perian. minimum, 1-phyll. 5. dent. acutum, coloratum, germini insidens, persistens.

Cor. 1-petal. hypocraterif. tubus cylindric. superne leviter ampliatus, erectus, longiss. limbus 5-fid. lacin. parvis, lanceol. patentiss.

Stam. Filam. 5.

Pistil. Germ. subrotun. coloratum, inferum. Stylus filiform. longitudine staminum. Stigm...

Bacca
Sem.
pendulum. V. Jacq. Amer. tab. 51. f. 1. ed. piæ. tab. 73.
In Martinicæ sylvis B.
 Planta fruticosa, ramosa, in truncis arborum seniorum parasitica, ramis pendul. Fol. plus, minus sesquipollig. opposita, petiol. lanceol. subfalcata, acumin. integerr. avenia, subdisticha, crassa, nitida. Racemi axillar. & terminal. corymbosi, compositi, penduli, rubent. Fl. semipollig. inodori, calyce, germineque rubris; cor. alba.

R U Y S C H I A.

Cal. Perian. 5-phyll. persistens, lacin. subrotund. obtusis, concavis, conniventibus, imbricatis, auctum basi squam. 2. lacin. contumilibus, & inter easdem appendice obovato, acuto, perpendiculariter dependente.
Cor. Petal. 5. ovata, obtusa, planiuscula, reflexa, calyce triplo longiora.
Stam. Filam. 5. subulata, plana, patula, petalis breviora.
Anth. oblong. incumbent.
Pistil. Germ. ovat-subrotund. Stylus nullus. Stigm. 4-gonum, cruciforme, planum.
Peric. Bacca
Sem.
Cuspidifolia. R. Jacq. Amer. tab. 51. f. 2.
In Martinicæ sylvis B.
 Planta suffruticosa, 2-ped. arboribus parasitica. Fol. 4-pollic. alterna, breviter petiol. obverse ovata, obtusa, integerr. crassa, nitida, avenia. Racemi terminal. 9-pollic. simplic. erecti. Fl. parvi, inodori. Cor. purpur.
Guianensis. Ruysschia.
 Sourouhea Guianens. Aubl. Guian. tab. 97.
In Guiana B.
 Arbuscula. Fol. alterna, petiol. ovata, apice acuto, emarginata, crassa, integerr. glabra. Fl. spicati, remoti, alterni, solitar. peduncul. Bractea coccin. Cal. luteus. Cor. sulphur.

BÆOBOTRYS.

Cal. Perian. duplex; exterius 2-phyll. foliol. minimis, subrotund. concavis: interius 1-phyll. campanulat. breve, interum, germini adnatum, 5-fid. lacin. ovatis, persistentibus; post efflorescentiam conniventibus & fructum corollantibus.

Cor. 1-petal. tubulosa, calyci inserta: tubus breviss. limb. erectus, 5-fid. lacin. breviss. rotundat.

Stam. Filam. 5. breviss. in medio tubi.

Anth. cordatæ.

Pistil. Germ. globosum, semisuperum. Styl. breviss. cylindric. persistens. Stigm. obtusum, apice operculatum.

Peric. Bacca globosa, calyci accreta, subsicca, 1-locul.

Sem. plura, angulosa, adfixa receptac. column. in fundo baccæ.

Confer. *Mæsa* Forsk. *Æg.* Cent. III. gen. 9. p. 66.

B. Forst. gen.

In Insulis maris austral.

GENIOSTOMA.

Cal. Perian. inferum, turbinat. persistens, 5-fid. lacin. brevibus, acutis.

Cor. 1-petal. tubulosa: tubus dilatatus, calyce longior: faux villoso-barbata: limb. patens, 5-part. lacin. ovat. acutis, longitudine tubi.

Stam. Filam. 5. brevia, in fauce cor. Anth. oblong. e cor. eminentes.

Pistil. Germ. ovatum. Stylus filiform. tubo longior. Stigm. cylindric. obtusum, sulcatum.

Peric. Capsula? oblong. 2-locul. polysper.

Sem. plurima, subangulata, receptac. filifor, imposita.

G. Forst. gen.

In Insulis maris austral.

DENTELLA.

- Cal.* Perian. superum, 5-part. foliol. subulat.
Cor. 1-petal. tubulosa, calyce longior: tubus sensim ampliatus in limbum 5-fid. patentem, lacin. acutis 3-dent. denticulo intermedio producione.
Stam. Filam. 5. brevia, subulata, ad basin tubi inserta.
Anth. parvæ.
Pist. Germ. inferum, villosum. Styl. brevis, cylindric. crassiuscul. Stigm. 2. stylo crassiora, longiora, patentia.
Peric. Caps. infera, globosa, calyce coronata; 2-locul.
Sem. plurima, ovata.
repens.
D. Forst. gen.
In Insulis maris austral.

LOPANTHUS.

- Cal.* Perian. 1-phyll. tubulosum, 5-fid. persistens; lacin. parvis, æqualibus, acutis.
Cor. Petal. 5. spathulata: unguis tenues longitudine calyc. lacin. subrotun. patentibus.
Stam. Filam. 5. subulata, longitudine cor.
Anth. erecto-incubent.
Pist. Germ. oblong. conicum, villosum. Styl. brevis, cylindric. parum clavatus, papulosus. Stigm. vix emarginatum.
Peric. 1-locul. villo longo obsitum.
Sem. 1. involucrat. ovatum, glabrum, in fundo calyc.
Obs. Genus proximum *Waltheria*.
tomentosus.
L. Forst. gen.
In Insulis maris austral.

CARPODETUS.

- Cal.* Perian. turbinat. germini adnatum, 5-dent. dentibus subulat. deciduis.
Cor. Petal. 5. parva, ovata, calyc. margine inserta.

- Stam.* Filam. 5. brevia, subulat. calyc. margin. inserta.
Anth. subrotun.
Pistil. Germ. inferum. Styl. filiform. staminibus longior. Stigm. capitato--depressum.
Peric. Bacca globosa, sicca, e margine calyc. adnato anulo quasi cincta, 5-locul.
Sem. aliquot subangulata.
C. Forst. gen.
In Insulis maris australis.

serratus.

G Y N O P O G O N.

- Cal.* Perian. minimum, inferum, persistens, semi-5-fid. lacinul. erectis, linear. acutis.
Cor. 1-petal. contorta: tubus cylindric. ventricosus, ad faucem coarctatus: limb. planus, 5-part. lacin. ovat-cordat.
Stam. Filam. 5. breviss. tubo supra medium inserta.
Anth. erect. linear. intra tubum.
Pistil. Germ. ovat. Styl. filiform. tubo dimidio brevior. Stigm. globosum, didymum, apice villosum.
Peric. Bacca subglobosa, pedicellata, coriacea, nucleo foeta.
Sem. Nucleus cartilagineus, 2-locul. seminibus subsolitar.
Obs. Nucleus plerumq. abortiens, semin. destitutus: germina sedda, 2--locular. locul. 2-sperm.
G. fol. verticillat. Forst. gen.
In Insulis maris austral.
G. fol. oppositis. Forst. gen.
In Insulis maris austral.

stellatum.

scandens.

D I G Y N I A.

M A T E L E A.

- Cal.* **P**erian. 1--phyll. turbinat. 5--part. lacin. oblong. acut.
Cor. 1-petal. tubus breviss. receptac. pistilli insertus: limb. 5-fid. patens, lacin. subrotundis, mutuo incumbentibus.

Stam. Filam. 5. brevis. tubo ad basin inserta.
Anth. in capitul. 5-gon. connatæ, 2-locul. intus
 dehiscentes.

Pistil. Germ. 2. ovata, alterum abortivum. Styli
 2. breves. Stigm. incurva, concava.

Peric. Siliqua ovat-oblön. acuta, 5-gona, ver-
 rucosa, 2-valv. 2-locul. septo medio mem-
 branaceo.

Sem. pluriina, plana, marginibus crenatis, mutuo
 incumbent. septo medio adnexa.

palustris.

M. fol. oblong--ovat. acuminat. fl. axillaribus.
Aubl. Guian. tab. 109. f. 1.

In Guiana 24.

Caul. pl. 2-ped. erecti, nodosi. Fol. opposita,
 longe petiol. angusta, integerr. Fl. corymbosi.
 Cor. subvirid. *Var.* fol. amplioribus: calyce ma.
 & cor. viridi.

latifolia.

M. fol. ovat--oblön. fl. axillar. *Aubl.* Guian.
 tab. 109. f. 2.

In Guiana 24.

Caul. 2-3-ped. quandoq. ramosi. Fol. opposita,
 latiora, petiol. semipolluc.

D I C H O N D R A.

Cal. Perian. inferum, 5-part. foliol. lanceol.
 apice patentibus.

Cor. 1-petal. subcampanul. profunde 5-part. lacin.
 lanceolat. longitudine calyc.

Stam. Filam. 5. subulata, cor. breviora.

Anth. ovatæ.

Pistil. Germ. 2. pilosa. Styli 2. filiform. longi-
 tudine staminum, interius e basi germinum
 orti. Stigm. capitato-depressa.

Peric. Capl. 2. subglobosæ, 1-locul. 1-sperm,

Sem. solitar. subglobosa.

repens.

D. Forst. gen.

In Insulis maris austral.



UMBELLIFERÆ.

G I N G I D I U M.

Cal. Involuc. foliol. sub 6. linearibus. Involucc. magnitudine, & numero involuc. foliol. lanceol--subulat.

Perian. proprium 5--dent. minimum, dentibus subulatis.

Cor. generalis flosculosa, flosculis radii fertili- bus; disci abortientibus.

Propriæ. Petal. 5. ovat--lanceol. inflexo apice cordata.

Stam. Filam. 5. cor. breviora, patentia.

Anth. subrotun.

Pistil. Germ. ovatum. Styli 2. divaricati, lon- gitudine stamin. Stigm. simplic.

Peric. Fruct. ovato-truncat. 8-striatus, 2-partibil.

Sem. 2. hinc plana, inde convexa, striata.

G. Forst. it.

In Insulis maris austral.

D A N A A.

Character consistit in fructu didymo, & semin. binis subrotund. non striatis, atque nucleus liberum non continentibus.

aquilegifolia. D. All. Fl. Ped. tab. 63.

Ligusticum alterum Ec. Lob. ic. 786.

In Jaxosis apricis collium, & monium Taurinen- sium 4.

Rad. composita. Fol. radical. plura. Caul. ere-ctus, subnudus, parum ramosus, striatus, glaber, teres, virid. Fol. petiolo palmari, tereti, & striato, qui in alias 3 uncial. dividitur me- dio longiore: qui deinde in 3 alias breves di- viduntur subfoliaceos, quorum quilibet suum foliolum gerit, profunde 3-fid. lateral. 2-lob. aut etiam 3-fid. medio profunde 3--fido: lobi ovati sunt, dentati. Fol. glabra, subtus nervis veluti reticulata. Umbella terminal. Involuc. ex foliol. 8. linear. inæqual. aristatis. Umbel-

Iulæ 15, radiis sub 20. involucc. 3--phyll. ex foliol. ut in universali. Petal. alba, ex ovata forma in caudam abeunt linearem, emarginatam. Sem. nigra, nitida, lævia, matura subrugosa: immatura loco striarum lineæ virides.

TRIGYNIA.

SAGONEA.

Cal. Perian. 1--phyll. 5--part. lacin. oblong, acutis.

Cor. 1--petal. campanif. receptaculo germin. inserita: limb. 5-fid. lacin. subrotun. acutis.

Stam. Filam. 5. cor. basi inserta.

Anth. oblon. nutantes, incurvæ, utrimque sulcatæ.

Pistil. Germ. subrotun. Styli 3. Stigm. subrotun. capitata.

Peric. Caps. sub 3-gon. 3-locul.

Sem. plurima, minutiss. placentæ adfixa.

palustris.

S. Aubl. Guian. tab. III.

In Caribæis 24.

Caul. pl. recti, 3-ped. simplic. cylindrici. Fol. alterna. subsessil. ovat-lanceol. longe acumin. integerr. glabra. Fl. axillar. numerosi, brevi-ter peduncul. Cor. cœurul.

TACHIBOTA.

Cal. Perian. 1-phyll. 5-part. lacin. oblon. acutis, persistent.

Cor. Petal. 5. oblong. acuta, receptac. pistil. unguibus inserta.

Stam. Filam. 5. intra petal. receptaculo imposita.

Anth. subrotun. 2-locul.

Pistil. Germ. 3-gon. Stigm. 3.

Peric. Caps. 3-gon. 3-locul. 3-valv. valvul. septis dissepimento longitudinali.

Sem. plurima, minuta, nigra.

Guianensis.

T. Aubl. Guian. tab. 112.

In Caribæis 5.

Frutex 7-8--ped. Rami pl. sparsi, hirsuti, rufescent. Fol. alterna, subsessil. ovata, acuta, integrerr. glabra. Stipul. 2. ad basin petioli, angustæ, acumin. Fl. axillar. spicati, alterni, remoti, hirsuti, peduncul. Cor. alba. Caps. nigra, calyce obvoluta.

A R U B A.

Cal. Perian. 1-phyll. 5-6-part. lacin. ovat. acutis.

Cor. Petal. 5-6. ovat--oblong. obtusa, calyc. ad ambitum disci inserta;

Stam. Filam. 5--6. raro 8. foliol. villosis, disco inserta.

Anth. 4-gon. 2-locul.

Pistil. Germ. 3-4-5--6. connata extus convexa, disco carnoso insidentia. Styli 3. conniventes. Stigm. sulcata, aut 2-part.

Peric. Caps. 3-4-6. laterales, distantes, ovatae, disco carnoso insertæ, 1-locul.

Sem. solitarium.

Guianensis. A. Aubl. Guian. tab. 115.

In Guiana ♂.

Frutex 6-ped. ramis alternis, undiq. sparsis. Fol. simplic. alterna, sessil. foliol. 3. petiol. comm. adnexis, ovatis, oblong-acumin. emarginatis, undulatis, integrerr. rigidis, glabris. Fl. axillar. & terminal. racemosi. Bract. 2. ad basin fl. Cor. viridis.

PENTAGYNYIA.

G O U P I A.

Cal. Perian. minimum, 1-phyll. 5-dent.

Cor. Petal. 5. disco pistil. inserta, lanceol. intus lamellam ab apice pendentem operientia.

Stam: Filam. 5. breviss.

Anth. 4-gon. 2-locul.

Pistil. Germ. subrotund. Styl. nullus. Stigm. 5. acuta.

Tom. II.

R

Peric. Bacca globosa, 5-striata, 1-locul. calyc. fundo adnata.

Sem. 3-4-5 hinc convexa, inde plana.

G. Aubl. Guian. tab. 116.

In Caribæis ♂.

Arbor excelsa, superne ramosa, & diffusa. Fol. alterna, petiol. ovat-lanceol. acuta, integerr. glabra. Stipul. minutæ, acutæ. Fl. axill. coriaceo-fusco, exigui, lutei. Baccæ nigræ.

tomentosa.

G. Aubl. Guian.

In Guiana ♂.

Differit a priore fol. hirsutis. *Cortex, & fol. valde amara.*

P I R I Q U E T A.

Cal. Perian. 5-phyll. foliol. ovatis, acutis, extus vi lonis, deciduis.

Cor. Petal. 5. subrotun. receptac. inserta, cum calyce alternantia.

St. m. Filam. 5. receptaculo germin. inserta.

Anth. ovaræ, 2-locul.

Fystil. Germ. subrotun. 3-gonum. Styli 5-6. Stigm. plana, carnosa, latifusc. 5-striata.

Peric. Caps. ovata, 3 gona, 1-locul. 3-4-valv. valvul. concavis, longitudinaliter dehiscentibus.

Sem. 7-8. subovata.

P. Aubl. Guian. tab. 117.

In Guiana ♂.

Capit. 2 ped. ramosus, hirsutus, pilis rufescent.

Fol. alterna, subsessil. ovat-oblon. dent. villosa, rugosa. Fl. in axill. superior. ramorum longi, solitar. peduncul. Cor. flava. Sem. fusca.

POLYGYNIA.

S C H Ä F F L E R A.

Cal **P** Erian. minimum, germen umbilicans, persistens, 5-dent. lacin. subulatis.

Cor. Petal. 5. parva, inter calyc. dentes, acuta, decidua.

Stam. Filam. 5. filiform. patent. petalis vix longiora.

Anth. subrotund.

Pistil. Gerin. globoso-depressum. Styli 8-10, breves, teretes, persistent. Stigm. simplic.

Caps. globoso-depressa, infera, 8-10-locul.

Sem. solitar. semicircular. compressa.

S. Forst. gen.

In Insulis maris australis.



C L A S S I S V I.

H E X A N D R I A.



M O N O G Y N I A.

Fl. calyculati, calyce, corollaque instrudi.

* *Musa.* (*Conf. Polygam. monœc.*)

* *Chamærops. Corypha.* (*Conf. App.*)

476. *Licuala.* Cal. 3-part. Cor. 3-part. Nectar. fertifor.
Al. 3-part. Drupa 1-locul.
477. *Bromelia.* Cal. parvus, 3-fid. superus. Pet. 3, lanceol.
Squama nectarifera ad basin petali. Bacca subrotund. umbi icata, 3-locul.
478. *Tilland-* Cal. oblong. 3 fid. inferus, persistens. Cor. campanul.
fusca. 3-fid. C. pf. 1-locul. Sem. pappo longiti. Planta parva.
479. *Burman-* Col. prismaticus, angulis membranac. 3-fid. in-
nua. fatus, coloratus. Cor. 3 pet. Caps. oblonga,
recta, 3-locul. Sem. minuta.
480. *Lachena-* Cal. sub 3-phyl. inferus, coloratus. Cor. 3-
lia. pet. receptac. intorta.
481. *Tridea-* Spatha foliacea fl. continens. Cal. 3-phyl. infe-
chiantia. rus. Pet. 3, magna, rotunda, plana. Filam.
barbata. Caps. 3-locul.
533. *Bursera.* Cal. inferus, 3-phyl. lacin. parvis, subrotund.
concavis. Pet. 3, ovata, acumin. patentiss.
Caps. carnosæ, ovata, 3-valv. 1-sperm.
540. *Frankenia.* Cal. subcylindric. 5-dent. 10-gonus, inferus,
persistens. Cor. 5-pet. Stigm. 6-part. Caps.
ovata, calyce tecta, 3-valv. 1-locul.
536. *Loran-* Cal. o. Cor. 6-fid. lacin. linear. revolutis. Stam.
thus: ad apices petal. Germ. inferum. Bacca 1-sper..
537. *Hillia.* Cal. superus, 6-phyl. segment. oblong. acutis.
Cor. tubo cylindrico, longiss. 6-tulcato: limbo 6-fid. Bacca infera, oblonga, 2-locul. po-
lysper.

529. *Richardia*. Cal. superus, brevis, 6-part. Cor. monopet. subcylindrica, limbo erecto, 6-fido. Sem. 3, nuda, anguosa, superne coalita.
534. *Berberis*. Cal. inferus, coloratus, 6-phyll. foliol. 3. interioribus maioribus, Pet. 6, subrotunda, ad ungues glandulis 2. Gerin. cum stigmate orbiculato, magno, evadit bacca 2-sper.
509. *Leontice*. Cal. inferus, 6-phyll. deciduus. Cor. 6-pet. Pet. 3 inter. minora. Nectar. 6-phyll. unguibus cor. insidens, limbo patente. Caps. inflata.
531. *Prinos*. Cal. inferus, parvus, 6-fid. persistens. Cor. rotata, 6-fid. lacin. ovatis. Bacca subrotun. 6-sper.
532. *Dureia*. Cal. cylindric. truncatus, superus. Cor. 6-part. Filam. o. Pomum hispidum.
538. *Canarina*. Cal. superus, 6-phyll. foliol. lanceol. recurvis. Cor. campanul. 6--fid. nervosa. Stigmat. 6. Caps. infera, 6-locul. polysper.
539. *Nandina*. Cal. polyphyll. imbricatus. Cor. 6-pet.
530. *Achras*. Cal. inferus, 6-phyll. foliol. ovatis, concavis, deciduis. Cor. ovata, 6-fid. squamis totidem alternis interioribus. Pomum 10-locul. Sem. solitar. hilo marginali, apiceq. unguiculato, nitida.
535. *Capura*. Cal. o. Cor. 6-fid. Stam. intra tubum. Stigm. globosum. Germ. superum. Bacca.
 * *Portlandia hexandra*. * *Lythra aliquot*. * *Fumaria cucullaria*.
Fl. spathacei, seu glumacei.
483. *Hæman-* Involuc. maximum, 6-phyll. multifl. Cor. tubuthus. losa, 6-part. supera, lacin. linearibus. Bacca subrotun. 3-loc.
485. *Leucoium*. Spatha oblonga, obtusa, compressa, marcescens. Cor. supera, campanif. 6-part. lacin. ovatis, apicibus incrassatis. Stigm. simpl. Caps. turbinata, 3-locul.
484. *Galan-* Spatha oblong. marcescens. Cor. supera, 3-pet. thus. Pet. concava. Nectar. ex petal. 3 interioribus, parvis, emarginatis. Stigm. simpl. Caps. subrotun.
487. *Narcissus*. Spatha oblong. compressa, marcescens. Cor. supera, 6-pet. æqualis. Nectar. 1-phyll. infundibulif. extra stam. integrum, aut sub 6-fid.
488. *Pancre-* Spatha oblong. compressa, marcescens. Cor. su-
rium. pera, 6-pet. petalis lanceolat. Nectar. infun-
R iii

- dibulif. longiss. 12-fid. extra stam. Germinat omnia sessilia.
- 491. Amaryl-** Flos e sinu magnæ spathæ prodit. Cor. supera, lis. campanul. 6-pet. in plerisque ringens. Stam. inæqualia, declinata. Stigm. 3-fid. Inflexio petal. stam. & pistillor. mire variat in hoc genere.
- 490. Crinum.** In spatha bifoliâ fl. umbellati. Cor. supera, infundibulif. 6-part. basi tubo flexo; lacin. 3-exterioribus uncinatis. Stam. distantia. Gerumen fundo cor. tectum.
- 482. Pontede-** Spatha multifl. Cor. monop. 6-fid. plerumq. ringens; lab. super. 3-fid. inferiore 3-part. Stam. 3 apici, 3 tubo cor. inserta. Caps. carnosa, 3-locul.
- 492. Bulbo-** Cor. infera, infundibulif. 6-pet. unguibus longoditum. giss. angustis, staminifer. Caps. acuminata, supera. Differt a Colchico petal. 6, styllo 1, caps. minus divisa.
- 486. Tulbagia.** Cor. infera, infundibulif. 6-fid. Nectar. coronans faucem, cylindric. 3-phyll. foliol. 2-fid. magnitudine limbi. Caps. supera, ovata. Spatha oblong. 2-valv. membranac.
- 494. Allium.** Spatha comm. membranac. cornuta. Fl. in umbella simplici. Pet. 6, æqualia. Stigm. acutum.
- 493. Aphyl-** Cal. ex squamis imbricatis constans, tubulosus. lanthes. Cor. infera, 6-pet. tubulosa, limbo patente. Filam. fauci cor. inserta. Stigm. 3-fid. Caps. supera, turbinata, 3-angular. Differt a Junco sola cor.
- 502. Hypoxis.** Cal. gluma 2-valv. Cor. 6-part. persistens, supera. Caps. a corolla coronata, basi angustior.
- 503. Ehrharta.** Cor. infera, glumacea, duplex. Nectar. paterifor. Fl. nudi.
- 521. Alstro-** Cor. 6-pet. subbilab. petal. 2 inferioribus basi meria. tubulosis. Stam. declinata. Caps. subrotunda, mucronata, 6-angular. Sem. plurima, globosa, subumbilic. punctis clavatis tecta.
- 522. Gethyllis.** Cal. o. cor. supera, 6-part. Bacca radicalis, clavata, 1-locul.
- 532. Hemcro-** Cor. infera, campanulata, tubo cylindrico, subirregul. 6-part. limbo superne magis reflexo, lacin. 3 interioribus latioribus. Stam. declinata,

520. *Agave*. Cor. supera, erecta, regular. 6-fid. lacin. hu-
ceol. Filam. plerumq. cor. longiora, erecta.
Caps. oblong. 3-locul. Fol. carnosa, succu-
lenta.
519. *Aloe*. Cor. infera, erecta, 6-fid. oblong. tabo gibbo;
limbo patente; fundo nectarifero. Filam. re-
ceptac. inserta. Caps. oblong. Fol. carnosa,
succulenta.
517. *Aletis*. Cor. infera, tubulosa, 6-angul. 6-fid. lacin. lan-
ceol. acutis, patentibus. Stam. inserta laci-
niarum basi. Caps. 3-locul.
514. *Polyanthus*. Cor. infundibulif. incurva, 6-fid. æqualis, lacin.
thes. ovatis. Filam. cor. fuci inserta. Germ. in
fundo cor. Caps. subrotun.
513. *Convallaria*. Cor. infera, 6-fid. limbo reflexo, patente, la-
cina. ovatis. Bacca ante maturitatem maculo-
sa, 3-locul. 3-sper.
515. *Hyacinthus*. Cor. infera, varia, tubulosa, ventricosa,
6-fid. limbo reflexo. Pori 3. melliferi ad api-
cem germinis. Stigm. obtusum,
516. *Phormium*. Cor. infera, campanulata, 6-pet. Pet. 3. ex-
teriora breviora.
507. *Asphodelus*. Cor. infera, 6-pet. stellata, petal. basi conglu-
tinatis. Nectar. ex valvul. 6 germini tegenti-
bus. Stigm. capitata. Caps. carnosa, subrotun.
3-loba.
508. *Anthericum*. Cor. infera, 6-pet. patens. Pet. oblong. obtu-
sa. Caps. ovata.
504. *Ornithogalum*. Bractæ loco calyc. Cor. infera, erecta, 6-pet.
persistens, supra medium patens. Filam. al-
terna, basi dilatata, sæpe tricuspidata.
505. *Scilla*. Bractæ loco calycis. Cor. infera, 6-pet. patens,
decidua, petal. ovatis. Filam. filiformia, non
lata. Caps. subovata, trisulca.
506. *Cyanella*. Cor. infera, 6-pet. concava, pet. 3 interiori-
bus propendentibus. Stam. infimum declina-
tum, longius.
512. *Dracæna*. Cor. infera, 6-pet. erecta. Filam. medio sub-
crassiora. Bacca 3-locul. 3-sper.
510. *Pollia*. Cor. infera, 6-pet. Petal. 3 exteriora majora,
concava; 3 inter. inflexa. Bacca polysper.
511. *Asparagus*. Cal. o. Cor. parva, infera, erecta, campainif.
6-pét. Pét. unguibus cohærentia, 3 interiori-
bus apice reflexis. Bacca rotund. 3-locul. 6-sper.

498. *Gloriosa*. Cor. infera, 6-pet. longa, caudata, reflexa, undulata. Styl. obliquus. Caps. ovata, pellucida.
499. *Erythro-nium*. Cor. infera, campanulata, 6-pet. Petal. lanceolata, supra medium reflexa, alternatim incombentia. Nectar. tuberculis 2, petal. alternorum basi adnatis. Stam. minima. Stigm. 3-fid. Caps. subrotund. Sem. oblonga.
497. *Uvularia*. Cor. infera, hypocraterif. 6-pet. erecta. Pet. longa, lanceol. acuta. Nectarii fovea baseos petali. Filamen. breviss. Styl. semibifid. Stigmatibus reflexis. Caps. oblong. Sem. subrotund. compræssa.
496. *Fritilla-ria*. Cor. infera, campanulata, 6-pet. basi fovea nectarifera. Stam. longitudine cor. Stigm. 3-fid. patens. Caps. 3-gon. Sem. plana.
495. *Lilium*. Cor. infera, campanulata, 6-pet. Petal. basi incombentia, & angusta, linea longitudinali, nectarifera. Caps. oblon. sulcata, 3-gon. valvulis pilo cancellato connexis.
500. *Tulipa*. Cor. campanul. 6-pet. basi late cava; petal. oblongo-cuspidatis, concavis. Stigm. triangul. angulis divisis. Caps. 3-gon. Sem. plana.
518. *Yucca*. Cor. infera, 6-pet. campanul. patens. Pet. magna, ovata, concava. Filam. erecta, cor. longiora. Styl. o. Caps. oblong. 3-sulca, 3-locul. Fol. carnosa, succulenta.
501. *Albuca*. Cor. infera, 6-pet. Pet. 3. exter. patentia, integra; 3. inter. emarginata. Stam. 3. sterilia. Stigm. cinctum 3. cuspidibus.
525. *Lindera*. Cor. infera, 6-pet. Capsula.
489. *Massonia*. Nectar. inferum. Cor. 6-pet. nectario inserta. Fl. incompleii.
526. *Orentium*. Spadix cylindric. multifl. Cal. segmentis subrotundo-angulatis, persistentibus. Cor. 6-pet. nudæ. Styl. o. Folliculi 1-sperm.
524. *Acorus*. Clava ex sinu fol. digitiform. fl. sessilibus undique tecta. Cal. 6-phyl. foliol. obtusis, superne crassioribus, persistentibus. Styl. breviss. Caps. 3-gon. 3-locul. 3-sper.
527. *Calamus*. Cal. 6-phyl. conicus, persistens, segmentis 3-exterioribus latioribus. Cor. o. Bacca globosa, exarida, 1-sper. retrorsum imbricata.
528. *Juncus*. Cal. 6-phyl. foliol. coloratis, siccis, glumosis. Cor. o. Caps. 3-valv. 1-locul. polysper. Her-

ba gramoidea. Fl. glomerato-spicati, paniculati.

541. *Peplis*. Cal. campanulat. 12-fid. Petal. 6, parva, calyci inserta, interdum nulla. Caps. cordata, 2-locul. polysper.

D I G Y N I A.

544. *Falkia*. Cal. 1-phyll. Cor. 1-pet. Sem. 4.
 545. *Atrapha*. Cal. 2-phyll. coloratus, persistens. Petal. 2, suis brotun. sinuata. Stigmat. capitata. Sem. 1, compressum, calyce tectum.
 542. *Gahnia*. Calyc. gluma 2-valv. irregular. Nectar. 2-valv filam. involvens. Stigm. dichotomum.
 543. *Oryza*. Calyc. gluma 2-valv. 1-fl. Cor. 2-valv. subæqualis, femini adnascens.

T R I G Y N I A.

- Fl. inferi.*
554. *Colchicum*. Cal. spatha radicalis. Cor. 6-petaloidea, tubo radicato, longo, tenui, angulato, lacin. erectis, æqualibus, ovato-lanceol. concavis. Caps. 3. connexæ, inflatæ. Num. stam. & 1 spatha simplici differt a Croco.
551. *Melanthium*. Cal. o. Cor. plerumque 6-pet. Petal. oblonga, patentia. Filam. ex elongatis unguibus cor. Caps. 3-gon. 3-locul.
552. *Medeola*. Cal. o. Cor. 6-part. Petal. ovat-oblong. æqualia, patentia, revoluta. Baccæ 3-cocc. 3-sper.
555. *Helonias*. Cal. o. Cor. 6-pet. subconica. Pet. oblong. æqualia. Styli recurvi. Caps. 3-locul.
553. *Trillium*. Cal. 3-phyll. Cor. 3-pet. calyce paulo maior. Baccæ subrotun. 3-locul.
550. *Triglochin*. Cal. 3-phyll. deciduus. Petal. 3 calyciform. Styli 3, aut 6, plumosi. Caps. oblon. 3-6, basi dehiscentes. Fol. graminea. Fl. racemosi.
546. *Rumex*. Cal. 6-phyll. foliol. duorum ordinum, quorum 3 exter. 3 interiora. Sem. 1, triquetrum, nudum. *Dantur species, in quibus sexus est tota planta distinctus.*
- 548 *Scheuchzeria*. Cal. 6-part. patens. Cor. o. Styli o. Caps. 3, ria. inflatæ, compressæ, 2-valv. 1-sperm. Fol. graminea. Fl. subpaniculati.
549. *Wurmbea*. Cal. 6-part. Cor. o. Caps. 3-locul. polysperm.

Fl. superi.

447. *Flagellaria*. Cal. 6-part. lacin. ovaris. Cor. o. Bacca subrotund. coronata, 1-sper. *Adfinitas proxima* *Calami*.

T E T R A G Y N I A.

556. *Petiveria*. Cal. 4-phyl. persistens, foliol. linear. obtusis. Cor. o. Sem. 1, aristis uncinatis.

P O L Y G Y N I A.

557. *Alisma*. Involuc. 3-phyl. fl. colligens. Cal. 3-phyl. Cor. 3-pet. Pericarpia plura. Fl. paniculati, pedicellis verticillatis.

M O N O G Y N I A.

476. LICUA-**C** Al. 3-part. Cor. 3-part. Nectar. fertiforme.
LA.. Drupa 1-locul.
L. spinosa. L. *Syst. veg. ed. 14.* *Thumb. Act. Stock. 1782.*
Diss. nov. gen. plant. Rumph. amb. 1. tab. 9.
In Amboina B.
Caudex ulnaris, superne divisus in 6. ramos, quorum quisque 6.-ulnar. & in apice folium gerit expansum, in radios divisum, qui omnes ad suum ortum separantur. Laterales hi 14. radii sunt angusti, & non ultra 3. digit. lati, superne obtusi, & quasi disrupti. Surculus longitudine rami, inferne vaginis obvolutus: ex eius summo simpl. oritur caul. in 5. min. divisus. Fl. spicati parvi.

477. BROME- Cal. 3-fid. superus. Petal. 3. Squama nectarifera ad basin petali. Bacca 3-locul.

- Ananas*. B. fol. ciliato-spinosis, mucronat. spica comosa.
Syst. veg. ed. 14. *Comm. hort. 1. tab. 57.* *Trew. ehret. tab. 2.* *Black. tab. 567.* *Knorr. del. hort. 2. tab. A. 1. 2.* *Sabb. hort. 1. tab. 72.*
Anassa. *Rumph. amb. 5. tab. 81.*
Kapa-Tsiakka. *Hort. Mal. 11. tab. 1. 2.*
b. Ananas aculeatus &c. Black. tab. 568.

c. *Ananas lucide virens* &c. *Dill. elth. tab. 21.*
f. 22.

In nova Hispania, Surinamo 24.

Fol. radical. 2. ped. longa, sesqui-poll. lata, rigida, dilute virid. Caul. pedal. teres, 2-3. foliol. obsitus. Fruct. terminal. oblongo-rotund. piniform. tuberculis bullatus, ex quibus exeunt flore. e coroll-purpurasc. Fruct. intense flavus. Caro albido-flavesc. sapore iucundiss.

2. *Pinguin.* B. fol. ciliato-spinosis, mucronat. racemo terminali. *Syst. veg. ed. 14. Trew. Ehr. tab. 51.*

Ananas &c. *Pluk. mant. tab. 258. f. 4.*

Pinguin. *Dill. elth. tab. 240. f. 311.*

In Jamaica, Barbados 24.

Fol. magis expansa, in centro rubentia. Scap. 2-3-ped. pyramidal. tomentosus. Fl. numerosi, sub 2-pollic. Petal. pulchre rosea. Fruct. sub-pollic. flavescens, sapore acidulo, non grato.

Pro sepibus vivis, ut possent fere inde mænia fieri.

3. *Karatas.* B. fol. erectis fl. acaulibus, sessil. aggregatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. ed. 2. piča tab. 260. f. 24. quoad fl. & fructum. Hort. tab. 31.*
32.

In Amer. meridion. 24.

Fol. radical. longiss. humanam altitud. superantia, subulato-linear. mucronata, canalicul. ciliato-spinosa, spinis sursum arcuatis, & pungent. basi villo ferrugineo obsita. Fl. 200-300. inodori. Cor. rosea. Fruct. ovalis, non edulis. Stolones inter fol. peracto fructu procumbentia, subulato-filiformes, radicantes, propagantes plantam.

4. *lingulata.* B. fol. serrato-spinosis, obtusis: spicis alternis. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 64. f. 1.*

In Amer. meridion. 24.

Fol. radical. sessil. lingulata, arundinacea, crebre avenia. Scap. simpl. subnudus. Spicæ multæ, laterales.

5. *nudicaulis.* B. fol. radical. dentato-spinosis: caulinis integr. (inermibus). *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 62.*

In Amer. merid. 24.

Fol. radicalia latiss. tese amplectentia, canalicu-

lata: caulinæ lanceol. nervosa. Fl. pyramidal.
Fruct. oblongi.

6. *humilis*. B. subacaul. fl. adgregatis, sessil. axillis stolonifer. *Syst. veg. ed. 14.*

Habitat .
Fol. mucronata, ciliato-spinosa, congeneribus similia, sed omnium rigidiss. breviora, magis que patent. Fl. sub 30. cœrule. in centro fol. Fruct. minor. non grati.

7. *Acanga*. B. panicula diffusa; fol. ciliato-spinosis, mucronat. recurvatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Caraguata. *Pil. Bras. tab. 91.*
Mexo-cotl. *Herm. mex. Moris. Hist. 3. f. 4. tab. 22. f. 7.*

In Brasilia 24.

Fol. longiss. angustiss. & aculeata. Fl. fig. digiti, col. albo-slavesc. Fruct. racemosi, dispersi. Sem. rotunda, nigra, carne spongiosa, acida. *Distinguenda itaque a B. Karatas.*

478. TILLANDSIA. Cal. 3-fid. persistens. Cor. 3-fid. campanulata. Caps. 1-lokul. Sem. papposa. *Plantæ parasiticae.*

1. *utriculata*. T. culm. paniculato. *Syst. veg. ed. 14.*

Viscum &c. *Sloan. Jam. hist. I.*

In Amer. meridional. arboribus 24.

Fol. Aloes in orbem posita, alia cliis inclusa, 2-pedal. cum dimidiò, basi in utricul. convenientia, apice mucronato. Caul. 3-4-ped. e folior. medio, rectus, ramosus. Fl. sparsi, pallide lutei, seu herbac. Stam. purpur. Caps. longæ, triangul. e viridi fus.æ.

2. *serrata*. T. fol. superne serrato-spinosis: spica comosa. *Syst. veg. ed. 14.*

Caraguata &c. *Plum. ic. 75. f. 1.*

In Amer. merid.

Fol. longiss. aliquot pedes longa, crassa, exscavata, lata bafi sepe invicem involvent.

3. *lingulata*. T. fol. lanceol-lingulat. integerr. basi ventricosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Am. tab. 62. ed. picta tab. 92.*

Caraguata &c. *Plum. ic. 74.*

Viscum &c. *Sloan. Jam. hist. I. tab. 120.*

In Amer. merid. arboribus vetustis.

Colligit aquam, & servat.

Culm. erectus, simpl. foliosus. Fol. radicalia,

multa, pedal. basi concava, integerr. nitida. Fl. terminal. glomerati, 3-pollic. lutei, inodori. Caps. fuscæ.

4. *tenuifolia*. T. fol. filiform. integerr. spica simplici, laxa.
Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 63. ed. piætab. 93.

Renealmia &c. *Plum. ic. tab. 238. f. 2.*

Vinum &c. *Sloan. Jam. hist. I. tab. 122. f. 1.*
In Amer. merid arboribus.

Scapus superne pl. spicas lateral. imbricatas emit-
tens. Fol. erecta. Fl. cœrul.

5. *paniculata*. T. fol. radical. brevissim: caul. subnudo; ramis
adscendentibus, subdivisis. Syst. veg. ed. 14.

Renealmia &c. *Plum. ic. 237.*

In Amer. merid.

Caul. ramosiss. Fol. multa, linear. integerr. Fl.
terminal. erecti. Petal. contorta, ac retrofle-
xa. Stam. longiss.

6. *polystachia*. T. culmo spicis imbricatis, lateralibus. Syst. veg.
ed. 14.

Viscum &c. *Cates. car. 2. tab. 89?*

In Amer. calidiore.

Culm. erectus, 3-pedal. foliosus. Fol. multa,
infer. 2-ped. lineari-subul. integerr. canalicul.
basi lata, & ventricosa. Spicae sub 10-ped.
coccineæ. Spathæ coccin. totas spicas tegen-
tes. Fl. solitar. sessil. inodori. Cor. cœrul.

7. *monoftachia*. T. fol. linear. canaliculatis, reclinatis: culmo
simplic. imbricato: spica simplici. Syst. veg. ed.
14.

Renealmia &c. *Plum. gen. ic. 238. f. 1.*

In Amer. merid.

Fol. ex lata basi imbricata. Fl. nivei.

8. *recurvata*. T. fol. subulatis, scabris, reclinatis: culmis 1-fl.
gluma 2-fl. Syst. veg. ed. 14.

Viscum &c. *Sloan. Jam. hist. I. tab. 121. f. 1.*

In Jamuica arboribus.

Dispositio fol. ut in prima specie. Fol. longa,
angusta, *Pini sylv.* æmula, lanuginosa. Caul.
3-unc nudus, incanus. Cal. canescens. Cor.
purpur.

9. *usneoides*. T. filiform. ramosa, intorta, scabra. Syst. veg.
ed. 14.

Viscum &c. *Sloan. Jam. hist. I. tab. 122. f. 2-3.*

Cuscuta &c. *Pluk. alm. tab. 26. f. 5.*

Camanbaya. Pet. gaz. tab. 62. f. 12.

In Virginiae, Jamaic. Brasiliæ arboribus.

Caulic. pl. media plerumq. parte ramo superficialiter adhærentes; filamentis ulnaribus, crispis, ad instar barbæ senis. Caulic. 2-3-unc. ramosi, cum filamentis eiusdem longitudinis, albis. Fl. in summis ramulis.

decumbens.

T. fol. ovat-lanceol. *Forsk. Ægyp.*

In Arabia 24.

Caul. decumbens. Fol. *Commelinæ* æmula, sed longitudinaliter punctato-striata, crassifuscula. Fl. violac. Filam. valde villosa. *An ergo Tournefortia?* Var. fol. lanceol. vaginant. alternis, ciliatis.

479. BUR-MANNIA.

Cal. prismat. coloratus, 3-fid. angulis membranaceis. Petal. 3. Caps. 3-locul. oblong. recta. Sem. minuta.

1. *disticha*.

B. spica gemina. *Syst. veg. ed. 14. Burm. zeyl. tab. 20. f. 1.*

In Zeylonæ paludosis.

Habitus Antherici. Fol. radicalia, plura, graminea, seu ensiform. Caul. erectus, semiped. simplex, fol. minimis, alternis vestitus. Spicæ terminal. simplic. divaricatae, secundæ. Fl. parvi, cœrul. Caps. ventricosa.

2. *biflora*.

B. fl. gemino. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginiae paludosis.

Caul. humilior, nudus, capillaceus. Fol. angusta. Fl. purpur. apicibus luteis.

480. LACHE-NALIA.

Cal. sub 3-phyll. inferus, coloratus. Cor. 3-pet. receptaculo inserta.

1. *tricolor*.

L. *Syst. veg. ed. 14. Að. helv. vol. 9. tab. 3. f. 3. Jacq. icon. pl. rarior. tab. 3.*

481. TRA-DESCHANTIA.

Cal. 3-phyll. Pet. 3. Filam. villis articulat. Caps. 3-locul.

1. *virginica*.

T. erecta, laevis: fl. congestis. *Syst. veg. ed. 14. Ephemerum. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 2. f. 4. In Virginia 24.*

Caul. pâlm. geniculat. Fol. radicalia 2-3. longa. & quasi graminea, mucronata, nervosa, margine aspero: caulina ad genicula amplexicaul. Bract. umbella longiores. Pedunc. inæqual. apice incrassati. Fl. ampli. Cal. villosus. Cor. purpuro-cœrul.

2. *malabari-* T. erecta, lævis: peduncul. solitar. longiss. *Syst. veg. ed. 14.*
ca. Tali-pulli. *Hort. mal. 9. tab. 63.*
In Malabar.
 Caul. rotundi, geniculati, virides. Fol. graminea. Petal. cuspidata, cœrul-purpur.
3. *nervosa.* T. scapo 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*
In Suratte?
 Caul. diffusi, palm. Fol. vaginant. lanceol. pollicar. conferta. Pedunc. terminal. filiform. sub-1-fl. Bract. obsoleta, a fl. remota. Flos magnus. Cal. scariosus, 5-nervis. Petal. ovata, lata, multinervia. Stam. pilis violac.
4. *geniculata.* T. procumb. hirsuta. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 64. ed. 2. piætab. 95.*
In Amer. merid.
 Caul. geniculati, herbac. Fol. alterna, vaginant cordato-acumin. integerr. nervosa. Panicul. axill. & terminal. dichotomæ. Fl. parvi. Cor alba.
5. *axillaris.* T. caul. ramoso: fl. sessil. lateralibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Ephemerum &c. Pluk. alm. tab. 174. f. 3.
Nir-pulli. Hort. mal. 10. tab. 13.
In India.
 Caul. basi repens, adscendens. Fol. linear. acuta, patentia, vaginis coloratis, longius ciliatis. Fl. solitar. parvi. Cor. infundibulif. cœruleo-purpurasc. Stam. pilis articulatis.
6. *cristata.* T. repens, lævis; spathis 2-phyll. imbricatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 137.*
In Zeylona ⊙.
Planta elegans, habitu Commelinæ comm. Caul. diffusi, teretes, læves, ramosi. Fol. lanceol. recurvata, crassa, pinguia, lævia, vaginis striatis. Spathæ 2-fl. fl. sessil. lunatæ, 4-6. parium, secundæ. Cal. cor. brevior, villosus. Petal. sessil. ovata, cœrul. Filam. pilis cœrul. articulatis. Styl. clavatus. Stigm. tubulosum, crenatum. Tota planta in aquis adnata succo muscofo donatur.
7. *papilionacea.* T. repens, lævis: spathis 3-phyll. imbricatis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 7. f. 11.*
In India ⊙.
 Radix fibrosa. Caul. 3-pollic. articulati, ad ge-

nicula radicant. Fol. linear-lanceol. subtus pilosa, erecta, sessil. basi subciliata: vagina breviss. latiuscula. Spatha cordata, margine subciliata; sub qua foliol. 2. lanceol-lunata, super. breviore; inter quæ flos, carinæ loco: inter prædicta 2. foliol. alia proditura spatha, cum suis foliol. nondum conspicuis; sic spatha refert fl. papilionac. Cor. violac. non cœrul. Simil. priori, sed stam. cor. longiora.

2. speciosa. T. fol. oppositis, connatis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Caul. 2--ped. lœvis, sub genicul. lanatus. Fl. verticilli remoti. Fol. sub verticillis opposita, ensiformi-lanceol. connata, margine parum lanata. Petal. 3. exteriora lanceol. rigidiora; interiora 3. teneriora.

482. PONTE-COR. 1-petal. 6-fid. bilabiata (plerumq.). Stam. DERIA. 3. apici; 3. tubo cor. inserta. Caps. 3-locul.

3. ovata. P. fol. ovatis: fl. capitatis. Syst. veg. ed. 14. Narukilo. Hort. mal. II. tab. 34.

In Malabarica aquosis 24.

Caul. rotundi, subcomplanati, superne unico nodulo instructi. Fol. ampla, oblong-rotunda, cuspidata, venis tenuissim. paralellis, supra sature virid. & nitentia, subtus dilutiora.

2. rotundifolia. P. fol. orbiculato-cordat. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In Surinamo.

Fol. radical. petiol. quandoq. renifor. obtusa, avenia. Fol. caulinum unicum, ex cuius petioli vagina exit pedunc. digital. semiteres. Spatha terminal. 1--phyll. ovata, persistens. Spadix hispidus. Spica peduncul. ovata, breviss. fl. pedicellat. fere imbricata in capitulum. Cor. fauce, & magnitudine flosc. neutri *Centaurii Cyani*.

3. vaginalis. P. fol. cordat. racemo (post efflorescentiam) cernuo. Syst. veg. ed. 14.

Plantaginis &c. Pluk. alm. tab. 215. f. 4.

Olus &c. Rumph. amb. 6. tab. 75. f. 1.

In Ind. orient. aquosis 24.

Radix fasciculata, fibrosa, ferrugin. Scap. nullus.

Fol. radicalia vix cordata, acumin. nervosa, lœvia, petiolat. pollicar. Petiol. longiss. supra medium

medium parum dilatati, rima laterali. Racemus lateral. simpl. fol. brevior, e vagina petioli. Fl. 4-5. alterni, breviter pedicell. secundi. Styl. clavatus.

4. *cordata*. P. fol. cordat. fl. spicatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Gladiolus &c. Pet. gaz. I. tab. I. f. 12.

Sagittæ &c. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 4. f. 8.

Plantagini &c. Pluk. manu. tab. 349. f. ult.

In Virginie aquosis 24.

Radix fibrosa, adgregata. Caul. spitham. simpl. Petiol. vaginantes. Fol. *Sagittariae* similia, acuta, nervosa, pubescentia. Fl. spica e rima vaginæ caulinæ, basi involuta bract. Cor. purpuro-cœrul.

5. *hastata*. P. fol. hastatis: fl. umbellat. *Syst. veg. de. 14.*

Carim-gola. Hort. Mal. II. tab. 44.

Sagittæ &c. Moris. Hist. 3. f. 15. tab. 4. f. 7.

Pluk. alm. tab. 220. f. 8.

In India 24.

Caul. simpl. herbaceus, in medio tumidior. Fol. e medio caulis, quasi ex utriculo prodeunt. Pedunculus ex scapo hiante, subspicatus. Spatha lanceol. infra spicam, viridis. Fl. remotiuscul. alterni, sessil. Scillæform. Cor. regular. Germ. superum, ovatum.

483. HÆ-MANTHUS. Involuc. 6-phyll. multifl. Cor. tubulosa, 6-part. supera. Bacca 3-locul.

1. *coccineus*. H. fol. linguiform. planis, lævibus. *Syst. veg. ed. 14. Comm. hort. 2. tab. 64.*

Narcissus &c. Herm. mex. tab. 899.

Ad cap. b. Spei 24.

Radix tuberosa, non edulis. Caul. ex vaginis fol. clausis, albis, violaceo-guttatus. Fol. sequi-spitham. ovali-oblone. integra, nervosa, viuid. rachis subtus violaceo-guttata. Spatha dentata. Setæ longæ inter pedicellos.

2. *puniceus*. H. fol. lanceolat-ovat. undulat. erectis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. Trew. chret. 44.*

Hyacintho &c. Seb. mus. I. tab. 12. f. 1. 2. 3.

Satyrium &c. Swert. flor. I. f. 3. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 12. f. 11. Rudb. elys. 2. p. 120. f. 3.

In Guinea 24.

Radix ex gemino tubere. Caul. dodrant. ex albivires, cum maculis purpur. Fl. nunc sature, nunc dilute coccinei, tandem incarnati.

274 HEXANDRIA MONOGYNIA.

3. *carinatus*. H. fol. linear. carinatis. Syst. veg. ed. 14.
Ad cap. b. Spei 24.

4. *pubescens*. H. fol. linguiform. villosis. Syst. veg. ed. 14. Lin.
Euopl.

Ad cap. b. Spei 24.

484. GA-
 LANTHUS. Petal. 3. concava. Nectar. ex petal. 3. parvis,
 emarginatis. Stigm. simpl.

1. *nivalis*. G. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 313.
Knorr. del. 1. tab. S. 15. n. 2. Clus. penn. 181.
 182.

Leucoium &c. Tabern. ic. 614.

Erangelia. Renealm. Sp. tab. 96.

Narcissus 6. Cam. epit. 956.

Ad radices montium Verona &c. 24.

Radix tunicata. Scapus 3-8--unc. anceps, basi
 fol. 2. involutus, 1--fl. Vagina albida. Fol.
 sublinear. triquetra, basi flavescens. Spatha
 longa, marcescens. Petal. elliptica, alba. Ne-
 ctar. supra medium extus cum macula viridi,
 cordiform. Caps. ovata, obtusa.

485. LFU-
 COIUM. Cor. campaniform. 6--part. apicibus incrassata.
 Stigm. simpl.

1. *vernus*. L. spatha 1-fl. stylo clavato. Syst. veg. ed. 14.
Jacq. Austr. 4. tab. 312. Knorr. del. 1. tab. S.
15. n. 1. Rudb. e.yf. 2. p. 95. f. 1. Clus. hist.
1. p. 169. Tabern. ic. 613.

Narcissus V.I. &c. Camer. epit. 957. Matth.

In Germania, Italiae &c. pratis umbrosis ad ri-
vulos 24.

Radix bulbosa. Scap. cubital. angulatus, fistulo-
 fus, striatus. Fol. porracea, radical. polita,
 nitida, sature virent. Spatha marcesc. Fl. ter-
 minal. nutantes. Petal. alba, apice extus vi-
 rescente, odora.

2. *estivum*, L. spatha multifl. stylo clavato. Syst. veg. ed. 14.
Jacq. Austr. 3. tab. 203. Clus. hist. 1. p. 170.

Polyanthemum. Renealm. Sp. tab. 100.

In Pannonia, Hetruria &c.

Fol. huius lata, ut in L. verno, nec filiform. ut
in sequenti. Scap. anceps, foliis altior. Fol. li-
near. Fl penduli. Petal. elliptica, alba, cum
macula virecente.

3. *autumnale*, L. spatha multifl. styl. filiform. Syst. veg. ed. 14.
Clus. hist. 1. pag. 170.

Tricophyllum. Renealm. Sp. tab. 100.

In Lusitania 24.

Scapus ped. Spatha oblong. linear-lanceol. 2-fl.
Pedunc. inæqual. Cor. tubulosa.

486. TULBA-*Cor. infundibulif. limbo 6-fido. Nectar. coronans
GIA.* facem, 3-phyll. foliol. 2-fid. magnitudine limbi. Caps. supera.

1. *alliacea.* T. fol. subfiliformibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin.
Suppl. Jacq. hort. 2. tab. 115. huc pertinet.*
Ad cap. b. Spei 24.

Radix bulbosa. Fol. radicalia, plurima, linear.
subcarnosa. Scap. pedal. Spatha umbellifera,
2-valv. Fl. cernui, fusco-purpur.

Differt a sequenti statura ma: & nectar. 6-dentato.
Fol. trita odorem alliaceum fætidum spirant.

2. *cepacea.* T. fol. lanceol-linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. supp.
Ad cap. b. Spei 24.*

Radix ex tubercul. connatis. Fol. radical. 1-2-ped.
plurima, linear. obtusa, nitida, læte vi-
rent. Scap. unicus, leviter compressus, obso-
lete anceps. Spatha membranac. 2-valv. alba,
sub 15-fl. formans umbellam raram, inæqua-
lem. Cor. lacin. erectis, lanceolat. rigidis, e
rufo ferrugin.

487. NARCIS-*Petal. 6. æqual. Nectar. infundibulif. 1-phyll. in-
SUS.* integrum, aut leviter 6-fid. Stam. intra necta-
rium.

1. *poeticus.* N. spatha 1-fl. nectar. rotato, breviss. scarioso,
crenulato. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. I. tub. N.
4. Dod. pempt. 223.*

In Italia, Helvetia &c. pratis montanis subhumidis.
Scap. pedal. & ultra, rectus. Spatha lacera.
Petal. alba. Nectar. limbis cinnabarinus, vel
luteus.

2. *Pseu-
narcissus.* N. spatha 1-fl. nectar. campanul. erecto, crispo,
æquante petal. ovata. *Syst. veg. ed. 14. Dod.
pempt. 227. f. 12.*

Bulbodium &c. *Bauh. hist. 2. p. 593.*

In Europæ nemoribus, & collinis pratis 24.

Scap. cubit, subanceps. Fol. crassa, lata, obtu-
sa, carinata. Flos grandis, flavus. Nectar.
plicatum, 6-fid. petal. concolor, & æquale.
Var. fl. pleno.

3. *bicolor.* N. spatha 1-fl. nectar, campanul. margine patu-
lo, crispo, æquante petala. *Syst. veg. ed. 14.
Rudb. elys. 2. p. 71. f. 9. an 7?*

In Europa australi 24.

Simil. priori, sed petal. alba. Nectar. suture luteum, maius, limbo patulo, undulato, crenato. Fol. vix palmar. Flos magnus. Petal. cordat-ovata, alba.

4. *minor*. N. spatha 1-fl. nectar. obconico, erecto, crispo, 6-fid. æquante petal. lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*

Rudb. elys. 2. p. 72. f. 11. Barr. ic. 976.

Pseudo-Narcissus &c. Clus. hist. 1. p. 165.

Bulbocodium &c. Bauh. hist. 2. 597.

In Hispania 24.

Adfinis valde N. Pseudo-Narcisso, sed triplo omnibus partibus minor. Scapus vix striatus. Spatha virens. Flos magis nutans. Petal. basi inter se distincta, recta, lanceol. nec obliqua, aut ovata.

5. *moschatus*. N. spatha 1-fl. nectar. cylindrico, truncato, subrepando, æquante petal. oblon. *Syst. veg. ed. 14.*

In Hispania 24.

Petal. alba. Nectar. cylindric. flavum, moschum olens.

6. *triandrus*. N. spatha sub-1-fl. nectar. campanul. crenato, dimidio petalis breviore; stamin. ternis. *Syst. veg. ed. 14. Rudb. elys. 2. p. 72. f. 12.*

In Pyrenæis 24.

Magnitudo N. poetici, sed fol. dimidio angustiora, canaliculata. Cor. tota nivea. Petal. ova-obläng. Nectar. margine inæqualiter crenulato. Stam. raro 6. Anth. luteæ.

7. *orientalis*. N. spatha sub-2-fl. nectar. campanul. 3-fid. emarginato, petal. triplo breviore *Syst. veg. ed. 14. Rudb. elys. 2. p. 52. f. 2. Clus. hist. 1. p. 154.*

b. N. orient. &c. *Rudb. elys. 2. p. 54. f. 5.*

c. N. *albus* &c. *Rudb. elys. 2. p. 50. f. 1.*

N. *latifolius* &c. *Clus. hist. 1. p. 155.*

In Oriente 24.

Species latifolia facie Turzette. Cor. alba. Nectar. erectum, flavum.

8. *trilobus*. N. spatha submultifl. nectar. campanul. sub 3-fid. integerr. petalis dimidio breviore. *Syst. veg. ed. 14. Rudb. elys. 2. p. 61. f. 3.*

In Europa australi 24.

Simil. N. Junquillæ, sed nectar. cylindric. obsolete trilobum. Petala pallida. Nectar. flavum.

HEXANDRIA MONOGYNIA.

277

9. *odorus*. N. spatha subbisflora; nectar. campanul. 6-fid. lœvi, dimidio petalis breviore: fol. semicylindric. *Syst. veg. ed. 14.*
In Europa australi 24.
 Scap. fere sesquiped. anceps. Fol. ut in *N. hispanico*. Flos luteus. Nect. concolor. *Var. fl. albo*, *sulphur. pleno* &c. *ut videre est in Rudb. elys. &c.*
10. *calathinus*. N. spatha multifl. nectar. campanul. subæquante petal. fol. planis. *Syst. veg. ed. 14. Rudb. elys. 2. p. 60. f. 5.*
Narcissus IX. &c. Clus. hist. I. p. 158.
In Europa australi, Oriente 24.
Simil. N. Tarzetta, sed petal. paulo ma: & acutiora. Flos flavus.
11. *Tarzetta*. N. spatha multifl. nectar. campanul. plicato, truncato, triplo breviore petalis: fol. planis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. I. tab. N. 3. Rudb. elys. 2. p. 57. f. 11.*
N. latifolius, fl. albo. I. 2. Clus. hist. I. p. 155.
In Gallia, Hispania &c. maritimis, subhumidis 24.
 Fol. disticha. Cor. tubus viridis.
12. *Bulbocodium*. N. spatha 1-fl. nectar. turbinato, petalis ma. genitalibus declinat. *Syst. veg. ed. 14. Rudb. Elys. 2. p. 75. f. 5. 7.*
Pseudo-Narcissus &c. Clus. hist. I. p. 166.
Inter Ulyssiponem, & Hispalim 24.
 Nectarium magnum, aureum.
13. *serotinus*. N. spatha 1-fl. nectar. 6-part. breviss. fol. subulatis. *Syst. veg. ed. 14. Rudb. elys. 2. p. 64. f. 8.*
N. autumnalis &c. Clus. tab. 252.
In Italia, Hispania, Barbaria 24.
 Planta parva. Flos albus.
14. *Junquilla*. N. spath. multifl. nectar. campanul. brevi: fol. subulat. *Syst. veg. ed. 14.*
N. iuncifolius &c. 2. Clus. hist. I. p. 159.
In Hispania, Oriente 24.
 Flos luteus.
-
- dubius*. N. spath. multifl. petal. ovatis: nectar. campanul. integerr. petal. triplo breviore. *Gouan, Illus. Rudb. Cam. tab. 51. f. 2.*
In sylvis 24.

HEXANDRIA MONOGYNIA.

N. Tarzetta duplo humilior. Scap. lineatus, apice subanceps. Fol. 5-6. linear. palmaria, scapo breviora. Petal. & nect. album.

hispanicus. *N. scapo* ancipi*ti*, exstriato, 1-fl. nectar. 6-fid. patulo; lobul. dentatis. *Gouan. Illust.*

In Hispania 24.

Scapus dodran-sesquiped. Fol. longitudine fere scapi, plana. Cor. minima, basi extus e flavo-virens. Petal. subæqual. lanceol. obliqua, lutea; exterioribus 3. paulo latioribus, magis que acumin. Nectar. cylindric. petalis vix longius, concolor, post anthesin longius.

488. PAN-CRATIUM. Cal. est spatha. Petal. 6. Nectar. infundibulif. 12-fid. Stam. nectario imposita.

1. *ceylanicum*. P. spatha. 1-fl. petal. reflexis. *Syst. veg. ed. 14.* Narcissus &c. *Herm. Lugd. tab. 693. Comm. hort. 1. tab. 38. Rupp. elys. 2. p. 179. f. 7.*

Lilium indicum. *Rumph. amb. 6. tab. 70. f. 2.* Catulli-pola. *Hort. mal. 11. tab. 40.*

In India 24.

Bulbus oblongo-rotund. pallidus. Fol. Narciso breviora. Cor. 6-gona, candida, odora.

2. *mexicanum*. P. spatha biflora. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 222. f. 289.*

In Mexico 24.

Scapus dodrant. Fol. dodrant. trisulcata, reclinata, dilute virid. glauca. Cor. alba.

3. *caribaeum*. P. spatha multifl. fol. lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Narcissus &c. Comm. hort. 2. tab. 87. Martyn. cent. tab. 27.*

In Jamaica, Caribæis 24.

Bulbus tunica exter. subrubra. Fol. 2. ped. longa, 4. digitos transversos lata, nervis longitudinal. Scap. fol. longior, planus. Flos hexagon. albus, odorus.

4. *maritimum*. P. spatha. multifl. petal. planis: fol. lingulatis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 197.*

Lilio-Narcissus &c. *Moris. hist. 3. f. 4. tab. 10. f. 28.*

Hemerocal. *Valentina.* *Clus. hist. 1. p. 167.*

In locis maritimis 24.

Bulbus extus nigricans, intus albus. Scap. 2-ped. anceps. Fol. 7-8. apice obtuso, latitudine pollic. dilute virid. Fl. magni. Petal. lanceol. alba, subtus linea viridi: exter. 3. apice in-

trorsum uncinata. Nectar. angul. 2-part. acuminat. & divaricatis ad latitudinem petal. Germ. media umbellæ, sessil. Stylus declinatus. Filam. inflexa.

5. *declinatum*. P. spath. multifl. scapo compresso, ancipiti: cor. lacin. tubum subexcedentibus: fol. lingulatis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. piæt. tab. 102. Hort. 3. tab. II.

Habuit . . .

Bulbus ovatus. Fol. plura, 2-3-ped. acutiuscula. Scap. longitudine fol. anceps, compressus. Fl. sub 10. adgregati, Vanillæ olentes. Spath. membranac. Cor. lacin. linear. patentibus, reflexis, canaliculat. albis, tubo subvidente. Nectar. albens. Anth. flavæ.

6. *carolinianum*. P. spath. multifl. fol. linear. staminibus nectarii longitudine. Syst. veg. ed. 14.

Lilio Narcissus &c. Catesb. car. 3. tab. 5.

In Jamaica, Carolina 24.

Scap. 6-7-pollic. Fol. latiusculi, suture virid. luentia. Cor. tubo ad basin ventricoso, alba.

7. *illyricum*. P. spath. multiflora: fol. ensiform. staminibus nectar. longioribus. Syst. veg. ed. 14. Trew. ehret. tab. 27.

Narcissus &c. Seb. thes. I. tab. 8. f. 1.

Lilio-Narcissus &c. Besl. eyst. vern. 3. tab. 16. f. 1.

In Illiria 24?

Fol. Galanthi magnitudine. Fl. magni, candidi, odore Balsami Peruani.

8. *littorale*. P. spath. multifl. scapo compresso, ancipiti: cor. lacin. tubo duplo brevioribus: fol. ensiform. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 79. f. 94. ed. piæta tab. 101. Hort. app. tab. 75.

In littoribus arenosis Cartagenæ 24.

Bulbus pugni magnitudine, foris fuscus. Fol. plura, sublinear. attenuata, acutiuscula, 2-3-ped. integerr. nitida. Scap. axillar. erectis. Fl. 4-10. odore Vanillæ. Spatha arida. Cor. inferne pallide virens, superne nivea, lacin. semireflexis. Nectar. inæqualiter emarginat. patens, album. Anth. aurantiacæ.

9. *amboinense*. P. spath. multifl. fol. ovatis, nervosis, petiolat. Syst. veg. ed. 14.

Narcissus &c. Rudb. clys. 2. p. 238. f. 17.

b. Pancratium foliis &c. Trew. ehrer. tab. 28.

Cepa &c. Rumph. amb. 6. tab. 70. f. I.

In Amboina.

Bulbus oblong-rotund. albicans. Scap. sesquiped.
& ultra, rotund. Fol. 4-5. longe petiol. magna, lata, acumin. nervis longitudinal. apice coeuntibus, dilute viridia. Fl. sub-12. pedunculat. nivei, inodori. Stam. petalis breviora: in var. longiora.

maximum. P. spath. 1-fl. petal. patent. nectar. pedal. Forks.
Æg.

In Arabia 24.

Scapus teres, glaber. Petal. stamin. longiora,
acuta, patula, sed non reflexa, et in P. zeylanico, alba. Nectar. enorme.

489. MASSONIA. Nectar. inferum. Cor. 6-petal. nectar. inserita.

1. *latifolia*. M. fol. orbiculat. glabris. Syst. veg. ed. 14. Lin.
Suppl. Thumb. Diff. nov. pl. gen.

Ad cap. b. Spei.

Fol. radicalia, bina, lævia. Fl. adgregat. exscapus. Fruct. non baccatus, sed capsul. membranaceis.

2. *angustifolia*. M. fol. lanceolat-oblong. glabris. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Thunib. l. c.

Ad cap. b. Spei.

3. *undulata*. M. fol. lanceol. undulatis, glabris. Syst. veg. ed. 14. Thunb. l. c.

Ad cap. b. Spei.

4. *echinata*. M. fol. ovat. muricatis, pilosis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

490. CRI-
NUM. Cor. infundibulif. 6-part. lacin. 3. exterioribus
uncinatis. Germ. fundo cor. tectum. Stam. di-
stantia. In spatha 2-fol. fl. umbellati.

1. *latifolium*. C. fol. ovat-lanceol. acuminat. sessil. planis. Syst. veg. ed. 14.

Sjouanna H. mal. II. tab. 39. Rudb. clys. 2. p. 91. f. 12.

In Asia arenosis 24.

Bulbus albicans. Scap. planus, compressus. Fol. 3-4. digit. transversos lata, crassa, striis longitudinal. Fl. 5-6. quatuor, quinq. pollic. candidi, striati, odore debili, sed grato. Anth. filiform. incumbentes.

2. *asiaticum*. C. fol. carinatis. *Syst. veg.* ed. 14.
 Lilium &c. *Herm. Lugd.* tab. 683. *Rudb. elys.* 2.
 p. 182. f. 10.
 Radix &c. *Rumph. amb.* II. tab. 69.
 Belutta pola. *Hort. mal.* II. tab. 38. *Rudb. elys.*
 2. tab. 90.
In Malabarria, Zeylona, America 24.
 Bulbus corculo flavo. Scapus plano-rotund. dilute virid. Fol. bifaria equitantia, ensiform. lata, oblong-acumin. venis longitudinal. viridifusca, ad radicem albican. Cor. purpurasc. margine albo, lacin. longiss. reflexis. Stam. declinata. Bulbi intra capsul. generantur.
3. *zeylanicum*. C. fol. scabro-dentat. scapo compressiusculo. *Syst. veg.* ed. 14.
 Lilio-Narcissus &c. *Ehret. pict.* 5. f. 2. *Trew. ehret. tab.* 13. *Comm. hort.* I. tab. 73. *Rudb. elys.* 2. p. 181. f. 9.
 Tulipa &c. *Rumph. amb.* 5. tab. 105.
In India orientali 24.
 Statura C. *americ.* Fol. *Scillæ officinal.* carnosa.
 Spatha 2-valv. præter ramenta aliquot interiora. Cor. tubus scapo concolor, rufescens; limbus albus petalis lanceol. recurvis, subtus rubro-carinatis. Filam. & styl. sanguineus. Germina sessilia.
4. *americanum*. C. cor. apicibus introrsum uncinatis. *Syst. veg.* ed. 14.
 Lilio-Aphodelus &c. *Comm. rar. tab.* 14. *Dill. elth. tab.* 161. f. 195.
 b. Lilio-Aphodelus &c. *Comm. rar. tab.* 15.
In America 24.
 Bulbus crassus. Fol. 2. ped. longa, & ultra, palmum lata, carinata, margine undato, dilute virid. Scap. 2-3-ped. subcompressus, ad latus fol. egrediens. Spath. multifl. Fl. primum dilute flavescent. dein albi, odore *Leucoii*.
5. *africanum*. C. fol. sublanceol. planis: cor. obtusis. *Syst. veg.* ed. 14. *Knorr. del.* I. tab. L. 10.
 Hyacinthus &c. *Breyn. prod.* I. ic. 23. tab. 10.
Comm. hort. 2. tab. 67. *Seb. thes.* I. tab. 19. f. 4.
 Hyacintho &c. *Pluk. alm.* tab. 195. f. 1.
In Æthiopia 24.
 Bulbus rotundus, subflavus, Scap. 2-ped. rotun-

dus. Fol. radicalia, in orbem expansa, mucronata, virid. Cor. coerulea.

6. *tenellum*. C. spath. multifl. fol. filiform. cor. æqualibus. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Pluk. atm. tab. 225. f. 2.

Ad cap. b. Spei 4.

Planta minor Ornuhogalo mi. Rad. bulbosa. Fol. radicalia, digital. Scap. digital. spiralis, ut in *Antherico spirali*, teres. Umbella pedicell. 3-4. æqualibus, pollic. Spatha linear. membranacea. Fl. magnitudine *Arenaria trinervia*.

7. *obliquum*. C. fol. lanceolat. obliquis: cor. lacin. alternis, extus glandulosis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Ad. cap. b. Spei.

Cor. purpurea.

8. *speciosum*. C. fol. ensiform. cor. campanulatis; lacin. 3. alternis, calloso-unguiculat. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Fl. magni, umbellati, sanguineo-purpur.

9. *lineare*. C. fol. linear. cor. campanulat. lacin. 2. angustioribus. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Fl. magni, albi.

10. *angustifo-* C. fol. linear. obtusis: cor. cylindricis, lacin. lium. alternis, interglandulosis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

11. *falcatum*. C. fol. linear. falcatis, ad oras cartilagineis, scabris. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 60.

In promontorio b. Spei 4.

Bulbus ovatus, magnitudine pugni, extus nigricans. Fol. obtusa, crassula, glauca, terræ incumbentia. Scap. lateralis, erectus, compressus, rufus. Spath. 2-fol. Fl. umbel'ati, 7. odori. Cor. albida, cum dorso media parte rubra. Styl. declinatus, rubens.

- caspium*. C. Pall. it. 2. tab. Q.

Ad mare Caspium 4.

Fol. radical. 2-3. lanceol-latiſcula, conniventia, undulata. Scap. erectus, fol. paulo longior, laevis. Spath. 2-phyll. Umbella erecta, convexa. Fl. peduncul. purpuro-albi.

491. AMA- Flos ex sinu magnæ spathæ prodit. Cor. 6-petal. cam-
RYLLIS. panulata, in plerisque ringens. Stam. declinata.
Inflexio petalor. stam. & pistil. mire variat in hoc gen.
1. *capensis*. A. spath. 1-fl. remotiss. cor. æquali ; staminibus , pistilloq. rectis . Syst. veg. ed. 14.
Sisyrinchium &c. Corn. Canad. 164. Morif. hist. 3. f. 4. tab. 23. f. 9. R mdb. elys. 2. p. 236. f. 17. Ad cap. b. Spei 24.
Bulbus crociform. reticulo obductus . Fol. *Narcissi*, longitudine scapi . Scap. infra medium vaginans . Spatha acumin. plana . Petal. lanceol. extus cinerea , intus cœrul. circulo flavo divisa , macula nigricante ad unguem . Stam. breviss.
2. *lutea*. A. spath. 1-fl. cor. æquali : stamin. strictis . Syst. veg. ed. 14.
Narcissus autumn. ma. Clus. hist. 1. p. 164. In Italia , Hispania &c. 24.
Scap. semiped. Petal. lutea . Stam. alterna , breviora .
3. *Atamasco*. A. spath. 1-fl. cor. æquali ; pistillo declinato . Syst. veg. ed. 14.
Lilio-Narcissus &c. Catesb. car. 3. tab. 12. Barr. ic. 994. Morif. hist. 3. f. 4. tab. 24. f. 4. In Virginia 24.
Scap. pedal. Fol. angusta , *Narcissina* . Fl. solitar. albi , dilute rosei .
4. *formosissima*. A. spath. 1-fl. cor. inæquali , petal. 3. genitalibusque declinatis . Syst. veg. ed 14. Act. Stock. 1742. tab. 6. Knorr. del. 1. tab. N.
Lilio-Narcissus &c. Dill. elth. tab. 162. f. 196. Narcissus &c. R mdb. elys. 2. p. 89. f. 10. In Amer. meridion. 24.
Bulbus fuscus . Fol. *Narcissina* , pedal. & ultra , reflexa , subcarinata . Scap. pedal. Cor. sanguinea , ad basin herbaceo-albicans , marginibus petal. lateralium linea albida . Squamæ totidem quot filamenta , e receptac. ortæ . Raro 2-fl. evadit .
5. *Belladonna*. A. spath. multifl. cor. campanulat. æqualibus , ungue reflexis : genitalibus declinatis . Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 23.
Lilio-Narcissus &c. Seb. thes. 1. tab. 17. f. 1. Lilium rubrum . Merian. Surin. tab. 22. In Caribæis , Barbados , Surinama 24.

Bulbus virid. Scap. teres, subcompressus. Cor. incarnata, fundo viridi-albicante. Petal. 3. exterior. intus apice reverso: 3. interior. basi ciliata. Stylus ruber.

6. *reginæ*. A. spath. multifl. cor. campanulat. æqualibus, undulat. genitalibus declinatis. Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 24.

Lilium &c. Herm. par. tab. 194.
In Caribæis.

Differt a priore marginibus petalor. undulatis, nec ad unguis recurvatis. Petal. punicea.

7. *undulata*. A. spath. multifl. cor. patulis, petal. undulatis, mucronatis, basi dilatatis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 13. Hill. hort. Keven. tab. 14. Ad cap. b. Spei 24.

Bulbus subrotundo-ovat. squamosus, extus fuscus, intus albus. Fol. pauca, erectiuscula, linear. obtusifusc. glabra. Spath. 2--phyll. sub 12--fl. Foliol. oblonga, striata, integerr. extus purpur. intus carnea, subpellucida. Petal. patent. rosea, inodora. Stam. declinata.

8. *sarniensis*. A. spath. multifl. cor. revolutis: genitalibus erectis. Syst. veg. ed. 14.

Narcissus &c. Corn. Canad. tab. 158. Rudb. elys. 2. p. 23. f. 14. Ehret. Select. tab. 9. f. 3. Seb. mus. 1. tab. 17. f. 3.

Lilium &c. Dugl. monogr. tab. 1. 2.

In Japonia, nunc in Sarnia insula Angliae 24.

Bulbus ovatus. Scap. ped. superne virens, inferne punctis atro-purpur. Fl. 9-10. Petal. 2-unc. angusta, cinnabarina, vena sanguinea, lacunarum media discriminante.

Fl. soli meridiano exposuit, mille scintillas evibrant. 9. *longifolia*. A. spath. multifl. cor. campanulat. æqualibus: genitalibus declinatis: scapo compresso, longitudine umbellæ. Syst. veg. ed. 14. Ehret. piæ. tab. 13.

Lilium &c. Herm. parad. tab. 195.

In Æthiopia 24.

Bulbus rotund. albus. Scap. spitham. Fol. longa, lata, flexuosa. Petal. sature purpur. nitentia, quandoq. diluta.

10. *disticha*. A. spath. multifl. fol. distichis, incumbenti-patientiss. cor. æqualibus, campanulat. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

- Umbella ut in *Hæmantho*. Fl. incarnati .
II. ciliaris. A. spath. multifl. fol. ciliatis : cor. 6-part. reflexa . Syst. veg. ed. 14.
In Æthiopia.
 Fol. linear. plana , 2-palmar. pollicis latitudine , ciliis albis .
II. orientalis. A. spath. multifl. fol. linguiform. cor. inæqualibus . Syst. veg. ed. 14.
Brunsvigia Heist. cum fig.
Lilio-Narcissus &c. Moris. hist. 3. s. 4. tab. 10. f. 35.
Narcissus &c. Swert. flor. tab. I.
In India 24.
 Bulbus maximus . Fol. ad terram strata , ampla , pedal. 2-3-pollic. lata , apice obtuso , subrotund. Scap. palmar. plano-convexus . Fl. veluti umbellati , sub 30 , 2-pollic. peduncul. Petal. pallide rubella , seu col. lateritii , striis flavidant. immixtis , inodora .
-

- alba.** A. fol. linear-lanceol. fl. albo . Forsk. Suppl. Æg.
In Arabia 24.
 Spatha 10-fl. Fl. declinati .
bifolia. A. fl. singulari , purpur. Aubl. Guian.
In Guiana.
492. BULBO-CODIUM. Cor. infundibul. 6-petal. unguibus angustis , staminiferis . Caps. supera . Differt a Colchico petal. 6. stylo unico ; capsul. minus divisa .
I. vernum. B. fol. lanceolat. Syst. veg. ed. 14. Retz. Obs. fasc. 2. tab. I. f. I.
Colchicum vernum Clus. hist. 2. app. 203.
In Hispania , Russia 24.
 Bulbus fuscus . Fol. sese mutuo amplectentia , carinata . Flos primum albus , dein dilute purpur. Fl. interdum 4-petal. tetrandi .
493. APHYL-LANTHES. Cal. ex squamis imbricatis compositus , tubulosus . Cor. 6-petal. caryophillæa , petalis in tubum , superius limbo patente instructum dispositis . Stigma 3-fid. Capsula turbinata , 3-angular. Differt a Junco sola cor.
I. monspeliensis. A. Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 3. p. 336.
Cariophyllum &c. Moris. hist. 3. s. 5. tab. 25. f. 12.
In pascuis siccis Monspelii &c. 24.

Rad. repens. Culm. pl. 2-palm. simpl. cincti basi vaginis, uti *Juncus*. Fol. radicalia, graminea. Fl. terminal. solitar. cœrul.

494. ALLIUM. Spatha commun. membranac. cornuta. Fl. in unibella simplici. Petal. 6. æqual. Stigm. acutum.

* *Fol. caulina plana. Umbella capsulifera.*

1. Ampelopra- A. caul. planifol. umbellifero : umbella globosa ; sum. petal. carina scabris ; stamin. tricuspidatis. Syst. veg. ed. 14.

In Oriente, & in Anglia 24.

Rad. sphærica, cum bulbis adnatis ex parte inferiori. Scap. cubital. & ultra, inferne foliosus. Fol. pulposa, succulenta, glauca. Spath. conica, 1-phyll. decidua. Petal. alba. Stam. cor. longiora. *Odor Porri.*

2. Porrum, A. caul. planifol. umbellifero ; stamin. tricuspidat. radice tunicata. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 421. Cam. epit. 321.

b. *Porrum sedile* Matth. 550.

In vineis Helvetiæ, an sponte?

Simil. priori, & forte sola varietas. Rad. bulbosa, subcylindr. ventricosa. Scap. 3-ped. & ultra, inferne foliosus. Fol. lata, plana, vel carinata. Spath. subconica, caduca. Umbella magna, sphærica, densa. Pedunc. purpur. Pet. subpurpur, carina scabra.

3. lineare. A. caul. planifol. umbellifero : umbella globosa ; stamin. tricuspidat. cor. duplo longioribus. Syst. veg. ed. 14.

Porrum &c. Gmel. Sib. I. tab. 13. 14. f. 1.

In Sibiria.

Scap. dodrant-sesquicubit. solidus. Fol. aut virid. & tenuia ; aut crassa, inferne convexa ; acuta, quandoq. obtusa, glauca. Spath. alba, postquam rumpitur bicornis. Petal. subrubent. stria longitudinali saturore.

4. rotundum. A. caul. planifol. umbellifero : umbell. subglobosa : fl. lateralibus, nutantibus : stamin. tricuspidat. Syst. veg. ed. 14.

Allium, seu Moly. 5. Clus. pann. 216. 218.

In Europa australi 24.

Rad. ex bulbis purpur. & nigris constans. Scap.

3-ped. Fol. graminea. Spatha brevis. Petal.
exter. purpur. inter. dilutiora.

5. *victoriae*. A. caul. planifol. umbellif. umbella rotundata: fol.
elliptic. stamin. lanceolat. cor. longioribus. Syft.
veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 216. Black.
tab. 544.

A. *anguinum*. Cam. epit. 329. Matth. 559.

A. *alpinum*. Bauh. hist. 2. p. 556.

In alpibus Italiæ, Helvetiæ, Austriae &c. 24.

Odor alliaceus. Bulbus ruber. Caul. pedal. &
ultra, inferne cum macula purpur. Fol. radi-
cal. 2-3. caulina 2-3. vaginantia: radicalia in
alpinis angusta, elliptico-lanceol. in hortis o-
vata, Spath. brevis, lata. Petal. purpur. vel
subalbida, virore tincta.

6. *subhirsutum*. A. caul. planifol. umbellif. fol. infer. hirsutis:
stamin. subulatis. Syft. veg. ed. 14.

Moly Diosc. Clus. hist. 1. p. 192.

In Africa, Italia, Hispania &c.

Bulbus exiguis, simpl. Caul. ped--cubital. Fol.
spitham. Spath. brevis. Pedunc. longi, sparsi.
Petal. acumin. alba.

7. *magicum*. A. caul. planifol. umbellifero; ramulo bulbifero;
stamin. simplic. Syft. veg. ed. 14.

Moly ind. Swert. Fl. 61.

b. Caucason. Lob. ic. 162.

Habitat . . .

Bulbus magnus. Caul. 2-cubit. teres. Fol. am-
pla, unc. lata, obtusa, glauca: caulina sub-
terna. Capitul. bulbiferum. Petal. magna,
alba, linea virescente.

8. *obliquum*. A. caul. planifol. umbellif. fol. obliquis, teretibus:
stamin. filiform. fl. triplo longioribus. Syft. veg.
ed. 14. Gmel. Sib. 1. tab. 9.

In Sibiria.

Bulbus oblong. Caul. 1-3-cubit. apice parum nu-
tans. Fol. omnia caulina, alterna, linearis-
lanceol. vaginis teretibus. Capitul. hemisphæ-
ric. sine bulbillis. Spath. globosa, acumin.
purpur. Petal. erecta, ovata, concava, alterne
latiora, lutea, carina viridi. Filam. albida.
Anth. luteæ. Germ. subglobosum.

9. *ramosum*. A. caul. planifol. umbellif. fol. (sæpe) linearis-
bus, subconvexis: umbella globosa: stamin.
subulat. longioribus. Syft. veg. ed. 14. Comm.

Gott. 1752. tab. 9. & tab. 10. f. 2. Gmel.
Sib. I. tab. 11. f. 1.

In Siberia.

Bulbus cylindricus. Caul. ferme 2--ped. teres.
Fol. subdodrant. Cepæ odore, & sapore, va-
riantia latitudine, & col. alterna, planiuscul.
canalicul. margine obtuso. Spath. alba, striis
virid. Petal. ovata, purpurascens. carina satu-
riore; quandoq. alba. Filam. purpur. Anth.
violac. Germ. subrotun. maculis 3. virid. E
medio caule ex ala folio opposita ramus nu-
dus, longitudine caulis.

10. *roseum*. A. caul. planifol. umbellif. umbella fastigiata;
petal. emarginatis; stamin. breviss. simplicibus.
Syst. veg. ed. 14. *Magnol. monsp. tab. 10. Rudb.*
elys. 2. p. 166. f. 17.

In Monspelii, Pedemontis vineis 24.

Fol. linear. plana, longitudine vix scapi. Scap.
pedal. teres. Spath. obtusa. Fl. maiores quam
in reliquis. Petal. obovat--oblong. obtusa,
atro-purpur. Stam. alba. Bulbi ad fructum
nulli.

11. *tataricum*. A. caul. planifol. umbellif. fol. semicylindric.
umbella plana, stamin. simplicibus. Syst. veg.
ed. 14. *Lin. Suppl.*

In Siberia.

Caul. semipedal. versus basin foliosus, teres,
lævis. Fol. vix caule breviora, lævia. Spath.
subrotun. 2-valv. marcescens. Umbella fasti-
giata. Cor. plana, alba, petal. lanceolat. sub-
carinatis.

** *Fol. caulina, plana. Umbel. bulbifera.*

12. *sativum*. A. caul. planifol. bulbifero: bulbo composito;
stamin. tricuspidat. Syst. veg. ed. 14. *Cam. epit.*
328.

In Sicilia.

Odor olidus. Fol. linear. Umbella subrotunda.
Sem. nigra.

13. *Scorodo-*
præsum. A. caul. planifol. bulbifero: fol. crenulat. va-
ginis ancipitibus: stamin. tricuspidat. Syst. veg.
ed. 14.

In Germania, Dania &c.

Caul. 3-ped. & ultra. Fol. lata, plana. Umbel.
subro-

subrotund. valde bulbifera. Spatha longa, mucronata. Petal. rubra, margine albido.

14. *strenarium*. A. caul. planifol. bulbifero, vaginis teretibus: spatha mutica; stamin. tricuspidat. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 290.

Porrum &c. Hall. tab. 2. f. 2.

Allium, seu Moly montanum &c. Clus. Pann. p. 212.

In Thuringia, Helvetia &c. secus torrentes 24.

Odor olidus. Priore angustius & minus. Bulbi etiam in iino caul. qui ante anthesin cernuus, 3-ped. Fol. lata, margine pilis rigidul. ciliata. Spath. bicornis. Umbel. exigua, bulbis atro-purpur. Fl. pauci, exigui, violac.

15. *sarinatum*. A. caul. planiuscul. bulbifero: stamin. subulatis. Syst. veg. ed. 14. Hall. all. tab. 2. f. 2.

A. sylvestre &c. Bauh. hist. 2. p. 561.

Ampeloprasum &c. Lob. ic. 156.

Allium, seu Moly 2. Clus. hist. 1. p. 193.

In Germaniae, Helvetiae &c. montibus 24.

Odor Rapaceus. Bulbus simplex. Caul. 4-ped. paucifol. Fol. angusta, obtusa, carinata, apice plana, non denticul. subtus striata, sicut & vaginæ: caprina teretia. Spath. longiss. 2-cornis. Umbella capsulifera. Petal. purpur. vel ochroleuca.

*** Fol. caprina teretia. Umbel. capsulifera.

16. *sphaerocephalon*. A. caul. teretifol. umbellif. fol. semiteretibus: stamin. tricuspidatis, cor. longioribus. Syst. veg. ed. 14.

Allium, seu Moly montanum &c. Clus. hist. 1. p. 195.

Scorodoprasum &c. Mich. gen. tab. 24. f. 2.

In Italia, Sibiria &c. ad rupes, & alpes 24.

Caul. cubit. glauci. Fol. fistulosa, succulenta. Spatha brevis. Umbella sphærica, dilute janthina, fl. mediis erectis; lateralibus repandis, etiam pendulis; omnibus parvis. Petal. connivent. sature purpur. ovata, alterna; exteriora paulo breviora, & angustiora.

17. *parviflorum*. A. caul. subteretifol. umbellif. umbella globosa; spath. subulata; stamin. simplis. cor. longioribus. Syst. veg. ed. 14.

In Europa australi 24.

Facies A. *sphaerocephala*. Bulb. oblong. tunicatus. Caul. teres, striatus, foliosus. Fol. subulata, longitudine fere caul. Fl. minimi. Petal. exter. ovata, triflora; inter. duplo longiora, lanceol. purpurasc. Stam. & styl. cor. longiores. Spath. 2-phylia.

18. descendens. A. caud. subteretifol. umbellifero; pedunculis exter. brevioribus: stamin. tricupidatis. Syst. veg. ed. 14. Rudb. ely. 2. p. 160. f. 20. & 165. f. 13.

In Pedemontio 24.

Ad caulis originem duos adnatos bulbulos habet.

Caul. 2 pedat. Fol. fistulosa, supra canaliculata, lata. Vagina 4-fida. Umbella sphaerica. Petal. sature purpurasc.

19. moschatum. A. caud. teretifol. umbellifera fastigiate, sub. 6-fl. petal. acutis; stamin. simplicibus: fol. setaceis. Syst. veg. ed. 14.

Moly &c. Rudb. ely. 2. p. 166. f. 14.

In Gallo-provinciæ, Narbonæ &c. apricis elevatis.
Bulbi 1-2. Caul. semiped. Spatha brevis: umbella rara. Fl. maiuscul. Petal. obscure albentia, linea fusca divisa, odore grato Zibethi. Fructus pyramidalis.

20. flavum. A. caud. teretiusculo, umbellifero: fl. pendulis; petal. ovatis; stamin. cor. longioribus. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 141. Rudb. ely. 2. p. 157. f. 6.

Monspelii, in Austria &c. 24.

Bulbus ovatus, odore, & sapore Cepæ. Caul. 1-2-ped. solidus, foliolus, rore glauco. Fol. teretia, supra basin planiuscula. Spathæ valvula altera foliacea, umbella duplo longior. Umbella laxa. Petal. erecta, ovata, obtusa, concava, flaviss. Stam. simplic. cor. duplo longiora. Styl. brevis. Fruct. erecti.

21. pallens. A. caud. subteretifol. umbellif. fl. pendulis, truncatis: stamin. simplicibus, cor. æquantibus. Syst. veg. ed. 14.

Gethioides sylv. Colum. ceph. 2. tab. 7. f. 2.

In Italia, Hispania &c. ad colles 24.

Caul. 2-ped. teres, laevis. Fol. alterna, longill. semiteret. heptagona, erecta, fistulosa. Spatha subulata, nervosa. Cor. campanulat. truncata, alba, quandoq. purpurasc. Petal.

erecta, obovata, obtusiss. concava, carina viridi. Stam. simplic. longitudine petalor. Fl. mox ab adolescentia penduli. Styl. breviss.

- 22. panicula-** A. caul. subteretiusc. umbellif. pedunc. capillarium. umbellifer : spatha longiss. stamin. subulatis. Syst. veg. ed. 14. Hall. opusc. n. 25. cum fig. In Austria, Italia, Helvetia &c. 24.

An var. prioris? Odor porraceus. Bulbus conicus. Caul. 2-pedal. Fol. subulata, canalicul. In umbella bulbilli plerumq. nulli. Pedunc. longiss. Petal. obovat. purpur.

- 23. vineale.** A. caul. teretiuscul. bulbif. stamin. tricuspidat. Syst. veg. ed. 14.

A. sylvestr. Lob. ic. 156.

Ampeloprasum. Matth.

b. Porrum &c. Moris. hist. 3. f. 4. tab. 15. f. 4. In Germania, Helvetia, Pedemontio, in arvis collium 24.

Bulbus ex multis bulbillis. Scap. sesquiped. Fol. fistulosa. Capitul. arctum bulbis acuminat. recurvis, saepe in longiora acumina crinitis. Cor. parva, violac. Stam. setis 2. longis, extra fl. prominentib. Var. capitul. gemino, fl. deflexo.

- 24. olerace-** A. caul. teretifol. bulbifero : fol. semiteret. scabris, subtus sulcatis; stamin. simplic. Syst. veg. ed. 14. Hall. all. n. 26. f. 2.

Allium, seu Moly 3. Clus. pann. 213. 215.

In Svecia, Germania &c. 24.

Odor bulbillor. porraceus. Bulbus gracilis, sursum acutus. Caul. cubit. & ultra. Spath. 2-fol. cornubus prælongis, altero longiore. Umbell. paucifl. Petal. exter. acutiora, pallide purpur. interior. latiora, dilutiora. Bulbil. maturi magni, ovales.

- 25. Pallasii.** A. caul. subteretifol. umbellif. umbella difformi ; stamin. simplic. cor. æquantibus : stylo breviss. Syst. veg. ed. 14. Comm. Gott. 1775. tab. 3.

Habitat . . .

Bulbus globosus, tunicatus, magnitudine Nucis avellanæ exiguae. Caul. sesquipedal. gracilis, foliosus. Fol. longa, semitereti-subul. alterna, vagina pallida, striata, lineis prominentibus, violac. Spath. 2-phyll. Umbella rotundata, interspersis fl. quibusdam abortientibus. Pedunc. longiss. pollic. purpurei, supra incrassati. Cor.

exigua, purpur. Stam. cor. æqual. Filam. purpur. Anth. fuscæ.

**** *Fol. radicalia. Scapus nudus.*

26. nutans. A. scapo nudo, ancipiti: fol. linear. subplanis: stamin. tricuspidatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Porrum &c. Gmel. Sib. I. tab. 12.

In Siberia.

Bulbus turbinat. albus, odore *Allii*. Scap. cubit. & ultra, in principio tres, mox compressus. Fol. 4-5. pallide virid. tæpe spiraliter torta. Spatha brevis, globosa. Caput hemisphær. Petal. alba, aut subpurpur. Stam. dentes in antiquo obliterantur. *Variat aetate, & loco præ reliquis, ut vix digoscatur.*

27. ascaloni- A. scapo nudo, tereti: fol. subulat. umbella globosa: stamin. tricuspidatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Cepa &c. Moris. hist. 3. s. 4. tab. 14. f. 3.

In Palæstina 4.

Statura fere A. *schænoprasi*. Scap. spitham. & ultra, subnudus. Spath. membranac. Fl. min. A. *schænoprasi*. Petal. erecta, ovat-lanceol. cœrul. carina atro-cœrul. Stam. longitudine petalor., alternis latissim. apice 3-fid. Anth. flavæ.

28. senescens. A. scapo nudo, ancipiti: fol. linear. subtus convexis, lævibus: umbella subrotunda; stamin. subulatis. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. I. tab. II. f. 2.*

Allium, seu Moly &c. I. Clus. pann. 220. 221.

A. saxatile &c. Bocc. mus. 2. tab. 79.

A. petraeum &c. Bauh. hist. 2. tab. 564.

In Siberia, Helvetia &c. 4.

Bulbus oblong. odore, & sapore *Cepæ*. Caul. 2-3-pedal. angulosi, dein purpur. Fol. obliqua, acumin. crassiuscula, glabra, plerumq. 6. erecta. Petala erecta, distantia, canalicul. inflexa, dilute purpur. Stam. corolla paulo longiora. Umbella numerosa. Fl. non penduli.

29. odorum. A. scapo nudo, teretiusc. fol. linear. canalicul. subtus angulatis: umbella fastigiata. *Syst. veg. ed. 14.*

In Europa australi 4.

Bulbus ovatus. Fol. basi connexa in fasciculum stipitatum. Scap. erectus, pedal. Spatha brevis,

cum rudimentis membranaceis inter omnes penduncul. Cor. alba, odora, carina rufescens. Stam. subulata, simplic. cor. dimidio breviora. Styl. albus.

30. angulosum. A. scapo nudo, ancipiti: fol. linear. canaliculat. subtrus subangulatis, umbella fastigiata. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 423.*

Cepa &c. Gmel. Sib. I. tab. 14. f. 2.

A. petraeum Ev. Bauh. hist. 2. tab. 564.

In Sibirice, Germania, Pedemontii pratis humidiusculis 24.

Bulbus ovat-oblon. albus. Fol. pedal. & breviora, obtusa, quandoq. subtus vix angulata. Scap. superne parum angulato-striatus, quandoq. 4-gonus, fol. altior. Spath. membranac. albida. Umbella hemisphær. densa. Petal. pallide purpur. odora, lateribus conniventia; interiora apice patentia.

Differit ab A. senescente, loco natali: fl. maioribus; maiori plantae magnitudine; & fol. minime flexuosis.

31. nigrum. A. scapo nudo, tereti (dein compresso-4-gono): fol. linear. umbell. hemisphær. spath. mucronata, 2-fid. petal. erectis. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 25. f. 1. Rudb. elys. 2. pag. 160. f. 21.*

Habitat Algirix, in Gallo-provincia, & Pedemontio 24.

Fol. radicalia, 2-palmar. pollicem lata, lanceol-linear. sæpe 5, vaginantia, odore Allii, plana. Petal. alba, 3. exteriora maiora. Fruct. magnus.

32. canadense. A. scapo nudo, tereti: fol. linear. capitulo bulbifero. *Syst. veg. ed. 14.*

In Canada 24.

Fol. spitham. recta. Scap. vix fol. longior. Spath. ovata, mucronata, acutiuscula. Fl. albidi, pauci, pedicellati. Stam. simplicia, longitudine cor. Anth. rufescens.

33. urinum. A. scapo nudo, superne triquetro: fol. lanceol. petiolat. umbella fastigiata. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 757. Lob. ic. 159. Cam. epit. 330.*

In Europa nemoribus 24.

Sapor acerrimus: odor Allii vehemens. Bulbi fascicul. Scap. pedal. inferne semicylindr. Fol. infer, subbina, longe petiol. subped. Umbella

- sub 12-fl. Spatha alba, 2-valv. valvis ovatis.
Petal. e viridi-a.bescent.
- 34. trique-trum.** A. scapo nudo, foliisq. triquetris: stamin. simplic.
Syst. veg. ed. 14. Rudb. elys. 2. p. 159. f. 16.
Moly &c. Park. par. tab. 143. f. 4.
In Hispania, circa Narbonam, & in alpibus Pe-demontii 24.
Fol. *parganii*, ensiform. Scap. palm. & ultra,
erectus, fol. brevior. Spath. 2-valv. lanceol.
scariosa. Petal. alba, carina obsolete viridi.
Stam. & pistill. petalis dimidio breviora. Anth.
flavæ. Stigm. acutum.
- 35. Cepa.** A. scapo nudo, inferne ventricoso, longiore:
fol. teretibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Habitat
Radix bulbosa, tunicata, orbicul. alba, vel ru-bræ. Scapus, & fol. tubulosa. Petal. alba, vel purpurascens.
- 36. Moly.** A. scapo nudo, subcylindrico: fol. lanceol. ses-silis: umbella fastigiata. *Syst. veg. ed. 14.*
Swert. Fl. 1. tab. 60. f. 2.
In Baldo, Pyrenæis &c. 24.
Petal. flava, patentia; 3 exter. magis, inter.
erecta.
- 37. multibul-bosum.** A. scapo nudo, tereti: fol. lanceolat.-elongat.
sessil. umbella fastigiata: petal. omnibus pa-tentiss. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab.*
10.
Habitat
Videtur A. nigrum. Lin. Vix odor Allii; sapor tamen aliquis. Bulbus ex multis bulbillis con-stans, albus. Fol. radicalia, 1-fesquiped. lato-ensiform. plana, striata. Scap. 2-ped. Umbe-l. densa, leviter convexa. Petal. alterna, ova-lia, obtusa, concava, albescens. cum linea dorsali virescen. Filam. alba.
- 38. fistulosum.** A. scapo nudo, adæquante fol. teretia, ventri-cosa. *Syst. veg. ed. 14.*
Cepa oblonga. *Dod. pempt. 687.*
Habitat
Radix tunicata. Scap. pedal. in medio ventricò-fus. Umbell. sphærica. Pedunc. semunc. Petal. alba, linea virente distincta; 3. exter. breviora.
- 39. Schæno-prasæm.** A. scap. nudo, adæquante fol. teretia, subulato-filiform. *Syst. veg. ed. 14. Dod. pempt. 689.*

b. Cepa &c. *Gmel. Sib.* I. tab. 15. f. 1. *Buxb.*
cent. 4. tab. 45.

Allium &c. *Comm. Gott.* 1775. tab. 14.

In alpestribus Sibiriae, Pedemontii &c. 24.

Bulbi compressi, longi. Scap. cubit. fistulosus.

*Fol. fistulosa. Vagina brevis, 2-tot. alba, cum
linea purpur. Petal. dilute purpur. nitida.*

40. sibiricum. A. scapo nudo, tereti: fol. semi-cylindric. stamin.
subulat. *Syst. veg. ed.* 14.

In Siberia.

*Fol. minime angulata. Scapi fol. longiores. Um-
rella fistigliata. Spatha parva, ovata, scariosa.
Petal. ovata, sinu obtuso, acuta, alba, carina
virescente. Stam. subulata, cor. breviora.
Stigm. simpl. Germ. ciareum.*

*41. tenuissi-
mum.* A. scapo nudo, tereti, inani: fol. subulat. fili-
form. capitul. laxis, paucifl. *Syst. veg. ed.* 14.

Gmel. Sib. I. tab. 15. f. 2. 3.

In Siberia.

*Bulbi tenuiss. dilute violac. Scap. palm-dodrant.
tenuis. Fol. ventricosa, glauca. Fl. 6--7--8.
breves, pallide rubent.*

*42. Chamæ-
moly.* A. scapo subnullo, nudo; fol. planis, ciliatis.
Syst. veg. de. 14.

Moly &c. Rudb. elys. 2. p. 166. f. 15.

Chamæmoli &c. Colum. ecphr. tab. 326.

Saturnia Maratti.

In Italia.

*Bulbus nucis Avellanæ magnitudine, subflavus.
Fol. 4--5. vix pedal. anibitu hirsuto. Petal.
alba, extus purpurasc. vel virentia.*

desertorum. A. fol. caulinis teretibus: umbell. capsulifera;
anth. subulat. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

*Est e minoribus. Petal. albo--rufescent. linea
media obscuriore.*

cœruleum. A. *Pall. it.* 2. tab. R.

In Dauuria.

*Bulbus parvus, simplex. Scapi 1--2. sesquiped,
teretes. Fol. ad basim scapi vaginant. 2--3--
linear. scapis multo breviora. Umbel. sphæri-
ca, dilute cœrul. Petal. basi albida, nervo
fatuoriore.*

296 HEXANDRIA MONOGYNIA.

- alanicum*. A. Pall. it. 2. tab. R.
In montibus altaicis.
 Bulbus maiuscul. turbinat. simplex, tunicis fuscis,
 radicul. longiss. ramosis. Fol. terna, vaginant.
 fistulosa, inferius ampla, subinflata, sensimq.
 attenuata. Scap. fol. longior, ampliss. fistulosus,
 in medio subventricos. Spath. simpl. lata.
 Umbell. parva, confecciss. ovata. Petal. albido-
 hyalina, basi virescent. Stam. cor. longiora.
- moespeffula-*
num. A. scapo tereti, solido: umbella fastigiata: petal.
 linear. stamin. subulatis: fol. lanceolat. Gouan.
Illus. tab. 16.
In agris.
Habitus A. magici. b.
 Odor nullus, aut debilis Allii. Bulbus albus,
 tunicis exterioribus nigricant. Scap. longiss. 3-
 ped. striatus. Fol. 4-5-7. radical. fere cubital.
 unc. lata, plana, glauca. Spatha globosa, bi-
 fariam dehiscens. Umbell. primum hemisphær.
 Petal. angustiss. virescent. patentia, dein reflexa.
- 495. LILI-
 UM.** Cor. 6-petal. campanul. linea longitudinali necta-
 rifera. Caps. oblonga, sulcata, 3-gona, val-
 vul. pilo cancellato connexis.
- L. candidum*. L. fol. sparsis: cor. campanulat. intus glabris.
Syst. veg. ed. 14. Ludw. et al. tab. 190. Knorr.
del. 1. tab. L. Black. tab. 11.
In Helvetia, Palaestina &c. 24.
 Radix bulbosa, squamosa. Caul. 2--cubit. simpl.
 rectus, foliosus. Fol. longa, acumin. undula-
 ta. Fl. racemosi. Petal. candida. Anth. sul-
 phur.
- L. bulbiferum*. L. fol. sparsis: cor. campanulat. erectis, intus
 scabris. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 226.*
Knorr. del. 1. tab. L. 4.
In Italia, Austria &c. editoribus collibus 24.
 Radix bulbosa, esculenta. Caul. sesquiped. etiam
 maculatus. Fol. alterna, graminea, lanceol.
 trinervia, subhirsuta. Bulbi axill. dilute virid.
 nitidi. Cor. erecta, purpuro-crocea, albo-
 punctata, phœnica. *Var. incana; & altera fl.*
pleno.
- L. pomponium*. L. fol. sparsis, subulatis: fl. reflexis: cor. revo-
 lutis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 65. f. 2.*
Knorr. del. 1. T. 4.
L. rubrum praecox. Clus. hist. 1. p. 133.

b. L. *miniatum* &c. Rudb. *elys.* 2. p. 176. f. 3.

In Pyrenæis, Sibiria, & in Comitatu Nicæenji 24.

Radix candida. Caul. 1--2--cubit. Fol. 2--unc.

*longa, unam lata, linear. acuta, triquetra,
canaliculata. Nectarii rima valde dentata. Pe-
tal. cinnabarina.*

4. *Chalcedoni-* L. fol. sparsis, lanceolat. fl. reflexis; cor. revo-
cum. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 20.*

L. rubrum &c. Clus. hist. 1. p. 131.

Hemerocallis &c. Lob. ic. 169.

In Persia, Carniola &c. 24.

*Odor fœtens. Caul. 2-spitham. totus foliosus. Fol.
dense sparsa, sessil. erecto-patent. supra nuda,
subtus multinervia. Fl. 1--pl. Cor. miniata,
aurantiaca, purpuro-sanguinea &c.*

5. *superbum.* L. fol. sparsis, lanceol. fl. ramoso--pyramidalis,
reflexis: cor. revolutis. *Syst. veg. ed. 14. Trew.
ehret. 2. tab. II. Catesb. car. 2. tab. 56.*

In Amer. Septentr. 24.

*Caul. 2-ped. & ultra, teres, leviss. superne pa-
niculat. Fol. constanter trinervia. Petal. ma-
gna, fundo aureo, limbo aurantiaco, punctis
nigricant. adsperso.*

6. *japonicum.* L. fol. sparsis, lanceol. cor. subcampanul. cer-
nui. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. Kæmph.
am. exot. Fasc. V. pag. 371.*

In Japonia 24.

*Caul. 2-ped. simpl. teres, glaber. Fol. alterna,
petiol. sesquipalm. integerr. marginata, glabra,
subtus pallida, 3-5-nerv. Fl. terminal. reflexo-
cernui. Cor. palmar. albida. Differt a L. albo
= fol. paucis in caule; petiolis longiss. remotis,
nervosis; caule debiliore, 1-fl.*

7. *Martagon.* L. fol. verticillatis: reflexis: cor. revolutis. *Syst.
veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 351. Knorr.
del. 1. tab. T. 6. Camer. epit. 617.*

L. sylvestre. Dod. pempt. 201.

In Helvetia, Germania &c. 24.

*Bulbus flavus. Caul. inferne pallide virens; su-
perne punctis nigris adspersus, cubital. & ul-
tra. Fl. nutantes, fœtidi. Petal. rufa, vel
pallida, punctis nigris mixta.*

8. *canescens.* L. fol. verticillat. fl. reflexis; cor. revolutis, cam-
panulat. *Syst. veg. ed. 14. Barr. rar. tab. 125.*

HEXANDRIA MONOGYNIA.

*Moris. hist. 3. f. 4. tab. 20. f. 9. Rupp. elys.
2. p. 177. f. 5. Catesb. car. 3. tab. 11.*

In Canada 24.

Fol. pollic. erecta, lanceol. trilineata. Cor. basi flava, punctis atris.

9. *camtschatica*. L. fol. verticillat. flore erecto: cor. campanulata: petal. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Canada, Kamtschatca.

Rad. squamata. Caul. ped. l. simpl. laevis. Fol. 4-6. sessil. lanceol. Petal. parva, magnitudine *Lilii persici*, ovata, leviter striata, purpurascen.

10. *philadelphicum*. L. fol. (superioribus) verticillat. fl. erectis; cor. campanulatis, petal. unguiculat. *Syst. veg. ed. 14. Catesb. car. 2 tab. 58.*

b. L. foliis &c. Mill. ic. tab. 165. f. 1.

In Canada 24.

Simillim. priori, sed eius petala ovata, sessil. huius unguibus oblongis, distinctis.

pyrenaicum. L. fol. lanceol. sparsis: fl. subumbellat. cor. revolutis. *Gouan. illustr.*

L. *montanum*, fl. punctato, maculis distincto. *Clus. hist.*

In Pyrenæis 24.

Difert a L. *superbo*, & *canadensis*. Odor plantæ gravis e *Narcissino-hircinus*. Bulbus flavesc. Caul. 2-pedal. Fol. conferta, erecta, adversa, sature virentia, in margine exalbido, 7-sulcata. Fl. 1-2-3. Cor. flava, extus ad basin virescens. intus punctis prominulis, e nigro-rubro-violac-purpur.

496. FRITIL-LARIA. Cor. 6-petal. campanulata, supra unguis cavitate nectarifera. Stam. longitud. cor. Stigm. 3-sid. patens. Caps. 3-gona. Sem. plana.

1. *imperialis*. F. racemo comoso, inferne nudo: fol. integer-rim. (nectar. hemisphærico). *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. K.*

Tusci. *Clus. hist. 1. pag. 127. 128.*

In Persia?

Radicul. horizontales. Caul. 3-4-ped. in medio foliosus, superne coloratus. Fol. decurrentia. Bract. terminal. magnæ. Flos magnus, nutans. Petal. phœnic-rubent. basi nigricante. Cavitas nectarifera alba.

2. *regia*. F. racemo comoso, inferne nudo: fol. crenatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Corona &c. Dill. elth. tab. 93. f. 109.

Ad cap. b. Spei 24.

*Tuber pyramidatum. Scap. brevis. Fol. radical.
in orbem posita, Liliiformia, primum sature
virent. Petal. herbacea.*

3. *nana.* F. racemo comofo: fol. bifariis, amplexicaul.
lanceolat. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei 24.

4. *persica.* F. racemo nudiuscul. fol. obliquis. *Syst. veg. ed. 14.*

L. persicum. Rudb. elys. 2. p. 183. f. 1.

L. susianum. Cluf. hist. 1. p. 130.

In Persia? Russia.

Caul. 2--ped. Fol. angusta, infima bina-terna-
quaterna, verticillatim opposita.

5. *pyrenaica.* F. fol. intimis oppositis: fl. nonnullis folio inter-
iectis. *Syst. veg. ed. 14. Cluf. hist. 2. p. 256.
posth. 10.*

In Pyrenæis, Russia 24.

Caul. pedal. Fol. glauca. Petal. parum reflexa,
extus col. obsoleti, ambitu venis flavescens.
intus e viridi-flavescens. splendentia.

6. *Melcagris.* F. fol. omnibus alternis: caul. 1-fl. *Syst. veg. ed.
14. Jacq. Austr. 5. tab. 32. Knorr. 1. tab. F.
2. Renealm. Sp. tab. 146.*

*In Italia, Helvetia, Carniola, Gallia, Austria &c.
in pratis alpium 24.*

Caul. pedal. quandoq. maculat. teres, (in sponte-
taneis sœpe 4-5-fl.). Fol. 5-6. graminea, an-
gusta, semiamplexicaul. canaliculata. Flos ma-
gnus, Tulipæform. petal. 3. interioribus longior.
variegatus, fusco-ruber, pleruinq. maculis al-
ternis, pallidiorib. subrotundis; quandoq. albus,
vel atro-purpureus &c. *Var. purpurea in lu-
team mutata est.*

longifolia. F. Hill. Hort. Keven. tab. 15.

Ad cap. b. Spei 24.

Fol. radicalia, pedal. lanceol. undulata. Caul.
pedal. supra fl. foliosus. Petal. virescent.

497. UVULA-COR. 6-petal. erecta, hypocraterif. petal. lanceol.
RIA. angustis. Nectarii fovea baseos petali. Filam.
brevissima. Styl. semibifid. stigmatibus reflexis.

Caps. oblong. Sem. subrotunda, compressa.

1. *amplexifo-* U. fol. amplexicaulibus; mollibus: caule glabro.
lia 5. *Syst. veg. ed. 14.*

- Smilax &c. Barr. rar. tab. 719. 720.
 Polygonatum &c. Bauh. hist. 3. p. 531. Morif.
 hist. 3. f. 13. tab. 4. f. II. Clus. hist. I. p. 276.
 Laurus alexandrina. Cam. epit. 936.
In Helvetia, Italie &c. sylvis montosis 24.
 Rad. serpens. Caul. 2-cubit. ramosus, brachiatus.
 Fol. distantia, alterna, sessil. Peduncul. florigeri
 solitar. 1-fl. geniculo flexo. Flos nutans, con-
 vergens. Cor. Medeola asparagoidis. Petal.
 per ætatem reflexa, albida, basi rubra. Bacca
 ovato-triquetra, rubra.
2. *hirta*. U. caul. villoso: fol. amplexicaul. hirtis. Syst.
 veg. ed. 14. *Thumb. Jap.*
In Japonia.
 Caul. erectus, pedal. teres. Fol. 2-pollic. alter-
 na, cordata, oblong-acum. 7-nervia, paten-
 tia, villosa, pilis breviss.
3. *perfoliata*. U. fol. perfoliatis. Syst. veg. ed. 14.
 Polygonatum &c. Morif. hist. 3. f. 3. tab. 4. f. 12.
In Virginia, Canada.
 Radix alba, pedis cervini formam referens. Caul.
 subpedal. Fl. pauci, flavescentes.
4. *sessilifolia*. U. fol. sessilibus, absque cirrhis. Syst. veg. ed. 14.
In Canada.
Habitus prioris. Caul. pedal. striato-angulat. gla-
 ber, ramis subfastigiatis, divaricato-erectis,
 2-3-fid. 1-fl. Fol. pollicar. & ultra, lanceol-
 ovata, integerr. nervosa, glabra, alterna; at
 ubi flos ex altero ramo exit, fol. bina adsunt.
 Fl. terminal. peduncul. 1-2. cernui, albi.
5. *cirrhosa*. U. fol. sessil. apice cirrhosis. Syst. veg. ed. 14.
Thumb. Jap.
In Japonia.
 Caul. erectus, simpl. teres, articulat. striatus,
 glaber. Fol. ex eadem gemma 2. digital. li-
 near. integra, glabra. E gemmi fol. pedun-
 cul. cernui. Petal. subpollic. lutea.
498. GLORIOSA. Cor. 6-petal. undulata, reflexa. Styl. ob-
 liguuus.
1. *superba*. G. fol. cirriferis. Syst. veg. ed. 14.
 Methonica &c. Herm. Lugd. tab. 689. Pluk. alm.
 tab. 116. f. 3.
 Lilium &c. Comm. hort. I. tab. 35. Rudb. elys.
 2. p. 178. f. 7.
 Mendoni. Hort. Mal. 7. tab. 107. f. 57.
In Malabarica 24.

Rad. rectangula, decumb. venenata. Caul. or-
gyal. teres, ramis 2. oppositis, lateralibus.
Caul. postquam ramos emisit, pedunculum e
singulis fol. alis exserit. Fol. alterna, at sub
ramis terna. Flos cernuus, figura Flammæ su-
pra crateres, spectatiss. coccineus, basi flavus,
denuo totus coccin. Petal. flava, lanceol.
longa, lateribus undulata, coccin. prope basin
reflexa.

2. simplex. G. fol. acuminatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Senegal.

Fol. non cirrhosa. Fl. coerulea.

499. ERY- Cor. 6-petal. campanulata; petal. lanceolat. su-
THONIUM. pra medium reflexis. Nectario tuberculis 2. pe-
talor. alternoorum, basi adnatis. Stam. mini-
ma. Stigm. 3-fid. Caps. subrotunda. Sem. ob-
longa.

1. Dens Canis. E. *Syst. veg. ed. 14.* *Gmel. Sib. I. tab. 7.* *Jacq.*
Austr. 5. tab. 9. *Knorr. det. I. tab. H. 8.*
Dod. pempt. 203.

*In Liguria, Allobrogibus, Augustæ Taurino-
rum, Sibiria, Virginia &c. ad sylvas umbrosas*
24.

Rad. carnosa, oblong-acumin. dentis canini for-
ma, alba. Scap. semiped. simplex, teres, nu-
dus, ruber, 1-fl. Fol. radical. bina (post ef-
florescentiam) elliptica, petiol. integerr. fus-
sco-rubra, virid. maculis variegata. Petal. lan-
ceol. e medio reflexa, alternatim incumbent.
tuberculata, purpur. carnea, alba. *Var. fl.*
pleno.

500. TULIPA. Cor. campanulata, basi late cava; petalis oblon-
go-cuspidatis, concavis. Stigma 3-angulare,
angulis divisum. Caps. 3-gona. Sem. plana.

1. sylvestris. T. fl. subnutante: fol. lanceolat. *Syst. veg. ed.*
14. Fl. Dan. tab. 375.

b. T. minor. &c. Rudb. elys. tab. 112. f. 6.

c. T. pumilio. I. 2. 3. 4. 5. Rudb. elys. tab.
109. f. I. 5.

In Apenninis, Helvetia &c. 24.

Rad. bulbosa. Caul. pedal. teres, 1-fl. Fol. fe-
re ensiform. Petal. ovat-lanceol. acuta, 3. in-
terior. etiam basi villosa, flava, extus vire-
scent. aut ex luteo-purpur. vel oris candidis.
Differet a sequenti, caule altiore: fol. angustio-

- ribus: scapo versus fl. inflexo, & ante florescen-
tiā nutante: sed præcipue stam. filamentis basi
valde attenuatis, & supra basin hirsutis: petala
minora; interiora margine hirsuta, & flos odorus.
- 2. Gesneriana.** T. fl. erecto: fol. ovato-lanceol. Syst. veg. ed.
14. Knorr. del. 1. tub. T. & T. 1. 2, 3.
In Cappadocia, & Russia 24.
Variet. 140. enumerat Park.
- 3. breyniana.** T. caul. multifl. polyphyllo: fol. linear-lanceo-
lat. Syst. veg. ed. 14.
Sisyrinchium &c. Breyn. cent. tab. 36. Rudb. elys.
p. 13. f. 11.
In Æthiopia 24.
Fol. caulina 6-7. alterna, suprema sensim bre-
viora. Fl. 3-4. Petal. basi angustata, ex phœ-
nicio-suaverubent. Styl. nullus.
- 4. biflora.** T. fl. erectis, planiuscul. caul. diphyllo, 2-3-fl.
fol. linear-subulat. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Pallas'it. 3. tab. D. fig. 3.
In Dauria 24.
Simil. T. sylvestri, sed minor. Bulbus turbinat.
Caul. digital. supra ipsam terram foliosus. Fol.
caul. longiora, succulentiora, magisq. glauca.
T. sylvestri, alterna, patenti-incurva, canalicu-
lata. Fl. ut in T. sylv. sed minores, odori.
Petal. 3. exter. lanceol. extus dilute cyanæa,
vel virecent. interior. alba cum nervo dorsali
cyanæo; omnia intus basi macula magna fulva.
- 501. ALBU-** Cor. 6-petal. interioribus disformibus. Stam. 6.
CA. tribus castratis. Stigma cinctum cuspidibus tri-
bus.
- 1. maior.** A. fol. lanceolatis. Syst. veg. ed. 14.
Ornithogalum &c. Rudb. elys. 2. p. 140. f. 7.
Moris. hist. 3. s. 4. tab. 24. f. 7.
Ad cap. b. Spei 24.
Scap. pedal. & ultra, rotund. glaber, subglau-
cus. Fol. radicalia, longa, lata, sulcata. Race-
mus longus. Fl. bracteati, luteo-virent.
- 2. minor.** A. fol. subulatis. Syst. veg. ed. 14.
Ornithogalum &c. Herm. par. tab. 209.
Ad cap. b. Spei 24.
- 3. spiralis.** A. fol. spiralibus: fl. nutantibus. Syst. veg. ed.
14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
Caul. 1-2-fl.

4. *villosa* ! A. fol. linear. villoso-vilcosis. Syst. veg. ed. 14.
Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
5. *abyssinica*. A. fol. linear. canaliculatis, glabris. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Jacq. ic. rar.
Ad cap. b. Spei.
502. HYPO-XIS. Cor. 6-part. persistens, supera. Caps. basi angustior. Cal. gluma 2-valv.
1. *erecta*. H. pilosa; capsul. ovatis. Syst. veg. ed. 14.
 Ornithogalum &c. Pet. gaz. I. tab. I. f. 4. Plak. alm. tab. 250. f. 12.
In Virginie, Canada 24.
 Fol. Caricis, seu Junci pilosi. Scap. fol. brevior, erectus, herbaceus, angulosus, pilosus.
 Bract. 2. subulatae, erectae, inter quas fl. 1-2. sessil. longitudine bractear. Cor. lutea.
2. *decumbens*. H. pilosa; capitul. clavatis. Syst. veg. ed. 14.
 Anthericum &c. Mill. dict. tab. 39. f. 2.
 Crocus &c. Plum. ic. 108. f. 1?
In Amer. meridion. 24.
 Caul. decumb. Fol. graminea. Pedunc. axill. longiss. Fl. gemini. Bract. lanceol. pedicellat. longiores. Cor. lutea.
3. *fascicularis*. H. tubis florum longiss. Syst. veg. ed. 14.
 Allium &c. Russel. alep. tab. 2.
In Alepo 24.
 Fl. multi, radical. albi, magni.
4. *sessilis*. H. pilosa, acaulis: fructificationibus subradical. Syst. veg. ed. 14.
 Ornithogali &c. Dill. elth. tab. 220. f. 287.
In Carolina.
 Fol. longa, angusta, radicalia dodrantal. carinata, dilute virent. vetustiora luteo-virent. tandem xerampelina. Capitul. sessil. oblonga, obtuse 3-gona. Fl. nudi. Petalor. laciniae 3. exterior. latiores, virentes, hirsutae; 3. interior. angustiores, glabrae, e viridi-lutescent. omnes cuspidatae.
5. *spicata*. H. erecta: fol. ensiform. falcatis, glabris: fl. spicatis. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.
In Japonia.
 Rad. fibris fasciculat. Fol. radical. plurima, spathiam. scapo breviora, integerr. trinervia, glabra. Scap. pedal. erectus, flexuosus, subangulat. villosum. Fl. e medio scapo ad apicem spicati, alterni, remoti, plusimi.

6. *plicata*. H. scap. 1-fl. triquetro: fol. lanceol. plicatis, villosis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei 24.
 Bulbus globosus. Fol. ensiform. subciliata, basi, carina, & margine denticul. Cor. flava, extus virescens.
7. *stellata*. H. est *Amaryllis capensis monente* Vahl.
8. *minuta*. H. fol. triquetris, carnosis, glabris: scapis 2-fid. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
 Planta pusilla. Bulbus conicus, ratione plantæ magnus, subtus truncatus, & marginatus, apice squamis linear. connivent. Fol. radicalia, linear. acuta, subcarnosa, scapis longiora, digital. Scap. pl. breviss. teretiuscul. Cor. patens, nivea.
9. *aquatica*. H. fol. linear. scap. umbelliferis, f. 1-fl. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
 Fol. radicalia, laxa, apice nutantia. Scapi filiform. Fl. in aliis solitar. hermaphrod., in aliis umbellati, mares.
10. *serrata*. H. fol. canaliculat. glabris, ciliato-serratis: scap. 1-fl. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
11. *ovata*, H. fol. ovat-lanceol. integris, glabris: scap. 1-fl.
 Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
 Flos pulchellus, albus.
12. *villosa*. H. fol. linear-ensiform. villosis; stigmate simplici, 3-gon. acuto. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
Variat magnitudine.
13. *alba*. H. fol. teretibus, glabris: scap. sub 2-fid. petal. immaculat. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
 Planta parvula.
-
- violacea*. H. fl. violaceis. Forsk. Æg.
In Arabia.
 Caul. digitæ longitudine. Fl. racemosi, nudi. Pedunc. semipollic. bracteol. squamiform. suffulti.

503. EHR- Cor. infera, glumacea, duplex. Nectar. pateri-
HARTA. forme.

1. *capensis*. E. Thunb. Ad. Stock. 1779. tab. 8.
In Africa.

*Gramen omnium pulcherrimum, glabrum. Rad. fi-
brosa. Culm. erectus, sesqui-2-ped. arti-
culat. indivisus. Fol. ensiform. vaginant. mar-
ginata, crispa; inferior. palmar. disco glabro,
margine scabro, cartilagineo-crenulato. Pani-
cul. simpl. oblong. 15-20-fl. Fl. cernui. Glu-
ma calycina basi colorata; exterior violac.
interior pallescens. Fasciculi villorum albissimi,
nitidi. Nectar. & filam. albida. Anth. luteæ.*

504. ORNI- Bracteæ loco calyc. Cor. 6-petal. erecta, persi-
THOGALUM. stens, supra medium patens. Filam. alterna,
basi dilatata, sæpe tricuspidata.

* *Staminibus omnibus subulatis.*

1. *uniflorum*. O. scapo 2-phyl. pedunculo 1-fl. Syst. veg. ed.
14. Ad. nov. Petrop. v. XVIII. tab. 6. f. 3.

In Siberiæ montibus.

Simil. O. luteo, sed peduncul. indivisus, 1-fl.
Flos dimidio minor *Tulipæ sylv.* sed triplo
maior O. luteo. Petal. lanceol. obtusiusc. lu-
tea, subtus virid. Fol. caulis 2. altero supe-
riore, O. lutei duplo maiora.

2. *luteum*. O. scapo angulo, 2-phyl. peduncul. umbella-
tis, simplicibus. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan.
tab. 378. Garid. Aix. tab. 74.

Pyrrochiton. Renealm. sp. tab. 90.

In Europæ cultis, & collibus aridis 24.

Bulbus rotund. Fol. radicalia, pauciss. graminea,
acuta. Bract. 2. umbella longiores. Pedunc.
longi, icæqual. 7. Petal. lineata, intus cùm
viore lutea; extus tota virid. obiusa, plerumq.
glabra. *Varietas ma. & minor.*

3. *minimum*. O. scap. angulato, 2-phyllo; peduncul. umbel-
lat. ramosis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab.
612. Bauh. hist. 2. p. 624.

Hypoxis Renealm. sp. 92.

b. O. bulbiferum &c. Colum. ecphr. 323. 324.

In Europæ cultis oleraceis.

Simil. priori, sed petal. acutiora, & dimidio cir-
citer min. unde potius varietas?

4. *pyrenaicum*. O. racemo longiss. filament. lanceol. peduncul.
Tom. II.

florifer. patentibus, æqualibus: fructiferis scapo ad proximat. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 103. Rudb. elys. 2. p. 134. f. 3.

Stadyoides. Renalm. sp. tab. 90.

In alpibus Austriae, Libiriae &c. etiam ad colles descendit 24.

Caul. fere 3-ped. nudus, teres. Fol. 3-4. sub-pedal. ad terram reflexa, canalicul. & flavesc. Stipul. solitar. albæ. Fl. patuli, tubodori. Petal. pallent. linea longitudinali subvirent. quan-dq. oris albis; 3. exter. angustior. 3. inter. breviora.

5. *narbonense*. O. racemo oblong. filament. lanceol. membranac. peduncul. floribusq. patentiss. Syst. veg. ed. 14. Dod. pen.pt. 222.

In Italiæ, Galliæ &c. arvis 24.

An varietas prioris? sed mirus. Fol. sesquiped. pollicem lata: in priore vix palmar. angustiss. Bract. ovato-lanceol. breviss. Petal. candida, subtus virid. margine albo.

6. *latifolium*. O. racemo longiss. fol. lanceol-ensiform. Syst. veg. ed. 14. Conf. suppl. p. 200.

In Arabia, Ægypto.

Scapus sesquiped. teres, virid. Fol. pedal. plus quam 2. pollic. lata. Petal. lanceol-patent. utrimq. alba.

7. *longibracteatum*. O. racemo longiss. bracteis pedunculis fere duplo longioribus: fol. lanceolat-ensiform. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 29.

Ad cap. b. Spei 24.

Diff. ab *O. pyramidali* bracteis, & fol. latioribus.

8. *comosum*. O. racemo breviss. bract. lanceolat. longitudine fl. petal. obtusis; filament. subulatis. Syst. veg. ed. 14. Rudb. elys. 2. p. 135. f. 1.

Habitat

Petala lactea.

9. *pyramidale*. O. racemo conico: fl. numerosis, adscendentibus. Syst. veg. ed. 14. Rudb. elys. 2. p. 134. f. 4. Besl. eysl. vern. 5. tab. 14. f. 2.

In collibus Iusitaniae 24.

** Staminibus alternis, emarginatis.

10. *arabicum*. O. fl. corymbosis: pedunc. scapo humilioribus: filament. subemargin. Syst. veg. ed. 14. Rudb.

elys. 2. p. 130. f. 1. *Clus. hist.* 2. p. 186. *Besl.*
cyst. vern. 5. tab. 12. f. 1.

Melenomphale. *Renealm.* sp. tab. 90.

In Aegypto, & ad cap. b. Spei 24.

Planta pedal-cubit. gracilis. *Fol.* *Hyacinthi orient.*
Petal. alba, odora. Nectar. 3-angul. splen-
dens, nigrum, dein viride. Bract. amplexi-
caul. cordatæ, magnæ. Stam. connata.

11. *thyrsoides.* O. fl. racemosis, confertissim. filament. emargin-
nat. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. hort.* 3. tab. 28.

Ad promontorium b. Spei.

Simile priori, sed differt in pl. *Planta glabra.*
Bulbus albidus. Fol. plura, elongato-lanceol.
acuta, lineata, crassula, debilia. Scapus su-
berectus, pedal. rore glauco tectus. Racemus
terminal. semiped. densus, thyrsifor. Bract. ad
pedunculos lanceol. aridæ, membranac. Petal.
patula, nivea, cum macula ad basin ex fla-
vo-fuscente, odora. Filam. ochroleuca.

12. *umbella-
tum.* O. fl. corymbosis: peduncul. scapo altioribus:
filamen. basi dilatatis. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq.*
Austr. 4. tab. 34.

Bulbus leucanthemos &c. *Dod. hist.* 221.

Eliocarmos. *Renealm.* sp. tab. 87.

In Germania, Gallia &c. ad vias, & secus agros
24.

Fol. radical. sub 9. In caul. dodrantali stipul.
maximæ, albæ. Fol. pauca, linear. carinata.
Spatha sub quolibet pedunc. Petal. intus alba,
extus virent. cum limbo albo.

13. *nutans.* O. fl. secundis, pendulis: nectar. stamineo cam-
panifor. *Syst. veg. ed.* *Jacq. Austr. 4. tab. 301.*
Rudb. elys. 1. p. 137. f. 12. *Clus. app. 2. p.*
9. tab. 9.

In Italia, Helvetia, Germania 24.

Caul. aphyll. Fol. pedal. linear. carinata, acu-
mine obtuso, supra læte, subtus cinereo-vi-
rent. Racemus 5-20-fl. Bract. longa, membra-
naceo-fusca. Petala e viridi-albent.

14. *capense.* O. fol. cordatis, ovatis. *Syst. veg. ed.* 14. *Comm.*
hort. 2. tab. 88.

Ornithogalo &c. *Breyn. cent.* tab. 41. *Rudb. elys.*
1. p. 138. f. 14.

Ad cap. b. Spei 24.

Radix magna, tuberosa. *Fol.* *radical.* 2. *longe*

- petiol. lata, nervosa, *Plantagini roseæ* simil.
Scap. sesquiped. rotundus, in cuius medio pe-
dunc. longi, alterni. Petal. primum virid. dein
alba. Stam. connexa in cylindrum.
- 15. crenula-** O. fol. oblong. obtusis, ciliatis: fl. racemosis,
tum. erectis. S. fi. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
O. *unifolium*. Retz. Obs. fasc. 2. (monente Vahl.)
Ad cap. b. Spei b.
Bulbus ovatus, magnitudine *Avellanæ*. Racemus
paucifl. Fl. alterni, peduncul. bracteati. Cor.
patentiss. Petal. lanceol. obtusa, flavescens.
- 16. rupestre.** O. fol. filiform. cernosis: scap. paucifl. Syst. veg.
et i. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
- 17. ciliatum.** O. fol. ovatis, acutis, ciliatis: fl. racemosis.
Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
- 18. altissimum.** O. fol. oblong. acutis, glabris: racemo 4--ped.
Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
- 19. pilosum.** O. fol. lineari--ensiform. ciliatis: fl. racemosis;
peduncul. incurvis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
- 20. bulbiferum.** O. bulbis axillar. caul. polyphyll. 1--fl. Syst. veg.
ed. 14. Lin. Suppl. Pall. it. 2. tab. Q.
Ad mare Caspium 24.
Fl. & statura simile O. *minuto*. Bulbus mole Pisi.
Fl. radical. plura, linear. subcarinata. Scap.
unicus, fol. longior, 1-fl. Petal. exter. virid.
marginè flavo, interior. nervo virescente. Circa
scapum inferius multa nascuntur fol. basi bul-
bosa.
- 21. circinata-** O. hirsutie canescens: fol. linear. recurvata, ca-
tum. nalicul. radicali solitar. caulinis 3. caul. 3--4--fl.
Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
O. *reticulatum*. Pall. it. 3. tab. D. f. 2.
In Dauuria.
Simil. O. *minimo*, sed *distinctum*. Tota planta,
fl. excepto, hirsutie minima canescente tecta.
Bulbus tunicis fibroso--reticulat. vagina cylindri-
ca, laxa. Fol. radicale lineare, crassifcul. cir-
cinnato--contortum. Scap. foliis dimidio bre-
vior, umbellatus. Involuc. 3-phyll. lacin. li-
near. attenuatis, & circinnatis. Fl. terni, raro
pl. O. *luteo* ma. Petal. 5. exter. ma. acumin.

- virid. margine flavo ; interior. teneriora , fla-
va , nervo lato , viridi .
- 22. japoni-
cum.** O. racemo spicato , cylindrico , longiss. scap.
striato . *Syst. veg. ed. 14. Thomb. Jap.*
Kui-Simira. Kæm. am. exot. Fusc. V. p. 872.
In Japonia 24.
- Bulbus nucis Avellanæ paulo ma. conicus , albus .
Fol. radicalia , scapo breviora , digital. erecta .
linear. plana , glabra . Scap. erectus , pedal. &
ultra , teres , glaber . Fl. erecti , in racemo
digital. & ultra , bracteati . Petal. lineam lon-
ga , patent. purpuro-cœrul.
-
- flavum.** O. fol. linear. plano-complicatis : fl. racemosis ,
flavis . *Forsk. Æg.*
In Arabia 24.
- 305. SCILLA.** Bracteæ loco calycis . Cor. 6-petal. patens , de-
cidua . Filam. filifor. non lata .
- 1. maritima.** S. nudiflora , bract refractis (linear-i-lanceol.).
Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 591.
S. hispanica. Clus. hist. I. p. 171.
b. S. rad. alba. Seb. mus. I. tab. 44. f. 4. 5.
Matth.
Ad Hispaniæ , Siciliæ &c. litora arenosa 24.
Radix maxima , bulbosa , tunicata , rubra , vel
alba . Fol. lanceol. stricta . Scap. ante fol. lon-
giss. multifl. Fl. albi .
- 2. Lilio-hya-
cinthus.** S. radice squamata . *Syst. veg. ed. 14.*
In Pyrenæis , Hispania &c. 24.
Rad. & fol. Liliæ . Cor. cœrul.
- 3. italica.** S. racemo conico , oblongo . *Syst. veg. ed. 14.*
Hyacinthus stellaris &c. Besl. eyst. vern. 42. f. I.
Clus. hist. I. p. 184.
*In locis lapidosis , & umbrosis Comitatus Nicæen-
sis 24.*
Bulbi congesti , tunicati . Scap. pedal. Fol. latio-
ra . Racemus pedicellis erectiucul. Bract. 2.
subul. longitudine pedicell. Flos patens , petal.
lateribus reflexis , apice obtusis , albis , aut
cœrul.
- 4. peruviana.** S. corymb. conico , conferto . *Syst. veg. ed. 14.*
Hyacinthus &c. Rudb. elys. I. p. 37. f. I.
Hyacinth. stellatus peruanus. Clus. hist. I. p. 182.
Eriophorus peruvian. Clus. hist. I. p. 173.
In Lusitania .

HEXANDRIA MONOGYNIA.

- Radix tunicata, lanuginosa. Scap. semiped. teres;
Cor. sature purpur. senescentes recurvatae.
- 5. amœna.** S. fl. lateral. alternis, subnutantibus: scapo angulato. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 213.*
Hyacinthus &c. Rudb. elys. 2. tab. 7. Besl. syst. vern. 43. f. 2.
- In Austria, Russia &c. 24.*
Scapi pl. in planta culta, sub 3-fl. Fol. sub 4.
scapo subæqualia, pedal. lata, mollia. Petal.
decidua, cœrul. basi lineol. 2. albis. Germen
flavum.
- 6. bifolia.** S. fl. erectiuscul. paucioribus. *Syst. veg. ed. 14.*
Fl. Dan. tab. 568. Austr. 2. tab. 117.
Hyacinthus stellatus &c. Bauh. hist. 2. p. 679.
Fuchs. hist. 837.
- In Gallia, Germania &c. 24.*
Bulbus pyriform. squamosus. Scap. 3-8-unc. superne purpurasc. Fol. 2. radical. carinata, basi flava, quandoq. terna, sature virent. mollia.
Fl. sæpe 4. Petal. alterna, cœrul. ovalia, tuberculis terminata. *Var. cor. carneæ, exalbita, alba: = spica breviore, multiſl. ſlipul. peduncul. & fl. cœruleſcent. petal. obtuſis.*
- 7. lusitanica.** S. racemo conico, oblongo: petal. lineatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Hyacinthus &c. Rudb. elys. 2. p. 34. f. 4.
- In Lusitania 24.*
Simil. *S. amœna.* Scap. teres. Fl. distantes. Petal. elliptica, obtusiusc. patent. cœrul. Stam. petalis paulo breviora. Anth. flavæ.
- 8. hyacinthoides.** S. racemo longiss. fl. subverticillat. pedunc. patentibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Bulbus eriophorus or. *Bauh. pin. 47. & antiquorum.*
Habitat
Bulbilli ad bulbum principem multi. Scap. 3-ped.
a medio fere ad apicem florens. Fol. plana,
semiped. longiora. Pedicelli sparsi, filiform.
fl. triplo longiores, cœrul. Cor. minima, e
violac-cœruleſc.
- 9. autumnalis.** S. fol. filiform. linear. fl. corymbosis; peduncul.
nudis, adſcendentibus, longitudine fl. *Syst. veg. ed. 14.*
Hyacinthus &c. Clus. 1. p. 185.
Ornithogalum &c. Garid. Aix. tab. 73.
In Hispania, Gallia, Italia, solo glareoso 24.

Radix tunicata. Scap. palmar. terebrat. racemosus. Fol. compressa. Cor. magnitudine *Pisi*, dilute purpur.

10. *unifolia*. S. fol. teretiuscul. latere subspicato. Syst. veg. ed. 14.

Bulbus &c. Bauh. hist. 2. p. 622.

In Lusitania.

Bulb. orbicular. fuscus, nucis Avellanæ magnitudine. Scap. 3-unc. Fol. angustum. Fl. 3. nivei, odori, simil. fl. *Parnassia palus*. Var. fol. & scapis binis.

11. *tetraphyl-* S. acaul. fol. quaternis, ovat-lanceol. Syst. veg. la. ed. 14. Lin. Suppl.

In Africa.

Rad. bulbosa. Fol. sessil. patent. nervosa, lœvia. Fl. fol. dimidio breviores, peduncul. copiosi. Petal. lanceol. margine membranac.

12. *japonica*. S. fl. umbella terminali, fastigiata. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.

In Japonia.

Scap. erectus, palmar. simplex, glaber. Bract. in scapo, & sub fl. unguicular. membranac. Petala unguicul. patent. albo-purpur. Fol. numquam visa sunt in planta florente.

506. CYA- NELLA. Cor. 6--petala; petal. 3. inferioribus propenden- tibus. Stam. infimum declinatum, longius.

1. *lutea*. C. fol. ensiform. ramis erectis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Convenit cum sequenti, filament. basi in urceolum natis: anth. una maiore: stigmate simpl. Differt ab illa, fol. radical. lanceol. nec linear. peduncul. minus divaricat. petal. ma. luteis.

2. *capensis*. C. fol. undulatis; ramis patentiss. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Jacq. hort. 3. tab. 35.

Ad cap. b. Spei.

Statura Scilla. Bulbus subrotund. depresso, fœtidus. Caul. incrassatus, ad telluris superficiem ramis diffusis. Fol. radical. pauca, basi vaginant. longe lanceol. acumin. glabra, integerr. supra striata: caulina sessil. lineari-lanc. Fl. racemosi. Petal. oval. obtusiusc. patentiss. concava, cum quadam purpura cœruleesc. Stam. petalum ringens mentiuntur.

3. *alba*. C. fol. linearis-siliformibus. *Syst. veg. ed. 14.* *Linn.*
Suppl.
Ad cap. b. Spei.
507. ASPHO- Cor. 6-patal. stellata, petalis basi conglutinatis.
 DELUS. Nectar. ex valvulis 6. germen tegentibus.
 Stigm. capitatum. Caps. carnosæ, subrotunda,
 trilobæ.
2. *luteus*. A. caul. folioso : fol. triquetris, striatis. *Syst. veg.*
ed. 14. *Jacq. Hort. I. tab. 77.* *Black. tab. 23.*
In Sicilia ♂.
 Rad. tubercul. Caul. 3-ped. nitidus. Fol. radical.
 multa, fistulosa, subulata, glauco-virent. cau-
 lina vaginosa. Spica densa. Bract. membranac.
 maiuscule, albæ. Cor. lutea, extus linea vi-
 ridi. Petal. alterna, quæ in fl. adhuc dum
 clauso exteriora fuerunt, sunt duplo reliquis
 angustiora. Ex his infimum magis distat a pro-
 ximis lateralibus, quam distant reliqua ab in-
 vicem. Stam. declinata, quorum 3. breviora.
2. *ramosus*. A. caul. nudo : fol. ensiform. carinatis, lævibus.
Syst. veg. ed. 14. *Nov. Comm. Gott. 1776.* *tab.*
 7. *Black. tab. 238.*
 Asphodelus. *Clus. hist. I. p. 197.*
 Asfodelo. *Matth.*
In Europa collibus apricis ♀.
 Radix tuberculosa. Caul. tortilis. Fl. spicati.
 Petal. alba.
3. *fistulosus*. A. caule nudo : fol. strictis, subulat. striatis, sub-
 fistulosis. *Syst. veg. ed. 14.* *Pluk. phyt. tab.*
 311. f. I.
 A. minor. *Clus. hist. I. p. 197.*
In Gallo-provincia, Hispania, Creta, & Ligurie
montibus ♀.
 Scapi cubital. ramosi. Petal. ovalia, albida.
-
- liburnicus*. A. fol. setaceis. *Scop. Fl. Carn. tab. 12.*
In Carniola.
 Caul. pedal. teres. Fol. basin caulis occupantia,
 uncial. & ultra, subtriquetra. Fl. uncial. pen-
 duli, laxi, lutei, 5. lineis fuscescent. striati.
508. ANTERICUM. Cor. 6-petala, patens. Caps. ovata.
 * *Fol. canaliculata.*
1. *serotinum*. A. fol. planiuscul. scapo 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*
Jacq. Austr. 5. tab. 38.

Bulbocodium &c. Raii. Angl. 3. p. 374. tab. 17.
f. 1.

Narcissus autumnal. &c. Bauh. hist. 2. p. 662.

Pseudo-Narcissus &c. Rudb. elys. 2. p. 64. f. 9.
In alpibus Helvetia, Anglia &c. 24.

Rad. oblong. alba, obducta squamis ramentaceis.

Scap. 4-unc. & paulo ultra. Fol. radical. multa, graminea, linear. gracilia, primum tertia, dein planiuscula: caulina 3-4. alterna, breviora, vaginant. lanceol. minuta, absque spatha. Flos respective magnus, inferus. Petal. ovat-lanceol. alba, lineis rufis, unguibus luteis. Filam. non lanata.

2. *græcum*. A. fol. planis: scapo simplici: fl. corymbosis; filamen. lanatis. Syst. veg. ed. 14.

In Oriente 24.

Bulbus. Fol. linear. glabra, longitudine fere scapi. Scapus fol. 3-4. brevioribus. Corymb. terminal. sub 5-fl. peduncul. intermedio 1-fl. lateralibus 2-fl. Cor. alba, A. ramosa. Stam. & styl. cor. brevior.

3. *planifoli-um*. A. fol. planis: scapo, filamentisq. lanatis. Syst. veg. ed. 14.

In Lusitania 24.

Statura A. græci, sed fl. min. Filam. non lævia.

Rad. oblong. crassa, flavescens. Fol. radical. linear. striata, subcarinata, apice involuto-subulata. Scap. ramosus, bracteis lanceolat. Peduncul. subracemosus. Fl. rubri, magnitudine A. ramosa.

4. *revolutum*. A. fol. trigonis, scabris: scapo ramoso: cor. revolutis. Syst. veg. ed. 14.

Phalangium &c. Comm. hort. 1. tab. 34.

In Æthiopia 24.

Rad. fascicular. Hæmanthi punic. Fol. radical. numerosa, scapo triplo breviora, subulata, striata, patent. Scap. 4-ped. subnudus, obliquus, bracteis 5. adpressis, subulatis. Corymb. terminal. compressus, ramis 6. longis, alternis. Fl. 1-2-3. alterni. Petal. lanceol-ovata, obtusa, alba, extus ad apicem viridi-fusca.

5. *ramosum*. A. fol. planis: scapo (sæpe) ramoso: cor. planis: pistil. recto. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 161.

Phalangium. *Lob. ic. 47. Ad. Bernens. 1766.*
tab. 6.

In Europæ australioris rupibus calcareis 24.

Scapus 3--ped. teres, nudus, superne paniculat.
glaucus. Fol. ensiform. carinata. Stipul. sub-
axillar. breviss. Panicula rara, sparsa. Petal.
stelliiform. alba, extus media linea fuso-virid.
Caps. subrotund.

6. *Liliago*. A. (fol. radical. carinatis) : scapo simpliciss. cor.
planis; pistill. declinato. *Syst. veg. ed. 14. Jacq.*
hort. tab. 83. Fl. Dan. tab. 616.

Phalangium &c. Moris. hist. 3. f. 4. tab. I. f. 10.
Liliago Cordi Lob. ic. p. 48.

In Helvetia, Germania &c. 24.

Differet a priore. Plantæ ætate cespitosa. Caul.
cubit. simpl. vel ramosus. Fol. ensiformi-linear.
acuta: caulinum unum, vel alterum. Racemus
rarus, 10-fl. Fl. magni, albi.

7. *Liliastrum*. A. fol. planis: scapo simpliciss. cor. campanulat.
stamin. declinatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Phalangium. Dalech. hist. 852.

In alpibus Helveticis, Allobrogicis 24.

Ad Hemerocallim spectat. Rad. fasciculata, fibris
carnosis. Scap. pedal-cubital. Fol. prælongi,
graminea, mollia. Stipul. ovat-lanceol. colo-
ratae. Spica rario, unilateral. Flos sensim di-
latatus, calyce instructus. Petal. *Lilii candidi*,
acumine reflexo, cum puncto viridi, odora.

8. *Spirale*. A. scapo spirali. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad. cap. b. Spei, locis glareosis 24.

Planta aphylla. Folior. rudimenta inferne scapum
tegentia. Rad. bulbosa. Scap. palmar. filiform.
sub 4-fl. Bract. minutæ, ovatæ. Fl. 3-4. mi-
nimi, magnitudine *Polygoni avicular.* ex apice
caulis.

** *Fol. carnosis.*

9. *frutescens*. A. fol. carnosis, teretibus: caul. fruticoso. *Syst.*
veg. ed. 14.

Phalangium &c. Dill. elth. tab. 231. f. 298.

Ad cap. b. Spei 24.

Caul. pedal. & ultra, ramis alternis. Fol. pedal.
& ultra, alterna, vaginant. Fl. longe spicati.
Bract. magnæ, ovat. membranac. Petala flava,
linea viridi.

10. *giooides*. A. fol. carnosis, subulatis, planiuscul. Syst. veg. ed. 14.
Phalangium &c. Dill. elth. tab. 232. f. 300.
Ad cap. b. Spei 24.
 Fol. radical. fasciculata, brevia, lata. Pedunc. longi, divergent. Fl. spicati. Petal. sature flava, linea viridi.
11. *aphodelo-* *ides*. A. fol. carnosis. subulat. semiteret. strictis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 181.
In Æthiopia 24.
 Scapus pedal. Fol. numerosa, vix striata, margine aspera, dorso versus alterum latus gibbosiora. Racem. simpl. longus, rarus. Fl. odore corticis Citri. Petal. lutea cum linea viridi.
12. *annuum*. A. fol. carnosis, subulat. teretiuscul. scapo subracemofo. Syst. veg. ed. 14.
In Æthiopia 24.
Differt a priore, cui simile, in eo quod sit annuum; caule, & fol. tenerioribus.
13. *hispidum*. A. fol. carnosis, compressis, hispidis. Syst. veg. ed. 14.
Asphodelus &c. Mill. dict. tab. 56?
Ad cap. b. Spei 24.
 Rad. fibrosa. Fol. semipedal. recurvata, striata. Scap. simpl. hispidus. Racemus bract. lanceolat. hispidis. Petal. alba, carina viridi. Anth. luteæ.
 *** *Fol. ensiformibus.*
14. *officinale*. A. fol. ensiformibus: filament. lanatis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 42. Gmel. Sib. I. tab. 18. f. 2.
 Narthecium. E. N. C. 1742. tab. 5. f. 1.
Asphodelus luteus &c. Dod. pempt. 208.
In Europæ borealis uliginosis 24.
 Caul. foliosus. Spica laxa. Petal. lutea.
15. *calycula-*
tum. A. fol. ensiformibus: perianth. trilobis: filam. glabris: fl. trigynis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 36. Gmel. Sib. I. tab. 18. f. 2. Fl. Lapp. tab. 10. f. 3.
Phalangium &c. Segu. ver. 2. tab. 14.
In alpibus Helvetiæ, Lapponiae &c. 24.
Pertinet ad Scheuchzeriæ genus, cum flos sit calvo.
donatus. Rad. cespitosa. Scap. pedal. simplic. quandoq; intorti. Fol. radical. linear. lævia,

parum striata, quandoq. in caul. unicum. Fl. I-2-3. peduncul. floriferis patentibus; fructifer. erectis. Cor. flavescentia, vel alba. Anth. cœrulea.

16. *japonicum*. A. fol. ensiform. convolutis, glabris: scapo ramoso, angulato: fl. racemosis, cernuis. Syst. veg. ed. 14. *Thumb. Jap.*

In Japonia.

Fol. radical. pedal. erecta, canalicul. integerr. coriacea, glabra. Scap. longitud. folior. erectus, flexuosus, bracteatus. glaber. Fl. albi, decidui.

In sequentibus divisiones ordinis servari non possunt.

17. *flexifolium*. A. fol. subulat. flexuosis, glabris; caule ramoso. Syst. veg. ed. 14. *Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

18. *muricatum*. A. fol. carnosis, compressis, striatis, muricatis. Syst. veg. ed. 14. *Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Fol. longa, scabriuscula. Scap. 2-pedal. basi hirsutus, dein ramosus.

19. *latifolium*. A. fol. carnosis, latro-ensiform. glabris: racemo longiss. caule simpl. Syst. veg. ed. 14. *Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

20. *cauda felis*. A. fol. canaliculato-ensiform. scapo simpl. racemo oblongo. Syst. veg. ed. 14. *Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

21. *triquetrum*. A. fol. filiform. triquetris, scapo simpl. brevioribus: racemo ovato: Syst. veg. ed. 14. *Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

22. *ciliatum*. A. fol. ensiform. carnosio-subtriquetris, ciliatis: scapo simpl. racemo longiss. Syst. veg. ed. 14. *Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Fol. longissima.

23. *falcatum*. A. fol. carnosis, ensiform. falcatis, glabris: caule ramoso, racemoso. Syst. veg. ed. 14. *Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Fol. terræ adpressa, depresso.

24. *contortum*. A. fol. planis, ensiform. caule ramoso: fl. remotiss. Syst. veg. ed. 14. *Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

25. *scabrum*. A. fol. triquetris, ferrulatis: caule ramoso, sca-
bro; peduncul. fructiferis recurvis. *Syst. veg.*
ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
26. *squamatum*. A. scapo squamis membranac. tumidis imbricato.
Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei 4.
Rad. tuberosa-pendula. Fol. radical. 3. grami-
nea, palmar. in quibusdam transverse plicata.
Scap. brevis, pollic. Racem. terminal. e pa-
leis scariosis, hyalinis, acutiss. Cor. infundibu-
lif. extus subpubescens. Caps. globosa, cer-
nua. *Var. fol. hirsutis, & glabris. Planta*
media inter Hyacinthos, Ornithogala, & An-
therica.
-

- aphyllum*. A. rad. bulbosa. *Forsk. Æg.*
In Arabia 4.
- asphodelum*. Rad. bulbis 6-7. pugni magnitudine. Fol. nulla.
A. fol. carnosus, teretibus: caps. 3-locul. 2-sperm.
Forsk. Suppl. Æg.
In Arabia.
509. LEON- Cor. 6-petal. Nectar. 6-phyll. unguibus cor. in-
TICE. sidens, limbo patent. Cal. 6-phyll. deciduus.
Caps. inflata.
1. *Chrysogo-* L. fol. pinnatis: petiol. comm. simpl. *Syst. veg.*
num. *ed. 14.*
Leontopetalo &c. *Moris. hist.* 3. f. 4. tab. 5.
f. 3.
Inter Græcia segetes 4.
Magnitudo sequent. Rad. tuberosa. Caul. ad ter-
ram repandi, ramosi. Fol. decussata, apice
latiora, divisura fol. Quercus, atro-virent. Fl.
dense spicati, lutei.
2. *Leontopeta-* L. fol. decomposit. petiol. comm. 3-fido. *Syst.*
lum. *veg. ed. 14. Moris. hist.* 3. f. 3. tab. 15. f. 6.
In Apulia, Creta, Sicilia 4.
Rad. tuberosa, rotunda. Caul. ramosus, cum
lineis pallide purpur. Foliol. circinatae fere
rotunditatis, glauco-flavescentes. Fl. spicati, pe-
duncul. lutei.
3. *Thalictroi*. L. fol. caulino triternato; florali biternato. *Syst.*
des. *veg. ed. 14.*
In Virginia 4.

Modus crescendi Epimedii. Caul. pedal. nudus, terminatus fol. 3. patentiss. petiolat. Petiol. singulus 3-fid. folioi. iateralibus 2. sessil. bilobis; intermedium petiolat. 3-lobum. Racem. simpl. cum 2. iateralibus. Petal. minima, herbac. Bacca globosa, cœrul.

4. *Leontopeta-* L. fol. simplic. 3-partito-multifid. cor. monopetal. calyculata. *Syst. veg. ed. 14.* *Act. petrop. tab. 113.*

In India.

Rad. tuberosa, subrotun. extus ciner. intus alba. Scapi plerumq. 4. simpl. cinerei, striis nigricant. in quorum apice fol. ampla, tenuia, lœte virid. in cæteris duobus fl. multi, in umbellam dense congesti, lutei. Caps. angulata.

incertæ.

L. *Pallas ir. 3. tab. V. f. 2.*

In Dauria 24.

Habitus Leontices, sed fl. vist non fuerunt. Plantæ mollis, succulenta. Radix tuberosa. Fol. ternata: foliol. vel lateral. 2-lobis, medio 3-lobo: vel lateral. inæqualibus, 4-lobis, terminali 3-part. intermedia parte 3-fida; iateralibus sub-2-fid. Peduncul. circa caulem vaginant. Racem. simpl. paucifl. bractea ad pedunculos singulos amplexicaul. reniformi. Fruct. vesicarii, maximi, extimo inflati, subtus magis ventricosi, & quasi recurvi, toti membranacei, pallidi, vel rubicundi.

510. *POLLIA.* Cor. 6-petal. petal. 3. exterioribus ma. concavis; 3. interioribus inflexis. Bacca polysperma.

I. *japonica.* P. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia.

Caul. erectus. 2-ped. parum ramosus, angulat. articulat. villoso-asperatus. Rami breves, alterni. Fol. infimo cauli adproximata; in supremo valde remota, pedalia, (superioribus brevioribus), pollic. latiora, alterna, amplexicaul. ensiform. integerr. longitudinaliter nervosa, patula, subtus albida. Fl. verticillato-corymb. Bractea sub singulo pedunc. alba. Bacca immatura alba, matura cœrul.

511. *ASPA-* Cal. o. Cor. 6-petal. erecta, campaniform. petalis 3. interioribus apice reflexis. Bacca 3-locul. 6-sperm.

1. *officinalis*. A. cau!. herbac. tereti, erecto: fol. setaceis; stipul. paribus. *Syst. veg.* ed. 14. *Luaw. ed.* tab. 78.
b. A. *utilis*. *Black. tab. 332.* *Knorr. del. I. tab. S. 22.* *Cam. epit. 259.*
In Europæ arenosis, pascuis, & sylvis cæduis 24.
 Caul. paniculat. Stipul. exterior. solitar. & binæ
 interior. min. inter quas fol. terna, raro 4-5.
 Pedunc. gemini, laxi, 1-fl. penduli. Cor. cam-
 panul. ex rubro-virid. Bacca rubra, punctulis
 flavis variegata.
2. *declinatus*. A. caul. tereti, inermi; ramis declinatis: fol.
 setaceis. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei.
*Simil. priori, sed altior; fol. pl. duploque longiori-
 bus.* Caul. anneus. Stipul. solitar. lanceol-su-
 bul. basi deorsum mucrone membranac. Fol.
 7-10. filiform. patentia.
3. *falcatus*. A. aculeis solitar. reversis; ramis teretibus: fol.
 ensiform. falcatis. *Syst. veg. ed. 14.* *Burm.
 Zeyl. tab. 13. f. 2.*
In Zeelona 3.
 Caul. 2-ped. teres, ramosus, cinereus. Fol. li-
 near. basi angusta, glabra, ex uno punto
 multa, in rami alterna. Aculei parvi. Ra-
 cem. axillar. simpl. breves.
4. *retrofractus*. A. aculeis solitar. ramis teretibus, reflexis, re-
 trofractisq. fol. fasciculat. setaceis. *Syst. veg.*
 ed. 14. *Pluk. amalh. tab. 375. f. 3.*
In Africa 3.
 Rami sursum, & deorsum alternatim flexi, tere-
 tes, dichotomi, dichotomis verrucosis, acu-
 leo minuto nutante. Fol. 30. & plura ex sin-
 gulo punto, ultimis ramis insidentia. Racemi
 axill. multipl. Spinæ stipul. deflexæ, ortæ ex
 stipul. pendulis, demum induratis in aculeos
 fragiles.
5. *aethiopicus*. A. aculeis solitar. reversis; ramis angulatis: fol.
 lanceol-linear. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei 24.
Simil. A. falcato, sed fol. min. sub 7. nec 3.
 Stipul. emittunt spinam retro spectantem. Ra-
 mi fleuroposi, quasi fruticosi, virides.
6. *asiaticum*. A. aculeis solitar: caule erecto: ramis filiform.

fol. fasciculat. setaceis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk.*
alm. tab. 14. f. 4.

In Asia.

Caul. & rami inermes, excepto aculeo ramo singulo subiecto. Fol. sub 14. ex singulo tuberculo.

7. *albus*.

A. aculeis solitar. ramis angulatis, flexuosis: fol. fasciculat. triquetris, muticis, deciduis. *Syst. veg. ed. 14.*

Corduba 3. Clus. 2. p. 178.

In Lusitania, Hispania \ddagger .

Caul. albus. Spinæ rectæ, patentes, seu reflexæ. Ramuli bini, oppositi.

8. *acutifolius*. A. caul. inermi, angulato, fruticoso: fol. aciformi. rigidul. perennantibus, mucronatis, æqualibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Corruda prior. Clus. hist. 2. p. 77.

In Lusitan. Hispan. Oriente &c. \ddagger .

Simil. A. aphylo, sed fol. sæpius septena, filo vix crassiora; cum illi sæpius terna, triplo crassiora, valdeq. subulata. Fol. punctulis subargent. prædita.

9. *horridus*. A. aphyll. fruticosus, 5-gonus, aculeis 4-gon. compressis, striatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Hispania \ddagger .

Fol. vix ulla. Aculei longitudine digitæ, solitar. remoti, alterni, lignosi, robusti.

10. *aphyllus*. A. caul. inermi, angulato, fruticoso: fol. subulat. striatis, inæqual. divergentibus. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 53.*

Corruda altera. Clus. hist. 2. p. 178.

In Sicilia, Hispan. Lusitan. 24.

Spinæ 3-4. ad eundem exortum.

11. *capensis*. A. spinis quaternis; ramis adgregat. teretibus: fol. setaceis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 78. f. 3.*

Ad cap. b. Spei \ddagger .

Rad. tuberosa. Caul. fruticosi, filiform. flexuosi, rubicun. Spinæ acutiss. patentes, subrecurvæ. Ramuli ex axillis spicarum, inermes, decidui. Fol. inermia, brevia, in ramulis fasciculata, semiunguicul. Stipul. membranaceæ. Fl. peduncul. Cor. alba.

12. *farmertofus*. A. sol. solitar. linear-lanceol. caul. flexuoso; aculeis

aculeis recurvis (solitariis). *Syst. veg. ed. 14.*
Herm. Lugd. tab. 650. 73.

In Zeylona ♂.

Adfinis valde Medeolæ asparagoidi. Rad. tuberosa. Sarmenta longiss. in pl. alas divisa. Fol. præ cæteris speciebus longiora, latiora, robustiora. Fl. parvi, albidi. Bacca rubra.

13. *verticillaris.* A. fol. verticillatis. *Syst. veg. ed. 14. Buzb.*
ris. cent. 5. app. tab. 37.

In Oriente.

Fol. Galii.

stipularis. A. stipulis basi mucronat. fol. simplic. subulat. mucronat. *Forsk. Æg.*

In Ægypto.

Caul. diffusus, ramosus, angulatus. Rami patent. angulati. Fol. pollic. conferta, solitar. raro ternata, angulata, pateat. rigida, mucrone acuto, flavo, pellucido. Stipul. membranac. pellucidæ. Fl. breviter peduncul. binii, terni, utrimq. axillar. flavidant. Baccæ Juniperinæ, coerule.

512. DRA- Cor. 6-part. erecta. Filam. medio subcrassiora.
 CÆNA. Bacca 3-locul. 3-sperm.

1. *Draco.* D. arborea; fol. subcarnosis, apice spinoso. *Syst. veg. ed. 14. Blak. tab. 358.*

In India orient. ♂.

Arbor fol. *Yuccæ*: rami 8-9-cubit. nudi, qui in apice in alios ternos-quaternos ramulos cubit. dividuntur: in quorum apice fol. longa, unc. lata, pendula. Peduncul. geniculo instructi. Fructus racemosi, Cerasiform. flavescens.

2. *ferrea.* D. arborea; fol. lanceol. acutis. *Syst. veg. ed. 14.*

In China ♂.

3. *striata.* D. frutesc. caulescens, erecta: caul. flexuoso: fol. lanceol. oblique falcatis, striatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei ♂.

4. *terminatus.* D. herbac. caulescens. fol. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14.*

Terminalis. Rumph. amb. 4. tab. 34.

In India ♂.

Fol. fere *Canna*. Racem. terminal. compositus.
Tom. II.

Pedicel. solitar. alterni, fl. breviores, cincti
ad basin gluma obtusa. *Arbor dura*.

5. *enifolia*. D. herbac. subcaulesc. fol. ensiformibus. *Syst.*
veg. ed. 14.

Gladiolus &c. Rumph. amb. 5. tab. 73.

In India b.

Caul. ramosus, paniculat. Fol. petiol. enervia,
subtus carinata. Ad exortum ramorum foliol.
2. parva, colorata.

6. *undulata*. D. herbac. caulescens, erecta: fol. ovat. acutis,
multinerviis: fl. axillar. pedunculat. *Syst. veg.*
ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

7. *Medeoloides*. D. est *Medeo'a Asparagoides* monente Vahl.

8. *erecta*. D. herbac. caulescens, erecta: fol. sessil. lanceolat. subulat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

9. *volubilis*, D. herbac. volubil. fol. lanceolat. *Syst. veg. ed.*
14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

10. *graminifolia*. D. herbac. acaulis: fol. linearibus. *Syst. veg.*
ed. 14.

In Asia.

Statura *Antherici phalangii*. Fol. graminea, val-
de striata, spitham. Scap. vix fol. longior.
Fl. ad singulos dentes racemi 4-5. pedicellati.

513. CONVALLARIA. Cor. 6-fid. Bacca maculosa, 3-locul,

* *Cor. campanulatis.*

1. *maialis*. C. scapo nudo. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 70.*
Ludw. eti. tab. 87. Sabb. hort. 1. tab. Knorr.
del. 2. tab. C. 3. Fl. Dan. tab. 854.

Lilio convallio. *Matth.*

In Europæ septentrion. sylvis 24.

Fol. radical. plerumq. bina, vaginant. lato-lan-
ceol. vel ovata. Scap. dodrant. Fl. spicati,
unilateral. cernui. Cor. parva, globosa, api-
ce reflexo, alba, odora. *Var. duplex.* Bacca
rubra.

2. *japonica*. C. scap. nudo, ancipiti: racemo cernuo. *Syst.*
veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In Japonia 24.

Variet. duplex. ma. & min. Fol. radical. plura,
10. & ultra, linear. inferne attenuata, trigo-
na, inde plana, integerr. striata, recurva,

2-pedal. & ultra. Scap. spitham. anceps, 4-gon. cernuus, apice floriferus, glaber, tenuissime striatus. Racemi fl. peduncul. secundis. Pedunc. adgregati, 2-6. Bract. alba. Petal. alba. Bacca magnitudine *Pisi*, coerulea.

5. Barba serpentina. *Kæmph. am. exot. Fas. V.*
pag. 824.

In Japonia inter frutices.

Rad. tuberculata. Fol. radical. inferne membrana tenuissime involuta, linear. acuta, striata, integerr. incurvata, secunda, glabra, palmar. & ultra, semilineam lata. Scap. fol. duplo brevior, anceps, glaber. Fl. ut in priore, sicuti bacca.

3. *spicata*, C. scap. nudo, striato: racemo spicato: fl. adgregatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia.

Radix fibrosa. Fol. radical. linear. inferne attenuata, obtusiusc. valde striata, glabra, scapo longiora. Scap. palmar-ped. erectus, striato-angulat. simpl. glaber. Racem. digital. Cor. subglobosa, glabra, violac.

** *Cor. infundibulifor.*

4. *verticillata*, C. fol. verticillatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan.*
tab. 86. Dod. pempt. 345.

In Europæ septent. saltibus, præcipitiis 24.

Caul. cubital. simpl. vel ramosus, erectus, fistulosus. Fol. terna-quaterna, elliptica, graciliora. Pedunc. axill. etiam ramosi, penduli, usque 6-fl. Fl. min. subvirid. Bacca violac.

5. *Polygonatum*. C. fol. alternis, amplexicaul. caul. ancipiti: penduncul. axillar. sub 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 377. Ludw. ed. tab. 47. Knorr. del. 2. tab. P. 4. Sabb. hort. 1. tab. 7. Barr. ic. 711.*

Polygonato. Mauth.

In Europæ septent. nemoribus 24.

Radix tuberosa, geniculata, serpens, Caul. cubit. angulatus. Fol. elliptic-lanceol. lata, nervosa, nutant. subtus glauca. Cor. tubulosa, albida, apice virescente, quandoq. duplex. Bacca mollis, purpur.

6. *latifolia*. C. fol. alternis, amplexicaul. acuminatis: caul.

HEXANDRIA MONOGYNIA.

angulato: pedunc. axillar. multifl. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 232.

In Austria.

Habitus, & pedunc. C. multifloræ. Rad. & fol.
C. maialis.

7. *multiflora*. C. fol. alternis, amplexicaul. caul. tereti: pedunc.
axill. multifl. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab.
152. Mill. ic. tab. 101. Black. tab. 251. Sabb.
hort. I. tab. 6.

Polygonatum latifol. I. Clus. hist. I. p. 275.

In Europæ septent. nemoribus 24.

Caul. 3-ped. simpl. arcuatus, cernuus. Fol. vix
amplexicaul. elliptico-lanc. meliora, ma: quam
in priore. Fl. min. Pedunc. compressi, 6-8-fl.
Cor. alba, lacin. subcordat.

*** Cor. rotatis.

8. *racemosa*. C. fol. sessilibus: racemo terminal. composito.
Syst. veg. ed. 14.

Polygonatum &c. Corn. Can. tab. 37. Moris. hist.
3. s. 13. tab. 4. f. 9. Pluk. alm. tab. 311. f. 2.

In Virginia, Canada 24.

Scap. squamatus, fascicul. tim racemosus. Bract.
lanceol. sub quolibet fasciculo. Fol. ampla,
alterna. Pedicell. conferti, patent. Fruct. rubri.

9. *stellata*. C. fol. amplexicaul. plurimis. Syst. veg. ed. 14.
Polygonatum &c. Corn. Can. tab. 33. Moris.
hist. 3. s. 13. tab. 4. f. 7.

In Canada 24.

Rad. geniculata, alba. Caul. pedal. & ultra.
Fol. vulgari acutiora, pinguiora, minus ner-
vosa, utrimq. virid. Fl. in summis fol. stellati,
lutei, dein spicam efformantes. Bacc. rubens.

10. *trifolia*. C. fol. amplexicaul. ternis: racemo terminali,
simpl. Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. I. tab. 6.

In Sibiria sylvis 24.

Rad. ut in *Lilio convallio*. Caul. palmar. Fol.
caulina 2-3-4. ovata, vel sublanceol. Fl. 5-9.
albi. Bacc. rubra.

11. *bifolia*. C. fol. cordat. fl. tetrands. Syst. veg. ed. 14. Fl.
Dan. tab. 291. Mill. ic. t. 105.

Lilium convallium &c. Barr. ic. 1212.

In Europæ boreal. pratis 24.

Scap. erectus, palmar. simpl. Fol. 1-2-3. alterna,
petiol. Racem. terminal. Cor. ovat--lanceol.
rotata, alba. Baccæ rubent.

514. POLY- Cor. infundibul. incurva, æqual. Filam. cor. fauci
ANTHES. inserta. Germ. in fundo cor.
1. *tuberosa*. P. fl. alternis. Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1.
tab. T. 12.
Hyacinthus indicus &c. Rudb. ely. 2. p. 39. f. 4.
b. Hyacinthus &c. Clus. hist. 1. p. 176. Rudb.
elys. 2. p. 39. f. 2.
Amica nocturna. Rumph. amb. 5. tab. 98.
In Java, Zelona 24.
Caul. 2-cubit. Fol. alterna, lata basi cauem am-
plexentia, subulata, integerr. radical. humi-
fusa. Fl. spicati, candidi, odore gravi. Var.
fl. pleno.
515. HYA- Cor. campanul. 6-fida, limbo reflexo: pori 3,
CINTHUS. melliferi in apice germinis. Stigm. obtusum.
1. non scrip- H. cor. campanul. 6-part. apice revolutis. Syst.
tus. veg. ed. 14. Black. tab. 61. Knorr. del. 2. tab.
H.
In Europæ nemoribus 24.
Rad. bulbosa, tunicata. Fol. radical. longa, in-
tegerr. etiam reflexa. Scap. teres. Spica pau-
ciflor. cernua. Bract. 2. Cor. cœrul. vel alba.
2. *cernuus*. H. cor. campanulat. 6-part. racemo cernuo. Syst.
veg. ed. 14.
H. *hispanicus*. Clus. Hist. 1. p. 177.
In Hispania 24.
Simil. priori, sed minor. Differt fol. magis linear.
minus lanceolat. erectioribus: racem. magis nu-
tante: cor. incarnata, nec cœrul. minus revo-
luta, et si reflexa, ut in illo: pistil. staminibus
breviore; bracteis saturatius incarnatis. Cor.
huic basi ventricosior.
3. *serotinus*. H. petal. exterior. subdistinctis; interior. coadunat.
Syst. veg. ed. 14.
H. *obsoleti* &c. Clus. hist. 1. p. 177. 178.
In Hispania, Mauritania, Liguria 24.
Racemus secundus. Fl. tristis col.
4. *viridis*. H. cor. exterioribus lacin. subulat. longissim. Syst.
veg. ed. 14. Comm. Götting. 1781. tab. 5.
Ad cap. b. Spei.
5. *amethysti-* H. cor. campanul. semi 6-fid. basi cylindricis.
nus. Syst. veg. ed. 14. Rudb. elys. 2. p. 27. f. 8.
H. *minor* &c. Bauh. hist. 2. p. 587.
In Hispania? Russia 24.
Fol. angusta. Cor. amethystina.

6. *revolutus*. H. cor. campanul. 6-part. revolutis : fol. oblongo-undulat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
7. *orientalis*. H. cor. infundibulif. semi-6-fid. basi ventricosis .
Syst. veg. ed. 14.
In Asia, Africa 24.
Bractæ 2. parvæ sub pedunculo. Variet. innumentæ petiol. multiplicat. & col. diverso .
8. *corymbosus*. H. cor. infundibuliform. corymbosis, erectis : scapo fol. breviore . *Syst. veg. ed. 14.*
In cap. b. Spei pascuis 24.
Rad. bulbosa . Fol. radical. linear. angustiss. digito breviora , sæpius 3. Racem. longiss. laxus , peduncul. supremis coloratis , deciduis . Fl. inferior. sordide pallentes ; superior. violac.
9. *romanus*. H. cor. campanulat. semi 6-fid. racemosis : stamin. membranac. *Syst. veg. ed. 14.*
H. *comosus &c. Bauh. hist. 2. p. 584.*
Romæ.
Fol. longiss. latitudine digitæ . Racem. longus , teres , fl. numerosiss. Bract. minutæ , membranac. muticæ . Cor. alba . Anth. cœrul.
10. *Muscari*. H. cor. ovatis , omnibus æqualibus . *Syst. veg. ed. 14.*
Muscari obsoletiore fl. *Clus. hist. 1. p. 178.*
In Asia, nunc in Europa 24.
Fol. radical. 5-6. humifusa , oblique inflexa , sulcata , succulenta . Scap. teres . Bractea una sub peduncul. altera supra ipsum . Fl. racemosi . Cor. ex purpuro-virens , aut fature purpurasc. Moschi odore .
- II. *corvalla-* H. scap. capillari : cor. ovatis , pendulis . *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
rioides.
Ad cap. b. Spei.
Fl. absque foliis , lutei .
12. *monstro-* H. cor. subovatis . *Syst. veg. ed. 14.*
sus. b. H. *sannestus &c. Col. ecphr. 2. tab. 12.*
In Gallia 24.
Videtur var. sequentis . Fl. paniculati , monstrosi , purpurei .
13. *comosus*. H. cor. angulato--cylindric. summis steril. longe pedicellatis . *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 126.*
H. *maximus &c. Bauh. hist. 2. p. 371.*
Jacinto Matth.
In Europæ australis agris 24.

Scap. pedal-cubit. Fol. pedal-dodrant. lata. Spica longiss. etiam pedal. cœrul. Fl. inferior. cylindrici, patuli, basi ventricosa, fusco-subvirid. fere *Miscari*: superior. minuti, vix dehiscentes; violac. sicuti pedicelli.

14. botryoides. H. cor. globosus, uniformibus: fol. canaliculato-cylindric. strictis. Syst. veg. ed. 14.

Hyacinthus. III. Clus. hist. I. p. 181. Lob. ic. 108. In Italia, Helvetia, Carniola &c.

Differet a sequenti fol. erectis, & fl. inodoris. Fol. 3. lineas lata. Racem. uncial. densus, 20-30-fl. Fl. magni, nutantes, late amethystini, ore albo.

15. racemosus. H. cor. ovatis; summis sessilibus: fol. laxis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 187. Knorr. det. I. tab. T. 8.

H. botryoides I. Clus. hist. I. p. 181.

In Europa australi 24.

Scap. 3-4-unc. sub fl. cœrul. Fol. semipedal. linearis lata, laxa, decumbent. Racemus densus, 40-50-fl. Pedunc. & cor. cœruleo-nigresc. odore debili *Prunorum*.

16. lanatus. H. cor. lanatis: caule ramoso. Syst. veg. ed. 14. Habitat

16. PHOR- Cor. campanul. 6--petal. Petal. 3: exter. breviora.

1. tenax. P. fol plurimis: inflorescentia ramosa. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen. Cook. vol. 2. tab. 96. Mill. ic. nov. tab. 2. fig. optima.

In nova Zeelandia.

Incolæ novæ Zeylandæ Lini speciem fabricant ex hac planta.

2. Hyacintho- P. fol. radical. binis, basi maculatis: scapo racemoso, simplici: cor. campanulato-patent. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Hyacinth. orchiodes. Jacq. hort. 2. tab. 178. Ad cap. b. Spei 24.

Fol. semiped. & ultra, lanceol. subulata, carnosa. Scap. basi ferrugineo-maculat. Racemus terminal. fl. copiosiss. Cor. campanul. extus viridescescens, odore Syringæ.

3. Aloides: P. fol. binis, radical. supra fusco-maculata, scap. racemoso, simplici: fl. nutantibus, cylindrico-infundibul. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei 24.

Radix bulbosa. Fol. lanceol. non carnosa. Scap. vix pedal. teres, fusco-maculat. Fl. versus apicem alterni, pedicellati. *Var. cor. luteis, croceis, sanguineis, apice purpur. albo-viresc. & proportione inter petal. exterior. & interiora. Species difficile determinatur.*

517. ALETRIS. Cor. infundibulifor. Stam. inserta laciniar. basi. Caps. 3-locul.

1. capensis. A. acaul. fol. lanceol. undulat. spica ovata; fl. nutantibus. *Syst. veg. ed. 14. Ad. Stock. 1770. tab. 5.*

Orchis hyacinthoid. &c. Buxb. cent. 3. tab. 20.

Ad cap. b. Spei.

Bulbus tunicat. violac. Fol. radical. sena, latolanceol.-violaceo-macul. Fl. copiosi, breviter peduncul. Bract. propriæ setac. Cor. punctis carneis, limbo breviss. obtuso. Caps. subinflata, ovato-triquetra, acute carinata, angulis compressis, magna.

2. hyacinthoides. A. acaul. fol. lanceol. carnosis: fl. geminat. *Syst. veg. ed. 14.*

Katu-Kapel. *Hort. mal. II. tab. 42?*

In Malabarria 24.

Scapus erectus, vix fol. superans. Fol. zonis transversis variegata. Fl. undiq. erecto-patuli, tubo angusto, limbo revoluto.

3. zeylanica. A. fol. quibusdam subulatis, compressis. *Comm. hort. 2. tab. 21. Pluk. alm. tab. 256. f. 5.*

In Zeylona 24.

Fol. prima lanceol. erecta, breviora, plana; reliqua longiora, subulata, semicylindr. canalicul.

b. guineensis. A. fol. omnibus lanceolat. *Jacq. hort. I. tab. 84. Comm. hort. 2. tab. 21. prælect. tab. 33.*

In Guinea 24.

Fol. plana, erecta.

3. fragrans. A. caulescens: fol. lanceolat. laxis. *Syst. veg. ed. 14.*

Aloe africana &c. Com. hort. 2. tab. 4. & I. tab. 49.

In Africa 3.

Radix fibrosa. Scap. 4-ped. Fol. sesquiped. 3. unc. lata, mucrone atro-virente, nitido. Fl. racemosi, pedunculis spitham. Petal. reflexa, alba, lineol. subrubris, odore *Polyantches* *suberosa*.

4. *Uvaria*. A. acaul. fol. ensiform. canaliculat. carinatis. Syst. veg. ed. 14.
Aloe &c. Knorr. del. I. tab. A. 13. Comm. hort. 2. tab. 15. Seb. thes. I. tab. 19. f. 3.
Ad cap. b. Spei 4.
Scap. erectus, longus, 4-5-ped. Thyrus fl. confertis, imbricat. pendulis, rubentibus, dein flavecentibus.
-
- bifolia*. A. fol. oblongo, canaliculato, scapum, foliolumq. involvente: fl. pendulis. *Buchoz.* Hist. gen. vol. 2. tab. I.
b. Buxb. cent. 3. tab. 19. ubi foliol. unicum: fl. pauciores.
518. *YUCCA*. Cor. campanulato-patens. Styl. nullus. Caps. 3-lecul. *Fol. carnosa, succulenta.*
1. *gloriosa*. Y. fol. integerrimis. Syst. veg. ed. 14. Barr. rar. tab. 1194.
In Canada, Peru H.
Rad. crassa, tuberosa, dein in multa capita pro-tuberans, intus candida, extus rubra. Fol. plurima, radical. in orbem expansa, cubital. dura, carinata, e cinereo-virid. in acutum, & fuscum mucronem desinentia. Scap. 3-ped. superne ramosus. Fl. plurimi, ampli, nutantes, albi, cum venis dilute rubent.
2. *aloifolia*. Y. fol. crenulat. strictis. Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 323. f. 416. Pluk. alm. tab. 256. f. 4.
Aloe &c. Comm. præl. tab. 14.
In Jamaica, Vera cruce 4.
Planta 7-ped. & ultra, ad 3. pedum longitudinem nuda. Fol. multa, undiq. ex scapo orta, infer. pendentia; reliqua horizontaliter & oblique surgentia; summa erecta: dodrant-fesquipedal. latitudine sesqui-unc. Fol. a scapo medio radiatim nata, recta, rigida, concava, in medio latiora, mucronata, nigro--purpur. margine crenis rigidis. Fl. nutantes, in thyrsus dispositi, antequam explicitur ad basin ex herbac-alblicant. superne obscure purpurascent. dein candidi.
3. *draconis*. Y. fol. crenatis, nutantibus. Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 324. f. 417. Comm. præl. tab. 16.
In America H.

Planta 8-ped. Fol. priore longiora, angustiora, teneriora, minus concava, lucida, sature virid. 2-ped. & ultra, 2-unc. lata. Fl. ut in priore, sed lactei, odore subgrato.

4. filamentosa. Y. fol. serrato-filiferis. *Syst. veg. ed. 14. Trew. ehret. tab. 37.*

In Virginia H.

Fol. per ambitum apprime filis albis, lanceol. acumin. Cor. alba.

519. ALOE. Cor. erecta, ore patulo, fundo nectarifero. Filam. receptaculo inserta. Fol. carnosa, succulenta.

1. persoliata. A. fl. corymbosis, cernuis, pedunculat. subcylindr.

Caul. saepe radicans, licet erectus. Fol. caulina dentata, amplexicaul. vaginant.

a. A. afric. caulesc. fol. magis glaucis, caulem amplectant. & in mucronem obtusiorem desinent. *Comm. præl. tab. 17. rar. tab. 44.*

Planta sesquipedal.

b. A. afric. caulesc. fol. minus glaucis, dorsi parte suprema spinosa. *Comm. præl. tab. 18.*

Caul. 3-ped. primum viridis, dein fuscus. Fol. pedal. & ultia, amplexicaul. latiora, margine, & dorso spinosa.

c. A. afric. caulescens, fol. glaucis, latioribus, & undique spinosis. *Comm. præl. tab. 19.*

Caul. sesquiped. fuscus. Fol. pedal. latitudine 4-unc.

d. A. afric. caulescens: fol. breviss. glaucis; fol. summitate interna, & externa nonnihil spinosa. *Comm. præl. tab. 22. rar. tab. 45.*

Caul. pedal. Fol. plurima, parva, vix 3-uncial., latitudin. uncial. Spinæ albicantes.

e. A. caulesc. fol. glaucis: dorso integro, spinoso. *Comm. præl. tab. 20. hort. 2. tab. 13.*

Caul. pedal. & ultra. Fol. pedal. latitud. 2-3-unc.

f. A. afric. caulescens; fol. glaucis, brevioribus: fol. parte interna, & externa nonnihil spinosa. *Comm. præl. tab. 21.*

Caul. vix ped. Fol. 5. unc. longa, 2-lata, maculis rotundis, albicant. Spinæ albicantes.

glaucia. A. afric. caulescens, fol. glaucis, caulem amplectentibus. *Comm. hort. 2. tab. 14.*

- Caul. pedal. Fol. dentata, mucrone 2-fid. adul-
ta reclinata, subtus pallescentia, nervis viri-
dibus.
- g. A. afric. caulescens; fol. spinosis, maculis ab
utraq. parte albicant. notatis. *Comm. hort. 2.*
tab. 5.
- Caul. ped. folior. stigmata diu servans, albo-pur-
purasc. Fol. 1-sesquiped. latitudine 2-3-unc.
mucrone acutiss. & spinoso.
- disticha.* A. afric. caulescens, perfoliata, glauca, & non
spinosa. *Comm. præl. tab. 23.*
- Planta tota glauca, & inermis. Caul. ped. Fol.
6-unc. longa, unciam lata, decussata.
- h. A. afric. fol. glaucis; margine, & dorsi parte
superiore spinosis; fl. rubro. *Comm. præl. tab.*
24. hort. 2. tab. 12.
- Fol. plurima, in orbem posita, pedal. sensim an-
gustiora. Spinæ subflavæ. Scap. sequiped. vi-
rid. foliol. aliquot non succulentis. Fl. plu-
rimi.
- i. A. afric. maculata, spinosa, ma. *Dill. elth.*
tab. 14. f. 15.
- Caul. sub 2-ped. Fol. fere palmum lata, pedem
longa, concava, utrimq. maculis albis. Spinæ
in ambitu rufescens. vel albicantes. Fl. pen-
duli, extus rubentes, intus e luteo pallescen-
tes.
- k. A. afric. maculata, spinosa, min. *Dill. elth.*
tab. 14. f. 16.
- Caul. palm-dodrant. Fol. priore minus crassa,
longius mucronata, magis concava: maculæ
minus albæ. Fl. breviores, profundius divisi.
Cor. pallide rubra.
- l. A. afric. mitriform. spinosa. *Dill. elth. tab.*
17. f. 19.
- mitriformis:* Caul. pedal. & ultra, e cinereo-subfuscus, dein
cubital. Fol crassa, cruciata, dodrant. latitud.
palmar. Aculei plerumq. albicant. in apice foli-
lor. fusco-purpurasc. Fol. concava, hyeme vi-
tidi-purpurasc. Fl. rubri.
- Aloe.
- m. A. succotrina, angustifol. spinosa, fl. purpur.
Comm. hort. 1. tab. 48. Pluk. alm. tab. 240. f.
4. Black. 333.
- Rad. tuberosa. Fol. sesquipedal. angusta. Spinæ.

- exiguæ, pallidæ. Caul. sesquiped. & ultra,
superne foliosus, fuscus. Fl. nutantes, dilute
purpur.
- humilis.* Aloe Afric. humilis; spinis inerm. & verrucosis
obsita. *Comm. præl. tab. 26. rar. tab. 45.*
Fol. multa, 4-uncial. utrimq. spinis inermi. &
verrucosis obducta, mucrone inflexo. Flos nu-
tans, incarnatus, ore viresc.
- n. vera.* Aloe fol. spinosis, confertis, dentat. vaginanti-
bus, planis, maculatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Kadanaku. *Hort. mal. 11. tab. 3.*
In Italæ, Siciliæ, Melitæ tædis, muris ♂.
Caul. sæpe radicans, licet erectus. Fol. 2-cubi-
tal. carinata, repanda, acumine longo, rigi-
do. Fl. flavi.
- In Indiis, Africa* 24.
- 2. variegata.* A. fl. racemosis, cernuis, subcylindric. ore pa-
tulo, æquali. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. I.*
tab. A. 7. Comm. præl. tab. 28. rar. tab. 27.
Tilli Pif. tab. 7.
In Æthiopix argillosis 24.
Fol. ex albo, & viridi variegata. Fl. ovat-ob-
long. subnutant. Cor. incarnata, lacin. 3. in-
terioribus alternis, patulis. Stam. declinata.
Stigm. simpl.
- 3. linguæfor-* A. fl. racemosis, erectis: cor. cylindric. fol.
mis. linguæform. distichis, patulis. *Syst. veg. ed.*
14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei ♂.
Arbor orgyalis.
- 4. disticha.* A. fl. pedunculat. pendulis, ovato-cylindr. cur-
vis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. I. tab. A.*
12, & A. 14.
Scapus declinatus. Fol. disticha.
b. A. afric. fl. rubro, fol. triangul. & verrucis
albicantibus ab utraq. parte notato. *Comm.*
hort. 2. tab. 9.
Fol. plurima, semiped. 2-unc. lata. Fl. pendu-
li, rubri.
- carinata.* A. sessilis, fol. carinat. verrucosis, apice trique-
tris, carnosis. *Mill. ic. tab. 19. Dill. elth.*
tab. 18. f. 20.
Fol. palmar-dodrant. cruciata, concava, apice
plano, ad basin, & in medio virent. non glau-
ca, supra, & margine fusco-virent. verruc.

obscure albicantibus. Scap. pedal. & ultra, ruber. Fl. 1-lateral. corallini.

c. A. afric. fol. planis, coniugatis, carinatis, verrucosis: caul. & fl. coralhi col. *Mart. cent. II. tab. 10.*

Fol. maculis albis, obscuris, in spinam desinentia. Scap. 2-pedal. superne rubesc. Fl. ex rubro, virid. & albo variegati.

d. A. afric. arboresc. montana, non spinosa, fol. longiss. plicatili, fl. rubro. *Comm. hort. 2. tab. 3.*

Caul. pedal. fuscus. Fol. sesquiped. longa, unc. lata, rore albo obducta, margine subrubente. Fl. rubri.

In Africæ rupibus 3.

5. *spiralis*. A. fl. spicat. ovatis, muricatis, crenatis, segment. interioribus conniventibus. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. I. tab. A. 6. Dill. elth. tab. 13. f. 14. Comm. præl. tab. 32.*

In Africæ campestribus 3.

Planta palm-pedal. tota foliis tecta, undique prodeuntibus, & in rotundam caulis foliati figuram dispositis. Fol. ovat-subul. mucronato-spinosa, apice tricarin. sexfariam imbric. col. viridi, vel obscure purpur. Scap. pedal-sesquipedal. simpl. vel ramosi. Fl. longe spicati, primum ex ochreo col. purpurasc. summo apice subcroceo; dein candicantes, parvi.

6. *retusa*. A. fl. spicatis, triquetris, bilabiat. lab. inferior. revoluto. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. I. tab. A. 10. Comm. hort. 2. tab. 6. Till. pis. tab. 5.*

In Africæ argillosis 4.

Fol. breviss. & crassiss. ob marginem reflexum triangularia evadunt, supra lineis albicant. praedita, mucrone subrubente. Scap. spitham. subruber. Fl. simil. A. *pumilæ*, virides.

7. *viscosa*. A. fl. spicatis, infundibulifor. bilabiat. lacin. 5. revolut. summa erecta. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. I. tab. A. 10. Comm. præl. tab. 31. Till. pis. tab. 5. Dill. elth. tab. 13. f. 13.*

In Æthiopix campestribus 4.

Fol. tribus seriebus ita disponuntur, ut triquetra figura adpareat; modice declinantur, & tenuiora facta in mucronem rigidum desinunt: cæterum brevia, carinata, rigida, col. obscu-

re virid. apice subpurpur. Scap. pedal. fusco-purpuras. subreclinat. Fl. rari, parvi, obsolete purpur.

8. pumila. A. fl. spicat. bilabiatis; lab. super. erectiore; inferior. recurvato. *Syst. veg. ed. 14.*

margaritifera. A. fol. ovato-subulat. tuberculis cartilagineis undiq. adspersis. *Comm. hort. 2. tab. 10. Bradl. succ. 3. tab. 21.*

Fol. plura, in orbem posita, superne glabra, ad extremitatem parum exscavata; subtus verrucis alblicant. per ætatem virid. mucrone acuto, & rubro. Scap. 2-ped. simpl. vel geminus, ramosus, virid. Fl. virid.

b. A. afric. margaritifera, minor. *Comm. hort. 2. tab. 11. Dill. elth. tab. 16. f. 17.*

Fol. duplo min. & tenuiora priore.

c. A. afric. margaritifera minima. *Dill. elth. tab. 16. f. 18.*

Differet a priore folior. & margaritarum parvitate.

d. arachnoides. A. sessil. fol. brevioribus, planis, carnosis, apice triquetris, margin. inerme spinosis. *Comm. præl. tab. 27. Knorr. del. 1. tab. A. 11.*

Fol. multa, in orbem posita, 2. unc. cum dimidio longa, in medio lata, mucronata, virid, margine, & in medio dorsi spinis albis, & inermibus. Fl. subvirid. linea rubra longitudinali.

i. A. fol. ovat-lanceol. carnosis, apice triquetris, angulis inerme dentatis. *Bœrh. Lugd. 2. tab. 131. Bradl. succ. 3. tab. 30.*

In Æthiopicæ campestribus 24.

Planta minima, atro-virid. Spinæ herbaceæ.

9. spicata. A. fl. spicatis, horizontal. campanulat. fol. caulinis planis, amplexicaul. dentatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Simil. A. perfoliatæ; at spica, & fig. florum valde diversa.

Ex huius succo optima Gummi resina Aloe paramatur: ex reliquis speciebus vilior.

10. dichotoma. A. ramosa, ramis dichotom. fol. ensiform. serratis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

- officinalis*. A. fl. rubris, racemosis, tereti-triquetris. *Forsk.*
Æg.
- In Arabia* 24.
- Scap. 2-cubit. teres, glaber, cinereus, quandoq.
 2-fid. Corymb. terminal. pedal. bractea mem-
 branac, deflexa sub singulo fl. Fl. breviter pe-
 duncul. cernui, lacin. reflexis; 3. interioribus
 infra apicem conniventibus, & paulo reliquis
 longioribus. Fol. extrorsum attenuata, supra
 cava, subtus convexa, margine aculeis oppo-
 sitis, erectis, compressis, brevibus; basi plana;
 vaginantia, col. viridi, nebulis albis, subtus
 rufescente.
- Si frangantur folia, produnt pulpam viridem, vi-*
scido-carnosam, factore A. succotrinæ Offic. un-
de hanc plantum existimo matrem esse succi istius,
A. vera Lin. fol. gaudet planis.
- pendens*, A. *Forsk.* *Æg.*
- In Arabia* 24.
- Fol. subdisticha, digito angustiora, sesquispitham,
 vel pedal. remota, vaginant. Fl. racemosi,
 flavi. Crescendo pendet e rupibus; peduncul. tam-
 men surgentibus.
- inermis*. A. fol. inermibus, margine subcartilagin. *Forsk.*
Æg.
- In Arabia* 24.
- Fol. sesquipollic. lata, carnosa, curva, subtus
 convexa, virid. supra concava, ferruginesc.
 albidio-maculata, lineæ 2. longitudinaliter ele-
 vatae in pagina super. folior. Margo fol. hya-
 linus, crassus, cartilagin.
- racillans*, A. fol. dentato-spinosis. *Forsk.* *Æg.*
- In Arabia* 24.
- Fol. planiusc. obscure virid. margine rubro. Fl.
 subsessil. cernui, flavo-rubent. Crescendo cau-
 dicem acquirit brachii crassitie, ulnæ longitud.
 tantæ vero debilitatis, ut leviss. vi decumbat,
 ni substentetur. *Succus recens flavicans; siccus*
rubor sanguinis instar. His notis differt ab A.
vera.
- caroliniana*, A. *Hill. hort. Kevens tab.* 13.
In Carolina 24.
- Caul. 3-ped. Fol. linear. Fl. viridi-albicant.
520. AGAVE. Cor. erecta, supera, 6-fida, epicarpia. Fila-

menta cor. (plerumq.) longiora, erecta. Fol. carnosa, succulenta.

1. americana. A. fol. dentato-spinosis: scapo ramoso. Syst. veg. ed. 14.

In Amer. nunc in Lusitania, Italia, Helvetia ad rupes 24.

Fol. ampliss. succulenta, hinc convexa, inde plana, mucrone duriss. firmis per oram spinis obsita. Scap. erectus, etiam 30-ped. simpl. spica ramosa, fl. innumeris. Petal. sublutea.

2. vivipara. A. fol. dentatis, staminibus cor. æquantibus. Syst. veg. ed. 14.

A. amer. Jobolifera. Herm. Ludg. tab. 17. 57. Comm. præl. tab. 15. Rumph. amb. 5. tab. 94.

In Americu.

Rad. geniculata. Fol. radical. sese mutuo amplectent. sesqui-2-pedal. latitud. 6-8. digitos, crassa, in medio crassiora, spina terminali acuta. Scapus foliol. parvis, amplexicaul. præditus. Pedunc. axill. ramosi. Fl. parvi, luteo-herbacei.

3. virginica. A. fol. dentato-spinosis: scapo simpliciss. Syst. veg. ed. 14.

In Virginia 24.

Fol. lanceol. spina cartilagin. terminata. Fl. alterni, sessil. virid. odori.

4. foetida. A. fol. integerrimis. Syst. veg. ed. 14. Comm. hort. 2. tab. 18. Pluk. alm. tab. 258. f. 2?

In Curaçao 1.

Radix crassa, & tuberosa. Caudex palmar. fusca. Fol. radical. 5-pedal. latitudine 4-unc. non admodum crassa, subtus eminent. virid. basi crassiore, & angustiore, ventre latiore, & tenuiore, mucrone inermi; adulta reflectuntur. Perperam definita fuit foetida, cum etiam A. amer. sit foetida.

cubensis.

A. cor. 6-petal. fol. cilato-spinosis. Jacq. amer. tab. 75. f. 28. ed. piæta tab. 260. f. 25.

In Cuba 24.

Planta elegantiſſ. Fol. 3-4-pollic. ensiform. acumin. erecta, crassa, ciliato-spinosa, pallide virid. Scap. erectus, 15-ped. paniculat. Fl. numerosi, penduli. Cor. extus sordide albens, intus

intus sordide virens, odore gratiore Tagetis.
Planta vivipara. Fl. Saponis loco usitantur.

521. AL- Cor. 6-petal. sub 2-lab. petal. 2. inferioribus basi
 STRÆMERIA. tubulosis. Stam. declinata.

1. *pelegrina*. A. caul. erecto: cor. campanulat. rectis: fol. li-
 neari-lanceol. sessil. *Syst. veg. ed. 14. Am. acad.*
 6. tab. 247. *Jacq. hort. tab. 50.*

Hemerocallis &c. Fewill. peruv. 2. tab. 5.
In Peru, & Lima 24.

Caul. simplex, erectus, herbaceus, spitham. Fol.
 caulina plurima, sparsa, resupinata, sessil. li-
 neari-lanceol. obtusiusc. integerr. supra nervosa,
 subitus laevia: terminalia 4-5. vericillatim di-
 gesta. Pedunc. terminal. 4-7. distantes, saepe
 1--phyll. 1--fl. Petal. oblonga, basi angusta,
 albida, disco rubro, maculifq. purpur.

2. *pulchella*. A. caul. erecto: cor. reflexo-patentibus: omnibus
 acutis: fol. sessil. pedicellis involucro brevio-
 ribus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Amer. merid.

Habitu, & structura simil. priori, sed fol. angu-
 stiora, & caule terminato involuc. irregul. ex
 fol. maioribus exacte petiolat. resupinatis. Pe-
 dunc. nudi, simpl. 1-fl. Fl. 4-6. subcernui,
 magnitud. prioris. Petal. a basi patent. recur-
 vata, acuta, alterna min. albida, apice rubra,
 basi rubro-punctata.

3. *ligu*. A. caul. erecto: fol. spathulato--oblong. pedun-
 culis umbell. involucro longioribus: cor. 2-lab.
Syst. veg. ed. 14.

Hemerocallis &c. Few. per. tab. 4.

In Lima.

Spectabilis fl. magnis. Caul. steriles vestiti fol.
 adpressis, subularis, terminati fol. spathul. ob-
 long. resupinat. in rosam fere dispositis. Caul.
 florifer vestitus fol. adpressis, subulat. termi-
 natus involuc. breviore. Petal. 3. super. ma:
 alba, basi punctata, apice rubro-maculata: 3.
 infer. breviora, præcipue infima, fere subula-
 ta, rubra. Anth. didimæ, luteæ. Pistil. rubrum.

4. *salsilla*. A. caul. volub. fol. petiolat. lanceol. acuminat.
 umbella ramosa; peduncul. involucro longiori-
 bus, bracteatis, laxis. *Syst. veg. ed. 14. Few.*
per. tab. 6.

In Lima.

Fol. alterna resupinata, nervosa. Involuc. polyphyll. subulat. reflexum. Pedunc. pauciores, sub 2-fl. Fol. florale ad ramificationes peduncul. Petal. erecto-patent. obtusiusc. exter. rubicunda, inter. virecent.

5. *multiflora*. A. caul. volub. fol. petiolat. lanceol. acuminat. umbella unipl. pedunc. bracteis brevioribus: petalis alternis, truncatis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In Amer. merid.

A reliquis diffinda. Habitus, & structura herbæ est *A. multiflora*; at petoli margin'e rugosi, nec umbella peduncul. involuc. multifl. constat foliol. latioribus: pedunculi involuc. & fl. breviores, simpl. nudi. Fl. magnitud. *A. multiflora*. Petal. 3. exter. breviora, angustiora, integra; 3. inter. truncata, seu emarginata cum acumin'e.

522. GETHYLLIS. Cal. o. Cor. 6-part. Bacca clavata, radicalis, 1-locul.

1. *villosa*. G. fol. filiform. spiralibus, villosis, limbi lacin. ovat-oblong. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Papiria villosa. Thumb. Act. Lund. P. I. p. III. cum fig.

Ad cap. b. Spei.

2. *ciliaris*. G. fol. linear. spiralibus, ciliatis; limbi lacin. ovat-oblong. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Papiria ciliaris. Thumb. Act. Lund. P. I. p. III. cum fig.

Ad cap. b. Spei.

3. *spiralis*. G. fol. linear. spiralibus, glabris; limbi lacin. oblong. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Papiria spiralis. Thumb. Act. Lund. P. I. p. III. cum fig.

Ad cap. b. Spei.

Rad. bulbosa, nigra. Fol. plura, ensiformi-linear. integrerr. valde nervosa. Spatha a'ba, ad rad. intra vaginam comm. folior. Cor. tubus fol. longior, limbo albo. Siam. alba. Anth. flavetc. Fruct. intra spatham reconditus, ventricosus.

4. *lanceolata*. G. fol. lanceol. planis, limbi lacin. lanceol. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Papiria lanceol. Thumb. Act. Lund. P. I. p. II2. *Ad cap. b. Spei.*

Obs. Omnes sp. habent faciem Colchici sed cor. 1-pet. & bacca facile dignoscuntur. Fl. fructum proferunt absq. fol. Bacca odora, & saporis iucundi.

523. HEME-ROCALLIS. Cor. campanulata, tubo cylindrico. Stam. declinata.

1. *flava*. H. fol. linearis-subul. carinatis: cor. flavis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 139. Knorr. del. 1. tab. L. 5.*

Lilio-Asphodelus &c. *Clus. hist. 1. p. 137.*

In Helvetia, Sibiria &c. campis 24.

Scap. 2--cubit. subflexuof. ramosus. Fol. scapo breviora, ensiforme-linear. acuta, integerr. glabra. Fl. graviter olentes.

2. *fulva*. H. fol. linearis-subul. carinatis: cor. fulvis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lilio-Asphodelus puniceus. *Clus. hist. 1. p. 137. Phalangium &c. Clus. app. ult. Hort. eyst. vern. ord. 9. tab. 6. f. 1.*

In China, Helvetia 24.

Differit a priore habitu ma: & cor. colore.

3. *japonica*, H. fol. petiolat. ovat-lanceol. septem-nerviis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

Simagi-gibbosii. *Kempf. am. exot. Fasc. V. p. 863. In Japonia.*

Fol. radical. erecta, apice patulo, integerr. supra fature virid. digitalia, quædam palinam fere, alia pollic. lata. Petioli foliis longiores, carnosii, canalicul. Scap. erect. fol. longior, teres, articulat. glaber. Fl. terminal. racemosi, cernui. Cor. alba.

4. *cordata*, H. fol. cordat. venosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jav.*

In Japonia.

Caul. pedal. & ultra, erectus, teres, glaber. Fel. spitham. palmum lata, alterna., petiol. acuta, glabra, erecta, supra virid. subtus pallida. Petioli alati. Fl. terminal. erecti, alterni.

524. ACORUS. Clava ex sinu fol. oriunda, digitifor. fl. sessilibus undique testa. Cal. 6-phyll. foliol. obtusis, superne crassioribus, persistent. Styl. breviss. Caps. 3-angul. 3-locul. 3-sper.

1. *Calamus*. A. *Syst. veg. ed. 14. Ludw. et. tab. 34.*

a. A. seu calamus aromat. offic. *Black. tab. 466.*

Thypha &c. Moris. hist. 3. s. 8. tab. 13. f. 4,

b. A. verus.

Calamus aromat. Garz. 288. c. fig.

Acorum. Rumph. amb. 5. tab. 72. f. 1.

Wæmbu. Hort. mal. II. tab. 60.

a. In Europæ: b. in Indiæ fossis paludosis 24.

Radix horizontal. articulata. Fol. radical. vaginant.
entiform. integerr. odorata. Scap. apice foliosus. Folii latus sulcatum profert spadiceum nudum, digitifor. cylindricum, substantem fl. in spica attenuata. Var. clavis ternis-quatern.

525. LINDERA. Cor. 6-petal. Caps.

1. *umbellata*. L. Syst. veg. ed. 14. Thunb. Jap. tab. 21.

In Japonia h.

Caul. fruticos. laxus. Rami, & ramuli alterni, flexuosi, patentiss. gl. bri. Fol. in apice ramulor. adgregata, pollicar. petiol. oblong. acuta, integerr. supra virid. glabra, subtus pallida, villosa. Petiol. vix unc. supra villosi. Fl. terminal. umbellati. Umbell. simpl. multifl. Petal. flavescent.

526. ORON- Spadix cylindric. tectus flosculis. Cor. 6-petal.
TIUM. nudæ. Styl. o. Follic. 1--sperm.

2. *aquaticum*. O. fol. lanceol-ovat. Syst. veg. ed. 14. Am. acad.
3. tab. I. f. 3.

Arum &c. Catesb. car. I. tab. 82.

In Virginiam, Canadæ paludibus 24.

Radix alte descendens. Scap. longus, teres, glaber, pallidus, cum punctis fuscis. Fol. petiol. acumin. integerr. glabra. Pedunc. sub spadice, albus. Fl. dense spicati, lutei.

2. *japonicum*. O. fol. ensiform. venosis. Syst. veg. ed. 14. Thunb.
Jap.

Omotto. Kæmph. am. exot. Fasc. V. p. 785.

In Japonia.

Differ a priore fol. multo longioribus, inferne attenuatis; venis pl. elevatis; & scapo breviore.
Fol. radicale, solitar. inferne attenuatum, convolutum, integerr. glabrum, 2-ped. duos pollic. latum. Scap. erect. digital-palm. teres, glaber. Fl. terminal. spicati, distincti, spica pollic. oblong.

527. CALA- Cal. 6--phyll. Cor. o. Bacca exarida, 1-sperm.
MUS. retrorsum imbricata.

1. *Rotung*. C. Syst. veg. ed. 14.

Arundo nucifera &c. Pluk. alm. tab. 106. f. 1. 2.

Palmiuncus. *Rumph. amb. 5. tab. 51. &c.*
Tsiere Tliurel. Hort. mal. 12. tab. 64. 65.

In indiæ sylvis iuxta fluenta Ḥ.

Habitus Arundinis. Calamus substantia spongiosa repletus. Ex singulis nodis usque ad apicem emitit farmenta, folior. quasi loco, funum modo intorta, & tenacia; hisque fructus globular. saepe uniti nascuntur nucleo duro, eduli, sapore fragarum; qui fructus rotundi, parvæ pilæ magnitudine, tecti putamine col. spadic. striis cancellatis ornati.

328. JUNCUS. Cal. 6-phyll. ex foliol. colorat. siccis, glumosis. Cor. o. Caps. 1-locul. 3-valv. polysperm. *Herba Graminoidea.*

* *Culmis nudis.*

1. *acutus.* J. culm. subnudo, tereti, mucronato: panicul. terminali; involuc. 2-phyll. spinoso. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 10. f. 15. b. f. 14.*

In Europæ maritimis paludosis 24.

Fol. teretia, acumin. Panicul. est potius lateral. cum involucri folium longius sit culmi continuatio.

2. *conglomerata.* J. culm. nudo, stricto: capitulo laterali. *Syst. veg. ed. 14. Leers. herb. tab. 13. f. 1. Matth. ic. 1036. Cam. epit. 780.*

In Europæ borealis uliginosis 24.

Cespites multi. Culmi cubital. latiores, subtiliter striati. Capitul. breve, densum, sessil. globosum.

3. *effusus.* J. culm. nudo, stricto: panicula laterali, (sparsa). *Syst. veg. ed. 14. Leers. herb. tab. 13. f. 2.*

In Europæ uliginosis, & pascuis humidis 24.

Simil. priori, sed fl. paniculati, & non capitati. Culm. 2-3-ped. apice subulati. Fructus triqueter.

4. *inflexus.* J. culm. nudo; apice membranac. incurvo: panicula laterali (sparsa, longe pedicellata). *Syst. veg. ed. 14. Leers. herb. tab. 3. f. 3. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 10. f. 25. Barr. ic. 204.*

In pascuis humidis &c. 24.

Culm. pl. profunde sulcati, ad terram vaginis nigris obsiti, apicibus attenuatis, post efflorescentiam inflexi.

5. *filiformis*. J. culm. nudo, filifor. nutante: panicula lateralē.
Syst. veg. ed. 14. *Leers. herb.* tab. 13. f. 4. *Pluk.*
tab. 40. f. 8. *Scheuz. gram.* tab. 7. f. 11.
In Europæ uliginoso-paludosis alpibus 4.
 Culm. pedal. recti, teretes. Panicula in medio
 culni, etiam infra medium, rara, paucifl. al-
 bicans, vel spadicea.
6. *trifidus*. J. culm. nudo: fol. floribusque (plerumque) tri-
 bus, terminalibus. *Syst. veg.* ed. 14. *Fl. Dan.*
tab. 107. *Gesn. Schmid. fasc. 1. tab. 4.* f. 16.
J. monanthos. *Jacq. Obs.* tab. 4. f. 1.
J. acumine &c. *Bauh. prodr.* tab. 22.
In alpibus Helveticis, Lapponicis, Pirenæis &c. 4.
 Culm. dodrant. tenuis, mollis, supra medium
 foliosus, folio super. exala florifero. Fol. con-
 vexa. Fl. plerumq. 3. etiam 1--2. spadicei,
 cum 2 stipulis.
7. *squarrescus*. J. culmo nudo: fol. setaceis: capitul. glomeratis,
 aphyllis. *Syst. veg.* ed. 14. *Fl. Dan.* tab. 430.
Gramen iunceum &c. *Morif. hist.* 3. f. 8. tab. 9.
 f. 13. *Loef. pruss.* tab. 29. *Lob. ic.* p. 18.
In Europæ borealis cespitosis, montanis 4.
Planta rigida. Culm. dodrant. Fol. semiped. pa-
 tentia, hinc convexa, inde acute carinata.
 Panicula spicata, pedunculis inæqual. Glumæ
 ovat-lanceol. duræ, albæ. Fructus spadicei,
 nitidi.
8. *pundorianus*. J. culm. nudo, tereti: fol. tereti, articulato,
 mucronato: panicul. glomerata. *Syst. veg.* ed.
 14. *Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
 Culm. 2-ped. & ultra, lœvis. Fol. nulla, sed
 membranæ 2. rudimenta folior. Fol. caulinum
 unicum, culmo simile, sed paulo longius,
 striatum, pungens. Panicula terminal. *Adfinis*
J. articulato; sed potissimum omnia robustiora.
- ** *Culmis foliosis.*
9. *nodosus*. J. fol. nodoso-articulat. petal. mucronat. *Syst. veg.*
ed. 14.
Gramen iunceum &c. *Morif. hist.* 3. f. 8. tab. 9.
 f. 25. *Pluk. alm.* tab. 92. f. 9?
In Amer. septentrion. 4.
 Similis *J. articulato*, sed fl. magis capitati, capitul.

maioribus, rarioribus, & paniculæ rami simplic. præcipue differt petalis subulatis.

10. *articulatus*. J. fol. nodosis, articulat. petal. obtusis. Syst. veg. ed. 14. Leers. herb. tab. 13. f. 6.

Germen iunceum &c. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 9. f. 1.

In Europæ aquofis 24.

Culm. 2-cubit. & ultra, teres. Fol. linear. canalicul. striata, isthmis pl. interne distincta, potissimum sicca. Panicula terminal. laxa, rigida. Spicæ ultimæ 3-fl.

11. *bulbosus*. J. fol. linear. canaliculat. capsul. obtusis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 431. Leers. herb. tab. 13. f. 7. Gesn. Schmied. tab. 5. f. 13.

J. repens &c. Barr. ic. 114.

J. Sorghi &c. Barr. ic. 747. n. 11. Gmel. Sib. 1. tab. 17. f. 2.

Germen iunceum &c. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 9. f. 11.

In Europæ pascuis sterilibus, montanis 4.

Convenit facie cum J. bufonio, sed humilior, 3-unc. & ultra, dichotomus, ad terram quasi bulbosus, ramosus. Rad. repens, densa. Culm. filiformi. subcompressi. Fol. florale longitudine corymbi. Corymbus comm. & partial. inæqual. Caps. fuscae, nitidæ.

12. *bufonius*. J. culm. dichotomo: fol. angulat. fl. sæpe solitar. sessil. (remotis). Syst. veg. ed. 14. Leers. herb. tab. 13. f. 8.

Germen &c. Barr. ic. 263.

Holosteum. Lob. ic. 18-Pet. gaz. tab. 7. huius infans, paucis lecta.

In Europæ inundatis ①.

Culm. cespitosi, unc-semiped. divaricati. Fol. hinc convexa, inde carinata. Fol. unum setac. in culmo; alterum sub quolibet ramo. Fruct. triquetro-conicus. Variat fl. magna parte in foliol. setaceo conversis, qui rotunda capitula efficiunt.

13. *strygius*. J. fol. setaceis, depresso-scul. pedunculis geminis terminal. glumis solitar. subbifl. Syst. veg. ed. 14.

In Sveciæ paludibus 4.

Culm. spitham. simplic. Fol. altitudine culmi, erecta, 3: a. ad radicem; b. in medio culmi, c. culmum instar spathæ terminans. Petal. exter.

angustiora, acutiora, concava, extus purpureo-rusc. interior, pallida. Anth. flavæ.

- 14. Jacquini.** J. fol. subulato: capitulo sub 4-fl. terminali. Syst. veg. ed. 14. Jacq. vind. tab. 4. f. 2. Austr. 3. tab. 221. Scheuz. it. 1. tab. 5. f. 2.

Juncoides &c. cheuz. gr. tab. 7. f. 9.

In Austræ, & Helvetiæ alpibus 24.

Convenit habitu, & situ fl. cum J. trifido, & statu dodrant. sed in multis differt. Crassior, firmior.

Caul. fol. unico, saepius elongato. Fl. 4-7. fuco-purpur. sextuplo ma. quam in J. biglumi, a quo diversus.

- 15. biglumis.** J. fol. subulato, gluma 2-fl. terminali. Syst. veg. ed. 14. Amæn. ac. 2. tab. 3. f. 3. Fl. Dan. tab. 120.

In alpibus Lapponicis 24.

Facies Schœni ferruginei.

- 16. triglumis.** J. fol. (tereti-fistulosis): gluma 3-fl. terminali. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 132. Rudb. elys. 1. f. 8. Fl. Lapp. tab. 10. f. 5.

In alpibus Lapponic. Tauro Rastadiensi &c. 24.

Habitus Scirpi. Culm. tridental. molles, vaginis fascis. Fol. iuncea. Capitul. inæqualiter altum.

- 17. pilosus.** J. fol. planis, pilosis: corymb. ramoso. Syst. veg. ed. 14. Leers. herb. tab. 3. f. 10.

Gramen &c. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 9. f. 1. Lob. ic. 16.

Culm. pedal. & paulo ultra. Fol. in culmo 4. Corymbus subiecto fol. longior. Pedunc. 1-2-

3-fl. suffulti vagina truncata. Fl. rufescentes. b. J. fil. granincis &c. Fl. Dan. tab. 441.

Culm. sesquiped. & ultra. Fol. pilosa latiora sunt. Panicula speciosa, ramosa foliol. excipitur. Fl. ex bruno-nigricant. ad ramulor. apicem, & dichotomiam pariter fasciculatim congesti. Dantur etiam aliæ varietates.

In Europæ sylvis; b. in alpibus 24.

Differ a sequenti. culmo ramoso, procumb. fol. latioribus: pedunc. ex apice culmi ex uno puncto pl. fol. pl. floribus: fl. minoribus &c.

- 18. niveus.** J. fol. planis, subpilosus: corymbis fol. brevioribus: fl. fasciculat. Syst. veg. ed. 14. Leers. herb. tab. 13. f. 6?

Juncoides &c. Scheuz. gram. tab. 7. f. 7.

Gramen hirsutum &c. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 9. f. 39.

In alpibus Helveticis, Rhæticis &c. 24.

Culm. 3-ped. 6-phyll. Panicula convexa, in arcum circuli facta, 2-3-fl. super hanc 2. fol. longa, & angusta. Petal. alba.

19. *campestris*. J. fol. planis, subpilosus: spicis sessil. pedunculatisq. Syst. veg. ed. 14. Leers. herb. tab. 13. f. 5.

Gramen exile &c. Lob. ic. 15.

b. J. fol. planis &c. Fl. Lapp. tab. 10. f. 2.

In Europæ pascuis siccioribus 24.

Culmi pedal. parum foliosi, aut ramosi. Fol. glabra, vagina pilosa in planta iuniore. Spica terminal. brevis, spadicea. Spicæ usque 6. inæqualiter pedunculat. ovatæ. Dantur multæ variet.

20. *spicatus*. J. fol. planis: spica racemosa, nutante. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 270. Fl. Lapp. tab. 10. f. 4.

In Lapponiae &c. alpibus 24.

Culm. vix sesqui-palm. Spica longior.

21. *serratus*. J. fol. ensiform. planis, serratis, subtus canis: paniculæ vaginis subulat. perfoliat. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Adfinis J. piloso; sed J. acuto longe maior. Culm. 4-6-ped. crassitie digitæ min. teretes, foliosi. Fol. graminea, vix longitudine culmi, alterna, subnervosa, duriora, lævia. Panicul. conglomerata, minusq. patula; fl. sparse conglomeratis.

22. *grandiflorus*. J. fol. tereti: culm. 1-fl. flore erecto, singulari, nudo. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In terra del Fuego 24.

Gramen vix pedal. glaberr. Culm. basi vaginis tectus. Fol. unicum, rectum, culmo longius, subulat. Flos terminal. magnus.

capitatus. J. fol. setaceis: capitul. terminal. & axillar. subfoliosis: petal. acut. integris, pericarpio æquilibus. Weig. Fl. Pomer.

Habitat

Culm. basi vaginis rectus, dein nudus, simpl. r-3-unc. setaceus. Fol. subuncial. lata, vagina fusca, margine membranac. albo notata. Capitul. 3-6-fl. iunius ovatum; adultius explicatum, fastigiatum, uno, altero vel foliol. immixtum. Hoc solum in min. uncialibus; maioribus 2-unc. praeterea simile capitulum sessile, vel breviter pedunculat. Ad basin capituli glumæ 2. Scariosæ. Petal. lanceol. integra, nec membranac.

Ericorum. J. culm. nudo, filiform. fol. linear. canaliculat. capitulo subrot. sessili, terminali, aphylio. Pollich. Palut.

In Palearcticu.

Differat J. bufonio. Culmi nudi in cespitem congesti, unc-palm. Fol. linear. fere setacea, canalicul. Capitul. terminale, sessile, densum, 3. foliol. inæqual. exceptum.

subulatus. J. fol. subulatis: panicul terminalibus: involuc. 2-phyll. subulato. Forsk. Æg.

In Arabia 24.

spinofus. J. involuc. panicul. infimæ pungentibus: superioribus setiferis. Forsk. Æg.

In Arabia.

spadiceus. J. planifolius, panicula laxa; petal. mollibus, breviter aristatis. Hall. helv. n. 1326. All. Fl. Ped.

In locis subhumidis, & umbrosis editiorum alpium 24.

luteus. J. planifolius, glaber; panicula nitente: fl. obtusis. Hall. helv. n. 1329. All. Fl. Ped.

Ad oras sylvarum in editioribus alpibus 24.

sylvaticus. J. fol. teretibus, articulat. panicula repetito-ramosa. Hall. helv. n. 1323. All. Fl. Ped.

In locis humidis, præsertim montanis 24.

aquaticus. J. fol. compressis, articulat. panicula semel ramosa. Hall. Helv. n. 1322. All. Fl. Ped.

Grauen iunceum &c. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 9. f. 2.

In fossis, & ad oras aquarum stagnantium 24.

Tenageia. J. annuus, culmo ramoso, paniculato: fl. solitar. sessil. petal. ovat-oblong. caps. subglobosa. Lin. Suppl.

In Germania ⊖.

529. RICHARDIA. Cal. 6--part. Cor. 1--petal. subcylindr. Sem. 3.

1. *scabra*. R. Syst. veg. ed. 14.

In Vera Cruce 24.

Planta ex stellatis XLIV. tota pilis obsita. Caul. altus, brachiat. subarticul. obsolete 4--gon. hispidus, pilis reflexis. Fol. subpetiol. lanceol-ovata, integerr. alterne nervosa, scabra. Fl. in capitula terminal. radiata sol. 4. vel pl. vel in verticillos congesti. Cor. ut in *Asperulis*, longæ, tenues, sed 6-fidæ; & fructus ex 3. semin.

330. ACRAS. Cal. 6-phyll. Cor. ovat. 6-fid. squamis totidem alterniſ interioribus. Pomum 10-locul. Sem. solitar. hilo marginali, apiceq. unguicul.

1. *mammosa*. A. fl. solitar. fol. cuneiformi-lanceol. Syst. veg. ed. 14.

A. *zapota* ma. Jacq. amer. tab. 182. f. 19. cd. piča tab. 51.

Malus persica &c. Sloan. Jam. 2. tab. 218.

Arbor americ. &c. Pluk. alm. tab. 268. f. 2.

In Amer. merid. H.

Arbor leviter laetescens, coma expansa, ampla, cortice fusco. Fol. plurima, 8-pollic. petiol. integerr. venosa, nitida. Fl. parvi, subalbidi, inodori. Fruct. subelevati, 3 5-pollic. ferrug' n. Sem. maxima, fusca, nitida. Demit $\frac{1}{2}$ partem numeri.

2. *sapota*. A. fl. solitar. fol. lanceol-ovat. Syst. veg. ed. 14.

Jacq. Amer. tab. 41. ed. piča tab. 60. Brow. Jam. tab. 19. f. 3.

b. *Anona* &c. Sloan. Jam. hisp. 2. tab. 230. & tab. 169. f. 2. Catesb. car. 2. tab. 82.

In Amer. merid. H.

Arb. 50-ped. Fol. alterna, petiol. 3-4-pollic. integerr. crassifc. glabra. Pedunc. axillar. & ramei, breves. Cor. albida. Fruct. ovalis, ovatus, globosus, cortice fusco-ferrugin. carne albescente. Sem. atra.

Cortex trunci adstringens loco Peruani in fibribus. Sem. decorticata suni diuretica, in dysuria, stranguria &c. Fructus putrescere incipiens præfertur *Bromelia* *Ananas*.

Ad pentandriam refert Jacq.

A. fl. solitar. fol. cuneiform. emarginato-retusis.

Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In Insula Tonga H.

Habitus similis congenibus. Rami teretes, crassi, tuberculati, apice foliiferi, & floriferi. Fol. sparsa, adproximata, petiol. glaberr. erecta, subtus rachide costata. Pedunc. ex omnibus axillis, solitarii, dependentes, 1-fl.

4. salicifolia. A. fl. confertis: fol. lanceol-ovat. Syst. veg. ed. 14. Brow. Jam. tab. 17. f. 4.

Salicis folio &c. Sloan. Jam. hisp. 2. tab. 206. f. 6?

In Amer. merid. 24.

Arbor fol. oblong. nitidis. Fl. infra frondes sparsi, parvi, pallide lutei.

balata.

A. fol. ovato-obl. subtus cinereis: fructu Olivæformi, viridi. Aubl. Guian. Hort. Mal. 4. tab. 5.

In Guiana H.

531. PRINOS. Cal. 6--fid. Cor. 1--petal. rotata. Bacca 6-sperma.

1. verticillatus. P. fol. longitudinaliter serratis. Syst. veg. ed. 14. Alcanna &c. Muni. phyt. tab. 51.

Aquifolium &c. Duham. arb. I. tab. 23.

In Virginias paludibus H.

Arb. trunco parvo, infirme, viminibus lentis, cortice glabro. Fol. Lauri; petiol. ovata, glabra; inferior. obtusa, super. acumin. serraturis acutis, & in mucronem subulatum desinentibus. Fl. axillar. pedunculati, veluti umbellati, albi.

2. glaber.

P. fol. apice serratis. Syst. veg. ed. 14.

Cassine &c. Mill. dict. tab. 83. f. 2.

In Canada H.

Arb. 12-ped. ramosus. Fol. alterna, petiol. oblong. persistent. glabra. Pedunc. axil. parvi, saepius 3-fl. Cor. alba. Bacca rubrae.

532. DUROIA. Cal. cylindric. truncatus. Cor. 6-part. Filam. nulla. Pomum hispidum.

1. Eriophila. D. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Anonyma Merian. Surin. tab. 43.

In Surinamo H.

Arb. ramis crassis, inæqual. apice hirsutis. Fol. terminal. plura, adproximata, opposita, subpetiol. spitham. obovata, obtusiusc. integerr. costata, supra pubescent. subtus reticulata. Petoli breviss. hirsuti. Fl. terminal. congesti;

sessiles. Cor. similis *Nyctanth. sambach*, alba. Fruct. magnitudine ovi Gallo-pavonis, paulo maior, sphæricus, densissime pilosus, bene sapidus.

533. BURSE- Cal. 3-phyll. Cor. 3-petal. Caps. carnosæ, 3-RA. valv. 1-sperma.

I. gummifera. B. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 65. ed. picta tab. 96.

Terebinthus &c. Comm. hort. I. tab. 77. Catesb. car. I. tab. 30.

Betula &c. Pluk. alm. tab. 151. f. 1.

In Americ. calidiore H.

Arb. saepe procera, comosa, succo aqueo balsamico scatens. Fol. vel simplic. vel ternata, aut impari-pinn. petiolata, sesquipollic. utrimq. 2-3. ovata, acuta, integerr. nitida. Racemi axillar. Fl. exigui. Petal. alblicant. Fruct. virent. purpur. vel mixti. Sem. rubra.

534. BERBE- Cal. 6-phyll. Petal. 6. ad ungues glandulis 2. RIS. Germen cum stigmate orbiculato, magno evadit bacca 2-sperma.

I. vulgaris. B. peduncul. racemosis; spinis triplicibus. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 163. Knorr. del. 2. tab. B. Camer. epit. 86.

Crespino. Matth.

In Europæ sylvis, & ad sepes H.

Frutex 6-ped. spinosus. Fol. prima obovata, serrato-ciliata, inarticulata: stipul. utrimq. dentate capillari terminatae. Caulina alterna: horum infimum subpinatifid. dentibus spinosis; reliqua mutata in spinas 3-part. Fol. secundaria bina, oblonga, serrata; inter fol. infima, & spinas occultantur fol. min. Racemi ramosi, penduli. Cor. lutea. Baccæ rubræ. Var. absque arillis: altera spinis simplic. in Syria.

2. cretica. B. peduncul. 1-fl. Syst. veg. ed. 14.

Lycium &c. Alp. exot. tab. 20.

In Creta H.

Fol. integerr. Buxi. Racemi subumbell. Sem. 3.

3. ilicifolia. B. fol. obovat. ferrato-spinosis: pedicellis elongat. cymosis: spinis digitato-spinos. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In Tierra del Fuego H.

Fol. ut in ilice, rigida, breviss. petiol. basi integerr. glaberr. subius glauciora. Stipul. palmatae. Racemi terminal. breviss.

4. *sibirica*. B. pedunc. 1-fl. solitar. cernuis; spinis palmat.
Syst. veg. ed. 14. Comm. Gott. 1784. tab. 6.
Pall. it. 2. tab. P. f. 2.
In montibus Altaicis, & Sibiricis H.
 Fruticul. subped. erectus, ramosus, rigidus. Lignum citrinum. Spicæ 5-7-9. raro ternæ.
 Fol. ovata, spinulis ciliata. Pedunc. axill. 1-fl. nudi. Baccæ obovat. rubræ.
535. CAPU- Germ. superum. Cal. o. Cor. 6-fid. Stam. intra RA. tubuni. Stigma globosum. Bacca.
1. *purpurata*. C. *Syst. veg. ed. 14.*
In India 24.
 Arb. ramis brachiat. purpurascent. Fol. opposita, subpetiol. ovata (*Lonicerae Xylostei*) acutiusc. integerr. annua. Florum fasciculi axillar. fol. breviores, purpur.
536. LORAN. Germ. inferum. Cal. o. Cor. 6-fida, revoluta.
 THUS. Stam. ad apices petalor. Bacca 1-sperm.
1. *tetrapetalus*. L. fl. ad articulos 4. verticillat. 4-petal: fol. subsessil. oppositis, oblongis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
In nova Zeelandia H.
 Folia integerrima.
2. *scurrula*. L. peduncul. 1-fl. congestis: fol. obovat. *Syst. veg. ed. 14.*
 Viscum &c. *Pet. gaz. tab. 63. f. 8.*
In China H.
 Frutex parasitic. Fol. palmar. opposita, petiol. integerr. glabra, altero latere paulo latiora. Fl. axillar. 3-6. propriis pedicellis. Germina inferne attenuata. Baccæ veluti pyriform.
3. *uniflorus*. L. racemis simpliciss. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 69. ed. piða tab. 100.*
In Domingo sylvaticis H.
 Parasitica. Fol. opposita, petiol. saepe lœsa, & difformia suboval. obtusa cum exiguo acumine, integra, glabra, venosa, coriacea. Racemi axillar. & terminal. Fl. parvi. Petala obtusa, patentiss. purpur. Bacca atra.
4. *europæus*. L. racemis terminal. simplicibus: fl. dioicis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. I. tab. 30.*
In Austria quercubus, parasiticus, in Sibiria H.
 Planta parasitica, Quercuum ramis innascens, fruticosa, 4-ped. diffusa, dichotoma, cortice fusco. Fol. opposita, oblonga, obtusa, sub-

crassa, integerr. & obsolete repanda. Racemi a 6. ad 12-fl. Cor. patentiss. parum olens, flavo-viresc. Bacca teres, dein pyriform. tandem subrotund. flavefcens, nitida.

5. *americanus*. L. racemis subramoisi, æqualibus: fol. ovatis. *Syst. veg.* ed. 14. *Jacq. amer.* *tub.* 67. *ed.* 2. *tub.* 98.

Lonicera &c. *Plum. gen. ic.* 166. f. 1.

In Amer. arboribus H.

Habitus Visci. Planta fruticosa, ramosa, fragilis, diffusa, supra arbores innascens. Fol. difform. avenia, coriacea, integerr. sessil. interiora opposita; ramea alterna. Fl. multi, penduli, sesquipollit. pedunculati, coccin. Baccæ nigrae.

6. *occidentalis*. L. racemis simplic. fl. irregular. *Syst. veg.* ed. 14. *Viscum* &c. *Sloan. Jam. hij.* 2. *tab.* 200. f. 2.

In Amer. arboribus H.

Statura prioris. Rami divaricati. Fol. ovata. Spicæ lateral. oppositæ simplic. Cor. purpur.

L. fl. adgregato-capitat. *Syst. veg.* ed. 14.

Periclymenum &c. *Fluk. alm.* *tab.* 213. f. 5.

Itti Canni. *H. mal.* 7. *tab.* 29.

In Asie arboribus H.

Frutex ramis longis. Fol. opposita, petiolat. ovat-lanc. obtusiflc. integerr. craifa, venosa. Involuc. 5-phyll. Fl. sæpe pentandri.

L. racemis trichotom. peduncul. 3-gonis; fl. æqualibus. *Syst. veg.* ed. 14.

In Cumanæ arboribus H.

Caul. frutescens, brachiat. ramis patent. Fol. sæpe opposita, longa, vel ovata, subfessil. coriacea, glabra. Pedunc. axillar. Cor. luteo-viridis.

9. *pentandrus*. L. racemis simplic. fl. 5-fid. fol. alternis, petiolat. *Syst. veg.* ed. 14.

In India H.

Frutex ramis ad folia dilatatis. Fol. subnervia, figura *Lauri*. Racemi axillar. solitar. seu bini. Filam. 3. e medio laciniar. cor. antheris breviora. Anth. longitudine cor.

10. *falcatus*. L. fol. linear. obtusis, lateralibus falcatis, glaucis: racemis axillar. paucifl. *Syst. veg.* ed. 14. *Lin. Suppl.*

In Madras. arboribus parasitica H.

Fol. integerr. avenia, cana. Fl. falcati, fulvi.

II. spicatus. L. spicis quadrangular. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 68. ed. piða tab. 99.

Habitat *Carthagena* ð.

Planta parasitica. Fol. opposita, petiol. obtusa, integerr. nervosa, pinguis, glabra. Spicæ axillar. oblong. crassæ, sulcatæ. Fl. pl. exigui, rubri, inodori. Bacca ovat-oblong. virescens, apice rubro.

pedunculatus. L. racemis solitar. fl. ternis, pedunculat. ramis radicantibus. Jacq. amer. p. 98.

In *Carthagena* sylvaticis ð.

Planta parasitica, fruticosa. Rami reclinati. Fol. 2--pollic. opposita, petiol. cordat-ovata, breviter acumin. integerr. coriacea, nitida. Racem. axillar. fol. breviores, simplic. sub 1-fl. Fl. parvi, inodori. Petal. alba.

sessilis. L. racemis solitar. simplicibus: fl. ternis, sessil. Jacq. amer. p. 99.

In *Carthagena* sylvis ð.

Planta parasitica, fruticosa, habitu omnino prioris; at rami ut in *L. spicato*. Fol. sesquipoll. ovata. Fl. sessiles. Baccae e rubro-sordide virent.

537. HILLIA. Cal. 6-phyl. Cor. 6-fida, longissima. Bacca infera, 2-locul. polysperm.

I. parasitica. H. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 66. ed. piða tab. 97.

In Amer. merid. ð.

Frutex repens, arboribus, & muris vetustis inhabitanter. Caul. basi procumbent. glabri. Fol. 3-pollic. opposita, petiolat. ovalia, utrimq. acumin. integerr. glabra. Flos terminal. solitar. semi-pedal. sessilis. Cor. albido-virescens.

538. CANA-RINA. Cal. 6-phyl. Cor. 6-fid. campanulata. Stigmata 6. Caps. infera, 6-locul. polysperma.

I. Campanula. C. Syst. veg. ed. 14.

la. Campanula &c. Hort. Cliff. tab. 8.

Campanula canariensis &c. Pluk. alm. tab. 276. f. 1.

In insulis Canebris 24.

Adfinis Campanulæ, sed differt fructificationis numero senario. Rad. tubero-fusiform. Caul. erectus, 3-pedal. articulat. teres, laevis. Rami terni

terni e singulis caulis geniculis; superior. longioribus, apice dichotom. Ramuli alterni. Fol. (caulina terna, ramea opposita) petiol. hastata, denticul. venosa, lævia. Fl. e dichotomia ramorum superior. peduncul. cernui. Cor. rufa, intus lætior, fundo flavescens: lacin. nervis 3. purpur. Anth. flavæ.

539. NANDINA. Cal. polyphyll. imbricatus. Cor. 6-petal.

1. *domestica*. N. Syft. veg. ed. 14. Thumb. Jap.

Nattæn, vel Nandin. Kæmph. am. exst. Fæst. V. pag. 776.

In Japonia ♂.

Caul. orgyal. erecti, fruticosi, laxi, superne ramosi. Rami vaginis fol. vestiti, flexuosi, apice foliosi. Fol. ternata, supradecomposita, petiol. Foliol. subsessil. ovata, setaceo-acumin. integerr. glabra, margine reflexo. Fl. terminal. paniculati: panicula supradecompos. peduncul. & pedicell. angulatis. Cor. alba. Bacca extus rubra, intus alba, magnitudine Pisi.

540. FRAN- Cal. subcylindric. 5--dent. persistens. Petal. 5.

KENIA. Stigim. 6-part. Caps. 3-valv. 1-locul.

1. *lævis*. F. fol. linear. confertis, basi ciliatis. Syft. veg. ed. 14.

Franca &c. Mich. gen. tab. 22. f. 1.

Polygonum &c. Barr. ic. 714. Bocc. mus. I. tab. II.

In Europæ austral. maritimis 24.

Planta parva, supina, glauca. Fol. Serpylli. Cor. purpur.

2. *hirsuta*. F. caulibus hirsutis: fl. terminal. fasciculatis. Syft. veg. ed. 14.

Nothria &c. Berg. cap. tab. I. f. 2.

Franca &c. Mich. gen. tab. 22. f. 2.

In Apulia, Creta &c.

Planta supina. Caul. paniculato-dichot. Fol. Thymi, ad basin præcipue ciliata. Cor. violac.

3. *pulverulen-* F. fol. obovat. retusis, subtus pulveratis. Syft. veg. ed. 14.

Franca &c. Mont. in Zann. tab. 79.

Anthyllis &c. Clus. hist. 2. p. 186.

In Italix, Narbonæ &c. litoribus ☽.

Caul. humifusi, palmar. ramosi, rubentes. Fol. opposita, vel quaterna. Fl. axillar. exigui, amæthistini.

- revoluta*. F. caul. frutesc. dichotomo, spitham: fol. ovatis, margine revolut. fl. axillar. sessil. albido-rufescens. stigmata 3-fid. *Forsk. Åg.*
In Ægypto b.
- 541. PEPLIS.** Cal. 12--fid. Petal. 6. calyci inserta, interdum nulla. Caps. 2-locul. polysper.
- 1. portula.** P. fl. apetalis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 64.*
Glaucoides &c. Mich. gen. tab. 18.
Glaux &c. Petav. gen. tab. 43. Loef. pruss. tab. 20.
Vaill. paris. tab. 15. f. 5. Bocc. mus. tab. 84.
In Europæ inundatis 4.
Cau. repentes, dodran-pedal. angulati. Fol. opposita, longe petiol. subrotund. glabra. Fl. axillar. sessil. Petal. fugacia, (si adiunt) elliptica, purpur.
- 2. tetrandra.** P. fl. tetrandris, monopetal. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 180. f. 29. ed. 2. piæta 103.*
In Jamaica ♂.
Plantula tenella. Rad. tubera distincta profert.
Caul. procumb. 2-pollic. Fol. opposita, petiol. ovato-subcord. obtusa, integrerr. glabriuscula.
Stipul. parvæ, solitar. Pedunc. axill. solitar. breves, 1-fl. Cal. campanulat. limbo 8-fid. Cor. tubulosa, alba. Stam. 4. Germen tubo calyc. adnatum. Stigmata 2. Caps. infera, 2-locul. coronata, longitudinaliter dehiscens, valvul. 4. hemisphæric.
Non pertinet ad hoc genus Hompton. Journ. des Scavans. 1785.

D I G Y N I A .

- 542. GAHNIA.** C Al. gluma 2-valv. irregular. Nectar. 2--valv. filamenta involvens. Stigm. dichotom.
- 1. procera.** G. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen.*
In nova Zeelandia.
Gramen semiorgyal. & ultra, Schœnis Africanis similis.
- 543. ORYZA.** Cal. gluma 2-valv. 1-fl. Cor. 2-valv. subæqualis, semini adnascens.

- r. sativa*. O. Syst. veg. ed. 14. Cates. car. I. tab. 14.
An in Æthiopia? ⊖.
 Planta graminifolia. Spica expansa. Sem. alba,
 dura, diaphana.
544. FALKIA. Cal. 1-phyll. Cor. 1-petal. Sem. 4.
I. repens. F. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Thumb. nov. pl.
 gen.
In cap. b. Spei inundatis.
 Herba, & structura fl. omnino Convolvuli, sed
 sem. nimis distant.
545. ATRA- Cal. 2-phyll. Petal. 2. sinuata. Stigm. capitata.
 PHAXIS. Sem. I.
I. spinosa. A. ramis spinosis. Syst. veg. ed. 14.
 Atriplex orient. &c. Buxb. cent. I, tab. 30. Dill.
 elth. tab. 40. f. 47. Herit. Stirp. Fase. 2. f. 14.
In Media iuxta fluvios, & in Sibiria ♀.
 Fruticul. 1-2-cubit, spinosus adultus, cortice ci-
 nereo-fusco. Fol. parva, elliptica, cæsia,
 glabra. Ramuli fl. onusti. Cor. albido-purpur.
2. undulata. A. inermis. Syst. veg. ed. 14.
 Arbuscula &c. Dill. elth. tab. 32. f. 36.
In Æthiopia ♀.
 Caul. fruticosi, 1-2-cubit. pl. procumbenti-ere-
 ctiusc. Fol. frequentia, sparsa, petiol. semiun-
 guicul. ovato-obtusa, glabra, margine undu-
 lato; superiora sensim maiora. St. pul. ovat-
 obl. Bract. ovatæ. Fl. 3-4. spicati, axillar.
 Cal. 4-part. æqualis, lacin. ovatis, concavis.
 Pet. o. Stam. lanceol. Styl. 2--fid. Sem. su-
 brotund.

TRIGYNIA.

546. RUMEX. C Al. 6-phyll. foliol. duorum ordinum; quo-
 rum 3 exteriora; 3 interiora. Sem. I. trique-
 trum.
*Dantur spec. in quibus sexus est tota planta di-
 stinctus.*
 * *Hermaphroditæ: valvulis granulo notatis.*
- I. Patientia*. R. fl. hermaphr. valvul. integerr. unica granifera:
 Z ij

HEXANDRIA TRIGYNIA.

- fol. ovat-lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 489.*
Lapathum sativum. Dod. pempt. 648.
Hippolapato. Matth.
In Italia, Germania, ad rivulos aquarum in alpibus 24.
Caul. sulcatus. Fol. Hippolapatho min. sed maiora Oxylapatho, cordata, acumine obtuso: seminalia sagittata, ut R. acetosæ.
- 2. sanguineus.** R. fl. hermaphr. valvul. integerr. unica granifera: fol. cordat-lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 492.*
Lapathum rubens. Dod. pempt. 650.
In Virginia, Germania quasi sponte 24.
Fol. acuta, obtuse virent. glabra, venis rubris, succo sanguineo. Fl. albido-fusci. Valvula exterior fl. grano magno, globoso, rubro notata; rarius altera grano minimo.
- 3. verticilla-tus.** R. fl. hermaphrod. valvul. integerr. omnibus graniferis: fol. lanceol. vaginis cylindric. *Syst. veg. ed. 14.*
In Virginia 24.
Fol. longa, angusta, acuta. Fl. ad genicula verticillati.
- 4. Britannica.** R. fl. hermaphrod. valvul. integerr. omnibus graniferis: fol. lanceol. vaginis obsoletis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Virginia 24.
Caul. ruber. Fol. magna, sature virent. glabra. Fl. herbido-fusci.
- 5. crispus.** R. fl. hermaphrod. valvul. integris, graniferis: fol. lanceol. undulat. acutis. *Syst. veg. ed. 14.*
Lapathum &c. Muntin. Brit. tab. 190. Tabern. tc. 436.
In Europæ fossis 24.
Caul. 3-ped. & ultra. Fol. plicata, crispa, splendide virent. ima obtusa, super. longe lanceol. Racemi subnudi. Fl. herbaceo-fusci.
- 6. perstacio-ides.** R. fl. hermaphrod. valvul. dentatis; omnibus graniferis: fol. lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*
In Virginia ○.
Planta spitham. ramosiss. Fol. alterna, petiol. lanceol. integra, undata, lævia. Floris valvula dentibus utrimq. 3. longis, granis magnis, pallidis. Panicul. ex racemis alternis.

7. *egyptius*. R. fl. hermaphrod. valvul. 3-fido--petaceis, unica
granifera. Syst. veg. ed. 14.
Lapathum &c. Till. pis. tab. 37. f. 1.
In Ægypto ○.
Fol. Parietariae. Capsula sem. longe barbata.
8. *dentatus*. R. fl. hermaphrodit. valvul. dentat. omnibus graniferis; fol. lanceol. Syst. veg. ed. 14. Nov. Comit. Goit. Vol. 5. tab. 10.
Lapathum &c Dill. elth. tab. 158. f. 191.
In Ægypto ○.
Caul. spitham. erectiunc. basi ramosus. Fol. petiol. obliqua. Fl. laterales, conferti. Differt a priori potissimum valvularum fl. aentibus minime serratis. A. R. persicarioide, valvular. apicibus lanceol. nec subulat.
9. *maritimus*. R. fl. hermaphrod. valvul. dentat. graniferis: fol. linearibus. Syst. veg. ed. 14.
Lapathum &c. Bocc. mus. 2. tab. 104.
In Europæ litoribus maritimis 4.
Radix rubra. Fol. læte virent. duriuscula, glabra. Fl. aurei.
10. *divaricatus*. R. fl. hermaphrod. valvul. dentat. graniferis: fol. cordat--oblong. obtusis, pubescentibus. Syst. veg. ed. 14.
Lapathum &c. Till. pis. tab. 37. f. 2.
In Italia ○.
Caul. longe brachiatus. Cum R. pulchro coniungit Hall.
11. *acutus*. R. fl. hermaphrod. valvul. dentat. graniferis: fol. cordato-obl. acuminat. Syst. veg. ed. 14.
Lapathum &c. Black. tab. 491. Muniung. Brit. tab. 189.
Lapathum, seu Oxylapathum. Bauh. hist. 2. p. 983. Lob. ic. 184.
Oxylapathum. Fuchs. 491.
In Europæ fossis 4.
Rad. extus fusca, intus flava. Caul. 3-pedal. Fol. longe lanceol. plana, ferrata, venosa, glabra, læte virent. Pedunc. prope basin articulati. Panicul. diffitæ, laxæ, spicatæ. Fl. albido-fusci.
12. *obtusifoli-us*. R. fl. hermaphrod. valvul. dentat. graniferis: fol. cordat--obl. obtusifl. crenulat. Syst. veg. ed. 14.
Lapathum &c. Lob. ic. 284. Cam. epit. 228.

Hippolapathum &c. Muntin. Brit. tab. 187.

In Europa, ad vias, & in pratis 4.

*Rad. extus fusca, intus lutea. Fol. obscure virid.
duriora, venosa; radicalia longe, caulina bre-
viter petiol. Fl. albido-fusci.*

13. pulcher. R. fl. hermaphrod. valvul. dentat. subunica granife-
ra: fol. radical. panduriform. *Syst. veg. ed. 14.*
*Lapathum &c. Till. pis. tab. 37. f. 2. Moris. hist.
3. s. 5. tab. 27. f. 13. Bauh. hist. 2. p. 988.*
In Europa, ad vias 4.

*Caul. prostrati, difformes, angulati. Fol. sordide
virent. glabra, venosa, nervis hirsutis; supe-
rior. lanceol. crispa. Fl. verticillati, albido-
fusci. Rami floriferi, recurvati.*

** *Hermaphroditii: valvulis granulo desitutis,
seu nudis.*

14. bucephalo- R. fl. hermaphrod. valvul. dentat. nudis: pedicel.
phorus. planis, reflexis, incrassatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Acetosa &c. Col. ecphr. I. tab. 150.

In Italia calidiore, arvis, & locis sabulosis ⊖.
*Caul. vix palm. ramosus. Fol. Ocyti similia,
ovalia, fuscunc. lata, alterna, longe petiol.
nitroso veluti pulvere adspersa. Fl. semper
terni, herbidi, lutescent.*

15. aquaticus. R. fl. hermaphrod. valvul. integerr. nudis: fol.
cordat. acutis, glabris (surrectioribus, rigidio-
ribus). *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 490.*

Lapathum palustre. Tabern. ic. 437.

Hippolapathum. Dalech. hist. 604.

Herba Britannica. Munt. brit. tab. I.

In Europa ad ripas fluviorum &c. 4.

*Fol. mire variant. Rad. intus flava. Fol. super.
longiora, margine undato. Racemi longi, laxi;
fl. verticillat. Valvul. cordat.*

16. Lunaria. R. fl. hermaphrod. valvul. laevibus: caule arbo-
reo: fol. cordat. *Syst. veg. ed. 14.*

Acetosa arboresc. &c. Pluk. alm. tab. 252. f. 3.
In Canariis ♂.

*Fol. subrotun. succulenta. Panicula oppositifol.
Flos 3-nec 6-part.*

17. vesicularius. R. fl. hermaphrod. geminatis: valvul. omnibus
maximis, membranac, reflexis: fol. indivisis,
Syst. veg. ed. 14.

Acetosa &c. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 28. f. 7.

In Africa ♂.

Petiol. longiss. Valvul. albæ.

18. *roseus.* R. fl. hermaphrod. distinctis : valvulae alterius ala maxima membranac. reticulata : fol. erosis. Syst. veg. ed. 14.

Acetosa &c. Shay. afr. 5. f. 5.

In Ægypto ♂.

Valvul. uncial. orbiculat. basi 2-fid. quod non in seq.

19. *tingitanus.* R. fl. hermaphrod. distinctis : valvul. cordat. obtusis, integerr. fol. hastato-ovatis. Syst. veg. ed. 14.

Acetosa &c. Mont. in Zann. tab. 6. Moris. hist. 2. f. 5. tab. 28. f. 8.

In Barbaria, Hispania 24.

Caul. pedal. ramosi. Fol. petiol. ovata, acuminat., subscabra, basi subaristata, juxta basin erosa, margine scaberrima, & fere inæqual. cum maculis sanguin. Racemi longi, fl. 5-3. propriis pedicell. ad lingulos dentes racemii. Valvul. nudæ.

20. *scutatus.* R. fl. hermaphrod. fol. cordato-hastat. caul. tereti, (ancipite). Syst. veg. ed. 14.

Acetosa &c. Mont. in Zann. tab. 8. Black. tab. 306. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 28. f. 9. Zannich. Venet. tab. 87.

b. *A. cambobritann. Mont. in Zann. tab. 7.*

In Helvetia, Gallo-provincia, montanis locis inter congestos lapides 24.

Ludit in fol. forma. Color plantæ glaucus, aut palidus. Caul. cubit. Fol. sagittata, mucronibus longis. Vagin. lanceol. Spicæ raræ, ramosæ.

21. *digynus.* R. fl. hermaphrod. digynis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 14.

Acetosa &c. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 36. fig. penult. Pluk. alm. tab. 252. f. 2. Blutr. Obs. tab. 67.

In alpib. Helveticis, Lapponicis &c. 24.

Fol. crassiusc. firma, glabra, venosa, sature virgentia; radical. iuniora longe petiol. integra; adulta apice rotundato, & submargin. Stipul. retusæ, albæ. Fl. multi, & albidi.

22. *arifolius.* R. caul. lœvi, subfrutesc. fol. cordato-hastatis, acutis, serrulat. valvul. nudis, integerr. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

HEXANDRIA TRIGYNYA.

R. *Abyssinicus*. Jacq. hort. 3. tab: 93.

In Abyssina 24.

Caul. pl. 10-ped. erecti, fruticosi, foliosi, supra medium ramosi, nodosi, pallent. vel purpur. Fol. inferiora cordat---hasta'a, lobo medio elongato, acuta, subundul. margine eroso-crenata, venosa, glabra, acida, alterna, petiol. Petioli membranac. fusco-pallent. summa linear-lanc. acumin. integerr. Panicula laxa. Petal. pallida. Sem. nitidum. Differt a R. *tuberoso*, rad. non tuberosa, & sexu florum. A. R. *tingitano*, statuta, caule erecto; & colore florum.

*** *Floribus diclinis.*

23. *alpinus*. R. fl. hermaphrod. sterilibus, femineisq. valvul. integerr. nudis: fol. (inferioribus) cordat. obtusis, rugosis. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 262.

Lapathum &c. Bauh. hist. 2. p. 987. Clus. hist. 2. p. 69.

In Helvetia, Gallia australi &c. circa domos alpinas 24.

Rad. intus flava, & purpurasc. Surcul. flavesc. Caul. crassus, ramosus, brachiat. Fol. petiolis striatis, & rubentibus innixa, e viridi-lute-scent. ad petiolum utrimq. aurita, plicata: caulina lanceol. Vagin. sub fol. & ramis amplæ. Spicæ floral. paniculatæ, densiss. multifl.

24. *spiniferus*. R. fl. androgynis: calyc. femin. 1-phyll. valvul. exteriorib. reflexo-uncinat. Syst. veg. ed. 14.

Beta cretica &c. Bauh. hist. 2. p. 962.

In Creta ⊖.

Caul. pl. procumb. dodrant. ramis paucis, alternis. Fol. cordat-ovat. vel oblong. vix sagittata, obtusa, petiolat. pallide virid. radical. multa; caulina remota.

25. *tuberosus*. R. fl. dioicis: fol. lanceol-sagittat: hamis patentibus. Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zann. tab. 3.

Oxalis tuberosa. Dod. pempt. 649.

In Italia 24.

Adonis nimium R. *Acetosæ*, & *veluti hybrida*.

Rad. omnino *Filipendulæ*. Caul. erectus, cubit. simpl. Fol. infer. longe petiolat. superiora sessil.

26. *multifidus*. R. fl. dioicis: fol. hastatis, auriculis hastatis. Syst. veg. ed. 14.
Acetosa &c. Bocc. mus. 2. tab. 126.
In alpibus Hetruriæ, Calabriæ, Orient. 24.
 Caul. pedales.
27. *Acetosa*. R. fl. dioicis: fol. oblong. sagittatis. Syst. veg. ed. 14. Bluck. tab. 230. Knorr. del. 2. tab. A. 13.
 b. *Oxalis crispæ*. Bauh. hist. 2. p. 990. Tabern. ic. 440.
 c. *Acetosa montana maxima*. Bauh. hist. 2. p. 890.
 d. *Acetosa montana lato ari folio, rotundo*. Bocc. mus. tab. 125. 126. All. Fl. Ped.
In Europæ pascuis: var. in alpib. 24.
 Sub quolibet ramo bractea oblong-acumin. Fl. albido-virent.
Var. d. Fol. plana, non undulata, non sinuata, triangularia: ima petiol. obtuse sagittata; caulinæ sessili-amplexicaul. Caulis humilior. Est planta dioica.
28. *Acetosella*. R. fl. dioicis: fol. lanceol-hastat. Syst. veg. ed. 14. Blak. tab. 307. Knorr. del. 2. tab. A. 14.
Acetosa &c. Zann. tab. 5.
Oxalis &c. Bauh. hist. 2. p. 292. Tabern. ic. 440.
 b. *Oxalis minima* &c. Tabern. ic. 441.
 c. *Oxalis* &c. 2. Tabern. ic. 441.
 d. *Acetosa* &c. Bocc. mus. tab. 26.
Oxalide minore. Matth.
In Europæ pascuis, & arvis arenosis 24.
 Caul. dodrant. Fol. longe petiol. angusta: inferiora mire variant; superior. lingulata. Fl. paniculati. Pedunc. inarticul. Fl. herbido-fusci.
Var. fol. non lanceol.
29. *aculeatus*. R. fl. dioicis: fol. lanceol. petiolat. fructibus reflexis; valvis ciliatis. Syst. veg. ed. 14.
Acetosa &c. Bauh. prodr. tab. 55.
Oxalis minor &c. Bauh. hist. 2. p. 991.
In Creta, Hispania 24.
 Simil. R. *Acetosella*, sed fol. basi attenuata, absque hamis. Florum femineorum interiores valvulae ciliatæ, aculeis minimis.
30. *luxurians*. R. fl. dioicis: fol. cordat-hastat. caulinibus angulat. diffusis: valvul. exterioribus subulat. interioribus orbiculat. Syst. veg. ed. 14.

Acetosa &c. Bocc. mus. tab. 126. Conf. Pluk. physe. 331. f. 2.

R. luxurians. Lin. Suppl. differens est, monente Vahl.

In alpibus Bononiensisibus 4.

Rad. Filipendule, tuberosa. Caul. in horto pedal-sesquiped. copiosi, prostrati, ramosi, pentagoni, striati. Fol. Acetosae longiora, ambitu cordata, hastata, figura Ari maculati, aciddiss. margine purpurasc. undulato, vix crenulato. Panicula terminal. divaricata, composita. Differt a R. scutato caul. angulato, nec tereti; fol. cordato-hastat. nec lanceolat-sagittatis.

31. bipinnatus. R. fl. dioicis: fol. bipinnat. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In Marocco 4.

Caul. adscendent, spitham. laves. Fol. cordata, 2-pinnatifid. lacin. fere ad costam dissectis, singulis pinnatis, seu dichotomis. Stipul. membranac. diaphanae, albæ. Racemus terminal. compositus. Cal. obtusus.

Nemolapathus. R. fl. hermaphrod. valvul. linear. obtusis, integrerr. graniferis: verticillis remotis: ramis patentibus: fol. inferior. cordat-lanceol. superior. lanceolat. *Lin. Suppl.*

In Germania 4.

hydrolepathus. R. (*Lapathum*) fl. hermaphrodit. unica, & exterior. valvula granifer. fol. planiuscul. racemis foliosis. Scop. Fl. Carn. Lob. ic. p. 286.

In locis uidis.

Tardius floret; & tota facie a R. crispa diversus.

R. (*Lapathum*) fl. dioicis: peduncul. ad articuli locum crassioribus: fol. imis cordato-sagitt. segmentis acuminat. petiolis duplo longioribus. Scop. Fl. Carn.

In alpibus.

Differt a R. Acetosa, & Acetosella, fol. spathuliform. pedunc. articulatis: bracteis amplexicaul. 3-jl. ruptura facile pedicellorum ad articuli sedem: fol. maioribus &c.

conglomeratus. R. (*Lapathum*) petiol. latescensibus: fol. longe lanceol. fl. verticillat. verrucosis. Hall. kist. n. 1590.

In fissis.

Caul. erectus ; 1-2-ped. sulcatus . Rami distantes , ere&to-patent. Fol. ovat-lanceol. planiuscula . Verticilli numerosi , remoti . Fl. copiosi , glomerati , reflexi . Valvul. granulo purpur.

glaber.

R. fl. masculis 6-petal. calyc. nullo . Forsk. Æg.
In Arabia ☽ .

Naturali ordine convenit cum Rumice , sed cor. mascula abludit . Caul. pl. decumbent. spitham. Fol. radical. & caulina maxima , (superior. min.) petiolat. triangulari-ovat. acuta , subrepanda , crassa ; margine scabra . Stipul. membranac. vaginantes .

comosus.

R. fl. spicato-comosis ; valvul. dentat. altera granifera . Forsk. Æg.

In Arabia.

An R. ægyptius ? Syst. veg. ed. 14. sed huic valvula cor. non 3 fida , sed. 5-7-fid. & flos deficiens .

Flos deficit 3a. parte . Caul. procumb. sesquipolluc. simplex , ruber , infra nudus , supra undiq. spicatus ; fl. breviter pedunculat. confertis ; erectis dum fiorent , reflexis fructu maturo . Spica inter fl. emittit fol. petiol. linearilanceol. subrepanda : ex apicæ coma exit minorum folior. oblongor.

pictus.

R. fl. diclinis , monoicis ; valvul. semineis integris , graniferis : fol. linear. pinnatifido-dentat. Forsk. Æg.

In Arabia.

Fl. racemosi , valvul. albidis , ad margines venis rubris pulcherrime pictis .

Lechanus.

R. fol. caulinis lato-lanceol. Forsk. Suppl. Æg.
In Natolia.

Fol. petiolis basi vaginantibus : radical. spathulata , obtusa . Fl. valvul. integris , graniferis .

347.FLAGEL-LARIA . Cal. 6-part. Cor. o. Bacca 1-sperm. *Adfinitas proxima Calami.*

i. indica. F. Syst. veg. ed. 14.

Palmiuncus &c. Rumph. amb. 5. tab. 59. f. 2.

Panambu-valli . Hort. mal. 7. tab. 53.

In Java , Malabar , Zeylona ♂ .

Frutex humanaam altitudinem superans . Rami distichi . Fol. arundinac. alterna , vaguant. cirrho terminata ut in *Gloriosa* , virore fulvo , & ni-

tente. Caul. sublignosi, e viridi-fusci. Panicula parva. Fl. Junci. Petal. rotundiora, parum cuspidata, circa se mutuo convoluta, primum albida, dein virescent. Baccæ rotund. rubicundæ.

548. SCHEU-Cal. 6-part. Cor. o. Styli o. Caps. 3. inflatæ, CHZERIA. 1-sperm. Fol. graminea.

i. palustris. S. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 76. Fl. Lapp. tab. 10. f. 1.

Juncus &c. Rudb. elys. I. p. 110. f. 2.

Gramen &c. Loes. pruss. tab. 28.

In Helvetia, Germania, Lapponia &c. paludosis 24.

Planta graminifolia. Culmi pedal. geniculati, ad terram vaginis albis obsiti. Fol. convoluta, carinata. Stipul. amplexicaul. ovat-lanceol. Ex genicul. exit panicul. rara. Petala, seu calyc. lacin. lanceol. ex viridi-subluteæ. Caps. breves, rotundæ, latæ, planæ, 3-5-6. in quolibet fl. Sem. 1-2. raro-3. in qualibet capsula.

549. WURMBEA. Cal. 6-part. Cor. o. Caps. 3-locul. polysper.

i. capensis. W. Syst. veg. ed. 14. Thumb. nov. pl. gen. p. 18. tab. Var. a. b. c. Ad. Medic. Svec. T. I. tab. 16.

550. TRI-GLOCHIN. Cal. 3-phyll. deciduus. Petal. 3. calyciform. Styl. 3. aut 6. plumosi. Caps. 3-6. basi dehiscentes. Fol. graminea.

i. palustre. T. capsul. trilocularibus, sublinear. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 490. Ad. Stock. 1742. tab. 6. f. 1. 2. 3. Leers. herb. tab. 12. f. 3.

Calamagrostis. IV. Dalech. hist. 1006.

b. Juncago &c. Barr. rar. tab. 271.

In Europæ inundatis uliginosis h.

Planta graminifolia. Rad. fibrosa. Scap. a late-re radicis sequipalm. Fol. graminea, crassula, hinc convexa, inde plana, pallide virent. Spica longa, rara, multi-fl. fl. alternis. Petal. ovata, virid. roseo col. tincta; interiora tota rosea.

2. bulbosum. T. rad. bulbosa, fibris obtecta. Syst. veg. ed. 14. Ad cap. b. Spei.

Simile priori. Rad. setæ in fasciculum cespitosum congestæ. Scapus vix semiped. nudus. Fol. radicalia, filiformia, hinc subcanalicul. Totæ minor priore. Stili 3. protracti, & patentes; in priore erecti, & obsoleti.

- S. maritimum*. T. capsul. 6-locular. ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Fl. Dan. tab. 306. Ad. Stock. 1742. tab. 6. f.
 4. 5.
In Europæ maritimis 24.
 Culm. simpl. inferne violac. Fol. graminea, læte virent. tenera, glabra. Spica brevior T. *palustri*. Fl. albido-virent.
551. MELAN. Cor. plerumq. 6-petal. Filam. ex elongatis un-
- THIUM. guibus cor.
1. *virginicum*. M. petal. unguiculatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Asphodelo &c. Pluk. amalt. tab. 414. f. 8.
In Virginia 24.
 Caul. sub 2-ped. teres. Fol. Triticea, longa, fibris longitudinal. prædita. Panicula terminal. Cor. Nigella, obsolete flava, in medio, ob maculas cordatas, nigricans adparet.
2. *sibiricum*. M. petal. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Am. acad. 2. tab. II.*
In Sibiria 24.
 Rad. bulbosa. Caul. pedal. in medio cinctus fol. unico, linear. Fol. radical. semipedal. in petiolum attenuata; nonnulla linear. acuminata, striata. Fl. paniculati. Cor. reflexa, alba.
3. *capense*. M. petal. punctatis: fol. cucullatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei 24.
 Caul. palmar. simpl. Fol. amplexicaul. perfoliata, vagina superne dilatata; in caule 4. supremo, & infimo minimo. Petal. ovalia.
4. *indicum*. M. petal. linear-lanceol. fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14.*
In Tranquebaria 24.
Herba statura Orinthogali lutei. Rad. bulbosa. Caul. erectus, palm. simplex, lævis. Fol. caulinæ 3. linear. caule longiora. Pedunc. terminal. Sæpius 2. altero 1. altero 2-fl. Fol. floral. 2. breviora, latiora. Fl. atro-purpur. Caps. 3-angular. magnitudine sem. Coffea.
5. *viride*. M. pedunc. 1-fl. cernuis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
 Caul. semiped. foliosus, subpubescens. Fol. palmar. alterna, sessil. lanceol. erecta. Pedunc. alterni, laterifl. filiform. Petal. angusto-lanceol. patent. purpurasc. ex margine connivente, flavo.

6. *ciliatum*. M. petal. unguiculat. fol. basi cucullat. ensiform. cartilagineo--ciliatis : fl. spicatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
 Fol. caule breviora. Petal. lanceol. alba.
7. *triquetrum*. M. fol. triquetris, glabris, caule longioribus : fl. spicatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
8. *monopeta-* M. cor. monopet. fol. cucullat. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
lum.
Ad cap. b. Spei 24.
 Rad. globosa, glabra. Caul. nullus, seu digital-palmar. simpl. vaginatus, teres, striatus. Fol. 3. alterna, vaginant. lanceol--subul. disticha, canaliculata, lævia, recurva. Spica pollicar. flexuosa. Fl. remotiuscul. alterni, albidi, dentibus margine atris. *Var. cor. albis, & purpur. margine nigro, & purpureo; tubo breviore, & longiore. Simil. M. capensi, ut vix extent differentia specificæ.*
552. MEDEOLA. Cal. o. Cor. 6-part. revoluta. Bacca 3-sper.
 1. *virginica*. M. fol. verticillat. ramis inermibus. *Syst. veg. ed. 14.*
 Lilium &c. *Pluk. alm. tab. 328. f. 4.*
In Virginia ♂.
 Fol. 6-7. sessil. lanceol. integerr. glabra. In summis ramulis 2-3. foliol. ex quorum alis exeunt peduncul. filiform. penduli, 1-fl. Cor. pallida,
2. *asparago-* M. fol. pinnat. foliol. alternis. *Syst. veg. ed. 14.*
ides.
Sabb. hort. 4. tab. 54.
 Asparagus &c. *Till. pis. tab. 12. f. 1. 2.*
 Laurus &c. *Herm. Lugd. tab. 681.*
In Æthiopia ♂.
 Caul. cubit. flexuosi, ramosi. Fol. (aut ramulos dicas, multis dubium) myrtifoliis, alterna, læte virescent. nitida. Fl. penduli. Cor. extus virescens, petal. linearibus, a medio totaliter reflexis.
553. TRILLIUM. Cal. 3-phyl. Cor. 3-petal. Bacca 3-locul.
 1. *cernuum*. T. fl. pedunculato, cernuo. *Syst. veg. ed. 14.*
 Solanum &c. *Catesb. carol. I. tab. 45.*
In Carolina 24.
 Rad. tuberosa. Caul. 2-3, octo--pollic. in quo- rum apice fol. 3. Flos oritur inter folia, nu- tans.

2. *erectum*. T. fl. pedunculato, erecto. *Syst. veg. ed. 14.*
Solanum &c. Corn. Canad. tab. 167.
Solano &c. Moris. hist. 3. f. 13. tab. 3. f. 7.
In Virginia.
 Caul. pedal. Fol. terna, opposita, orbiculata.
 Peduncul. terminal. Petal. obverse-ovata, atro-purpurea. Bacca *Solani hortensis* magnitud. nigra.
3. *sessile*. T. fl. sessili, erecto. *Syst. veg. ed. 14.*
Solanum &c. Pluk. alm. tab. III. f. 6. Catesb. car. I. tab. 50.
In Virginia, Carolina 24.
 Caul. 6-pollic. simpl. in cuius apice fol. 3. oval-acum. nutantia. Flos oritur inter fol. Petal. purpur.
554. COL- Spatha. Cor. 6-part. segmentis erectis, æqualibus: tubo radicato. Caps. 3. connexæ, inflatæ. Numero stam. & spatha simpl. differt a Croco.
- CHICUM.
- I. *autumnale*. C. fol. planis, lanceol. erectis. *Syst. veg. ed. 14.*
Black. tab. 566. Knorr. del. I. tab. Z. I. Camer. epit. 845. Lob. ic. 143. Matth.
- b. C. fl. pleno.
- c. C. *vernus*. Bauh. pin.
- In Europæ pratis 24.*
- Bulbus subcordat. cuticula lutea tectus. Fol. perrampla, Liliacea. Cor. dilute purpur. Fructus sessil. C. *vernus* habet fol. & petal. paulo angustiora.
2. *montanum*. C. fol. linear. patentiss. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Ped. tab. 74. f. 2. Clus. hisp. tab. 267.*
In Hispania, Helvetia &c. 24.
- Pluribus notis differt a C. *autumnali*. Floret Junio, non Autumno. Radix globosa, tunicata: folia vaginant. una cum flore erumpunt. Eadem primum latiuscula, ovata, deinde linear. virid. & fl. paulo breviora. Cor. angustior, linear. 2-pollic. violac. Tuba profunde 3-fida. Altitudo totius plantæ paulo ultra digitum.
3. *variegatum*. C. fol. undulatis, patentibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Moris. hist. 3. f. 4. tab. 3. f. 7.
In Chio insula.
- Cor. *Fritillariae* instar tessulata.
555. HELONIAS. Cal. o. Cor. 6-petala, subconica. Caps. 3-locul.

- 1. bullata.* H. fol. lanceol. nervosis. *Syst. veg. ed. 14. Am. acad. 3. tab. 1. f. 1.*
Veratrum &c. Mill. ic. tab. 272.
Ephemerum &c. Pluk. alm. tab. 174. f. 5. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 2. f. 1.
In Pensylvaniæ paludosis 24.
Rad. carnosa. Caul. erectus, simpl. teres, vestitus squamis remotis, lanceol. ad basin vero confertis, ovatis. Fol. radicalia, acuta. Racemus terminal. ovatus, purpurasc. Pedunc. simplic. Flosculi bullati.
- 2. Asphodelo-ides.* H. fol. caulinis setaceis. *Syst. veg. ed. 14.*
Asphodelus &c. Pluk. manu. tab. 342. f. 3.
In Pennsylvania.
*Caul. 2-ped. simpl. Fol. alterna, seu sparsa, erecta, laevia, margine scabra. Racemus terminal. simplex, pedunculis fl. longioribus. Cor. alba. Simil. *Asphodelo*, sed styli 3. recurvati.*
-

TETRAGYNYIA.

- 556. PETI-**
VERIA. *C*al. 4-phyll. Cor. o. Sem. 1. apice aristis uncinat.
- 3. alliacea.* P. fl. hexandris. *Syst. veg. ed. 14. Trew. Ehret. tab. 67. Act. Stock. 1744. tab. 7.*
In Jamaicæ nemorosis Ȑ.
Simil. sequenti. Caul. frutescens. Fol. alterna, solitar. ovat-lanceol. ad basin angusta, integra. Spica axillar. Fl. alterni, remoti, sessil. albidi.
- 2. octandra.* P. fl. octandris. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. ed. pida tab. 104. Plum. gen. 50. ic. 219.*
In Amer. merid. Ȑ.
Planta fruticosa, 3-ped. Corpus penicillifor. quod germini adsidet, rubrum; in priore album. Simill. priori: differt caul. breviore, striatore; staminibus 8. filament. purpur. nec albisi. fili. rigidioribus, & omnino glabris.

POLYGYNIA.

557. ALISMA. **C**al. 3--phyll. Petal. 3. Sem. plura, sive caps. compressæ, 1--sperm. margine cinctæ. *Involuc.* 3-phyll. fl. colligens: *Fl. paniculati*, pedicellis verticillat.
1. *Plantago*. A. fol. ovat-acutis: fructibus obtuse 3-gonis. *Syst. veg.* ed. 14. *Fl. Dan.* tab. 561.
Plantago aquat. *Cam. epit.* 264. *Dod. hist.* 606.
Piantagine aquatica. *Matth.*
In Europæ aquosis 24.
 Caul. cubit. nudus. Fol. longe petiol. nervis apice confluentibus, crassa, rigida, glabra, venosa, sature virid. quandoq. fol. iuncea. Rami verticillor. inferiorum umbelliferi. Panicul. magna, laxa, racemis verticillat. Petal. inaperta, rosea.
2. *flava*. A. fol. ovatis, acutis: peduncul. umbellat. fructibus globosis. *Syst. veg.* ed. 14.
Damasonium &c. *Plum. sp.* 7. *ic.* 115.
In Amer. merid. 24.
Planta stolonifera. Petiol. longiss. triangular. Fol. crassa, nervosa. Pedunc. nudi, triquetri. Cor. flavescentia.
3. *Damasoni-* A. fol. cordat-oblong. fl. hexagynis: capsul. subulatis. *Syst. veg.* ed. 14.
Plantago aquat. min. altera. *Lob. ic.* 301.
Damasonium &c. *Dalech. hist.* 1058.
In Anglia, Gallia &c. aquosis.
 Caul. ped. gracilis, teres, pallide virens. Fol. latitudine varia, crassa, nervosa, glabra, obscure virid. Cor. alba. Fruct. radiatus.
4. *cordifolia*. A. fol. cordat-obtusis: fl. dodecandris: fructibus uncinato-mucronat. *Syst. veg.* ed. 14.
Sagittaria &c. *Moris. hist.* 3. *f.* 15. *tab.* 4. *f.* 6.
Ranunculus &c. *Plum. sp.* 7. *ic.* *tab.* 234. *f.* 2.
In Amer. austral. & septentr. 24.
Media inter Alismas, & Sagittarias. Planta narrans. Petiol. longiss. 5-goni, ex lata basi angustati. Fol. decemnervia. Pedunc. 6-7. terminal. Fl. parvi, albi.

5. *natans*, A. fol. ovatis, obtusis: peduncul. solitar. *Syst. veg. ed. 14.*
Damasonium &c. Vaill. Ad. 1719. tab. 4. f. 8.
In Gallia, Germania &c. fossis.
Caul. fluitans, Fol. nervosa, glabra, laxe virid.
- Fl. nonnulli ex eadem spatha. Cor. alba. Caps. sphaerius 8.
6. *ranunculo-* ides. A. fol. linear-lanceol. fructibus globoso-squar-
olis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 122.
Plantago aquat. humilis &c. Bauh. hist. 3. p. 738.
Lob. ic. 300.
Ranunculus &c. Pet. gaz. tab. 26. f. 12.
In Europæ fossis 24.
Scap. spithamea-pedal. teres. Fol. petiol. nervosa,
glabra, pallide virent. Fl. verticillato-panicul.
Cor. parva, alba.
7. *subulata*, A. fol. subulatis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Virginia.
Cor. alba.
8. *parnassifo-* lia. A. fol. cordatis, acutis; petiolis articulat. *Syst. veg. ed. 14.*
Ranunculus &c Till. pis. tab. 46. f. 1.
In Aperiniorum paludibus 24.
Statuta A. plantaginis. Fol. longe petiol. vix
*acuta, laxe. Petiol. vix articulati. Scap. flo-
ridus omnino A. Plantaginis. Cor. alba. Sem.
*aristata.**

NOVA GENERA.

MONOGYNIA.

RIPOGONUM.

Perian. inferum, 6-phyll. foliol. erectius-
cul. lanceol. acutis.
Cor. nulla.
Stam. Filam. 6. minuta.
*Anth. linear. 4-gon. erectæ, calyc. triplo lon-
*giores.**

Pistil. Germ. globosum : styl. filiform. longitud. calyc. Stigm. obtusum.

Peric. Bacca globosa, 2-sperm.

Sem. solitar. hemisphærica.

Genus Smilaci proximum.

R. Forst. gen.

In Insulis maris Austral.

Planta geniculata, & viminea.

R A V E N A L A.

Cal. Spatha multifl. ovata, lanceol. carnosæ, dura,

Cor. 4-part. lacinia longæ, acuminat. angustæ, 7-8-pollic.

Stam. Filam. 6. cor. fere æqual. parum reflexa.

Anth. linear.

Pistil. Germ. longum, Styl. 8-pollic. angulatus.

Stigm. dentatum.

Peric. Caps. oblon. coriacea, 3-angul. 3-locul. polysper.

Sem. nigra, cuticula cœrul. tecta.

R. Sonnerat. Voyag. tab. 126.

In Madagascari. H.

Adfinitas cum Musa, & Heliconia, sed caps 3-locul. polysperm. Truncus altus, erectus, simplic. ob fol. lapsum cicatrixatus. Fol. flabellum expansum referunt. Foliol. Musæformia, sed spissiora. Petioli 2-ped. amplexicaul. lata basi, Fl. axillar. in spathis alternis.

A D E N I A.

Cal. Perian. longiss. teres, 2-pollic, sursum crassius, limbo 6-fid. lacin. oblong. obtusis, recurvis, semipollic. albidis.

Cor. 6-petal. inserta inter lacinias calycinas, linear-lanceol. curva, calyc. breviora. Nectar. squam. 6. linear. erectæ, truncatæ, inter calyc. & quodvis filament. singula in eorum iunctura.

Stam. Filam. 6. filiform. inserta calyc. tubo ad basin, dein parum connata, mox libera, calyc. breviora, alba.

Anth. erectæ, simplic. linear-lanceol. flavæ.

Pistil. Germ. tubo cal. adnatum. Styl. oblong-conicus, breviss. slaveſcens. Stigm. crassum, emarginatum.

I. venenata. A. fol. palmatis: fl. spicatis. *Forsk.* *Æg.*

In Arabia *ḥ.*

Truncus scandens, viridis, brachii crassitie. Rami alterni, flexiles, teretes. Fol. alterna, petiol. peltata, 5-loba, lobis versus medium ma: o- valibus. Cirrhi ex ramis lateralibus. Peduncul. ramuli conferti, in apice ramorum, breves, ramulosi. Fl. 2-3. sessil. albi.

LICARIA.

I. Guianensis. L. *Aubl.* *Guian.* tab. 121.

In Caribæis *ḥ.*

Arb. 60-ped. superne ramosa. Fol. alterna, petiol. ovata, acumin. integra, glabra, odore aro- matico. Fl. & fructus desiderantur.

RAPATEA.

Involuc. 1-phyl. 2-lobum, lobis oppositis, basi ampliss. apice angustioribus, longiss. acutis. Fl. numerosi, congesti.

Cal. Perian. 1-phyl. 3-part. lacin. oblong. con- cavis, acutis.

Cor. 1 petal. tubus breviss. receptaculo germinis inseritus: limbus 3-lobus, lobis oblong. ovatis, acutis, concavis.

Stam. Filam. 6. breviss. tubo cor. inserta.

Anth. oblong. 4-gon. in foliol. concavum, lu- teum desinentes.

Pistil. Germ. subrotun. 3-striat. Styl. longiss. stria- tus: Stigm. 3. in spicam convoluta.

Peric.

Sem.

I. paludosa. R. *Aubl.* *Guian.* tab. 118.

In Guiana *24.*

Fol. longiss. angusta, acuta, basi vaginant. mutuo se amplexantia, supra vaginam angustata, stria- ta, integerr. glabra. Scapi pl. axillar. 2-ped., nudi, compressi, marginati, apice sensim la- tiores. Fl. in involucro collecti, peduncul.

GUAPIRA.

Cal. Periant. 4-5-phyl. lacin. brevibus, subrotun. acutis.

Cor. monopetala, tubulosa; limbo patente, 4--5-deht.
Stam. Filam. 6. 3. longiora, 3. breviora, recep-taculo pistil. inserta.
Pistil. Germ. ovat. Styl. cylindric. Stigm. 5-6-fid. lacin. linear. acutis.
Peric. Drupa ovata, 1-sperm. 6-striata, corona-ta denticulo cor. evadens pulposa.
Sem. 1. membrana alba involutum.

x. Guianensis. G. Aubl. Guian. tab. 119.

In Guiana H.

Arb. medioc. magnitudinis, ramis oppositis, no-dosis. Fol. opposita, petiol. ovat. acuta, integerr. glabra, in apice ramorum 3-4. verticil-lata. Fl. racemosi, albi.. Drupa coccinea.

A I O U E A.

Cal. Periant. 1--phyll. subrotun. concavum, 3--dent.
Cor. Petal. 3. minima, calyc. intra divisuras in-serta.
Stam. Filam. 6. ovata, superne latiora.
Anth. 1-locul. 1-valv.
Pistil. Germ. orbiculat. Styl. longus. Stigm. 6-fid.
Peric. Bacca subrotun. subcarnosa, 1-locul.
Sem. unicum, testa fragili tectum.

x. Guianensis. A. Aubl. Guian. tab. 120.

In Guiana H.

Arb. 5-ped. superne ramosa. Fol. alterna, petiol. lanceol. integerr. glabra. Fl. axillar. & terminal. numerosi, minimi. Cor. sublutea. Bacca nigra, aromatica.

D I G Y N I A.

C A R O M B A.

Cal. P erian. 1-phyll. 6-part. lacin. 3. exterio-ribus ovatis, acutis, intus luteis; 3. interio-ribus ovatis, obtusis, luteis, petala mentien-tibus.

Aa iij

Cor. nulla.

Stam. Filam. 6. singul. ad basin laciniar. inserta.
Anth. ovat. 2-locul.

Pistil. Germ. 2. oblon. Styli breves. Stigm. obtusa.

Peric. Caps. 2. ovat. subcarnosæ, stylo terminata, 1-locul.

Sem. numerosa, minutiss.

E. aquatica. C. Aubl. Guien. tab. 124.

In Caïenna, & Guiana.

Planta in aquis demersa. Caul. pl. longi, ramosi,
cylindrac. Fol. caulinæ opposita, petiol. in
lacinias pl. tenuissimas, capillaceas, oppositas,

plutifariam divisa. Fol. terminal. alterna, longe
petiol. peltata, orbiculata, integerr. natantia.

Fl. axillar. solitar. longe peduncul. Cor. lutea.



CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

358. *Trientalis*. Cal. 7-phyll. Cor. 7-pet. æqual. plana. Bacca exsucca, 1-locul. *Omnium partium numerus saepe septenarius.*
359. *Disandra*. Cal. sub 7-phyll. Cor. rotata; sub 7-part. plana. Caps. 2-locul. polysperm. *Flos partium num. maximè variat.*
360. *Aesculus*. Cal. 1-phyll. ventricosus, 5-dent. Cor. 5-pet. inæqualiter colorata; calyci inserta. Caps. subrotun. 2-3-locul. 2-sper.

* *Gerania africana.*

DIGYNIA.

361. *Limneum*. Cal. 5-phyll. Cor. 5-pet. æqualis. Caps. globosa, 2-locul. polysper.

TETRAGYNIA.

362. *Saururus*. Cal. amentum squamis 1-fl. Cor. 6. Germ. 4-rus. Baccae 4, 1-sperm.
363. *Aponogeton*. Cal. amentum. Cor. 6. Caps. 3-sper.

HEPTAGYNIA.

364. *Septas*. Cal. 7-part. Cor. 7-pet. Petal. oblong. æqual. Germ. 7. Caps. 7. oblong. acutæ, parallela, polysper.

MONOGYNIA.

558. TRIEN-TALIS. **C**al. 7-phyll. Cor. 7-part. æqual. plana. Bacca exsucca.
Oenium parvum num. s^epe septenarius.
I. europea. T. fol. lanceol. integrerr. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 86.
In Europ. borealis sylvis, & Juniperetis 24.
 Planta parva. Rad. bulbosa. Fol. subsessil. simplicia, terminalia. Fl. terminal. pedunculati. Pedunc. 2-3. graciles. Pedicelli oblongi, tenues. Flos stellatus. Cor. alba. Stam. 5-7. s^epius 6. cum totidem calyc. laciniis.
559. DISAN-DRA. Cal. sub 7-phyll. Cor. rotata, 7-part. plana.
I. prostrata. Caps. 2-locul. polysperm. Flos num. maxime variat.
 D. Syst. veg. ed. 14.
 Planta. Pluk. phyt. 257. f. 5.
In Oriente.
 Caul. 1-2-pedal. prostrati, teretes, pubescent. Fol. alterna, petiol. reniformi-orbicul. 30-crenata, pubescent. Pedunc. axillar. 2-raro 1-3. erecti, filiform. 1-fl. Cor. lutea.
- 3. africana.** D. Syst. veg. ed. 14.
 Chrysosplenii &c. Shaw. afric. f. 149.
In Africa.
An sp. distincta a priore? Pedunc. solitar.
560. ÆSCULUS. Cal. 1-phyll. 5-dent. ventricosus. Cor. 5-petal: LUS. inæqualiter colorata, calyci inserta. Caps. 2-3-locul.
- I. Hippocastanum.** Æ. fl. heptandris. Syst. veg. ed. 14.
 Castanea &c. Clus. hist. I. p. 7.
In Asia septentrion. H.
 Arb. speciosa, frondosa. Fol. digitata, in 5-7. foliol. divisa, ovat-acum. ferrata, subtus nervosa. Racemi pyramidati. Petal. alba, ex rubro mixta.
- Pavia.** Æ. fl. (s^epe) octandris. Syst. veg. ed. 14.
 Pavia. Trew. chret. tab. 15. Bærh. Lugd. 2. tab. 260. Hort. angl. tab. 19. Mill. ic. 198.
 Saamouna &c. Pluk. alm. tab. 56. f. 4.
In Carolina, Brasilia H.

Truncus validus, spinis obsitus. Fol. prioris,
acumin. serrata. Fl. spicati. Cal. & cor. fan-
guinea. Cor. 4-petal. clausa.

D I G Y N I A.

561. LIMEUM. **C**al. 5-phyll. Petal. 5. æqual. Caps. globo-
sa, 2-locul.

1. *africanum*. L. fol. oblong. petiolat. Syst. veg. ed. 14.
In Æthiopia.

Statura Corrigiolæ, seu Telephii. Caul. prostrati,
spitham. debiles, angulati, nudi, basi peren-
nant. Fol. parva, remota, alterna, subpetiol.
lineari-lanceol. Corymb. terminal. solitarii,
compositi, nudi, longe peduncul. Cal. seg-
ment. carinatis. Petal. parva.

2. *aphyllum*. L. fol. ovatis, sessilibus. Syst. veg. ed. 14. Lin.
Suppl.

Ad cap. b. Spei.

humile. L. fol. orbiculat-ovat. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

Caul. prostrati. Fol. breviss. alterna, petiol. mu-
cronata. Petiol. perexigui, amplexicaul. Cal.
vix carinatus. Cor. acuta.

T E T R A G Y N I A.

562. SAURU- **C**al. amentum squamis 1-fl. Cor. o. Germ.
RUS. 4. Baccæ 4, monosper.

1. *cernuus*. S. caul. folioso, polystachio. Syst. veg. ed. 14.
Serpentaria &c. Pluk. alm. tab. 117. f. 4.
In Virginia 24.

Fol. alterna, cordat-acum. membrana ex adver-
so fol. caulem involvente. Fl. dense spicati,
albi, dein virescent. Spicæ cacumen nutans.
Stam. multa, longa, nigra.

378 HEPTANDRIA TETRAGYNIA.

563. APONOGETON. Cal. amentum. Cor. o. Capsul. 3.
sperm.
1. *monoſta-chion.* A. spica simplici: fol. cordat-ovalibus. Syst. veg. ed. 14.
Saururus natans. Syst. veg. ed. 13.
Parya Kelanga. Hort. Mal. II. tab. 15.
In Indi or. paludosis, inundatis 24.
 Rad. bulbosa. Fol. radical. longiss. petiol. integerr. lævia, natantia. Scapi obsolete 3-goni, flaccidi. Spica simpl. 6-angul. spatha caduca testa. Bracteæ cor. loco 2. intra singulos flosculos, parvæ, clavatæ, obtusiusc. carnosæ, persistentes.
2. *distachyon.* A. spica bipartibili: fol. elliptico-lanc. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei in rivulis 24.
 Rad. bulbosa. Fol. longissime petiol. radicalia, integerr. lævia, natantia, *Potamogetonis natantis.* Spica introrsum imbricata. Fl. alterni, erecti, albi, fragrantiss. bract. ovata excepti. Stam. a 6. ad 12. Bulbi assati eduntur.
-

HEPTAGYNA.

564. SEPTAS. C Al. 7-part. Petal. 7. Germ. 7. Caps. 7. polysperm.
1. *capensis.* S. Syst. veg. ed. 14. Pluk. mant. tab. 340. f. 9.
Ad cap. b. Spei 24.
 Ordine naturali *Saxigragis*, & *Sedis* accedit. Scap. digital. filiform. Fol. radical. 4. obtusa, crenata, nuda: 2. infer. opposita ma: subpetiol. subrotun. 2. super. opposita, sessil. ovalia, angustiora. Umbel. simpl. Pedunc. 7-8. filiform. 1-fl. nudi. Involucrum minimum.



CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.



MONOGYNIA.

Fl. completi.

575. *Mimusops*. Cal. inferus, 4-phyll. Cor. 4-pet. Nectar. 16-phyll. Drupa acuminata.
565. *Tropæo-* Cal. 1-phyll. erecto-patul. 5-fid. calcaratus, colum. coloratus. Pet. 5, irregular. 2 super. sessil. 3 infer. unguibus ciliat. Baccæ 3, siccæ, 1-sper.
595. *Bæken*. Cal. superus, infundibulif. 3-dent. Pet. 5, subrotun. Caps. globosa, 4-locul. coronata.
585. *Memecy-* Cal. superus, turbinato-cylindric. fundo striato, len. margine integrerr. Cor. 1-pet. Anth. insertæ lateri apicis filamenti. Bacca coronata calyce.
572. *Combræ-* Cal. superus, campanulat. 4-dent. Cor. supera, tum. 4-pet. parva, calyci inserta. Stam. longiss. Sem. 1. 4=angul. angulis membranac.
588. *Ophiræ*. Involuc. 2-valv. 3-fl. Cor. 4-pet. supera, petalis, oblong. conniventibus. Bacca 1-locul.
570. *Epilobium*. Cal. 4-phyll. superus. Petal. 4. saepe 2-fid. Filam. calyci, non receptac. adhærent; longiora paulo altius inseruntur; inferiora infra; horum basis quodammodo villosa videtur. Caps. oblong. infera, 4-locul. Sem. papposa. Differt ab *Ænothera* sem. min. papposis.
569. *Gaura*. Cal. superus, 4-fid. longe tubulosus. Pet. 4-cordata, sursum flexa. Nux infera, 4=angul. 1-sper.
568. *Ænothera*. Cal. superus, 4-fid. tubo longo. Pet. 4. obverse cordata, patent. incisuris cal. inserta. Anth. linear. Caps. 4-valv. 4-locul. Sem. angulata.
567. *Rhezia*. Cal. 4-fid. tubulosus, basi ventricosus. Pet. 4-5. calyci inserta, subrotun. patent. Anth. ar-

cuatæ. Caps. 4-5-locul. intra ventrem cal.
sita.

566. *Osbeckia*. Cal. campanulat. 4-fid. persistens, lobis squama
ciliari intersinctis. Pet. 4. subrotun. Anth.
rostratæ. Caps. 4-locul. calyc. tubo truncato
cincta.
577. *Grislea*. Cal. campanulat. 4-dent. inferus. Pet. 4. mini-
ma, ex incisuris cal. Filam. longiss. adscen-
dentia. Caps. globosa, supera, 1-locul. poly-
sper. Interdum $\frac{1}{3}$ pars additur fl. partibus.
578. *Guarea*. Cal. brevis, 4-dent. inferus. Pet. 4: linear. acu-
ta, erecta. Nectar. cylindric. ore anth. ge-
rens. Caps. globosa, umbilicato-4-sulca, 4-
locul. Sem. solitar.
579. *Anticho*- Cal. 4-phyll. inferus. Pet. 4. Caps. supera, su-
rus. bulata, 4-valv. 4-locul. polysper.
574. *Allophyl*- Cal. inferus, 4-phyll. segment. orbiculatis, op-
lus. spōsitī minoribus. Pet. 4. orbiculata, calyce
min. Germ. didymum. Stigm. 4-fid..
576. *Jamboli*- Cal. inferus, minimus, 4-dent. Cor. infundibu-
lera. lif. 4-pet. Filam. planiuscula. Stigm. simpl.
584. *Lawso*- Cal. inferus; parvus, 4-fid. Cor. 4-pet. Stam.
nia. 4 parium. Caps. subrotun. 4-locul. polysper.
577. *Melicocca*. Cal. 4-part. segment. obtusis, patentibus. Pet.
4. reflexa infra calycem, æqual. oblong. Dru-
pa magna, subrotun. corticosa. Stigm. peltat.
anceps.
579. *Amyris*. Cal. parvus, 4-dent. inferus. Pet. 4. oblong.
Stigm. 4-gon. Bacca drupacea, 1-sper.
587. *Xymentia*. Cal. parvus, 4-fid. Pet. 4. revoluta, concava,
pilosa. Drupa 1-locul. 1-sper.
581. *Fuchsia*. Cal. o. Cor. tubo basi angulato; limb. 8-fid.
plano, lacin. alternis inferioribus. Bacca in-
fera, subrotun. 4-locul. Sem. plura, dupli-
serie.
582. *Chlora*. Cal. 8-9-phyll. Cor. monopet. 8-12-fid. Caps.
1-locul. 2-valv. polysper.
586. *Vicci*- Cal. superus, minimus, 4-5-dent. raro integer.
niam. Cor. monopet. 4-5-dent. Filam. receptaculo
inserta. Bacca globosa, umbilicata, 4-locul.
polysper.
587. *Erica*. Cal. inferus, 4-phyll. interdum duplex, colora-
tus. Cor. 4-fid. Filam. receptacul. inserta.
Anth. 2-fid. Caps. parva, 4-valv. 4-locul. Fol.
tenuissima.

- * *Aesculus Pavia*.
- * *Monotropa Hypopithys*
- * *Ruta graveolens*.
- * *Jussiaea erecta*; *suffruticosa*.
- * *Portulaca quadrifida*.
- * *Dais octandra*.
- * *Fagara octandra*.
- * *Melastoma octandrum*.
- * *Eulis serrata*.

** *Fl. incompleti*.

591. *Gnidia*. Cal. infundibulif. 4-fid. coloratus. Pet. 4. parva; calyci inserta. Stam. exserta. Sem. 1. subbaccatum, ovatum, in cal. Differt a *Passerina sola cor*.
594. *Lachnaea*. Cal. 4-fid. corollinus, inæqual. Stam. exserta. Sem. 1. subbaccatum, oblong. intra calycis situm. Differt a *Passerina cor. tantum inæqual.*
590. *Dirca*. Cal. corollinus, tubulosus, limbo subnullo, inæquali. Stam. exserta. Bacca 1-locul. 1-sper.
589. *Daphne*. Cal. corollinus, 4-fid. æqual. marcescens, tubo cylindrico, segment. ovatis; planis, patentibus. Bacca 1-sperm.
593. *Passerina*. Cal. o. Cor. 4-fid. æqual. marcescens; tubo cylindrico, tenui, inferne ventricoso, segment. concavis. Stam. tubo imposita. Sem. 1. corticatum.
592. *Stellera*. Cal. o. Cor. 4-fid. persistens; tubo longo, tenuiss. segment. ovatis. Stam. inclusa, breviss. Sem. 1. rostrat.
583. *Dodonæa*. Cal. 4-phyl. segment. ovatis. obtusis, concavis, deciduis. Cor. o. Caps. inflata, 3-locul. 3-sulca. Sem. bina.

* *Rivina octandra*.

D I G Y N I A.

597. *Weinmannia*. Cal. parvus, 4-phyl. patens, segment. ovatis. Cor. 4-pet. Caps. ovat. 2-locul. 2-rostris, polysper.
598. *Mæhrin*-*Cal.* 4-phyl. patens. Pet. 4. ovat. calyc. min. *gia*. Caps. ovat-conica, 4-valv. 1-locul. polysper.
599. *Codia*. Cal 4-phyl. Cor. 4-pet. Receptac. comm. involucratum.

395. *Schmiédelia*. Cal. 2-phyll. Cor. 4-pet. Pericar. 2. pedicellata.
396. *Galenia*. Cal. 4-phyll. concavus, segment. oblong. Cor. o. Caps. subrotun. 2-locul. 2-sper.

* *Chrysosplenium*.

TRIGYNIA.

602. *Paulli*. Cal. 5-phyll. patens. Pet. 4. patent. Nect. 4-nia. phyll. inæqual. Caps. 3. connatæ, compressæ, membranac. Sem. solitar.
603. *Cardio-* Cal. 4-phyll. segment. alternis mi. Pet. 4. ob-spermum. tusa cum acumine. Nect. parvum, 4-phyll. inæqual. Caps. 3. connatæ, inflatæ. Sem. solitar. basi cordis effigiem referentia.
604. *Sapindus*. Cal. 4-phyll. patens, coloratus, deciduus. Pet. 4. calyc. min. patula. Caps. 3. connatæ, carnosæ, ventricosæ. Sem. solitar.
605. *Coccoloba*. Cal. 5-part. coloratus, Cor. o. Bacca calycina, ba. basi 5-lob, 1-sper.
606. *Polygo-* Cal. coloratus, 5-part. persistens, segment. ovatum, tis. Stam. 5-8. Styl. 1-3. Cor. o. Sem. 1. nudum, angulatum.

TETRAGYNIA.

606. *Adoxa*. Cal. 3-fid. inferus. Cor. supera, 4-5-fid. plana. Bacca 4-5-locul. calyce coalita. Sem. solitar.
607. *Elatine*. Cal. 4-phyll. patens. Pet. 4. ovata, plana. Caps. depressa, 4-valv. 4-locul.
605. *Paris*. Cal. 4-phyll. lacini. longis. Pet. 4. subulata, plana. Bacca 4-locul.
608. *Haloragis*. Cal. 4-fid. Cor. 4-pet. Drupa sicca. Nux 4-locul.

* *Cotyledon laciniata: nudicaulis*.

* *Petiveria oðandra*,

MONOGYNIA.

565. TRO-
PÆOLUM. **C**al. 1-phyl. calcaratus, Petal. 5. inæqual.
Baccæ 3. siccæ.
1. minus. T. fol. peltat. repandis: petal. acumin-setaceis.
Syst. veg. ed. 14.
Cardamindum &c. Fewil. per. 3. tab. 8.
Nasturtium indicum. Lab. ic. 516. f. 2. I.
In Peru ☽ 24.
Fol. supra dilute virid. subtus pallidiora. Petal.
flavo-punicea.
2. maius. T. fol. peltat. sub 5-lobis: petal. obtusis. Syst.
veg. ed. 14. Knorr. del. I. tab. R. 17.
Cardamindum &c. Fewil. per. 3. tab. 8.
Viola &c. Herm. lugd. tab. 629.
In Peru ☽ 24.
Caul. debiles. Fol. orbiculata, priore duplo ma:
Pedunc. axill. 1-fl. Cor. ampla, extus crocea,
intus cinnabarina, vel coccinea, odora.
3. hybridum. T. fol. subpeltat. 5-lobis, integerr. petal. va:
riantibus, Syst. veg. ed. 14. Ad. holm. 1765.
tab. I.
Habitat nullibi; sed noviter ortu a priore.
Fol. latius cuneata, nutant. petiolis triplo bre:
viora, nuda, nervosa, venosa, cucullata. Ne:
ctar. obtusum, Cor. vix umquam determinata.
4. peregrinum. T. fol. subpeltat. 5-lobis, dentat. petal. ciliato:
laceris. Syst. veg. ed. 14.
Cardamindum &c. Trew. per. 2. tab. 42.
In Peru ☽ .
Fol. profunde 5-fid. lacin. media 3-loba. Petal.
vix calyce longiora.
566. OSBE-
CKIA. Cal. 4-fid. lobis squama ciliari interstinctis. Cor.
4-pet. Anth. rostratae, Caps. 4-locul. calycis
tubo truncato cincta.
1. chinensis. O. fol. sessilibus: pedunc. axillar. 3-fl. bractea:
tis. Syst. veg. ed. 14. Obs. it. 213. tab. 2.
Echinophora &c. Pluk. alm. tab. 173. f. 4.
In India.
Habitus Melastomæ. Caul. erectus, brachiatus,
acute 4-gon. Fol. angusto-lanceol. opposita,
trinervia, scabra. Fl. terminal. aliquot, ses:
siles, cincti fol. 4. flore longioribus, patentibus.

2. *zeylanica*. O. fol. petiolat. pedunc. axillar. 1-fl. nudis.
Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
In Zeylona.
Habitus prioris.
367. RHE-XIA. Cal. 4-5-fid. Petal. 4-5. calyci inserta. Anth. declinatae. Caps. 4--5--locul. intra ventrem calyci.
3. *virginica*. R. fol. sessil. serratis: calycibus glabris. Syst. veg. ed. 14.
Lysemachia &c. Pluk. alm. tab. 202. f. 8.
In Virginia.
Caul. 4-gon. angulis membranaceis. Fol. opposita, sublanceol. trinervia, pilis hispidiuscula, serraturis setaceis. Pedunc. terminal. dichotom. Fl. solitar. ex dichotomia, subsess. Petal. rubra. Anth. falcatae, luteae.
2. *mariana*. R. fol. ciliatis. Syst. veg. ed. 14.
R. glomerata. Act. litt. Hafn. 1778. tab. 4.
Lysemachia &c. Pluk. mant. tab. 428. f. 1.
In Marilandia &c. in pratis.
Calyx adpersus setis, apice stellatis.
3. *Acisanthera*. R. fl. axillar. alternis, pedunculat. 5-fid. Syst. veg. ed. 14.
Acisanthera &c. Brow. Jam. tab. 22. f. 1.
In Jamaica.
Caul. lignosi, virgati, ramis, ramulifl. alternis. Fol. opposita, subpetiol. oblong-ovat. acute ferrata, nuda. Fl. solitar.
4. *Jussiaoides*. R. fol. alternis, costatis, margine scabris. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
In Surinamo ♂.
Alfinis Epilobiis, & Ønotheris, sed absq. calyc. tubuloso. Frutex 4-ped. pubesc. uti pedunc. & fructus. Fol. confertiusc. subsessil. vix digital. lanceol. magis secunda, margine scabra ex minutiss. ferraturis, subtus nervis prominulis. Fl. axill. solitar. peduncul. vix folior. longitudo, flavi. Singulare, quod stigm. nudum, indivisum, verrucos. ovatum, quasi margine 4-dent. cinctum: & caps. intra calyc. prominens, quasi 4. laminis adglutinat. notata.
5. *glutinosa*. R. fol. oppositis, trinerviis, laevibus: fl. thyrsoides. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Mutis. Amer. V. L. tab. 6.
In nova Granada ♂.

Arbusc. frondosa, *Melastomæ* simil. ramulis articulat. alterne canalicul. Fol. confertiuscula, pollicar. petiol. elliptica, integerr. Fl. peduncul. vix fol. longiores. *Summitates ramulorum*, & calyc. glutinosi.

villoso.

R. caulis decumbentibus: fol. subrotund. *Aubl.*
Guian. tab. 129. f. 1.

In Guiana ♂.

Planta lignosa. Caul. & ramuli 4-goni, hirsuti, supra terram sparsi. Fol. opposita, breviter petiol. serrulata, 5-nervia, pilis utrimq. rufescens. Fl. terminal. peduncul. Petal. subrotund. violac. Caps. orbiculata.

atifolia.

R. fol. amplo, subrotund. villoso: fl. violac. *Aubl.*
Guian. tab. 129. f. 2.

In Guiana ♂.

Differet a priore caulis 2-pedai. erectis, crassioribus: fol. ampliss. ovat. acutis: fl. maioribus.

568. ENO-
THERA.

Cal. 4-fid. Petal. 4. Caps. cylindr. 4--locul. 4-valv. infera. Sem. angulata.

1. biennis.

♀. fol. ovat-lanceol. planis: caul. muricato, villosa. *Syst. veg.* ed. 14. *Fl. Dan.* tab. 446.

Lysimachia &c. *Moris.* hist. 3. f. 3. tab. II. f. 7.

Hyoscyamus &c. *Alp. exot.* tab. 324.

In Virginia, Pedemontio &c. ♂.

Altitudo humana. Caul. erectus, ramosus. Fol. subdenticul. radicalia in petiolum decurrentia. Fl. axillar. spicati. Petal. patula, emarginata, lutea, odore *Primulæ* graviore.

2. peruviflora.

♀. fol. lanceol. planis: caule laevi, subvilloso. *Syst. veg.* ed. 14. *Mill. ic.* 189. f. 1.

In Amer. septentr. ♂.

Fruitus apice 8-fid. nec 4-fid. ut in priore, Caul. ruber, scaber. Fol. repando-subdent. minus mollia. Petal. dimidio breviora.

3. muricata.

♀. fol. lanceol. planis: caul. purpurascente, muricato. *Syst. veg.* ed. 14. *Nov. Comm. Gottin.* VI. tab. I.

In Canada.

Planta orgyalis. Caul. apice incurvus, teres, superius sulcatus, rimosus, pilosus, exasperatus prominentiis acutis, purpur. in pilos desinent. Rami multi, axillar. Fol. sesqui-2-palm. lanceol. infer. repanda, super. obsolete cre-

Tom. II.

B b

nata, sparsa, glabra sublineata, patentiss. sessil.
fature virid. Bract. exiguae, rubicundæ. Petal.
obcordata, lutea, odore Jasminti. Caps. ore 4 fid.

- 4. longiflora.** ♂. fol. denticul. caulibus simplic. pilosis: petal.
distantibus, bilobis. Syst. veg. ed. 14. Jacq.
hort. 2. tab. 172.

In agro Bonariensi ⊖. ♂.

Fol. radical. numerosa, lato-lanceol. pubescent.
costa alba, oblique nervosa. Caul. saepius 5.
simpl. hirti, virid. pilis longis albis. Fol. cau-
linia sessil. ovat-oblong. Cal. tubo insigniter e-
longato. Petal. flava. Fruct. ♂. bienni longior.

- 5. obovalvis.** ♂. fol. lanceol-oblon. acumin. planis, glabris.
Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 70. ed. piñia
tab. 105.

In America.

Suffruticosa, ramosa. Fol. sessil. min. venis pa-
ralellis. Fl. axillar. solitar. sessiles. Cor. lutea.

- 6. molliflora.** ♂. fol. lanceol. undulatis. Syst. veg. ed. 14. Sabb.
Hort. 4. tab. 60.

Onagra &c. Dill. eth. tab. 219. f. 286.

In agro Bonariensi ⊖.

Fol. linear-lanceol. denticulis rariss., remotis,
mollia. Fl. axillar. Cor. lutea. Caps. tomento
albido obsita.

- 7. hirta.** ♂. hirta, fol. supra glabris. Syst. veg. ed. 14.
Onagra &c. Plum. sp. 7. ic. 174. f. 2.

In America calidiore ♀.

Fruticulus. Caul. & rami alterni, hispidae. Fol.
sessil. ovat-oblon. venis parallellis, subtus sca-
bra. Fl. axillar. solitar. magni, sessil. Cal. ma-
gnus, hispidus. Cor. lutea.

- 8. sinuata.** ♂. fol. dentato-sinuat. caulis apice nutante. Syst.
veg. ed. 14. Nov. Comm. Gott. V. tab. 9.

Lychnachia &c. Pluk. alm. tab. 203. f. 3.

In Virginia ⊖.

Caul. erectus, pedal. simpl. iunior pilosus. Rami
alterni. Fol. alterna, sessil. lato-lanceol. ob-
liqua, nuda. Fl. axillar. solitar. sessil. Petal.
obcordata, flava.

- 9. fruticosa.** ♂. fol. lanceol. subdent. capsul. pedicellat. acu-
tangul. racemo pedunculato. Syst. veg. ed. 14.

In Virginia ♀.

Caul. ruber. Calyx purpurasc. 4-phyll. sed rumpi-
tur altero saepius, & unico latere. Fl. parvi, albi.
Tubus filiform. angustiss. Fol. rarius denticulata.

10. *pumila*. ♂. fol. lanceol. obtusis, glabris, subpetiol. caulinibus prostratis: capsul. acutangul. Syst. veg. ed. 14.

In Amer. septentr. 24.

Caul. palmar. herbaceus, teres, flexuosus, divaricatiss. Fol. elliptico-lanceol. integerr. Fl. axillar. solitar. sublessil. erecti. Petala obcordata, lineata, lutea. Caps. obovat. obtusæ, 8-angular. angulis 4. latioribus, compressis, 4-valv.

laciniata. ♂. Hill. hort. Kewens. tab. 6.

In Carolina ♂.

Caul. sesquiped. glaber. Fol. pinnatifid-laciniata. Fl. flavi.

569. GAURA. Cal. 4-fid. tubulosus. Cor. 4-petal. adscendens versus latus superius. Nux infera, 1-sperm. 4-angula.

1. *biennis*. G. Syst. veg. ed. 14. Act. holm. 1756. tab. 8.

Lysimachia &c. Pluk. amalt. tab. 428. f. 2.

In Virginia, Pennsylvania ♂.

570. EPILO-BIUM. Cal. 4-fid. Petal. 4. Filam. calyci, non receptac. adhærent; longiora paulo altius inseruntur: inferiora infra: horum basis quodammodo villosa videtur. Caps. oblong. infera. Sem. papposa, Differt ab *Oenothera* semin. papposis.

* Staminibus declinatis.

1. *angustifoli*-um. E. fol. sparsis, linear-lanceol. fl. inæqual. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 289.

In Europa boreali 24.

Caul. 4-ped. erectus, firmus, superne ramosus, ruber. Fol. sæpe undulata, hilari-virent. sub-tus albida, nervulis horizontalib. conspicuis. Spicæ longæ. Pedunc. purpur. nutantes. Cal. læte purpur. Petal. elliptica, leviter emarginata, purpur. alba, vel variegata.

Var. *Lysimachia Chamæn. dicta alpina*. Bauh. pin. & prod. Fol. linear. raro serrata. Cal. purpur-niger. Petal. purpur. Siliquæ tomentosæ.

2. *latifolium*. E. fol. alternis, lanceol-ovat. fl. inæqual. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 565.

In Siberia, & Silesia 24.

Differt a priore fl. duplo maioribus: fol. lanceo-lat-ovat. alternis, nec sparsis, utrimq. læviss. tomento mollissim.

B b ij

** *Staminibus ereditis, regularibus: petal. 2-fid.*

3. hirsutum. E. fol. oppositis, lanceolat. undulato-serrat. de-currenti-amplexicaul. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 326. Sabb. hort. tab. 63.*

*Lysimachia &c. Morif. hist. 3. tab. II. f. 3.
b. L. parvo fl. Morif. hist. 2. tab. II. f. 4. Fl. Dan. tab. 347.*

In Europæ humidiuscul. 24.

Planta subhirsuta. Caul. 3-6-ped. ramosus, rufescens. Fol. mollia, sordide virent. basis media altior lateralibus. Cal. per ætatem reflexus. Cor. cordata, emarginata, purpurasc. Siliquæ fuscæ.
*b. Fol. inferior. opposita, superior. alterna, sessilis
aut breviter petiol. villosa, molliss. minus acuta.
Var. fol. ternis.*

4. montanum. E. fol. (imis) oppositis, ovat. dentat. *Syst. veg. ed. 14. Pseudo-Lysimachium &c. Dod. pempt. 85.
b. Lysimachia &c. Bocc. mus. tab. 16.*

In Europæ montofis 24.

Caul. erectus, 2-ped. teres, subhirsut. molliss. rufescens. Fol. petiol. ovat-lanc. argute dentat. glabra, nervis subtus hirsutis, firma, superior. alterna. Petal. profunde cordiform. carnea. Siliquæ subhirsutæ, fuscæ.

*Var. in foliis, quæ quandoq. subsessil. angustiora,
livida, terna, quaterna. In siccis adnata admodum parva.*

5. tetragonum. E. fol. elliptico-lanceol. denticulat. imis oppositis: caule 4-gono. *Syst. veg. ed. 14.*

Lysimachia minor. Tabern. ic. 854.

In Europa 24.

Caul. erectus, 3-ped. ramosus, fragilis, rufescens. Fol. sessil. etiam integra, glabra, tenera, cum macula livida; superior. alterna. Flos parvus. Petal. cordiform. punicea. Siliquæ tomentosæ, rufo-fuscæ. Summitas adhuc tenella nutans. Stigma integerr. *Var. prioris.*

6. palustre. E. fol. opposit. lanceol-linear. subintegerr. petalis emarginat. caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 347?*

Lysimachia &c. Tabern. p. 856.

In Europæ humidiuscul. 24.

Caul. erectus, cubit. ramosus, fuscus. Fol. alterna, in medio latiora, mollia, glabra, ci-

nereo--virent. Cal. ex rubro--ferrugin. Cor. rosea. Siliquæ rufescens. tomentosæ.

7. alpinum. E. fol. opposit. ovat--lanceol. subintegerr. siliquis sessilibus: caule repente. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 322.*

Lysimachia &c. Bocc. mus. 2. tab. 103?

In alpibus Helveticis &c. 24.

Caul. dodrant. & min. procumbens, inde erectus.

Fol. rigida, glabra, obscure virid. nitida: inferiora ovata; super. angustiora. Fl. min. Cor. dilute purpurasc. Siliquæ rubræ.

roseum.

E. fol. oppositis, alternisq. ovat-lanceol. petiolat. serratis, glabris. *Schreb. Lips. Schiemed. Opusc. Gesn. 2. fascic. tab. 20. f. 73.*

In locis humidis.

Caul. teres, glaber, superne villoso-incanus. Fol. iuniora hirsuta. Fl. parvi. Petal. dilute rosea, aut albicantia, venis saturioribus.

obscurum.

E. fol. oppositis, alternisq: lanceol. serratis, glabris; inferior. basi decurrentibus. *Schreb. sp. cil. Fl. Lips. addenda.*

In locis humidis.

Caul. ramosiss. superne villosus. Fol. parva, acuta, summa sessil. Fl. parvi, alterni, pedicellati. Petal. purpurasc.

Dodonæi.

E. fol. linear. fl. difformi. *All. Fl. Ped. Hall. helv. n. 1001. Vill. prosp.*

Lysimachia siliquosa, speciosa &c. IB. 2. p. 907.

In fluminum arenosis 24.

Rad. crassa. Caul. 1--2--cubit. Fol. nervo depresso, oris contractis, simpliciss. raro ferrata, pulposa, & subtus reticulata. Cal. purpur. vel niger. Cor. rosea, alba, vel variegata.

grandiflorum.

E. fol. longis, dentatis, villosis: fl. magno. *All. Fl. Ped. Hall. helv. n. 410.*

In locis montanis 24.

571. ANTI- CHORUS. Cal. 4-phyll. Petal. 4. Caps. supera, subulata, 4-locul. 4-valv. Sem. plurima.

i. depressus. A. *Syst. veg. ed. 14.*

Jussiaea edulis. Forsk. Ægypt. monente Vahl.

In Arabia ♂.

572. COM-BRETUM. Cal. 4-dent. campanulat. superus. Cor. 4-petal. calyci inserta. Stam. longiss. Sem. 1. quadrangul. angulis membranaceis.

1. laxum. C. spicis laxis. Syst. veg. ed. 14. Aubl. Guian. tab. 137.

In Amer. merid. ♂.

Frutex ramis farmentosis, scandentibus: ramulis foliosis, & floriferis. Fol. opposita, breviter petiol. ovat-acum. integerr. glabra. Fl. alternativim axillar. & terminal. spicati. Fl. in spica longa. Petal. minima, flava.

2. secundum. C. spicis secundis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 176. f. 30. ed. piata tab. 260. f. 26.

In fruticetis Carthagenaꝝ ♂.

Arbust. 12--ped. rami longiss. arboribus vicinis se substantantes. Fol. 4-pollic. opposita, petiol. ovat-oblon. integerr. glabra, venosa, disticha. Spica pinnata. Fl. multi, e viridi-flavescens. anther. rubris. Fol. trita odorem sauidum spirant.

decandrum. C. fol. alternis: fl. decandris. Jacq. amer. ed. piata tab. 260. f. 27.

In sepibus Carthagenaꝝ ♂.

Frutex scandens, 20--ped. Rami longiss. subvimei. Aculei sparsi, rari, semipollic. subulati, obtusi, leviter recurvi. Fol. 2-3-pollic. petiol. ovali-oblon. acumine obtuso, subcanalicul. cartilagineo, integerr. nitida. Spinæ semipedal. laxæ, compositæ, in apice ramulor. Pedunc. ultra fl. elongantur ad 6. ped. aphylli debiles. Fl. numerosi, parvi, albi. Fruct. subfuscæ.

573. GRISLEA. Cal. 4-fid. Petal. 4. ex incisuris calyc. Filam. longiss. adscendentia. Caps. globosa, supera, 1-locul. polysperm. Interdum $\frac{1}{3}$ pars additur fl. partibus.

1. secunda. G. Syst. veg. ed. 14.

In Amer. calidore ♂.

Arb. ramis teretibus. Fol. lauriform. opposita, breviter petiol. ovat-lanceol. integerr. glabra, nervis alternis. Racemus terminal. simplex, extrorsum flexus. Fl. pedicellati, sursum uno versu flexi. Cal. turbinat. Petal. vix conspicua. Stam. purpurasc. Anth. fulvæ.

574. ALLO- Cal. 4-phyll. foliol. orbiculat. oppositis minoribus.

PHYLLUS. Petal. 4. calyce min. Germ. didymum. Stigm. 4-fid.

1. *zeylanicus*. A. *Syst. veg. ed. 14.*
In Zeylona ḫ.
 Arb. facie *Perficæ*. Rami teretes. Fol. spitham.
 alterna, petiol. ovalia, acumin. glabra, ve-
 nosa. Racemi axillar. parvi, breviss.
575. MIMUSOPS. Cal. 4-phyll. Petal. 4. Nectar. 16-phyll.
 Drupa acumin.
1. *Elengi*. M. fol. alternis, remotis. *Syst. veg. ed. 14.*
Flos cuspidum. *Rumph. amb. 2. tab. 63.* *Breyn.*
cent. tab. 8.
Elengi. *Hort. Mal. 1. tab. 20.*
In India ḫ.
 Arb. procera, frondibus densis, & opacis, late
 sparsis. Fol. breviter petiol. ovat-acum. crassa,
 supra e viridi-fusca, & nitente glabritie, sub-
 tus dilutiora, & minus nitida. Pedunc. axill.
 pollic. 5-6-fl. Petal. albido--flavescens. seu ex
 flavo-fusca, odora. Gemmæ fl. conicæ, &
 col. muscosi. Cal. tomentosus. Fruetus olivæ-
 form. primum virid. dein flavi, ac rubescens.
 carne flava, farinacea, eduli. Officulum ob-
 long--rotund. nonnihil planum, spadiceo--fu-
 scum, ac nitens.
2. *Kanki*. M. fol. confertis. *Syst. veg. ed. 14.*
Metrosiderops &c. *Rumph. amb. 3. tab. 8.*
Binectaria. *Forsk. Æg. Vahl.*
In India ḫ.
 Arb. ramis crassioribus; cicatricibus parvis undiq.
 adspersis. Fol. terminalia.
576. JAMBO. Cal. 4-dent. Cor. 4-petal. infundibulifor. Filam.
 LIFERA. planiuscula. Stigm. simplex.
1. *peduncula-* J. *Syst. veg. ed. 14.*
ta. Jambolana. *Rumph. amb. 1. tab. 34.*
Caryophyllus &c. *Pluk. alm. tab. 274. f. 2.*
In India ḫ.
 Frutex niger, olivæfor. ramis erectis, obtusis,
 teretibus, cinereis. Fol. opposita, petiol. o-
 vata, integerr. glabra. Pedunc. axillar. oppo-
 siti, trichotomi, partialibus 3-fl. Panicula, &
 fl. ad *Myrtum* accedunt. Variat magnitudine,
 & fol. ovalibus, cuneiform. integerr. vel apice
 2-fid.
577. MELI- Cal. 4-part. Petal. 4. reflexa infra calyc. Stigm.
 COCCA. subpeltat. Drupa coriacea.

I. biuga. M. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 72. ed. pi^{ct}. tab. 109. Pluk. clm. tab. 207. f. 4.

In Amer. meridion. H.

Arb. procera, ramosa, comosa. Fol. alterna, biuga. Foliol. breviter petiol. subovata, obtusiuscula, integrerr. nitida. Racemi subramosi. Fl. pl. parvi. Petal. albicant. Fruct. subrotund. cortice viridi. Nues Castanearum more comeduntur. *Similis Sapindo.*

578. GUAREA. Cal. 4-dent. Petal. 4. Nectar. cylindric. ore anth. gerens. Caps. 4-locul. 4-valv. Sem. solitar.

I. trichilio-ides. G. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 176. f. 37. Guidonia &c. Plum. ic. tab. 147. f. 2.

Iito. Pif. Bras. tab. 80.

In Brasilia, alisq. locis Indiae orient. H.

Arb. 25--ped. comosa. Fol. alterna, pinnata, nitida, costa uni-sesquiped. Foliol. opposita, breviter petiol. oblong. obtusa, apice attenuata, integrerr. Racem. axill. semiped. laxi. Fl. breviter peduncul. e viridi-albicant. nectar. albo, odori; similes Meliae Azederach. Fruct. diametro semipoll. cortice solide virenti.

579. AMYRIS. Cal. 4-dent. Petal. 4. oblong. Stigm. 4-gon. Bacca drupacea.

I. Elemifera. A. fol. ternatis, quinato-pinnatisq. subtus tomentosis. Syst. veg. ed. 14.

Cornus &c. Plum. ic. 100.

Frutex &c. Catesb. car. 2. tab. 33. f. 3.

In Carolina H.

Planta fruticosa. Foliol. ovata, acumin. obsolete serrata, subtus villosa, & foraminulata. Fl. racemis compositis. Petal. apice inflexa. Bacca subrotund. 1-locul. *Differet a sequenti.*

2. sylvatica. A. fol. ternatis, acutis, crenatis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. ed. pi^{ct} tab. 108.

In Carthagene sylvis umbrosis H.

Frutex sub 15-ped. parum ramosus, succo Terebinthino, odore forti, & ingrato. Foliol. 2-pollic. ovat-lanceol. aut cordato-ovata, vel rhombæa, nitida. Racemi axillar. & terminal. erecti, paniculati. Fl. exigui. Petal. nivea. Drupa pisiform. rubra, cum succo rubro.

3. maritima. A. fol. ternatis, obtusis, crenulat. Syst. veg. ed. 14.

In America 24.

An prioris varietas? Frutex nanus, succo gratiore *Rutæ* quiddam spirante. Foliol. vix pollic. nitida. Fl. ut in priore. Fruct. duplo ma. nigri, succo purpur.

4. *gileadensis*. A. fol. ternatis, integerr. peduncul. lateralibus, 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

In Arabia felici ♂.

Frutex ramis purpurascen. substriat. gemmis protuberant. Fol. e gemmis conferta, petiol. lævia. Foliol. sessil. lanceol. acutiuscula, impari parum ma. cuneiformi-lanceol. Fl. inter fol. terni. Petal. sessil. elliptica.

5. *Opobalsamum*. A. fol. pinnat. foliol. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Balsamum. *Bell. ic. 110. Alp. Eg. tab. 60.*

In Arabia ♂.

Frutex altitudine *Ligustrum*. Foliol. parva, ternqua-septena, cum impari. Fl. similes *Acaciae*, ex albo-purpur. odori. Folliculi nigrorubent. Sem. flava.

6. *toxifera*. A. fol. pinnat. foliol. petiolat. planis. *Syst. veg. ed. 14.*

Toxicodendron &c. *Catesb. car. I. tab. 40. See-ligm. au. ic. 2. tab. 80.*

In Carolina.

Arb. pumila, ex quo liquor emanat nigerrim. Foliol. ovat-oblon. cum impari, opposita, semper virent. Racemi pl. axillar. fl. sparsi. Fruct. purpur.

7. *Protium*. A. fol. pinnat. foliol. petiolat. undulat. *Syst. veg. ed. 14.*

Tingulong. *Rumph. amb. 7. tab. 23. f. 1.*

In India orient. ♂.

Aib. fol. opposit. Foliol. 5-7. laurina, petiol. glabra. Fl. panicula multiplex. Petal. sessil. ovat-acum. Nectar. e receptacul. marginato.

8. *ambrosiaca*. A. fol. pinnat. petiolat. paniculis axillar. confertis. *Syst. veg. ed. 14 Lin. Suppl.*

Icica heptaphylla. *Aubl. Guian. tab. 130.*

In India orient. ad litora maris ♂.

Arb. 30-ped. Fol. alterna. Foliol. 5-6. ovat-oblon. acuta, glabra; petiolis basi gibbis. Fl. albo-flavescens. Bacca lauriform. ovata, obliqua. Necleus pulpa viscosa rubra. Arbor tota

odoratiss. detruncata fundit balsamum album,
odoratiss. cuius usus est in dysenteria, pro dosi
dr. 1. in vino rubro. Fructus ruber, pulpa vi-
scosa, odore, & sapore balsamico, quæ indurescit
in resinam griseam, ad suffimenta uilem.

9. *balsamifera*. A. fol. 2-3-iugis. Syst. veg. ed. 14.

Lauro &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 168. f. 4.

Lucinium &c. Pluk. alm. tab. 201. f. 3.

In Jamaica ♂.

Arb. 20-ped. ramis reclinatis, quandoq. spinosis,
 ligno odore grato. Fol. ramulis adnata, ala-
 ta, abrupte pinnat. Pinnae subrotun. subunc.
 Fl. terminal. fasciculati: *Sambuci* ænuli. Cor.
 candida. Fruct. grani Piperis magnitudine.

Guianensis. A. fol. impari-pinnat. foliol. bijugis, ovat-ob-
 long. fructu racemoso, luteo. Aubl. Guian.
 Terebinthus &c. Sloan. Jam. 2. tab. 199. f. 3.
 In Guiana ♂.

Eruitur resina subrubra, odore Citri.

Kataf. A. fol. ternatis: apice serratis: pedunc. dichoto-
 mis. Forsk. Æg.

In Arabia ♂.

Arb. ligno albo: rami inermes. Fol. varia, ob-
 tusa, vel acuta. Pedunc. veluti corymbosi,
 dein dichotomo-ramosí, incarnati. Petal. vi-
 rid. acuta, apice recurvo. Bacca globosa,
 umbilicata.

Kafal. A. Forsk. Æg.

In Arabia ♂.

Simil. priori, sed arbor procerior, ligno rubro.
 Fol. uniora acuta, villosa; antiqua saepe ob-
 tusa, glabra. Ramuli apice parum spinosi.
 Baccæ compressæ, utrimq. subcarinatæ, apice
 puncto nigro prominulo. Utriusq. fol. ternata:
 foliol. sessilia, apice incisi; lateral. min. ova-
 ta, obliqua; medium maius, pollic. inverse
 ovat. h. si angustatum. *Uraq. sp. spirat odorem*
Balsami fragrantiss.

zeylanica. A. fol. pinnat. petiolat. glabris: racemis axillar.
 interruptis: fl. involucrat. hexandris. Retz.
 Obs. fasc. 4.

In Zeylona ♂.

Arb. cortice cinereo. Fol. quinque-septena: fo-
 liol. petiol. ovata, acuta, integerr. nuda, ve-

nis fere transversalibus. Pedunc. elongati, tomentosi. Involuc. sessil. cordata, tomentosa. Cal. coriaceus, subglobosus, 3-dent. tomentosus, cor. maior. Petal. 3. cava, extus tomentosa, margine fusco, nudo. Stam. 6. Drupa sesquipoll. ovata, secca. Nux olea, crassa. Fundit Elemi Off. orientale, ab americano eius nomine diversum.

Numero partium fructificationis differt.

580. XIME- Cal. parvus, 4-fid. Petal. 4. pilosa, revoluta, NIA. concava. Drupa 1-sperm.
i. americana. X. fol. oblong. pedunculis multiflor. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 177. f. 31. ed. piat. tab. 107.

In America ♂.

Arbusc. 15-ped. Fol. 2-pollic. alterna, petiol. ovat--oblong. integerr. emarginata, glabra. Spina axillar. subulata. Racemus multifl. inter spinam, & ramum. Fl. albidi, odore suavi. Fructus ovi columbini magnitudine, lutei, nitidi. An Stam. 7?

- 2. inermis*. X. fol. ovatis: pedunc. 1-fl. Syst. veg. ed. 14.
In Jamaica ♂.

Arb. fol. glabris, vetustioribus confertis, petiolis subemargin.

581. FUCH- Cal. o. Cor. 8-fid. Bacca infera, 4-locul. poly- SIA. sperm.

- i. triphylla*. F. pedunc. 1-fl. Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. tab. 133. f. 1.

In Amer. meridion.

Radix brachiata. Caul. herbac. simplex. Fol. ter- na, sessil. lanceol. integerr. venosa. Racemus terminal. erectus. Cor. coccinea. Bacca ovata.

- 2. multiflora*. F. peduncul. multifl. Syst. veg. ed. 14.
In America.

- 3. excorticata*. F. fol. alternis, ovatis: pedunc. axillar. 1-fl. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Skinnera excorticata. Forsk. Æg.

In nova Zeylandia ♂.

Arb. glaberr. Fol. longe petiol. tenuissime ser- rata, subtus canescens. Pedunc. solitar. Fl. ma: penduli.

582. CHLO- Cal. 8-9-phyll. Cor. 1-pet. 8-12-fid. Caps. 1-lo- RA. cul. 2-valv. polysper.

- i. perfoliata*. C. fol. perfoliatis Syst. veg. ed. 14. Sabb.: hort. I. tab. 100. Renelmi. sp. tab. 76.

*Centaurium &c. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 26. f.
I. 2. Clus. hist. 2. p. 180.*

In Europa, Oriente ♂.

*Planta cubital. glauca, glabra, apice brachiata.
Caul. erectus, ramis paucis, erectis, oppositis.
Fol. opposita, integerr. inferior. ovata;
caulina basi lata, cordat-lanceol. Fl. terminal.
parvi. Cor. flava. Var. fol. angustioribus: &
fol. ternis,*

2. imperfoliata. C. cor. 6-fid. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In extrema Italia ♂.

*Caul. erectus, palmar. simplex, herbac. 4-gonus,
lævis. Fol. opposita, subamplexicaul. ovata,
acuta, lævia. Flos terminal. pedunculat. fol.
maior, flavus.*

*Facies Chloræ, sed genus dubium. Cal. 1-phyll.
nec laciniae linear. Cor. 6-fid. nec 8-fida. Styl.
2. conglutinati.*

3. quadrifolia. C. fol. quaternis. Syst. veg. ed. 14.

In Europa australi.

*Planta matre Gentiana persoliata, patre Lino qua-
drifolio. Caul. spitham. simpl. sub 4-gon. arti-
culat. Fol. verticillato-quaterna, linear. ad api-
cem paulo latiora, obtusiuscula. Pedunc. ter-
minal. 5. bracteati.*

4. dodecandra. C. fol. oppositis. Syst. veg. ed. 14.

In Virginia.

583. DODO-Cal. 4--phyll. Cor. o. Caps. 3-locul. inflata.
NÆA. Sem. bina.

1. viscosa. D. fol. oblongis. Syst. veg. ed. 14. Trew. ehret.
t. 19 i.

Triopteris &c. Brow. Jam. tab. 18. f. 1.

Aceri &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 162. f. 3.

Caryophyllaster &c. Rumph. amb. 4. tab. 50.

Arbuscula &c. Pluk. phyt. 142. f. 1.

In Indiæ locis arenosis ♂.

*Frutex 5-pedal. totus viscosus, foetidus. Fol.
alterna, subpetiol. oblonga cum acumine, ob-
tususc. basi attenuata, integerr. in planta te-
nella plerumq. repanda, vel ferrata, viscosa.
Racemi valde variant. Fl. herbacei. Pistil. lon-
giss. Fructus Ulmi, sed triplici ala.*

2. angustifolia. D. fol. linearibus. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In India australi ♂.

*Simil. priori, sed fol. lanceol-linear. Fructificatio
polygama.*

584. LAWSO- Cal. 4-fid. Petal. 4. Stam. 4-parium. Caps. 4-
NIA. loc. polysper.

1. *inermis*. L. inermis: fol. subsessil. ovatis, utrimq. acutis.
Syst. veg. ed. 14.

Alhenna. *Walh. hort. 3. tab. 4.*

Pontaletsce. *H. mal. 4. tab. 57.*

Cyprus. *Rauw. it. tab. 60.*

In India, Ægypto ♂.

Adfinis maxime L. *spinosæ*, ut forte cultura mi-
tior facta. Petal. cœrul.

2. *Acronychia*. L. inermis; fol. longe petiolat. cuneiform. *Syst.
veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Acronychia lærvis. *Forst. gen.*

In nova Caledonia ♂.

Difserit a priore fol. longe petiolat. ad insertio-
nem subarticulat. calyc. omnium minimo: pe-
tal. non planis, ovatis, sed linearibus, apice
ungue reflexo.

3. *spinosa*. L. ramis spinosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Rhamnus &c. *Pluk. alm. 220. f. 1.*

Cyprus. *Rumph. amb. 4. tab. 17.* Mail-anschi.
H. mal. 1. tab. 40.

In India ♂.

Arb. 3-orgyal. ramis densis, late sparsis. Fol.
solitar. vel opposita, breviter petiol. parva,
ovalia, tenuia, glabra, subnitent. saporis a-
mari. Fl. axillar. racemosi, parvi, odori, pe-
duncul. rubris. Petal. crispa, subflava. Caps.
subrotun. cum spiculo in vertice, calyce arcte
contenta, primum virid. dein rufescens, po-
stea nigra.

585. MEME- Cal. superus, fundo striato, margine integerr.

CYLON. Cor. 1-pet. Anth. insertæ lateri apicis filamen-
ti. Bacca coronata calyc. cylindrico.

1. *capitellatum*. M. fol. ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Cornus &c. *Burm. zeyl. tab. 30.*

In Zeylona ♂.

Arb. ramis teretibus. Fol. opposita, breviter pe-
tiol. obtusiusc. integerr. glabra. Pedunc. axil-
lar. breves, oppositi, solitar. Fl. capitati.
Cal. parvus, campanulat. sicuti & cor.

grande.

M. fol. acuminatis *Retz. Obs. fasc. 4.*

Habitat

Arb. grandis. Rami teretes. Fol. semiped. op-

posita, ovata, integerr. longe acumin. Pedunc. axillar. alterni, 4-5-fid. pedicell. multifl. Anth. incumbentes.

586. VACCI- Cal. superus, brevifl. 4-5-fid. Cor. 1-pet. 4-5-fid. Filamen. receptaculo inserta. Bacca globosa, 4-locul. polysper.

* *Fol. annotinis, seu deciduis.*

1. *Myrtillus*. V. pedunc. 1-fl. fol. ovat. serratis, deciduis: caud. angulato. *Syst. veg. ed. 14. Blak. tab. 463. Du-ham. arb. 2. tab. 107. Knorr. del. I. tab. f. 18. n. 1. Dalech. hist. 191. 192. Math. 231.*

In Europæ sylvis umbrosis ♂.

Frutex 2-ped. Fol. alterna, petiol. Pedunc. axill. sub calyc. rubri. Fl. unilateral. Cal. integer. Cor. ex albido-purpurasc. Bacca nigra, pollin. cœrul. tincta, vel alba. Filam. 10.

2. *flamineum*. V. pedunc. solitar. 1-fl. antheris corolla longioribus: fol. oblong. integerr. *Syst. veg. ed. 14. Vitis idea &c. Pluk. alm. tab. 339. f. 3.*

In Amer. septentr. ♂.

Frutex. Pedunc. axill. filiform. Cor. 5-fid. campanul-patent. Anth. 10. Syl. flore longior.

3. *uliginosum*. V. pedunc. 1-fl. fol. obovat. obtusis, integerr. lævibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 231. Vitis idæa. II. Clus. hist. 1. tab. 62. Camer. hort. 182.*

In alpibus uliginosis ♂.

Frutex 1-2 ped. ramosus, superne foliosus. Fol. glabra, venosa; tenella basi ciliata. Flos nutans. Cor. ovalis, albo-rosea, denticul. reflexis. Bacca cœrul.

4. *hirtum*. V. pedunc. 1-fl. fol. ovat. serratis: ramis teretibus, divaricatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jep.*

In Japonia ♂.

Caul. frutesc. ramosiss. Rami ferrugin. Fol. annua, unguicular. inæqual. alterna, subsessil. patentia, acutæ, villosa, subtus paullo pallidiora. Fl. in ramulis sparsi, solitar. cernui. Cor. lacin. revolutis.

5. *album*. V. pedunc. simplicibus: fol. ovat. integerr. sub-tus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Pensylvania ♂.

Frutex. Fl. 2-3. peduncul. adgregatis, breviss.
nudis.

6. *mucronatum*. V. peduncul. simpliciss. 1-fl. fol. ovatis, mucro-
nat. integerr. glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

In Amer. septentr. H.

Frutex ramis teretibus, glaucis. Fol. elliptica,
petiolis canaliculat. innixa.

7. *corymbosum*. V. fl. corymbosis, ovatis: fol. oblong. acumi-
nat. integerr. *Syst. veg. ed. 14.*

In Amer. septentr. H.

Frutex. Fol. nervis subtus villosis. Corymbi ex
gemmaceo involuc. sessiles. Cor. cylindrico-
ovat. longior præ reliquis. Stam. 10.

8. *frondosum*. V. racemis filiform. foliosis: fol. oblong. inte-
gerr. *Syst. veg. ed. 14.*

In Amer. septentr. H.

Frutex. Cor. ovato-campanulata. Stam. 10.

9. *ligustrinum*. V. racemis nudis: caul. fruticoso: fol. oblong.
crenulat. *Syst. veg. ed. 14.*

In Pennsylvania H.

Fl. in racemis alternis, numerosis; desituti bra-
cteis, seu foliolis.

10. *bracteatum*. V. racemis solitar. fol. acutis, ferratis. *Syst. veg.*
ed. 14. Thumb. Jap.

In Japonia H.

Caul. fruticosus, glaber. Rami, & ramuli alter-
ni, divaricati. Fol. caulina alterna, breviss.
petiol. ovata, margine revoluto, venosa, pol-
lic. racemorum lanceol. lineam longa. Fl. ra-
cemosi, secundi. Racem. axillar. digital. pa-
tentiss. Bract. in medio pedunc. binæ. Cor.
cylindr. alba.

11. *ciliatum*. V. racemis foliatis: fol. ovatis, integris, hispi-
dis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia H.

Caul. fruticos. cinereus, glaber. Ramuli alterni,
erecti, villosi. Fol. ramea sparsa, acuta, ner-
vosa, inæqualia, 1-2-pollic. Racemorum lan-
ceol. glabra, semiunguicul. Fl. secundi. Ra-
cemus terminal. digital. Cal. breviss. Cor. ru-
bra.

12. *Arctostaphylos*. V. fl. racemosis: sol. ovat. acutis, crenulatis:
caul. arboreo. *Syst. veg. ed. 14.*

Vitis idæa &c. *Tourn. it. 2. tab. 223.*

In Cappadocia H.

OCTANDRIA MONOGYNIĀ.

Racemi fol. longiores; infra fol. sui, foliol. ovatis instructi. Cor. variegata.

** *Fol. sempervirentibus.*

13. *Vitis idaea*. V. racemis terminal. nutantibus: fol. obovatis, integerr. revolutis, subtus punctatis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 40. Knorr. del. I. tub. S. 18. n. 2.

Vitis idaea &c. Cam. epit. 136.

In Europæ sylvis macris H.

Caul. pedal. repens, ramosus, teres. Fol. crassa, nitida, subtus albida. Pedunc. breves, colorati. Cor. carnea. Bacca rubra, vel alba.

14. *Oxycoccus*. V. fol. ovatis, integerr. revolutis: caulis repentibus, filiform. nudis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 80. Black. tab. 593.

Vaccinia palust. Loh. ic. 109. Dod. pent. 770.

In Europæ paludibus Sphagno repletis U.

Fol. alterna, elliptica, dissita, secunda, subtus albida. Racemus brevissim. peduncul. longiss. coloratis; bract. 2. alternis. Cor. profunde 4-fid. revoluta, rubella. Bacca rubra.

15. *hispidulum*. V. fol. ovatis, integerr. revolutis: caulis repentibus, filiform. hispidis. Syst. veg. ed. 14.

Vitis idaea &c. Pluk. alm. tab. 320. f. 6.

In Amer. septentr. paludosis U.

Strudura prioris, sed omnia maiora; & caul. squamis setaceis imbricatus.

587. ERICA. Cal. 4-phyll. Cor. tubulosa, 4-fid. Filam. receptac. inserta. Anth. 2--fid. Caps. 4--locul. 4--valv. polysper. Fol. tenuissima.

* *Anth. aristatis; fol. compositis.*

1. *vulgaris*. E. anth. aristat. cor. campanul. subæqualibus: calycibus duplicit: fol. oppositis, sagittatis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 677.

E. I. Matth.

In Europæ campestribus sterilibus frequens H.

Fruticulus. Fol. in 4 series imbricata. Bracteol. sub singulo fl. Cal. coloratus. Cor. rubra, vel alba, aut ex purpuro-violac.

2. *lutea*. E. anth. aristat. cor. ovat. acuminat. fl. congestis: fol. opposit. linearibus. Syst. veg. ed. 14.

Ad cap. b. Spei.

Caul. plusquam pedal. ramis angustis. Fol. opposita,

posita, breviter petiol. adpressa, fere imbricata, linear. Cal. flavescentia. Cor. subrostrata, lutea.

— foliis ternis.

3. *halicacaba*. E. anth. aristat. cor. ovatis, inflatis: fl. solitar. stylo inclusi: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Æthiopia ♂.
 Frutex altus. Rami purpurasc. ramuli subtoment. albi. Fol. confertiss. lævia, margine scabra. Cor. purpurasc. glabra, magnitudine glandis quernæ.
4. *regerminans*. E. anth. aristat. cor. ovatis, stylo inclusi; calyc. acutis; fl. racemosis: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei ♂.
 Caul. frutesc. determinate ramosus, ramis iuncceis. Fol. linearis-subul. acumin. lævia, patula. Fl. secundi, nutantes, peduncul. incarnatis: bracteis remotis, minutis, coloratis. Cal. ruber. Cor. globosa, rubra. Ramus spicam continuat.
5. *Monsonia-*
na. E. anth. aristat. cor. oblong-inflatis; styl. inclusi; calyc. calyculato: fl. terminalibus ramulorum obtusorum: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14.* *Lin.*
Suppl.
In interiori parte Africæ.
 Rarissima, & Ericarum speciosiss. fl. magnis, albis: stamin. aristatis.
6. *mucosa*. E. anth. aristat. cor. subglobosis, mucosis; styl. inclusi: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei ♂.
 Caul. frutesc. determinate ramosus, lineis albis, decurrentibus, subulat. sub cicatricibus folior. Fol. adpressa, linear. lævia. Fl. terminal. sub-umbellati. Bract. remoræ, minutæ, lineares. Cal. scariosus. Cor. col. ferreo.
7. *bergiana*. E. anth. aristatis: cor. campanulat. stylo inclusi; calyc. reflexis: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei ♂.
 Frutex 2--ped. pubescens. Fol. erecta, linearia, subciliata. Fl. terminal. subsolitar. brevissime peduncul. Cor. (*Convallaria maialis*) purpur.
8. *depressa*. E. anth. aristat. cor. campanulat. stylo inclusi: fl. rariss: fol. ternis: caul. depresso. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. procumbent. copiosi , palmar. Fol. lanceol. obtusiusc. carinata , lævia . Fl. sparsi , solitar. Cal. scariosus . Cor. rubra .

9. pilulifera. E. anth. aristat. cor. campanulat. stylo incluso : fl. umbellat. fol. ternis . Syst. veg. ed. 14.

In Æthiopia H.

Caul. fruticosus , dodrant. & ultra , purpurasc. inferne subdichotom. Rami brunnei , foliosi . Fol. petiol. linearis-subul. glabra . Fl. peduncul. Cor. globoso--campanul. dilute purpurasc. Bract. 3. linear. parvæ , ciliatæ .

10. viridipurpurea. E. anth. aristat. cor. campanulat. stylo incluso : fol. (plerumque) ternis : fl. sparsis . Syst. veg. ed. 14.

E. corios fol. 3. Clus. hist. 1. p. 42.

In Lusitania H.

Frutex humilior . Fol. imbricata , lanceol. Fl. racemosi , unilateral. ex herbaceo-purpur. Variat fol quaternis .

11. pentaphylala. E. anth. aristat. cor. campanulat. stylo incluso : fol. ternis : fl. pubescentibus . Syst. veg. ed. 14.

E. africana &c. Seb. mus. 1. tab. 21. f. 2.

Ad cap. b. Spei H.

Caul. fruticos. pedal. cinereus : rami sparsi , foliosi . Fol. unguicul. petiol. linear. utrimq. plana , subtus albido-tomentosa . Fl. umbellati . Bract. 3. Cor. maiusc. pyramidali-cylindr. ore obtuso , erecto ; truncata , villosa , alba .

12. nigrita. E. anth. aristat. cor. campanulat. styl. incluso ; calycibus imbricat. 3--fl. sessilibus . Syst. veg. ed. 14.

E. africana &c. Seb. mus. 2. tab. 9. f. 7.

Ad cap. b. Spei H.

Caul. fruticosus . Fol. terna , subtriquetra , brevia , patula , glabra . Bract. 3. facie calyc. Fl. terminal. 3-4. albi . Anth. nigræ .

13. planifolia. E. anth. aristat. cor. campanulat. stylo exerto : fol. ternis , patentiss. Syst. veg. ed. 14.

E. africana &c. Pluk. mant. tab. 347. f. 1.

Ad cap. b. Spei H.

Caul. fruticos. procumb. spitham. flaccidus , mox ramosus . Fol. frequentia , patentia , ovata , acuta , ciliata , subpubesc. Fl. axillar. oppositi , nutantes . Cor. violac.

14. scoperia. E. anth. aristat. cor. campanulat. stigmate exser-

to, peltato : fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14. Lob.*
ic. 2. p. 215.

E. corios fol. IV. Clus. hist. I. 4. 2.

In Europa australi ♂.

Frutex 2-cubit. & ultra. Rami albi. Fol. brevi tempore diffluunt, patentia. Fl. axillar. sessil. verticillati. Cor. herbacea.

15. *arborea*. E. anth. aristat. cor. campanulat. stylo exerto : fol. ternis ; ramulis incanis. *Syst. veg. ed. 14.*

E. corios fol. I. Clus. I. p. 4.

In Europa australi ♂.

Frutex erectus, 6-ped. ramosus, albidus. Fol. copiosa, erecta, non patula, pene subulata, glabra. Fl. numerosi, in mediis ramis, pendul. ramosis, paniculati. Cor. *Convallariæ*, brevis, lata, alba.

16. *vespertina*. E. anth. aristat. cor. campanulat; stylo exerto : fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Frutex erectus, ramis ternis. Fol. adpressa, triquetra, lævia. Panicula fl. nutantibus, alternis, albis, bracteatis. Pedun. albi.

— fol. quaternis.

17. *ramenta-* E. anth. aristat. cor. globosis ; styl incluso, stig-
cea. mate duplicito : fol. quaternis, tetaceis. *Syst.*
veg. ed. 14.

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. fruticosus, pedal. ramosus, fuscociner. Rami longi, filiform. ramentacei, ferruginei. Fol. erecta, adpressa, petiolat. angustiss. Fl. umbellati. Cor. purpur. Stigma inferius subrotund. superius 4-fid.

18. *persoluta*. E. anth. aristat. cor. campanul. styl. inclusio ; calyc. ciliatis : fol. quaternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. fruticosus, pedal. læviuscul. ramis pubescent. Fol. erecta, petiol. linearia, obtusa, subtus canalicul. hispida, aut subscabra. Fl. umbellati, dispersi in summis ramulis. Cal. minutiss. Cor. obtusa, pallida.

19. *Tetralix*. E. anth. aristat. cor. ovatis ; styl. incluso : fol. quaternis, ciliat. fl. capitatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Fl. Dan. tab. 81.

In Europa borealis paludibus cespitosis ♂.

Caul. fruticosi, fere pedal. ramosi, fusci. Fol. ovat-linear. patentia, prope fl. cauli adprelia, margine inflexo. Fl. imbricati, unilateral. Cor. ampla, carnea, raro alba. *Bis in anno floret.*

- 20. pubescens.** E. anth. aristat. cor. ovatis; styl. inclusi: fol. quaternis, scabris: fl. sessil. lateralibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Æthiopia ♂.

Caulis fruticosus, plusquam pedal. fuscus. Fol. petiol. Fl. subquaterni. Bract. 3. Cor. pubescens, sordide purpurascens.

- 21. abietina.** E. anth. aristat. cor. grossis: stylo inclusi: fol. quaternis: fl. sessilibus. *Syst. reg. ed. 14. Buxb. cent. 4. tab. 41. 42. Leb. mis. I. tab. 21. f. 1.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. fruticosus, erectus, cinereus: rami terni, foliosi; ramuli adgregati. Fol. petiol. linearisubul. glabra, vix unguicular. Fl. verticillati, 4-8 nutantes. Cor. magna, fol. duplo longior, erecta, cylindrica, coccinea.

- 22. mammosa.** E. anth. aristat. cor. grossis: stylo exerto: fol. quaternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Frutex lineis albis subulat. Fol. conferta, subulata, margine scabra. Fl. subcapitati, pollicar. Cal. sanguineus. Cor. E. cerithoides, longiss. ore obtuso, sanguinea.

- 23. caffra.** E. anth. aristat. cor. ovatis; stylo exerto: fl. quaternis, pubescentibus: fl. congestis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Æthiopia ♂.

Magnitudo Juniperi. Fol. linearisubul. Fl. axill. Cor. limbo parvo.

- 24. sessiliflor-**
ra. E. anth. aristat. cor. clavatis; stylo exerto: spica fl. sessil. oblongis, deflexis: fol. quaternis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Frutex facie Pini sylv. min. determinate ramosus, fuscus, scaber. Fol. confertiss. linear. tature virid. Spica oblonga, undiq. ambiens: fl. imbricati. Cor. sœpe cernea.

— *Foliis sparsis.*

- 25. fascicularis.** E. anth. aristat. cor. grossis; styl. inclusi: fl.

fasciculatis : fol. pl. linear. truncatis . *Syst. veg.*
ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. fruticosus , erectus , 2-ped. compositus . Fol.
conferta , sparsa , pollic. linear. fere filiform.
erecto-patula , lœvia . Fl. fattigiat . Cor. purpur.

** *Anth. cristatis : fol. ternis .*

26. *triflora* . E. anth. cristatis : cor. globoso-campanul. styl.
incluso : fol. ternis : fl. terminalibus . *Syst. veg.*
ed. 14.

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. fruticos. aphyll. fuscus , hirsutus . Rami ,
& pedunc. tomentosi . Fol. 2. unc. longa , petiol.
linear. obtusa , decidua . Fl. copiosi , terni , con-
gesti , pedunculati , nutantes , carnea . Bract.
3. linear. Cor. longitudine calyc.

27. *baccans* . E. anth. cristatis : cor. globoso-campanul. rectis ;
styl. incluso : fol. ternis , imbricatis . *Syst. veg.*
ed. 14. Seb. mus. I. tab. 21. f. 3. Pluk. phyt.
tab. 279. f. 3.

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. erectus , ramosus . Fol. imbricata , linear.
obtusiusc. margine scabra ; petiol. albis . Fl.
terminal. subterni , nutantes , magnitudine Pisi ;
peduncul. purpur. Cal. inflexus , incarnatus .
Cor. rubra . Anth. breviss. flavicantes .

28. *gnaphalo-*
des . E. anth. cristatis : cor. ovatis , rectis ; styl. in-
cluso : fol. ternis : stigm. 4-part. *Syst. veg. ed.*
14. Pluk. mant. tab. 346. f. 11.

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. pedal. Fol. breviss. obtusa , pubescent. Fl.
copiosi , laterali-panicul. subterni . Cor. subro-
tunda , carnea .

29. *corifolia* . E. anth. cristatis : cor. ovatis ; styl. incluso ; ca-
lyc. turbinatis : fl. umbellatis . *Syst. veg. ed. 14.*
Seb. mus. I. tab. 21. f. 3. Pluk. mant. tab.
346. f. 5. Pet. gaz. tab. 3. f. 7.

In Æthiopia ♂.

Caul. fruticosus , compositus . Fol. linear. gla-
bra . Umbell. sessiles . Bract. in fungulo pedunc.
3. purpur. Cal. & cor. purpur.

30. *articulatis* . E. anth. cristatis : cor. ovatis , acuminat. styl.
incluso , calyce longiore : fol. ternis . *Syst.*
veg. ed. 14.

Ad cap. b. Spei ♂.

Frutex. Fol. adpressa, linear. glabra. Fl. racemosi, peduncul. Bract. solitar. & binæ, calycis facie, & col. Cal. incarnatus. Cor. alba. Anth. fusca. Syl. atro-purpur. Stigm. apice cœruleesc.

31. calycina. E. anth. cristatis: cor. ovatis; styl. inclusa; calyc. patentiss. rotatis: fol. ternis. Syst. veg. ed. 14. Seb. mus. 2. tab. II. f. 7.

Ad cap. b. Svei ♂.

Caul. fruticos. ped. cinereus, glaber, inferne simplex, dein trifido-dichotom erectus. Rami tridichotomi, foliosi. Fol. breviss. triquetra, obtusa, supra pubescent. subtus glabra. Fl. laterali-panicul. copiosi, subterni, terminal. pedicellati. Bract. alternæ. Cal. amplius, obtusus, coloratus. Cor. alba.

32. cinerea. E. anth. cristatis: cor. ovatis; styl. subexerto; stigmat. capitato: fol. ternis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 38.

Erica. 6. Clus. hist. I. p. 47.

b. Erica. V. Clus. hist. I. p. 43.

In Europa, Oriente ♂.

Caul. suffruticos. pedal. ciner. Fol. linear. patentia, supra glabra, nitida, transversim rugosa, subtus canalicul. sature virid. Fl. longe spicati, verticillato--glomerati. Cor. sature purpur. ut in *Arbuto*, vel cœruleesc.

33. paniculata. E. anth. cristatis: cor. campanulat; styl. exerto: fol. ternis: fl. minutis. Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 175. f. 2. Seb. mus. 2. tab. 44. f. 4.

In Aethiopia ♂.

Caul. fruticos. dodrant. & ultra, cinereo-purpurea. superne umbellatim divisus. Fol. petiol. linear. obtusiusc. erecta, lineam longa, 6-fariam laxe imbricata, fere lævia. Fl. copiosi, ut totam tegant plantam, in cylindrum conglomerati, parvi, cernui, purpur. ut etiam calyc. & pedunc.

34. australis. E. anth. cristatis: cor. cylindric. stylo exerto: fol. ternis, patentibus. Syst. veg. ed. 14.

In Hispania ♂.

Frutex erectus, rigidus, cinereus. Fol. linear. obtusa, margine subscabra. Fl. terminal. 2-3. sublessil. laciniæ cor. canescentes.

— *Foliis quaternis.*

35. *physodes*. E. anth. cristatis : cor. ovatis, inflatis ; styl. inclusus : fol. quaternis : fl. subternis. *Syst. veg.* ed. 14.

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. fruticosus, foliosus, fusco-cinereus. Rami breves, simplices, supremi subdiviti. Fol. imbricata, petiol. lato-linear. patula, carinata. Fl. cernui. Bract. 3. ovatæ, in pedunculo sitæ. Cal. coloratus. Cor. magnitudine *Pisi*, viscosa, pallida, ore rubicundo, marcescens.

36. *empetrifo-* *lia*. E. anth. cristatis : cor. ovatis : fol. quaternis : fl. lateralibus, sessilibus. *Syst. veg.* ed. 14.

In Aethiopia ♂.

Caul. fruticos. subped. subdichotom. purpur. Fol. sparsa ut *Lycopodii*, quasi spiraliter, unde numerus difficilis; linear. obtusa, erecto-patentia, incurva. Fl. subspicati. Spica ovata. Cor. superne purpur.

37. *cernua*. E. anth. cristatis, inclusis : fl. capitatis, ovatis : calyc. ciliatis : fol. quaternis. *Syst. veg.* ed. 14. *Lin. Suppl. Act. Ups. vol. 2. tab. 9. f. 3.*

Ad cap. b. Spei.

38. *retorta*. E. anth. subcristatis : cor. ovat-oblongis : styl. mediocri : fol. quaternis, recurvis. *Syst. veg.* ed. 14. *Lin. Suppl. Act. Stock. 1774. tab. 7.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. frutescens, determinate ramosus, scabriusc. Fol. oblong-ovata, setula terminata, supra convexa, glabra, lucida. Fl. terminal. corymbosi, subsessil. Cal. ruber. Cor. inflata, viscida.

*** *Anth. muticis, inclusis : fol. oppositis.*

39. *tenuifolia*. E. anth. muticis, inclusis : cal. corollisq. sanguineis : fol. oppositis. *Syst. veg.* ed. 14. *Seb. mus. 2. tab. 9. f. 8.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. ped. nudus. Fol. linear. obtusa, carinata. Fl. 3-4. adgregati. Bract. 4. foliiform. calyci concolores. Cor. parva, ovata.

40. *Passerinæ*. E. anth. muticis, inclusis : cor. campanulat. pi-

still. exserto : fol. opposit. *Syst. veg. ed. 14.*

Lin. Suppl. An. n. act. Ups. vol. 2. tab. 9. f. 17.

Ad cap. b. Spei ♂.

Fl. terminal. solitar. peduncul. Pedunc. albido-tomentosi.

— *Fol. ternis.*

41. *albens.* E. anth. muticis, inclusis : cor. ovat-oblong. acutis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. frutescens. Fol. linear. triquetra, erecta, lævia, acutiuscul. Cal. scariosus, albus. Cor. alba, ventre hyalino. Anth. 2-fid.

42. *spumosa.* E. anth. muticis, inclusis : cor. ternis calyc. comm. obtectis; styl. exserto : fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14. Seb. mus. 2. tab. 9. f. 10. mala.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. fruticos. pedal. & ultra. Fol. brevia, petiol. linear. glabra. Fl. solitar. sessil. erecti. Cor. albido-subdiaphana. Cal. sanguineus. Styl. longiss. nutans.

43. *capitata.* E. anth. muticis, mediocribus; cor. tectis calyc. lanato : fol. ternis : fl. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Pet. gaz. 5. tab. 2. f. 10. Seb. mus. 1. tab. 20. f. 1.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Dignoscitur fl. globofisis, lanugine luteo-viridi obtectis. Caul. fruticos. cinereo--purpur. Fol. erecta, petiol. linear. punctis elevatis utrimq. scabra; superiora hirsuta. Fl. lateral. solitar: Cor. semi-4-fid. calyce non longior, obtusa, hirsuta, rubicunda.

44. *melanthera.* E. anth. muticis, mediocribus: cor. campanulat. cal. colorato longioribus: stylo exerto: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. fruticosus, flexilis. Fol. linear. obtusa, lævia, patula. Fl. terminal. subumbellati, confertim sparsi, subnutantes. Pedunc. purpurasc. Cal. & cor. sanguinea, lacinias subrotund-ovat. Anth. 2-fid. atræ.

45. *Thumber.* E. anth. muticis, mediocribus: cor. planis, tubigii. bo globoso; stylo exerto: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Act. Ups. 2. tab. 9. f. 2. mala.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. raro ramosus, rufescens, teres. Fol. fere adpressa, sessil. linear. acuta, lœvia. Fl. terminal. peduncul. bracteati.

46. *absinthioi-* E. anth. muticis, inclusis; cor. ovat-campanul. styl. exerto; stigm. subinfundib. Syst. veg. ed. 14. *Pluck. phyt.* 47. f. 14.

Ad cap. b. Spei ♂.

Frutex statura *Absinthii*, paniculatus, caule rufo; ramis ternis. Fol. linear. extus gibba, subhirsuta. Fl. terminal. Cor. paliida. Anth. 2-fid. atropurpur. Stigm. purpur.

47. *ciliaris*. E. anth. muticis, inclusis: cor. ovatis, grossis; styl. exerto: fol. ternis (ciliatis): racemis secundis. Syst. veg. ed. 14.

In Lusitania ♂.

Caul. suffruticosus, 2-3-ped. Fol. saepe in verticilos obliquos disposita, sessil. ovata, acuta, margine reflexo. Racemus longus, fl. nutantibus. Cor. magna, ore contracto, inæquali, purpuro-cœrulea.

48. *hispida*. E. anth. muticis, inclusis: cor. subrotundis: fol. subternis, ovatis, acutis, ciliatis: caul. hispido. Syst. veg. ed. 14. *Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. decumbens, semiped. strigosus. Fol. subsessil. horizontaliter patula, lœvia. Fl. rarius sparsi, parvi.

49. *leucanthe-* E. anth. muticis, exsertis: fol. ternis: cor. campanul. cal. albo; stylo exerto: fl. ternis.

Syst. veg. ed. 14. *Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Cor. & anth. albæ.

— *Foliis quaternis.*

50. *tubiflora*. E. anth. muticis, inclusis: cor. clavatis, grossis; styl. inclusi: fol. quaternis, subciliatis. Syst. veg. ed. 14. *Seb. mus. 1. tab. 20. f. 4.* *Pluk. mant. tab. 346. f. 9.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Cor. pubescent. laciniis lanceol. incurvæ, carneo-purpur.

51. *curviflora*. E. anth. muticis, inclusis: cor. clavatis, grossis; styl. inclusi: fol. quaternis, glabris. Syst. veg. ed. 14. *Seb. mus. 2. tab. 19. f. 5.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Ad finis priori. Cor. pubescent. longiss. laciniis lanceol-subul. sed rami pilosi, & fol. glabra.

52. *coccinea*. E. anth. muticis subinclusis : cor. clavatis, grossis ; styl. incluso ; calyc. hirsutis : fol. quaternis. Syst. veg. ed. 14. Seb. mus. I. tab. 21. f. 4.

In Æthiopia H.

Caul. fruticos. Rami superne umbellatim dispositi. Fol. ramea sena, linearis-subul. pubescens-scabrida ; superior. quinata. Fl. lateral. copiosi, conferti. Cor. pubescens, coccinea.

53. *cerinthoides*. E. anth. muticis, inclusis : cor. clavatis, grossis ; stigm. incluso, cruciato : fol. quaternis. Syst. veg. ed. 14. Sem. mus. 2. tab. 22. f. 4. & tab. 34. f. 6.

In Æthiopia H.

Caul. fruticosus : rami compositi, foliosi, brunnei. Fol. petiol. linear. scabra. Bract. extus hirsutæ. Fl. subcapitati, pubescent. Cal. quasi duplicatus. Cor. maxima, hirsuta, rubra.

54. *fastigiata*. E. anth. muticis, inclusis : cor. hypocraterif. fasciculat. styl. incluso : fol. quaternis. Syst. veg. ed. 14.

Ad cap. b. Spei H.

Fruticul. ramis 4-fariam stria exaratis. Fol. linear. acumin. triquetra, lœvia, margine scabra, erecta. Fl. fastigiati. Cor. tubo cylindrico ; limbo 4-part. subtus rubro, supra albo, lacin. subcordat.

55. *cubica*. E. anth. muticis, inclusis : cor. campanulat. acutis ; styl. incluso : cal. 4-gono : fol. quaternis. Syst. veg. ed. 14.

Ad cap. b. Spei H.

Caul. fruticos. determinate ramosus. Fol. patentia, linear. acuta, subincurva ; petiol. albis. Fl. terminal. corymbosi. Pedunc. subtoment. bract. setaceis. Cal. scariosus. Cor. semi 4-fid. purpur. basi pallida. Anth. breviss.

56. *denticulata*. E. anth. muticis, inclusis : cor. ovat-infundibulif. stylo incluso ; calyc. denticulat. fol. quaternis. Syst. veg. ed. 14.

Ad cap. b. Spei.

Caul. distorti E. vulg. Fol. conferta, subteretia, patentiuscula, lœvia. Fl. terminal. subfascicul. Cal. duplicatus.

57. *viscaria*. E. anth. muticis, inclusis: cor. campanulat. glutinosis; styl. incluso: fol. quaternis: fl. racemosis. Syst. veg. ed. 14.
Ad cap. b. Spei ḫ.
 Caul. fruticos. determinate ramosus. Fol. linear. acuta, erecta, margine scabra. Bract. calycinæ adproximatæ. Cal. subulat. Cor. valde mucosa, purpurasc. semi-4-fid. lacin. erect. acutis. Anth. 2-fid.
58. *granulata*. E. anth. muticis, inclusis: cor. globosis: styl. incluso; cal. subimbricat. fol. quaternis. Syst. veg. ed. 14.
Ad cap. b. Spei ḫ.
Simil. E. ramentaceæ. Caul. determinate ramosus. Fol. linear. erecta. Fl. terminal. pauci, peduncul. Cal. breviss. scariosus. Cor. rubra. Anth. quasi bicornes.
59. *comosa*. E. anth. muticis, inclusis: cor. ovat-oblong. styl. incluso: fol. quaternis: fl. congestis. Syst. veg. ed. 14.
Ad cap. b. Spei ḫ.
 Caul. fruticos. pedal. erectus, obscure cinereus, ramis supra fl. congestis. Fol. linear. obtusiusc. erecta. Cal. scariosus, subdiaphanus. Cor. E. *albentis*, alba.
60. *Spermanni*. E. anth. muticis, subinclusis: capitulis 4-fl. cor. tubulosis, strigoso-hispidis: fol. quaternis, imbricat. ciliatis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad. Holm. 1778. tab. 2.
Ad cap. b. Spei ḫ.
Singularis est capitulis fl. semper divisis in 4. fl.
Capitulum, antequam fl. elongantur, globum echinatum efformat, ex patentiss. luteis setis folior. involueri, & calyc. Cor. hirsutiss.
61. *Maisonii*. E. anth. muticis, inclusis: cor. cylindric. grossis: fl. capitatis: fol. octofariis imbricat. pubescentibus. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad. cap. b. Spei ḫ.
 Caul. fruticos. filiform. fol. undiq. tectus. Fol. quaterna, conferta, breviss. elliptica, obtusa, ciliata.
- **** *Anth. muticis, ertis: folsex. ternis.*
62. *Pluknetii*. E. anth. muticis, longiss. exsertis: cor. cylindr. styl. exerto; cal. simplicibus: fol. ternis. Syst. veg. ed. 14.

OCTANDRIA MONOGYNIA.

Chamæpythys &c. *Pluk. mant. tab. 344. f. 3.*
Seb. mus. 2. tab. 25. f. 5.

In Æthiopia ♂.

Simil. sequent. sed cal. simpl. Cor. obsolete 4-fid.
phœnic. Fruticulus. Fol. conferta, terminal.
distantia, terna, crassæ petiol. linear. semite-
ret. Fl. lateral. solitar. vel binati, peduncul.
nutantes. Cor. phœnic longa, cylindrica, ore
obsolete 4-fid. Stam. cor. duplo longiora.

63. *Petiverii*. E. anth. muticis, longiss. exsertis: cor. acutis;
 styl. exerto; cal. imbricat. fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Frutex fuscus. Rami tecti ramulis ternis, bre-
 viiss. confertis, pubescentibus. Fol. conferta,
 subulata, subtrigona. Fl. terminal. solitar. cer-
 nui. Cal. subcartilagin. Cor. lutea, ore 4-fid.

64. *nudiflora*. E. anth. muticis, exsertis: cor. cylindric. styl.
 exerto: fol. ternis; ramis tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. flexuos. determinate ramosus, tomento-
 sus. Fol. erecta, linear. subtus sulco exarata.
 Fl. per ramos sparsi, copiosi. Cal. omnium
 minimus.

65. *Brunia-*
des. E. anth. muticis, exsertis: cor. tectis cal. lanato;
 styl. exerto: fol. ternis: fl. sparsis. *Syst. veg. ed. 14.* *Pet. giz. 5. tab. 2. f. 9.*

Eriocephalus &c. *Pluk. mant. tab. 347. f. 9.*

Frutex &c. *Seb. mus. 2. tab. 63. f. 7.*

In Æthiopia ♂.

Rami ramosi. Fol. patent. subciliata. Capitulum
 globosum. Cor. truncata, albida, stamin. rubris.

66. *imbricata*. E. anth. muticis, exsertis: cor. campanulat. calyc.
 imbricatis, stylo exerto: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. fruticos. pedal. purpur. 2--fid. apice pani-
 culato-ramosus. Fol. petiol. linear. subteretia,
 petiolis latiss., crassis. Fl. laterales, 2-3. Cor.
 tecta calyce, alba.

67. *umbellata*. E. anth. muticis, exsertis; cor. campanulat. styl.
 exerto: fol. ternis, acerosis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Lusitania ♂.

Caul. fruticos. varie ramosus, plerumq. inclinatus.

Fol. brevia. Umbell. terminal. simpl. Cor. cœrulescens. Anth. basi gibbosso-caudatæ.

— *Fol. quaternis, pluribusque.*

68. *purpura-* E. anth. muticis, exsertis: cor. campanulat; styl. scens. exerto: fol. subquaternis: fl. sparsis. Syst. veg. ed. 14.
Erica corios fol. VII. *Clus. hist.* I. p. 43.
In Europa australi H.
 Caul. procumb. Rami ped--cubit. atro-purpurasc.
 Cor. purpurasc. Anth. profunde 2-fid. Fol. in summis ramulis quina.
69. *vagans*. E. anth. muticis, exsertis: cor. campanulat. stylo exerto: fol. subquaternis: fl. solitar. Syst. veg. ed. 14.
In Africa, Tolosæ H.
 Caul. fruticos. scabriusc. Rami ultimi divaricati, albidi. Fol. linear. obtusiusc. conferta, breviuscula. Fl. ad latera ramulorum sparsi, peduncul. Cal. coloratus, breviss. Anth. 2-part.
70. *herbacea*. E. anth. muticis, exsertis: cor. oblong. styl. exerto: fol. quaternis: fl. secundis. Syst. veg. ed. 14.
Erica corios fol. VIII. *Clus. hist.* I. p. 44. *quaæ nostra planta hyemalis est.*
Erica corios fol. IX. *Clus. hist.* I. p. 44. *Jacq. Austr. tab. 32. quaæ nostra planta vernal. seu iunior fl. carneo.*
In Europa australiori, locis subalpinis H.
 Interdum unus, alter caulin. interdum densum format fruticulum. Fol. breviter periol. linear. acumin. patentiss. crassiusc. antice plana, subtus exiguo sulco exarata. Fl. primo vere carnei; in autumno virentes.
71. *multiflora*. E. anth. muticis, exsertis: cor. cylindric. styl. exerto: fol. subquinis: fl. sparsis. Syst. veg. ed. 14. *Garid. Aix. tab. 32. Bauh. hist.* I. p. 356.
In Gallia, Anglia &c. H.
 Simil. sequenti, sed rami non angulati. Altitudo humana. Fol. obtusa, basi gibba, patentia. Fl. purpurasc.
72. *mediterræ*. E. anth. muticis, exsertis; cor. ovat. styl. exnea. exerto: fol. plerumq. quaternis, patentissim. fl.

sparsis. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. I. p. 356.*
Erica coriosa fol. II. Clus. hist. I. p. 42.

In Austriae alpibus L.

Caul. ramis angulat. albicantibus. Fl. lateral. Cal.
coloratus. Cor. purpurasc. *Simil. priori*, sed
cor. omnino ovata: rami angulati, albi.

73. tetragona. E. fol. ternis: styl. inclusi; cor. 4-gona, oblong.
calyc. linearis: fl. racemosis, secundis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Fl. lutei E. *lutea*, sed longiores.

74. grandiflora. E. fol. quaternis: styl. exsertio; cor. cylindric.
calyc. simpl. fl. lateral. subcurvatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Simil. E. curviflora, sed fol. longiora.

Forskalii. E. (*verticillata*) verticilio ex ala fol. prodeunte.
Forsk. Ægypt.

Circa Constantinopolim.

Ad quodlibet fol. in iis verticillis, qui fl. quoque ferunt, pl. pedunc. oriuntur: apices ramorum raro floriferi, sed fl. medium caulem occupant.

verticillata. E. stylis exsertis: cor. magnis cylindric. pubescent. subverticillat. ramis verticillat. brevibus: fol. quinato-senis. *Berg. Fl. cap. Herm. Afric. 8.*

Ad cap. b. Spei L.

Caul. altus, fruticosus, fol. imbricatus. Fol. caulinis 6. ramea 5. linear. petiol. super. ciliata. Fl. laterali-verticill. 3-4. congesti. Cor. subincurva, rubicundo-purpur.

virgata. E. stigmatibus 4-lob. exsertis: cor. globo-campanul. numerosis, secundis: ramis virgatis: fol. ternis, hirsutis. *Berg. Fl. cap.*

Ad cap. b. Spei L.

Caul. pl. fruticosi, spitham. brunnei, aphylli: rami in formam pyramidal. congesti. Fol. subtereta, lineae, & ultra longitudine. Fl. lateral. subverticillati, terni, congesti, numerosi, parvi, nutantes. Cor. cinerea.

nudicaulis. E. anth. stylisq. inclusis: cor. umbellat. ovat. fol. subquaternis, subscabridis: caul. nudo, determinate ramoso. *Berg. Fl. cap.*

Ad cap. b. Spei L.

Caul. fruticos. ped. & ultra , simpl. brunneus . Rami erecti , umbellati . Fol. petiol. linear. imbricato-subpatula . Bract. 3. linear-lanc. ciliatæ , subalbid. Cal. carneo-rubicun. Cor. supra rubra , subtus cal. concolor .

588. OPHI- Invol. 2-valv. 3--fl. Cor. 4--pet. supera . Bacca RA . 1-locul.

O. Syst. veg. ed. 14.

In Africa H.

Frutex erectus . Fol. opposita , ovat--linear. Fl. lateral. sessil.

589. DAPHNE . Cal. o. Cor. infundibulifor. 4-fid. marcescens , stam. includens . Bacca 1-sperm.

* *Fl. lateralibus .*

1. *Mezereum* . D. fl. sessil. ternis , caulinis : fol. elliptico--lanceol. deciduis . *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 268. Ludw. ed. tab. 63. Kniph. cent. I. tab. 23. Knorr. del. I. tab. K. 6. Black. tab. 582.*

Dafnoide . Matth.

In Europæ boreal. sylvis H.

Caul. fruticos. Fol. sparsa , sessil. integerr. subtus dilutiiora . Spica ex fl. 2-3-4. cylindrica , caulem ambiens . Fl. odori , rubri , raro albi . Baccæ rubræ .

2. *Thymelæa* . D. fl. sessil. axillaribus : fol. lanceolat. caulis simpliciss. *Syst. veg. ed. 14. Ger. prov. tab. 17. f. 2.*

Thymelæa &c. Pluk. alm. tab. 229. f. 2.

In Hispania &c. H.

Caul. pl. palm. Fl. sparsi , non racemosi . Cor. ex albo-lutea .

3. *pubescens* . D. fl. sessil. lateralibus , adgregatis : fol. lanceol-linear. caul. pubescente . *Syst. veg. ed. 14.*

In Austria .

Caul. simplic. Fol. remota , alterna , annua . Fl. angusti , 5. pauciores , tubo filiform. pubescente . *Simillima priori .*

4. *villosa* . D. fl. sessil. lateralibus , solitar. fol. lanceol. planis , ciliatis , pilosis , confertis . *Syst. veg. ed. 14.*

In Lusitania , Hispania H.

Frutex ramis alternis . Fol. *Polygoni* , vix petiol. subtus præcipue pilosa . Ex alis rudimenta plurima foliosa ramulorum , unde quasi verticillata . Fl. parvi , angusti .

5. *Tarton-rai*. D. fl. sessil. adgregatis, axillaribus: fol. ovatis, ra. utrimq. pubescentibus, nervosis. Syst. veg. ed. 14. Lob. ic. 160. Pluk. phyt. tab. 318. f. 6.
In Gallo-provincia &c. H.
 Fruticulus. Fol. mollia, candicant. & veluti sericea. Fl. ex albo-pallent.
6. *alpina*. D. fl. sessil. adgregatis, lateralibus: fol. lanceolat. obtusiusc. subtus tomentosis. Syst. veg. ed. 14. Gesn. fasc. 6. tab. 3. f. 7.
Chamælæa &c. Lob. ic. 370. Barr. ic. 234.
b. Thymelæa incana &c. Pluk. alm. tab. 229. f. 3.
In alpibus Italiæ, Austriae &c. H.
 Suffrutex cortice cinereo. Fol. in summis ramulis rosulam efformant, ovato-longa, pallide virid. iuniora hirsuta; adulta calva. Fl. in centro rosulæ, subhirsuti, albi. Fruct. oval. hirsutus.
7. *Laureola*. D. racemis axillar. 5--fl. fol. ellipticis, glabris. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Aust. tab. 183. Black. tab. 62. Dod. pempt. 365.
Chamedafne. Matth.
In Europa H.
 Tota planta flexilis, supra medium ramosa, ramis apice foliosis. Fruticul. 2--ped. erectus, cinereo-fuscus. Fol. digitum longa, laurinæ firmitatis, alterna, breviter petiol. perennant. crassa, integerr. supra sature virid. subtus dilutiora. Racemi nutantes, bracteis concavis, alternis. Fl. tristes.
8. *pontica*. D. peduncul. lateralibus, 2-fl. fol. lanceol-ovat. Syst. veg. ed. 14.
Thymelæa &c. Tourn. it. 3. tab. 180.
In Ponto H.
 Caul. sub 2--ped. quandoq. inferne ramosi. Fol. inordinata, figura, & consistentia *Limonii*, nitida, glabra. Cor. luteo-virid. Bacca virid.
9. *divica*. D. fl. axillar. geminis: fol. linear-lanceol. Syst. veg. ed. 14. Gouan. Illus. tab. 17. f. 1.
Habitat . . .
Non est Passerina ciliata. Lin. Frutex ped. ramosiss. ramorum fol. deciduis, cicatricibus exasperatis. Fol. conferta, fere imbricata, glaberr. Fl. sessil. Cor. albido-sulphur. tubo basi ventricoso; limb. 4-fid. lacin. acutis.

** Fl.

** *Fl. terminalibus.*

10. *indica*. D. capitulo terminal. pedunculato: fol. opposit. oblong-ovat. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Osb. it. 246.*
In China ♂.
 Frutex parvus, spitham. Fol. petiol. integerr. Fl. 6-8. sessiles.
11. *cneorum*. D. fl. terminal. fasciculat. sessilibus: fol. lanceol. mucronatis, nudis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 426.*
Thymelæa &c. Gesn. fasc. 5. tab. 3. f. 6. Pollich. Palat. n. 380. cum icone.
Daphne &c. Duham. arb. 2. tab. 94.
Cneorum. Matth. hist. 46. Clus. hist. 89.
In Europæ sylvis apricis collium, & montium ♂.
 Fruticul. vix sepinped. debilis, ramosus, fuscus.
 Fol. sparsa, subsessil. integerr. rigida, glabra; in summis ramis congesta, nervo medio vix conspicuo, mucronato. Cor. purpur. raro alba, odora, lacin. ovat--lanc. obtusis, vel acutis.
 Bacca albida.
12. *Gnidium*. D. panicula terminal. fol. linearis-lanc. acumin.
Syst. veg. ed. 14.
Thymelæa &c. Clus. hist. 1. p. 87. Cam. epit. 974. Pluk. phyt. tab. 113. f. 3.
In Italia &c. ♂.
 Caul. humifusi, fruticosi, cubital. & ultra, ramosi. Fol. viscosa, annua, glabra. Fl. congesti, albi, supra rubri, cincti fol. suaveolentes. Fruct. maturi rubri, succosi. *Bis quotannis florens.*
13. *squarrosa*. D. fl. terminal. pedunculat. fol. sparsis, linear. mucronat. patentibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Thymelæa &c. Burm. afric. tab. 49. f. 1.
In Æthiopia ♂.
 Frutex ramosus. Fol. plurima, inordinata, sessil. cinerea, ita congesta, ut caput efformant. Foliol. min. axillar. superne. Fl. terminal. simul iuncti. Cor. alba.
14. *oleoides*. D. fl. geminis, terminal. sessilibus: fol. elliptico-lanceol. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. dec. 13. tab. 7.*
In Oriente ♂.
 Caul. fruticulosus, compositus.

15. fastida. D. glabra; fl. terminal. congestis, sessilibus: fol. oppositis, petiolat. ovat-oblong. acutis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In Tahiti.

An suis distincta a D. indica?

16. rotundifolia. D. hirsuta; fl. terminal. congestis, sessilibus: fol. subpetiol. oppositis, elliptic. obtusis, glabris. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In Tonga Tabu ♂.

Rami tomentosi, cani.

17. odora. D. fl. adgreditis, terminal. sessilibus: fol. alternis, ovatis, glabris. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.

Jamma Kintio. Kämp. am. exot. Fas. V. p. 844.

In Japonia ♂.

Caul. frutescens, erectus, dichotom. nudus, glaber, fuscus. Rami divaricato-erecti. Fol. in apice ultimorum ramorum adproximata, pollicar. inaequil. sessil. acuta, integerr. patentia, apice recurvo, supra sature viiid. subtus pallidiora. Fl. in ultimo ramulor. apice, sessil. sub 11. Bract. inter fol. & florum umbellam sessilem, imbricatae, lanceol. sub 10. Cor. tubo purpur. limbo lacin. extus purpur. intus carnatis.

candidum.

D. (Thynelæa) fol. petiolat. acuminat. mollibus, utrimque villosis, fl. longioribus. & cop. Fl. Carn.

In Carniola &c.

Differit a D. Cneoro cortice foetido; fol. etiam summis fl. duplo longioribus: cor. segment. ovatis, albis.

590. DIRCA. Cal. o. Cor. tubulosa, limbo obsoleto. Stam. tubo longiora. Bacca 1-sperm.

3. palustris. D. Syst. veg. ed. 14. Am. acad. 3. tab. 1. f. 7. Duhem. arbr. 1. tab. 212.

In Virginie paludosis ♂.

Altitudo humana. Frutex facie *Daphnes Mezerei*. Fol. oblong. acumin. Fl. terni e singula gemma, nutantes, pedunculis breviss. Cor. alba.

591. GNIDIA. Cal. infundibulif. 4-fid. Petal. 4. calyci inserta. Sem. 1. subbaccatum.

3. pinifolia. G. fol. sparsis, linearibus: floralibus verticillat. Syst. veg. ed. 14.

Rapunculus &c. Burm. afr. tab. 41. f. 3.

Valerianoides &c. Seb. mus. 2. tab. 32. f. 5.

Ad cap. b. Spei H.

G. pinifolia. Lin. Suppl. differens est, monente Vahl.

Fruticulus. Fol. sparsa, unguicular. breviter petiol. linear. acumin. obtusa, subcarnosa, carinata, glabra. Spica subrotunda, bracteis, & fl. constans. Cal. albus. Petal. calyce breviora, lanceol. alba. Stam. 4. intra tubum; reliqua 4. extra.

2. radiata. G. fol. subulat. triquetris, acutis: terminal. sessil. radiatis: bracteis lanceolat. Syst. veg. ed. 14.

Ad cap. b. Spei H.

Frutex prolifer, scaber. Fol. sparsa, glabra. Fl. extus subvilloso. Petal. 4. calyce min. pilosa. Stam. 4. exserta; 4. in fauce.

3. simplex. G. fol. omnibus linear. acutis: fl. terminal. sessilibus. Syst. veg. ed. 14.

Thymelæa &c. Breyne, cent. tab. 6.

Ad cap. b. Spei H.

Caul. semiped. tuberculoso, inæqual. Fol. sparsa, erecta, lævia. Fl. nudi, sessil. lutei calyc. petal. antheris. Fol. floralia reliquis non latiora.

4. tomentosa. G. fol. sparsis, ovat-oblong. glabris, margine scabris. Syst. veg. ed. 14.

Ad cap. b. Spei H.

Caul. erectus, fruticosus, purpur. Rami adgregati: ramulor. apices lanati, ut congeneres. Fol. subcarnosa, glauca, pubescent. superiora pilosa, apice subpurpurasc. Fl. terminal. 3-4. adgregati. Bract. foliiformes. Petal. parva, emarginata, albo-hirsuta, sericea. Stam. 4. exserta; 4. in fauce.

5. sericea. G. fol. ovatis, tomentosis; floralibus quaternis, caul. hirsuto: fl. corona setis 8. Syst. veg. ed. 14.

Thymelæa &c. Burm. afr. tab. 49. f. 2.

Ad cap. b. Spei H.

Caul. fruticos. plusquam pedal. Fol. unguicul. sessil. obtusa, erecta. Fl. terminal. sessil. in capitulum collecti. Cor. extus albido-hirsuta, lacin. ovat. obtusis, concavis. Stam. in tubo 4; in fauce 4.

6. *oppositifo-* G. fol. oppositis, lanceolat. *Syst. veg.* ed. 14.
lia. Thymelææ &c. *Pluk. alm.* tab. 323. f. 7.
 b. Thymelææ &c. *Burm. afr.* tab. 49. f. 3.
Ad cap. b. Spei h.
 Caul. fruticos. pedal. purpur. Fol. semiunguic.
 sessil. imbricato-patula, subcarnosa, glabra:
 supra apice sanguin. Fl. terminal. adgregati.
 Cor. albida, extus villosa, intus rubra. *Culta*
in hortis petata acquirit.
7. *capitata.* G. fol. sparsi, lanceolat. glabris: fl. capitatis,
 bracteis obvallatis; pedunc. nudo. *Syst. veg.*
 ed. 14. *Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei h.
 Caul. fruticos. ramis erectis, teretibus, purpu-
 rasc. Fol. remotiora, angustiora, lævia. Fl.
 terminal. Involuc. æquale, lanceol. 8-phyll.
 flosculis dimidio brevius. Flosculi 16. sessil.
 pub. scented. cani. Tubus tuiform. limb. brevis,
 5-part. Stain. 10. quinque extra faucem, 5.
 intra. *Flos Passerina simii. Forte Dais?*
8. *filamento-* G. fol. elliptice ovatis, adproximatis, glaberr.
sa. fl. capitatis: filamentis capillaribus. *Syst. veg.*
 ed. 14. *Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei h.
 Frutex cicatricibus folior. tuberculatus. Fol. al-
 terna, sessil. integerr. avenia. Capitula fl. solitar.
 sessil. Involuc. glabrum. Cor. villosa, limbo
 4 part. *Variat fol. angustior. sed filamentis fa-*
ci e dignoscitur.
9. *imbricata.* G. fol. oblong. 4-fariam imbricatis, sericeis: fl.
 terminalibus in axill. fol. *Syst. veg.* ed. 14. *Lin.*
Suppl.
Ad cap. b. Spei h.
10. *pinifolia.* G. fol. linearis-subulat. acutis, supra planis: fl.
 axillaribus, binis. *Syst. veg.* ed. 14. *Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei h.
 Rami læves, nec tomentosi. Fol. non pungen-
 tia, subtus convexa, lævia, patula. Fl. e
 summis ramulis, glabri: limbis acutus, tubo
 duplo longiore. Anth. 4. supra faucem pilis
 cinctæ; & 4. intra tubum min.
11. *daphnæfa-* G. decandra: fol. oblong. planis, integerr. ca-
 lia. pitulo terminal. pedunculato, involucrato: fl.
 5-fid. *Syst. veg.* ed. 14. *Lin. Suppl.*
In Madagascär.

*Habitus, folia, inflorescentia, involucrum, calyc.
fig. & hirsuties Daidis Cotinifoliae est: structura
vero, & situs partium fl. est exinde Gniaix, sed
non numerus.*

Fol. alterna, nec opposita, ut in genere Daidis.

Involuc. fl. ut in Daidis, sed 5-phyll.

*Var. hirsuta = fol. oblong. spathulat. hirsutie
canis: fl. min.*

*= glabra = fol. oblong. ad basin attenuatis,
nudiuscul. fl. ma.*

polyftachia. G. fol. sparsis, linear. obtusiuscul. sp cis sub-
panicul. bract. ovatis: nectar. 8-phyll. Berg.
Fl. cap.

Ad cap. b. Spei ♂.

Caul. fruticos. vix pedal. ramosus, obscure ci-
nereus. Fol. vix unguicul. sparsa, adproxima-
ta, subsess. Spicæ pl. subrotun. Bractæ fl.
distinguente ovatæ, obtusæ, glaucæ. Cal. o.
Cor. hirsuta, supra rubra, subtus albida.

392. STELLE. Cal. o. Cor. 4-fid. segment. æquilibus, tubo
RA. longo. Stam. breviss. Sem. I. rostratum.

I. passerina. S. fol. linearibus: fl. 4-fid. Syst. veg. ed. 14.
Passerina. Bauh. hist. 3. p. 456. Fuchs. p. 535.
Linaria &c. Colum. eph. I. tab. 80.

*In Italiæ, Helvetiæ &c. campis aridis, apricis, &
inter stipulas ☽.*

Facies Thesii alpini. Caul. erect. sesquipalm. ra-
mosus. Fol. alterna, integerr. glabra. Fl. la-
terales, sessil. ex spicis longis, laxis, in lana
minuta. Stipul. sub fl. ovat-lanceol. Cor. par-
va, viridula, apicibus luteis.

2. Chamæjas- S. fol. lanceol. cor. 5-fid. Syst. veg. ed. 14. Amm.
me. Ruth. tab. 2.

In Sibiria ♀.

Rad. crassa. Caul. multi, dodrant. & ultra, de-
biles, inferne rubent. Fol. brevia, alterna,
utrimq. acuta, nervosa, subtus dilutiora, Cen-
taur. min. simil. Fl. umbellati. Cor. supra al-
ba, subtus purpur.

393. PASSE. Cal. o. Cor. 4 fida. Stam. tubo imposita. Sem.
RINA. I. corticatum.

I. filiformis. P. fol. linear. convexis, 4-fariam iubricatis: ra-
mis tomentosis. Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt.
tab. 213. f. 9.

In Æthiopia ♂.

Dd iii

OCTANDRIA MONOGYNIA.

Fruticul. Fol. alterna, sessil. erecta, 2. lineas Jonga. semiteret. lateribus compressa. Fol. floralia basi margine lato, membranac. quod non in reliquis. Fl. axillar. sessil. Cor. lacin. oblong. obtusis.

2. hispita. P. fol. carnosis, extus glabris: caul. tomentoso. Syst. veg. ed. 14.

Sanamunda 3. Clus. hist. I. p. 89. Breyn. cent. tab. 19.

Passerina metnan. Forsk. Æg-Arab. Vahl.

In Italia, Gallo provincia &c. H.

Sinon. Clus. ad Daphnem suam dioicam revocat Gouan. Illust. tab. 17. f. 1.

Caul. ramosiss. diffusus. Rami crebri, lignosi, lanuginosi. Fol. parva, conferta, sessil. thymiform. ovat-lanceol. in medio depressa, supra tomento albida, subtus obscure virid. Fl. pl. parvi. Cor. lutea.

3. ericoides. P. fol. linear. lævibus, subimbricat. cor. globosiss. Syst. veg. ed. 14.

Ad cap. b. Spei H.

Facies omnino Ericæ. F. utex statura P. filiformis.

Ramuli pubescent. Fol. brevia, Ericæ, opposita, ovat--oblon. florifer. subcordat. Fl. in summis ramulis laterales, sessiles. Cor. colorata. Sem. ovata, atra, nitida.

4. capitata. P. fol. linear. glabris: capitul. pedunculat. tomentosis. Syst. veg. ed. 14.

Thymelæa &c. Burm. afr. tab. 48. f. 3.

Ad cap. b. Spei H.

Caul. fruticos. pedal. cinereus, inferne simpl. dein ramosus. Rami subumbellati. Fol. sparsa. Pedunc. tomentosi, incrassati. Fl. sessil. Cor. utrimq. albo-hirsuta. Stam. supra faucem 16. quorum 8. castrata.

5. ciliata. P. fol. lanceolat. subciliat. erectis: ramis nudis. Syst. veg. ed. 14.

Thymelæa &c. Burm. afr. tab. 47. f. 2.

Erica &c. Seb. mus. 2. tab. 12. f. 9.

Sanamunda 1. Clus. hist. I. p. 88.

In Æthiopia, Hispania &c. H.

Caul. breviss. fruticos. purpurasc. Fol. sparsa, semiunguicul. sessil. imbricato--patent. linear. obtusa, concava, pallide virent. Fl. terminal. 4-5. aggregati, sessiles. Cor. lacin. purpuratus, & fauce villosa.

OCTANDRIA MONOGYNIA.

423

6. *uniflora*. P. fol. linear. oppositis: fl. terminal. solitar: ramis glabris. Syst. veg. ed. 14.
Thymelæa &c. Burm. afr. tab. 48. f. 1. 2.
In Æthiopia ♂.
Caul. fruticos. ped. l. ramosus. Fol. sessil. quandoq. linearicuneiform. glauca; vel tature virid. Cor. hirsuta. extus cinereo-albida, sericea, intus purpur. Var cor. alba.
7. *anthylloides*. P. fol. ovatis, villotis: fl. capitatis, hirsutis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
Fl. extus hirsutiss. albi; iotus in viva planta lutei, in secca nigri.
P. fol. ovatis, villotis: fl. lateralibus, solitar. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
Ramulis floriferis refert spicam foliosam.
8. *spicata*. P. fol. ovatis, sparsis: fl. capitatis: ramis laxis, cernuis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
Simil. Ericoidi, sed differt fl. capitatis.
9. *laxa*. P. fol. ovatis, sparsis: fl. terminalibus, solitar. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
In Africa ♂.
Dignoscitur magnis fl. limbis, extus sericeis.
10. *grandiflora*. P. glaberrima: fol. oblong. acutis, concavis, extus rugosis: fl. terminalibus, solitar. sessiliibus. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
In Africa ♂.
Banksia gnidia. Forst. gen.
In nova Zeelandia ad fissuras rupium; in littore maris; & in summis montium cacuminibus.
Fol. rigidiora, & Gnidia similia.
11. *Gnidia*. P. diandra, glaberrima: fol. lanceol. acutis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Banksia gnidia. Forst. gen.
In nova Zeelandia ad fissuras rupium; in littore maris; & in summis montium cacuminibus.
Fol. rigidiora, & Gnidia similia.
12. *pilosa*. P. diandra pilosa: fol. linear. obtusis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Banksia tomentosa. Forst. gen.
In nova Zeelandia.
13. *prostrata*. P. diandra, pilosa: fol. ovatis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Banksia prostrata. Forst. gen.
In nova Zeelandiæ montibus aridis.
594. LACHNÆA. Cal. o. Cor. 4-fid. Imbo inæquali; (in quo differt a Passerina). Sem. 1. subbaccatum.
14. *erioccephala*. L. capitulis solitar. lanatis: fol. 4-fariam imbricatis. Syst. veg. ed. 14.
In Æthiopia ♂.

OCTANDRIA MONOGYNIA:

Fol. trigona, gibba. Capitula terminal. cincta lana candida.

2. conglomera- L. capitulis confertis: fol. laxis. Syst. veg. ed. 14.

Sanamunda 3 &c. Breyn. cent. tab. 7.

Ad cap. b. Spei Ȑ.

Frutex Rosmarini facie. Rami alba lanugine obtusi. Fol. Polii, Lavandulæ, supra virid. subtus lanuginosa. Capitul. terminal. umbellata. Fl. Pisi magnitudine, extus albi.

595. BÆCKEA. Cal. infundibul. 5-dent. Cor. 5-pet. Caps. globosa, 4-locul. coronata.

1. frutescens. Syst. veg. ed. 14. Osb. it. tab. I.

In China Ȑ.

Frutex habitu *Abrotani*, ramis virgatis: ramul. brevibus, oppositis. Fol. opposita, linear. acuta, integerr. glabra. Fl. axillar. solitar. penduncul. Petal. subrotunda.

D I G Y N I A .

596. SCHMIE- C Al. 2-phyll. Cor. 4-petal. Germ. pedicel-
DELIA. lata, fl. longiora.

1. racemosa. S. Syst. veg. ed. 14.

Usubis &c. Burm. ind. tab. 32. f. I.

In India orient. Ȑ.

Arb. facie *Rhois Toxicoden*. ramis flexuosis. Fol. alterna, petiol. subtoment. ternata: foliol. petiol. ovat-oblong. acumin. subserrata, nuda. Racem. axillar. simpl.

597. GALENIA. Cal. 4-sid. Cor. o. Caps. subrotun. 2-sperma.

1. africana. G. fruticosa, erecta: fol. linear. carnosus. Syst. veg. ed. 14.

Kali &c. Boc. mus. tab. 110.

Atriplex &c. Till. pis. tab. 15.

In Africa Ȑ.

Frutex habitu *Tetragonise*, licet omnia minuta; totus obsolete papillosum. Caul. teres, setulis raris reflexis. Fol. opposita, sessil. perennia. Fl. panicul. dichotomi, sessil. albi.

2. *procumbens*. G. procumb. fol. ovatis, canaliculat. apice patulo, recurvato. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.

asiatica. G. fol. alternis, ovat-oblong. *Burm. Ind. tab.*
31. f. 5.
In India ♂.

Arb. ingens, ramis divaricat. glaberr. lucidis.
 Fol. subpetiol. integerr. nitida. Pedunc. terminal. racemosi, nudi. *Arb. grata Camelis.*
Fol. sapore Nasturtii hort.

598. WEIN- *Cal.* 4-phyll. *Cor.* 4-petala. *Caps.* 2-locul. 2-MANNIA. rostris.

1. *glabra*. W. fol. pinnatis; foliol. obovatis, crenatis, lævibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Jamaica ♂.

Arbuscula ramis oppositis, ultimis subpubescent.
 Fol. opposita, impari-pinn. petiolo alato, articulis subovat. Foliol. 11-13. parva, opposita, sessil. nuda, latere interiore ad basin angustiora, serraturis utrimq. 3-4. Stipul. magnitudine folior. ovatæ, inter paria petiolor. solitariæ, deciduæ. Racemi terminal. solitar. peduncul. simpl. erecti. Fl. multi, albi.

2. *tomentosa*. W. fol. pinnatis: foliol. ovat. integerr. subtus tomentosis: stipul. caducis. *Syst. veg. ed. 14.*
Lin. Suppl.

In nova Granada ♂.

Arb. valde ramosa, & foliosa, cortice fuscescen.
 Fol. opposita, petiolo comm. alato. Foliol. 5-6-iuga, parva, crassiuscula, regularia. Stipul. solitar. Racemi ad apicem densiss. quasi spicæ, pedicellis breviss. Nectar. campanulat. stam. cingens, membranac. integerr.

3. *trifoliata*. W. fol. ternatis: foliol. elliptic. lanceol. serratis, glaberr. panicul. compositis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei ♂.

Facie non valde recedit a Pteleis. Frutex glaber.
 Fol. opposita. Paniculæ axillar.

4. *racemosa*. W. fol. simplic. ovatis, ferratis, utrimq. glaberrimis: stipul. nullis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In nova Zeelandia.

OCTANDRIA DIGYNIA.

In florescentia cum reliquis convenit; at fol. simplicibus, ma: distincta.

599. MOEHRINGIA. Cal. 4-phyll. Petal. 4. Caps. 1-locul. 4-valv. polysper.

i. muscosa. M. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 449.
Alsine &c. Scheuch. alp. tab. 6. Pluk. alm. tab. 75. f. 1. Col. ecphr. tab. 290. Linder. hort. tab. 2.

b. Alsine &c. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 23. f. 12.
Segu. tab. 5. f. 1. Pluk. phyt. tab. 74. f. 3.
In alpibus Italiæ, Helvetiæ &c. umbrosis subhumidis 24.

Caul. debil s., dodrant. filifor. ramosiss. Fol. opposita, sessil. setacea, subulata, integerr. confluentia. Fl. axillar. longe peduncul. solitar. albi. Calyx laciniis ore pallentibus. Petal. patentia, angusta, elliptica, lanceol. alba, calyc. superantia. Caps. flavescens.

600 CODIA. Cal. 4-phyll. Petal. 4. Receptac. comm. involucratum.

i. montana. C. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen.
In nova Caledonia ♂.

Fol. opposita, petiol. elliptica, obtusa, integra, glaberr. Capitula terminal & axillar. breviss. globosa, pedunculata. Forte Brunix sp: fol. ellipticis.

TRIGYNIA.

601. POLY- GONUM. **C**Al. 5-part. coloratus, segmentis ovatis. Stam. a 5 ad 8. Styl. 1-3. Sem. trigonum, nudum.

* *Atrapaxoides*, caul. frutescente.

i. frutescens. P. caul. fruticoso; calycinis foliol. 2. reflexis.
Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 12. f. 2.
In Sibiria, Dauria ♂.

Frutex humilis, ramis non spinosis. Fol. rigida;
& lente in mucronem abeuntia. Pedunc. recti. Petal. alba, in medio purpur. Cal. 2-phyll.
Petal. 3. obcordat. Stigm. 3. Fructus triquetus.

** *Bistortæ, spica unica.*

2. *Bistorta*. P. caul. simpliciss. monostachyo: fol. ovatis, in petiol. decurrent. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 421. Black. tab. 254. Ludw. et al. tab. 31. b. *Bistorta britannica*. Lob. ic. 292. Bauh. hist.

3. p. 539.

Bistorta. Matth.

In Europæ pratis subalpinis 24.

Rad. magna, tuberosa, semel--bis--ter intorta. Caul. 2-ped. genicul. tumidis. Fol. glabra, plana, vel undulata, subtus albida; ima petiol. summa sessili-amplexicaul. cordato-lanceol. Spica unica, ovata, densa, purpur.

3. *viviparum*. P. caul. simpliciss. monostachyo: fol. lanceolat. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 13. Gmel. Sib. 3. tab. 7. f. 2.

Bistorta alp. media. Pluk. tab. 151. f. 2.

In Europæ subalpinis pascais duris 24.

Rad. magna, intorta. Caul. dodrant. Fol. radical. petiolat. elliptica, firma, ore punctato, vel serrato: caulinia linear-lanceol. cæterum similia. Spica 2-unc. tenuis; in planta iuniora densa, in adulta rara, strigosa. Fl. sessil. profunde divisi, albi. Bract. argute lanceol. Spicæ fl. inferior. in bulbum transeunt sœpe viviparum.

*** *Persicariæ, pistil. 2-fid. aut stam. minus 8.*

4. *virginianum*. P. fl. pentandr. semidigyn. cor. 4-fid. inæqualibus: fol. ovatis. Syst. veg. ed. 14.

Persicaria &c. Moris. hist. 3. p. 589.

In Virginia 24.

Caul. pl. virentes, genicul. tumidis. Fol. ampla, 6. digit. longa, inuncronata, nervosa, ex cœrul-virid. plerumq. maculata. Fl. spicati, albi. Cor. clausa.

5. *lapathifoli-um*. P. fl. pentandr. semidigyn. staminibus cor. regulari æqualibus. Syst. veg. ed. 14.

Persicaria &c. Lob. ic. 315.

In Gallia.

Caul. erectus, firmus, lœvis. Vaginæ pubescent. ciliatæ. Fol. petiol. ovata, magnitudine *Phytolaccæ*. Pedunc. oppositifol. spicato-racemosi.

6. *amphibium*. P. fl. pentandr. semidigyn. spicata ovata. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 282.

OCTANDRIA TRIGYNIA.

b. *Persicaria* &c. *Trew. Comm. nor. 1737. tab. 5.*
f. 1. 2.

In Europa, ad lacus 24.

Caul. rubri, longe reptantes. In *natabili* fol.
Bistorta, petiolo alato, elliptico-lanceol. ora
serrata, vel ciliata. In *terrestri* fol. minus
dura, erecta, hirsuta.

7. *filiforme*. P. fl. pentandr. digyn. spicis filiform. fol. ovatis:
stipul. ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia 3.

Caul. erectus, villosus, ferrugin. Rami erecti,
alterni, hirsuti. Fol. pollic. alterna, petiol.
integerr. nervosa, ciliata, villosa. Petiol. va-
ginant. dilatati. Stipul. interfoliac. inflatæ,
membranac. Fl. inferne remoti, minut. Spica
spitham. apice cernua. Bract. amplexicaul. bar-
bata, 3--fl. Cor. lacin. 3. superior. rubris,
infima alba.

8. *ocreatum*. P. fl. pentandr. trigynis: fol. lanceolat. *Syst. veg.*
ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 8. Sloan. Jam. I.
tab. 3. f. 1.

In Siberia &c.

Caul. pedal-3-cubit. procumb. ad nodos mem-
branæ albido-fuscæ. Fol. subsessil. angusta,
revoluta, splendent. Stipul. sunt vaginæ am-
plæ, ventricosæ, læves. Rami floriferi axillar.
racemosi.

9. *Hydropiper*. P. fl. hexandr. semidigyn. fol. lanceol. stipul. sub-
muticis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 119. Trew.*
Comm. nor. 1737. tab. 5. f. 7. 8. Ludw. et
tab. 168. Dod. pempt. 607. Fuchs. 842.

Idropepe. Matth.

In Europæ subhumidis, ad fossas ⊖.

Caul. longior. Fol. subpetiol. longiora, & an-
gustiora, undulata, e viridi-fluvescent. Vaginæ
coloratæ, latæ. Stipul. ciliatae. Spicæ dense,
tenues. *Var. fl. albo. Lepor. piperis.*

10. *Persicaria*. P. fl. hexandr. digynis: spicis ovat-oblong. fol.
lanceolat. stipulis ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl.*
Dan. tab. 702. Black. tab. 118.

Persicaria mitis. Bauh. hist. 3. p. 779.

Persicaria. Matth. Trew. Comm. nor. 1737. tab.
5. f. 3. 4. 5. 6.

b. *Persicaria minor. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 29.*

c. *Polygonum*. Hull. helv. p. 1556. *Fol. subtilis albo-tomentosa*.

In Europæ humidis, & ad vias ⊖.

Caul. 1-3 pedal. ramosus, sæpe rubens. Fol. subpetiol. ex elliptico-longe lanceol. plerumque glabra, nervis, & oris plerumq. macula nigra notatis. Vagina lacera. Spicæ laxiores. Fl. albi, vel rubri.

II. *barbatum*. P. fl. hexandr. trigynis: spicis virgatis; stipul. truncatis, setaceo-ciliatis: fol. lanceolat. Syst. veg. ed. 14.

Velutina-modela-mucu. H. mal. 12. tab. 77.

In China.

Caul. herbaceus, rufus. Stipul. vaginal. laxæ. Spicæ longæ, fl. remotis. Var. *caul. & fol. villosis, latioribus, e rubro-sericeis: spicis brevioribus.*

12. *orientale*. P. fl. heptandr. digynis: fol. ovat-acum. caul. erecto: stipul. hypocraferif. hirtis. Syst. veg. ed. 14.

Persicaria &c. Comm. rar. tab. 43. Hort. mal. 12. tab. 76.

In Oriente, India ⊖.

Altitudo humana. Fol. magna, longo petiol. caulem amplectente. Racem. axillar. Cor. purpur. *In India longe hirsutior est quam oriental.*

13. *pensylvanicum*. P. fl. octandr. digynis: peduncul. hispidis: fol. lanceolat. stipul. muticis. Syst. veg. ed. 14.

In Pennsylvania.

Facies P. *Persicaria*, sed omnia maiora, & striatiora. Caul. sub 3-ped. ramosus, angulatus, fistulosus, quandoq. maculat. Fol. ciliata, sæpe pubescent: quandoq. maculata, carina subius scabra. Stipul. truncatæ, muticæ. Spicæ subracemosæ, ovatæ, floscul. pedicellat. herbaceis.

**** *Polygona fol. indivisis: fl. octandris.*

14. *maritimum*. P. fl. octandr. trigynis, axillar. fol. ovali-lanceol. semperfurent. caul. sufrutescente. Syst. veg. ed. 14. Cam. epit. 691. Bauh. hist. 3. p. 376.

In litoribus maris mediterranei &c. b.

Ad fine sequent. sed omnia ma: & duriora. Fol. coriacea, subius albida, exsiccatione coerule-scen. Caulis brevior, durus, perennans. Squa-mæ pellucid. albicant.

- 15. aviculare.** P. fl. octandr. trigynis, axillar. fol. lanceol. caul. procumb. herbaceo. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 803. Black. tab. 315.
Poligono maschio. Matth.
In Europæ cultis ruderatis ♂.
Caul. dodrant. Fol. parva, alterna, quandoq. ova-ta, vel linear. Vagin. membranac. coloratæ. Fl. axill. vel glomerati. Cal. extus virid. intus, & margine coloratus. Cor. alba, aut subrubra.
- 16. erectum.** P. fl. octandr. trigynis, axillar. fol. ovalibus: caul. erecto, herbac. Syst. veg. ed. 14.
In Philadelphia ♂.
17. articula-tum. P. fl. octandr. trigynis: spicis articulat. paniculatis: stipul. vaginalibus, truncatis. Syst. veg. ed. 14.
In Canada ♂.
Rad. parva, fibrosa. Caul. pedal. ramis superne alternis. Fol. linear. glabra. Spicæ filiform. angustiss. paniculam formantes. Cor. incarnata.
- 18. divarica-tum.** P. fl. octandr. trigynis, racemosis: fol. lanceol. caule divaricato, patulo. Syst. veg. ed. 14.
Gmel. Sib. 3. tab. 10.
P. alpinum. All. Fl. Ped. tab. 68. f. 1.
Persicaria &c. All. Spec. Ped. tab. 8. Bocc. mus. 2. tab. 83.
b. P. spicis &c. Gmel. Sib. 3. tab. 11. f. 1.
In Helvetia, Sibiria &c. pratis alpium 4.
Caul. erectus, cubit. & ultra, ramosus, geniculat. Fol. petiol. subhirsuta, nervo magno, & albo. Vagin. integræ. Stipul. ovato-lanceol. fuscæ. Spicæ laxiss. Fl. copiosi, paniculati, albi.
- 19. undula-tum.** P. fl. octandr. trigynis, racemosis: fol. lanceol. acuminat. undulatis. Syst. veg. ed. 14. Comm. Gotting. 1774. tab. 5.
In Siberia 4.
Simillimum P. divaricato.
- 20. serratum.** P. fol. crenatis. Syst. veg. ed. 14.
In Mauritania.
Fol. oblonga.
- ***** *Helxine fol. subcordatis.*
- 21. chinense.** P. fl. octandr. trigynis: pedunc. scabris: fol. lato-ovat. bract. cordatis. Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 30. f. 3.
In India.

Caul. flexuosus, ramosus. Fol. petiol. (in Japonia sesquipollis.) quandoq. ovat-cordat. utrimq. glabra. Pedunc. hispidi, apice laevis 3-fid. Fl. capitati. Stipul. vaginal. latæ, ovatæ, integrerr.

22. *sagittatum*. P. fol. sagittatis: caul. aculeato. *Syst. veg.* ed. 14. *Gmel. Sib.* 3. *tab.* 13. f. 2. *ic. plantæ sylves.* *Helxine &c. Hort. Cliff.* *tab.* 12. *planta hirs.* *Fagotritico &c. Pluk. mant.* *tab.* 394. f. 5. *Planta &c. Laet. amer.* *tab.* 74. *In Virginie, Marilandie madidis* ⊖.
Caul. 1-2-ped. subsimpl. Fol. petiol. basi dissecta, integerr. laevia, superior. longiora. Ad exortum petoli membrana fusca. Fl. in summis ramis pauci, e viridi-albentes, & subrubent. *Interdum scandit frutices.*

23. *arifolium*, P. fol. hastatis: caule aculeato. *Syst. veg.* ed. 14.

Fagotritico &c. Pluk. amalt. *tab.* 398. f. 3.

In Virginia, Florida.

Caul. decumbens, scandens, ramosus, e viridi-rubescens. Fol. priore latiora, subpollic. longe petiolat. villoso-strigosa, inæqual. Stipul. ciliatae, hirsutæ, truncatae. Fl. in ramulis alterne adgregati.

24. *crassifoliuni*. P. fl. octandr. trigynis: fol. hastatis, carnosis: caul. decumbent. inermi. *Syst. veg.* ed. 14.

P. hastatum. Comm. Gott. 1774. *tab.* 6.

P. sibiricum. Nov. Act. Petrop. *tab.* 7. f. 2.

25. *perfoliatum*. P. fol. triangularibus: caul. aculeat. stipul. perfoliato-foliofis, patentibus, subrotun. *Syst. veg.* ed. 14. *Burm. Ind.* *tab.* 31. f. 2.

Fagotritico &c. Pluk. alm. *tab.* 398. f. 1.

In India.

Simil. P. Sagittato, & Arifolio. Caul. angulatus, Stipul. non vaginant. Fol. basi parum sinuata, latiora quam longa, interdum peltata. Pedunc. ad apicem caul. paucifl. aculeati.

26. *tataricum*, P. fol. cordato-sagittat. caul. erecto, inermi: semin. subdent. *Syst. veg.* ed. 14. *Gmel. Sib.* 3. *tab.* 13. f. 1. *Act. Stock.* 1744. *tab.* 4.

In Tataria ⊖.

Habitus sequentis. Caul. cubital. a latere folior. canalicul. Petoli sulcati. Sem. scabra, e fusco-ciner.

27. *Fagopyrum*. P. fol. cordato-sagittat. caul. erectiusc. inermi : seminum angulis æqualibus . Syst. veg. ed. 14. Knor. del. 2. tab. F. Frumentum *Saracenicum* Matth. 876. *Ocymum cereale* . Tabern. hist. 276. In Asia ; inter segetes Europæ quasi sponte ☽ . Caul. pedal-cubit. Fol. alterna , plicata , glabra , atro-virent. inferior. longe petiol. superior. subfessil. Fl. axillar. & terminal. laxe spicati . Cal. purpur.
28. *Convolvulus*. P. fol. cordat. caule volub. angulato : fl. obtusatis . Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 744. Helsine &c. Bauh. hist. 2. p. 157. In Europæ agris ☽ . Caul. ped-cubit. volubil. angulati . Fol. petiol. acutiusc. glabra . Racemi axillar. parvi . Fl. etiam ad basin pedunc. comm. Cal. albo-virens . Anth. violac. Sem. cal. triquetro tecta .
29. *multiflorum*. P. fol. cordat. caul. volub. angulato : fl. panicula ramosa . Syst. veg. ed. 14. Thun. Jap. In Japonia . Rad. tuberosa . Caul. filiform. Fol. 2-pollic. alterna , petiol. integerr. glabra , inferiora basi subtruncata , super. magis cordata . Fl. axillar. Panicula patentiss. Bract. ovatæ , acutæ , integræ . Differt a sequenti , cui simil. fl. minutis , obtusis : panicula ramosa , racemosa , patentiss.
30. *dumetorum*. P. fol. cordato-sagitt. caul. volub. lævi : fl. carinato-alatis . Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 756. In Europæ austral. sylvis umbrosis ☽ . Habitus altior. Caul. non striatus . Panicul. ex racemo composito , alterne bifario . Fl. longe peduncul. alii axill. racemosi , alii spicati . Anth. albæ .
31. *scandens*. P. fol. cordatis : caul. erecto , scandente . Syst. veg. ed. 14. Fagotriticum &c. Pluk. alm. tab. 177. f. 7. *Fagopyrum* &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 90. f. 1. In America 24 . Planta magna . Caul. rubens . Fl. carinati . Obs. Petiolor. basis subtus poro perforata in P. scandente , dumetorum , Convolvulo . stridum .

frigidum.

P. fl. hexandr. digynis : fol. lineari-lanceol. stipulis ciliatis : caule divaricato, patulo : spicis interruptis, rariss. *All. Fl. Ped. tab. 67. f. 1.*
Perficaria pusilla &c. Lob. ic. 316.
Perficaria pumila. Tabern. hist. 858.

In fossis humentibus, ad stagnorum margines &c. ⊖.
 Caul. procumbent. rotundi, ex viridi-rubent.
 Fol. alterna, petiolo dilatato-amplexic. supra intense virid. subtus pallidiora, nervo albicans, glabra, ambitu subtilissime ferrulata.
Geniculi nodosi. Fl. intus albi, extus purpur.
 Stam. 5-6. Styli 2.

Bellardi.

P. erectum ; fl. axillar. octandr. trigynis : fol. elliptico-lanceol. vaginis ciliatis. *All. Fl. Ped. tab. 90. f. 2.*

In Pedemontii arvis, vere florens ⊖.

Rad. tortuosa, alba. Caul. erectus, 2-ped. & ultra, rotundus, firmus, striatus, glaber, plures per alternam dichotomiam divisus : rami omnes florigeri, fl. alternis, subfessil. Fol. breviter petiolat. nervo subtus eminente ; ramæ linear. floralia breviora, subfessil. Flos primum albus, dein roseus, breviter pedunculat. sœpe solitar. quandoq. 2-3. Vagina argenteo colore nitens, ad basin fusca, in ore lacera, & resecta.

602. COCCO-Cal. 5-part. colorat. Cor. o. Bacca calycina,
 LOBA. 1-sperm.

i. uvifera. C. fol. cordat-subrotun. nitidis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 73. ed. piæta tab. II.*
Uvifera &c. Pluk. alm. tab. 236. f. 7.
Guaiabara &c. Plum. ic. tab. 145.
Prunus &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 220. f. 3.
Catesb. car. 2. tab. 96.

In America ♂.

Arb. procera, diffusa, ramosa, ramis vastis, sœpe fulcratis, cortice ciner. Fol. magna, alterna, breviter petiol. basi vaginant. subrotun. cordata, in breve, & obtusum acumen abeuntia, integerr. crassa, coriacea, nitidiss. sature virentia, nervo medio, venisq. magis, minusq. coccineis. Racemi terminal. longiss. erecti ; fructiferi penduli. Fl. parvi, alblicant. odore fl. *Cerasi.* Fruct. *Cerasi* magnitudine,

Tom. II.

E e

OCTANDRIA TRIGYNIA.

subrotun. vel subovati; purpur. pulpa acidodulcis, purpur. edulis. Nux. semitrilocul.

2. pubescens. C. fol. orbiculat. pubescentibus. Syst. veg. ed. 14.

Scortea &c. Pluk. phyt. tab. 8.

In America b.

Arb. 60-80 ped. Coma saepe constat 2-3. tantum ramis crassis, inordinatis, cortice subfuscō. Lignum durissimum, sub terra lapidescens. Fol. pauca, alterna, diametro 2-ped. brevi, & vaginanti petiol. innixa, cordata, integerr. venolitif. valde rugosa.

3. excorinata. C. fol. ovat-oblong. ramis quasi exorticatis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 78. ed. piñia tab. 115.

Guaiabara &c. Plum. ic. 146. f. 1?

Arbor &c. Pluk. alm. tab. 364. f. 4?

In America b.

Arb. 20-ped. ramosa, comosa. Fol. semiped. alterna, petiol. integerr. nitida, rugosa, venosa. Racem. terminal. simplic. solitar. sursum versi. Fl. exigui, flavescent. Fruct. dulcis, edulis.

4. punctata. C. fol. lanceol-ovat. Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 77. ed. piñia tab. 114.

Uvifera &c. Pluk. alm. tab. 237. f. 4.

In America b.

Arb. Fol. subpetiol. lata, cordata, longe emargin. venosa. Fl. racemosi, sessil. Fruct. punctati, aromatici. Var. C. uviferæ.

5. emarginata. C. fol. subrotun. exciso-emarginat. subcoriaceis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. I. tab. 9.

In Amer. calidiore b.

6. barbadensis. C. fol. cordat-ovat. undulatis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. I. tab. 8.

In Barbados b.

Habitus C. uviferæ. Fol. 5-pollic. valde coriacea. Petiol. tomentoso-ferrugin.

7. conifolia. C. fol. ovatis, membranaceis. Syst. veg. ed. 14. Coccobolis &c. Brow. Jam. tab. 14. f. 3.

In Jamaica b.

Recedit a cōngeneribus. Fol. non coriacea. Petiol. cincti membrana loco stipulæ. Racem. terminal. simpl. Fl. sparsi, pedicellati.

- leoganensis*. C. fol. subrotund. integerr. nitidis : racemis fructuum erectis. *Jacq. amer. tab. 178. f. 33. ed. picta tab. 260. f. 30.*
In Domingo fruticosis H.
 Arbusc. erecta, 10-ped. ramosa. Fol. figura C.
uviferæ, at duplo min. coriacea, venosa.
- obtusifolia*. C. fol. oblong. obtusiss. *Jacq. am. tab. 74. ed. picta tab. III.*
In Carthagena fruticosis H.
 Arbusc. 12-ped. ramoliss. ramis cinereis, glabris.
 Fol. numerosa, alterna, petiol. apice plerumq.
 latescente, plana, coriacea, integerr. nitida,
 venosa. Racem. terminal. solitar. simplic. Fl.
 parvi, albi. Nux arcte calyc. involuta, atra.
Fructus adstringens.
- flavescens*. C. fol. lanceol-oblön. obtusis, mucronat. *Jacq. am. tab. 75. ed. picta tab. II2.*
In Domingo fruticetis H.
 Arbusc. 12-ped. ramosa. Fol. numerosa, alterna,
 petiol. integerr. coriacea, subrigida, fere
 avenia, nitida, flavo-virent. Racem. terminal.
 erecti, simpl.
- diversifolia*. C. fol. ramusculis ovatis, ramorum ovat-corda-
 tis. *Jacq. amer. tab. 76. ed. picta tab. II3.*
In Domingo H.
 Arbusc. 10-ped. ramosa. Fol. numerosa, ma-
 gnitudine varia, alterna, petiol. attenuata in
 apicem obtusum, subcoriacea, integerr. veno-
 sa, nitida, læviter rugosa. Racem. terminal.
 erecti, 3-pollic. solitar. simpl. Drupa magni-
 tudine *Cerasi* min. subrotun. pellicula nigrican-
 te, pulpa molli, purpur.
603. PAUL- LINIA. Cal. 5-phyll. Petal. 4. Nectar. 4-phyll. inæqua-
 le. Caps. 3. compressæ, membranac. con-
 natæ.
- I. asiatica*. P. fol. ternatis; petiol. canaleq. aculeatis. *Syft. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 3. tab. 61. f. I.*
Chamelæa &c. Burm. Zeyl. tab. 24.
Frutex &c Pluk. alm. tab. 95. f. 5.
Kaka-toddali. H. Mal. 5. tab. 41.
In India H.
 Frutex ramis teretibus. Fol. alterna. Foliol.
 subsessil. lanceol-ovat. obtusifc. crenata. Ra-
 cemi axill. erecti. Aculei sparsi, recurvi. Fl.
 candidi, grayeolentes.

3. *Seriana*. P. fol. ternatis; petiolis nudis: foliol. ovat-oblong. *Syst. veg.* ed. 14. *Jacq. Obs.* 3. tab. 61. f. 2. *Plum.* ic. 113. f. 2.
In America calidiore ♂.
 Planta sarmentosa, & volubil. Foliol. intermedia
ma: Pedunc. axillar. racemoso-panicul. cirrhi-
feri. Caps. ad basin gerit sem. Foliol. sunt
breviter petiol. nec adeo serrata, ut in iconē
Plumeriana.
3. *nodosa*. P. fol. ternatis; petiolis nudis; foliol. medio
obovato. *Syst. veg.* ed. 14. *Jacq. ibidem* tab. 62.
f. 3.
In America ♂.
4. *Cururu*. P. fol. ternatis; petiolis marginatis. *Syst. veg.*
ed. 14. *Jacq. ibidem* tab. 61. f. 4. *Plum.* ic.
111. f. 2. *Pluk. phyr.* tab. 145. f. 4.
In America calidiore ♂.
 Caul. scirmentosi, scandent. flexuosi. Fol. alterna.
 Foliol. petiol. oval. subserrata, glabra. Cirrus
axill. & racemi. Fruct. pyriform. Sem. ad a-
piceum.
5. *mexicana*. P. fol. biternat. petiol. omnibus marginatis: caul.
aculeato. *Syst. veg.* ed. 14. *Jacq. ibidem* tab.
61. f. 5.
Seriana &c. *Plum.* ic. 113. f. 1.
In Amer. calidiore ♂.
 Planta scandens, & aculeata. Foliol. sessil. lan-
ceol-linear. obtusa, integræ, glabra. Racem.
axill. simpl.
6. *carthaginensis*. P. fol. biternat. petiol. omnibus marginatis: caul.
inermi. *Syst. veg.* ed. 14. *Jacq. ibidem* tab. 62.
f. 6.
Habitat Cariagenæ ♂.
 Fol. cæteris magis incisa, & valde tenuia.
7. *caribæa*. P. fol. biternat; petiolul. omnibus marginat. ramis
aculeatis. *Syst. veg.* ed. 14. *Jacq. ibidem* tab.
62. f. 7.
In Caribæis ♀.
 Foliol. subovat. incisuris raris.
8. *eurassavi-*
ca. P. fol. biternat. petiolul. omnibus marginat. ramis
inerribus. *Syst. veg.* ed. 14. *Jacq. ibidem* tab.
61. f. 8.
Cururu. *Plum.* ic. 111. f. 1.
Cordis &c. *Pluk. alm.* tab. 168. f. 6.
In Curaçao ♂.

Foliol. sessil. ovat. oblong. basi adtenuata, incisa,
crenata. Fl. racemosi. Fruct. subpyriform. tri-
quetri, rubri.

9. *barbedensis*. P. fol. biernat. foliolo intermedio marginato;
reliquis nudis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. ibidem
tab. 62. f. 9.

In Barbados H.

*Diffr. a priore potissimum folior. fig. & incisuris
rarioribus.*

10. *polyphylla*. P. fol. triternat. petiolul. nudis. Syst. veg. ed. 14.
Jacq. ibidem tab. 61. f. 10.

Seriana. Plum. ic. 112.

Cordis &c. Pluk. alm. tab. 168. f. 5.

In Amer. calidiore H.

Planta fruticosa, & sarmentosa. Foliol. subova-
ta, obtusa, raro crenata. Cirrus axillar.
Panicul. longiss.

11. *triternata*. P. fol. triternat. petiolul. marginat. Syst. veg. ed.
14. Jacq. ibidem tab. 62. f. 11. amer. 180.
f. 38. ed. picta tab. 260. f. 29. quoad folium.

In sylvis Domingo.

Arbores scandit ad 20. pedes. Rami longi, fle-
xiles. Fol. multa, alterna, nitida. Fl. axill.
sub 50. parvi. Cal. & cor. albicans.

12. *japonica*. P. fol. quinato--pinnat. petiolulat. marginatis:
caule herbac. inermi. Syst. veg. ed. 14. Thumb.
Jap.

In Japonia.

Caul. scandens, angulatus. Fol. alterna, petiol.
foliol. infima subfessil. ovata, incisa, 2-3-fid.
pollicar. foliol. intermedia ternata, petiolulo
marginato: pinnis lateral. ovatis, integris,
vel incisis, intermedia 3-fid. Foliol. ultimum
pinnatum, petiolulo articulato, marginato.
Pinnæ 2-iugæ, oblong. 3-fid. infima m: 3-fid.
Fl. foliis oppositi, paniculati.

13. *pinnata*. P. fol. pinnat. petiol. marginatis: foliol. nitidis.
Syst. veg. ed. 14. Jacq. ibidem tab. 62. f. 12.

Clematis &c. Plum. amer. tab. 91.

In Brasilia Ec. locis siccis, arenosis H.

Caul. sarmentosus, lensus. Foliol. 5. opposita,
sessil. oblong--ovat. profunde, & remote ser-
rata. Racemi terminal. longi. Fl. parvi, ex
luteo, albo, & viridi col. variegati. Caps.
coccinea.

- 14. tomentosa.** P. fol. pinnat. petiol. marginatis : foliol. tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. I. tab. 10. & Obs. 3. tab. 61. f. 13.*
In America L.
 Planta tomentosa, sicuti, & calyc. qui ex glauco-fusci. Petioli inter foliol. inferiora, non marginati.
- 15. diversifolia.** P. fol. supradecomposit. petiol. marginatis ; infimis pinnatis, reliquis ternatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ibidem tab. 62. f. 14.*
In America L.
-
- tetragona.** P. fol. pinnatis ; foliol. integerr. fructu 4-gono, subalato. *Aubl. Guian. Rumph. Arib. 5. tab. 2.*
In Guiana.
- 604. CARDIOSPERMUM.** Cal. 4-phyll. Petal. 4. Nectar. 4-phyll. inæquale. Caps. 3. connatæ, inflatæ. Sem. basi cordis effigiem referentia.
- 1. Halicacabum.** C. fol. lævibus. *Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. 6. tab. 24. f. 2. Dod. pempt. 455.*
In Indiis ♂.
 Caul. debiles. Fol. ovata, incisa. Pedunc. teretes, fol. longiores. Cal. minimus, lacin. 2. min. Cor. parva, alba. Variat fol. & fruct. min.
- 2. Corindum.** C. fol. subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Brasilia.
 Simil. priori, sed caps. & fol. subtus tomentosa. Pedunc. inter cirrhos 10-11-fl. a casu fructificationum persistentes, rigidi. Capsul. arctiores.
- 605. SAPINDUS.** Cal. 4-phyll. Petal. 4. Caps. 3, connatæ, ventricosæ, carnosæ.
- 1. Saponaria.** S. fol. impari-pinnat. caul. inermi. *Syst. veg. ed. 14. Men. in Zann. tab. 149.*
 Nux amer. &c. *Comm. hort. I. tab. 94.*
 Nuciprunifera &c. *Pluk. alm. tab. 217. phyt. tab. 217. f. 7.*
In Indiis L.
 Arb. Foliol. longa, elliptica, subundul. nutantia, petiol. longis alatis. Fru&t. rotund. *Cerasi magnitudine, niger, vel pullus.*
- 2. spinosus.** S. fol. abrupte pinnat. caul. spinosiss. *Syst. veg. ed. 14. Brown. Jam. tab. 20. f. 7.*
In Jamaica L.
 Frutex, & rami spinosiss. Foliol. ovata.

- S. trifoliatus*. S. fol. ternatis. Syst. veg. ed. 14.
In Malabarica H.
- S. chinensis*. S. fol. pinnatis: foliol. laciniat. Syst. veg. ed. 14.
Kölrenteria paniculata. Ad. petrop. v. 16. tab. 17.
In China.
 Cal. 5--phyll. inferus; lacin. ovatis, concavis,
 membranac. inaequil. infimi lateris divergentibus.
 Petal. 4. oblong. æqual. sursum veisi,
 apice recurvo, flava. Foliol. *Crataegi Oxyanthæ*.
-
- frutescens*. S. fol. pinnatis: fruct. coccineo. Aubl. Guian.
 tab. 138.
In Guiana H.
 Frutex 8-ped. superne foliosus. Fol. ampla, alterna.
 foliol. 7--iuga, subsessil. ovat--oblon.
 acuta, integerr. Costa inferne foliol. destituta,
 apice acuto terminata. Fruct. axillar. racemosi,
 globosi, coccinei, cum tuberculo subrotun. minimo, intus cavo, ad basin adnato:
 quandoq. fruct. gemelli.
- arborescens*. S. fructu parvo, rubro. Aubl. Guian. tab. 139.
In Caribæis H.
 Arb. 7--8--ped. superne ramosa. Fol. alterna,
 pinnata. Foliol. 3-iuga, subsessil. ovata, acuta,
 integerr. glabra. Fructus axillar. racemosi, ut
 in priore, sed min. & eiusdem coloris.
-

TETRAGYNYA.

606. PARIS. **C**al. 4-phyll. Petal. 4. angustiora. Bacca 4-locul. polyliper.
- P. quadrifolia*. P. fol. quaternis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dun.
 tab. 139.
 Herba paris. Garid. tab. 45. Black. tab. 286.
 Bauh. hist. 3. p. 613.
 Erba paris. Match.
In Europa neboribus 4.
 Rad. crassum tuber refert. Caul. simpl. Fol. 4.
 raro 3-5. univerticillata, lanceol-ovat. crassiss.
 late virentia, venosa, glabra. Flos terminal.

pedunculat. solitar. Petal. e viridi-pallent. Bacca nigra.

607. ADOXA. Cal. 3-fid. inferus. Cor. 4-5-fid. supera. Bacca 4-5-locul. calyce coalita. Sem. solitar.

1. *Moschata*. A. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 94. Sabb. hort. 2. tab. 69.

Fumaria &c. Tabern. ic. 39.

Minimus Ranunculus &c. Lob. 674.

In Europæ nemoribus 24.

Odor Moschi. Rad. crassa, geniculata, squamosa.

Caul. palmar. 2-phyll. paucifol. Fol. ternata, triloba, flavo-virent. tenuiora, glabra; lobis petiolat. lateralibus semibilobis, medio semi-trifid. Fl. spicati. Petal. luteo-virent. Stam. quandoq. 9-10. Bacca succulenta.

608. ELATINE. Cal. 4-phyll. Petal. 4. Caps. 4-locul. 4-valv. depressa.

1. *Hydropiper*. E. fol. oppositis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 156. Buxb. cent. 3. tab. 37. f. 2.

Alsinastrum &c. Paris. 5. tab. 2. f. 1. 2.

In Europæ inundatis ♂.

Caulicul. exigui, diffusi, ramosi, inde radiati.

Fol. ovat-ellipt-lanceol. Pedunc. 1-fl. Petal. rosea, vel alba, calyc. ma.

2. *Alsinastrum*. E. fol. verticillatis. Syst. veg. ed. 14.

Potamopytys. Buxb. Act. Petrop. tab. I. f. 6.

Alsinastrum &c. Vaill. paris. tab. I. f. 6.

In Europæ fossis 24.

Caul. per aquam radicans, inde erectus, dodrant. simpl. latiuscul. Fol. Galii, lineata; inferior. acutiora, reflexa; superior. latiora, obtusa, ovat-lanceol. patula. Fl. parvi, albidi. Caps. fuscae.

609. HALO- CAL. 4-fid. superus. Petal. 4. Drupa sicca. NUX RAGIS. 4-locul.

1. *prostrata*. H. fol. lanceolat. integris: fructibus globosis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen.

In nova Caledonia ad littora maris ♂.

P.° intuitu, fructu maturo, referebat Ammanniam latifoliam. Rami 4-gon. glabri. Fol. opposita, sessil. oblong. basi adtenuata, undulata, glabra. Fruct. axill. solitar. peduncul. globosi.

NOVA GENERA. MONOGYNIA.

GRUBBIA.

F L. subterni, lanati, intra perian. comm: 2--
phyll.

rosmarinifolia, *G. Berg. Fl. cap. Ad. Stock.* 1767, *tab. 2. f. 3.*
Ad cap. b. Spei $\ddot{\text{b}}$.

Caul. fruticos. Rami oppositi, ramulosi. Fol. op-

Cat. Nutt. Rami
posita linear ob-

Caul. fruticul. Rami oppoliti, ramuloi. Fol. opposita, linear. obtusiuscula, margine revoluto, supra virid. subtus glauca, semiunguicul. patentia. Fl. axillar. conglomerati, sessil. albo-hirsuti. Cal. fuscus. Petal. extus albo-lanata.

GLAUCENA.

Cal. Perian. 1-phyll. 4-dent. breve, planiuscul.

Cor. Petal. 4. subrotun. sessil.

Stam. Filam. 8. subulata, cor. breviora, inferne dilatata, incrassata, intus exscavata, germini circumstantia, nectariumq. constituentia. Anth. subrotun. versatiles.

Pistil. Germ. subrotund. styl. cylindric. staminibus brevior. Stigm. simpl.

Sem.

G. Burm. Fl. Ind.

G. Birm. 2

Frutex. Fol. alterna, pinnata. Foliol. plurima,
petiolat. ovat--oblon. vix crenata, pubescent.
Racemi paniculati.

SODA DA.

Cal. Perian. 4-phyll. inæqual. deciduum, lacinia
super. maxima, convexa, gibba, compressa:
3. inferior. æqual. linearis-lanceol. patentes,
marginè ciliat.

*Cor. 4-petal. inæqual. calyc. longior. Petal. 2.
superior. recondita primum inter laciniam ma-
gnam calycis, ovata, acumin. plana: 2. infer.
alternantia cum calyc. 3. laciinis minor: ob-
longa, acuta, plana, margine, & subtus villosa.*

OCTANDRIA MONOGYNIA.

Stam. Filam. 8. filiform. petalis longiora, inaequal. inclinata, fusco-virid. Anth. simpl. erectæ, flavæ, lanceol. recurvæ.

Pistill. Pedicellus ex receptac. filiform. inclinatus, longitudine stamin. Gerin. globosum, 4-sulcat. Styl. subulat. Stigm. acutum.

Peric. Fruct. Nuce Coryli maior.

decidua.

S. Forsk. *Ag.*

In Arabia H.

Frutex diffusus, ramis alternis, remotis, sesquipoilic. patentibus. Fol. decidua, raro præsentia, sessil. oblon. Spicæ 2. breves, patentes. Pedunc. a spinis exeuntes, terni, 1-fl. Fl. & fruct. rubri.

M A L I C O P E .

Cal. Perian. inferum, campanulat. 4-part. lacin. rotundat.

Cor. Petal. 4. ovat. acumin. patentia. Nectar. germinis basi adiutatum, 8-fid. lacin. crenatis.

Stam. Filam. 8. subulata. Anth. erectæ, subcordatæ.

Pistil. Germ. ovat. apice 4-lobum. Styl. brevis, sub 4-angul. Stigm. crassusc.

Peric.) Germ. 4-sperm. forte in baccam abiturum.

Sem.) Germ. 4-sperm. forte in baccam abiturum.

Obs. Genus obscurum, ulterius examinandum.

H E Y M A S S O L I .

Cal. Periant. 1-phyll. 4-part. lacin. acutis.

Cor. 4-petal. petal. oblong. obtusis, supra tomentos. albis, receptac. pistilli insertis.

Stam. Filam. 8. Anth. linear. oblon. 2-locul.

Pistil. Germ. ovatum. Styl. brevis, cylindr. Stigm. acutum.

Peric. Drapa ovata, 1-locul.

Sem. unicum, putamine fragili inclusum.

spinosæ.

H. Aubl. Guian. tab. 125.

In Guiana H.

Frutex 5--6--ped. ramis tortuosis, aculeat. Fol. alterna, petiol. ovata, integerr. glabra. Acul. axill. solitar. Fl. axillar. corymbosi, pedunculat.

Petal. inferne virent. superne alba, & tomen-

inermis. tosa. Interdum flos 3-petal. & stam. 6. Drupa flava. Nucleus edul.
H. Aubl. Guian.
In Guiana H.
Caret aculeis. Fl. expansi odorem *Caryophylli aromatici* exhalant.

A N I B A.

Cal. Perian. 1-phyl. 6-part. lacin. ovat. obtusis,
concavis.
Cor. nulla.
Stam. Filam. 8. receptac. pistill. inserta. Anth.
2-locul.
Pistil. Germ. subrotun. styl. brevis. Stigm. ob-
tusum.
Peric.
Sem.
Guianensis. A. Aubl. Guian. tab. 126.
In Guiana H.
Arb. 40--ped. & ultra, apice ramosiss. Fol. op-
posita, petiol. 3-4-5. verticill. ovat--oblon.
acuta, integerr. glabra. Fl. axillar. racemosi,
minimi. Cal. virid. Lignum trunci citrinum,
aromaticum.

I R O U C A N A.

Cal. Perian. 1-phyl. 5-part. lacin. brevioribus,
acutis.
Cor. nulla.
Stam. Filam. 8. tria breviora; 5. longiora, disco
inserta. Anth. oblon. 2-locul. intra singula
filam.
Pistil. Germ. ovat. ad basin disco cinctum. Styl.
oblong. crassus. Stigm. compressum.
Peric. Caps. globosa, 1-locul. 3-4-valv.
Sem. 3--4. membrana pulposa, rubra obvoluta,
placentæ in medio adfixa.
Guianensis. I. Aubl. Guian. tab. 127.
In Caïenna, & Guiana H.
Frutex ramosus. Fol. alterna, petiol. ovata,
dentata, glabra. Stipul. minimæ, acutæ. Fl.
axill. & supra tuberc. caul. & ramorum fasci-
culat. peduncul. Cal. albus. Caps. subternosa,
violæ,

M A T A Y B A.

Cal. Perian. maximum, 1--phyll. 5--part. lacin.
subrotun. acutis.

Cor. Petal. 5. subrotun. emarginata: petalum
quodlibet continet foliol. 2. minora, villosa,
alba, prope unguem adnata, cal. disco inserta.
Stam. Filam. 8. cor. longiora, disco inserta intra
petal. Anth. 4-gon. 2-locul.

Pistil. Germ. ovatum, disco ad basin cinctum.
Styl. nullus. Stigm. obtusum.

Peric. Caps. ovat. oblon. compressa, utrimq. sulco
longitudinali notata, 1-locul. 2-valv.

Sem. 2. reniformia.

I. Guianensis. M. Aubl. Guian. tab. 128.

In Caribæis ♂.

Arb. 50 60-ped. superne ramosiss. rami in centro
longi, erecti; cæteri sparsi, horizontal. Fol.
alterna, pinnata. Foliol. 4-6-8. opposita, vel
subopposita, sessil. ovat. obtusa, integerr. gla-
bra. Fl. axillar. aut terminal. Paniculæ am-
pliss. Cor. exigua, alba. Caps. subvirid.

I C I C A.

Cal. Periant. 1-phyll. 4-dent. denticul. subacutis.

Cor. Petal. 4-5-6. oblonga, acuta, erecta, in
tubum conniventia, apice extus incurva, disco
inserta.

Stam. Filam. 8. disco inserta. Anth. oblong. 2-
locul.

Pistil. Germ. subrotun. ad basin disco cinctum.
Stylus brevis. Stigm. capitat. planum, concav.
4-sulcat.

Peric. Caps. coriac. subrotun. acuta, vel ovata,
2-3-4-valv.

Sem. Ossicul. 2-3-4. angulata. pulpa rubra dulci
obvoluta, aut alba.

Guianensis. I. fl. cespitosis, supra, & ad axill. folior. Aubl.
Guian. tab. 131.

In Guiana ♂.

Arb. 15-ped. superne ramoso-pinn. ramis spar-
sis. Fol. impari-pinn. Foliol. opposita, subles-
sil. ovat. acut. integerr. glabra. Fl. congesti,
breviter peduncul. Petal. subvirid.

E cortice stillat succus resinofus, aromaticus.
I. fol. amplissim. impari-pinnat. fruct. racemoso.
Aubl. Guian. tab. 132.

In Guiana H.

Arb. 60-ped. superne ramosiss. ramis sparsis.
 Fol. alterna. Foliol. magna, longe, & obtuse acumin. subsessil. integerr. rigida, glabra, utrimq. 3. oppositis. Caps. magna, extus valvul. verrucolis, rufescentibus.

Aracouchini. I. balsamifera; fol. ternatis--quinatis. *Aubl. Guian. tab. 133.*

In Caribæis.

Arbusc. 15-ped. superne ramosa, ramis sparsis.
 Fol. alterna. Foliol. ovat. integerr. glabra.
 Fruct. axillar. & terminal. racemosi.

Stillat succus balsamicus, subflavescens, odore grato.

enneandra. I. fol. ternat-quinatis. *Aubl. Guian. tab. 134.*
In Caribæis H.

Arb. 30-ped. superne ramosa. Fol. alterna, impari-pinn. Foliol. opposita, petiol. ovata, acuta, integerr. rigida, glabra. Fl. axillar. & terminal. paniculati. Petal. 5-6. alba. Caps. flavesc.

Stillat succus resinofus, & aromaticus.

I. fol. pinnato-quinatis. *Aubl. Guian. tab. 135.*
In Caribæis H.

Arb. 40-50-ped. superne ramosa. Fol. alterna, impari-pinn. Foliol. opposita, petiol. ovat. acumin. integerr. rigida, glabra. Fl. axillar. & terminal. paniculati. Petal. 5. viridi-albent. Caps. subvirid.

T A L I S I A.

Cal. Periant. 1-phyl. 5-part. lacin. acut.

Cor. Petal. 5. ovat. disco ovarii inserta. Squamulæ 5. breves, erectæ, pilosæ, stam. tenuentes, intra petal.

Stam. 8. brevia, disco inserta. Anth. oblon. 2-locul.

Pistil. Germ. minimum, subrotund. Styl. breviss. Stigm. obtusum.

Peric. subrotund. 4-locul.

Sem.

Guianensis. T. Aubl. Guian. tab. 136.

In Carib. ß.

Arbusc. ramosa. Fol. alterna. impari-pinn. Foliol. crebra, ovat-oblone. acuta, glabra. Fl. paniculati, exigui. Panicul. & fl. rosei.

TRIGONIS.

Cal. Periant. 5-phyl. lacin. oblong. obtusis, erectis, concav.

Cor. Petal. 5. triangular. erecta, basi acumin. plana, intus hirsuta, longitudine calyc. apice villosa.

Stam. Filam. 8. subulata, erecta, basi hirsuta, petal. duplo longiora. Anth. oblong. incumbentes.

Pistil. Germ. ovat. superum, hirsutum. Styl. nullus. Stigm. simpl. obtusum.

Peric.

Lem.

tomentosa. T. Jacq. amer. p. 102.

In Domingo sylvaticis ß.

Arbusc. 12. ped. erecta. Rami iunior. & fol. costæ subtoment. Fol. semiped. altern. abrupte-pinn. Foliol. utrimq. plerumq. 3. oblong. basi adtenuata, serrata, supra glabra, subtus toment. exter. ma. sœpe semipedal. costaq. longiora. Racem. axillar. 7-pollic. simpl. erecti. Fl. numerosi, parvi. Petal. subflavescent.

Dicta Trigonis ob petala inversum triangul. Iso-faec. referentia.

DIGYNIA.

LITCHI.

Cal. PEriant. parvum, 5--dent. extus pubescent.

Cor. 5-petal.

Filam. 6-8. inferne pubescent. Anth. oval. emarginatæ.

Pistil. Germ. 2-lobat. Styl. brevior staminibus.
Stigm. 2. divergentia.

Peric. Drupa subrotunda, squamata. Nucleus
ovalis. Caro edulis.

L. Sonnerat. Voyag. aux Indes 2. tab. 129.

In China H.

Arb. magna, ligno tenero, albo. Fol. alata.
Foliol. 5-7. ovali-lanceol. acuta, integerr. op-
posita, breviter petiol. utrimq. glabra, supra
longitudinaliter sulcata, nitida, dura. Fl. pa-
nicula terminali, parvi, herbacei. Fruct. ma-
turus subruber, edulis.

T O N D I N.

Cal. 4-fid.

Cor. 8-9-petal.

Stam. 8. 4. longiora, 4. breviora. Anth. glo-
bulosæ.

Pistil. Stigm. 2. quorum unum altero crassius.

Nectar. 4. lutea.

Peric. Caps. vel potius nucula pollicem fere lon-
ga, turbinata, superius e rotundo-molliter 3-
gona, & inter torulos exiguo mucrone instru-
cta, 3-valv. 3-locul. Nuclei 3.

Simile Paulliniæ.

surinamenfum. T. Schilling. de *Lepra* tab. I.

Clematis 5-phylla. Plum. Amer. tab. 91.

In locis uliginosis H.

Frutex mediocr. magnitudinis. Caul. trianguli.
Coma diffusa, caulinul. longis, foliosis, cir-
rhosisq. Fol. pinnata, quina uni petiolo. Fl.
axillar. racemosi, candidi.

Valet in Lepra.

T R I G Y N I A.

T O U L I C I A.

Cal. P Eriant. 1-phyll. 5-dent. lacin. subrotun-
concavis.

OCTANDRIA TRIGYNIA.

Cor. Petal. 4. calyc. ma. lanceol. apice villoso,
disco pistil. inserta.

Stam. Filam. 8. alterna min. disco inserta. Anth.
ovat. 2-locul.

Pistil. Germ. oblong. sub 3-gon. disco insidens.
Styli 3. breves. Stigm. acuta.

Capit. trialata, 3-locul. singul. alis 2-valvibus.

Sem. solitar. ovata.

Guianensis. T. Aubl. Guian. tab. 140.

In Caribæis H.

Arb. 20-30-ped. superne ramosa. Fol. alterna,
pinnata. Foliol. 8-iuga, subopposita, subses-
sil. ovata, acuta, integerr. glabra, Fl. axil-
lar. & terminal. paniculati. Ramus paniculæ
3-gon. villosus, tactu asper. Fl. in glomeru-
los densos sparsi, & in spicam dispositi, exi-
gui, sessil. Cor. apice rubro. Capit. rufescens.

PENTAGYNYIA.

POLYSCIAS.

Cal. U Mbel. maxima, verticillato--prolifera;
umbellul. terminal. multiradiat. planis.

Periant. proprium: margo truncatus, persistens,
vix conspicue denticul. notatus.

Cor. Petal. 6-7-plerumq. 8. lanceol-subulata, pa-
tentiss.

Stam. ex numero petalorum subulata.

Anth. erectæ, 4-sulcæ.

Pist. Germ. inferum, hemisphæric. calyce mar-
ginatum. Styl. nulli. Stigm. 3-4-plerumq-5.
breviss. erect-patentia.

Peric. Bacca globosa, 4-locul. calyc. margine,
pistillisq. coronata.

Sem. solitar. triquetra, convexa.

P. Forst. gen.

Ad insulas maris austral.

pinnata.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.



MONOGYNYIA.

611. *Tinus*. Cal. erectus, campanulat. 5-fid. Cor. 5-part. Nectar. urceolat. includens germen. Bacca 3-locul. Sem. solitar.
609. *Laurus*. Cal. o. Cor. calycina, 4-6-8-part. segmen. erectis, concavis. Nectar. glandulis 3. bifetis, germen cingentibus. Filam. interior. glandulifera. Drupa oval. 1-sper. Var. num. stam. & cor. calycinæ divisione.
610. *Anacardium*. Cal. erectus, 5-part. Pet. 3. reflexa. Stam. 9. decimo castrato. Nux magna, reniform. supra receptacul. carnosum.
612. *Cassyta*. Cal. o. Cor. calycina, 6-part. Nectar. glandulis 3. truncatis, germen cingentibus. Filam. interior, glandulifera. Drupa ovata, 1-sper.

TRIGYNYIA.

603. *Rheum*. Cal. o. Cor. impervia, basi angustata, persistens, 6-fid. lacin. obtusis, alternis minorib. Sem. 1. triquetrum, margine membranac. Fl. paniculati.

HEXAGYNYIA.

614. *Batumus*. Cal. o. Pet. 6. duorum ordinum; exter. mucronata, duriora. Caps. 6. polysper. 1-locul. Involucr. umbellæ 3-phyl.

MONOGYNIA.

609. LAU-
RUS.

Cal. o. Cor. calycin-4-6-8-part. Nectar. glandulis 3. bisetis, german cingentibus. Filam. interior. glandulifera. Drupa 1-sperm. corolla calycina comprehensa. Variat num. staminum, & cor. calycinæ divistione.

2. Cinnamo-
mum.

L. fol. trinerviis, ovat-oblong. nervis versus apicem evanescientibus. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. ed. pida tab. 117. Black. tab. 354. Burm. Zeyl. tab. 27.

Cassia &c. Herm. Iugd. tab. 655.

b. Katou-Karva. H. mal. 5. tab. 53.

In Martinica, Zeylona ♂.

Aib. 20 ped. & ultra, comosa, truncō seped. col. e fusco-ciner. Fol. opposita, breviter petiol. 3-5-pollic. plerumq. ovat-oblong. vel ex oblong-acumin. vel subovat. obtuse acumin. integerr. coriacæa, nitida, supra læte virent. subitus albescent. nervis candicantibus, odore *Cinnamomi*. Pedunc. axill. 3-fl. vel 3-fid. pedicell. 3-fl. Fl. parvi, e flavo-virent. odore subfætido. Fruct. olivæform. sature cœruleus. *Dicca enneandra*.

2. *Cassia*.

L. fol. triplicinerviis, lanceol. Syst. veg. ed. 14. *Cinnamomum* &c. Burm. Zeyl. tab. 28.

Cassia lignea. Black. tab. 319.

Carna. H. Mal. 1. tab. 59.

In Malabarica, Sumatra, Java ♂.

Arb. 4-5-orgyal. Fol. spitham. & ultra, breviter petiol. supra virid., subtus dilutiora; iuniora col. hepatico, odore *Cinnamomi*. Fl. axillar. subumbellati, parvi, stelliform. dilute alblicant. odori. Baccæ glandiform. maturæ cœrul-fuscæ, nitentes. An var. prioris fol. angustioribus, & obtusioribus?

Ex cortice radic. elicetur oleum *Camphora* dictum.

3. *Camphora*.

L. fol. triplicinerviis, lanceol-ovat. Syst. veg. ed. 14. Kampf. am. exot. tab. 771. Black. tab. 347.

Arbor &c. Breyn. prod. ic. 16. tab. 2. Comm. hort. 1. tab. 95.

In Japonia ♂.

Caudex ramis longe, lateque brachiatis, cortice nitente. Fol. prior. æmula, alterna, petiol. palmat. 2. digit. transversos lata, nitida. Fl. parvi. Var. buccis rubris, flavis, atro-purpur.

4. *Calilaban*. L. fol. triplicinevis, oppositis. Syst. veg. ed. 14.

Cortex &c. Rumph. amb. 2. tab. 14.

In India Orient. H.

Arb. alta, foliatura densa. Fol. *Cassiae Ligneæ* æmula, palmaria, 3-4. digitos lata, opposita, ovat-acum. firme, supra fature virid., & glabra, subtus cinerea.

Genus dubium ob fol. opposita; fide Rumphii receptum.

5. *Chloroxy*. L. fol. trinerviis, ovatis, coriaceis; nervis apicem attingentibus. Syst. veg. ed. 14. Brown. Jam. tab. 7. f. I.

In Jamaica H.

Fol. rigida, glabra. Fl. singular.

6. *glauca*. L. fol. nervosis, lanceol. perennibus: ramulis tuberculat. fl. solitar. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.

Kuru &c. Kæmph. am. exot. Fusc. V. p. 770.

In Japonia H.

Arbor. Rami patentiss. cinerei, punctis elevatis scabridi. Ramuli subverticill. Fol. in apice ramulor. frequentia, 2-pollic. & ultra, alterna, petiol. acum. obtuso, patula, integerr. margine reflexo, nervosa, supra pallide virid. subtus glauca, vel lutea. Petiol. unguicular. Fl. inter fol. sparsi, breviter peduncul. Drupa ovata, apice parum attenuata, obtusa, cœruleo-atra, magnitudine Pisi.

Oleum fructuum expressum pro fundendis candelis inservit.

7. *pedunculata*. L. fol. nervosis, oblongis, integris: fl. solitar. pedunculatis. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.

In Japonia H.

Caul. fruticosus. Rami a casu folior. nodulosi, rugosi, cinerei. Fol. 2-pollic. opposita, breviter petiol. acumin. glabra. Fl. in apice ramulor.

8. *nobilis*. L. fol. lanceolat. venosis, perennantibus: fl. 4-fid. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 175. Cam. epit. 60. Del. pent. 849.

Lauro. *Math.*

In Italia, Græcia ♂.

Arbus. glabra. Fol. alterna, petiol. ovat-lanceol. undulata, odora. Flos decolor. Bacca sature coerulea. Stam. numero variant: fl. pleno etiam ludit. *Dioica* est.

9. *indica*. L. fol. lanceolat. perennantibus, planis: ramulis tuberculat. cicatricibus: fl. racemosis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 301. f. 1.*

Laurus latifolia &c. *Barr. rar. tab. 877.*

Cinnamomum &c. *Seb. thes. 2. tab. 84. f. 6.*

In Virginia ♂.

Arb. alta. Fol. inter *L. nobilem*, & *Lauro-cerasum*; seu *Padi* æmula, col. subviridi, non ita firma, ut *Laurus*, subpalmar. latitudine 6-unc. Bacca oblong.

10. *Persea*. L. fol. ovat. coriaceis, transverse venosis, perennantibus: fl. corymbosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Amer. ed. piða tab. 264. f. 92. quoad fructum.*

Persea. *Plum. gen. tab. 20. Clus. hist. I. p. 2.*

Prunifera &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 222. f. 2.*

Arbor &c. *Pluk. alm. tab. 267. f. 1.*

In America calida ♂.

Altitudo, & extensio *Pyri*. Fl. multi, parvi, albi, subodori. Fructus gratissim. pugni maior, ex rotundo-obverse ovat. maturus ex fusco-sature purpurasc. Caro butyracea, sapore iucundo. Nucleus subrotund. albus, non edulis.

11. *Borbonia*. L. fol. lanceolat. perennantibus: calyc. fructus baccatis. *Syst. veg. ed. 14. Cates. Carol. I. tab. 63. Seligm. ic. 26.*

In Carolina, Virginia ♂.

Arb. elegans. Fol. magna, vix petiol. glabra, venosa, subtus pubescent. nervis transversal. Fl. axillar. longe peduncul. corymbosi. Fruct. glandiform. quandoq. globosus, carnosus, purpureus, vel aureus.

12. *lucida*. L. fol. oblong. ferratis; ramulis ternis: fl. axillaribus, solitar. subsessil. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia ♂.

Arb. tota glabra. Rami divaricati, nodosi, cinerrei. Fol. in apice ramulorum. sparsa, 1-sesquipollig. breviter petiol. acumine obtuso, mar-

gine reflexo, supra lucida, subtus pallida.
Fruct. oblongi.

13. *umbellata*. L. fol. ovatis, ferratis: ramulis umbellatis: fl. racemosis. Syst. veg. ed. 14. *Thumb. Jap.*

In Japonia ♂.

Caul. fruticosus, ramosiss. Rami subterni, incurvi, tuberculati, cinerei. Ramuli erecti, subumbellati. Fol. in apice ramulorum. sparsa, pollic. & ultra, petiol. obtusa, marginata, nervosa, supra nitida, subtus pallidiora, glabra. Fruct. magnitudine *Pisi*, globosi, coerulei.

14. *æstivalis*, L. fol. oblong. acumin. venosis, annuis, subtus rugosis: ramis supra--axillaribus. Syst. veg. ed. 14.

Cornus &c. *Catesb. car.* 2. tab. 28?

In Virginia ad ripas rivulorum ♂.

Arbor. Fol. petiolat. Fl. umbellati, involuc. 4-phyll. ut in *Corno*. Pedunc. fructiferi colorati. Cor. alba.

15. *Benzoin*, L. fol. ovatis, utrimq. acutis, integris, enerviis, annuis. Syst. veg. ed. 14.

Arbor &c. *Comm. hort.* 1. tab. 97. *Pluk. alm.* tab. 139. f. 3. 4.

In Virginia ♂.

Caudex fuscus, Fol. Citriform. sed molliora, tenuiora, mucronata, supra pulchre virid. subtus albidiiora, odore ingrato. Fl. exigui. Cor. e luteo-herbac.

16. *Sassafras*. L. fol. integris, trilobisque. Syst. veg. ed. 14.

Trew. Ehræt. tab. 69. 70. *Black. tab.* 267.

Cornus &c. *Pluk. alm.* tab. 222. f. 6. *Catesb. car.* 1. tab. 55. *Seligm. ic. tab.* 10.

In Virginia, Carolina, Florida ♂.

Arbor pumila. Fol. primi anni elliptica, integerr. dein triloba. Racemi terminal. Fl. lutei. Baccæ maturæ purpur. Mares 5-petal. 8-andri: hermaphroditæ 6-andræ.

globosa, L. fructu nigro: calyc. rubente. *Aubl. Guian.*
Borbonia &c. *Plum. gen.* 4.

In Guiana.

611. ANA-CARDIUM, Cal. 5-part. Petal. 5. reflexa. Stam. 9. unico strato. Nux reniform. supra receptacul. carnosum.

I. occidentale. A. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 181. f. 35.
ed. piča tab. 121. Black. tab. 369.

Pomifera &c. Catesb. car. 3. tab. 9.

Cassuvium. Rumph. amb. 1. tab. 69.

Cashon. Mer. Surin. tab. 16.

Kapa-maua. H. mal. 3. tab. 54.

In Indiis ♂.

Arb. 20-ped. comosa, ramis inæqual. fulcratis.

Fol. alterna, petiol. subovata, coriacea, integrerr. nitida. Panicula terminal. diffusa, corymbosa. Fl. pl. parvi. Cal. supra receptacul. carnosum, pyriforme. Cor. rubra, suaveolens. Nux reniformis, flavo-coccinea. Nuclei albi, dulces, sapore viroso, acidulo.

Nux oleo caustico scatet; e qua, candelæ admota, ignis lusorius physicis.

612. TINUS. Cal. 5-fid. Cor. 5-part. Nectar. urceolat. includens germen. Bacca 3-locul. Sem. solitar.

I. occidentalis. T. Syst. veg. ed. 14.

Volkameria &c. Brow. Jam. tab. 21. f. 1.

Baccifera &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 198. f. 2.

In Jamaica ♂.

Arb. trunco crasso, cortice lutescente, ramis in orbem dispositis. Fol. in apice ramulor. 5. unc. longa, $\frac{1}{2}$ unc. lata, petiol. laevia, obscure virid. Baccæ pl. Pisi magnitudine, subrotund. peduncul. pallide luteæ, glabræ, calyc. fusco coronatæ; pulpa dulci, alba, farinacea; ossiculo fusco.

613. CASSYTA. Cor. calycina, 6--part. Nectar. glandulis 3. truncatis, germen cingentibus. Filam. interiora glandulifera. Drupa 1-sper.

I. filiformis. C. filiformis, laxa. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 79. ed. piča tab. 116.

Cuscuta &c. Pet. gaz. tab. 49. f. 12. Pluk. alm. tab. 172. f. 2. Rumph. amb. 5. tab. 184. f. 4.

Acatsia-valli. Hort. mal. 7. tab. 44.

In India.

Herba Cuscutæ; fructificatio Lauri. Planta parasitica, diffusa, aphylla, filamentosa, ramul. inordinat. nitida. Cauliculus emittit pl. verrucas situ longitudinali, pedibus *Erucarum* omnino similes. Spicæ lateral. crassæ. Fl. minimi, albi, inodori. Fruct. Pisiform. albi, nitidi, pellucidi, sapore dulci.

2. *cornicula-* C. ramis lignosis, spinosis. *Syst. veg. ed. 14.* *Burm.*
ta. *Ind. tab. 33. f. 1.*
In Celebis montibus, inter truncos putridos H.
 Rami pedal. crassitie digitii. Spinæ solitar. recur-
 væ. Fol. spinis min. lanceol-linear. Baccæ
 subsessil.
-
-

TRIGYNIA.

613. RHEUM. C Al. o. Cor. 6-fid. persistens. Sem. 1. tri-
 questrum. Fl. paniculati.
1. *Rhaponti-* R. fol. (subrotundo-cordat.) glabris: petiol. sub-
 cum. *subtus sulcatis.* *Syst. veg. ed. 14.* *Black. tab. 262.*
Sabb. hort. t. tab. 34. *Knorr. del. 2. tab. R.*
Alp. Rhap. I. tab. I.
In Thracia, Scythia, Monte aureo 24.
 Fol. vix undulata, & fere plana, virid. adspersa
 poris. Petiol. subtus rubri. Panicul. rotunda-
 ta, ramul. confertis. Corollul. & pedicelli nivei.
2. *Rhabarba-* R. fol. (oblong--cordat. undulatis) subvilloso;
 rum. petiol. æqualibus. *Syst. veg. ed. 14.*
R. undulatum. *Amœn. acad. 3. tab. 4.*
In China, Sibiria H.
 Fol. magis oblonga, & undulata, canescens, &
 pilis brevissim. rectis, albidis. Panicula oblon-
 ga, ramul. divaricat. corollul. & pedicell. al-
 bidis.
3. *palmatum.* R. fol. palmatis, acumin. *Syst. veg. ed. 14.* *Linn.*
fasc. 7. tab. 4. *Ad. Engl. 1765. tab. 12.* *Black.*
tab. 600. a. b.
Rhabarbe. *Brun. orient. tab. 73.*
In China ad murum 24.
 Fol. scabriuscula; seminalia ovalia, & integra.
 Geminæ obscure rubræ. Folior. lacin. oblong.
 acutiusculæ. *Est R. officinale genuinum.*
4. *compactum.* R. fol. sublobat. obtusiss. acute denticulat. gla-
 bert. lucidis. *Syst. veg. ed. 14.* *Mill. Did.*
tab. 218.
 Fol. magis quam reliqua, coriacea, seu compa-
 ña. Lobi rotundati, obsoletiores, crenati,
 margine cartilagineo, utrimque glaberr. venis
 robustioribus. Paniculæ rami nutantes.

5. *Ribes*, R. fol. granulat. petiolis æqualibus. *Syst. veg.*
ed. 14. *Lapathum &c. Dill. elth. tab. 158. f. 192. Po-*
coch. orient. tab. 84. *In Persia, Libano, Carmelo 24.*
Fol. subrotunda, aspera, & verrucosa.
6. *tataricum*. R. fol. cordato ovat. integris, planis, glaberr.
 petiol. semiteret. angulatis: panicul. fulcata.
Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. *In Tataria min. 24.*
Folia magna, radicalia, humo incumbent. Pe-
tioli rubri. Nervi folior. valde dilatati. Inflo-
rescentia vix fol. altior. Racemi sulcati.
7. *hybridum*, R. fol. cordatis, acuminat. planis; radicalibus
 utrimq. 2-3-dent. reliquis repandis. *Syst. veg.*
ed. 14. Comm. Gotting. 1779. vol. 2. tab. 1.
Habitat . . .
Gemma vernalis, ovata, rubra. Caul. fistulo-
sus, internodiis subpedal. punctis rubris con-
persus. Fol. petiol. patentiss. subvillosa: radi-
cal. multa, longe petiol. quaquaversum dispo-
sita, ovat-acut. quædam acuminata, cordata,
quædam palmata, cætera repanda; subrugosa,
5-nerv. nervis purpur. caulina alterna, denti-
bus obsoletis. Stipul. sesquipalm. vaginant. lu-
teo-rubræ. Fl. pyramidati, viridi-albescent,
ut in R. Rhabarbaro; sed min. R. Rhapont.
Convenit igitur cum R. palmato gemma rubra;
caul. alto, rubro-maculato, & internodiis ma-
gnis instruō; fol. magnis, explanatis, paten-
tiss. & circumscript. similibus, licet forma dis-
crepantibus: petiol. longis, rubicundis; panicul.
longioribus, & magis pyramidalibus; fl. pau-
cioribus quam in R. Rhapontico, non viridi-al-
bis, & inde rubescitibus.

HEXAGYNYA.

614. BUTO-
 MUS,

Cal. o. Petal. 6. duorum ordinum; exteriora
 mucronata, duriora. Caps. 6. polysper. 1-lo-
 cul. Involuc. umbellæ 3-phyll.

- I. umbellatus.* B. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 604. Cæsalp.
553.
Sedo adfinis &c. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 5.
f. I.
Juncus floridus. Matth. 1037.
Juncus &c. Lob. ic. p. 86.
In Europæ aquosis 4.
Culm. erectus, 2-cubit. teres. Fol. radical. longiss. cubital. ensiform. triquetra. Pedunc. sub-20. ex summo culmo umbellati, digitum longi. Petal. ovata, albo, rubroq. col. varia. Stam. petalis breviora. Stigm. 2-fid. Var. petal. totis albis.
-

NOVA GENERA.

MONOGYNIA.

PALOUE.

- Col. P* Eriant. duplex; exterius 1-phyll. 2-part. lacin. ovat-oblong-acut. ad basin squamulis munitum; interius 1-phyll. cyathiform. 4-5-fid. lacin. oblong. acutis, unica ma.
Cor. Petal. 3. longa, angusta, fimbriata, calyc. laciniae latiori ad basin inserta.
Stam. 9. filiform. cor. longiora, varie inflexa, disco circulari ad faucem calyc. inserta. Anth. crassæ, versatiles, 2-locul.
Pistil. Germ. pedicellat. (pedicello ab uno latere ala membranac. munito) oblong. compressum. Styl. filiform. longitudine stam. Stigm. obtusum.
Peric. Legum. longum, angustum, 1-locul. 2-valv.
Sem. 7-8. ovat. compressa, glabra.
I. Guianensis. P. Aubl. Guian. tab. 141.
In Caribæis 5.
Frutex 15-ped. ramosus. Fol. alterna, subsessil. ovat-oblong. acuta, integerr. glabra, virid.

Stipul. 2. minimæ, ad basin petiolor. Fl. terminal. 3-4. peduncul. Petal. purpur. Stam. purpur. Anth. violac. Sem. subrufelcentia.

VOLUTELLA.

Cal. Periant. 6-phyll. minimum deciduum; laciniae ad basin cor. subrotundæ, ciliatæ, planæ, tres alternæ, exteriores crassiores.

Cor. inæqual. erecta, calyce quadruplo longior. Pet. 6. tria exter. ovalia, obtusa, concava, interne e basi emittentia corniculum cochlearifor. Tria alterna interiora, reliquis breviora, angustiora, lanceol.

Filam. Anth. 9. separatae, sessil. inter cor. & nectar. pyramidales. Nectar. inter anth. & pistil. Cornicula 3. recta, transversa, spathulata.

Pistil. Germ. in calyce demersum, globosum. Styl. subulat. Stigm. capitulatum, nigrum.

Peric. Bacca globosa, coronata. Drupa sessil. rubra, *Pisi* magnitudine.

Sem. unicum, rugosum, nigrum.

Volutella. Forsk. Æg.

In Arabia 24.

Mira planta; tenuissima, tota fere nulla, sine radic. ramis, fol. caule capillari, fl. vix manifestis, arbores scandit, valde implicant. surgendo fructum, in flore superum, invertit. Caul. valde volubil. fili crassitie, parum striatus, villosus. Pedunc. lateral. patentes, caule crassiores, spicati. Fl. alterni, sessil. globosi, lente min. albi.

CADAMBA.

Cal. Periant. 1-phyll. extus pubesc. caducum, integerr. undulatum.

Cor. 1-petal. infundibulif. tubo longiss. limb. 9-fid. lacin. ovalibus, obtusis; extus pubescens. Stam. Filam. fere nulla. Anth. 9. subsessil. cor. adhærentes.

Pistil. Germ. inferum, parvum, subrotund. Styl. filiform. Stigm. parvum, globosum.

Peric. Drupa subrot. 6-angular. compressa, umbilicata. Nucleus 6-lobat. 6-9-locul. loculis 1-sperm.

Sem. oblonga, alba.

1. *Jasminiflora*. C. Sonnerat *Voyag.* 2. *tab.* 128.

Rava-pou. *Hort. mal.* 4. p. 99.

In Coromandel h.

Arb. pumila, cortice nigro. Fol. opposita, petiol. ovalia, 3. pollices cum dimidio lata, 5. longa, integerr. glabra, mollia, subtus nervosa. Petiol. subrubent. tomentosi. Pedunc. ex axill. superioribus longi, dichotomi, 7-10-fl. Cor. alba, forma, & odore *Nyctanthes*.



