

30

9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0

2m



赤水玄珠

十九



門 十武
編 516
卷 19

赤水玄珠第十九卷目錄

秘結門

大小便不通

閉癃遺溺不禁辨

小便不通門

癃門

赤水玄珠第十九卷

新安生生子孫一奎著輯

秘結門

經曰大便者腎之所主腎主五液也腎氣充則太
便潤虛則燥液耗竭而燥結矣又飢飽勞役損
傷胃氣及食辛熱厚味之物而助火邪伏於血
中前熟真陰皆能使大便燥結又有年老陰血
不足而燥者惟當補而潤之不可用峻利之劑
又大便燥結者不得發汗則重亡津液必秘

而死矣

有陽結有陰結有風結有實結有虛結有氣秘有血秘

仲景曰脉浮數能食不大便者此為實名曰陽結也期十七日當劇脉沉而遲不能食身體重大便反硬名曰陰結也期十四日當劇陽結者散之陰結者熟之風結者諸藥中加羌活防風之類此二味雖是風藥然味辛所以能潤燥也經肾惡燥急食之等以潤之

索古曰脈腑之秘不可一槩治療有虛秘有實秘胃實而秘者能食小便赤以麻仁丸七宣丸之類主之胃虛不能食而小便清利者厚朴湯主之實秘者物也虛秘者氣也

東垣曰有物有積而結者當下之食傷太陰腸滿食不化腹嚙嚙然不能太便者以苦泄之仲景丸局方七宣丸皆以大黃為君之類是也治注夏大使滯者血少血中伏火也黃蓍人參湯加生地當歸身梔仁泥潤之如潤之大便仍久不快者少加煨大黃

微利之如加大黃久不快利者非血結血秘是熟生風止當服黃耆人參湯內用羌活防風各五錢水四盞煎至一盞空心服之其便必大也丹溪戒人用峻利但宜滋養陰血使孤陽之火不燔而金行清化木邪有制脾土清健而運行津液津液入胃則腸潤而通矣須知在西北以開結為主在東南以潤燥為主慎勿膠柱而調瑟王海藏云榧杏仁俱治大使秘當以血氣分之年老虛人大便秘脉浮在氣杏仁陳皮主之脉沉

在益桃仁陳皮主之所以俱用陳皮者以其于陽明病與手太陰為表裏也

脉多沉伏而結伏而遲或結

老人虛人便結肺雀啄者不治

七宣丸

紫胡 枳實炒 討子皮 木香各五 桃仁去尖炒 大兩 甘草 炙四 大黃 麵包煨 十五兩 子大每服二十丸水飲下漸加四五十九以利為度

厚朴湯 胃虛而秘者不能飲食小便清利

陳皮 半夏 麵 枳實 各

炒一兩

甘草 各

炙三錢

厚朴 製各
二兩

白术 三兩 每三五七錢 姜三片 東一枚 水煎服

頭末五錢

為細末

每三錢有

製各二兩

保命集 大黃牽牛散 相火之氣遊走 腸腑大便
秘結

金一兩牽牛五錢

大黃牽牛

頭末五錢

為細末

製各二兩

厥冷合用酒調無厥冷而手足煩熱者 寒湯調

下食後以微利為度此謂不時而熱者溫熱也

凡用大黃半兩至一兩而大便不通利者 加射

香少許調于藥中則大使必大走也

製各二兩

半硫丸 治年高虛秘冷秘 方見燥門

大潤腸丸

治太便秘通用

杏仁 炒枳殼

麻仁

陳皮 各五錢

阿膠

防風

各二錢半

右煉蜜丸

梧子大

每五十丸老人蘇子

煎湯下壯者荆芥湯下

麻仁丸 實秘能飲食小便赤此丸與七宜丸主

之

枳殼 川芎等

麻仁泥減

煉蜜丸 梧子大食前溫水下

又麻仁丸 風秘脾約症小便數大使秘

大黃 枳殼

赤芍藥各一

厚朴五錢

麻仁

杏仁各一兩味俱另研 煉蜜丸 梧子大 每服三十五丸 皂角丸 治有風人太便秘澁

牙皂

枳殼

羌活

桑白皮

檳榔

杏仁

麻仁

防風

白芷

陳皮

蜜丸

梧子大

每服三十五丸

蜜湯下

皂角枳殼丸

太腸有風秘結老人宜服

皂角丸

梧子大

每七十丸

心食前米飲下

搜風順氣丸

枳殼

炒各分

蜜丸梧子大

每七十丸

治大腸秘澁

大黃五兩半熟半生 山茱萸 麻仁泥 郁子仁炮去皮研
菟絲子 山藥 牛膝 檳榔各二兩 防風 枳
殼 獨活各一兩 車前子二兩 煉蜜丸 梧子大 每
二三十丸米飲下平旦臨卧各一服
二仁丸 治老人虛人風秘不可服 大黃者妙
麻仁 杏仁 枳殼 詞子等分
四磨湯 氣滯腹急太便秘澁入蜜丸
沉香 木香 膻榔 烏藥等分 各磨半鍾和

橘杏丸 治氣秘老人虛弱人皆可服
橘紅 杏仁等分 煉蜜丸梧子大每七十丸空心米飲下

藕麻粥 順氣滑大使 蘇子 麻仁 二味不拘多少研爛水瀝取汁煮粥食之

從容瓊陽粥 老人陰血不足大使燥結

肉蓯蓉

瓊陽

煮粥服

小通氣散

虛人憂愁傷肺致令秘澁

曾服藥而大使松

陳皮 蘇葉 枳殼 木通等分 水煎服立通
金液丹 治挾冷結滯兼治傷寒陰結以杏仁、麻仁煎湯吞下 方在寒門

神功丸

治氣壅風盛秘結滯重疼痛煩悶

大黃 詞子各四兩

人參 麻仁各二兩

右蜜丸梧子大

每二十丸米飲下食後臨卧服此藥虛實加減

小柴胡湯 治傷寒陽結能食而大使結
檳榔丸 治太腸實熱不通心腹脹滿

檳榔 大黃 麻仁 枳實 羌活 杏仁

牽牛 白芷 黃芩 各一
人參五錢

蜜丸 梧子大每四十九空心溫水下

四順清涼飲 治同前 每加燈心十根枳殼十

片水煎服

檳榔散 治腸胃有濕大便秘結

檳榔不拘為末每服二錢蜜湯點服

香薷散 治同上 加枳殼檳榔水煎服

五仁丸

津液枯竭大腸秘結傳道銀雞

研均蜜丸 梧子大穿心米飲下五十九

調氣滋補溫腸丸 治發汗利小便亡津液以致

秘結 沉香一兩另用肉蔻容兩

為末用麻子仁汁打糊為丸梧子大每七十丸空心米飲下

潤腸丸 治脾胃中伏火秘結及風結血結

桃仁 麻仁 當歸尾 大黃 羌活 各五錢 升

麻 紅花 郁李仁 右除桃麻仁另研為泥

外餘為末，煉蜜丸梧子大，每三十丸空心

白湯下

一方加防風錢，皂角仁燒存性，無升麻以下三

歲靈仙丸治年高氣虛津液枯燥秘結

黃耆枳殼歲靈仙等分

陳黃湯治老人大使秘結

蜜丸

梧子大，每五十九粒，姜湯熱水任下

黃耆陳皮各五錢，每服三錢，用少麻仁丁合研爛，以水投取汁一鍾，濾去渣于銀店器中

煎候有乳花起，即入白蜜一大匙再煎，含滾調藥末空心服

獨束湯治大便積日不通

太東一枚，劈開入輕粉五分，依舊合起，以麻線縛扎，慢火煮熟，嚼碎以束汁送下

丹溪治虛熱太腸秘

白芍藥一兩半，陳皮生地黃當歸身各一條

芩甘草各二錢，右粥丸每七八十九粒，湯下

潤麻丸治益燥太便不通

秘方此丹溪

卷之九

九

九

麻仁 當歸 桃仁 生地黃 枳殼 各一兩

蜜丸 梧子大每五十九粒心白湯下

導滯通幽湯 治大便難幽門不通上沖吸門不
開噎塞不便燥秘氣不得下治在幽門以辛潤
乏當歸身 桃仁泥 升麻各一錢
地各五分炙甘草 紅花各三錢水煎食前調檳榔

末五錢或加麻仁泥一錢若加大黃名當歸

潤燥湯

潤燥湯

潤燥湯

升麻 生熟地黃各二錢當歸梢 生甘草

黃 桃仁泥 麻仁泥各三錢紅花

升麻各一錢紅花各三分

右除二仁另研作一服水煎數沸下二仁煎

空心熟服

活血潤燥丸 治大便風秘血秘時常燥結

當歸稍一錢防風三錢大黃紙裹活各一錢桃仁

麻仁各二兩皂角燒存性一兩三錢其性滑

右除二仁另研外餘為末蜜丸梧子大宜心

服五十丸白湯送下三兩服後以蘇子麻仁

粥，每曰早晚食之，大便不致燥結，以磁器盛

藥紙封

脾約麻仁丸 和劑治腸胃熱燥大便秘結

厚朴 去皮姜製

芍藥

枳實 麸炒各八分

杏仁 去皮米炒

麻仁 另研各五錢

大黃 蒸焙一兩六錢

蜜丸

梧子大每二十九

潤腸丸

治大便秘滯，連日不通。

麻子仁 一盞半細研用

芝麻 半盞微炒研

桃仁 泡去皮米炒

荆芥穗 為末各一兩

桃仁 黃研如泥

荆芥穗 為末各一兩

車前草前藥入鹽少許同煎，可以代茶飲之，以利度三和散 治七情之氣結于五臟不能流通以致脾胃不和，心腹痞悶，大便秘滯。

川芎 三兩羌活

紫蘇梗 去梗

沉香 宣木瓜 白术

木香 檳榔 陳皮 甘草

各七錢半

大腹皮

每服五錢水煎服。

木香三稜散 治腹中有虫，面色痿黃，一切積滯。

黑丑 半生半炒君

大腹子君 檳榔 木香 三稜

煨 醋 大黃

雷丸 煨

義术

錫灰

炒 大黃

巴上各二兩

右為末每服三錢空心蜜水調下或砂糖水亦可湏先燒肉一片口中嚼之久吐出口中肉汁然後服藥

大小便不通

烏柏湯

治大便不通如神亦能通小便

烏柏木皮方十寸七劈破以水煎取小半盞服之立通不用多服其功神聖兼能取水或以此湯調下五苓散二錢空心服

推車散

治大小便秘經月欲死者

推車客

松枝

土狗

松枝

如男子病推車客用頭

土狗用身

如女子病土狗用頭推車客用

身右新瓦上焙乾為末用虎臼即虎杖樹

皮向南者濃煎汁調只一服經驗如神

皂筍散

治大小便閉格不通經三五日

不生皂角燒灰米湯調下三錢即通

甘遂散

治大小便不通

甘遂

兩

用赤皮者為末煉蜜二合和丸每丁

兩重分作四服寧水下如沫效第二服漸加

蜜硝湯 治大小便不通

好蜜一鍾

入皮硝二錢

用滾水一盃

調下共

導引法 密

是二分

葱汁三匙

猪膽汁二匙

青黛二分

皂角末五

玄胡索三分

右同和一處以猪小

腸一節

將此藥灌入腸內

一頭用竹筒一箇

兩頭俱用線扎定

將竹管入肛門徐徐擠藥

進去

肛門得藥氣即通神效

父法 凡諸秘結不通

或兼他症及老弱虛極不可用下藥者

密熬老入皂角末少許以葱

作膏乘熟搗作丸候冷硬用油塗肛門挿入通
猪膽汁導法 太猪膽一枚瀉汁和醋少許入竹

管灌穀道中少刻即通

麝靈煎 用鹽與蜜乘熟搗如蜜丸法上頭銳用

寸許納入穀道中少刻化開即通

一法 用蜜丸不通者用薑吹入肛門亦妙

提盆散 治雜病非陰候者

草烏頭不拘多少為極細末每用葱一枝肥者
薑削去鬚圓頭上有汁溫蘸之納穀道中

海藏用鹽與蜜兌相合如用草烏頭末相合亦可
蓋鹽能軟堅潤燥草烏能化寒消結可隨症隨
陽所宜用之

宣積丸

巴豆 乾姜 生子 良姜 硫黃 白欖榔
甘遂各等分 為末研飯為丸圓眼大早朝先用椒
湯洗手麻油塗手掌口握藥一粒移時便瀉
欲止以冷水洗之

大小便不通

鹽燒紅填臍內切蒜一片蓋鹽上艾炷炙三五
壯即通

孫尚治趙令女忽吐逆大小便不通煩亂四肢漸
冷無脈凡一日半與大承氣湯一劑至夜半漸
得大便通脈漸和翌日乃安此閑格之病極為
難治垂死而活者惟此一女耳

孫兆方 治大小便不通

皂角燒存性為末粥飲調下三錢立通
外臺秘要方 治脹滿大小便不通

獨蒜煨熟去皮紙包納下部氣立通

止吐透格湯

藿香 砂仁 白叩仁各一錢 陳皮 半夏各二錢 厚朴 蒼朮各一錢半 水二鐘煎七分入姜汁三匙徐嚥服如火熱者去藿香叩仁加黃連炒姜汁 山梔竹茹鬱結氣滯者加香附子 檳榔

通閑導滯散

木香 檳榔 枳殼 當歸尾 厚朴各一錢半 大黃一錢 如小便不通加瞿麥木通活石各一丁

錢半或用八正散水煎食前服

閉癃遺溺不禁辨

生生子曰閉者小便不出塞而不通也癃者癃弱而氣不充淋瀝點滴而出或澁而疼一日數十次或百次俗名淋病者是也閉則多是急病癃則是緩病遺溺睡夢中漏出醒而方知是也不禁者日夜無遍數頓而溺也今各分枝門詳載治法以見新久虛實寒熱氣血各有所依重也惟肝與督脈三焦膀胱主之

經云肝主小便淋溲肝足厥陰之脉逆陰器所生病者遺溺閉癃又云督脈者女子入繫廷孔其孔溺孔之端也其男子循莖下至篡與女子等其生病癃痔遺溺故遺溺閉癃皆取厥陰腧穴及督脈腧穴也又三焦主之者經云三焦下脉在于足太陽之前少陽之後出于胸中外廉名曰委陽足太陽絡也三焦者足太陽少陽之所將太陽之別也上踝五寸別入貫腨腸出於委陽並太陽之正入絡膀胱約下焦實則閉癃虛

則遺溺遺溺則補之閉癃則瀉之是也又膀胱主之者經云膀胱不利為癃不約為遺溺然遺溺閉癃不取膀胱腧穴者蓋膀胱但止藏溺其出溺皆三焦及肝督脈也又經云三焦者決瀆之府水液出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣由是言之膀胱藏水三焦出水治小便不利故刺灸法但取三焦穴不取膀胱穴小便不通門

東垣謂小便不通有在氣在盈之異夫小使者足

太陽膀胱所主長生於申申者西方金也金能
生水金者肺也肺中伏熱水不能生是絕小便
之源也人法象天地膀胱之源自頭項下至于
足故曰陽中之陰如渴而小便不通者肺不能
降是也治法者用清燥金之正化氣味薄之藥
茯苓猪苓澤瀉琥珀燈心通草車前子瞿麥扁
蓄之類皆為淡滲之藥能瀉肺火而清肺金滋
水之化源也若不渴熱在下焦是絕其流而溺
不泄也須用氣味俱厚陰中之陰藥治之二者

之病一居上焦在氣分而必渴一居下焦在
分而不渴血中有濕故不渴也二者之殊至易
分別耳

綱目云氣鬱于下微者杳以散之甚者吐以提之
血鬱于下微者輕刺行之甚者峻刺破之
丹溪云小便不通有氣虛血虛有實熱有痰氣閉
塞皆宜吐之以提其氣氣升則水自降蓋氣乘
載其水也先哲譬之如滴水之器必使上竅通
而後下竅之水出焉氣虛參术升麻先服後吐

血虛四物湯先服後吐痰氣閉塞者二陳加木通香附探吐實熱當分利之或火正散大便動則小便自通老人氣短者四物加參芪益滋腎丸下焦血氣乾者死

統旨云氣虛而小便不通者經曰膀胱者津液藏焉氣化則能出矣氣虛則不能化故不通也血虛而小便不通者蓋血即津液之屬血虛即津液燥而澀道不利故不通也與痰氣閉結於下者虛實之情不同今丹溪皆用吐法乃急則治

其標也雖然氣虛血虛以虛為本虛則必補之而後可夫以參术四物調其真氣而吐之誠可以通其濁而其本之虛也豈參芪四物之類頃刻下咽遂能以補益之耶吾恐病根猶在不久必復作故愚意以為若果氣虛血虛必用補氣補血之藥使其氣盛而施化血生而津潤其便自可以通不必探吐果宜吐者必須先吐俟其潤通繼服補劑庶可平復非如痰氣閉結者但吐之而可已此丹溪未盡之意予故表而出之

戴元禮云汗多而小便赤澁夏月多有此症盛暑所飲既多小便反澁緣上停為飲外發于汗津道不通小腸閉澁則水不運下五苓散然有虛勞汗多而反澁者乃是五內枯燥滋脾既去不能生津當以溫養潤肺十全大補湯或養榮湯不可過用利小便藥蓋汗者心液心主血養血則心得所養汗止金生不待通濁而自清矣諸失精血及患瘧毒入或有小便反澁之症亦是枯竭不潤之故也

水四升煎二升去渣內膠煎溶溫服一日

茯苓戎益湯

茯苓半

白术二

戎益一

枚

脾丸大

為末白湯調下

清肺飲 治肺燥而小便不通

黃芩一

山梔子三

鹽豉二十

粒

長流水煎服

治熱在血分之劑

東垣滋腎丸 下焦陰虛脚膝軟無力陰汗陰痿足熱不能履地不渴而小便閉者邪熱在血分

也

黃柏

知母

俱酒洗焙各二兩

肉桂

錢

右滾水為丸梧子大每百丸加至二百丸煎

百沸湯空心服

潔古黃連丸 治因服熱藥過小便不利諸藥莫能効者或臍下痛不可忍

黃連

炒

黃柏

炒

甘草

各分

水煎服

如耳不通加知母此藥助氣使氣得化則通羅太無白花散 治小便不通膀胱有熱

朴硝為末每服二錢煎茴香湯調下

東垣導氣除燥湯 小便不通乃血溫致氣不通而竅溼 知母酒洗澤瀉各三錢黃柏四錢滑石炒茯苓各二錢水煎不拘時服

小便不通腹下狀如覆枕痛悶難忍者乃腸胃乾涸膻中氣不下則便不化啓玄子謂胞器若得氣海之氣施化則溲便下氣海之氣不及則隱秘不通故不得便利也先用木香沉香各三錢酒調下金氣通達便自通利

又方 煎陳皮茯苓湯調木香沉香末服之

上二方正綱目所謂氣鬱于下微者香以散之是也

丹溪治氣鬱於下甚者以吐法提之

血鬱于下小便不利徵者輕劑行之如蒲灰散滑石白魚散茯苓戎鹽湯皆主之

仲景蒲灰散

蒲黃粉七分滑石三分為細末白湯調一日三服

滑石白魚散

滑石 乳髮灰 白魚各二分乃衣魚也

為末米飲服五分一日三服

羅太無髮灰散 治腰下急滿小便不通

髮灰二錢米醋二合調服 一法與葵子等分

為末米飲服二錢訖即炒黑豆葉蓋其上即

右滑石能逐污血蒲黃髮灰能消污血丹溪

謂髮灰補陰之功甚捷

血鬱于下小便不利甚者峻劑破之

本事桃仁煎治婦人積血小便不通腰腹脹疼不可忍衆醫皆作淋治如八正散之類數種皆治

不効診之乃知血瘕也非瞑眩藥不可去予用此藥得愈 桃仁 大黃 朴硝各一
黑半兩 炙蟲半兩 四味為末先以醇醋二升半銀店器內慢火煎取一升五合下大黃桃仁牽牛等不住手攬良久出丸如梧子大前一日不晚食五年更初溫酒吞下五丸至日午腹大痛不可忍卧少頃下血塊如拳者數枚小便如黑豆汁或如鷄肝蝦蟆衣狀其痛止此藥極峻氣虛血弱者不可輕用凡用宜少服之漸加可也

如見鮮血即止藥續以補藥調理此方金方
倒換散 治癃閉大小便不通小腹急痛肛門腫痛 大黃小便不通減半 刑芥穗大便不通減半

為末每服二錢溫水調下

朴硝牛膝湯 治小便不通或血淋 杜牛膝二兩 以雪水二碗煎至一碗調朴硝一兩空心服立通

雜方

治小便閉用大田螺生去殼搗細封臍上即通

治傷寒後小便不通

生姜八九塊杵碎水十餘碗麻布五六尺同煎數沸用桶盛候可通手以布頻熨小腹良久恰用紅豆末一錢江米一錢井花水調服神効小便如本事方 治小便難小腹脹急不速治即死葱白一斤細切炒全熟以帕子裹分作兩處更替熨臍下即通

聖通方 治小便難腹滿悶不急療即死

秦艽去芦一兩以水一大碗煎七分食分二服服瘥

癥世方 治小便不通

杏仁二十枚研碎水調分作二服効

千金方

治婦人卒不得小便用紫光末以井水

調服三撮便通如小便血五撮立止

灸小便淋澀法

炒益不拘多少熱填滿病人臍中是神闢穴也却用筋頭大艾炷灸七壯良驗或灸三陰交穴

又法 治小水秘澀

猪膽連汁籠套玉莖少刻汁入即通

婦人用藥未貯袋子安入玉戶中必通
玄珠經云陰陽閑格前後不通利小水自行中有
轉胞之症諸藥不効無救則脹滿悶亂而死曾
以甘遂末水調敷臍上內以甘草節湯飲之藥
汁至臍云藥相反而胞自轉小水來如湧泉此
救急良方

一法 治小便不通諸藥無効或轉胞至死

用猪尿胞一箇底頭出箇小竅用翎筒通過放在竅內根底細線繫定翎筒口子細杖子堵定

上用黃蠟封尿胞口頭吹滿氣七分繫定手
用手捻定翎筒根頭放了黃蠟堵塞其翎筒放
在小便頭放開翎筒根頭手其氣透入龕自然
小便下神効

瓜萎散 治腹脹小便不通

瓜萎仁 不拘多少為末每服三錢溫酒調下
如不能食酒米飲下以通為度

葵子散 治小便不通

黃蜀葵子 赤茯苓各三錢水煎服

鷄蘇散 治小便不通

鷄蘇

一
兩

生地

兩

通草

各四

滑石

一
兩

石葦炒去毛

冬桑子

半
兩

淡竹葉

三十片

灯心

五
分

煎湯徐

調下

即通

心進一服約人行五里路又進一服

一方加榆莢黃芩車前子

治小便不通垂死者

玄明粉

一
兩

淡竹葉

三十片

灯心

五
分

煎湯徐

調下

即通

治老人虛人小便不通亦治心痛

琥珀為末人參湯調下

共半
錢

王海藏云脬轉小便不通非膀胱小腸厥陰之氣也蓋因強力房事或遇忍小便以致此疾非可利之藥所能利之法當治氣宜以沉香湯主之沉香木香各三

為細末煎陳皮茯苓湯空心食前調服

癃門

生生子曰癃篋也下元罷憊而氣餽弱不能施化故小便淋瀝點滴而下是又稱為淋也陳無擇曰淋古謂之癃名稱不同也癃者罷也淋

東垣曰者滴也古方皆云腎氣鬱致小腸膀胱不利復有冷淋湿淋熱淋等屬外所因既言心腎氣鬱與驚恐憂即內所因况飲啖冷熱房失勞役及乘急忍溺多致此病豈非不内外因也大率有五曰冷曰熱曰膏曰血曰石五種不同皆以氣為本

嚴氏曰五淋氣石血膏勞是也氣淋為病小便澁常有餘瀝石淋莖中痛尿不得卒出膏淋尿似膏出勞淋勞倦即發痛引氣衝血淋遇熱即發

甚則溺血候其鼻頭色黃者小便難也大抵此症多由心腎不交積蘊熱毒或酒後房勞服食熱燥七情鬱結所致癃閉淋閉為病皆一類也張子和曰世人多為服金石燥熱之劑得之常見農家有此症豈是服金石之人也大抵是膀胱蓄熱而成此疾如湯瓶久在火中煮瓶底白碱而不能去沙石淋之症與此理同劉宗厚曰此譬極當內經云小腹熱溲出白液亦甚似之東垣曰凡小便癃閉是無陰而陽氣不化也凡

利小便之藥皆淡味滲泄為陽止。是氣藥陽中之陰非北方寒水陰中之陰所化者也。此乃奉養太過膏粱積熱損北方之陰腎水不足膀胱腎之室久而乾涸小便不化火又逆上而為嘔嗁非膈上所生也獨為閨非格病也。潔古云熟在下焦填塞不便是治閨格之法因治王善夫病小便不通漸成中滿腹大堅硬如石壅塞之極腿腳腫脹破裂出黃水雙睛突出晝夜不得眠飲食不下苦痛不可名狀求予治之因問受

病之始知病不渴近苦嘔噦衆醫皆用治中滿利小便滲淡之藥急難措手乃辭歸從夜至旦耿耿不寐窮究其理記素問有云無陽則陰無以生無陰則陽無以化此病小便癃閉是無陰則陽無以化也今病者內閨外格之症悉具死在旦夕但治下焦可愈隨處以北方寒水所化太苦寒之氣味俱陰者黃柏知母為君桂為引名曰滋腎丸沸湯下二百丸少頃前陰如刀刺火燒之痛澀出如湯泉卧具皆溫床下成流頤

躬之間腫脹消散予驚喜曰大哉聖人之言豈可不遍覽而熟一者也其症小便閉塞而不渴時見煩燥者是也凡諸病在下焦皆不渴也

千金方 治小便淋痛以杜牛膝以酒煮服

肘後方 以杜牛膝根莖葉酒煮服治小便不利莖中痛欲死及治婦人血結堅痛如神蓋牛膝

治淋之聖藥也但虛人當用補藥監治之耳仲景云淋家不可發汗發汗則便血

寶鑑曰痺論云胞痺者小腹膀胱按之内痛若沃

以湯澁於小便上為清涕夫膀胱為州都之官津液藏焉氣化則能出焉今風寒溫邪客于胞中則氣不能化出故胞滿而水道不通其症小腹膀胱按之内痛若沃以湯澆于小便以足太陽經其直行者上交額下入絡腦氣下灌於鼻竅則為清涕也

劉宗厚曰按此則知淋閑有寒熱之殊太抵人之所熏虛實受病不同宜參脉理分治方古庵云淋症其感不一或因勞房厚味醇酒忿

怒所致夫房勞者陰虛火動也忿怒者氣動生
火也醇酒厚味者釀成溫熱也積熱既久熱結
下焦所以小便淋瀝欲去不去又來而痛
不可忍者初則熱淋血淋久則煎熬水液稠濁
如膏如沙如石也諸方中類多散熱利小便而
于開鬱行氣破血滋陰蓋少焉若夫散熱利小
便只能治熱淋血淋而已其膏淋沙淋石淋三
者必須開鬱行氣破血滋陰方可也古方用鬱
金琥珀開鬱藥也用青皮木香行氣藥也用蒲

黃牛膝破血藥也用黃柏地黃滋陰藥也東垣
用藥凡例小腹痛用青皮黃柏夫青皮疏肝黃
柏滋腎緣小腹小便乃肝腎之部位也學者不
可不知

治熱之劑

火府丹 治心經熱小便澀及治五淋腰下滿痛
生地 木通 黃芩 甘草
煉蜜杵丸梧子大每二十丸木通煎湯下
導赤散 治心蘊虛熱小便赤澀或成淋痛

生地 甘草 木通 加竹葉水煎服
車前子散 治諸淋小便痛不可忍

車前子錢 淡竹葉 赤茯苓 灯草 刑芥
穗各二分干帖水煎服

地膚子湯 治諸病後虛熱結下焦小便
赤澁多起少出莖痛如刺或尿血

地膚子 猪苓 知母 黃芩 海藻 通草
瞿麥 枳實 升麻 萋子各等分姜三片水煎服
立効散 治下焦結熱小便淋閉作痛有時尿血

甘草炙三兩 瞿麥一兩 山梔仁炒五錢 每十一兩姜
三片葱白三根灯心三十根水煎服
通草湯 治諸淋

通草 蕺子 莪根 蒲黃 當歸 王不留行 桃膠 瞿麥 滑石各一兩 甘草五錢
每十一兩姜五片水煎服

石葦散 治膀胱有熱淋瀝不去腰腹急痛蓄作
有時勞役即發或尿如豆汁或出沙石並治
芍藥 白朮 滑石 蕺子 木通 瞿麥各一兩

當歸

甘草

王不留行

各一兩

石葦去毛二兩

五淋散

腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或如膏如沙如石如豆汁並治乏

赤芍藥

山梔仁各十兩

當歸

甘草

生各兩條參

赤芍藥

山梔仁六兩

當歸

甘草

生各兩條參

五兩

甘草

八正散

治大人小兒心經蘊熱臟腑閉結小便

赤澁癃閉不通熟淋血淋膏淋沙淋石淋並皆

治之

車前子

瞿麥

扁蓄

滑石

甘草

赤茯苓

六兩

每服七八錢水煎

又方

治諸淋

車前子

瞿麥

扁蓄

滑石

甘草

四芩散

益元散

山梔子

各一錢

木通

各等分

每服五七錢入灯

山梔

大黃

麵包

木通

各等分

每服五七錢入灯

心十薑煎至六分食前服

又方

治諸淋

車前子

各一錢

益元散

加車前子末一錢

或加阿膠一錢

石葦飲

治小便不利莖中痛

石葦

去冬葵子各二錢

瞿麥一錢

滑石五錢

車前子三錢

石葦

去冬葵子各二錢

瞿麥一錢

滑石五錢

車前子三錢

為末每服二錢日三服熟水下

葵花湯

治小便淋澁

葵花根洗净搗碎水煎服

又方 治沙淋

車前草搗汁半碗入蜜一兩懸井中五更取起

溫服

若是沙淋石淋則以煅寒水石為末調

如治

共白淋用砂糖

治淋閉莖中疼痛神効方

石葦 滑石 瞿麥

扁蓄

木通

冬葵子

王不留行

地膚草

各等分為末每服三錢

白湯調下

一方 治淋及尿血立効

旱蓮草 車前草 同取汁每服半碗

一方 治淋痛及尿血

側柏葉 藕節 車前子等分

一方 治石淋方

杜牛膝 搗碎水五碗煎至一盃去渣入射香

少許調服効

一方 治沙淋

水

珠

卷

石首魚腦骨

五對火煅

滑石

五錢

為末分二服煎

通湯調下連服數劑看沙盡止藥

海金沙散

治膏淋

海金沙

滑石末

各兩

甘草

二半錢

為末每二錢麥冬湯調服灯心湯亦可

一方 加木通瞿麥穗通草杏仁

鹿角霜丸

治同上

鹿角霜

白茯苓

秋石

各等分

太為末麵糊丸梧子大每五十丸米湯送下

大海金沙散 治小便淋瀝及下焦溫熱氣不施化或五種淋疾癃閉不通

海金沙

研木通

瞿麥穗

滑石

通草

各半兩

杏仁

去皮尖一兩

每五錢入灯心二十根水煎服

牛膝膏

治死血作淋

牛膝

四兩酒洗去皮尖一宿

桃仁

一兩去皮尖炒

當歸尾

二兩酒洗赤芍

藥

半兩

生地

一兩半兩半川芎

五錢

用水以炭火慢熬至二鍾入射少許分作四服空心服如夏月用涼水換此膏不壞

滋陰降火湯

治火燥血少氣不得降而淋

當歸

黃柏

益水炒各一錢半

知母

牛膝

生地

錢白芍二分

甘草稍

木通

各八分

水煎食前服

靈苑透膈散

治五種淋疾

氣淋熱淋勞淋石淋

及小便不通至甚者

硝石一兩雪白者爲末

每服二

錢各依湯使服

如勞倦虛損小便不出小

腹急痛

桑子煎湯下通後更須服

補虛丸藥

如血淋小便不出時下血瘀痛

甚者用冷水

調下

如氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝

大抵

如氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝

木

通煎湯下

如石淋壅內痛尿不能出內引

小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將藥末

先入铫子內隔紙炒至紙焦為度再研令細

溫水調下

如小便不通小麥湯下

卒患

諸淋並以冷水調下

以上並空心先調藥

消散如水即服之更以湯使送下凡服藥未

効者服此立愈

靈苑方

治卒患諸淋遺溺不止小便赤澁疼痛

二葉酸漿草取嫩者搗汁一合酒一合

旋復花

心服之立通

酸漿草即布谷飯

一方 治血石淋

楊樹莖屑烏梅丁太東三水煎服

羅太無石燕丸

治石淋多因憂鬱氣注下焦將

所食_充物結成砂石

小便殊痛不可忍必俟砂

石出而後小便通

石燕_{次研水瓶過}滑石

石葦_七瞿麥穗_{各一}

為末糊丸梧子大煎燈心

瞿麥湯吞下十九日三服

葛粉丸

治男女淋病疼痛効速勿輕忽之

沙糖本草云治心肺大腸熱葛粉 和丸梧子大井花水化開十二丸

牛門方 治五淋

苧麻根兩莖打碎水煎頓服大妙丹溪云苧根補陰行滯血治石淋方 燉蛤一枚 盐兩用於新瓦上鋪蓋

焙乾研末溫酒調下一錢七服下即愈

白薇散 治熱淋血淋

白薇芍藥等分為末每服二錢溫酒調下主效或加檳榔

一方 治血淋諸熱淋

山茵陳 淡竹葉 木通 山梔 滑石

草猪苓 瞽麥

每服五七錢加灯心煎服
甘

太便秘共加大黃

二神散 治諸淋急痛

海金沙

七錢半

滑石

五錢

為末

每服二錢木通麥

冬車前草煎湯入蜜少許調下

治淋閉便濁神方

五爪龍藤連根

一兩

土茯苓 杜牛膝根

各八錢

共用酒半碗煎至一盃空心服三服全愈

又治下疳如神五帖後疳愈再不發他瘡毒

腎瀝湯

治胞痺小便不利小腹急

麦冬

木通

桔梗

桑白皮

杜仲

炒犀角

眉

五加皮

各一錢

赤芍

五分

水二鐘加羊腎一枚切碎煎至八分入竹瀝少許食前服

濟生木通散 小便不通小腹痛不可忍

木通

活石

各一兩

黑丑

頭末五錢

每服五錢灯心十莖葱白一莖水煎服

治氣開鬱之劑

芍藥檳榔散 治五淋

赤芍藥兩 檳榔一枚 麵

為末每服一錢七空心白湯調下

丹溪 生氣藥

砂仁三錢

海金沙 紅曲

檀香二錢

白豆仁

木香

丁香各一錢

分五帖

研桃仁十四枚入生氣藥

治諸般沙石淋

琥珀二錢

研細末空心用葱白頭煎濃湯調下

無間諸般淋疾一二服 神効

本草云虎柏消汚血極驗

通秘散

治血淋痛不可忍

陳皮

香附

赤茯苓等分

水煎眼

沉香散

治氣淋夜此多因 五內鬱結氣不舒行

陰滯於陽而致壅滯

小腹脹滿便溺不通

沉香

后聾 滑石 當歸 王不留行

各五錢

桑子

芍藥各七錢半

甘草

陳皮

木香 青皮

治卒淋急痛方

金錢半

為末每服三錢煎太來湯下

益元散

錢二

茴香

一錢微炒黃

木香

各二錢微分生

右為末水調服

琥珀散

治五淋砂石淋

滑石

琥珀各一錢兩

木通

當歸

木香

鬱金

扁蓄

各五錢

為末

每五錢以蘆葦葉煎湯調服

如無蘆葦葉以竹葉煎湯送下

一方 治同上

后燕子

七枚搗如新桑白皮
黍米大

新桑白皮

三兩剉同拌勻

二味分作

七帖用

水煎一日三服

治肝經氣滯蘊熱小便淋痛方

甘草稍子

五錢

青皮

黃柏

澤鴻

各一錢

水煎服効

補氣血之劑

丹溪治朱郎小便淋痛脉大右濇此為勞傷經血勿作淋治可補血行肝經滯血自愈

生地

當歸

赤芍

各一錢

川芎

條芩

甘草

梢分各三錢

陳皮

木通

各五錢

黃柏

二錢分炒紅花

各一分

杜牛膝

一錢右以桃仁泥研滑石同煎待淋病退

減柏仁滑石杜牛膝木通入川牛膝代木通分兩倍之

氣虛者八物湯加杜牛膝黃芩煎服

老人氣虛亦能淋參术中加木通山梔治勞苦傷血脉沉而大下焦蘊結而淋

人參 归尾 白芍 香附各五錢 条芩三錢 木通
錢 山梔仁炒三錢半 黃芪 甘草稍生各
分四帖煎杜牛膝湯煎服

茯苓琥珀湯 小便澁革中痛不可忍相引脇下

痛 川練子炒甘草各一錢 人參小分 茯苓四分
琥珀 當歸梢 澤鴻 柴胡各三錢 玄胡索七分
水煎服數服效

六味地黃丸 治久淋陰虛者

清心蓮子飲 治上盛下虛心火炎上口舌咽乾

煩渴微熱小便赤澁或欲成淋並治之

黃芪 石蓮肉 赤茯苓 人參各七錢半 甘草
車前子 地骨皮 麥門冬 黃芩各五分
每服七八錢水煎溫服 發熱加薄荷柴胡

治氣虛脾虛消渴淋濁

人参 滑石 各一錢 白术 半錢 赤茯苓 大澤鴻 各分麥門冬 甘草 各五錢 竹葉三十片 加灯心二十根水煎服

治寒之劑

十全大補丸 治胞痺小便內痛
赤茯苓 防風 細辛 白术 澤鴻 各五錢
死 天花粉 牛膝 黃芪 炙藥 甘草 各三錢
山藥 山茱萸肉 獨活 半夏 各一錢 附子

官桂 各二錢 煉蜜丸梧子大每服五六十九丸

空心溫酒下

腎暑湯 治胞痺小便不通

赤茯苓 白术 各四兩 甘草 各三兩 乾姜 各兩

每服五七錢水煎一日三服

巴戟丸 治胞痺腰腹痛小便不利

巴戟 去心一兩半 桑螵蛸 炒遠志 去心一兩 生地黃 山藥

附子 炮肉蓯客 酒浸續斷各一杜仲 炒鹿茸 各兩

石斛 兔絲子 五味子 山茱萸 官桂

龍骨各三錢 煉蜜丸 梧子 大字心溫酒下三十丸
三因生附散 治淋而脉沉微小便秘澁數起不
通竅中痛半夏各一錢 清石五錢

附子五錢 每二錢生姜三片灯心二十莖蜜半
匙水煎食前服

淋閉餘論

生生子曰淋閉一證王機微義闡述詳盡極當檢閱
如劉河間之熟羅知悌之寒張潔古分在氣在血
之異嚴用和之五淋陳無擇之三因朱彥修之痰

積死血劉宗厚之腎虛火熾述素問靈樞脉經之要
言門分類析甚便後學惟婦人治法尚畧顧今時婦
人患此頗多鮮獲奇効緣由未得其真括也考之經
曰肝主小便淋溲婦人經未絕年皆厥陰肝經用事用
主謀慮者也婦人之性多於偏鄙鬱而不決氣道因滯
鬱久成火凝滯濁液漸結成粒名曰砂石淋是也今
之治淋者動手脚用五苓八正之類皆淡滲利竅之
劑于病未嘗遠也而底績不樹何耶殊不知淡滲
皆在天之陽也但能利肺氣是氣降而水利矣非

治有形之陰病也。腎乃肺之子也。淡滲過刺。腎氣奪矣。陰血日虧。鬱火日熾。經曰：無陽則陰無以化。無陰則陽無以生。淡滲皆泄氣而損血者。血損則寡。愈滯。則病劇。治當開鬱火。養陰血。兼之以導氣之藥。經曰：壯者氣行。則愈。陰血旺。氣道滑。病自瘳矣。正如河涸舟粘。縱用力多。未若決水之為易也。學者其可忽諸。

丹溪牛膝膏加鬱金以開鬱。山梔以降火。生地以補陰。琥珀以導氣。利竅則愈矣。大官唐少溪吳馭閣校終

