


嚴氏濟生方

再校

二



20

JAPAN

10

3

1

0

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6


7

8

9

0

門
武
卷



嚴氏濟生方卷之三

心痛論治 蟲痛附

論曰夫心痛之病醫經所載凡有九種一曰蟲心痛二曰疰心痛三曰風心痛四曰悸心痛五曰食心痛六曰飲心痛七曰寒心痛八曰熱心痛九曰去來心痛其名雖不同而其所致皆因外感六淫內沮七情或飲啖庄令草食之類使邪氣搏於正氣邪正交擊氣道閉塞鬱于中焦遂成心痛夫心廻諸藏之主正經不可傷傷之則痛苦痛甚手足青過節者則名曰真心痛真心痛者日發夕死夕發旦死若乍間乍甚

成寒而不死者名曰厥心痛不過邪氣乘於心支別
絳也寸口脉緊心脉甚急皆主心痛又有痛甚而心
脉沉伏者有之矣王叔和云心腹痛脉沉細差浮大
弦長命必殂治法當推其所自而調之痛無不止矣
加味七氣湯治喜怒憂思悲恐驚七氣爲病發則心
腹刺痛不可忍時發時止發則欲死及外感風寒濕
氣作痛亦宜服之

牛夏

湯泡茶次三兩

桂心

不見火

玄胡索

炒去皮各四錢

人參

甘草

炙各半兩

乳香

三錢

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚煎

至七分去滓食前溫服婦人血痛加當歸煎
九痛圓治九種心痛腹脇氣脹不欲飲食

附子

炮去皮二兩

乾薑

炮

吳茱萸

炒

狼毒

剉醋拌炒黃

人參

各一兩

巴豆

半兩去殼油

右細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服三圓熱湯送
下不拘時候

愈痛散治急心痛胃痛

五靈脂

去砂石

玄胡索

炒去皮

蓬莪术

煨剉良姜

當歸

去芦洗

右等分爲細末每服二錢熱醋湯調服不拘時候

得効

蕪荑散治大人小兒咬心痛經云蟲貫心則殺人欲驗之大痛不可忍或吐青黃綠水涎沫或吐蟲出發有休止此是蛇心痛也宜速療之

乾薑炮煙盡一兩雷丸

蕪荑各半兩

右爲細末每服三錢溫水七分盞調和服不拘時候甚者不過三服小兒每服半錢重燒脾散治飲啖生冷菓菜寒留中焦心脾令痛不忍及老幼霍亂吐瀉

乾姜炮

厚朴姜製剉炒

草果仁

甘草

麥蘖炒

縮砂仁

神曲剉炒

橘紅良姜剉炒甘草炙各等分
右爲細末每服三錢用熱鹽湯點服不拘時辰

怔忡論治

論曰夫怔忡者此心血不足也蓋心主於血血主於心之主心乃形之君血富則心君自安矣多因汲汲富貴戚戚貧賤又思所愛觸事不意真血虛耗心虛失輔漸成怔忡怔忡不止變生諸證舌瘡恍惚善憂悲少顏色皆心病之候難經曰損其心者益其榮法當專輔真血真血若富心帶有輔無不愈者矣又有肩風寒暑濕閉塞諸經令人怔忡五飲停蓄煙塞中脘

亦令人怔忡，當隨其證施以治法。

益榮湯治思慮過制耗傷心血，心帝無輔，怔忡恍惚，善悲憂少，顏色夜多不寐，小便成濁。

當歸去芦酒浸黃芪去芦

小草

酸棗仁炒去殼柏子仁炒

麥門冬去心

茯神去木白芍藥

紫石英一兩細研各

木香不見火人參

甘草炙各半兩

右改咀每服四錢水一盞半生姜五片棗一枚煎至七分去滓溫服不拘時候。

龍齒丹治心血虛寒，怔忡不已，痰多恍惚。

龍齒

附子

炮去皮，臍切片，姜汁浸一宿

遠志去心甘草煮

酸棗仁

炒去殼，別研

當歸去芦酒浸

官桂去皮不見火

琥珀別研

南星剉姜汁浸一宿各一兩

木香不見火

紫石英煅醋淬

沉香別研

熟地黃酒蒸焙各半兩

右爲細末，煉蜜爲圓如梧桐子大，朱砂爲衣，每服

五十圓，用棗湯送下，不拘時候。

心丹治憂愁思慮謀用過度或因驚恐傷神失意耗傷心血，怔忡恍惚夢寐不安。

朱砂五十兩

新羅人參

遠志去心甘草煮

熟地黃 洗淨酒 蒸焙 白朮

石菖蒲

當歸 去芦酒 浸焙 麥門冬 去心

黃芪 去芦

茯苓 去皮

茯神 去木

柏子仁 棟滑

木鼈仁 炒去殼 石蓮肉 去心炒

益智仁 已上各
五兩

右加入人參等十四味各如法修製剉碎拌勻。將此藥滾和以夾生綿袋盛貯用麻線繫袋口於突上安大銀鍋一口著長流水令及七分重安銀罐入白砂蜜二十斤將藥袋懸之中心勿令著底使蜜浸袋令便以柴燒鍋滾沸勿令火歇煮三日蜜焦黑換蜜再煮候七日足住火取出淘去衆

○茯苓飲子治痰飲蓄于心胃怔忡不_已
藥洗淨砂令乾入牛心內蒸_令七次蒸熟砂時別安銀鍋一口煖水候大鍋水耗從鍋弦添溫水候牛心蒸爛熟取砂再換牛心如前法蒸凡換七次其砂已熟卽用沸水淘淨焙乾入乳鉢玉杵研_令十分細末_棕爲圓如豌豆大陰乾每服十粒至二十粒食後參湯棗湯麥門冬湯任下

茯苓飲子治痰飲蓄于心胃怔忡不_已

赤茯苓 去皮

牛夏 湯泡七次

茯神 去木

橘皮 去白

麥門冬 去心各一兩

沉香 不見火

甘艸 炙

檳榔 各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至七分

去滓溫服不拘時候

排風湯治風虛令濕閉塞諸經令中人恆弛

方載中風門中宜加炒酸棗仁煎

壽星圓治驚憂思慮氣結成痰畱蓄心胞恆仲驚惕痰逆惡心睡卧不安方載中風門中

驚悸論治

論曰夫驚悸者心虛膽怯之所致也且心者君主之官神明出焉膽者中正之官決斷出焉心氣安逸膽氣不怯決斷思慮得其所矣或因事有所大驚或聞

虛響或見異相登高陟險驚忤心神氣與涎鬱遂伏驚悸驚悸不已變生諸證或短氣悸乏體倦自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安皆心虛膽怯之候也治之之法寧其心以壯膽氣無不瘥者矣溫膽湯治心膽虛怯觸事易驚夢寐不祥異象感惑遂致心驚膽憚氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短氣悸乏或復自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安

半夏湯泡七次

竹茹

枳實

去穢各二兩

陳皮去白三兩

白茯苓去皮一兩

兩半

甘草一兩炙

右咬咀每服四錢水一盞半生姜五片棗子一枚煎至七分去滓溫服不拘時候

○遠志圓治因事有所大驚夢寐不祥登高陟險神魂不安驚悸恐懼

遠志

去心姜
汁淹

石菖蒲

各二兩

茯神

去皮木

白茯苓

去皮

人參

龍齒

各一兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大辰砂爲衣每服七十圓用熟水送下食後臨卧

健忘

論曰夫健忘者常常喜忘是也蓋脾主意與思心亦

主思思慮過度意舍不清神官不職使人健忘治之法當理心脾使神意寧靜思則得之矣

歸脾湯治思慮過制勞傷心脾健忘怔忡

白朮

茯神

去木

黃芪

去芦

龍眼肉

酸棗仁

炒去殼各一兩

人參

木香

不見火各半兩

甘草

炙二錢半

右咬咀每服四錢水一盞半生姜五片棗子一枚煎至七分去滓溫服不拘時候

虛煩論治

論曰夫虛煩者心虛煩悶是也且人之有血氣分爲

榮衛別乎陰陽，榮衛通適，然後陰平陽秘，精神廼治。攝養乖方，榮衛不調，使陰陽二氣有偏勝之患，或陰虛而陽盛，或陰盛而陽虛，素問云：陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒。今虛煩之病，陰虛內冷所致也。但虛煩有數證，不可不辨。傷寒大病不復霍亂吐瀉之後，及婦人產後皆使人心虛煩悶，又有虛勞之人心火內蒸，亦致心煩。治療之際，不可不詳審也。

竹葉湯治傷寒大病後及霍亂吐瀉後心虛煩悶，內熱不解。

半夏竹葉 麥門冬去心 人參
二日茯苓去皮 小麥炒 半夏湯泡七分
甘草炙半兩

右㕮咀，每服四錢水一盞半，姜五片煎至八分去滓溫服，不拘時候。

小草湯治虛勞憂思過度，遺精白濁，虛煩不安。
小草 黃芪去芦 當歸去芦酒浸
麥門冬去心 石斛去根 酸棗仁炒去殼各一兩
人參 甘草炙各半兩

右㕮咀，每服四錢水一盞半，姜五片煎至八分去

滓溫服不拘時候

地仙散治傷寒後伏暑後煩熱不安及虛勞煩熱

地骨皮二兩 防風去芦一兩 甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至八分去滓溫服不拘時候產後虛煩載產後雜治門中

癲癇論治

論曰夫癲癇病者考之諸方所說名證不同難於備載觀別錄有五癇之證一曰馬癇作馬嘶鳴應乎心二曰羊癇作羊叫也應乎脾三曰雞癇作雞叫也應乎胃四曰猪癇作猪叫也應乎腎五曰牛癇作牛吼

也應乎肺此五癇應乎五畜五畜應乎五臟者也發則旋暈顛倒口眼相引目睛上搖手足搐搦背脊強直食頃廻甦原其所因皆由驚動藏氣不平鬱而生涎閉塞諸經故有是證或在母腹中受驚或幼小受風寒暑濕或因飢飽失宜逆於藏氣而得之者各隨所感施以治法

鳴頭圓治風癇不問長幼發作漸頻嘔吐涎沫

飛鳴頭一枚

燒灰

號丹

五錢細研

皂角

五錢酥炙

右爲細末用糯米糊爲圓如菜豆大每服十五圓加至二十圓以粥飲送下不拘時候

蛇黃圓治五癘因積風熱風痰攻心所致

蛇黃小者二十枚以猪膽汁一杵入火燬通紅取出地上出火毒研令極細

右用狗膽一枚取汁和粟米飯圓如菉豆大每服十五圓溫酒送下不拘時候吐涎乃効長幼皆可

用

控涎圓治諸癰久不愈頑涎聚散無時變生諸證悉皆治之

生川烏去皮半夏

殭蚕不炒此二味剉碎生姜汁浸一夜宿各半兩

全蝎去毒七箇

鐵粉三錢

甘遂二錢半

右爲細末生姜自然汁打糊爲圓如菉豆大朱砂爲衣每服十五圓食後用姜湯吞下忌食甘草

五勞六極論治

論曰醫經載五勞六極之證非傳尸骨蒸之比多由不能衛生施於過用逆於陰陽傷於榮衛遂成五勞六極之病焉益盡力謀慮成肝勞應乎筋極曲運神機成心勞應乎肺極意外過思成脾勞應乎肉極預事而憂成肺勞應乎氣極矜持志節成腎勞應乎骨極此五勞應乎五極者也然精極者五藏六腑之氣襄形體皆極眼視無明齒焦髮落體重耳聾行履不

正邪氣逆於六腑厥於五藏故成精極太極勞極之脉多弦治療之法隨其虛實令熱而調之精極者當補其精也素問所謂形不足者溫之以氣精不足者補之以味各分門類大略如此臨病之際又當詳審羚羊角散治肝勞實熱兩目赤澁煩悶熱壅胸裏炎炎

炎

羚羊角 銚

柴胡 去芦

黃芩

川當歸

決明子

羌活 去芦

赤芍藥

甘草 炙等分

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分去

滓溫服不拘時候
續斷湯治肝勞虛寒腸痛脹滿關節疼痛牽縮煩悶眼昏不食

川續斷酒浸

芎藭

當歸 去芦酒浸

橘紅

半夏

湯泡七次乾姜

炮各一兩

桂心 不見火

甘草

炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片煎至七分去滓溫服不拘時候

黃芩湯治心勞實熱口瘡心煩腹滿小便不利
澤鴉 柔子仁 黃芩

麥門冬 去心

木通

庄乾地黃

黃連 去鬚

甘草 炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分去
滓溫服不拘時候

遠志飲子治心勞虛寒驚悸恍惚多忘不安夢寐驚
魘

遠志 去心甘
艸煮乾

茯神 去木

桂心 不見火

人參

當歸 去芦酒浸

酸棗仁 炒去殼

黃耆 去芦

各一兩

甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片煎至七分去
滓溫服不拘時候

滓溫服不拘時候

小甘露飲治脾勞實熱身體眼目悉黃舌乾咽喉痛

黃芩

川升麻

茵陳

梔子仁

桔梗 去芦剉炒

庄地黃 洗

石斛 去根

甘草 炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分去
滓溫服不拘時候

白朮湯治脾勞虛寒嘔吐不食腹痛泄瀉胸滿喜噫
多睡少起情思不樂腸鳴體倦

白朮

人參

草果仁

乾姜 炮

厚朴 姜釀炒

肉豆蔻

薑裹煨

橘皮 去白

木香 不見火

麥蘖

炒各一兩

甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生姜五片棗子一枚
煎至七分去滓溫服食前
二母湯治肺勞實熱面目若腫欬嗽喘急煩熱頰赤
骨節多痛乍寒乍熱

知母

貝母 去心膜

杏仁 去皮尖炒

甜葶藶

畧炒

半夏 湯泡七次

參朮 去芦

橘紅 各一兩

甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至八分去
滓溫服不拘時候

溫肺湯治肺勞虛寒心腹冷氣胸脇逆滿氣從胸達
背痛飲食卽吐虛乏不足

人參

鍾乳粉

半夏

湯炮七次

桂心 不見火

橘紅

乾姜 炮各一兩

木香 不見火

甘草

炙各半兩

左咬咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至七分去
滓溫服不拘時候

大黃湯治腎勞實熱腹脹四肢黑色耳聾多夢見大

水腰子解

生地黃 洗

赤茯苓 去皮

玄參 洗

石菖蒲

人參

黃芪 去芦各一兩

遠志 草煮

甘草 炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分去滓溫服不拘時候

羊腎圓治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不利夢寐驚悸上氣小腹急痛引腰脊四肢苦寒小便白濁

熟地黃 酒蒸焙

杜仲 去皮剉炒去絲

石斛 去根

兎絲子

淘淨酒浸蒸焙別研

黃芪

去芦

川續斷

酒浸

桂心 不見火

磁石

煅醋淬

川牛膝

去芦酒浸

沉香 別研

五加皮 洗

山藥 剝炒各一兩

右爲細末雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入少酒糊同杵和爲圓如梧桐子大每服七十圓空心鹽湯送下

五加皮湯治筋實極效則兩脇下痛不可轉動脚手滿不得遠行脚心痛不可忍手足爪甲青黑四肢筋急煩滿

羌活 去芦

羚羊角 鏟

赤芍藥

防風 去芦

五加皮 洗

秦艽 去芦

枳實 去穰炒

甘草 炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分主
轉痛十指甲痛數轉筋甚則舌卷卵縮唇青面色蒼
白不得飲食
木瓜 去穢

虎脰骨 酥炙

五加皮 洗

當歸 去芦酒浸

柴寄生

酸棗仁 炒去殼

人參

柏子仁 炒

黃芪 去芦各一兩

甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片煎至七分去
滓溫服不拘時候

麥門冬湯治肺實極氣壅血焦髮落好怒唇口赤甚
口語不快色不澤飲食不爲肌膚

麥門冬 去心

遠志 去心甘草煮

人參

黃芩

生地黃 洗

茯神 去木

石膏 煅各一兩

甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分去

滓溫服不拘時候

茯神湯治脈虛極熱則心痛喉中介介如梗狀甚則
咽腫驚悸不安

茯神去木

人參

遠志去心甘
艸煮

通草

麥門冬去心

黃芪去芦

桔梗去芦剉炒

甘草炙各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片煎至七分去
滓溫服不拘時候

薏苡仁散治肉實極肌膚滌滌如鼠走津液開洩或
癰不仁四肢急痛

薏苡仁

石膏煅

川芎

桂心

不見灰

防風去芦

漢防已

羚羊角鎚

赤芍藥

杏仁去皮尖

甘草炙各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分去
滓溫服不拘時候

半夏湯治肉虛極體重腸引肩背不可以動動則努
嗽脹滿畱飲痰癖大便不利

半夏湯泡七次白朮

茯苓去皮

人參

橘皮去白

附子炮去皮臍

木香 不見火 桂心 不見火 大腹皮

甘艸 炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片煎至七分去
滓溫服不拘時候

前胡湯治氣實極胸滿不利欬逆短氣嘔吐不平

前胡 去芦

半夏

湯泡七次 杏仁 去皮尖

枳實 去穰炒

橘皮

去白

紫蕷子 炒

枳實

去穰炒

橘皮

乘白皮 炙

甘草

炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分去
滓溫服不拘時候

紫苑湯治氣虛極皮毛焦津液不通四肢無力或喘
急短氣

紫苑茸 洗

乾姜 炮

黃芪 去芦

人參

五味子

鍾乳粉

杏仁 去皮尖 炒

甘草

炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞半生姜五片棗子一枚
煎至七分去滓溫服不拘時候

玄參湯治骨質極耳鳴面色焦枯隱曲膀胱不通牙
齒腦髓苦痛手足痠痛大小便閉

玄參

生地黃 洗

枳殼 去穰炒

車前子

黃芪 去芦

當歸 去芦酒浸

麥門冬

去心

白芍藥 各一兩

甘草 炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分去滓溫服不拘時候

鹿角圓治骨虛極面腫垢黑脊痛不能久立氣寒髮落齒槁腰脊痛甚則喜睡

鹿角 二兩

川牛膝 去芦酒浸焙一兩半

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服七十圓空心鹽湯送下

石斛湯治精實極熱眼視不明齒焦髮落形襄通身

虛熱甚則胸中痛煩悶泄精

小草

石斛 去根

黃芪 去芦

麥門冬 去心

生地黃 洗

白茯苓 去皮

玄參 各一兩

甘草 炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分去滓溫服不拘時候

磁石圓治精虛極底羸驚悸夢中遺泄尿後遺溺小便白濁甚則陰痿小腹裏急

磁石 煅醋淬

二兩

肉蓯蓉 酒浸

切焙

鹿茸 去皮毛酒蒸

川續斷 酒浸

杜仲 炒去絲斷

柏子仁 炒別研

赤石脂 大根

熟地黃 酒 蒸 培

山茱萸 取肉

兜子 酒 浸蒸

川巴戟 桂去心

韭子 炒各一兩

右爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服七十圓空心溫酒塗湯任下

痼冷積熱論治

論曰 一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾夫人一身不外乎陰陽氣血相與流通焉耳如陰陽得其平則疾不生陰陽偏勝則爲痼冷積熱之患也所謂痼冷者陰毒沉痼而不解也積熱者陽毒蘊積而不散也故陰偏勝則偏而爲痼冷陽偏勝則偏而爲積熱古

賢云偏勝則有偏害偏害則致偏絕不可不察也太極真陽既弱胃氣不溫復啖生冷水雪以益其寒陰逆於內陽不能勝遂致嘔吐涎沫畏冷憎寒手足厥逆飲食不化大腑洞泄小便頻數此皆陰偏勝而爲痼冷之證也其或陰血既衰三焦已燥復餌酒炙丹石以助其熱陽熾于內陰不能制遂致口苦咽乾涎稠目澁萬熱口瘡心煩喜冷大便閉結小便赤淋此皆陽偏勝而爲積熱之證也施治之法冷者熱之熱者冷之痼者解之積者散之使陰陽各得其平則二者無偏勝之患矣

洞陽丹治陽虛陰盛手足厥冷暴吐大下脈細羸瘦
傷寒陰證悉皆治之

附子 炮去皮臍 鐘乳粉 各二兩 天雄 炮去皮臍

川烏 炮去皮 四兩

陽起石 火煖 一兩

朱砂 一兩別研細

右爲細末酒煮神麃糊爲圓如梧桐子大每服五十圓空心溫酒塗湯任下

荳附圓治久虛下寒泄瀉不止腸滑不禁日夜無度全不進食一切虛寒泄瀉困乏並皆治之

肉荳蔻 檳榔 煥

附子 炮去皮臍 良姜 剁炒

乾姜 炮

赤石脂 火煖

陽起石 火煖

龍骨 生用

白礬 研各二兩

白茯苓 去皮

桂心 不見火

細辛 洗各一兩

右爲細末酒煮麃糊爲圓如梧桐子大每服七十

圓空心食前米飲送下

利膈湯治上膈壅熱口苦咽乾痰唾稠粘心煩喜冷咽喉生瘡疼痛但是一切上壅之證皆可服之

防風 去芦

雞蘿葉

桔梗 去芦

牛蒡子

荆芥穗 各一兩

川升麻

人參

甘草 炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞牛姜五斤煎至八分去

廣雅

卷之三

津溫服不拘時候

三黃圓治三焦積熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼
熱氣上衝口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯眼赤睛疼
及大便秘澁或下鮮血

大黃 酒煎

黃連 去鬚

黃芩 各等分

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服五十圓不
拘時候用溫熟水送下如藏府壅實可加圓數以
利爲度

嚴氏濟生方卷之三

嚴氏濟生方卷之四

虛損論治

論曰醫經所說諸虛百損難經有所謂五損不過因
虛而致損也素問云恬淡虛無真氣從之精神內守
病安從來人能法道清靜精神內持苛疾不起迺知
固養之道也不自衛生或大病未復便令陰陽或疲
極筋力飢飽失節盡神度量或呴呼走氣榮衛虛損
百病交作或吐血衄血便血瀉血遺泄白濁令滑洞
泄盜汗自汗潮熱發熱嘔吐晚咯痰飲涎沫等證因
斯積微成損損成襄者多矣且婦人產蓐過於大

病之後虛損尤甚治之之法詳審脉理原其所自隨證施治然病候非一略具數條以爲備治之要

大建中湯治諸虛不足小腹急痛肠肋脹脹骨肉痠痛短氣喘咄痰多咳嗽潮熱多汗心下驚悸腰背彊痛多卧少起

黃芪去芦

附子炮去皮臍

鹿茸酒蒸

地骨皮去木

續斷

石斛去根

人參

川芎

當歸去芦酒浸

白芍藥

小草各一兩

甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至七分

去滓溫服不拘時候欬嗽者加數冬花唾血者
加阿膠便精遺泄者加龍骨怔忡者加茯神
芡實圓治思慮傷心疲勞傷腎心腎不交精元不固
面少顏色驚悸健忘夢寐不安小便赤澁遺精白濁
足胫痠疼耳聾目昏口乾脚弱

芡實蒸去殼

蓮花鬚各二兩

茯神去木

山茱萸取肉

龍骨生用

五味子

枸杞子

熟地黃酒蒸焙

韭子炒

肉蓯蓉酒浸

川牛膝去芦酒浸焙

紫石英煅七次各一兩

右爲細末酒煮山藥糊爲圓如梧桐子大每服七

十圓空心溫酒塗湯任下

白圓治元氣虛寒精滑不禁大府溏泄手足厥冷

陽起石煅研令極細 鐘乳粉各等分

右爲細末酒煮附子末糊爲圓如梧桐子大每服五十圓空心米飲送下

黑圓治精血耗竭面色黧黑耳聾目昏口乾多渴腰痛脚弱小便白濁上燥下寒不受峻補

鹿茸酒浸 當歸去芦酒浸

右等分爲細末煮烏梅膏子爲圓如梧桐子大每服五十圓空心用米飲送下

玉關圓治諸虛不足膀胱腎經痼敗陰陽不交致庄多病水欲升而沃心火欲降而溫腎如是則坎離既濟陰陽暢和火不炎而神自清水不滲而精自固久服閉精補益永無膏淋白濁遺精之患神効非一難以具述

辰砂一兩

鹿茸二兩作片酥炙

當歸酒浸焙

附子七錢重者四箇生去皮臍各切下項剝空心中安辰砂在內以前項子蓋定用線丸

木瓜大者二箇去皮穰切開頂入朱砂附子四箇在內以木瓜元頂子蓋之線札定燭蒸

訖取出附子切作片焙乾爲末朱砂細研水飛木瓜研如膏宣瓜爲妙

柏子仁炒別研

沉香別研

巴戟去心

黃芪 去芦蜜炙 肉蓴蓉 酒浸 茯神 去木

川牛膝

去芦酒浸

石斛 去根酒浸

菟絲子 水淘淨酒

杜仲

去鹿皮酒浸

五味子 各一兩半

遠志

去心炒二兩

右爲細末用木瓜膏杵和入少酒糊爲圓如梧桐子大每服七十圓空心米飲溫酒塗湯任下。脰肺腰圓治五勞七傷真陽衰憊臍腹冷痛肢體瘦疼腰背拘急脚膝緩弱面色黧黑肌肉消瘦目眩耳鳴口苦舌乾飲食無味腹中虛鳴腸下刺痛心常慘懨夜多異夢晝少精神小便滑數大腑溏泄時有遺瀝陽事不舉但是風虛痼冷皆宜服之。

脰肺腰

一對用酒蒸熟杵和後藥

天雄 炮去皮

附子

炮去皮臍

川烏

炮去皮尖

陽起石

煅

鍾乳粉

各二兩

獨體朱砂

研極

人參

沉香

不見火別研

鹿茸

酒蒸各一兩

右爲細末用脰肺腰膏子入少酒糊入臼內杵和爲圓如梧桐子大每服七十圓空心用溫酒塗湯任下。秘精圓治下虛胞寒小便白濁或如米泔或若凝脂腰重力

牡蠣殼

卷之四

兜絲子 酒浸蒸焙別研龍骨 生用

五味子

桂子 炒

白茯苓 去皮

白石脂 煅

桑螵蛸 酒炙各等分

右爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服七十圓空心溫酒塗任下

黃犬肉圓治真陽衰憊腰腹冷痛小便頻數頭暉耳鳴足脛痠冷步履無力腰背拘痛水穀不消飲食無味肌肉瘦悴遺泄失精

磁石 三兩 煅

川烏 炮去皮尖附子 炮去皮

水飛

川烏

炮去皮尖附子

炮去皮

桑寄生

鹿茸 燉去毛

酒蒸

鹿茸

同上

麋茸

同上

仙茅 酒浸

肉蓯蓉 酒浸

切焙

川巴戟 去心

葫芦巴 炒各二兩

沉香 別研

青鹽 別研

煅研

龍骨 生用

虎脰骨 酥炙

極細

虎脰骨

酥炙

虎脰骨

酥炙

右爲細末用黃犬肉二斤以酒葱茴薑薑爛杵和

爲圓如梧桐子大每服七十圓空心溫酒塗任下

白濁亦濁論治

論曰素問云夫精者身之本也蓋五藏六府皆有精腎爲都會關司之所聽命於心人能法道清靜精氣內持火來坎戶水到離局陰平陽秘精元密固矣若夫思慮不節嗜慾過度遂使水火不交精元失守由

是爲赤濁白濁之患焉。赤濁者心虛有熱也。多因思慮而得之。白濁者腎虛有寒也。過於嗜慾而得之。其狀旋面如油，光彩不定。璇脚澄下凝如膏糊，皆思慮嗜慾之所致耳。各分受病之由，施以治法。使坎離既濟，陰陽協和，然後火不上炎，而神自清，水不下滲，而精自固。安有赤濁白濁之患哉？雖然，思慮過度不特傷心，亦能病脾。脾生虛熱，而腎不足，故土邪干水，亦令人便下。渾濁史載之云：夏則土燥而水濁，冬則土堅，而水清。醫多峻補，則疾愈甚。若以中和之藥療之，水火既濟，脾土自堅，其流清矣。

瑞蓮圓治思慮傷心便下赤濁

白茯苓

去皮

石蓮肉

炒去心

龍骨

生用

天門冬

洗去心

麥門冬

洗去心

遠志

洗去心
甘艸煮

柏子仁

炒別研

紫石英

火煅七次
研令極細

當歸

去芦酒浸

酸棗仁

炒去殼

龍齒

已上各一兩

乳香

牛兩別研

右爲細末，煉蜜爲圓如梧桐子大，朱砂爲衣。每服七十圓，空心溫酒服，湯任下。

固精圓治嗜慾過度，勞傷腎經，精元不固，夢遺白濁。

肉荳蓉

酒浸薄切焙

陽起石

火煅研極細

鹿茸

燎去毛酥炙

韭子

炒

龍骨

生用

赤石脂

火煅七次

川巴戟 槩去心 白茯苓 去皮 鹿角霜

附子 炮去皮臍各等分

右爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服七十圓空心溫酒燉湯任下

芡實圓治勞傷心腎水火不交璇面如油光彩不定旋脚澄下凝如膏糊頻數無度又治遺泄不禁之疾

方載虛損門中

羊脰炭圓治思慮傷脾脾不攝精遂致白濁

厚朴 去皮取肉畧使姜汁製爲細末二二兩

羊脰炭火煅過通紅窖殺研如粉一兩

右二味白水麪糊爲圓如梧桐子大每服百圓空心用米飲湯送下

腰痛論治

論曰素問云腰者腎之腑轉搖不能腎將憊矣審知是說則知腰近於腎多因嗜慾過度勞傷腎經腎藏既虛喜怒憂思風寒濕毒得以傷之遂致腰痛又有墜墮閃肭氣凝血滯亦致腰痛大抵腰痛之脉脉皆沉弦沉弦而緊者寒腰痛沉弦而浮者風腰痛沉弦而濡細者濕腰痛墜墮閃肭以致氣凝血滯而痛者脈多沉弦而實也當推其所因合其脉以治無不效

者矣

五積散治寒傷腎經腰痛不可中俛仰

方載和劑局方中

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜五片桃仁七箇煎至七分去滓溫服空心食前

附子湯治濕傷腎經腰重冷痛小便自利

附子炮去皮白朮各一兩杜仲去皮剉炒

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜七片煎至七分去滓溫服空心食前

獨活寄生湯治風傷腎經腰痛如掣久而不治流入

脚膝爲偏枯冷痺緩弱之患

方載脚氣門中

小七香圓治鬱怒憂思或因閃肭懶模一切氣滯腰痛

方載和劑局方中

右一貼作二服橘仁一錢鹽少許水一盞煎至七分放溫送下空心服

一至圓治老人虛弱人腎氣虛損腰痛不可屈伸

鹿角銛二兩

麋角銛二兩

附子炮去皮

桂心不見火

補骨脂炒一兩

杜仲去皮剉炒

鹿茸酒蒸焙

青鹽別研半兩

右爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服七十圓空心用胡桃肉細嚼以溫酒塗湯任下惡熱藥者去附子加肉蓯蓉一兩

巷藺圓治墜臍內臍血氣凝滯腰痛

巷藺子 半兩

沒藥

乳香 各二錢半

補骨脂 炒

歲靈仙

杜仲 炒

桂心 不見火

當歸 各半兩

右爲細末酒糊圓如梧桐子大每服七十圓溫酒塗
湯任下

陰癩論治

論曰夫陰癩之證有四種一曰陽癩二曰氣癩三曰
卵癩四曰水癩是也聖惠云腎氣虛風冷所侵流入
于腎不能宣散而然也三因云陰癩屬肝係宗筋胃
陽明養之考之衆論俱爲至當多由不自衛生房室
過度久蓄憂思恐怒之氣或坐臥冷濕處或勞役無
節皆能致之病則卵核腫脹偏有大小或堅硬如石

或臍腹絞痛甚則膚囊腫脹多成瘡毒輕則時出黃
水甚者成癰潰爛大抵卵脈腸癩皆不易治氣癩水
癩灸之易愈也又有小兒有生以來便如此者乃宿
疾也四癩治法橘核圓用之屢驗謾錄于后
橘核圓治四種癩病卵核腫脹偏有大小或堅硬如
石或引臍腹絞痛甚則膚囊腫脹或成瘡毒輕則時
出黃水甚則成癰潰爛

橘核 炒

海藻 洗

昆布 洗

海帶 洗

川練子 取肉炒

桃仁 麝炒各
一兩

厚朴 去皮姜
汁製炒

木通

枳實 麝炒

玄胡索

炒去皮

桂心

不見火

木香

不見火各半兩

右爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服七十圓空心溫酒鹽湯任下虛寒甚者加炮川烏一兩堅服久不消者加礞砂二錢醋煮旋入

牡丹散治小兒癩卵偏墜

防風

去芦

牡丹皮

去木

石等分爲細末每服二錢溫酒調服如不飲酒鹽湯點服亦可

灸法治陰卵偏大癩病

關元穴在臍下參寸灸百壯良

勞瘵論治

論曰夫勞瘵一證爲人之大患凡受此病者傳變不一積年疰易甚至滅門可勝嘆哉大抵合而言之日傳屍別而言之日骨蒸殞滯復連屍疰勞疰蠱疰毒疰熱疰冷疰食疰鬼疰是也夫疰者注也自上注下病源無異是之謂疰又其變則有二十二種或三十六種或四十九種又有所謂五疰者日蜚疰道疰寒疰喪疰注是也其名不同傳變尤不一感此疾而獲安者十無一二也大凡五臟所傳皆令人增寒發熱其證狀各異有如傳之於肝則面白目枯口苦自

汗心煩驚怖傳之於心則面黑鼻乾口瘡喜忘大便或秘或泄傳之於脾則面青唇黃舌強喉硬吐涎體瘦飲食無味傳之於肺則面赤鼻白痰吐咯血喘嗽毛枯傳之於腎則面黃耳枯胸滿脅痛白濁遺瀝又有二十四種勞蒸者亦可因證驗之蒸在心也少氣煩悶舌必焦黑蒸在小腸也腹內雷鳴大腸或秘或泄蒸在肝也目昏眩躁怒無時蒸在膽也耳聾口苦肠下堅痛蒸在腎也耳輪焦枯腰脚痠痛蒸在右肾也情意不定泄精白紫蒸在肺也喘嗽略血聲音嘶遠蒸在大腸也右鼻乾疼大腸隱痛蒸在脾也唇

口乾燥腹脹滿畏寒不食蒸有胃也鼻口乾燥腹膨自汗睡卧不寧蒸在膀胱也小便黃赤凝獨如膏蒸在三焦也或寒或熱中脘膻中時覺煩悶蒸在膻也心胸噎塞疼痛不舒蒸在宗筋也筋脉縱緩小腹隱痛陰器自強蒸在回腸也肛門秘澁傳導之時裏急後重蒸在玉房也男子遺精女子白淫蒸在腦也眼眵頭眩口吐濁涎蒸在皮也肌膚鱗起毛折髮黑薰在骨也齒黑燥太杼瘻疼蒸在髓也肩背疼倦腑骨痠痛蒸在筋也眼昏肠痛爪甲焦枯蒸在脉也心煩體熱痛刺如針蒸在脊也自覺身熱多不奈何

四肢瞶動，蒸在血也。毛髮焦枯，有時鼻衄，或復尿血。
詳諸病證，大畧如斯。若究其根，惟心肺受蟲，嗜禍之甚也。治法先宜去根，次湏攝養調治，亦有早灸膏肓，俞雀氏穴而得愈者。若待其根深，帶固而治之，則無及矣。平時得三五方用之，頗驗。謾錄于左，以爲備治。鱗甲地黃湯治熱勞手足煩心，怔悸婦人血室有乾血，身體羸瘠，飲食不爲肌肉。

柴胡去芦

當歸去芦

酒浸

麥門冬去心

各

鱗甲醋炙

石斛去根

白朮

各

熟地黃酒浸焙

茯苓去皮

秦艽去芦

一兩

人參

肉桂不見火

甘草

炙各半兩

右㕮咀，每服四錢水一盞半生姜五片，烏梅少許煎至七分，去滓溫服，不拘時候。此藥專治熱勞，其性差寒，脾胃快者方可服，餌虛甚而多汗者不宜服此。

黃芪飲子治諸虛勞，氣四肢倦急，骨節痠疼，潮熱之力自汗，怔忡，日漸黃瘦，胸膈痞塞，不思飲食，欬嗽痰多甚，則嘔血。

黃芪蜜炙一兩

當歸去芦

酒浸

紫苑洗去土

各

人參

石斛

去根

地骨皮去木

乘白皮

附子

炮去皮臍鹿茸酒蒸

欵冬花

各一兩半夏湯泡七次

甘艸炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜七片棗子一枚煎至七分去滓溫服不拘時候此藥溫補榮衛枯燥者不宜進此唾血不止者加阿膠蒲黃各半兩蛤蚧圓治積勞咳嗽日久不瘥

蛤蚧一枚酥炙

皂角

不姓者酥炙

欵冬花

木香

不見火

杏仁

去皮尖童子小便浸

天麻

湯泡七次

熟地黃

酒蒸

五味子各一兩

丁香半兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服十五圓加至二十圓食後庄姜湯下

太上混元丹河車者天地之先陰陽之祖乾坤之寧籥鉦汞之匡廓胚脾將兆九九數足我則載而成之故謂之河車歷驗篇中名曰混沌皮蓋亦生天地陰陽之始爲七十二丹之首高士垂慈始開端緒太上云若欲長生當修所生人之所生實資于此所以成功靈應非金石艸木夜露曉霜之所比倫修真之士服之不輒誠足以還本元補益之道真得其真

紫河車

一具用少婦首生男子者良帶子全者於東流水洗斷血脈入麝香二錢在內

以線縫定用生絹包裹懸胎於沙瓮
內入無灰酒五升慢火熬成膏子一斗

沉香 別研

朱砂 別研水飛各一兩

人參

蕤蓉 酒浸

乳香 別研

安息香 酒煮去沙石各二兩

白茯苓 去皮三兩

右爲細末入河車、膏子和藥末杵千百下圓如梧桐子大每服七十圓空心溫酒送下。沉香湯尤色詳此丹以紫河車爲主，但佐使之藥太輕無病八久服可以輕身延年補損扶虛。乃若病重之人服之却宜用增漆之法也。

男子真陽氣衰、榮衛虛耗、腰背疼痛、自汗、怔忡、夜寐多驚、喘夢遺白濁、潮熱心煩、脚膝無力。宜於內加

鹿茸 酒蒸

川巴戟 去心

鍾乳粉

陽起石 火煅

附子 炮去皮臍黃芪 去芦各

二兩

桑寄生 無則以川續斷代

生鹿角 鏟

龍骨

紫苑 已上各一兩

右依前法修製和前藥末杵和前膏子爲圓湯使如前或沉香湯下。

婦人血海虛損、榮衛不足，多致潮熱心煩口乾喜冷、腹脇刺痛、腰痛、腿痛、痰多、欬嗽驚惕、仲經候不調或閉斲不通，宜於內加

當歸 去芦酒浸 石斛 去根 紫英石

煅酥淬七次水飛

柏子仁 微炒

別研

鹿茸 酒浸

鱗甲 醋炙各二兩

卷柏葉 一兩

川牛膝 去芦酒浸 一兩半上

右依前法修製和前藥末杵和前膏子爲圓湯使如前任下虛寒者加炮熟附子二兩咳嗽者加紫苑草一兩

經效阿膠圓治勞嗽并嗽血衄血

阿膠 蛤粉炒

庄地黃 洗

卷柏葉

山藥 刀炒

大薑根

五味子

雞蓁 各一兩

柏子仁 炒別研人參

茯苓 去皮

百部 洗去心

遠志 去心甘

草木煮

防風 去芦

麥門冬 去心各半兩

右爲細末煉蜜爲圓如彈子大每服一匱細嚼濃煎小麥湯或麥門冬湯嚥下

地仙散治骨蒸肌熱一切虛勞煩燥庄津液方載虛損門

崔氏灸穴

崔玄相灸勞法外臺秘要崔相家傳方及王寶官經驗方悉編載然皆差誤毗陵郡有石刻最詳予取諸本參校成此一書比古方極爲委曲依此治

入未嘗不驗，往往一灸而愈。予在宜城久，病虛羸，亦用此而愈。

唐中書侍郎崔知悌序

夫含靈受氣，稟之於五行，攝生乘理，降之以六疾。若岐黃廣記，蔚有舊經，攻灸兼行，顯著斯術。骨蒸病者，亦名傳屍，亦謂殮瘞，亦稱復連，亦曰無辜。丈夫以毒氣爲根，婦人以血氣爲本，無間少長，多染此疾。嬰孺之流傳注更苦，其爲狀也，髮乾而聳，或聚或分，或腹中有塊，或腦後兩邊有小結，多者乃至五六，或夜卧盜汗，夢與鬼交，雖目視分明，而四肢無力，或上氣食少，漸就沉羸，縱延日時，終於殞盡。予昔忝洛州司馬，嘗三十日不治，一十三人，前後差者數踰二百，至於狸骨懶肝，從聞曩說，金牙銅鼻罕見其能，未若此方扶危拯急，非止單攻骨蒸，又別療氣，療風，或癥，或勞，或邪，或癖，患狀旣廣，灸治者不可具錄，略陳梗槩，又恐傳授訛謬，以誤將來，今故具圖，形容狀，令覽者易悉，使所在流布，頗用家藏，未暇外請名醫，傍求上藥，還魂返魄，何難之有？遇斯疾者，可不務乎？

取穴法

先兩穴令患人平身正立取一細繩繩之勿令展縮順脚底貼肉堅踏之男左女右其繩前頭與大拇指端齊後頭令當脚跟中心向後引繩循脚肚貼肉直上至曲脅中大橫紋截斷又令患人解髮分兩邊令見頭縫自顙門平分至腦後乃平身正坐取向所截一頭令與鼻端齊引繩向上正循頭縫至腦後貼肉垂下循脊骨引繩向下至繩盡處當脊骨以墨點記之墨点不是灸處又取一繩子令患人合口將繩子按於口上兩頭至吻却釣起繩子中心至鼻柱根下如△此便齊兩吻截斷將此繩展令直於前來

脊骨上墨點處橫量取平勿令高下繩子先中當中以墨記之却展開繩子橫量以繩子上墨点正脊骨上墨点爲正兩頭取平勿令高下於繩子兩頭以白圈記白圈是灸處

以上是第一次點二穴

次二穴令其人平身正坐稍縮臂膊取一繩繞頸向前雙垂與鳩尾齊鳩尾是心岐骨人有無心岐取一寸卽雙截斷却背翻繩頭向項後以繩子中停取心正令當喉嚨結骨上其繩兩頭夾項雙垂循脊骨以墨點記之墨点不是灸處又取一繩子令其人合口橫量齊兩吻截斷還於脊骨上以墨點橫

量如法繩子兩頭以白圈記之

白圈處是灸穴

以上是第二次點穴通前共四穴同時灸日別各七壯至二七壯累灸至一百壯或一百五十壯爲妙候瘡欲差又依後法灸二穴


又次二穴以第二次量口吻繩子於第二次雙繩頭盡處墨點上當脊骨直上下豎點令繩中停中心在墨點上於上下繩盡頭以白圈兩穴

白圈是灸穴

以上是第三次點兩穴謂之四花灸兩穴各百壯三次共六穴各取離日量度訖卽下火唯須

三月三日艾最佳疾差百日內慎飲食房室安

圖形狀于後



自太極指端當脚跟向後
至曲脅太橫紋

名委中穴





最氏傳注方

卷之四

八十九

循脊骨引繩頭向下至繩盡處當脊骨以墨點之

以上是第二次點二穴



以上第一次點二穴


將量口吻繩子展直於前來脊骨上墨點處橫量兩頭以白圈記白圈是灸穴墨點處不是灸穴



合口以繩子按於口上鉤起繩子中心至鼻柱下便齊兩吻截斷




翻繩頭向項後以繩兩頭夾項雙垂循脊骨向下至兩繩頭盡處以墨點記灸穴




以上是第二次點二穴



用量口吻繩子於脊骨墨點上橫量兩頭以白圈記白圈記是灸穴墨點不是灸穴



以第二次量口吻繩子於第二次雙繩頭盡處墨點上直上下豎量繩盡頭用白圈記





凡骨蒸之後所起辨驗有一十二種並依上項灸

一胞蒸小便赤黃

二玉房蒸

男遺尿失精女月漏不調

三腦蒸頭眩熱悶

四髓蒸覺髓沸熱

五骨蒸齒黑

六筋蒸甲焦

七血蒸髮焦

八脈蒸急緩不調

九肝蒸

或時眼前昏眩

十心蒸舌焦

或瘡或時胸滿

十一脾蒸

唇焦折或口瘡

十二肺蒸

口乾注瘡

十三腎蒸

耳乾焦

十四膀胱蒸

右耳焦

十五膽蒸

眼目失光

十六胃蒸

舌下痛

十七小腸蒸

下泄不禁

十八大腸蒸

右鼻孔痛

十九三焦蒸

乍寒乍熱

二十肉蒸

別人覺熱自覺冷

二十一皮蒸

皮肉生起

二十二氣蒸

遍身壯熱不自安息

用尺寸取穴法

凡孔穴尺寸皆隨人身形大小須男左女右量手
指中心一節兩橫紋中心爲一寸

艾炷大小法

凡艾炷須令脚根足三分。若不足三分，恐覆孔穴不備。穴中經脉火氣不行，卽不能抽邪氣引正氣。雖小兒必以中指取穴爲準。

取艾法

端午日日未出於艾中，以意求其似人者，輒指之。以灸殊有效。幼時見一書中云爾，忘其何書也。艾未有真似人者。於明闇間，苟以意命之，萬法皆寒無一真者。此何疑耶？

用火法

黃帝曰：松柏柳桑棗榆柳竹等木火用灸，必害肌血，慎不可用。凡取火者宜敲石取火或水精鏡子於日得者太陽火爲妙。天陰則以槐木取火亦良。

自汗論治

論曰：難經云：心之液爲汗。凡自汗出者，皆心之所主也。人之氣血應乎陰陽，和則平偏則病。陰虛陽必湧，故發熱自汗。陽虛陰必乘，故發厥自汗。又况傷風暑傷濕喜怒驚悸，房室虛勞，歷節，腸癰，痰飲，產蓐等病，皆能致之。更有盜汗，一證，睡著而汗自出，亦由心虛所致。脉來微而濶濡，而虛虛而弱，皆主自汗。

桂枝湯治傷風脉浮自汗惡風

桂枝不見火 白芍藥各一兩 甘艸灸半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜五片大棗二枚煎至八分去滓溫服不拘時候發汗汗不止者謂之漏風宜加炮熟附子煎

消暑圓治中暑厥虛自汗煩渴

半夏一斤好醋 伏苓去皮半斤 生甘草半斤

右爲細末生姜自然汁爲圓如梧桐子大每服百圓熱水蘸下不拘時候此藥臻至修治用之極效

中暑爲患下卽甦傷暑發熱頭疼用之尤驗夏中

常服止渴利小便雖多飲水亦不爲害應是暑藥皆不及之

求附湯治中濕脉細自汗體重

白朮四兩

附子炮去皮 腊甘草灸二兩

右㕮咀每服四錢水一盞半姜七片煎至七分去滓溫服不拘時候

黃芪湯治喜怒驚恐房室虛勞致陰陽偏虛或發睡自汗或盜汗不正悉宜服之

黃芪去芦蜜水炙一兩半 白茯苓去皮 熟地黃酒蒸

肉桂不見火

天門冬去心 麻黃根

龍骨 各一兩

五味子

小麥炒

防風 去芦

當歸 去芦酒浸

甘草 炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至七分去津溫服不拘時候發厥自汗加熟附子發熱自汗加石斛

芪附湯治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠

黃芪 瘰水

附子 炮去皮臍等分

右咬咀每服肆錢姜五片水壹盞半煎至七分去滓溫服

消渴論治

論曰消渴之疾皆起於腎盛壯之時不自保養快情縱慾飲酒無度喜食脯炙醯醢或服丹石遂使腎水枯竭心火燔熾三焦猛烈五藏乾燥由是渴利壯疊醫經所載有消渴內消強中三證消渴者多渴而利

內消者由熱中所作小便多於所飲食物皆消作小便而反不渴令人虛極短氣強中者莖長興盛不交精液自出皆當審處施以治法大抵消渴之人愈與未愈常防患癱疾其所慎者有三一飲酒二房室三鹹食及虧能慎此者雖不服藥而自可不如此者縱有金丹亦不可救深思慎之

○加減腎氣圓治勞傷腎經腎水不足心火自用口舌焦乾多渴而利精神恍惚面赤心煩腰痛脚弱肢體羸瘦不能起止

山茱萸 取肉

白茯苓 去皮

牡丹皮 去木

熟地黃

酒蒸

五味子

澤瀉

鹿角

鎊

山藥

剉炒各一兩

沉香

不見火

官桂

不見火各半兩

右爲細末，煉蜜爲圓如梧桐子大，每服七十圓，用鹽湯米飲任下。弱甚者加附子一兩，兼進黃芪湯。黃芪湯方載自汗門中。

齊虧圓治強中爲病，壅長興盛，不交精液，自出消渴之後，多作癰疽，多由過服丹石所致。

齊虧

大豆

去皮及

茯神

去木

磁石

煅研極細

玄參

括婁根

石斛

去根

地骨皮

去木

熟地黃

酒浸

鹿角

各一兩

沉香

不見火

人參

各半兩

右爲細末，用猪腎一具煮，如食法，令爛杵和爲圓，如梧桐子大，每服七十圓，空心用鹽湯送下。如不可圓，入少酒糊亦可。

猪肚圓治消渴

猪肚

一枚治如食法

黃連

去芦

小麥

炒各五兩

天花粉

茯神

去木各四兩

麥門冬

去心二兩

右五味爲末，內猪肚中，縫塞安靜，中蒸之，極爛，不可圓，如梧桐子大，每服七十圓，用米飲送。

田小杵

可圓如梧桐子

大，每服七十圓，用米飲送。

下隨意服之如不能圓入少煉蜜

五疸論治

論曰古方論有黃疸有疸病命名不同其實一也詳觀花書黃有三十六種疸有五種三十六種黃者聖慧方載之備矣五疸之證感之者多不容不詳具五疸者黃汗黃疸穀疸酒疸女勞疸是也黃汗之狀身體俱腫汗出不渴狀如風水汗出入水浴水入汗空中故汗黃也黃疸之狀食已卽飢身體面目爪甲牙齒及小便悉黃欲安卧或身體多赤多青皆見者必發寒

熱此由酒食過度藏府熱極水穀相并積於脾胃復爲風濕所搏結滯不散熱氣鬱蒸所爲也大抵發於陰部其人必嘔發於陽部必振寒而發熱穀疸之狀食畢卽頭眩心中怫鬱不安而發黃此由大飢大食胃氣衝蒸所致也酒疸之狀身目發黃心中懊痛足脰滿小便黃面發赤班此由飲酒多進穀少胃內生熱因大醉當風入水所致也女疸之狀身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便不利此由大勞大熱不能保攝房後入水所致也其間多渴而腹脹者其病難療又有時氣傷風傷寒伏暑亦令人發黃五疸口淡怔

仲耳鳴脚弱微寒發熱小便白濁當作虛證治不可妄投涼劑愈傷血氣臨病之際不可不辨明也

黃芪散治黃汗

黃芪去芦蜜水灸一兩
石膏四兩 赤芍藥
茵陳各二兩
甘草炙半兩 麥門冬去心 豉各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分去滓溫服不拘時候

茵陳散治黃疸

木通
梔子仁各一兩

大黃炒一兩 瓜蒂一箇 石膏二兩

甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜五片薑白一莖同煎至八分去滓溫服不拘時候

穀疸圓治穀疸

苦參三兩 龍膽草一兩 牛膽一枚

右爲細末用牛膽汁入少煉蜜爲圓如梧桐子大每服五十圓空心食前熟水或生姜甘草煎湯送下紅圓子亦可服載和劑局方中

葛根湯治酒疸

葛根 二兩

枳實 去穰炒 楊子仁

豉 各一兩

甘艸 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服

不拘時候

滑石散治女勞疸

滑石 一兩半

白礬 一兩桔

右爲細末每服二錢用大麥粥飲調下以小便出黃水爲度

茵陳湯治行癰熱在裏鬱蒸不消化爲發黃

茵陳 二兩

大黃 一兩

梔子仁 三錢

右咬咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服
不拘時候

加減五苓湯治伏暑鬱發黃煩渴小便不利

赤茯苓 去皮

猪苓 去皮

澤瀉

白朮

茵陳 各等分

右爲咬咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服
不拘時候

秦艽飲子治五疸口淡耳鳴脚弱微寒發熱小便白濁

秦艽 去芦

當歸 去芦酒浸芍藥

白朮

官桂去皮不見火

茯苓去皮

熟地黃

酒蒸

橘紅

小草

川芎各一兩

半夏湯泡

甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片煎至七分去

滓溫服不拘時候

淋閉論治尿血附

論曰膀胱不利爲癃閉此由飲酒房勞或動役冒熱或飲冷逐熱或散石發動熱結下焦遂成淋閉亦有溫病後餘熱不敢霍亂後當風取涼亦令人淋閉淋之爲病種凡有五氣石血膏勞是也氣淋爲病小便

澁常有餘瀝石淋爲病莖中痛溺卒不得出膏淋爲病尿似膏出勞淋爲病勞倦卽發痛引氣衝血淋爲病熱卽發甚則尿血候其鼻頭色黃者小便難也地膚子湯治下焦結熱小便赤黃不利數起出少莖痛或血赤溫病後餘熱及霍亂後當風取涼過度飲酒房勞及行步冒熱令飲逐熱熱結下焦及散石熱動閑格小腹堅胞脹如斗諸有此淋悉皆治之

地膚子一兩

知母

黃芩

升麻

通艸

葵子

猪苓去皮

瞿麥去莖葉

枳實炒

海藻 洗各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至七分去滓溫服不拘時候忌甘草

通草湯治諸麻

通草 王不留行 葵子

茆根

桃膠

瞿麥

當歸 去芦洗

蒲黃炒

滑石已上一兩

甘艸 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分去滓溫服不拘時候

琥珀散治小便不通 琥珀不拘多少右爲細末每服一錢用萱艸根煎湯調服燈心湯調服亦可

小薊飲子治下焦結熱血淋

生地黃洗四兩 小薊根 滑石 通艸蒲黃炒

淡竹葉

四兩

藕節

當歸去芦

山梔子仁

甘艸炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服空心食前

鹿角膠圓治房損傷中小便尿血

鹿角膠半兩

油頭髮灰

沒藥別研各三錢

右爲末用茆根汁打糊爲圓如梧桐子大每服五

十圓空心鹽湯下

免絲子圓治小便多或致失禁

免絲子二兩

杜鵑根

附子炮去皮臍

五味子

鹿茸酒炙各一兩

肉苁蓉酒浸二兩

雞胫胫炙乾

桑螵蛸酒炙各半兩

右爲細末酒糊圓如梧桐子大每服七十圓空心溫酒鹽湯任下

失血論治金瘡瘀血附

論曰醫經所載失血有三種一日內衄二日肺疽三日傷胃是也蓋心主血肝藏血肺主氣血爲榮氣爲衛相隨上下升降無有休息者也六氣不傷七情不驚榮衛調平則無壅夫之虞節宜失宜必致壅閉遂

不得循經流注失其常度故有妄行之患焉夫血之妄行也未有不因熱之所發蓋血得熱則淖溢血氣俱熱血隨氣上乃吐衄也大抵脉芤爲失血沉細者易治浮大者難治又有感冒汗後不解鬱乾經絡隨氣湧洩而成動血思慮傷心心傷則吐衄肺傷亦令人唾血又有折傷吐血治療之法當以證別之乃可施治

犀角地黃湯治傷風汗下不解鬱乾經絡隨氣湧洩爲動或清道閉流入胃脘吐出清血及鼻衄吐血不盡餘血停畱致面黃大便黑

犀角 鎔

庄地黃

白芍藥

牡丹皮

右等分咬咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時候如狂者加黃芩大黃其人脉大而逕腹滿但依本方不湏加減

茜根散治鼻衄終日不止心神煩悶

茜根

黃芩

阿膠蛤粉炒

側柏葉

庄地黃各一兩

甘艸灸半兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜三片煎至八分去滓溫服不拘時候

香墨汁治鼻衄不止

香墨

葱汁

右件藥以葱汁磨墨滴少許於鼻中即止

天門冬湯治思慮傷心吐衄不止

遠志

去心甘艸木黃

白芍藥

天門冬

去心

麥門冬

去心

黃芪

去芦

薦節

阿膠

蛤粉炒

沒藥

當歸

去芦

生地黃

各一兩

人參

甘艸

灸各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分去滓溫服不拘時候

大薊散治飲啖辛熱，熱邪傷肺，嘔吐出血，一合或半升。

升許名曰肺疽。

大薊根洗

犀角鏘

升麻

萊白皮炙

蒲黃炒

杏仁去皮尖

桔梗去芦炒各一兩

甘艸炙半兩

升麻去皮尖

右㕮咀每服四錢水一大盞半姜五片煎至八分去滓溫服不拘時候。

加味理中湯治飲酒傷胃遂成嘔吐物與氣上衝，與血吐出，或心腹疼痛自汗，名曰傷胃嘔血。

人參

乾薑炮

白朮各一兩

乾葛

甘艸炙各半兩

右爲細末每服三錢水一大盞煎至七分去滓溫服，不拘時候。

棄命散治金瘡打損及從高墜下，木石所壓內損瘀血心腹疼痛大小便不通氣絕欲死。

紅蛭

用石灰慢火炒令焦黃，剉半兩

大黃二兩

墨牽牛二兩

右件爲末每服三錢用熱酒調下，人行四五里，再用熱酒調牽牛末二錢，准之須，藏府轉下，黑血成塊或成片，惡血盡卽愈。

雞蘆散治勞傷肺經睡內有血咽喉不利

雞蘆葉

黃芪去芦

生地黃洗

阿膠蛤粉炒

白芍根各一兩

桔梗去芦

麥門冬去心

蒲黃炒

貝母去心

甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半姜三片煎至七分去滓溫服不拘時候

藕汁飲治吐血衄血不止

生藕汁

生地黃汁

大蘆汁

各二合

生蜜半匙

右件藥汁調和令勻每服一小盞細細冷呷之
狗時候

Jan

7
25