

甚以致損傷胃氣而然治之者新病可兼去滯解鬱久病必須扶助正氣健脾養脾胃爲主○王太僕云食入反出是無火也此誠一言而盡然無火之由而猶有上中下三焦之辨寒在上焦則多爲惡心或泛泛欲吐者此胃脘之陽虛也寒在中焦則食入不化食至中脘或少頃或半日復出者此胃中之陽虛也若寒在下焦則朝食暮吐暮食朝吐乃以食入幽門火不能傳化故久而復出此命門之陽虛也治之者當求其本始效○嘔吐方內亦有可通用○初愈宜飲參湯或食稀粥飯祇可食半盞由漸而加一月後乃可復常亦切不可過飽

○翻胃列方

陳皮半夏湯和

治病在上焦惡心嘔食

陳皮一錢五分

半夏製二錢

加生薑三片煎○如有痰加茯苓二錢

人參半夏湯熱

治上焦為寒所傷而惡心嘔食者

黨參米拌炒去蘆三錢

半夏製二錢

乾薑八分

水煎

加味六君子湯溫補

治病在中焦嘔而兼有痰者

黨參去蘆米炒

半夏製各二錢

白朮淨

茯苓各一錢五分

陳皮

炙草

各一錢

吳萸

五分

生薑

三片

理中加半夏湯

熱補

治病在甲焦脾胃虛寒食入反出者

黨參去蘆

半夏

製各二錢

白朮淨炒

歸身

各一錢五分

乾薑炒

華撥

炙草

各一錢

右歸飲加減湯

熱補

治病在下焦朝食暮吐暮食朝吐食入久

而反出者

熟地 四錢

淮山

炒

半夏

製

枸杞

各二錢

黃肉

一錢五分

附子

製一錢

肉桂

去皮另燉五分

炙草

七分

地黃肉桂湯熱補

治同上○愈後宜服六味地黃丸或加肉桂

黨參去蘆米炒三錢 熟地 四錢 半夏製 歸身各二錢

吳萸七分 肉桂去皮另 麝六分

附子散大熱 治病在下焦而反胃者

大附子 一個 新燒磚 一只

將附子淬入生薑汁放在磚上四面燒紅炭火逼乾再乾再逼約薑汁盡半碗研末每服一錢米飲下。薑要自然汁磚要新方佳

香椽 甘蔗湯 和 通治反胃

乾香椽一大只 甘蔗汁五碗 生薑汁 一茶杯

和勻早晚每服大半茶杯

噎膈

食不得入爲噎。食雖入咽卽帶痰吐出爲膈。此皆由憂愁思慮積勞積鬱。或酒色過度以致血液俱耗。上下乾槁而然。趙養葵則歸於治腎。腎乃胃之關門。關門不利升降息矣。惟腎旺則胃陰充。胃陰充則能食。以大劑六味八味地黃湯爲主。而高鼓峰等又宗其法而變通之。專取陽明以六味地黃湯去丹皮澤瀉茯苓加甘草枸杞生地當歸使一派甘潤之藥以養胃陰。胃陰

溫中生養
去穢淨平
乳者血濁
渣盡汁多
白酒煉用
此數者為
主治因症
加減則自
得矣

上瀉。則膏門寬展而飲食進。胃陰下達。則幽門闌門滋潤而二便通。服十餘劑可愈。○薛立齋則以歸脾六君等湯與六味八味地黃丸間服。○或謂此症往往六七日不大便。則陳物不去。宜以大黃下之。隨用芝蔴煎濃飲之。○惟張仲景之法最佳。以半夏為主。而降衝任之逆。以人參為輔。而生既世之液。若於此而得其樞機。又審其寒熱虛實而施治之。則善矣。○幸而能愈。初一二日。祇可飲參湯與稀粥一盅。三日後。由漸而加。十日後。方可食飯。然亦不得飽食。飽食傷胃。則病復難救。

○噎膈列方

開膈法

甘蔗約四寸去皮白米一酒杯以水潤透

用磁碗一只將蔗與米放入碗內蓋密慢火蒸成飯先取蔗與病人徐徐嚼嚥其汁喉嚨乃開隨食此飯開膈後看

症服藥

四物加味湯補治噎膈

熟地四錢

當歸二錢

川芎一錢

黨參去蘆米炒

半夏製

白芍酒炒各一錢五分

加甘蔗汁牛乳各一酒杯沖藥服

加減六味地黃湯 涼補 治同上

生地

當歸 各二錢 半夏 製

黃肉

淮山

枸杞 各一錢 甘草 六分

如寒則去生地加熟地三錢肉桂四分附子七分甘草炙

歸脾湯 補 治同

黃耆 炙

黨參 去蘆米 棗仁 即炒杵 白朮 飯蒸

白芍 酒炒各一錢五分

當歸 三錢 龍眼 淨肉 木香 七分

遠志 去心

炙草 五分

如有痰涎多者加泡吳萸六分

葛花半夏湯補 治好飲酒人噎膈

黨參去蘆米 炒三錢 半夏製 葛花各二錢 白朮淨

茯苓各一錢 陳皮一錢 炙草七分 生薑二片

加牛乳或羊乳半茶杯沖藥服。如痰涎多者加泡吳黃

六分

烏藥半夏湯和 治氣滯人噎膈

黨參去蘆米 炒三錢 半夏製 烏藥各二錢 香附酒炒

茯苓各一錢 陳皮去白 一錢 砂仁粹 七分 炙草六分

加生薑二片煎。加味照前

神麩半夏湯消食兼補治不節飲食人噎膈

黨參去蘆米炒三錢白朮淨炒半夏製各二錢神麩炒

山楂 茯苓各一錢五分陳皮去白一錢炙草七分

生薑三片同煎。加味照前。如大便結三方俱加當歸

二錢。一老醫云此症宜飲牛乳或同薑汁蔗汁陳酒服

均佳若徒服香燥之藥以取快一時破氣而燥血是速其

死也

生薑汁煎補治噎食不下咽喉閉塞胸膈煩悶

高麗參去蘆米拌炒百合各二兩牛酥 白蜜

生薑汁 各五兩

共入銅鍋內煎去渣熬膏每服一酒杯緩緩嚥下

金銀花膏 微涼 治噎膈胸痛畏食者

金銀花 十兩

水煎去渣慢火熬成膏早晚每服一酒杯米湯下

枇杷葉煎 兼補 噎膈均治

黨參

去蘆米炒 半夏 製

阿膠 蛤粉炒 枇杷葉 去毛蜜炙

陳皮 六分

炙草 五分

生薑 三片

老人噎食不通方

黃鷄鷄肉四兩茯苓二兩白麵六兩作餛飩入白油煮食

三五次即愈

治噎膈奇方

香椽一只挖通心以乾結人糞填入仍封口火煨三炷香

久取出碗蓋存性研細末每服二錢黃酒下三次即效○

如無香椽用蘿蔔亦可

呃逆

內經無呃字通謂為噦後之仲景對於呃逆亦曰噦蓋噦必吐物此不過呃之連聲故以呃逆名之今以噦在氣分氣逆于下直冲于上以胃有新舊新故相亂真邪相攻氣逆相逆復出於胃故呃逆為診治大別之為寒呃也呃虛脫呃寒則溫之散之熱則清之降之虛脫則補之納之又可分為內傷(寒)外感(熱)一兩連至于虛脫內外俱有是候也

此症雖由氣逆而然然有兼寒兼熱有因食滯氣帶亦有因中

氣虛陰氣竭者治之當察其耳強氣盛多宜清降聲小息微悉
宜溫補若大病之後而見此者乃虛脫之哕殊非吉兆○凡哕
逆多至七八聲相連收氣不同者難治

○哕逆列方

柿蒂飲和

治尋常哕逆

柿蒂 三錢

水煎○一方加丁香七分治胸滿哕逆不止○又方用雄

黃二錢研細末酒煎令病人以鼻常聞之即愈

薑蜜飲溫

治哕逆久不愈連連四五十聲者

景岳簡易方

(1) 久不愈連連四五七聲者用生薑搗汁一合加蜜煎服

溫熱服

(2) 服者不效者用硫黃乳香等分以酒煎令病以

白昇散之 一才用雄黃一味酒煎

生薑汁 半盅

加蜜調勻燉熱服

安胃飲 涼

治胃火上衝呃逆不止

黨參 去蘆

陳皮

山楂

麥芽

木通

澤瀉 鹽水炒

黃芩

石斛 各一錢

橘皮湯 微涼

治氣鬱火衝呃逆

黨參 去蘆

半夏 製

各一錢 竹茹

陳皮 各一錢 五分

甘草 八分

生薑 一片

丁香散 熱

治痢後或病後胃中虛寒呃逆

黨參去蘆米 半夏製

陳皮

茯苓谷一錢

良薑五分

柿蒂一錢五分

丁香四分

炙草五分

加生薑二片煎

遺精

遺精之症凡有所注戀而夢者精為神動也其因在心有慾事不遂而夢者精失其位也其因在腎有勞倦而即遺者筋力不勝肝脾之氣弱也有用心過度輒遺者中氣不足心脾之虛陷也有濕熱下流相火妄動而遺者脾腎之火不清也有無故滑

而不禁者下元之虛肺腎之不固也有素稟不足而精易滑者先天之元氣單薄也有久服冷利等劑以致元陽失守而滑泄者誤藥之所致也治此者當各求所因至於年壯孤眠盛滿而溢則去者自去生者自生無足爲意

○遺精列方

兔絲子湯補

治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠夜夢精遺

絲餅五錢

淮山炒三錢

石蓮去殼去心

白茯苓各二錢

水煎○一方加五味子六分治小便不禁

補心神效丸補

治心神不安夜夢遺泄

黨參去蘆米

淮山炒

一 扶神 各六錢

遠志去心

一錢五分

熟地 四錢

棗仁 即炒杵

三錢 北味 二錢

加另研 柏子仁末 三錢 煉蜜為丸 如綠芸 大硃砂為衣 每

服三錢 黨參龍骨煎湯下

遠志飲兼補

治心腎不足恍惚不寧遺泄精

高麗參

去蘆米 淮山炒

龍齒煨 一錢

石菖蒲 一錢

正扶神

硃砂末 拌 遠志去心

扶神湯涼補

治慾心太熾而夢遺者

黨參去蘆

一錢五分 扶神 二錢

生地

當歸

不...

遺精

兔絲餅 三錢

肉桂 去皮另煨 四分

固真散 和溼

治纔睡即夢泄者

韭子 炒

白龍骨 煨 各一兩

共研細末每服二錢温酒調下或白湯冲酒一杯送下

金櫻子丸 補溼

治遺泄精滑

絲餅 五錢

茯苓

酒拌蒸 晒二錢 牡礪 煨二錢

金櫻子

去毛去核 蒸熟二錢

共研末煉蜜為丸如綠荳大每服三錢酒下或淡鹽湯下

五鎖散 和溼

治玉門不閉遺精日久如水之洩不能關束者

文蛤 一兩 六錢

白龍骨 煨 二錢

白茯苓 四錢

共研細末每服二錢淡鹽湯下臨睡再服一次

治遺精奇方

荷葉 二兩

研細末每服三錢酒調下或白湯加酒一杯送下

濁症淋症

由精濁者動在心腎由溺濁者病在膀胱肝脾
治淋之法大抵與治濁同凡熱者宜清清者宜利下陷者宜
升提虛者宜補陽者不固者宜溫補命門

濁有赤白之分併有便濁精濁之異赤濁者熱勝於濕白濁者
濕勝於熱便濁色似米泔水精濁便後如膠粘之有絲此病較
淋症頗輕若淋之為病古人別為勞膏石氣血五種膏淋則溺

出如膏勞淋每從勞後而得石淋則溺如砂石痛不易出氣淋則氣滯不通臍下悶痛血淋則瘀血停蓄莖中刺痛此皆為熱結膀胱所致治之者當辨人有強弱病有新久用藥庶不至誤○云云溺出帶赤色為赤濁鮮紅色不痛者為尿血血來而痛者為血淋精濁則是因相火妄動久而痛澀俱去均宜用寧心固腎等藥方合

○濁症列方

加味二陳湯涼

治濁病初起宜導其濕

陳皮 一錢

白朮 淨 二錢

蒼朮 米泔水 浸

半夏 製

黃柏

草薺 各一錢五分

茯苓 三錢

甘草 七分

如赤濁加丹參二錢。體質寒者去黃柏。病頗久者當

服固劑

清心蓮子飲 涼

治赤濁屬熱者

炙蒼 八分

黨參 去蘆

茯苓

石菖蒲 名一錢

遠志 去心五分

石蓮 淨仁 去心一錢

麥冬 去心

川地骨

黃芩

車前

甘草 各一錢五分

分清飲 涼

治心移熱膀胱而為赤濁併治諸淋症

丹參

車前 各一錢五分

黃柏 五分

川草薺 二錢

白朮淨

茯苓各一錢

石蓮淨仁半石菖蒲五分

固精丸和澀

治下元虛損白濁如脂小便無度並效

牡蠣煨

絲餅

韭子

桑螵蛸酒炙

北味

龍骨煨

茯苓

白石脂煨

等分爲末酒和丸如綠豈大每服二錢淡鹽湯下

草薺分清飲

治真元不固下焦虛寒或服寒涼利藥過多

小便白濁頻數無度澄如膏糊等症

川草薺

益智仁鹽水炒烏藥

白茯苓

石菖蒲各一錢

甘草梢一錢

加鹽少許煎

兔絲丸補

治思慮太過心腎虛損真元不固小便白濁夢寐

頻泄尿有餘瀝

兔絲餅二兩

石蓮仁去心六錢

白茯苓一兩五錢

研末酒和丸如綠荳大每服二錢淡鹽湯下

鎖精丸溫

治白濁白帶小便頻數

破故紙

白茯苓

五味子炒各六錢 青鹽三錢

研末酒和丸如綠荳大每服二錢淡鹽湯下

次實杞子湯補澀治精濁

熟地 三錢

淮山 炒 二錢

杞子

石蓮仁 去心 杵

茨實 杵各一錢五分

牡蠣 煨 各一錢 白茯苓 一錢五分

茯神 一錢

水煎好另以椿根扁蓄煎汁入藥再煎服。如熱加黃連

六分。寒加益智仁一錢五分。滯加烏藥一錢五分

四君子加遠志湯 補 治心虛白濁頗久者

黨參 去蘆米 炒

茯苓 各一錢 五分

白朮 淨 二錢

遠志 去心 五分

炙草 七分

金櫻膏 溫補 治虛勞遺精白濁

黨參去蘆米 山藥 各二兩 益智仁鹽水炒 桑螵蛸瓦焙燥

薏仁炒 黃肉 各四兩 川杜仲鹽水炒 枸杞子

茨實杵 青鹽 各二兩五錢 三錢

水煎去渣熬成膏以金櫻膏對半和勻每服三四匙空心

白湯調下

水陸二仙丹澀 治精脫腎虛白濁與補陰藥同服更效

茨實 四兩

研末同金櫻膏四兩和丸如綠葶大每服三錢淡鹽湯下

加味附桂地黃湯熱補 治命門火衰以致敗精為濁

熟地 三錢

淮山 炒

茯苓 各二錢
絲餅 四錢

黃肉

車前 各一錢
澤瀉 鹽水炒
丹皮 各一錢

附子

製 八分

肉桂 去皮另燉
四分

淋症列方

五淋散寒

治膀胱有熱小便不通淋澀不出或尿如荳汁或

成砂石或為膏汁或熱而便血均宜

山梔

淨仁炒

白芍

酒炒

當歸 一錢

赤茯苓 三錢

甘草

一錢五分

燈心

一團

如氣淋加香附二錢荆芥麥芽各一錢五分○血淋加生

地牛膝各二錢紅花一錢入麝香少許。石淋加六一散
三錢調下。膏淋合分清飲煎。勞淋合補中益氣湯煎
○如過服金石藥與老人陽已痿而思色以降其精致精
內敗而為淋者加萆薢二錢石菖蒲一錢兔絲餅三錢以
導之

八正散寒微峻治心經蘊熱臟腑秘結小便赤澀淋閉不通及血

淋等症

滑石

木通

車前

山梔淨仁炒杵

大黃

瞿麥

菖蒲

甘草各一錢

加燈心二十莖煎

導赤散涼 治心火及小腸有熱小便赤澀赤濁血淋而渴者

生地二錢

木通一錢五分

甘草一錢

加竹葉二十片煎。一方有黨參麥冬

加味六一散涼

治血淋

滑石三錢

車前一錢

甘草梢四分

加生柞葉生藕節搗汁半茶杯沖藥服

牛膝煎和

治石淋及死血作淋痛不可忍者。凡五淋小便

不通莖中痛甚者均宜

牛膝鹽水炒 一兩

濃煎去渣加麝香少許調勻早午晚分三次服。如氣淋

則不用麝香加乳香末一錢。有遺精症者禁用牛膝

髮灰散剉 治血淋

亂髮洗淨火煨透 研末 二錢

用藕節搗汁半茶盅調服二三次愈

假蘇散微涼 治氣淋

瞿麥 赤茯苓 麥冬去心 香附炒

陳皮 荆芥 木通 各一錢

海金沙散

治膏淋

海金沙

滑石 各五錢 甘草 六分

共研細末每服二錢燈心湯下

六味地黄丸補

治淋症久而水虛者

熟地 一兩

淮山 炒 八錢

萸肉 六錢

茯苓 三錢

澤瀉 鹽水炒 丹皮 各二錢

煉蜜為丸每服三錢白湯下。加肉桂附子治冷淋

琥珀散補

治老人虛人小便不通淋澀

真琥珀 五錢

研末用高麗參煎湯調勻每服一錢

疝氣

此症六抵任病肝病居多。小腸病亦多。各經間或有之。經云男
子內結七疝。女子帶下瘕聚。治之之法必先治氣。蓋寒有寒氣
熱有熱氣。濕有濕氣。氣實者須破氣。氣虛者須補氣。諸症中俱
當兼用氣藥。○凡寒症必喜煖惡寒。鼻尖手足多冷。夫小便亦
不熱。若熱症必煩熱喜冷。或爲脹爲痛。或大便秘結。或小水熱
閉不通。○傷於寒則陰縮。傷於熱則縱挺不收。○疝病初起必

以溫經除濕散寒行氣為主。切不可早用寒涼以致留邪為害。

疝氣列方

加味五苓散溫

治疝氣初起

白朮淨 二錢

橘核杵

茯苓

金鈴子各一錢

檳榔

猪苓

澤瀉鹽水炒 小茴香一錢

木通七分

肉桂去皮另燉 三分

荔枝散和

治疝氣痛極併治小腹氣痛等症俱效凡在氣分

者最宜

荔枝核燒微焦 大茴香各六錢

研末好酒調服二錢或三錢日三次。寒甚者加泡吳萸

三錢。此方加橘核六錢治腎囊大如斗者

導氣湯 溫 治寒疝疼痛

川楝子 二錢 木香 五分 茴香 一錢 吳萸 泡 五分

用長流水煎。一方用栗木炭燒紅放碗內加好燒酒半

碗以碗蓋住飲之雖痛不可忍亦必立止

神應散 熱 治寒疝及諸疝心腹痛不可忍以此散氣開鬱

元胡索 小茴 胡椒

等分爲末每服二錢酒調下

加味二陳湯 微熱 通治七疝甚驗

白朮 淨

半夏 製

小茴

金鈴子 各一錢五分

陳皮

澤瀉 鹽水炒 猪苓 各一錢

白茯苓 一錢五分

木通 一錢

肉桂 去皮另炙 草 六分

如寒甚者加乾薑一錢附子一錢。熱極者去肉桂加黃

柏知母各一錢五分。小便如膏者加石菖蒲七分葶藶

一錢五分。氣上衝者去白朮加泡吳萸六分當歸一錢

五分肉桂再加二分。囊腫如水晶者加生薏米四錢桑

白皮一錢五分。痛不可忍者恐瘀血為膿致潰加桃仁

十餘粒紅花一錢製乳香一錢○筋縮者加生薏米一兩
川木瓜二錢○頑麻不痛者加川芎一錢檳榔一錢五分
○癢者加刺蒺藜三錢

胡蘆巴丸熱

治小腸氣蟠腸氣奔豚疝氣偏墜陰腫小腹有

形如卵上下來去痛不可忍或絞結繞臍攻刺作痛者

大把戟炒

三錢

胡蘆巴

八錢

茴香

一兩

吳萸

泡五錢

川棟子九錢

製附子

三錢

共研末酒和爲丸每服三錢空心溫酒下

煖肝煎

微熱兼補

治肝腎陰寒小腹疼痛疝氣

當歸

枸杞 各三錢

茯苓

小茴

烏藥 各二錢

肉桂 去皮另燉四分
沈香 六分

生薑 三片

加味附桂地黃湯 熱補
治陰虛痲症

熟地 四錢

淮山 炒 二錢

萸肉

川棟子

丹皮

茯苓

小茴 各一錢
五分

製附子

澤瀉 鹽水炒 各一錢
肉桂 去皮另燉 三分

加味歸脾湯 補

治陽虛痲症

炙黃耆

白芍 酒炒

歸身

白朮 淨炒 各一錢
五分

龍眼肉 一錢

棗仁 即炒 粹

茴香 各一錢
五分

黨參 去蘆飯蒸 二錢

金鈴子一錢五分 遠志去心四分 木香六分 炙草七分

治寒疝神方 大熱 治病甚至於氣往上衝如有物築塞心臟欲

死手足厥冷者二三服除根痛當立止

荔枝核燒焦研末 洋硫黃 陳皮

等分爲末飯丸如綠葶大每服十四丸酒下多亦不得過

二十九丸。一方葫蘆巴子一兩鐵鍋內炒黑研末每服三

錢滾水冲服出微汗即消。又方老絲瓜瓦上焙枯研末

熱酒冲服重者不過三服即愈雖氣痛冲心亦效

治陰囊腫痛奇方

不印醫必受 卷三 疝氣 脚氣

用葱白乳香搗塗即時痛止腫消或用煨葱入鹽少許搗
塗亦可。一方治偏左不痛者黨參三錢當歸炙著各二
錢川芎小茴橘核川棟子荔枝核各一錢川椒製附子各
五分赤芍一錢五分另燉肉桂五分分三次沖藥服服一
二劑效驗之至

脚氣

此症自膝至足。或見麻痺。或見冷痛。或見痿弱。或見攣急。或腫
或不腫。或漸枯細。或如火熱。或有物如指發自踣腸而氣上衝。

心是皆脚氣之正病而亦有兼病者宜辨而治之。○又云腫者爲濕脚氣不腫者爲乾脚氣腫者當除濕乾者當行氣大抵此症有緩有急緩者其來漸初時飲食如故至二三月久乃日甚一日急者其來速或一二月卽危治之若緩恐其氣上衝心亦能殺人。○寒濕外侵致成脚氣者十居六七其症疼痛拘攣惡寒凍厥宜以溫經除濕爲主故多用麻黃桂附乾薑川烏之屬蓋以麻黃川烏走而不守能通行經絡乾薑桂附辛甘大熱能助陽退陰清濕旣除病無不去。○除濕則用蒼朮白朮防已南星行氣利關節則用羌活獨活木瓜檳榔引經則用木通牛膝

和血則用生地當歸此皆不可少之藥。凡人不論男女老幼
難襪濕切須速換。卽赤脚亦無碍。不然則染脚氣之病。慎之。

○脚氣列方

鷄鳴散溫 治脚氣男女皆宜如感風濕流注浮腫疼痛者亦

服之甚效

橘紅 木瓜 各六錢 檳榔 杵 五枚 吳萸 泡

蘇葉 各二錢 桔梗 三錢 生薑 三片

煎好約於四五更時分作三次或六次溫服服畢食乾飯
壓下至天明當有黑糞水瀉出卽是腎家所感寒濕之毒

漸當痛住腫消須遲吃飯

加減檳榔湯和疎散治脚氣脚弱名曰壅疾貴在疎通春夏尤宜

橘紅

檳榔

蘇葉 各二錢

炙草 一錢

加生薑三片煎○如脚痛不已者加五加皮二錢木香一

錢○中滿不食加枳殼一錢○痰厥或吐加半夏一錢五

分○轉筋者加吳萸六分○脚腫而痛加大腹皮川木瓜

各二錢○脚痛而熱加地骨皮二錢○小便不利加木通

一錢五分○大便不通加大黃一錢五分○婦人脚痛加

當歸二錢○室女脚痛多是肝血滯實加赤芍藥二錢

獨活湯熱補兼散治脚氣陽虛寒勝經氣不行頑麻不用如神

麻黃去節

獨活

川芎

附子製

牛膝鹽水炒

炙蒼

黨參去蘆米

當歸

白芍酒炒

茯苓

白朮淨炒

杜仲鹽水炒

乾薑

肉桂去皮另研

木香

炙草

等分研末每用七錢加生薑三片紅棗三枚煎服○凡虛

弱之人受寒濕此方所必用切勿以為脚氣忌補而棄之

二妙湯寒

治濕熱脚氣疼痛者

蒼朮米泔水浸切黃柏各二錢

水煎加生薑汁半酒杯沖服。此二味藥有雄壯之氣氣實者加酒一杯助之痛甚再加薑汁。又云有氣加氣藥血虛加補血藥。一方有陳皮一錢羌活二錢芍藥甘草各一錢威靈仙酒炒研末三分

立效散

溫

治脚氣攻心兼治暴腫甚效

木瓜

蘇葉

陳皮 各二錢

吳萸 泡 一錢

檳榔 四枚

加生薑五片煎分二次服

檳榔散和行氣治脚氣衝心煩悶不識人

茴香

檳榔

木香

等分研末每服三錢白湯調下

半夏散兼散治脚氣煩悶嘔逆心胸壅滯不能飲食

黨參去蘆米炒赤茯苓各二錢肉桂去皮另半夏製

陳皮

前胡

檳榔杵

蘇葉各一錢五分

加生薑三片煎或加淡竹茹一錢

茱萸散溫

治脚氣入腹喘急欲死

川木瓜

吳萸泡

等分爲末每服三錢酒調下

刺脚氣方

治脚氣腫痛

白芥子

白芷 各五錢

共研細末薑汁和勻敷患處

脫肛

大腸與肺爲表裏肺虛則大腸滑脫故有因久瀉久痢脾腎氣陷而脫者有因中氣虛寒不能收攝而脫者有因色慾傷腎而脫者有因酒濕傷脾而脫者有因腎氣本虛而脫者有因過服寒涼而脫者亦有因濕熱下墜而脫者然熱者必熱赤腫痛乃係實症不然非氣虛卽陽虛也須用溫補升提之藥始效

脫肛列方

涼血清腸湯涼兼補 治大腸血熱脫肛

生地 二錢 當歸 白芍 酒炒 槐花 炒 各一錢五分

黃芩 一錢 川芎 五分 升麻 六分 甘草 七分

加味補中益氣湯 涼補 治脾虛下陷而有熱者

炙蒼 黨參 去蘆 白朮 淨 槐花 各一錢五分

當歸 黃芩 各一錢 升麻 五分 柴胡 七分

陳皮 六分 炙草 七分

如無熱則去黃芩槐花加北味七分薑棗同煎

柯子人參湯補

治脫肛

黨參去蘆米炒二錢

白朮淨炒

蓮仁去心炒

歸身

茯苓各一錢五分

升麻蜜炙五分

柯子杵一只

炙草七分

加生薑二片煎。如臟寒加乾薑隨宜或再加附子。

升陽除濕湯和

治酒濕脫肛

白朮淨

葛花

茯苓各一錢五分 升麻六分

澤瀉鹽水炒

蒼朮米泔水浸

神麩各一錢 甘草五分

加生薑二片煎

參耆白朮湯補

治瀉痢與虛氣虛脫肛

不日...

脫肛

三

黨參去蘆米炒二錢炙著

白朮淨炒

肉蓯蓉

茯苓各一錢淮山炒二錢

升麻蜜炙六分

炙甘草七分

加生薑二片煎○或加製附子五分

補陰益氣湯補

治陰虛肝腎不足而下陷脫肛者

熟地三錢

黨參去蘆米炒

淮山炒各二錢

當歸一錢五分

陳皮七分

升麻蜜炙五分

炙草一錢

生薑二片

蟠龍散

治熱症脫肛腫痛者

地龍晒乾五錢

風化硝一兩

共研細末先用荆芥八錢生葱四根煎湯候溫以軟帛淋

洗拭淨如濕則將藥末摻之乾則調芝麻油塗之須以油

紙托上

明礬五倍子散

治脫肛

五倍子 三錢

白礬 二錢

共研末用水二碗煎沸候溫以軟帛蘸湯淋洗日數次即
上如脫肛長者淋洗後以油紙托上四圍皆用赤石脂研
細末摻之

泄瀉

不知醫者必受

泄瀉

泄瀉之症有寒有熱。實熱者形氣有餘，聲音壯亮，飲食裕如，舉動輕捷。虛寒者形氣不足，精神短少，言語輕微，舉動疲倦。以此辨之，始無所誤。○但人之病此，實熱固有而虛寒居多。辨之未真，不如先服平劑爲妥。○水瀉係清濁不分，利其小便自愈。挾濕則兼用去濕藥一二味，若口中利，小便清長，切不可利。利則傷陰。○又有洞瀉一症，忽然大瀉不止，或汗或喘，最爲危候。多因夏月伏陰在內，虛寒人恣食寒涼蔬果所致，須速服大劑附子理中湯，乃可挽回。

泄瀉列方

四苓湯和 治水瀉小便短少者

白朮土炒

澤瀉鹽水炒

茯苓各二錢

猪苓一錢五分

如脚冷者是挾濕加蒼朮一錢。兼感冒身熱者加防風

荆芥各一錢五分。體質寒者加肉桂三四分

胃苓湯和

治脾濕泄瀉不止

陳皮

厚朴製

蒼朮米泔水浸

白朮土炒

茯苓各二錢

澤瀉鹽水炒

猪苓各一錢五分

甘草七分

加生薑二片紅棗二枚煎

扁荳四苓湯和

治夏月暑瀉欲成痢者

白朮 土炒 二錢

厚朴 薑汁炒 一錢
扁豆 炒碎

澤瀉 鹽水炒

猪苓

茯苓 各一錢
五分 生薑 二片

如有火人加香薷一錢黃連五分。無火人加肉桂三分

防風芍藥湯 和

治瀉而腹痛者

白朮 土炒 二錢

白芍 酒炒 一錢五分 防風

陳皮 各一錢

白朮芍藥湯 補

治脾經受濕體倦泄瀉水穀不化

白朮 土炒 二錢

白芍 酒炒 一錢五分 炙草 二錢

柴胡湯 涼

治平人身熱煩渴泄瀉。胃寒者去黃芩

白朮 土炒 二錢

黃芩

澤瀉 鹽水炒 柴胡

猪苓

茯苓 各一錢
五分

茵陳 飲寒

治熱瀉或口渴喜冷小水不利者甚驗

山梔子 炒杵

茵陳

澤瀉 鹽水炒
青皮

甘菊花 各一錢
五分
甘草 一錢

七味白朮散

補微涼

治泄瀉而渴者無論大人小兒應驗如神

黨參 去蘆

白朮 土炒

茯苓 各一錢
五分
藿香 一錢

木香

濕紙包煨六分

乾葛 二錢

炙草 七分

如胃寒人加煨薑二片

白朮湯 補

治小便清長而瀉者

白朮土炒四錢
炙草一錢

加煨薑三片大棗二枚煎如寒甚則煨薑換用乾薑隨宜

理中止瀉湯熱補治寒瀉溫胃止泄

黨參去蘆米炒一錢五分
乾薑炒一錢
白朮土炒二錢
肉蔻霜五分

炙草一錢
或加柯子一只藿香一錢五分

八味理中湯熱補治脾胃虛寒飲食不化食滯泄瀉胸膈痞滿

黨參去蘆米炒各一錢
茯苓各五分一錢
白朮土炒二錢
乾薑炒

神麴炒各一錢
麥芽各一錢
砂仁炒杵五分
炙草一錢

加生薑二片煎如飲食不化加生益智仁一錢五分

北味吳萸湯

温

治五更即溏瀉經年不愈名為腎泄

肉蔻霜 一錢

北味 六分

吳萸 泡五分 白朮 淨炒一錢五分

炙甘草 五分

薑附湯 大熱峻劑 治忽然暴瀉不止或大汗大喘手足厥冷氣少不

欲言語者

白朮 淨炒三錢

附子 製三錢

乾薑 炒一錢五分 良薑 一錢

炙草 一錢

水煎候温急服如欲嘔加製半夏 二錢

痢疾

此症所下有紅有白穢濁膠粘裏急後重欲下不下當分虛實寒熱實熱者其人必形氣強壯畏熱喜冷不欲衣被渴欲飲水小便赤痛或下純紅鮮血虛寒者其人必體質薄弱喜煖畏冷常欲衣被口不渴水小便清長若混治最易殺人○如發熱不休非外感風寒卽經絡不和宜用人參敗毒散加老米治其初起以取微汗則愈如邪侵陽明則用仲景葛根湯寒熱往來必用小柴胡湯熱多口渴則去半夏加葛根口中熱胸腹脹滿則用承氣湯下之口中和小便清長手足冷者是虛寒無疑當用理中湯加龍心土八錢危極者亦用此方救之○有滯服平胃

散脾胃虛弱服六君湯。○察其無外症惡症三日外方可服。○
藥湯。○倘是產婦俱宜於各方之內加阿膠炙草。

痢症列方

人參敗毒湯散

治痢疾初起身熱者。○不可望速須因症服

藥始免日甚

羌活

獨活

黨參去蘆

川芎各一錢

桔梗一錢五分

枳殼麩煨去瓢六分

柴胡七分

甘草八分

加生薑二片老米一撮煎

薑茶飲和

治痢初起

陳細茶 二錢

生薑 八片

水煎

石藥湯 和

治痢疾初起身不熱者

痢症奇方。冬間買蘿蔔菜十餘觔，以滾水拖過，即攤在星瓦上，任經風霜雨雪，至次年立春後，檢回洗淨，掛於石風無日之處，俟乾用新瓦器收藏。遇有痢疾，秤六七錢，加生薑三片煎水飲，無論寒熱紅白，噤口痢均極效驗。

生白芍

山楂

燒成炭

桔梗

各一錢

陳茶葉 二錢

炙甘草 七分

生薑 五片

如渴加葛根一錢五分

歸芍湯 和

治痢疾

當歸 二錢

桔梗 一錢

五分

枳殼

麵煨去

生白芍 三錢

木香

濕紙包

檳榔

各一錢

炙草

七分

加生薑三片煎。如白痢加蒼朮七分砂仁四分。紅痢則加山楂炭一錢。

黃芩芍藥湯 寒

治熱痢

生白芍 六錢

黃芩 一錢五分

甘草 一錢

如腹痛加肉桂三分。膿血甚者加當歸一錢黃連五分

芩連湯 寒

治實熱人痢疾

當歸 二錢

黃連 六分

黃芩 一錢五分

生白芍 三錢

檳榔

木香 各一錢

炙草 五分

如腹中脹滿而痛手按更痛者加生大黃二錢厚朴一錢

下之審非此症切不可服

芍藥木香湯熱

治虛寒人痢疾

白芍酒炒 七錢

木香濕紙包 煨

炮薑各一錢

吳萸黃連拌炒 去

蘄艾揉去灰坭 一錢五分

炙草 一錢

歸芍利導湯滑腸兼補

治痢日夜數十次欲下不下逐點而來者

油當歸 七錢

枳殼麵煨 蘿蔔子

檳榔 各一錢

生白芍 五錢

車前一錢 細甘草 一錢

如實熱加槐花一錢五分。虛寒人加泡吳萸六分乾薑

六七分或一錢甘草蜜炙。服藥後大便漸通色變黃即

不可再服功過滑也須服黨參甘草湯

黨參甘草湯補

治痢疾糞漸變黃者

黨參去蘆

甘草一錢

七錢

如寒痢參用米拌炒甘草蜜炙加煨薑一片

當歸黃耆湯補

治肝脈下痢腹痛小便澀者

黃耆炙

三錢

當歸六錢

加糯米一撮煎

噤口痢

下痢常覺惡心欲吐。食不能入。此症最危。虛寒者居多。亦間有
實症。若因食積。必胸腹脹滿。因火鬱。必臟腑熾熱。無脹無火。但
見臟氣不能容受。有出無入。精神日敗。其故有二。一由脾氣之
弱。或爲嘔吐。或爲吞酸。或惡聞食氣。饑不能食。而枵腹待斃。此
中焦不運。病在脾也。非用人參白朮。乾薑炙草之屬。不可。一由
腎氣之弱。則命門不煖。大腸不能固。小腸不能化。胃氣不能行。
此下焦失守。而化源無主。病在腎也。非用熟地。附子。肉桂。吳茱
之屬。不可。脾胃強而食自能入。其理甚明。不加審察。妄用寒涼
攻擊之藥。必速其死矣。慎之。

噤口痢列方

人參黃連飲 寒

治噤口痢屬熱者

生黨參 去蘆 三錢

黃連 吳萸拌炒去吳萸 六分

加粳米一錢濃煎逐匙入口

人參蓮子飲 補

治噤口寒痢惡心不能食者

黨參 去蘆 四錢 米拌炒 石蓮 去殼去心炒 六錢

加陳倉米一錢煎○有高麗參則不用黨參

治噤口痢奇方

糯米穀 炒 開花人薑汁再炒

研細末每服二三錢白湯調下

開際方

鐵秤鍾二只無秤鍾用新瓦盤一只銅盤亦可

將秤鍾燒紅放盤內以好醋淬之日夜數次令病人聞其

氣甚效

理中湯熱補

治虛寒各痢症危極者以此方救之或可回生

黨米去蘆炒三錢白朮淨炒二錢乾薑一錢炙草七分

加竈心土入錢先煎澄清去土入藥煎服

○○附瘧痢並行列方 有痢後瘧有瘧後痢亦有瘧痢並行

者治之當分寒熱

柴芩煎寒

治內火上衝瘧痢並行頭痛煩渴喜冷者

柴胡 二錢

澤瀉 鹽水炒

梔子 枳 各一錢五分

枳殼 麩煨去瓢

木通 各一錢

黃芩 一錢五分

如下純紅鮮血者加酒炒白芍二錢甘草一錢○濕勝氣

陷者加防風一錢

補中益氣加薑桂湯 熱補

治瘧止而痢更甚者

炙薯

白朮 淨炒

當歸 各一錢五分

升麻 蜜炙 三分

柴胡 五分

黨參 去蘆米 炒二錢

乾薑 五分

肉桂 去皮另燉 三分

陳皮 一錢

炙草 七分

水煎。○凡瘧後痢痢後瘧俱宜服補中益氣湯。薑桂則因人而用。○瘧痢並作先治瘧瘧止痢益甚須服此湯若復瘧則去薑桂加製附子隨宜。

小便閉

凡人小便不通若火在下焦必有火症可據及溺管疼痛此則可清可利又有敗精宿血阻塞水道而不通者亦可用法以通之固非難事所難者其惟氣閉乎然氣亦當分虛實實閉者不

過肝強氣逆移碍膀胱或破其氣或提其氣而升之猶易爲力
至於虛閉之症最危最難治之不得加意詳審矣經云膀胱
者州都之官氣化則能出是水卽氣氣卽水氣既不化安得不
閉今人往往見小水不通輒強爲通利而不知真陽下竭元海
無根再用苦寒之藥以清之通之是醫殺之也臨症者其慎之
○又云大小便俱閉通其大便而小便自利

○小便閉列方

導赤散涼 治心火及小腸有熱小便不通而渴

生地 二錢

木通 一錢五分

麥冬 去心

赤茯苓 各二錢

竹葉 十片

甘草 七分

大分清飲 寒

治積熱閉結小水不利或腰腹下部極痛或濕

熱黃疸溺血蓄血淋閉等症

茯苓

澤瀉 藍水炒 木通

猪苓

枳殼

麵煨 去瓢

車前 各一錢

梔子 炒 一錢五分

如內熱甚者加黃芩黃柏龍胆草之類。大便堅鞭脹滿

加大黃三二錢

葵子湯 寒

治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥

滑石

葵子

猪苓

赤茯苓

枳實去瓤

瞿麥

木通

黃芩

車前各一錢 甘草五分

化陰煎寒兼滋陰 治水虧陰涸陽火有餘小便癯閉淋濁疼痛等症

熟地四錢

牛膝鹽水炒

生地各二錢

生知母

黃柏

牛各一錢五分

猪苓二錢

綠苳三錢

閩澤瀉鹽水炒

加食鹽少許煎。如熱甚加龍胆草一錢五分

滋腎飲微涼

治腎虛足熱小便不通肚腹腫脹之甚眼睛欲突

出者。凡病在下焦不渴者宜之。

一名通關飲方在臍腹痛內

葱白湯和

治小便卒暴不通小腹脹急氣上衝心悶絕欲死

陳皮 三錢

葵子 一錢五分

加葱白三莖煎

春澤湯

微熱兼補

治氣虛小便閉

黨參

去蘆米炒二錢

白朮

飯蒸

茯苓

澤瀉

鹽水炒

猪苓

各一錢五分

肉桂

去皮另燉四分

舉元煎補

治小便閉因氣虛下陷者提而升之

炙耆

黨參

米炒去蘆各二錢

白朮

淨一錢五分

升麻

炒五分

炙草

七分

水煎服後即以手探而吐之譬之滴水之器閉其上竅倒

懸之點滴不下去其上閉下竅即通

八味地黄湯熱補治腎火虛而閉用附桂蒸動腎氣以開關

熟地 五錢

淮山 炒

澤瀉 鹽水炒 茯苓 各二錢

萸肉

丹皮 各一錢五分

肉桂 去皮另燉 附子 製 一錢

治小便閉奇方

白菊花根 搗爛取汁半茶盅

用熱酒衝汁服或滾水加酒一小杯衝亦可。如倉猝無

白菊花根即別樣色亦宜取用

葱熨法 治小便不通

連根葱 三觔

慢火炒熟透加好燒酒二杯再炒用布分作二包輪流順熨臍下卽通如一時無葱則以食鹽炒熟熨之但不可太熱免傷皮膚

薰洗法

治小便不通

皂角 十兩

葱頭 二觔

玉不留行 十兩

煎濃湯一大盤令病人坐浸其中薰洗小腹下體久之熱氣下達壅滯自開而便通但便出時須聽其在盤內切不可起致使氣收復閉。通後要審症施治不可有誤

〇〇附小便不禁列方

兔絲子飲温 治小便不禁或遺或過多者

絲餅 三錢

牡蠣煨 一錢

北味碎 五分

益智仁 一錢鹽水炒

熟地 二錢

固脾丸熱 治小便不禁遺尿不覺

兔絲餅 三兩

桑螵蛸炙 五錢

戎鹽 一錢
茴香 一兩

製附子 五錢

研末酒和為丸每服三四十粒米飲下

縮泉飲温 治脾氣不足小便頻多

不印醫必要

卷三 附小便不禁

是

淮山炒三錢

烏藥錢五分

益智仁鹽水炒一錢

大便燥結

大便不通之症。不過陰結陽結二者而已。陽結者。或以飲食之火起於脾。或以酒色之火熾於腎。或以時令之火蓄於臟。凡因暴病及年壯氣實之人。乃有此症。此則宜清宜泄也。若陰結者。既無火症。又喜熱惡冷。其必下焦陽虛。則陽氣不行。陽氣不行。則不能傳送。或以下焦陰虛。則精血枯燥。精血枯燥。則腸臟乾枯。故治之者。陽虛陰結。則益其火。須用右歸飲。八味地黃湯之。

屬陰虛陰結者則壯其水宜用左歸飲六味地黃湯之屬均加
洗淡肉蓯蓉三二錢多效。○又有大便本無結燥或連日或旬
日欲解不解解下祇些須而不能通暢及其已解仍非乾硬此
總由七情勞倦色慾以致陽氣內虧不能化行亦陰結之類也
當服理中歸脾右歸八味地黃等湯。○凡虛弱之人雖旬日十
餘日不大便不必以為意倘病家醫家性急欲速遽用大黃等
藥通之多致誤事。

○大便燥結列方

小承氣湯峻劑大寒治陽結因邪有餘津液枯燥者。○須察果係實

熱始可服切勿輕用

大黃 二錢

枳實

厚朴 各一錢

如不下煎好藥加芒硝一二錢再煎服

四順清涼飲子

寒微峻

治陽結較前方畧緩

大黃 一錢五分

白芍 酒炒

當歸 各一錢五分

甘草 一錢

水煎

潤腸湯

寒補微峻

治陽結大便燥結不通

熟地 四錢

生地 二錢

當歸 三錢

火麻仁 一錢五分

大黃 一錢

甘草 一錢

肉蓯蓉丸 潤

治陰結或因發汗利小便致亡津液而大便不

通者。凡老人虛人亦宜。

肉蓯蓉 酒洗淡 四兩 沈香末 二錢

用火麻仁一兩搗爛和水取汁為丸如綠豈大每服二錢

米飲下

益血潤腸湯 兼補 治陰結凡虛弱及老人大便不通均宜

熟地 四錢 麻仁 二錢 枳殼 去瓢麵 炒一錢 肉蓯蓉 酒洗去甲 二錢

杏仁 杵 一錢 阿膠 蛤粉炒 一錢五分 當歸 三錢

加減左歸飲 潤補劑 治陰虛陰結而大便不通者

熟地 六錢

萸肉 二錢

淮山 二錢

肉蓯蓉 酒洗淡

當歸 各三錢

杞子 二錢

加減右歸飲熱補潤劑 治陽虛陰結而大便不通者

熟地 六錢

萸肉

淮山炒 各二錢

肉蓯蓉 酒洗淡 三錢

杞子 二錢

肉桂 去皮另煨四分

附子製 一錢

油當歸 三錢

蜜煎導方

治虛弱人大便秘結

白蜜 四兩

加皂角末四五分微火煎稍凝即用竹箸攪之勿令焦候

可為丸以手速捻成條上畧小下大約長二寸許麻油塗

納穀道內夾緊大便急極然後去之。或用線繫下截亦是善法

豬膽汁導方

治老人或虛弱人大便不通

大豬膽

一只加入好醋少許

用小竹管插入膽口線縛緊將油塗滑小竹管納穀道中以手捻膽汁灌下約一食頃當大便出宿食惡物甚效

小兒斗

內載各方乃係為飲乳小孩而設若四五歲以上藥味則宜畧重。惟大黃黃連附子乾姜肉桂等藥須斟酌。

小兒之病非外感風寒。即內傷飲食。及驚風吐瀉寒熱疳疔而

已蓋外感者必有外症。如發熱、頭痛、拘急、無汗。或因風搖擗之類是也。內傷者必有裏症。如吐瀉、腹痛、脹滿、驚疳、積聚之類是也。熱者必有熱症。如熱渴、燥煩、秘結、癰瘍之類是也。寒者必有寒症。如清冷、吐瀉、無熱、無煩、惡心、喜熱之類是也。四者之外尤當辨其虛實。有聲音之虛實。有形色之虛實。如體質強盛與柔弱者。有異聲。聲音雄壯與短怯者。有異形色。紅赤與青白者。有異觀其形色。審其病情。若果有實邪。果有火症。不得不暫爲治標。治標之法。及病則已。切不可妄爲攻擊。消耗小兒以柔嫩之體。血氣未充。臟腑甚脆。各受傷殘。卽痿敗而不可救。慎之。○小兒

疾痛痾瘕不能自言。旁人又不能代言。且以嬌嫩之體。易虛易實。藥一過分。變幻百出。卽危在頃刻矣。○凡小兒有病。自一二歲至十二三歲。全恃父母細心看理。方能知真。其虛實寒熱。庶不至誤。○有一等父母。姑息之深。飽煖失宜。果物恣食。或畏苦廢藥。或求速。雜投爲害。亦不淺。○小兒一切雜症。與大人同治。惟藥味較輕耳。至於大黃朴硝等藥。非萬不得已。切不可用。

發熱

凡小兒平日無病。陡然發熱。乃是外感風寒。外感之症。其至甚

速若熱由內生。其來必緩。察其絕無表症。而熱在臟腑。七竅三焦。三陰筋骨肌肉之間。卽是內熱之症。但熱有虛實。實熱者面赤氣粗。口燥唇瘡。作渴喜冷飲水。大小便難。或掀衣露體。煩啼暴叫。聲洪伸體而臥。睡不露睛。手足指熱。此其邪氣有餘。可清可散。虛熱者面色清白。氣怯神倦。恍惚軟弱。鼻微冷。不喜寒涼飲湯。安靜泄瀉多尿。嘔惡驚惕。上盛下泄。抱而喜按。乍涼乍溫。夜則虛汗。睡則露睛。屈體而臥。手足指冷。此其正氣不足。最宜調補。切不可妄用寒涼及消散剋伐等劑。○小兒發熱。服表散藥不退。如別無癰毒疔積。而耳後紅筋燦然。及眼如包淚。手

指尖冷者。必是痘疹。○飲食內傷。本無發熱。蓋飲食傷臟。不過為脹。為痛。為吐瀉。安得有肌表之症。惟傷風夾食者。有之。傷食久而成疳者。有之。其熱之來。亦有漸。不可不辨。

○發熱列方

紫蘇飲散

治傷風身體發熱。憎寒。噎涕。鼻塞。聲重。○凡陡然

發熱者。即宜服此方。或服鈎藤飲。最穩。

紫蘇

黨參去蘆飯蒸 桔梗八分 半夏製

防風 各七分

芫花 各一分

陳皮 五分

甘草 四分

加生薑一小片。紅棗一枚煎。○如服後尚有餘熱未清。摘

生竹葉二十片煎服

鈎藤飲散

治感冒兼肝風內動

黨參 去蘆

防風 各一錢

蟬退 去頭足

鈎藤 一錢五分

荆芥 六分

竹葉 十片

陳皮 四分

甘草 三分

如有痰加竹黃一錢一分

生犀散 涼

治心經風熱

柴胡

葛根 各一錢

犀角 鎊三分

地骨皮

白芍 酒炒

甘草 五分

各一錢

柴胡飲 涼補

治肌熱蒸熱積熱或汗後餘熱

黨參 去蘆

柴胡 各六分 白芍 酒炒

黃芩 各八分

當歸 一錢

甘草 四分

柴芩竹葉飲 涼

治壯熱往來

柴胡

麥冬 去心

黨參 去蘆

赤茯苓 各六分

黃芩 一錢

甘草 五分

加生竹葉五片煎

人參黃連飲 寒

治心經蘊結煩躁者

黨參 去蘆 一錢

生地

麥冬 去心 各七分

黃連 四分

竹葉 十片

炙草 三分

加生薑一小片煎

黃芩芍藥湯寒

治伏火熱症

白芍 酒炒

黃芩 各一錢

山梔 炒黑 六分

丹皮 七分

甘草 一錢

地骨皮飲 涼補

治晝靜夜熱

生地 一錢

沙參 八分

丹皮 六分

地骨皮

一錢五分

黨參 去蘆

白芍 酒炒 各七分

甘草 四分

四物加天麻鈎藤湯 兼補 治肝經血虛生風而熱

熟地 一錢

當歸

天麻

白芍 酒炒 各七分

川芎 五分

鈎藤 一錢

參耆四物湯 補

治汗後陰虛陽無所附而熱

黨參

去蘆飯 蒸八分

炙耆

當歸

白芍

酒炒 各七分

熟地

一錢

川芎 五分

四君子加味湯 補

治陽虛而熱者

黨參

去蘆米 炒

白朮 淨

炙耆

茯苓 各一錢

炙草

四分

加生薑一小片紅棗一枚煎

參桂飲 熱補

治隔陽熱症口燥舌焦者

熟地

二錢

黨參

去蘆米 炒七分

肉桂

去皮另 煨二分

澤瀉

鹽水炒

白芍 酒炒

淮山 各一錢

驚

小兒或感風寒。或積乳食。皆能生痰。痰積則化火。或受暑熱。亦能生火。失於清解。則痰隨火升。痰火上壅。閉其肺竅。則諸竅俱閉。其症壯熱痰壅。昏悶不醒。鼠視反張。搐搦顫動。牙關緊急。口中氣熱。頰赤唇紅。飲冷便秘。此因痰火鬱結。肝風內動而然。宜利火降痰。醒後當清熱養血。○肝主筋。肝失所養。則筋脈乾熱。故外作抽搐拘攣。而現青色。此是肝風內動。非外風也。不可誤。

治○血虛則肝風內動風動則肝火愈熾火熾則肺金虧肝邪愈盛若屢服祛風化痰瀉火辛散之劑便當認作脾虛血損急補脾土庶不至變慢脾之症○凡小兒服藥後餘藥須與乳母服乳母宜忌口

急驚列方

利火降痰湯

治急驚壯熱痰壅昏悶不醒搐搦顫動

柴胡 八分

黃芩 七分

陳皮 六分

天竹黃 一錢

鈎藤 二錢

連翹 一錢

木通 七分

細甘草 四分

清熱降痰湯

治同上

柴胡 一錢

連翹 八分

蟬退 去頭足 四只

鈎藤鈎 一錢五分

陳皮 五分

澤瀉 鹽水炒 六分

甘草 三分

加竹瀝水半酒杯沖藥服

生地丹參湯 涼

治急驚馬初愈清熱養血者

生地 一錢五分

丹參 一錢

青蒿 七分

白芍 酒炒 八分

丹皮 五分

桔梗 六分

竹葉 四分

甘草 三分

人參竹葉湯 涼補

治虛弱小兒急驚初愈

生黨參 去蘆 二錢

生竹葉 二十片

水煎

慢驚

小兒慢驚因作吐作瀉或吐瀉交作稍久則脾土虛弱肝木乘之其症氣微神緩昏睡露睛痰鳴氣促鼻煽乍發乍靜時涼時熱面部淡白瀉漸青色手足微搐無力神氣懶懶不掇乃脾虛生風無陽症也。此症多因病後或因誤用寒涼損傷脾胃所致然亦有小兒脾胃素弱不此病後及誤藥者總屬脾胃虛寒之症初起當用溫補加藿香煨薑冀見青色卽加木香或肉桂若手足漸冷唇舌痿白此將脫之候速用附子以回陽方可以

救。一切驅風逐痰之藥絲毫不得用。

○慢驚列方

加味異功散 溫補 治慢驚初起

黨參 去蘆飯 白朮 飯蒸 鈎藤 當歸 各一錢

陳皮 五分 茯苓 七分 炙草 四分

加煨薑一片煎。泄瀉則去當歸

加味六君子湯 熱補 治慢驚昏睡露睛痰鳴氣促

黨參 去蘆米 白朮 淨炒 半夏 製 乾薑 四分

陳皮 五分 茯苓 八分 炙草 四分

附子理中湯 補大熱

治慢驚手足漸冷唇舌痿白者

黨參 去蘆米炒

白朮 淨炒各一錢五分 附子 製七分 乾薑 微炒四分

炙草 五分

紅棗 一枚

附桂地黃湯 補大熱

治慢驚口燥舌焦陰症似陽者

熟地 三錢

白芍 酒炒一錢五分 附子 製六分 澤瀉 鹽水炒

黨參 去蘆米各一錢

肉桂 炒去皮另燉二分

驚啼

此症與驚風不同。與大驚猝恐者亦異。蓋小兒肝氣未充膽氣

不知驚必受 卷三 小兒科 驚啼

最怯凡耳聞驟聲目覩驟色雖非大驚猝恐亦能怖其神魂醒時受怖寐則驚惕或振動不寤或忽爾啼叫或微有煩熱皆神怯不安之症宜以安神養氣為主○驚啼多淚忽啼忽止者是驚惕啼叫無度聲長不揚者是腹痛

驚啼列方

硃砂安神丸寒

治寐中驚悸而煩熱者

生地

當歸

黃連

各一錢
姜汁炒

甘草五分

共研末米飲和丸如法實大硃砂為衣每服一丸滾水開

融灌下

參麥湯 微涼 治驚悸而微煩熱者

生黨參 去蘆 八分
麥冬 去心 六分
北味 三分

水煎

團參散 補 治心虛驚悸

黨參 去蘆 飯蒸 各二錢
當歸 各二錢

共研細末 每服一錢 用猪心一片 硃砂五厘 煎湯下

安神丸 補 治受驚嚇而驚啼者

黨參 去蘆 飯蒸
棗仁 炒
茯神 各七分
陳皮
白芍 酒炒
當歸 各五分
炙草 四分

不印醫必更 卷三 小兒科 腹脹腹痛

共研末薑汁和丸如芡實大每服一九白湯開下

腹脹腹瀉

小兒肚腹或痛或脹雖由食積與寒涼傷脾而然然使脾胃不
虛則腹中和煖運化以時何至為寒涼食積所傷故治之者當
以健脾煖胃為主。審無火症不得妄用涼藥無拒按堅實等症。
切不可妄用攻擊之藥慎之。

○腹脹腹痛列方

藿香飲和 治腹痛

黨參去蘆 飯蒸

藿香

各一錢

陳皮 五分

加生薑一小片煎

四君子加味湯

溫補

治寒滯腹痛

黨參

米炒 去蘆

白朮

淨炒 各一錢

藿香

木香 各六分

茯苓

七分

炙草

四分

煨薑 一片

加味六君子湯

補 去積

治腹有食積痛而兼脹者

黨參

去蘆 飯蒸

白朮

淨炒 各一錢

茯苓

七分

神麴

炒 八分

陳皮

四分

半夏

製 五分

木香

六分

炙草

三分

芍藥想實散

消 微補

治小兒肚腹膨脹或不時

作痛大人亦宜

不知醫必重

卷三

小兒科腹脹腹痛

三

白朮淨

四錢

枳實剉

二錢

蓮仁去心

陳皮各一錢

加炒香老米一錢其研細末量見大小或一錢或二錢
米飲調下白湯下亦可

疳症

小兒疳疾皆因病後脾胃虧損或用藥過傷不能傳化乳食內
亡津液虛火妄動或乳母六淫七情飲食起居失宜致兒為患
凡疳在內者目腫腹脹瀉痢青白體漸瘦弱疳在外者鼻下赤

爛頰採鼻耳。或肢體生瘡。其症不一。治亦多方。而有驗有不驗。竟有過服寒涼。尅伐之劑。而斃者。故不可不慎。○疔者乾也。因脾胃津液乾涸。而然。在小兒為疔疾。在大人則為癆瘵。宜兼調補脾胃為要。

○疔症列方

治疔疾藥

皮硝 三錢

苦杏仁 二錢

生梔子 七個

真頭道酒糟

一兩

葱頭 七個 每個約長一寸

白灰麩 三錢

大紅棗 七個 去核

共入石臼內搗爛成坭。用白布二塊。約寬五寸。將藥在布

上攤勻一貼肚臍一貼背後正對肚臍之處用帶細好貼
三日肉見青色卽愈如未見青再換藥一次無有不效

治疳奇方

羊尿脬

六七只吹脹陰乾

頂上汾酒一瓶

將汾酒灌入尿脬內用線紫緊掛小兒心口胃腕之間症
重者不過數時其酒自然消滅必須稱準方知滅否如滅
再換一個人酒掛上換至數個酒不消滅卽愈無汾酒用
好燒酒亦可

消疳散和

治疳積服

雄黃 二分

石決明

煨一錢

海螵蛸

煨去殼

正辰砂

一分

滑石 五分

蘆甘石

童便泡一日一夜燒透以能浮水為度五分

共研細末加冰片五厘再研量兒大小或三四分或五六

分用不落水鷄肝一副竹刀切破上開下連搽藥在內線

紮好加淘米水入砂灌煮熟連湯食盡神效之至

疹症

凡出疹皆由胎毒蘊於脾肺發於皮毛肌肉之間一時傳染大
小相似未有不因天行癘氣而發者總之君相二火燔灼大陰

脾肺受之。其爲症則有欬嗽噴嚏。面腫腮紅。目胞浮腫。眼淚汪
汪。鼻流清涕。呵欠悶煩。乍涼乍熱。手足稍冷。夜臥驚悸。或惡心
嘔噦。或以手搯面目唇鼻。是卽出疹之候。便宜用解毒散邪等
藥。不使毒留於中。庶無他患。○疹將出。其面必赤。中指冷而多
嗽。大熱五六日。而後遍身見紅點。此所以異於出痘與傷寒。○
疹與痘不同。痘本於肝腎。出自中下二焦。始終不妨於食。而全
賴水穀爲主。所以能食則吉。不能食則凶。治痘者不可不顧脾
腎。疹之毒則由表邪不解。而內犯大陰陽明。病在上中二焦。多
不能食。治疹者宜解散火邪。則自能食。○疹出至二三日。必兩

鼻孔俱乾。待收完毒。輕者清涕即來。當思飲食。不必服藥。如清涕來遲。不思飲食者。須要清肺解毒。必清涕復出。方可無慮。○疹與麻癩同類。疹則大者如蘇子。次者如芥子。小者如蠶子。而成粒成片者是也。麻則最細而碎。如蚊跡。模糊者是也。癩則無粒。惟紅紫成片。如雲如錦者是也。俱是火邪。治宜解散。○疹毒須假嗽多而散。故疹後旬日之內。尚宜有嗽。切不可見嗽而治。嗽至於泄瀉嘔吐腹痛。亦是疹毒使然。不得妄用補澀之藥。○宜謹避風寒。忌鷄魚炙煨鹽醋五辛併生果之物。以免逼毒入裏。○疹後瀉痢。須細審虛實。亦間有過服寒涼。而將成慢脾者。

當急治補不可執一不通以致不救

○疹症四忌

一忌初起即用寒涼

俟出後看症用藥

一忌妄用辛熱

一忌誤用補澀

一忌輩腥生冷風寒

○疹症列方

升麻葛根湯

散

微涼治疹症初起

升麻

葛根

白芍

酒炒

甘草

各一錢

如譫語狂亂調辰砂一分六一散一錢服○牛旁子黃芩

貝母知母桔梗麥冬連翹生地當歸防風荆芥柴胡桑白

皮等藥均可隨症加入

透邪煎散 微補 治疹症初熱疑似之時恐誤藥者

當歸

荆芥 各一錢

升麻 三分

白芍

酒炒 一錢五分

防風

甘草 各七分

如熱甚加柴胡一錢

加味瀉白散寒

治疹出之時欬嗽口乾心煩者

桑白皮 一錢

元參 七分

連翹 八分

地骨皮 一錢

天花粉 一錢

黃連 三分

甘草 四分

敗毒湯散 微補 治風寒外束逡巡不出或出而復沒者

生黨參 去蘆

防風

荆芥 各一錢 當歸

牛旁子

升麻 各七分
川芎 五分
甘草

四分

加薄荷六分煎

加味四物湯 涼補 治心血不足疹色淡白者

生地 酒炒透
白芍 酒炒

防風

當歸 各一錢

川芎 六分

炙草 五分

涼血補陰湯 涼

治疹色帶紫或出大甚者

生地黃 一錢

白芍 酒炒

連翹 各七分

紅花 六分

牛旁子

黃芩

當歸

乾葛 各八分

導赤散 涼

治疹症譫語潮閉

生地 二錢

木通 一錢

竹葉 二十片 甘草 六分

加味甘桔湯 涼

治疹症火毒上薰而咽喉乾痛

牛旁子

桔梗

連翹

甘草

各一錢

水煎緩緩嚥之

解毒合白虎湯 大寒

治疹症煩躁大渴

生石膏 一錢

知母 七分

黃連 四分

連翹 七分

金銀花 一錢

甘草 五分

加粳米一撮煎

加味犀角地黄湯 大寒

治疹症吐血衄血

生地

白芍 酒炒

山梔 仁炒碎

犀角

鎊各一錢 煎

丹皮 七分

如小便赤加木通一錢

加味四苓散 涼

治疹症泄瀉

白朮 土炒

茯苓

澤瀉 鹽水炒

金銀花 各一錢

猪苓 七分

如小便如米泔水加車前木通各一錢

黃芩湯 涼

治火邪內逼下焦而痢者

白芍

酒炒一錢五分

黃芩 一錢

炙草 七分

加大棗一枚煎。如火逼上焦而吐或吐痢

並作者俱加

半夏一錢五分 生薑一片

大柴胡湯 寒

峻劑

治疹症大便秘結發熱身痛者

柴胡

半夏製

白芍酒炒

黃芩各一錢

枳實

麵煨去
瓢六分

大黃八分

生薑一片

紅棗一枚

二母散寒

治疹

後嗽甚者

貝母

去心童
便洗

知母各二錢

乾薑一片

共研末每服一錢白湯下

痘症

近日有種洋痘之法最為穩妥但恐有未種而自出者方法亦不可不為之備。○。○痘由胎毒內藏而復因時氣外觸其毒

乃發。始終皆賴乎血氣。若血氣充暢，則易出易收。氣血不足，則變症不一。治痘者，必要先顧血氣。蓋氣主形，以起脹。血主色，以灌漿。凡爲白爲陷，爲灰色爲不起，發爲頂有孔爲出水，爲痛爲癢，爲浮腫爲痘殼，爲不靨不落爲坼表不固，爲膚腠不通等症。皆氣之病也。至如爲紫黑爲乾枯，爲無血爲無膿，爲黑陷黑靨，爲腫痛牙疔，爲疔癰癩疹，爲津液不達，爲痘後餘毒，皆血之病也。氣與血相需，氣至而血不隨，雖起發而灌必不周。血至而氣不至，雖潤澤而毒終不透。○表熱者，肌膚大熱，根窠紅紫，頂赤發癰，頭面紅腫，紫黑焦枯，癰腫疔毒，痛甚，皆火在肌表之症。治

宜散血解毒。裏熱者煩躁狂言口乾大渴咽腫喉痛內熱自汗。小便赤澀大便秘結衄血溺血皆火在臟腑之症。治宜清熱解。毒。表寒者不起發不紅活根窠淡白身涼癢癩倒陷乾枯皆肌。表無陽之症。治宜補陽。溫表裏寒者爲吐瀉爲嘔惡爲腹脹爲。腹痛爲吞酸爲不欲食爲寒戰咬牙惡寒喜煖爲小便清長大。便不實完穀不化。皆臟腑無陽之症。治宜溫中補陽。○當腫不。腫者必其元氣不足。當消不消者必其毒氣有餘。○治痘宜先。顧脾胃能食者吉。不泄瀉者吉。且須培補氣血畧兼發散始合。○看心窩有紅色耳後有紅筋目中含淚身體發熱手指亦皆。

熱惟中指男左女右獨寒便是出痘若傷寒症則中指獨熱甚
驗○如熱盛血虛者首尾俱不可用白朮半夏之燥悍及升麻
之提氣上冲○要謹避風寒忌葷腥生冷生果葱蒜鷄鴨蛋猪
肉茶水等物○痘疹之候頭常欲涼足常欲溫若頭溫足冷者
多不治此亦宜辨

○痘症四忌

一忌清熱敗毒

一忌剋伐氣血

一忌妄投醫藥

一忌吞服醫家小丸

痘症四宜

一宜補氣

一宜補脾腎

一宜補血

一宜察虛實

痘症列方

柴歸飲散

治痘初時發熱未退無論是痘是邪疑似之間

當歸

白芍

酒炒

各一錢 防風

荆芥穗

各八分

柴胡 七分

甘草 五分

加生薑一片煎。血熱加生地一錢。陰虛加熟地一錢五分。氣虛加黨參一錢五分。虛寒加炮薑六分。肉桂三分。火盛加黃芩八分。熱渴加乾葛一錢五分。腹

痛加木香四分嘔吐加陳皮五分炮薑四分○如陽明實

熱邪盛者初起用升麻葛根湯方在疹症內

六物煎補 治痘症血氣不充隨症加減甚效○並治孕婦氣

血俱虛等症

黨參去蘆米炒 白芍酒炒 當歸各一錢 熟地一錢五分

川芎三分 炙草六分

如發熱不退或痘未出之先宜加蘇葉一錢防風八分○

頭痛加蔓荊子七分川芎三分○咽痛加桔梗八分連翹

七分○不起發不灌漿或灌而漿薄加糯米五十粒川芎

六分肉桂三分人乳半酒杯好酒少許以助營氣○虛寒
癢塌不起加炒川山甲六分○紅紫血熱不起加紫草七
分或犀角八分○脾氣滯者加陳皮六分山楂八分○胃
氣虛寒多嘔者加炒乾薑四分或加丁香三分○腹痛兼
滯者加木香五分陳皮四分○表虛氣陷不起或多汗者
加酒炒黃耆一錢○氣血兩虛未起未灌而先癢者加肉
桂三分白芷六分○元氣大虛寒戰咬牙泄瀉者去白芍
加黃耆一錢五分製附子六分乾薑四分或再加肉桂三
分生薑一小片

六氣煎補微熱治痘症氣虛癢塌倒陷寒戰咬牙。併治男婦陽

氣虛寒等病

黃耆炙

黨參去蘆米炒

肉桂去皮另白朮淨

各一錢

當歸一錢

炙草六分

如泄瀉去當歸加肉蔻霜五分茯苓八分其餘加減照前

六物煎

涼血養營煎寒補

治痘血虛血熱地紅熱渴或色燥不起及便

結溺亦陽盛陰虛等症

生地

白芍酒炒

當歸

地骨皮各一錢

黃芩 八分

紫草 七分

紅花 六分

生甘草 五分

如渴加花粉一錢。肌熱無汗加紫蘇一錢荆芥七分。熱毒甚者加牛旁子七分連翹一錢木通八分。血熱毒不透者加犀角八分。

加味四物湯寒補陰治痘症熱毒熾盛紫黑乾枯煩熱便結純陽

等症

生地

黃芩

白芍 酒炒

當歸

連翹 各一錢

川芎 五分

紫草 八分

木通 八分

如渴加花粉麥冬各一錢。陽明熱甚頭面牙齦腫痛者

加生石糕一錢五分知母一錢○大腸乾結臍腹實脹者
加大黃一錢○血熱妄行者加犀角一錢童便半酒杯冲
服○小水熱閉者加山梔車前各一錢○兼表熱者加蘇
葉荆芥各一錢

連翹升麻湯

涼
治痘散毒清火

連翹一錢

葛根

白芍酒炒

桔梗各七分

升麻六分

薄荷一分

甘草七分

加竹葉十片燈心十條煎

加味甘桔湯

涼
治痘症肺熱咽喉腫痛聲不清者

桔梗 一錢

甘草 七分

柯子皮 三分

牛蒡子 炒 六分

連翹 五分

薄荷 一分

托裏十補散

溫補

調氣補血內托痘毒五日後必消之方也亦

治一切癰疽

高麗參 去蘆 米炒

黃耆 酒炒

當歸 各一錢 川芎

川厚朴

防風

桔梗

白芷

炙甘草 各五分

肉桂 去皮 吳煨 三分

共為細末每服一錢或二錢木香湯下

保元湯 補

治虛弱人出痘

炙著

黨參 米拌炒去蘆 炙草 六分
各一錢

如痘灰白色或頂陷者加酒炒黃耆當歸各一錢○癩則

去當歸加酒炒白芍一錢五分

活血湯補 養營起痘

當歸 一錢
川芎 四分
紅花 二分

水煎服

鹿著催漿湯補 治痘不起漿

炙著 一錢 五分
鹿茸 酥炙 七分
香信 一錢
川山甲 炒 五分

水煎

丙托散補

治痘雖起發以手按之水漿即出者

黃薯 酒炒一分
黨參 米炒去蘆一錢
川芎 五分
丁香 二分

糯米 五十粒
炙草 五分

快班越婢湯 溫補
治痘手足不起發

黃薯 酒炒一分
白芍 酒炒一錢
桂枝 六分
防風 七分

炙草 四分
生薑 一片
紅棗 一枚

蟬退散補 微散
治痘瘡虛陷不起

當歸 六分
川芎 三分
防風
荆芥穗

升麻 淡蜜炙
薄荷 各二分
蟬退 去頭足四只
高麗參 米拌炒六分

不知醫必要

卷三 小兒科痘症

七

白芍 酒炒 五分

炙草 三分

加味保元湯

溫補

治痘瘡漿清脚淡倒靨

炙薯

黨參 去蘆米 炒 白芍 酒炒

扁豆 炒 碎

當歸 各一錢

肉桂 去皮另 燉三分 木香 四分

炙草 五分

紫草飲 補

治痘瘡黑陷氣血虛弱不起

黃薯 酒炒 一錢

紫草

炙草 各一錢

加糯米一百粒煎

加味四聖飲

兼補

治痘黑陷倒靨

黨參 米拌炒 去蘆

黃薯 酒炒 各一錢 紫草 七分

木通 八分

一 蠅退去頭足六只 川芎

木香

多草各六分

加糯米五十粒煎

起痘奇方

治痘不起或倒靨或灰白者

童子糞

要乾結者

用新瓦煨透存性每一兩入冰片一分研勻少則服五分

多則服一錢蜜水調下入藥沖服亦可

百花膏

治痘燥痂皮濺起作痛或痂欲落不落者

白蜜

一杯

小酒

滑石

一錢

研細末

畧用湯和勻以鵝翎染藥輕掃痛處則易落無痕

固肌湯補 治痘發表太過以致肌肉不密痘痂久粘不落

炙薯 八分 當歸 酒洗七分 蟬退 去頭足四只 高麗參 去蘆米炒六分

糯米 一錢 炙草 五分

催漿飲補 治空倉痘外雖起發而內無膿漿者

黃薯 酒炒八分 川芎 白芷 牛子 各五分

肉桂 去皮另燉三分 當歸 一錢 鹿茸 酥炙 生地 酒炒各一錢

白芍 七分 山甲 炒三分

水煎服 二劑即去山甲

補氣健脾湯 溫補 治漏痘上有孔者

高麗參去蘆米炒八分 黃耆酒炒八分 川芎 白芷 各五分

白扁豆炒杵一錢 丁香二分 肉桂去皮另淮山炒七分

炙甘草 四分

加龍眼肉四分 去心炒蓮仁七分

寶聚飲補 治痘色光亮全無膿血者。看其中有起脹極大

者刺去其水

高麗參去蘆米炒 黃耆酒炒 鹿茸酥炙當歸 各八分

白扁豆炒杵 淮山炒 白朮飯蒸 白芷 各七分 五分

炙草 四分 山楂 六分 黃耆 二十粒

○治爛痘列方

敗草散

治痘癢抓搔已爛膿血淋漓者

爛草 蓋屋蓋墻多年者或野外自爛者尤佳

研極細末摻之如遍身俱抓爛者須多摻席上令兒坐臥其上即愈

白龍散

治爛痘及抓破者

乾黃牛糞 在風露中日久者

煨成灰取中心白者爲末入漚絹囊內於爛處撲之

○痘後日疾列方

决明散

治痘後眼生翳障

石决明 煨

穀精草 各二錢

共研細末每用一錢以蒸熟猪肝蘸食

臭虫方

治痘眼發紅將上膜或已有白點者

臭虫血

射入眼內即愈

或用蛙膽調臭虫血點入更佳

○痘後癰列方

三豈散

治痘後癰初起者

綠豈

黑豈

赤小豈

各四錢

共研細末醋調勻時時塗之自愈

黃荳散

治荳後癰

黃荳

炒
八錢

研細末熟水和勻塗之或炒黑研末芝麻油調塗亦佳。

一方用赤小荳研末調雞蛋清塗之

○痘疔列方

此疔能開痘毒凡未齊則不出現既齊則不

起發行漿則必致倒陷看痘中有紫黑乾硬暴脹獨大者

卽是須急治之○一見此疔卽以銀針挑破吸盡紫血乃

以藥塗之

拔毒膏

治痘疔

蒲公英 二兩

水煎熬膏，置磁器內，放水，中一日一夜冷。

去火氣，俟挑破痘疔，吸盡紫血，卽以此膏塗之。○又方：雄黃一錢，紫草三錢，研細末，如法挑吸，用臘脂調塗之。

不知醫必要卷三終

楊鴻文堂刊

不知醫必要卷三

小兒科痘症

七

古今圖書集成

卷之三

