


得
効
方



十三

世醫得效方卷第十二

小方科

瘰癧毒

(平血飲)治風熱積毒聚成發於頭面手足熱者如
胭脂色其熱如火輕輕著手痛不可忍加紫草煎
與(犀角消毒飲)相間服赤瘰癧紫萍瘰癧並治壯
熱煩渴甚加黃芩麥門冬去心朴硝各半錢方見後

腫科諸瘡類

(內托散)

紅內消

當歸

茹片

甘草節

羌活

黃芩

各半兩

麝香

半錢

右為末每服二錢茄蒂煎湯調成或生地黃亦



可

〔敗毒散〕治癰毒初發如白梅樣遊走遍體燥悶腹脹焦啼每服二錢水一盞生薑二片紫草少許煎溫服方見大方科傷寒類

通治〔平血飲〕與〔敗毒散〕合和生薑薄荷蟬退去足防風去細切煎渴加天花粉少許

〔又方〕角癰遊走不定炊然赤腫疼痛用藥角歸手足上為妙後取碎

寒水石 石膏 黃連 黃柏各一兩

右為末水調刷

〔又方〕青黛土朱為末井水調入蜜敷角亦可

〔又方〕黃丹不拘多少磨刀水調刷

〔又方〕癰毒腫痛如火用大黃朴硝為末調塗腫處立效水苔生地黃菘菜浮萍梔子皆可研爛水

調傳

〔洗方〕用防風酸車草赤豆竈心土煎水洗

〔又方〕洗角後用〔小驚口〕〔壓邪〕〔大驚口〕〔鎮驚口〕方見前

〔蟻針法〕取碎用水蟻數條以青苔蓋覆或濕紙亦可去血即消未消再用癰毒滿身徧黑入腹入

陰難治

諸疔

〔大安神口〕治心疔面黃臉赤煩滿壯熱心燥口瘡

虛驚方見前

〔益黃散〕治脾疔體黃肚大愛喫泥土脹滿氣麓疔

下酸臭後方見

〔生熟地黄湯〕治肝疳搖頭揉目白膜遮睛流汗合面而卧肉色青黃髮立筋青腦熱羸瘦

生乾地黄洗

熟地黄

洗淨蒸各半兩

川芎

赤茯苓

枳殼

煨去穢

杏仁

去皮

川黃連去鬚

半夏麩

天麻

地骨皮

甘草炙

當歸

各半二錢

右剉散每服二錢生薑二片黑豆十五粒水煎

臨卧温服

〔清肺湯〕治肺疳咳嗽氣逆多啼揉鼻咬甲寒熱

桑白皮

炒半兩

紫蘇

北前胡

黃芩

當歸尾去

天門冬心去

連翹

防風

赤茯苓

北梗

生乾地黄

甘草炙各一分

右剉散每服二錢水一盞煎温服不拘候

〔地黄口〕治腎疳極瘦身有瘡疥寒熱作時頭極熱

脚冷如水

生乾地黄

八錢

乾山藥

山茱萸

各四錢

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

去皮各三錢

右為末煉蜜口梧桐子大每用一二口化開服

〔胡黃連口〕治熱疳潮熱如火大便澀

胡黃連

川黃連

各半兩

朱砂

一錢半別研

右二連為末和朱砂入猪膽內繫定虛懸於鈹

中煮一炊久取出研蘆薈青黛乾各二錢半去

足蝦蟇灰二錢麝少許粳米飯口麻子大每服
十口食後米飲下

〔五福化毒丹〕治熱疔肌肉黃瘦雀目夜不見物陳
粟米飲化下前方見

〔至聖口〕治冷疔時時泄瀉虛汗不止

丁香

丁香皮各一錢

木香

紫厚朴

製見前

史君子肉

橘紅

肉豆蔻

濕紙略煨各二錢

右為末神麩糊口麻子大每七口食前米飲下

〔銅青散〕治走馬疔口内生瘡牙齦潰爛齒黑欲脫
或出血臭氣丈夫婦人同

川白芷

半兩生

馬牙硝一錢

銅青一分

麝香

一字

右為末乾傅口角及擦齒上妙仍服〔蟾酥口〕效

方見後

〔下虫口〕治蛔疔因食肉太早或腸胃停蓄肥膩為
蛔其證多啼嘔吐清沫腹痛脹滿唇口紫黑腸頭
及齒痒

新白苦練根皮

酒浸焙

綠色貫衆

木香

桃仁

浸去皮炒

蕪荑

焙各二錢

雞心檳榔

二錢

鶴虱

炒一錢

輕粉

半錢

乾蝦蟇

炙焦三錢

史君子

略煨取肉五十箇

右為末飛羅麩糊口麻子大每二十口天明清
肉汁下內加當歸川黃連各二錢半治脊疔無

疢勞可擇用

〔大蘆薈〕治脊疢虫蝕脊脊身熱羸黃煩熱下痢脊骨如鋸齒十指背瘡頻啣指甲

蘆薈

蕪荑

木香

青黛乾

檳榔

川黃連淨各一分

蟬退二十枚

麝少許

胡黃連兩半

右為末猪膽二箇取汁浸糕口麻子大每服二十口米飲下

〔龍腦〕治腦疢頭皮光急滿頭餅瘡腦熱髮結身汗顛腫顛高

龍膽草

川升麻

苦練根皮焙

防風

赤茯苓

蘆薈

油髮灰

青黛乾

黃連淨各三錢

〔右為末猪膽汁浸糕糊口麻子大每二十口薄荷紫蘇泡湯下食後仍以蘆薈末入鼻

〔保童〕治乾疢瘦悴少血舌乾目睛不轉乾啼身熱手足清冷皮燥大便乾結搭口癡眼乾渴

黃連鬚去

白鱈頭

草龍膽去蘆

青橘皮去穢

五倍子

蟾頭

夜明沙炒

苦練根

雄黃

麝香

青黛

天漿子炒

熊膽

蘆薈

胡黃連已上各一分

右為末研令勻糯米糊和口麻子大一歲兒每服一口不計時候米飲下日進三服尤佳一方

有乾蝸牛一分微炒

〔白朮散〕又名〔清寧散〕治疳渴煩燥引水乳食不進夜則渴甚加烏梅陳米疳瀉停積宿滯水穀不聚頻泄不效加肉豆蔻訶子前方見

〔木香口〕治疳痢冷熱不調五色雜下裏急外重

黃連淨三錢

木香

紫厚朴去麩皮薑汁炒

縮砂仁

夜明沙隔紙炒各二錢

訶子肉炒一錢

右為末粳米飯口麻子大每服十五口乾艾葉

生薑煎湯食前溫下

〔揭口子〕治疳腫脹困虛中有積腹肚緊脹頭面虛浮

蘿蔔子炒一兩

陳皮

青皮

好檳榔

黑牽牛取仁半生半炒

北五靈脂

赤茯苓

蓬莪朮煨各半兩

木香二錢

右為末飛羅麩糊口菜豆大每服十五口紫蘇

桑白皮煎湯下

〔黃耆湯〕治疳癆嗽喘不定虛汗骨蒸渴而復瀉乳食遲進

黃耆炙

當歸

川芎

白芍藥

生乾地黄

蝦蟇去足炙焦

鱉甲醋炙焦各三錢

人參

白茯苓

橘皮

半夏麴

北柴胡

史君子煨

甘草各二錢

右剉散每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎食前服

〔驚血口〕治疔癩

人參兩半 川芎 蕪荑 北柴胡各一兩

史君子二箇 胡黃連 川黃連各二兩

右用驚血一盞吳茱萸一兩拌和二連淹一宿次早炒乾透出茱萸并血只用二連夾餘藥杵末粟米粉糊口麻子大每服二十口食前熟水下

〔蚶蚞口〕治腦後項邊有核如癰瘰狀按之轉動軟而不疼名無辜疔毒無治諸疔一服虛熱退二服渴止三服瀉痢住

蟾蜍一枚夏月溝渠中取腹大一

右取糞虫一杓置桶中以尿浸之桶上要乾不與虫走却將蟾蜍殺之頓在虫中任與虫食一日夜次以新布袋盡包繫定置之急浸一宿取出瓦上焙為末入麝一字瘦飯揉口麻子大每服二三十口米飲下

一方白蕪荑黃連胡黃連青黛各半兩蚶蚞一箇只用酒浸炙去骨為末麪糊口粟米大每服三十口食後臨卧米飲下日三服立效

〔又方〕治無辜疔

右以夜明沙炒為末入諸飲食中與之

通治〔蟾酥口〕治諸疔殺虫止腹痛退虛熱大效或

因病後通泄太過成疳

蟾酥一箇酥油

胡黃連

宣連去鬚

龍膽草

陳皮

川練子去核

木香

史君子去殼

蕪荑各一兩

麝半錢或不入

巴豆二七粒去油

茴香炒一兩

右為末猪膽汁口或糊口青黛為衣常服蘇湯

下

肥兒口治諸疳多因關乳喫食太早或因久患臟

腑胃虛虫動日漸羸瘦腹大不能行髮豎發熱無

精神

黃連

神麴各一兩

大麥蘖炒半兩

木香二錢

檳榔二箇不見火

史君子肉

肉豆蔻麴裹煨各半兩

右為末麴糊口蘿蔔子大每服三二十口量兒

歲數如減熟水吞下

六神湯捉疳止瀉

丁香

木香

肉豆蔻去殼各等

兩三味用麴裹同入慢灰火煨令麴熟為度

蘆薈各一兩細研入

右為末棗肉口麻子大每服五口至七口温米

飲下乳食前服

五疹口治疳傷肚大

青皮不去白炒焦黃

乾薑燒帶存性

北五靈脂

蓬莪朮各一兩

右為末搜和秤藥末一兩用肥巴豆肉去油秤一錢研細拌和粳米飯口麻子大每三五口米正湯不飢飽時下

〔小黃連阿膠口〕治諸疔作熱頻瀉每服二十口米飲下方見大方科咳嗽類

〔疔啞不能發聲方〕

右以〔肥兒口〕每服十五口用〔蘇合香口〕一粒入朱砂五靈脂各少許石菖蒲煎湯調開下方見蘇合香口大方科中氣類

〔猪肚連黃元〕治疔瘡自孩提至弱冠潮熱發瘡乃疔氣使然疔虫食其肌膚空虛疔熱流注遍身熱瘡發歇無已

〔蟾酥口〕相間服為妙

雄猪肚一具淨洗 鷹爪黃連去鬚淨

右剉作小截少水和納猪肚中用線縫密頓在五升粳米上蒸十分爛取放白中入些蒸飯擣千餘杵粘實得所衆手捏口如小菜豆大每服二十口米飲下童子倍之冠者又倍之仍以川芎生地黄茯苓神與之調血清心熱多者間服〔生犀散〕方見前二十歲以上潮熱發瘡是為虛

勞皆一種病也用藥同前凡兒童諸病不出於疔則出於熱熱則生痰常須識此矣

〔洗方〕右用大腹皮苦參川白芷為剉散煎湯淋洗

妙

〔又方〕甘草黃柏馬鞭草帶鬚葱

〔用訶子連肉核燒灰

瘡上效

〔傅藥〕治疔後虛熱小腹腫

右以韭菜地龍糞煨為末出火毒清油調傅

〔針法〕治無辜疔腦後項邊有核如彈按之轉動軟

而不疼其間有虫如米粉不速破之則虫隨熱

氣流散淫蝕臟腑以致肢體作癰瘡便利膿血

壯熱羸瘦頭露骨高皆因氣血虛憊所致用針

刺破以膏藥貼則愈或因澣濯兒衣露於簷下

為雌鳥落羽所污兒著此衣出入皮毛亦致斯

疾凡曬兒衣須微火烘之

丁奚哺露

〔十全丹〕治小兒手足極細項小骨高尻削體痿腹

大臍突號哭曾陷或生穀癥是名丁奚虛熱往來

頭骨分開翻食吐蟲煩渴嘔噦是為哺露二者皆

因脾胃久虛不能消化水穀以榮血氣致肌肉銷

鑠腎氣不足復為風冷所傷柴骨枯露亦有胎中

受毒臟腑少血致之此皆無辜種類之疾並難治

宜服

青皮去核

陳皮去白

蓬朮煨

川芎

北五靈脂

白豆蔻仁

鷄心檳榔

蘆薈各半

木香

史君子肉焙

蝦蟇灰各三

右為末猪膽汁浸糕糊口麻子大每服二十口
米飲下有熱薄荷湯下

魘病

〔龍膽湯〕治孕婦被惡祟導其腹中令兒病也其證
下利寒熱去來毫毛鬢髮不悅懌及治婦人有兒
未能行時復有孕使兒飲此乳亦作此病

龍膽草

北柴胡

去蘆及苗

黃芩

桔梗

釣藤皮

芍藥

甘草

茯苓

各二錢半

蛻螻

大黃

一兩濕紙裹煨

右剉散以水一升煮取五合為一劑十歲以下
小兒皆可服若兒生一日至七日分一合為三

服八日至十五日分一合半為三服十六日至
二十日分二合為三服二十日至三十日四十
日盡以五合為三服皆以得下即止此劑為出
腹嬰兒所作若日月長大者以次依此為例必
知客忤及有鬼氣可加人參當歸各二錢半一
百日兒加一錢一字二百日兒加二錢半一歲
兒加半兩餘准此

積滯

〔葱湯〕治積神效

巴豆

三十五粒用水浸一宿五更初去水後去皮殼心膜不去油另研

輕粉

半錢

滑石

五錢

鷹糞

五錢

右為末研飯為口如粟米大周歲以下每用三

口以上四口未效再加口數膈上有涎或吐亦無妨如有虫用苦練皮少許甘草二寸煎湯五更初先將化虫藥服了後用此取下春季燈心湯下夏季蘇鹽湯下秋季蘇湯冬季葱白湯下初生兒以一粒放口中乳汁下

消積口治乳積吐乳瀉乳其氣酸臭此由啼哭未已乳與兒停滯不化得之

丁香十五箇

烏梅五箇

巴豆十箇去油殼

縮砂仁二十箇

右為末麪糊口黍米大每服七口米飲下

化鐵丹治食積肚硬帶熱渴瀉或嘔皆因飲食無度多食過飽飽後即睡得之

烏梅八箇取肉

巴豆十六粒去殼

青皮五錢去穢

陳皮五錢去白

右為末米糊口粟米大每服七口米飲下化鉄亦消

盧氏感應口紅口子治食積面目腫黃肚熱脹痛覆睡多困酷啼不食或大腸乾澁小便如泔或便利無禁糞白酸臭服之大效方見大方科諸積及痰瘡類

蘇感口治氣積腹痛啼叫利如蟹渤皆因觸忤其

氣榮衛不和淹延日久得之蘇合香口感應口各等分和口如粟米大紫蘇湯下三十口立效方見大方

科中氣 秘澁類

異香散取積後調理

石蓮肉 一兩

蓬莪朮

益智仁

京三稜

甘草 各六兩

青皮 去穢

陳皮 去白各三兩

厚朴 薑汁炒二兩

右剉散每服二錢水一盞生薑二片棗一枚鹽

少許煎通口服鹽湯點鹽酒調亦可不拘時服

〔縮砂香附湯〕平胃散合和滋氣和胃消積每服一

錢蘇鹽湯下多服尤妙 方見大方料

殺虫

〔史君餅〕治因喫食麤肥甘生熱肌瘦體虛口吐清

涎腹中絞痛口鼻中出黑色虫不治

史君子 四十箇去殼

雷丸 兩半

定粉 二分

輕粉 半錢

青箱子

鶴虱 一分

右為末用鷄鴨卵和蒸為餅先將此藥隔日夜

五更服

〔史君子湯〕每服二錢苦練根少許煎湯調服近病

亦效 方見前

〔化蟲口〕

鶴虱 去土

胡粉

檳榔

白礬 半生半枯

苦練根皮 各半兩

蕪荑

黃連

酸石榴皮 各一分

右為末以糊口如麻子大一歲兒三口漿水入

香油三五滴下其虫少者化為水大者自下加

雷丸或用猪肉湯下

〔碧金散〕治蛔虫寸白蟲

苦練根

兩一

猪牙皂角

燒參銀灰

鶴虱

擯榔

兩各半

史君子仁

半兩各搗羅為末

好青黛

兩半

麝香

分一

右同研勻每服一字用淡猪肉湯食前調下
〔安蟲散〕治因喫物麤肌膚消瘦虫生腹中極痛不可忍者

真胡粉

炒

擯榔

川練子

炒去核

鶴虱

炒各兩二

白礬

二錢半生用

右為末米飲調痛時服空心未洗面前服或口如麻子大小兒多有諸虫臟腑虛弱食肥甘則動腹痛叫哭倒身撲手嘔清水涎沫面色青黃飲食不進不生肌膚或寒熱或沉沉嘿嘿其虫

不療相生不已長一尺則能害人一歲兒五口

温漿水入清油一二點打勻温米飲下其虫小

者化為水大者自下

嘔吐

驚吐〔安神口〕治因驚吐妳面色青藿香煎湯化開

服方見前

〔硫黃散〕治吐并驚吐

硫黃

兩半

水銀

分一

右同研無星黑色量大小一字至一錢匕水小

點以指緩緩磨濕添湯調方可服吐立止兼治

大人反胃妙

冷吐〔益黃散〕治脾胃傷冷作吐每服二錢水一盞

生薑紅棗煎溫服後方見白朮散亦效前方見

熱吐(通心飲)治壅熱久傷臟腑作渴發吐每服二

錢燈心藿香葉煎溫服前方見

涎吐(半夏口)治胸膈停痰作吐方見嘔吐類下一方

單用半夏泡七次為末薑湯下效亦能止瀉有熱

者(人參湯)即(小柴胡湯)方見傷寒類

積吐(益黃散)治脾胃停食不化所吐酸臭生薑烏

梅煎服後方見消積口前方見

風吐(大青膏)治胃脘生風頻吐用黃荊葉一皮煎

湯化開兼服(白朮散)前方見又方風熱吐朴硝白滑

石為末每服半錢漿水半盞清油半兩調勻服必

定

吐乳

(理中湯)治吐乳兼下痢不止雪糕口粟米大米飲

下二十口方見嘔吐類

(掌中口)治喫物喫乳便吐下水乳不得飲食不下

者

白豆蔻十四箇甘草半兩半縮砂十四箇

右為末逐旋安掌中與他乾噉牙兒乾糝口中

(丁香散)治吐乳傷食

丁香 石蓮肉

批把葉生薑自然汁塗

右為末每服一錢米飲調下

(藿香正氣散)治外感風寒濕作嘔每服二錢水一

盞生薑二片木瓜一片煎服效方見大方科傷寒類

濕熱不時暴嘔香葛湯生薑二片藿香少許煎方見

大方科傷寒類

香蘇散治生時洗上牽延或嘔加半夏湯洗葱白

生薑各少許煎方見大方科傷寒類

交精吐妳四君子湯加藿香木瓜煎湯服又治經

年吐妳不停或成片段眼慢糞多穢氣有筋膜廼

父母交感時喫乳所致益黃散方見後保童口方見前

兼用

吐乳不止恐成脾風方

右以靈砂一粒青州白口子三粒同研末米飲

調下量大小與之吐久虛甚者對用靈砂親試

有效靈砂大方科痼冷類青州白口子方見風科通治類

又方蓮心二十一箇香附子三箇吳茱萸七箇丁

香七箇一處新瓦上炒黃研為末以乳汁調付

乳頭上令兒吮食屢用有驗

霍亂

總說吐瀉起於脾胃不調陰陽不順清濁相干或

感風冷之氣傷於脾胃胃氣不調故嘔不食脾

氣虛弱臟腑不調故泄瀉有脾虛傷食外感風

冷故先吐而後瀉有胃熱嘔吐發瀉夏月嘔吐

發瀉為霍亂因胃熱引飲停留胃氣吐瀉發熱

用香薷散大凡吐瀉不可便下止吐瀉藥先調

脾氣秋冬之間多是傷食生冷過度外感風寒

多瀉發熱當用醒脾散但吐不瀉因傷粘物滯脾有胃熱嘔吐渴水不休有胃冷嘔吐面青白四肢逆冷大凡吐瀉先調脾氣此大法也

白朮散治胃氣不和脾氣虛弱發為吐下每服二錢水一盞生薑二片烏梅半箇紅棗一枚蘇梗三寸煎溫服前方見

五苓散治陰陽不調或感風邪暑毒霍亂嘔瀉不止每服二錢蘇葉木瓜食鹽湯調服未效加生薑自然汁小許服

又方用生薑自然汁為口麻子大量兒大小米飲下效

六和湯治夏秋冬暑冷相搏嘔泄不止每服二錢

水一盞生薑二片木瓜一片煎溫服已上方並見大方科傷暑類

香薷散治傷暑伏熱躁渴昏悶頭目昏眩胃膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發

霍亂吐利轉筋宜服方見大方科傷暑類量大小與服

來復丹治陰陽不和脾胃虛損吐下不止凡吐瀉

五月內九分下一分補八月內九分補而一分下

有熱者先用補脾後退熱竹葉石膏湯主之次用

水銀硫黃末主之生薑水調下但霍亂一證吐利

交作蓋由飲啖生冷或胃熱之氣中腕節閉揮霍

變亂用此能通暢三焦分理陰陽兼治反胃嘔吐

中暑昏亂最為切當方見大方科痲冷類竹葉石膏湯見大方科傷寒類

〔金液丹〕與〔青州白〕子等分為末理吐瀉之後已覺虛損若因虛發熱必作慢脾風用米飲調下特效須多服若胃氣已生則旋減金液却以〔四君子湯〕加陳皮名〔異功散〕徐徐調理方見大方科通治類及風科通治類

〔單方〕治霍亂

右以牛涎一合灌下立效陳大蓼濃煎湯洗手足上并服濃汁一二合自愈

〔灸法〕男左女右第二脚指上如菘豆大艾炷灸三壯即愈

泄瀉

〔驚瀉〕安神口〔小驚口〕白朮散治瀉下青色並方見前

〔疝瀉〕白朮湯〔蟾酥口〕史君餅治所瀉爛如泥肚緊

方並見前

〔積瀉〕消積口治瀉下極臭穢腹痛方見前服後次用

〔益黃散〕方見後〔平胃散〕縮砂香附湯補脾即安方並見大

方科諸氣脾胃類

〔熱瀉〕五苓散方見傷暑類〔通心飲〕方見前治溇利大便

熱每服二錢並用燈心十莖車前草二根煎服

〔冷瀉方〕治臟腑極冷瀉出如破水〔勻氣散〕欲變候

用

〔白朮散〕〔觀音散〕冬瓜子仁湯下或脾氣虛〔益黃散〕

〔五苓散〕蘇柿薑錢或誤服冷藥脾虛生風成慢驚

〔南星散〕生薑防風湯下瀉極用〔金液丹〕為末陳

米飲下立住方並見前

〔理中湯〕治冷瀉不止每服一錢棗湯或鹽湯調方見
大方科嘔吐類

〔豆蔻散〕治腹痛洞瀉腸胃虛冷

肉豆蔻一枚剉一小孔內滴乳香一塊麪裹煨熟

右為末每服一錢米飲調下

冷熱不調瀉〔和安散〕

木香 當歸

北前胡 柴胡 川芎

北梗 甘草炙 赤茯苓各等分

右剉散每服一錢水一盞生薑二片棗一枚煎空心服

〔枇杷葉散〕來復丹方見大方科傷暑及痢冷類

〔養臟湯〕香連口方並見大方科泄瀉類

〔腎洩〕震靈丹治面鰲黑齒消脫骨力弱小腹痛泄多白膿

右用三口為末火鍾乳粉半錢以炒破故紙一

錢半生肉豆蔻一錢大棗二枚煎取清汁乘熱

調空心灌下方見大方科痢冷類

梅月天時行瀉〔香葛湯〕每服生薑二片豆豉伍粒

水一盞煎方見大方科傷寒類

下痢

〔地榆散〕治赤痢因大腸停積熱毒得之或點滴鮮紅

地榆

訶子

甘草各等

右為末每服一錢鹽米湯調空腹服

〔又方〕

地榆錢一

甘草錢二

芍藥錢一

當歸錢二

右剉散每服一錢水一盞煎溫服

〔小黃連阿膠〕治腸胃有熱大便秘澁疼痛啼叫

下痢赤黃煩燥多渴腹痛小便不利乃積熱蘊毒

為之口如粟米大方見大方科咳嗽類

〔四生散〕

鶯粟殼去萼蒂赤頰

黑豆

甘草半炙

生薑

半炙

右剉散每服二錢熟煎溫服如嘔食不入加人

參少許

〔大柴胡湯〕治下痢舌黃口燥胃滿作渴身熱腹脹

讖語此必有燥屎服此下之後與止藥方見大方科傷寒類

〔木香散〕治白痢因腸胃虛弱受於寒氣所下不止腹痛不食立效

木香炮一分

厚朴薑汁炒

白朮一分

龍骨

當歸洗淨炒

乾薑

訶子肉各分

右剉散每服二錢水一盞生薑二片棗一枚煎

溫服量大小加減

〔朴附口〕治滑冷下痢不禁

厚朴 附子

乾薑

陳皮 各一兩

右為末糊口粟米大每服三十口米飲下日三服

香連口 治赤白痢皆氣血不和為寒熱所傷冷熱相乘乍赤乍白或赤白相雜裏急後重口如粟米

大 方見大方科泄瀉類

養臟湯 治同下 方見大方科泄瀉類

小駐車口 治冷熱不調或乳哺失節泄瀉不止或

下痢鮮紅或赤多白少腹痛後重腸胃虛滑便數

減食困倦一切瀉痢並宜服之 方見大方科下痢類

鷲粟飲 治赤白痢

木香 五錢

黃連 去鬚

粟殼 去蒂萼赤類一兩

僵蠶 炒去絲五錢

甘草 一兩

右用生薑二兩切同炒為末每服一錢米飲下

赤痢生地黃七寸白痢烏梅一錢並煎湯調下

如有熱小柴胡湯解之 方見大方科傷寒類

石蓮散 治禁口痢因服澁住藥太過傷損胃氣聞

食口閉四肢逆冷若穀道不閉黃汁長流不治

蓮肉 去心

右為末每服一錢空腹米飲調服

真料參苓白朮散 治禁口痢和胃進食或單用山

藥細炒半生半熟為末米飲調服立效 方見大方科脾胃類

等住口 治溏瀉并一切瀉痢立效

當歸

硫黃

牡蠣各一分

木香兩半

真右為末麩糊口粟米大每服二七口糯米飲入薑汁一二滴送下

駐車口治休息痢因腸胃虛弱紅白相雜兩三點滴乍發乍止方見大方科下痢類

炒雞子治休息痢及疴瀉日久不能安者右用雞子一枚打破用黃蠟一塊如指大銚內

鑄以雞子拌和炒熟空心食之感應口治釀肚痢肚大喫食不成肌膚其下如濃

粥汁青白黑為冷黃赤為熱皆積聚所致方見大方科秘

靈砂口即蠟治積痢

牛乳湯治氣痢下如魚眼二方並見大方科下痢類

脾胃

白朮散又名清寧散温脾養胃正氣理泄瀉冒熱

煩渴不問陰陽虛實並宜服之或乳食不進羸困少力因而失治變成風痲方見前為散紫蘇梗煎正

脾生薑棗子虛實熱服涼藥後不能食先用此生胃中津液後服生犀散退熱方見前早涼夜熱不可

下只用煎三升許頓服稍愈後再服三升候不渴無涎又投阿膠散二服即安白水煎亦可如渴飲

水多者多服無時盜汗虛汗亦用此藥止瀉治痰退熱清神渴倍加白朮渴甚者任意多飲

〔阿膠散〕阿膠一兩半熬炒鼠粘子一分炒香馬兜鈴半兩甘草一分杏仁七箇去皮尖糯米一兩為散每服三錢用水煎服

〔史君子口〕正脾助胃

厚朴去麩皮 史君子去殼

陳皮

甘草

訶子

去核

右為末煉蜜口菜豆大每服三七口 疴瀉積

瀉米飲下 熱瀉加青黛米飲 冷瀉薑 中

暑瀉香薷 時行瀉桑葉 赤痢藍姑草 白

痢烏梅 驚瀉藍姑草已上並用米飲下藍姑草

葉菜是也

〔六神湯〕理脾胃虛止吐瀉進飲食養氣

嫩黃耆

白扁豆

炒

人參

白朮

白茯苓

粉草

各等分或加藿香葉亦可

右為末每服二錢蘇鹽湯正氣生薑棗子湯調

下

〔益黃散〕治脾胃虛弱吐瀉及治脾疴腹大身瘦此

藥補脾調氣治冷腹痛久冷泄效

陳皮

青皮

訶子肉

甘草

各一兩

丁香

五錢

右剉散每服二錢水一中盞生薑二片煎空腹

服

〔醒脾散〕

人參

白朮

豆蔻

甘草

乾薑

藿香

各等分

右為末每服一錢或半錢薑湯下如醒脾胃冬
瓜子仁米飲下

勻氣散

桔梗

甘草

乾薑

縮砂

益智子

茴香

藿香葉

各等分

右為末每服半錢水瀉紫蘇木瓜煎湯下調脾

胃生薑棗子煎湯調服

觀音散

治脾胃不和

前方見前

腹痛

四順清涼飲 治挾熱作痛面赤壯熱四肢煩手足

俱熱加青皮枳殼去穰切片入

方見大方類

七氣湯 治挾冷作痛面色或白或青四肢冷甚

青皮

陳皮

桔梗

蓬莪朮

煨

辣桂

藿香

益智仁

各一兩

香附子

半一兩

甘草

炙三分

加半夏

湯洗三分

右剉散每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎不

拘時候

蘇合香口與七氣湯兼服治證同上

方見大方類

枳殼桔梗湯 治邪正交爭冷熱不調作為腹痛嘔

吐

枳殼

去穰炒

桔梗

去

青皮

去穰

陳皮去白各五錢

木香三錢

當歸

粉草各五錢

右劉散每服二錢水一盞生薑二片煎溫服

疝氣

〔金鈴散〕治疝氣作痛時先曲腰啼哭眼中無淚脚

冷唇乾額上多汗或外腎釣上陰囊偏大

金鈴子一兩煨去核

縮砂七錢半去殼

萹澄茄

木香各五錢

右為末每服一錢大者二錢鹽湯或好酒調服

〔紅口〕子治同上但小口如粟米大每服二七粒金

鈴子煎湯下方見大方科痰瘡類

〔小檳榔〕治疝氣小腹痛引腰脊孿曲身不能直

芫花醋浸炒

木香

檳榔

三稜炒各半兩

茯苓

青皮去白

全蝎

肉桂

附子炮

硃砂各一分

右為末將硃砂浸先去土頓在湯瓶上候成膏

和子和糖醋打麪糊口如菜豆大每服三十口空

心溫酒送下未效再服

〔又方〕金鈴子口治疝氣小腹痛引腰脊孿曲身不

能直

木香

檳榔

三稜

蓬木炮

青皮去白

陳皮

川練肉

芫花醋浸炒各半兩

粹桂

牽牛 生取仁 各三錢

川巴豆肉 不去油 一錢

右為末麩糊口麻子大每三口空心午前各一服薑湯下

〔五苓散〕治陰核氣結腫大釣痛多因啼怒不止傷動陰氣結聚不散得之或胎婦啼泣過傷令兒生下小腸氣閉加以風冷血水相聚水氣上乘於肺故先喘而後疝痛外腎木硬擠下痛楚不可忍惟利二便則安以木通葱白茴香食鹽煎湯調下得小便利為效 方見大方科傷暑類

〔當歸散〕治疝氣大腑秘小腹陰囊牽引撮聚痛甚

粹桂

牽牛

當歸

北大黃

桃仁

全蝎

右剉散每一錢入蜜煎溫服以利大便利後以青皮陳皮茯苓木香縮砂甘草為散生薑煎和胃唇青不治

〔釣藤膏〕治盤腸內釣腹中極痛乾啼

明乳香

沒藥

木香

薑黃

木鱉子

右以木鱉子搜和四味末為口櫻桃大煎釣藤湯化下一歲可服半口次〔魏香散〕

〔魏香散〕用蓬莪朮半兩真阿魏一錢先以溫水化

開阿魏浸莪朮一日夜焙乾為末每服一字或半錢煎蘇葉米飲空心調下

吐衄

〔蒲黃散〕治吐血咯血

生蒲黃 油髮灰分等

右研細每服一錢煖生地黄汁調下米飲亦可

〔生地黄汁方〕治吐血衄血

生地黄汁取一合髮灰半錢調分作兩服食後

少頃灌下

〔鼻衄方〕

生蘿蔔汁仰頭滴下鼻仍飲其汁

腫滿

〔五苓散〕香薷散治伏暑感濕腫滿用生薑皮木瓜

車前草山茵陳煎方見大方科傷暑類

〔分氣飲〕治腫脹作喘氣短而急

北梗

赤茯苓

陳皮

桑白皮炒

大腹皮

枳殼

半夏麩

真蘇子炒

紫蘇

甘草各二錢

草果仁一錢

右剉散每服一錢半水一盞生薑二片棗子一

枚煎服若臍心凸起掌心平缺盆平背心平不

治大喘氣麤不食乃腎水盈溢上行傍浸於肺

亦不治

〔五皮散〕神助散相兼服方見大方科腫滿類

〔奇方〕治熱毒遊腫破草鞋人亂髮燒灰醋調傅熱

毒處

〔三黃散〕貼腫毒

右用大黃黃柏黃連各等分為末獐猪膽汁調塗頭心及脚心又方硝石白麩等分研勻井水調睡時塗脚心效

〔單方〕治脚氣腫痛及蠱腫

右商陸不以多少切碎酒煮熟候酒温連商陸飲喫腹肚蠱腫同米煮粥喫大人亦可服

盜汗

〔白朮散〕安神口〔小驚口〕牡蠣麻黃根煎湯下

方並見前

〔又方〕治心腋汗大人小兒皆有之大人乃心血溢盛面常發赤者是也小兒因驚得之有人常有盜汗不止氣弱體羸久醫不可乃心血溢盛為汗非虛也宜用葉收斂心血

川當歸

人參 各半兩

右剉散用猪心一箇可切三片葉亦分三服每服水一椀猪心一片煎服

〔黃耆建中湯〕治盜汗入米糖煎服效

〔牡蠣散〕治血虛自汗或病後暴虛津液不固自汗夜卧愈甚久不止則枯瘦短氣煩倦 方見大方科自汗類

〔竒方〕治脚汗白礬乾葛為散煎水洗效

〔又方〕治睡中汗出酸棗仁人參茯苓為細末米飲下半錢

項軟

〔天柱口〕治風氣頸起軟頭不得正或去前或去後

蛇含石

大一塊煨柒次用醋淬柒次

川礬金末

少許

右碾細又入鉢內研極細和前藥末入少麝香
和勻用雪白大米飯口龍眼大每服一口荆芥
湯化下或又入生薑汁一二滴或用金銀薄荷
湯早晨不拘時下風熱項軟合用（涼肝口）方見前
五加皮散治頸軟

右用五加皮為末酒調塗傳頸骨上
健骨散治久患疴疾體虛不食及諸病後天柱骨
倒醫者不識謂之五軟

白僵蠶為末三歲兒半錢薄荷酒調下後用生
筋散貼

生筋散治如前

木鱉子六箇
去殼

草麻子六十箇
去殼

右研細先抱起顱摩項上令熱津唾調貼之效
又方用附子生用去皮臍天南星切各等分生
薑自然汁調貼項軟處

語遲

菖蒲口治受胎其母卒有驚怖邪氣乘心舌本不
痛四五歲長猶不能言

人參

石菖蒲

麥門冬去心

遠志取肉薑
汁炒

川芎

當歸各二錢

滴乳香

朱砂各一錢
別研

右為末煉蜜口麻子大每服十口粳米飲下

聽耳

明礬散治腎經有熱上衝於耳遂使津液壅滯為

稠膿為清汁耳內痛亦有沐浴水入耳中濕氣停滯為膿但不疼二證久不瘥變成聾耳

明礬煨

龍骨

研各三錢

黃丹

煨二錢

胭脂一錢

麝香

少許

右為末先以綿杖取去水次以鵝毛管吹藥入耳本方加海螵蛸末亦好

〔月蝕耳瘡方〕胡粉和東方辟土為末傅
〔又方〕蝦蟆燒灰存性搗為末和猪膏傅

重舌

〔傅藥〕治重舌乃心脾俱有熱也心候於舌所主者血脾之脉絡出於舌下若心脾有熱則血氣俱盛附舌根而重生一物形如舌而短小是也有着頰

裏及上腭者曰重腭有着齒斷者曰重斷皆當刺去其血也用真蒲黃傅之或髮灰傅之或馬牙硝傅之或竹瀝浸黃栢點之燄硝亦好餘並大

方科舌病類

木舌

〔紫雪〕治木舌舌更心之候脾之脉絡於舌臟腑壅滯心脾積熱熱氣上衝故令舌腫漸漸脹大塞滿口中是為木舌若不急療必至害人每用一字研

細竹瀝調下

方見和劑局方

〔又方〕黃蜀葵花研細黃丹半之同研點七次

〔又方〕川朴硝二分紫雪一分白鹽半分同研每半

錢竹瀝井水調傅

滯頤

冷證温脾口治滯頤涎流出而潰於頤間也涎者脾之液脾胃虛冷故涎液自流不能收約法當温脾

半夏

木香

丁香

各半

川白薑生

白朮

青皮

陳皮各二分半

右為末糕糊口麻子大一歲十口二歲二十口米湯灌下

熱證通心飲前方見

口角瘡爛方髮灰為細末猪脂和傅燕窠泥亦好

咽喉

射干湯治風熱腫痛

射干

川升麻

各兩

馬牙硝

馬勃

各半兩

右為末每服一錢水一盞煎食後温服

喉痺腫痛方

蛇退

燒存性末

右每服用半錢乳汁調下或用蜂房燒存性為末每用半錢乳汁調服

夜啼

導赤散治心燥啼面赤小便赤口中熱腹上亦

熱或有汗仰身而啼至曉方息加黃芩煎未效

通心飲加麥門冬車前子燈心薄荷煎或用燈心

燒灰塗乳上與兒飲亦效前方並見

〔六神散〕治腹痛啼哭面青口中冷氣四肢亦冷曲腰而啼或大便泄瀉青白糞及不吮乳

人參

山藥炒

白朮各半

甘草二錢

白茯苓

白扁豆炒各一兩

右為末每服一錢薑二片棗一枚煎一方用當

歸白芍藥人參各二錢半甘草桔梗陳皮各一

錢為散每服二錢水煎時時與服

〔蒜圓〕治冷證腹痛夜啼面青手冷

大蒜一枚慢火煨香熟取出細切

乳香半錢別研

右研勻口如芥子大每服七粒乳空時服

〔安神口〕治外客忤犯夜啼金銀湯化開服方見前

〔黃土散〕治小兒卒客忤

竈中黃土

蚯蚓尿各等分

右研勻和水塗兒頭上及五心良

〔觸犯禁忌夜啼方服蘇合香口〕以醋炭熏及用方

術驅之口到乳上便啼身額必微熱急看口內

或瘡或重舌依前口瘡重舌類治之其啼自止

顛陷

〔單方〕治因臟腑有熱渴引水漿致成泄利久則血

氣虛弱不能上交腦髓故顛陷如坑不得滿平

宜用黃狗頭骨炙黃為末雞子清調之傳

顛填

〔集說〕顛填者顛門腫起也脾主肌肉乳食不常飢

飽無度或寒或熱乘於脾家致使臟腑不調其氣上衝為之填脹顛突而高如物堆塚毛髮短黃自汗是爾若寒氣上衝則牢鞭熱氣上衝則柔軟寒者溫之熱者涼之劑量輕重無以調氣小兒肝盛風熱交攻亦然未易退差

解顛

〔地黄口〕治年大小兒頭縫開解不合腎主髓腦為髓海腎氣有虧腦髓不足所以腦顛開而不能合凡腦髓欠少如木無根不過千日終成廢人

大熟地黄

洗焙四錢

山茱萸

乾山藥

各二錢

澤瀉

一錢

牡丹皮

白茯苓

各一錢半

右為末煉蜜口梧桐子大每用一二口溫水空

心送下仍用大南星微炮為末米醋調傅於緋帛上烘熱貼之

〔三辛散〕治頭骨應合不合頭骨開解名曰解顛

細辛

桂心

各半兩

乾薑

七錢半

右為末以乳汁和傅顛上乾復傅之見面赤即愈

〔又方〕蛇蛻炒焦為末用猪頰車中髓調傅頂上日三四度有人作頭巾裏遮護之久而自合亦良法也

〔又方〕驢頭骨不以多少燒灰研細以清油調敷頭縫中

手拳不展

〔薏苡口〕治所受肝氣怯弱致兩脉孿縮兩手伸展無力

當歸乾焙

秦艽

薏苡仁

酸棗仁

防風

羌活各一兩

右為末煉蜜口鷄頭大每一粒至二粒麝香京芥湯化下

脚拳不展

〔海東皮散〕治稟受腎氣不足血氣未榮脚指拳縮無力不能伸展

海桐皮

牡丹皮

當歸

熟地黄

牛膝各一兩

山茱萸

補骨脂各半兩

右為末每服一錢葱白二寸煎食前服

行遲

〔地黄口〕治氣血不充骨髓不滿軟弱不能行或肝腎俱虛肝主筋筋弱不能束所致一方加川牛膝

五加皮酒炙鹿茸妙方見前

〔又方〕虎骨口

革不虎脛骨

酒炙赤

生乾地黄

酸棗仁

酒浸去皮炒香

白茯苓

辣桂

防風

當歸

川芎

牛膝等分

右為末煉蜜口麻子大每五口酒吞下或木瓜湯

〔五加皮散〕治三歲不能行者

真五加皮

一分

牛膝

酸乾木瓜

各半分

右為末每服一錢半粥飲調次入好酒兩點再
調食前服日二劑

鶴節

〔地黄〕治稟受不足血氣不充故肌肉瘦薄骨節
呈露如鶴之膝乃腎虛得之腎虛則精髓內耗膚
革不榮易為邪氣所襲日就枯瘁其殆鶴脚之節
乎本方加鹿茸酥炙川牛膝各二錢修合服餌並
同三歲以下與十口三歲以上與十五口前方見

龜胸

〔百合丹〕胸高脹滿其狀如龜此肺經受熱所致也
乳母酒麪無度或夏月熱煩熱乳與兒得之或乳
母多食五辛而亦成此疾

川大黃三分

天門冬去心

杏仁去皮

百合

木通

桑白皮炒

甜葶藶紙上

爛石膏各半

右為末煉蜜口菜豆大每服五口食後臨臥熟

水化下

龜背

〔松藥丹〕治嬰兒生下不能護背客風吹脊入於骨
髓致之或坐太早亦致偻僂背高如龜多成痼疾

松花

枳殼

防風

獨活各一兩

麻黃

川大黃

前胡

桂心各半兩

右為末蜜口黍米大每服十粒粥飲下量兒加

減

〔灸法〕肺腧穴第三椎骨下兩傍各一寸半膈俞穴第七椎骨下兩傍各一寸半以小兒手中指中節為一寸艾炷如小麥大但三五壯而止

髮不生

〔菴蓉〕治稟受血氣不足不能榮於髮

當歸去尾

生乾地黄

肉菴蓉酒洗

揚芍藥各一兩

胡粉五錢

右為末煉蜜口如黍米大每服十粒煎黑豆湯下兼磨化塗抹頭上

齒不生

〔芎黃散〕治齒不生齒者由骨之所終髓之所養稟

氣不足則髓不能充於骨故齒久不生

川芎

乾地黄

當歸

山藥

白芍藥各一兩

沉香半兩

粉草三錢

右為末溫鹽湯調服半錢用少許揩齒脚亦佳
〔單方〕雄鼠糞二七粒兩頭尖者是每日用一粒揩齒根上至二十一日當生

瘡毒

〔平血飲〕合和〔敗毒散〕治諸般瘡毒生薑薄荷生乾

地黄麥門冬去心煎服方見瘡腫科諸瘡類及大方科傷寒類

〔犀角消毒飲〕治同前方見

〔五福化毒丹〕小牛黃口小口服治同上方見瘡腫科諸瘡類

〔角無辜瘡毒〕

右用黃連大指為末芭蕉汁調敷角留口 搽

瘡加輕粉有汁加黃丹煨麝香各少許和勻乾

搽

〔諸般惡瘡〕

土藜蘆取皮焙乾為末別研入 不夾石雄黃

輕粉

水粉

蚌粉

右和勻先用鯽魚一箇入真清油內煎候熟去

魚以油攤冷調藥傅瘡三日後以葱湯遍身洗

浴所穿衣服並脫去洗淨乳母仍忌油膩肥汁

紅酒煎炙及熱物等立效癬瘡用真米醋調傅

立效

〔鯽魚方〕治小兒白禿瘡

鯽魚一尾重三四兩者去腸肚以亂髮填滿濕帛裹燒存性 雄黃二錢

右為末生清油調傅先以麤水洗拭後用藥

〔如聖黑膏〕治頭瘡久不瘥及白禿

豆豉半升 龍膽草 蕪荑各一分

右一處用濕帛裹鹽泥固濟火煨存性碾為末

以生清油半斤熬取四兩下藥急攪勻得所麤

合收傅神效

凡人耳輪瘡極痒臨睡時傅一遍治白禿剃頭

後一傅愈

〔療瘡方〕治卒得癩瘡

右用赤爛牛糞燒灰研細傅

魚臍瘡方瘡頭黑深破之黃水出四畔浮漿

右用蛇退皮燒存性細研雞子清調傅

蠟蝮瘡方燕窠土研細猪脂調傅

癬方水銀一分胡粉二分水研入雞冠血傅

濕癬瘡方

右用蛇床子為末先以韭菜根煎湯洗次用臍
月猪脂調藥傅之

灸甲散治眉叢中生瘡名曰鍊銀癬

右用穿山甲前膊鱗炙焦為末清油輕粉調傅

漏瘡方鍊成松脂末并髮灰生黃丹填傅

白鯁散治凍耳成瘡或痒或痛

白鯁

白鯁各半

右為末先以湯洗瘡後用生清油調塗

三物散治鬚邊生軟瘡名發鬚有數年不愈者此

極妙

猪頭上毛

猫頭上毛

各一撮

鼠屎

一粒

右為末清油調傅或加輕粉尤妙

生附散治凍爛脚成瘡

生附子

半分去

右為末麪水調貼之即愈

陰瘡方治陰股間汁出先痒後痛愈後復發及陰

囊生瘡以火灸瘡扒去痂令乾以蜜傅却搜麪作

燒餅炙熟以錫糖塗在餅上乘熱熨之冷則再炙

再熨二度為妙

〔胎毒瘡方〕治一歲二歲內滿頭延及遍身生瘡皆因在胎中父母恣情交合所致名曰胎蛆經久不差先用〔化毒丹〕消毒飲服却用父小便以鵝翎刷洗瘡上青黛為細末乾糝效

〔即效方〕治頭上生瘡及肥疔瘡猪筒骨中髓調輕粉早傳晚愈又用樹上乾桃燒灰清心調傳效暑毒軟癬皆可

〔疣目瘡方〕治遍身如魚目無膿又名征虜瘡川升麻剉散煎百一沸入蜜一二匙以磁器盛鵝翎蘸拭瘡上

〔諸惡瘡〕生頭面南星貝母等分用湯泡七次研為細末入土朱少許乾則清油調擦濕則乾糝

又文火口瘡

〔瀉心湯〕治血盛將養過温心有客熱熏發於上焦遂成瘡

右用黃連一兩去鬚或加腦子麝香鵬沙為末每服一字温水臨卧服

〔連翹飲〕治心肺有熱瘡發斑駁如丹身軀有熱或熟煮大栗與食亦佳

〔洗心散〕治心熱煩渴作成口瘡每用一字乾糝

口中嚙喫亦無妨乳母同服尤妙

〔傅葉〕治滿口瘡爛

黃丹一兩好蜜一兩瓦盞盛甑上蒸一炊久取出以鵝翎刷瘡上效

〔貼藥〕吳茱萸末醋調貼兩脚心移夜即愈藥性雖熱能引熱就下至良

〔又方〕天南星密陀僧為末治口瘡不能吮乳醋調貼兩脚心即洗去清熱

去加薄荷水拭口內〔又方〕生硫黃為末新汲水調貼手心脚心效即洗

軟癬

〔猪頭散〕治軟癬愈而再作用野蜂房一二箇燒灰存性以巴豆三七粒去殼煎清油三二沸去巴豆以油調藥敷立效白礬枯為末清油調傅亦效此藥有驗人以猪頭為謝遂名之

〔又方〕大枳殼一枚去穰令空地上磨令口平以稠

麪糊擦四唇露在癬上自破膿溜出盡更無癢痕

〔又方〕治軟癬屢安再作者

右用桑螵蛸燒灰存性以清油調傅

〔又方〕鷄抱卵殼燒灰存性為末入輕粉少許清油

調傅此物難得只以雞子抱退殼如上法用亦可

〔飲瘡口方〕

白及

赤石脂

各一錢研

當歸

三錢去芦

龍骨少許研

右為細末乾糝

脫肛

〔釣腸〕治大腸虛寒或因服涼藥過度或久痢後
臟寒所致口如粟米大大者細嚼胡桃温酒送下
小者木香湯下方見大方科諸痔類
〔瓜萋〕治初病脫肛鼻梁青脉唇白齒根焦黃久
病兩頰光眉赤唇焦多啼哭

黃瓜萋箇一

白礬兩半

右將白礬入瓜萋內固濟火煨為末米糊口每
服三十口米湯送下

〔痢頻脫肛〕黑色生殼方

右用巴豆殼燒灰芭蕉自然汁煮入朴硝少許
洗軟用真清油點三滴放三角白礬煨過研爛
真龍骨少許同研糝肛頭用芭蕉葉托上勿令

便去出入令大兒抱定

〔龍骨散〕治大腸虛肛門出

龍骨

訶子肉

炒各二錢半

沒石子

大者二枚

鸞粟殼

去類醋炙

赤石脂

各二錢

右為末每服一錢米飲調下

〔洗方〕香附子荆芥皂角煎水洗

〔又方〕以葱湯洗令軟用芭蕉葉托上

〔又方〕五倍子朴硝大腹皮煎水洗以赤石脂末糝

在芭蕉葉上托入

〔貼方〕草麻子四十九粒研爛水調作餅子貼腮頂

上收上立有效

〔水聖散子〕治脫肛不收

右用浮萍草不以多少為細末乾貼患處

紫葳膏治臟熱肛門脫出

右用紫背叢一大握又為魚腥草搗爛如泥先用朴硝水洗糝肛門用芭蕉托入却用藥於臀下貼坐自然致入

又方用新磚一片燒紅以醋澆之氣上即用脚布疊數重壓定使熱氣上透不可過熱令病者以醫坐於布上如覺布溫逐旋減之以常得溫熱為度

灸法頂上旋毛中三壯即入又灸尾翠骨三壯又灸臍中隨年壯遺尿

雞腸散治腎與膀胱俱虛冷氣乘之不能約制故遺尿不禁或睡裏自出

莽桂

龍骨各二錢半

雞腸燒

牡蠣灰

白茯苓

真桑螵蛸炒各半兩

右剉散每服一錢水一盞薑二片棗一枚煎服

又方

雞腔脰具一

雞腸燒

猪胞炙

右為末每服一錢酒調下男用雌雞女用雄雞者

尿白茯苓散治乳哺失節有傷於脾致使清濁色白也久而成疳亦心膈伏熱無而得之

京三稜

蓬莪朮煨

縮砂仁

赤茯苓 各半

青皮

陳皮

滑石

甘草 炙各二錢半

右為末每服一錢麥門冬燈心煎湯調下
〔又方〕大甘草頭煎湯服

淋閉

〔葵子散〕治諸淋無小便不通

葵子

車前子

木通

瞿麥

桑白皮 炒

赤茯苓

山梔子仁

甘草 炙各等分

右剉散每服一錢井水一小盞葱白二寸煎食前服

〔導赤散〕治血淋仍以米飲調油髮灰少許空心灌

下方見

〔尿血方〕

生蒲黃

生地黄

赤茯苓

甘草 炙各等分

右剉散每服一錢水一小盞煎調油髮灰少許

不食前服

〔順經散〕治十餘歲因驚之候心氣下行小便淋瀝

日夕三四十次漸覺黃瘦宜服

韭子 炒

琥珀 研別

益智 去殼炒

金毛狗脊 去毛

白茯苓 皮去

石燕子 火煨各半兩

醋淬研

石葶 去毛一錢

右為末每服一錢韭湯調日二服

〔新葉〕大便秘

〔沒藥散〕治風與滯血留蓄上焦胸膈高起大便不通

沒藥

大黃

枳殼炒

北梗各二錢

木香

甘草炙各一錢

右剉散每服一錢薑一片水一盞煎服

陰腫

〔三白散〕治膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹大小便不利

白牽牛二兩

桑白皮

白朮

木通去節

陳皮去白各半兩

〔桃仁〕治啼叫怒氣閉擊於下結聚不散水竇不

衝發為此疾

桃仁浸去皮麩微炒三錢

薜桂

牽牛炒碾取仁

白蒺藜炒香搗去刺

牡丹皮

北大黃各二錢

右為末煉蜜口如麻子大每服五口或七口青

皮木通葱白鹽少許煎湯灌下或煎大流氣飲

〔研青木香〕灌下

〔蟬退散〕治陰囊忽腫多坐地為風或虫蟻吹著

右用蟬退半兩水一碗煎湯洗腫處其痛立止

〔腫亦消再溫再洗洗後仍與五苓散加燈心煎

服又方用葱園內蚯蚓糞甘草汁調塗

〔傅藥〕地龍膏治外腎腫硬或疝或風熱暴腫及陰

瘡

乾地黃不以多少為末先以葱椒湯於避風處
洗次用津唾調傅其上外腎熱者鷄子清調傅
或加牡蠣少許

又方地龍糞研生薄荷汁調傅

牡蠣散治外腎腫大莖物通明

牡蠣粉研極細先以津唾塗腫處次用糝傅

又方卵腫研挑仁唾調傅

遇仙方治風熱外腎焮赤腫痛日夜啼叫不數日

退皮如鷄卵殼愈而復作用老杉木燒灰入膩

粉清油調傅效

卒暴

捷方治卒然腹皮青黑而死灸臍上下左右去臍

各半寸并鳩尾骨下一寸凡五處各灸三壯仍

用酒和胡粉塗其腹

又暴腹滿欲死半夏不以多小微火炮為末酒和

為口如粟米大三五粒淡薑湯或蜜湯下

又中惡暴死葱白納下部及鼻中立活或用菖蒲

末著舌底及吹入兩鼻兩耳中效

又中蠱欲死甘草濃煎湯服立驗

斷乳

畫眉膏

梔子三箇燒存性

雌黃

朱砂各少許

右為末入生清油輕粉少許調勻候兒睡着濃

抹於兩眉醒來自不喫乳未效再用即驗

周氏小兒方卷第十二

風科得効方卷第十三

建寧路官醫提領陳

志

刊行

南豐州醫學教授危

亦林

編集

江西等處官醫副提舉余

賜山

校正

風科

論雜風狀

中風大法有四一曰偏枯二曰風癱三曰風懿四曰風痺夫諸急卒病多是風初得輕微人所不悟宜速治之

偏枯者半身不遂肌肉偏不用而痛言不寔智不亂病在分腠之間温卧取汗益其不足損其有餘乃可復也

風痺者身無痛四肢不收智亂不甚言微可知則
可治甚即不能言不可治
風懿者奄忽不知人咽中塞窒然舌強不能言
病在臟腑先入陰後入陽治之先補於陰後瀉於
陽發其汗身轉輒者生汗不出身直者七日死
風痺濕痺周痺筋痺脉痺肌痺皮痺骨痺胞痺各
有證候形如風狀得脉別也脉微澁其證身軀不
仁

中風惡證

口開者心氣閉絕也遺尿者腎氣閉絕也手散者
脾氣閉絕眼合者肝氣閉絕鼻斡者肺氣閉絕備
此五證尤不可治五證中纔見一證猶當審餘證

以救療蓋以初中則眼合者多痰上則鼻斡者亦
多惟遺尿口開俱見為惡心為五臟主君腎為一
身根本誠不可閉絕也

中風要說

凡中風脉無不大者非熱也是風脉也中風有冷
熱陽病則熱陰病則冷冷則用溫風藥熱則用涼
風藥不可一槩用也凡中風皆不可吐出涎人骨
節中皆有涎所以轉動滑利中風則涎上潮咽喉
中袞響以藥壓下涎再歸骨節可也不可吐出若
吐出涎時間快意非久枯了手足不可不戒小兒
驚風亦不可吐出涎其患與大人同方其發搐搦
之時不可捉住手足捉住則涎不歸手足當不隨

但寬抱之可也

中風須大作湯劑方有成效若風歸手足名曰小
中不宜用正風藥深治但用平和湯劑雖不能為
全人亦可留連歲月戒之戒之

虛證

〔通氣驅風湯〕治男子婦人血氣虛弱虛風攻注肌
體顫掉肩背刺痛手足拳攣口眼喎斜半身不遂
頭目旋暈痰涎壅盛語言蹇澁行步艱難心忪氣
短客風所湊四肢拘急鼻塞聲重頭疼脾胃不和
心腹刺痛胸膈不快少力多困精神不爽不思飲
食嘔吐惡心霍亂吐瀉胎前產後但是氣虛百病
皆可服之

天台烏藥

五兩

桔梗

去芦

川白芷

川芎

甘草

炙

陳皮

去白

白朮

各三兩半

麻黃

去根

枳殼

麩炒去穢各兩半

人參

去芦半兩

右為末每服三錢紫蘇木瓜煎湯調下去白朮
加乾薑僵蠶名烏藥順氣散卒中風氣不順手
足偏枯流注經絡四肢骨節疼痛或身如板片
舉動不得筋脉拘挛先宜多服得手足間微汗
為妙又脚氣步履艱難脚膝軟弱婦人血風者
人冷氣上攻胸臆兩脅刺痛咳嗽心腹膨脹為
散每服四錢生薑三片紅棗二枚煎服或閃挫
身體不能屈伸温酒調服遍身搔痒抓成瘡薄

苛煎服常服疎風通滯氣調榮衛進飲食大有神效一方每料加天麻一兩沉香五錢亦效並不拘時候

加減續命湯治中風不省人事漸覺半身不遂口眼喎斜手足顫掉語言蹇澁肢體痿痺神情昏亂頭目眩重筋脉拘攣不能屈伸骨節煩疼不得轉側亦治脚氣緩弱久服之瘥有病風人常服不可缺以防瘖啞

麻黃去根

白芍藥

杏仁去尖炒

防風半兩

人參

川芎

防己

附子炮去皮

黃芩

甘草

桂各二兩

附子白附子以上係正方

右到散每服四錢水一盞半生薑三片棗二枚煎不拘時候溫服取汗隨人虛實與所中輕重也筋急拘攣語遲脉弦加薏苡仁治筋急加人參黃芩芍藥以避中寒服后稍輕再加當歸全愈脚氣痺弱不能轉側心神恍惚加茯神遠志骨節煩疼有熱者去附子倍加芍藥煩燥大便澁去附子倍芍藥加竹瀝臟寒大便自利去黃芩加白朮附子骨肉冷痛者加肉桂附子煩燥多驚者加犀角嘔逆腹脹人參半下自汗去麻黃語言蹇澁手足顫掉石菖蒲竹瀝大便秘胃中不快枳殼大黃氣塞不通沉香有痰南星數片發渴麥門

冬乾葛瓜根 身疼秦苑 上氣浮腫喘急防
風桑白皮以上所加各一兩小兒慢驚煎取藥
汁一盞入生薑汁再煎一二沸日三服夜二服
夏間又有熱者減桂一半春加麻黃一兩夏加
黃芩一兩秋加當歸四兩冬加附子半兩風虛
加川芎一兩一方加木香縮砂獨活各一兩川
烏炮三分亦效牙關緊用南星末半錢龍腦一
字頻擦牙上令熱即自開

大省風湯治諸虛風涎潮痰厥神昏頭暈語澆手
足搐搦半身不遂及歷節風痛筋脉挛急
川芎 半夏 防風 各一兩
甘草 炙半兩 全蝎 去毒三箇 附子 生去皮臍 各二錢

川烏 去皮 木香 南星 各半兩
右剉散每服四錢水一盞半生薑十片煎溫服
不拘時候氣虛加沉香氣逆紫蘇胃膈不利有
痰倍加半夏人參頭暈頭疼加天麻半兩全蝎
二錢煎熟入麝香熱風左癱右瘓口眼喎斜口
噤不能言手足頑麻於本方中去附子川烏
順元散治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂咽
喉作聲痰氣上壅六脉沉伏或浮盛兼治痰厥飲
厥及氣虛眩暈

川烏 二兩 天南星 附子 各一兩
木香 兩半 右剉散每服二大錢水一盞半生薑七片煎稍

熱服。感風濕卒中五積散合和服。不省人
事細辛皂角少許為末或只用半夏為末以蘆
管吹入鼻中候噴嚏少蘇然後進藥。痰涎壅
盛每服加全蝎五枚仍服養正丹每服三七粒
鎮墜之以其用硫黃黑錫皆有利益則痰涎隨
去矣因氣中者以沸湯化蘇合香口一粒乘熱
灌下仍用前藥汁濃磨沉香汁少許同煎一沸
服之。四體冷厥用靈砂丹歲丹二七粒無服
方並見傷寒
痲冷中氣類

二香二建湯治男子婦人中風虛極六脉沉伏舌
強不能言語痰涎併多精神如癡手足偏廢不能
舉動此等證狀不可攻風只宜扶虛

天雄

附子

川烏

並生去皮
各一兩

木香

不見火
半兩

沉香

農磨水
煎入

右剉散每服四錢水二盞生薑十片煎七錢空
心溫服

一粒金丹治一切風疾氣血俱虛陰陽偏廢卒暴
中風僵臥昏塞涎潮搐搦不省人事失音舌強手
足蹇曳口眼喎斜或癱瘓偏枯半身不遂語言蹇
澀舉止錯亂四肢麻痺及治顛癇倒卧目瞑不開
涎盛作聲或角弓反張目睛直視口禁悶絕牙關
緊急并治風搏於陽經目眩頭牙齒疼痛耳作蟬
鳴皮膚攣搐頻欠喜睡項強拘急不能回顧及賢
臟風虛脚膝疼痛步履艱難偏風流注一邊屈伸

不得無問新久並能治之

川烏頭

炮去皮

大附子

炮去

白附子

炮各

白僵蠶

炒去絲

白蒺藜

炒去刺

五靈脂

去石

白礬

枯

沒藥

研各

朱砂

研

細墨

磨汁

麝香

研各

右為末用墨汁和藥每兩作六口窖乾金箔為

衣每服一口生薑半兩和皮擦取自然汁化盡

為度用無灰酒半盞溫熱調前藥溫服量病人

酒性多少更飲酒一二升投之以助藥力次用

衣被蓋覆使卧汗出為效勢輕每服半口不以

時候如有風疾常服尤佳補益五臟固密真元

通流關節祛逐風邪壯筋續骨神效

〔萬金湯〕治風補虛順榮衛通血脉并腰脚膝沉重

緩弱無力及治手足風累驗

續斷

杜仲

防風

牛膝

華陰細辛

白茯苓

人參

桂枝

當歸

甘草

川芎

獨活

秦艽

熟地黄

各半兩切酒

右劉散每服五錢水二盞煎遇空腹熱服若左

臂不遂得痊愈后而手指不便無力試諸藥不

效者不半劑可愈血虛體弱加鹿茸肉蓯蓉各

半兩

〔八寶回春湯〕治一切諸虛不足風疾血氣交攻凝

滯脉絡拘急孳孳氣不升降癰中疼痛痰涎壅盛
脾胃不和飲食不進此藥去風和氣活血大有神
效凡治風不可專用風藥攻之愈急則愈甚服此
輕者一月重者二三月自然愈矣且無再作夫血
氣和平榮衛調順則風證不攻而自去

附子炮

人參

麻黃去節

黃芩

防己

香附子去毛

杏仁皮去

川芎

當歸各一兩

茯苓兩半

陳皮

防風各一兩

白芍藥兩五

沉香

川烏炮各兩半

半夏兩半

桂一兩

白朮兩二

天台烏藥兩半

乾薑一兩

黃耆兩三

甘草

熟地黄各一兩

生乾地黄一兩

右二十四味去風八味和氣八味活血同
剉散每三錢水一盞半薑三片棗一枚煎空心
通口服常服效

真珠母研三分 治肝虛為風邪所干卧則魂散而不守狀
若驚悸

真珠母研三分

當歸

熟地黄各一兩半

人參

酸棗仁

栝子仁各一兩

犀角

茯苓

沉香

龍齒各半錢

右為末煉蜜口梧桐子大朱砂為衣每服四五
十口金銀器薄苛煎湯食後吞下

〔禦風膏〕治口眼喎斜

右用草麻子去殼碾碎塗在手心以一孟子置
在手心草麻子上用熱水置盂中口正則急取
孟子左癱塗右手心右癱塗左手心口眼纔正
急洗去藥只隨病處左右貼亦可又治產難者
爛研塗兩脚心纔生下便洗去

〔又方〕用桂心酒煮取汁故紙蘸貼患處左喎貼右
右喎貼左即正

〔又方〕括萋搗爛絞取汁和大麥麩搜作餅炙令熱
熨如正便止不令太過

〔又方〕大鱈魚一條以針刺頭上血左斜塗右右斜
塗左以平正即洗去鱈放之

〔虎骨湯〕治諸般風痺手足疼痛步履艱難腿膝緩
弱久服身輕體健行動快捷大和氣血通行榮衛
補虛排邪有益真氣

虎脛骨酥炙三兩半

川附子炮去皮臍

川羌活

赤芍藥

草薢

肉蓯蓉酒洗焙

黃耆去蘆

白茯苓去皮

人參去蘆

川當歸酒洗焙

大川烏炮去皮尖各一兩半

川芎

白朮

防風去蘆

川牛膝酒洗焙

金毛狗脊燒去毛

白蒺藜炒去刺

天麻已上各一兩

獨活

杜仲去粗皮薑炒去絲

肉桂去麋皮

川續斷一兩

右到散以生絹袋盛了用無灰酒一斗浸之密封瓶口春浸三日夏二日秋七日冬十日每服一盃溫過空心服神效留滓日乾或焙乾為末酒糊口溫酒下

熱證

〔金沸草散〕治卒中風痰上壅頭項強急肢體煩疼筋脈寧急偏癱發熱先以解之方見大方科傷寒陽正語〔人參羌活散〕治風壅痰實頭目昏暈遍體拘攣頭項強急肢節煩疼壯熱煩渴

前胡 羌活 人參
防風 天麻 赤茯苓去皮
薄荷葉 蔓荊子 川芎

粉草 黃芩 枳殼去穢
桔梗 川獨活各一兩
右到散每服四錢薑三片桑白皮七寸煎不拘時服

〔星香飲〕治中風痰盛服熱藥不得者

南星錢八 木香錢一

右到散每服四錢生薑十片水一大盞煎濕服
〔防風通聖散〕治一切風熱頭目昏痛肢體煩疼咳嗽喘滿涕唾稠粘口苦咽乾腸胃結燥

防風二錢 川芎兩半 石膏一兩
滑石三兩 當歸一兩 赤芍藥
大黃各半兩 甘草炒 荆芥穗各二錢半

薄荷葉兩一

連翹

牛膝酒浸去芦

山梔子錢三

右剉散每服四錢水一盞生薑三片煎溫服不

以時候

三黃湯治中風手足拘攣百節疼痛煩熱心亂惡寒不欲飲食兼治賊風偏風猥退風半身不遂失瘖不言

麻黃去根節

黃芩

人參

白朮

桔梗

半夏薑汁製各半兩

麻黃去根節

獨活兩一

右剉散每服四錢水一盞半煎不以時候服取

黃耆兩半

黃芩分三

汗為效心熱加大黃半兩氣滿枳實一分氣逆

人參三分心悸牡蠣三分渴加瓜蒌根寒加附

子一枚炮煎熟入

小省風湯治左癱右瘓口眼喎斜口噤全不能言

半身不遂手足頑麻

防風去芦

大南星湯炮各三兩

甘草炙一兩

右剉散每服四錢生薑十片水一大盞煎熱服

洗心散治因食熱物過度作成中風其狀手足如

火煩燥眼赤肌肉瞶動筋脉拘攣痰涎壅塞大小

便閉澀依證用之大效方見大方科積熱類

四順清涼飲治血熱蘊結壅滯遂成風證煩渴喘

悶譫妄驚狂舌強口噤

〔小通聖散〕治風熱上攻目赤頭痛咽疼齒牙兩頰腫滿口乾煩燥筋脉寧急併解酒毒

當歸

薄荷

羌活

防風

梔子

粉草

大黃

川芎

防己

桔梗各一兩

右剉散每服四錢水一盞半燈心二十莖青竹葉七皮煎食后服小兒急驚可服二錢

〔清神散〕消風壅化痰涎治頭昏目眩心忪面熱腦痛耳鳴鼻塞聲重口眼瞶動精神昏憤肢體疼倦頭項緊急心膈煩悶咽嗑不下

檀香

人參去芦

羌活去苗

防風

去苗各一兩

薄荷

去土

荆芥穗

去土

甘草

各二兩

石膏

研

細辛

去苗洗焙各五錢

右為末每服二錢沸湯點服或入末茶少許食后服

〔茶調散〕治同上或加石膏亦可

方見大方科頭痛類

川芎石膏湯治風熱上攻頭目眩痛咽乾煩渴痰壅喘嗽又治中風偏枯調理勞復諸病

川芎

芍藥

當歸

山梔子

黃芩

大黃

菊花

荆芥穗

人參

白朮

各半兩

滑石

四兩

寒水石

桔梗

各一兩

甘草

三兩

縮砂仁三錢

石膏

防風

連翹

薄荷葉

各一兩

右剉散每服三錢水一盞食后煎服熱甚者為末冷水下

消風散治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩疼膚肉蠕動目眩暈耳鳴眼澁好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻瘙痒癢疹又治婦人血風頭皮腫痒眉睫骨痛旋運欲倒痰逆惡心

荆芥穗

甘草

川芎

羌活

人參

茯苓

白僵蠶

炒去絲去

蟬退

去足各二兩

厚朴

去麩皮薑汁炒

陳皮

去白各半兩

右為末每服二錢茶清調下如久病偏風每日

三服便覺輕減如脫著沐浴暴感風寒頭痛聲

重寒熱倦疼用荆芥茶清調下温酒亦可可併

服之小兒虛風目澁及急慢驚風用乳香荆芥

湯調下半錢並不拘時候一方治口眼喎斜半

身不遂多因下元虛弱為風所乘先服順氣藥

次服補劑却用茶清調此吞青州白口子

透冰丹治一切風毒上攻頭面腫痒痰涎壅塞心

胃不利口舌乾澁風毒下疰腰脚沉重腫痛生瘡

大便多秘小便赤澁中風癱瘓一切諸疾

川大黃

益智仁

白茯苓

茯神

山梔仁

蔓荆子

葳靈仙

天麻

白芷 各半兩

香墨

燒醋 滓 細研

麝香

研各一 錢一字

仙靈脾葉

洗半 兩

川烏

二兩 河水 浸半月 三日 一換水 切 片焙乾 用鹽一兩 炒黃 去鹽 用

右為末煉蜜搜和麥飯相似以真酥塗杵臼擣

萬杵如乾旋入蜜令得所和搜成劑每服旋口

如梧桐子大用薄苛自然汁同溫酒化下兩口

卒中風涎潮昏塞煎皂角莢白礬湯放溫化四

口灌下 癱瘓風每日服三五口漸覺有效

常服一口疎痰利膈溫酒食後下 小兒驚風

入膩粉少許薄苛汁化下半口立效 治瘰癧

葱湯下一口忌動風毒物

解毒雄黃口 治中風卒然倒仆牙關緊急不省人

事并解上膈壅熱痰涎不利咽喉腫閉一切熱毒

鬱金 二錢 半

巴豆 去皮油 十粒

雄黃 研飛 二錢 半

右為末醋煮麪糊口菜豆大每服七口用熱茶

清下吐出頑涎立蘇未吐再服如牙關緊閉灌

藥不下者即以刀尺鐵匙幹開口灌下

大秦芫散 治風壅痰盛四體重著或軟痰疼痛或

拘攣麻痺顫掉口乾目赤煩熱睡卧不寧

條參 去芦

川羌活 去芦

枳殼 去穢

秦芫 去芦

赤芍藥

桔梗 去芦

前胡 去芦

川芎

白芷

黃芩

薄荷

桑白皮 去赤

天麻 粉草 木瓜

防己 荆芥穗

去苗各等分

防風 赤茯苓

右剉散每服四錢水一盞半薑三片煎溫服不以時候

通關散治卒暴中風昏塞不省牙關緊急藥不得下咽下

細辛

薄荷葉

牙皂去子

雄黃各一錢

右研為末每用少許銅管吹入鼻中候噴嚏然後進藥或用白梅擦牙更以菖蒲末著舌下牙關即開倉卒可用

通治

解語湯治中風客於心脾二經舌強不能言半身不遂口眼喎斜神氣不清一切風氣並皆治之

附子炮

防風去

天麻

酸棗仁炒各二兩

羚羊角屑

官桂各七錢半

甘草炙

羌活各半兩

右剉散每服半兩水二盞煎八分去滓入竹瀝兩匙再煎三兩沸溫服不拘時候

加味壽星口治因事驚憂涎留心包精神不守事多健忘謔言妄語如有所見不得安卧或風痰潮作手足抽掣或心虛煩燥

天南星三兩

母真珠一錢

真琥珀五錢

圓白半夏

六兩

枯礬

五錢

大朱砂

一兩 細研

衣為

右為末生薑自然汁煮麩糊為口梧桐子大每
 三十五口淡薑湯下心氣狂甚加鐵膩粉一兩
 氣不順人參湯下 驚悸金銀器竈心土湯
 上熱煩燥淡竹葉麥門冬湯 寧心定志石菖
 蒲湯 痰盛喘急桑白皮湯 小兒急驚麥門
 冬青竹葉湯 慢驚冬瓜仁木香湯下
 排風湯治風虛濕冷邪氣入臟狂言妄語精神錯
 亂肝風發則面青心悶吐逆嘔沫脇滿頭眩不聞
 人聲偏枯筋急曲踈而卧心風發則面赤翕然而
 熱悲傷嗔怒目張呼喚脾風發則面黃身體不仁

不能行步飲食無味夢寐顛倒與亡人相隨肺風
 發則面白欬逆唾膿血上氣奄然而極腎風發則
 面黑手足不隨腰痛難以俛仰冷痺骨疼諸有此
 證令人心驚志意不定恍惚多忘服此安心定志
 聰耳明目通臟腑諸風疾悉主之

白鮮皮

白朮

芍藥

桂心

川芎

當歸

杏仁湯去尖

防風去義

甘草炙各二兩

獨活

麻黃節去

茯苓各三兩

右剉散每服四錢水一盞半薑七片棗二枚煎

溫服

蝎麝白圓子治男子婦人半身不遂手足頑麻

眼喎斜痰涎壅塞及一切風他藥不能痊者小兒驚風大人頭風洗腦風婦人血風

半夏七兩

川烏一兩

白附子二兩

天南星三兩

天麻一兩

全蝎五錢

防風一兩

生麝香半錢

右為末薑汁糯米糊口梧桐子大每服一二三十口淡薑湯不以時吞下癰瘕風溫酒下日三服一二日后當有汗便能舒展經三五日頻呵欠是應常服除風化痰治膈壅小兒驚風薄苛湯

下二三口

救急稀涎散治中風忽然若醉形體昏悶四肢不收涎潮於上膈氣閉不通

猪牙皂角

四條肥實不蛀者去黑皮

白礬

一兩光明者

右為末輕者半錢重者三字溫水調灌下不至大嘔吐但微出冷涎一二升便醒次緩調治不可大吐恐虛人

苦丁香散治風涎暴作氣塞倒卧或有稠涎諸藥化不下者

甜瓜蒂

亦名苦丁香日乾為末

右每用一二錢加輕粉一字以水半合同調勻灌之良久涎自出如涎未出噙沙糖一塊下藥涎即出不損人

禹功散治卒暴昏憤不知人事牙關緊硬藥不下咽

黑牽牛末一錢

茴香半二錢

右用生薑自然汁調藥少許灌入鼻中立醒一方用牽牛木香尤良

又方治暴患痰飲不省人事

右用生清油一盞灌入喉中須臾逐出風痰立醒然後隨證用藥

又方治中風痰壅不能治

猪牙皂角肥實者去皮弦及子二片

玄胡索七

青黛二錢

右為末極細用一字以新汲水調成稀糊令患者仰卧男左女右將藥入病人鼻內覺藥味到喉少酸令患者坐却令咬筆筒一枚涎盡為度

神柏散治中風不省人事涎潮口噤語言不出手足躡曳得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人卒有此證無藥去處用之得力

柏葉一握去枝 葱白一握同根

右細研如泥用無灰酒一升同煎一二十沸去滓溫服不拘時如不飲酒須分作四五次方進他藥

去風丹治癰風痰風大風一切諸風仍治脚氣并攔撲傷折及破傷風服過伯粒即為全人尤能出汗

紫色浮萍不少

右以七月半旬或望日採萍擇淨者先以盆盛

水以竹篩盛萍於水盆上曬乾研為細末煉蜜
口如彈子大每服一粒豆淋酒空心食前化下
〔豆淋酒法〕用黑豆半升揀洗令淨炒令烟出以無
灰酒三升浸一晝夜去豆取酒用之亦可常服
〔枳皮酒〕治中風身軀強直不得屈伸反覆
右取枳樹皮細切一升以酒二升浸一宿每日
溫酒服半升酒盡再作

〔萊菔膏〕治大人小兒噤口風

皂角

不蛀者炙去皮子

蘿蔔

如無以子代之

右以皂角為末以蘿蔔同釀醋研雞翎蘸菜塗
牙齦即蘇

〔一得散〕治中風口噤不知人事產後中風同

右用白朮四兩水三升煎一升頓服

〔又方〕治中風通身冷口噤不知人者

右用川獨活四兩好酒一升煎至半升分溫服

〔獨行散〕治失音

槐花一味炒香熟三更后床上仰卧隨意服亦

治咯血

〔又方〕治中風心煩恍惚或腹中痛滿或時絕而復

蘇

竈心土五升搗為末以冷水八升和之取汁服

口噤者以竹筒灌下即愈

〔趨風膏〕治中風手足偏廢不舉

川山甲

左癱用左足右癱用右足

紅海蛤

如棋者

大川烏頭

生用各二兩

右為末每用半兩搗葱白汁和成厚餅約徑一寸半貼在所患一邊脚中心用舊絹緊縛定於無風密室中榻子上坐用湯一盆將貼藥脚於盆內浸仍用人扶病人恐汗出不能支持候汗出即急去了藥汗欲出身麻木得汗周遍為妙切宜避風自然手足可舉如病未盡除半月二十日已后再依此法用一次自除其根仍服治風補理藥遠慾以自養

效
〔乳靈〕治痛風數年不能舉日夜呻吟不數圓大

川烏去皮勝生用半兩

生乾地黄酒浸一兩

草烏頭小者去皮勝生用半兩

木香不見火

五靈脂石微炒沙

麻黃去根節微

自然銅火煨七次研

乾木瓜酸明者

虎脛骨死虎尤好各乙兩

滴乳香好者為末去燈心

右研細如粉煉蜜去上白沫為口如龍眼大每一兩重作十二口以帶皮生薑自然汁化開一

口熱酒服更以酒半盞送下病在下空心食前

服病在上食后停步時服一日二服口有少麻

勿疑

追風獨活散治氣虛感風或驚恐相乘肝膽受邪

使止氣不守正位致頭招搖手足顫掉漸成目昏

獨活

正地骨皮

北細辛

大川芎

菊花

防風去

甘草各等分

右剉散每服三錢水一盞半煎取六分清汁入少竹瀝再煎食后服

〔仙桃〕治丈夫婦人手足麻痺時發疼痛腰膝氣閉作痛不止或冷地冰身血氣不運打撲閃肭不可忍及癱瘓等疾

生川烏兩三

五靈脂兩四

歲靈仙兩五

右各燒焙同研為末醋糊口梧桐子大每服七粒加至九粒鹽湯吞下婦人當歸醋下空心服

病甚者加至十五粒忌茶立效如神

〔竒方〕治中風牙已緊無門下藥

天南星末半錢白龍腦一字頻擦令熱牙自

開

又治暗風倒地北細辛為末每挑一字搐鼻中

〔神應方〕治諸風癱久服其涎自大便中出生白礬

一兩研好臈茶半兩煉蜜為口梧桐子大三

口再用臈茶湯下

〔烏蝎〕治手足拳攣痛不可忍者

乳香

沒藥研別

地龍去

全蝎去足

草烏各五錢

烏藥炒

麝香兩一

蜈蚣一條去

川烏

二隻生用
去皮尖

右為末麪糊口梧桐子大每服七口至十口十五口用麝香少許好小酒送下空心服服至七日略利至半月或滿身發風丹經月方沒多服其病安全后常用生川烏沒藥浸酒日二服通氣驅風湯加乳香沒藥生川烏麝香少許酒調服不飲木瓜湯下服此忌熱食一時
四神口治手足頑麻痰涎壅盛頭目昏眩肩背拘急

大天麻

大南星

各湯洗淨

防風

去芦

各

薄荷葉

兩半

右為末酒煮薄麪糊口菘豆大每服二十口荆

芥生薑煎湯送下

腎瀝湯腎虛為厲風所傷語音蹇吃不轉偏枯胫脚踏蹇緩弱不能動口喎言音混濁便利耳聾塞腰背相引

羊腎一具

黃耆

芎藭

桂心

當歸

人參

防風

甘草

五味子

玄參

芍藥

茯苓

磁石

一兩七錢

地骨皮

五錢

生薑

二兩

右剉散以水一斗煮羊腎取五升下諸藥取二

升分三服服

乳香尋痛口治中風癱瘓不遂手足躡曳口眼喎

斜或旋運僵仆涎潮搐搦卒中急風不省人事每服二十口黑豆淋酒下風虛眩冒項筋拘急太陽穴疼痛亦用生地黃汁調酒下腰脚疼重行步艱辛筋脉攣促俛仰不利賊風所中痛如錐刺皮膚頑厚麻痺不仁或血脉不行肌肉乾瘦生慈酒下或生慈茶亦可風濕脚氣腿膝無力或腫或疼不能舉步兩脚生瘡膿血浸漬痒痛無時愈而又發温鹽酒下打撲閃肭筋骨内損已經多年每遇天寒時發疼痛沒藥酒下

乳香 川烏 沒藥
五靈脂 白膠香 地龍
白薑 半夏 五加皮

赤小豆 各等分
右為末糊口隨證湯引如前並空心服

〔牛黃清心〕治諸風緩縱不隨語言蹇澁痰涎壅盛心怔健忘或發顛狂並皆治之

白芍藥 一兩
甘草 五兩 炒
黃芩 各一兩
大棗 一兩 伯核 研成膏
蒲黃 兩半 炒
肉桂 兩半 皮
防風 苗 去
麝香
柴胡 苗 去
乾山藥 七兩
杏仁 去皮 尖 取仁 炒
桔梗 各二錢 半
麥門冬 去心 炒
大豆黃卷 炒
白斂 七錢
白朮 各半
當歸 苗 去
龍腦 一兩 研
羚羊角末
人參 兩半

白茯苓皮去

阿膠七錢半

雄黃八錢

芎藭

牛黃

金箔

各一兩 二錢半 炮七

錢一兩 二 犀角末 二

內一千二百 為衣

右除棗杏仁金箔二角末及牛黃麝香雄黃龍腦四味別為末入餘藥和勻煉蜜棗膏為口每兩作十口以金箔為衣每服一口食后溫水化下

烏荊口治諸風緩縱手足不隨口眼喎斜言語蹇澁眉目瞶動頭昏腦悶筋脉拘急不得屈伸遍身麻痺百節疼痛皮膚瘙癢抓成瘡瘍又治婦人血風渾身疼痛頭疼眼暈及腸風臟毒下血血下不止服之尤效久服令人顏色和悅力強輕健鬚髮

不白

川烏去皮臍 炮一兩

荆芥穗二兩

右為末醋麪糊口梧桐子大每服二十口酒或

熱水任下有痰食空時日三四服無痰早一服

青州白口子治男子婦人手足癱瘓風痰壅盛嘔

吐涎沫及小兒驚風並皆治之

半夏白好者水浸洗 過七兩生用

川烏頭去皮臍半 兩生用

白附子生二兩用

天南星生三兩用

右為末以生絹袋盛於井花水內擺出未出者更以手揉令出以滓更研再入絹袋擺盡為度放瓷盆中日曬夜露每日一換新水攪而復澄春五日夏三日秋七日冬十日去水曬乾如玉

片碎研以糯米粉煎粥清為口如菜豆大常服
二十口生薑湯下不拘時如癱瘓風溫酒下小
兒驚風薄荷湯下三五口

蘇青口和氣宇散風痰亦可常服

右以蘇合香口方見大方類與青州白口子方見
打和薑蘇湯化下

蛇黃散治暗風忽然仆地不知人事良久方醒

蛇黃醋不以多小米

右為末每服二錢溫酒下數服便愈年深者亦
效

琥珀口治暗風百日内者

天南星二兩火安南星在內即以醋餘火煨令紅

蓋一伏時取出先
去灰土焙乾為末

琥珀者別研

朱砂半兩研
真金箔十片

右拌勻以獾猪心血為口梧桐子大每服十五
口人參或麥門冬湯下臨卧服

辰砂口治暗風年深日近發搐不省人事

好辰砂兩半

好雄黃三錢各研極細

右用烏鷄心內血和口梧桐子大每服十口以
煮獾猪心湯吞下如不省人事則灌下仍灸百

會穴九壯

妙應口治諸風攣急遍體疼痛遊走無定百藥所
不效者

穿山甲

十五片石

全蝎

去毒三

蜈蚣

生用

麝香一字別研

沒藥研別

班猫漆筒糯米炒去頭足

五靈脂三錢沙石去

草烏生去皮

乳香別研各

白僵蠶薑汁炒

白僵蠶薑汁炒

地龍去土

松脂兩半

右為末酒糊口菜豆大青黛為衣每服二十口不拘時温酒送下忌食熱物

〔大九寶飲〕治挾氣中風已微微去其痰或非重熱氣實者亦可服

天雄氣弱者以

南星炮

薄荷葉

地龍翅去

木香

全蝎

防風

沉香各等

麝香別入

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎熟入

麝香啜服不拘時候

〔烏附口〕去風疎氣

川烏二十枚或用草烏一斤第功

香附子半斤薑汁淹一宿炒

右焙乾為末酒糊口量數服之若只用草烏當防其麻木人也然肌體肥壯之人及有風疾人宜常服

〔葳靈仙口〕治腎臟風壅積滯腰膝沉重

葳靈仙酒洗酒浸

右為末煉蜜口梧桐子大更初服用温酒下八十口平明微利惡物如青膿即是風毒積滯也如未動其夜再服百口后喫少粥補之

積肝口主四肢攣縮不伸等證曾有人自幼年酒
多長而風痰為酒使痰注骨節四肢不能運動服
此有效

茯神心木

白茯苓 去皮

姜黃

白朮 炒

黃耆

羌活

五加皮

川烏 炮去
皮臍

薏苡仁

木瓜 去
穢皮

半夏麴

神麴 炒

天雄 炮
皮去

白芍藥

乳香 別
研

沒藥 研

防風

獨活

當歸

玄胡索

桑寄生

海桐皮 去
皮麩

木香

陳皮 去
白

枳殼 去
穢

南星 炮

地龍 去
土

荆芥穗 各五
錢

麝香 一
錢

右用積肝一具洗淨煑存性研爛同酒麴為糊
口如梧桐子大每服三十口溫酒吞下不飲水
瓜湯下

皂角六一口疎風活血起癱瘓除脚疾烏鬚髮駐
紅顏肌肉不緊實人生風證切宜此藥

川烏

草烏 各一
兩

天台烏藥

何首烏 各二
兩

猪牙皂角 五條湯泡
去皮

烏梅 去
核

烏豆 一
升

右剉如指面大以冬月無灰酒好醋各二升浸
一宿瓦銚內慢火煎乾取出曬焦揀何首烏一
味別為末煑膏六味焙乾為末以前煑藥餘酒

醋及何首烏膏和口每服三十口酒吞下

〔金汞靈丹〕治卒暴中風奄忽手足躄曳口面喎斜
舌強痰盛搐搦戰掉或角弓反張目睛正視口禁
閉絕每日三服中風數年不能步履服至十口復
舊新中風三服可無事常服半口滋養五臟補益
真元通流關節祛逐風邪強筋健骨

金箔一錢半以火煨過用法酒
水銀兩一辰砂兩半好硫黃兩一

自然銅肆兩搗細末用甘草一鍋子一箇盛之不

生犀角半兩乳冷取出於地搗細末以炭一斤同四味同入

白僵蠶絲炒去羚羊角三錢乾蝎毒炒去藿香葉各半

官桂兩一烏蛇三兩洗酒浸皮骨浸
白花蛇同製白木炒剝去皮骨白芷
川芎製破故紙炒葶澄茄去

羌活去當歸法酒浸防風去
牛膝酒浸一鹿茸火燉去毛酥
附子炮去川烏炮去皮尖各
沉香半兩天麻一兩木香三錢
安息香半兩白附子炒

右先將二十六味為末却連前五味拌和入安
息香膏搜和再入白中杵伍伯下每一兩作十
口每服一口空心細嚼溫酒吞下
〔香附湯〕治十手足指疼痛麻木

香川烏炮去皮 草烏炮去皮 地龍去土

天南星炮各 乳香 沒藥研二

右為末入研藥和勻酒麪糊為口梧桐子大每

服止十口空心日午冷酒送下荆芥茶亦可

治諸風疾夫風之為病半身不遂口眼喎

斜手足拘攣或生痺曳語言蹇澁心多驚悸其狀

多端各隨所中由氣血俱虛腠理疎弱風邪外中

真氣失守邪正相干而生焉

自然銅一斤好者用生鉄銚子內或以炭火一

氣其葉乃成漸冷取如葉有五色者甚妙

然後安向淨黃濕土上著紙先曬其葉用盆

以水合之淘得通風者一宿取出火毒洗淘又取濃

者三五度淘黑澄定去酒水用陸瓦盆內將紙

觀者令自乾如黑粉一同秤陸兩用紙候炮

製后葉了當却入 川烏四兩 麻黃三兩 黑附子炮裂

烏蛇酒浸一夕 厚朴去麁皮 防風

蒼朮炒麩 川芎 陳皮

白芷 白朮炒黃各 芍藥

吳茱萸各兩 南星兩半

右為末與自然銅粉相和勻搗細煉蜜口梧桐

子大臈月合甚妙男女中風癱瘓半身不遂

起止不能者空心服臨卧豆淋酒下一粒六十

日內必瘥男女患筋骨腰膝疼痛走注不定

坐則刺腰卧則刺背行即入脚跟亦用豆淋酒

下須更以葱粥一盞投之衣被盖覆出汗然後

更喫一粒必差或患五七日間未得汗亦如前法服纔入口汗即出便安依法服二十日定愈治破傷風頑麻風暗風偏風並用豆淋酒下一粒至二粒即見功效 丈夫元臟氣虛臍下撮痛不可忍以擯榔一箇酒磨一半入生薑自然汁少許同煎五七沸研二粒服之須臾以小麥麩醋拌炒熨臍下便止 治痲痺氣發時有搐得兩頭相就者用擯榔一箇中分破半生用半炙黃一處為末酒一盞葱白一握同一處煎葱熟傾盞內候酒得所時先呷兩口擯榔酒葱白和藥一粒爛嚼以煎酒嚥之但依法服立效須臾間下泄三二度隨即便愈凡些小風疾

即一服差忌動風有毒物休食

〔左經〕治左癱右瘓手足顫掉言語蹇澁渾身疼痛筋骨拘攣不得屈伸項背強直下疰脚膝行履艱難骨節煩疼不能轉側跌撲閃肭外傷內損並皆治之

草烏 炮四兩

川烏 炮去皮二兩

乳香 研

沒藥 各一兩

生黑豆 一升以班貓二十介去頭足同煮候豆脹為度去班貓取豆焙乾入

右為末醋糊口梧桐子大每服三十口温酒下不拘時常服通經絡活血脈疎風順氣壯骨輕身

〔川芎散〕治鷄爪風手口搖動不能舉物

五加皮

海桐皮

川烏

牡丹皮

川芎

赤芍藥

各五錢

乾薑

肉桂

各一錢

右為末每服三錢水一盞將古銅錢一箇入清油內浸每煎藥入錢同煎不拘時服

〔枳實酒〕治遍身白疹瘙痒不止切不可全用風藥

治之蓋寒邪伏於肌膚相搏凝滯而成瘡或天色

冷則重或因患風中若遇天晴日暖則輕宜用〔烏

藥順氣散〕為妙更用此酒服累用神效

順氣散方見前

枳實

不拘多少麩炒黃切片

右到散每服貳大錢用酒浸少時去枳實但飲酒最妙用枳實煎水洗患處佳

〔貼藥芫花散〕治臂腿間忽一兩點痛著骨不可忍

芫花根研為末米醋調隨大小傅之

〔天仙膏〕治卒中風口眼喎斜

南星

大者一介

白及

草烏

大者一介

僵蠶

七箇

右為末用生鱈魚血調成膏傅喎處覺正便洗去

〔洗方〕治風損風腫及瘡等石楠葉馬鞭草貼壁草

煎湯洗

〔燒竹瀝法〕新竹截尺許長用兩磚對立相去八寸

置竹在上每截破二片仰安磚上急著火磚外兩頭各置碗以盛瀝瀝盡以絹瀘澄清夏秋須沉冷

水中防溼酸大熱有風人亦可單服冷煖隨人勿過度荆瀝亦然

(灸法)治口喎斜即效

耳垂下麥粒太艾炷三壯左灸右右灸左

(洗方)治痰涎壅塞聲如牽鋸服藥不下宜於關元丹田二穴多灸之良

治卒中風口噤不開灸頰車二穴在耳下八分

小近前灸伍壯隨愈中風失瘖不能言語緩縱

不隨先灸天倉二穴五拾壯其穴在頸大筋前

曲頰下扶突穴后動應手陷中息火仍移灸百

會穴伍拾壯其穴在頂正中心灸畢還灸天倉

五拾壯始發先灸百會則風氣不得泄內攻五

臟喜閉伏仍失音也所以先灸天倉次百會佳

一灸伍拾壯悉泄火勢復灸之視病輕重重者

一處三百壯大效凡中風服藥劇者但是風穴

悉皆灸之三壯無不愈也勿疑惑不至心者勿

浪盡灸

癘風

(得效第一方)治癘風即大風惡疾癘是也雖名曰

風未必皆因風大率多是嗜慾勞動氣血熱發汗

泄不避邪風使淫氣與衛氣相干則肌肉不仁勞

氣位濁則腑熱不利故色敗皮膚瘍潰鼻梁闌壞

或自作不仁極猥之業所致久則或遍身白皮脫

落如蛇蛻狀

右用桑枝灰一斗熱湯淋取汁洗頭面次用大豆及菘豆漿添熱水三日一次一日一洗面却用側柏葉蒸曝乾白膠香各等分為末蜜口溫水下三七粒日三服

〔仙方〕治大風惡疾雙眼昏咫尺不辨人物髮眉自落鼻梁崩倒肌膚瘡如苔蘚勢若不可救此方特效

右用皂角刺三斤炭火蒸久曬乾為末濃煎大黃湯下一匕服旬日間眉髮再生肌膚悅潤眼目愈明

〔解毒雄黃〕治多啖炙燔成此癘風茶清下三四服效方見大方科續熱類

〔浴法〕

麻黃根

地骨皮

草烏頭各二兩

右剉散研朴消二兩勻和每用藥一兩水一桶椒一合葱三十莖艾葉一兩同煎十沸用米醋一中盞又打勻去滓坐溫室中自用手巾搭四肢候湯可浴即浴令汗透面上如珠流更坐室中或睡片時尤佳汗解方著衣避風而出五日再浴如此兩上浴便服換骨丹

〔換骨散〕

九肋鱉甲

海蜈蚣

知到各二兩

右以鹽泥固濟候乾火煨存二分性為末巴豆半兩去皮膜順手研青州棗朮枚去核入巴豆

膏在棗中火燒令焦存巴豆五分性將棗巴豆
研爛如泥入前二味末研勻以醋煮糊口如棗
豆大每服七口虛中四五口用溫蠶汁下候利
惡物如膿血爛魚腸即住三兩服未利更加三
口次服遇仙丹

〔遇仙丹〕

人參

紫參 各一兩

苦參 二兩

白僵蠶 去鬚 二兩

右為末麪糊口梧桐子大每服三十口溫鹽湯
吞下食前日二服次服疎風散

〔疎風散〕

山梔子仁 半兩

大黃 白滑石

熟地黄

右為末入朴消半兩令勻每服一錢食后淡茶
清調下次以佛手膏

〔佛手膏去黑紫瘡核〕

班猫 翅七介去

巴豆 七粒去皮

杏仁 二十粒去皮

砒霜 一錢別研

紅娘子 二錢去翅足

盆硝 一兩

黃蠟

韶粉 各半兩

瀝青 兩研

硫黃

黃丹 各三錢

膩粉 兩炒

棗豆 合一

槐角 二條

清油 兩四

亂髮 一兩

右用油煎令髮化次下紅娘子次下巴豆槐角
等逐味下焦者瀉出方下硫黃盆消及丹粉等
以篋子不住手攪令勻滴水成珠為度用時先

將針刺瘡核用藥一粟米大放針處次日擠瘡
有黑臭膿血出三兩日血漸少次服去毒丹
〔去毒丹〕

赤芍藥

甘草

白滑石各半

朴硝

大黃各一分

巴豆去皮炒別研后入

黑牽牛生一兩半炒

右為末麪糊口菜豆大臨卧服十五口金銀薄
苛湯下加至三十口次服甘草散

〔甘草散〕

甘草

白滑石各半

山豆根一兩

大黃一分

右為末每服一錢蜜湯調下日二服次服解毒口

〔解毒口〕

苧萋根三兩

甘草半兩

大黃一分

朴消一分別研

右為末麪糊口如菜豆大每服二十口至三十
口白湯下次服福神丹

〔福神丹〕

訶子四箇

巴戟炒

黑牽牛洗各半兩

甘遂三錢

赤小豆四十九粒

右為末麪糊口菜豆大每服十口至五十口薄
苛湯下次用水膏藥

〔水膏藥〕傳貼破處及面脚上瘡令生肉

陳皮去灰土半斤炒紫色

陳米半斤

藿香

馬蹄香

一兩

麝香

一錢 別研

右為末入麝香用冷水調掃傳瘡上有膿處如損破即煎槐枝湯洗再上藥此十方廼秘傳有驗大要病人須能如法將息理會敬而信之

通天再造散治大風惡疾

鬱金

一兩

大黃

一兩

白牽牛

六錢半 生半炒

皂角刺

一兩 炮 經年者

右為末每服五錢日未出面東以無灰酒下盡量為度晚利黑頭小虫病稍輕者止利如魚腸臭穢物忌毒半年但食稠粥軟飯漸漸頭毛皮膚如常甚者不過三兩次須將理不可妄有勞動及終身不得食牛馬驢騾等肉犯者死不救

三濟口治如前

當歸

熟地黃

川芎

荆芥穗

各二兩

防風

北細辛

各一兩 去葉

桂心

右剉散先以醋一升浸一宿漉出焙乾再以生地黃一斤擣汁浸一宿焙乾酒一升浸一宿焙乾旋入乳香半兩以餘酒醋地黃汁釋蒸餅為口梧桐子大用好川烏頭一箇炮裂剉荆芥穗半兩浸酒三升旋溫下藥五十口

八葉湯淋沫大風瘡

桑葉

荷葉

地黃葉

皂角葉

蒟葉

蒼耳葉

菖蒲葉

何首烏葉

右等分晒乾燒存性為末如面藥用洗手面身體大風惡疾瘡癩茶毒膿汁淋瀝眉鬚墮落手足指脫頑痺痛痒顏色枯痒鼻塌眼爛齒豁唇揭病證之惡無越於斯負此病者百無一生猶且愛戀妻孥復著名利不仁之行死而無悔深可悲傷凡遇此疾切須戒鹽及一切口味公私世務悉宜屏置

瘕風

〔排風湯〕治五臟風瘕風亦治風毒脚氣腫痛每服二錢水一盞半生薑四片煎溫服前方見
〔加減續命湯〕治中風諸風迷仆涎潮舌強語蹇或

昏潰痿痺或厥冷拘攣不論表裏淺深服之效前方見

〔蘇合香〕理氣氣和則風散方見大方

〔不換金正氣散〕服之則氣順血行瘕風自解方見大方

科傷寒類

〔一粒金丹〕疎風健筋骨方見前

〔大鐵彈〕治諸風癱瘓

川烏炮去皮臍

川五靈脂兩四

乳香

沒藥各一兩 生麝錢一

右乳香以乾竹葉包裹用熨斗火熨過即研成末餘藥末和勻再碾滴水口彈子大每服一口薄芎酒磨下

〔大四斤口〕治風寒濕毒與血氣搏筋骨緩弱四肢

瘡疼痒痛

天麻

肉荻蓉

洗酒焙
用仔酒

川牛膝

去苗

宣州木瓜

虎骨

酥炙各
二兩

大當歸

分三

乳香

沒藥

五靈脂

各半
兩

生麝香

一錢

右為末浸藥酒煮麪糊口梧桐子大每服三四

十口食前温酒或豆淋酒下未效木瓜湯下亦

治脚氣

歷節風

羌活湯治白虎歷節風短氣自汗頭眩欲吐手指

攣曲身體魁瘰其腫如脫其痛如掣因體虛飲酒

當風汗出入水受風寒濕毒之氣凝滯筋脉蘊於

骨節或在四肢肉色不變晝靜夜劇痛徹骨如虎

啣不可忍久不治令人骨節蹉跌一名癘風須大

作湯口救治不可以淺近之劑則無驗

羌活

去芦
二兩

附子

炮去
皮

秦艽

去
芦

桂心

不見
火

木香

不見
火

川芎

當歸

去
芦

川牛膝

去芦
酒浸

桃仁

去皮尖
去炒

骨碎補

防風

去芦
一兩

甘草

炙半
兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎不拘

時温服

越痛口治走注歷節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷

損

草烏頭

三兩去
皮

熟地黄

或生
者

南星

半夏麴

白僵蠶

烏藥 各半兩 並日乾

右為末酒糊口梧桐子大每服五七粒空心日

午夜卧温酒下如跌撲傷損痛甚薑汁和酒研

十粒塗傷處卒中倒薑汁茶清研五七粒灌下

立醒

附子八物湯治歷節風四肢疼痛如槌鍛不可忍

附子 炮去皮

乾薑

芍藥

茯苓

甘草 炙

桂心 各三兩

白朮 四兩

人參 三兩

右剉散每服四大錢水二盞煎食前服一方去

桂心用乾地黄二兩

烏頭湯治病歷節痛不可屈伸

烏頭 五枚剉以蜜二升煎取一升去烏頭

甘草

麻黃 節去

芍藥

黃耆

右剉散每服四錢水盞半煎去滓投蜜再煎空

心服或加老薑桂心大棗不用麻黃黃耆治寒

疝腹中絞痛賊風入腹攻五臟拘急不得轉側

叫呼發作有時使人手足厥冷

虎骨散治白虎風肢節疼痛發則不可忍或痒痛不得屈伸

虎骨 酥炙二兩

花蛇 酒浸取肉

天麻

防風 去蘆

川牛膝 酒浸去蘆

白僵蠶 炒去

川當歸 去蘆酒浸

乳香 研別去毒各

桂心 各一兩

甘草 炙

全蝎 去毒各

麝香 別研

右為末每服一錢溫酒調不拘時服豆淋酒亦

可

麝香口治白虎歷節諸風疼痛遊走無定狀如蟲噬晝靜夜劇一切手足不側疼痛及脚痛

川烏者大八角全蝎二十箇黑豆二十箇

地龍半兩並生用

右為末入麝香半字糯米口菜豆大每服七口甚者十口夜卧令肚空溫酒下微出冷汗一身便差一方加赤足蜈蚣一條以草烏代川烏尤妙

獨活寄生湯治歷節風溫解風寒暑濕之毒亦治

脚氣見方大方科腰痛類

麻黃散治歷節無汗宜發汗

羌活兩一分華陰細辛 黃耆各半兩

麻黃一分兩

右剉散每服五錢水二盞煎接續三四服有汗慎外風

神授口治白虎歷節痛甚肉理枯虛生蟲遊走痒

痛兼治痺疾半身麻木殺傳尸瘵蟲效

正川椒色紅大者去子并合口以黃裨紙二盆蓋以灰圍於爐上炒出汗取頓地上用沙盆弦約時許

右為末老酒浸白糕為糊口梧桐子大每服三

四十口食前鹽湯下治痺痺桂煎湯下腰痛茴

香酒下腎冷鹽湯

〔歷節癘風方〕治手足彎曲骨節間痛甚

草麻子去皮二兩

黃連去鬚到如豆子一兩

右用新水二升於磁瓶內浸藥密封七日后取出逐日侵晨面東以浸藥水吞草麻仁一粒七日后添兩粒微利無妨以療大風亦效

〔白虎風走注癢痛方〕

右用三年釀醋五升熱煎三五沸切葱白三升煮一沸漉出布帛熱裹當病處熨之〔又方〕鷄子搯患處呪三遍願送糞堆頭蓋白虎糞神愛喫鷄子患者下飯用黃脚鷄為炒亦可用抱鷄來壓之其癢自止〔又方〕用芥菜子為末鷄子白傅之

〔攝風酒〕治白虎歷節風及諸般風濕流注四肢大風鶴膝一切風疾四肢拘攣不能坐立凡是骨節去處皆盡浮腫夜痛號哭諸藥不效重者服至兩料愈矣

尋風藤一兩

五加皮一兩 虎脛骨

烏藥

石楠葉

蒼朮各五錢

三角尖一兩石上生者佳

骨碎補七錢

青木香

葳靈仙

川續斷

當歸

乳香

川羌活

北細辛各二錢半

青藤根一兩

川牛膝四錢

防風五錢

南木香二錢

石薜荔一兩石上生者佳

蘇木

甘草節五錢

生薑一兩

大川烏 一雙分作四分 只生用一分

右二十四味剉碎用無灰酒一壺將藥盛於布袋內放酒壺中油紙封縛仍以鍋盛水將壺於鍋內用慢火自辰時煮至午時連壺取出每日不拘時候隨意溫服藥酒如夏月恐停久作酸只半料用小壺酒依上煮服

癩風

何首烏散治肌肉頑麻紫癩白癩風

荊芥穗

蔓荊子皮

蚶蚩草土

葳靈仙洗

何首烏

防風去

甘草各等分

右為末每服二錢食后溫酒調下

如聖膏治癩風詩曰紫癩白癩兩般風附子硫黃

最有功薑汁調勻茄蒂蘸擦來兩度更無蹤

先以布擦洗其瘡令損却以茄蒂蘸藥擦一說

白癩風用白茄蒂紫癩風用紫茄蒂

又方硫黃一兩米醋煮一日海螵蛸二箇並為末

浴后以生薑蘸藥熱擦避風少時數度絕根

又方

雞子一枚用醞醋浸一宿以針刺小穿滴青烱

為汁入砒霜并菜豆末少許和勻用石扎擦破

青布蘸擦

又方

雄黃

硫黃

黃丹

密陀僧

大南星

各等分

又右為末先用薑汁擦患處次用薑蘼葉末擦后
漸黑次日再擦黑散則無恙矣

灸法治白癩風灸左右手中指節宛中三壯末瘡
報之

凡有贅疣諸痣但將艾炷於上灸之三壯即除

得効方卷之十三



