

醫方類聚卷之四十三

傷寒門 十七

傷寒論注解

辨太陽病脉證并治

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之



太陽病項背強几几無汗惡風者中風表實也表也項背強几几無汗惡風者中風表實也表虛宜解肌表實宜發汗是葛根湯發之也

金匱方太陽病無汗而小便反少氣上衝

胃口噤不得語欲作剛痙葛根湯主之

葛根湯方

葛根四兩 麻黃三兩 桂二兩 芍藥二兩 甘草

二兩 生薑三兩 大棗十二枚 芩藥二兩 切二兩 甘草

本草云輕可去實麻黃葛根之屬是也此以中風表實故加二物於桂枝湯中也

右七味咬咀以水一斗先煮麻黃葛根減

二升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一

升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將

息及禁忌

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之

傷寒有合病有併病本太陽病不解併於陽  
明者謂之併病三經俱受邪相合病者謂之  
合病合病者邪氣甚也太陽陽明合病者與  
太陽少陽合病陽明少陽合病皆言必自下  
利有以邪氣併於陰則陰實而陽虛邪氣併  
於陽則陽實而陰虛寒邪氣甚客於二陽二  
陽方外實而不主裏則裏氣虛故必下利與  
葛根湯以散經中甚邪○千金翼方註云用  
上方一云用後葛 太陽與陽明合病不下利  
根黃芩黃連湯 但嘔者葛根加半夏湯主之  
邪氣外甚陽不  
氣下而不上者但下利而不嘔裏氣上逆而  
不下者但嘔而不下利與葛根湯以散其邪  
加半夏以  
下逆氣  
葛根加半夏湯方

葛根四兩 麻黃三兩 去節湯泡生薑 三兩 甘草二兩 芎藭二兩 桂枝二兩 去皮大棗 十二枚 擘半夏 半升 洗半升

右八味以水一斗先煮葛根麻黃減二升去白沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗○無求子活人書葛根四兩 或作一 半夏六錢 麻黃三分 去節湯泡甘草 炙兩 桂枝去芍藥 各半兩○南陽活人書加右 剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗

子一枚水一盞半煮至八分南陽活人書 每服五錢水一盞半煮 至八分去滓溫服覆取微汗

太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促傷寒

論註曰者表未解也喘而汗出者葛根黃連一作縱

黃芩湯主之經曰不宜下而便攻之內虛熱

也而反下之虛其腸胃為熱所乘遂利不止邪在表則見陽脈邪在裏則見陰脈下利脈

微遲邪在裏也促為陽盛雖下利而脈促者知表未解也病有汗出而喘者為自汗出而

喘也即邪氣外甚所致喘而汗出者為因喘而汗出也即裏熱氣逆所致與葛根黃芩黃

連湯散表邪除裏熱

葛根黃芩黃連湯方

葛根 半斤 甘草 二兩炙 黃芩 三兩 傷寒論三兩

黃連 三兩 味苦寒

內經曰甘發散為陽表未解者散以葛根甘草之甘苦以堅裏氣弱苦堅以黃芩黃連

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸

藥煮取二升去滓分溫再服 千金翼 ○無

求子活人書葛根 四兩 ○南陽黃芩 半兩 ○

南陽活人書三分 黃連 六兩 或作一兩半 ○ 甘草

二兩炙 ○南陽活人書半 右剉如麻豆大

每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

日進二三服

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風

無汗而喘者麻黃湯主之 此太陽傷寒也寒

腰痛以至牽連骨節疼痛者太陽經榮血不

利也內經曰風寒客於人使人毫毛畢直皮

膚閉而為熱者寒在表也風并於衛衛實而

榮虛者自汗出而惡風寒也寒并於榮榮實  
而衛虛者無汗而惡風也以榮強衛  
弱故氣逆而喘與麻黃湯以發其汗  
傷寒明理論本草有曰輕可去實即麻黃

葛根之屬是也實謂寒邪在表皮腠堅實榮衛勝津液內固之表實非腹滿便難之內實也聖濟經曰汗不出而腠密邪氣勝而中蘊輕劑所以揚之卽麻黃葛根之輕劑耳麻黃味甘苦用以爲君者以麻黃爲輕劑而專主發散是以爲君也桂枝爲臣者以風邪在表又緩而膚理踈者則必以桂枝解其肌是用桂枝爲臣寒邪在經表實而腠密者則非桂枝所能獨散必專麻

黃以發汗是當麻黃爲主故麻黃爲君而桂枝所以爲臣也內經曰寒淫于內治以甘熱佐以辛苦者茲是類歟甘草味甘平杏仁味甘苦溫用以爲佐使者內經曰肝苦急急食甘以緩之肝者榮之主也傷寒榮勝衛固血脈不利是專味甘之物以緩之故以甘草杏仁爲之佐使且桂枝湯主中風風則傷衛風邪併於衛則衛實而榮弱仲景所謂汗出惡風者此爲榮弱衛強

者是矣故桂枝湯佐以芍藥用和榮也麻黃湯主傷寒寒則傷榮寒邪併於榮則榮實而衛虛內經所謂氣之所并為血虛血之所并為氣虛者是矣故麻黃佐以杏仁用利氣也若是之論實處方之妙理制劑之淵微該通君子熟明察之乃見功焉

麻黃湯方

麻黃 三兩味甘節 桂枝 二兩去皮味辛熱 甘草 二兩 杏仁 七十個湯去皮尖

喘不甚用

五十枚

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛麻黃甘草開肌發汗桂枝杏仁散寒下氣

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息千金翼方 ○無求子活人書太陽病頭痛發熱身疼惡風無汗而喘者宜服 太陽陽明合病喘而胃滿不可下宜服 太陽病十日以去脉浮細而嗜臥者外已解也設胃

滿者與小柴胡湯脉但浮無餘證者與服之  
 太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已  
 微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也此主之  
南陽活人書此下云脉浮者病在表可發汗宜麻黃湯  
 傷寒脉浮緊不發汗因衄此主之  
已上屬太陽  
 陽明病脉浮無汗而喘發汗則愈宜服  
 脉但浮無餘證者與服若不溺腹滿加噦者不治  
已上屬陽

明甘草 半兩 桂枝 一兩 杏仁 三十五箇去皮  
炙 書二十 麻黃 一兩半去節百沸湯 右剉如  
五介 麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八分去滓温服覆取微汗不須歡粥  
加減傷寒熱病藥性須涼不可太温夏至後麻黃湯須加知母半兩石膏一兩黃芩一分蓋麻黃湯性熱夏月服之有發黃斑出之失唯冬及春與病人素虛寒者乃用正方不在加減

太陽與陽明合病喘而胃滿者不可下宜麻

黃湯主之陽受氣於胃中喘而胃滿者陽氣

為實當下之此以為胃滿非裏實故不可下

雖有陽明然與太陽合病為屬表是與麻黃

汗發太陽病十日以去脉浮細而嗜卧者外

已解也設胃滿脇痛者與小柴胡湯脉但浮

者與麻黃湯十日以去向解之時也脉浮細

而嗜臥者表邪已罷也病雖已

利解之若脉但浮而不細者則邪太陽中風

金但在表也與麻黃湯發散之

千金方中脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出

而煩躁者大青龍湯主之若脉微弱汗出惡

風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆

也大青龍湯主之此中風見寒脉也浮則為

風風則傷衛緊則為寒寒

則傷榮榮衛俱病故發熱惡寒身疼痛也風

並於衛者為榮弱衛強寒並於榮者為榮強

衛弱今風寒兩傷則榮衛俱實故不汗出而

煩躁也與大青龍湯發汗以除榮衛風寒若

脉微弱汗出惡風者為榮衛俱虛反服青龍

湯則必亡陽故生厥逆筋惕肉瞤此治之逆

大青龍湯方

麻黃六兩去節桂枝二兩去皮味辛熱甘

草二兩炙杏仁四十个去皮生薑三兩切

大棗十二枚擘味甘溫石膏如雞子大碎味甘微

寒

辛甘均為發散然風宜辛散寒宜甘發汗  
辛甘相合乃能發散榮衛之風寒麻黃甘  
草石膏杏仁以發散榮中之寒  
桂枝薑棗以解除衛中之風

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上  
沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升取微  
似汗汗出多者溫粉粉之一服汗者停後  
服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也千金  
同翼方○千金方右七味咬咀以小九升煮

麻黃去沫乃內諸藥煮取三升分服一升  
厚覆當大汗出溫粉粉之即止不可再服  
服之則筋惕肉瞤此為逆也不汗乃再服  
傷寒明理論青龍東方甲乙木神也應春  
而主肝專發生之令為敷榮之主萬物出  
甲開甲則有兩岐肝有兩葉以應木葉所  
以謂之青龍者以發散榮衛兩傷之邪是  
應肝木之體耳桂枝湯主中風麻黃湯主  
傷寒二者發散之純者也及乎大青龍湯

則不然雖爲發汗之劑而所主又不一必也中風脈浮緊爲中風見寒脈是風寒兩傷也傷寒脈浮緩爲傷寒見風脈是風寒兩傷也風兼寒寒兼風乃大青龍湯專主之也見茲脈證雖欲與桂枝湯解肌以祛風而不能已其寒則病不去或欲以麻黃湯發汗以散寒而不能去其風則病仍在茲仲景所以特處大青龍湯以兩解之麻黃味甘溫桂枝味辛熱寒則傷榮必以甘

緩之風則傷衛必以辛散之此風寒兩傷榮衛俱病故以甘辛相合而爲發散之劑表虛膚緩者則以桂枝爲主此以表實腠理密則以麻黃爲主是先麻黃後桂枝茲麻黃爲君桂枝爲臣也甘草味甘平杏仁味甘苦苦甘爲助佐麻黃以發表大棗味甘溫生薑味辛溫辛甘相合佐桂枝以解肌石膏味甘辛微寒風陽邪也寒陰邪也風則傷陽寒則傷陰榮衛陰陽爲風寒兩

傷則非輕劑所能獨散也必須輕重之劑以同散之乃得陰陽之邪俱已榮衛之氣俱和是以石膏為使石膏為重劑而又專達肌表者也大青龍湯發汗之重劑也非桂枝湯之所同用之稍過則又有亡陽之失經曰若脈微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也又曰一服汗者停後服若復服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也即此劑之劑之輕重可見

矣其用湯者宜詳審之麻黃君六兩桂枝

臣二兩甘草佐一兩杏仁佐四十枚生薑佐

兩大棗佐十枚石膏使如雞子大碎石七味以水九

升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取

三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者

溫粉粉之一服汗者停後服若復服汗多

亡陽遂虛一作惡風煩躁不得眠也

傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰

證者大青龍湯發之此傷寒見風脈也傷寒者身疼此以風勝故身

不疼中風者身重此以兼風故乍有輕時不  
 久厥吐利無少陰裏證者為風寒外甚也其  
 散表中風寒傷寒表不解心下有水氣乾  
 嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少  
 腹滿或喘者小青龍湯主之傷寒表不解心  
 寒相搏肺寒氣逆故乾嘔發熱而欬針經曰  
 形寒飲冷則傷肺以其兩寒相感中外皆傷  
 故氣逆而上行此之謂也與小青龍湯發汗  
 散水水氣內瀆則所傳不一故有或為之證  
 隨證增損以解化之

傷寒明理論青龍象肝木之兩岐而主兩  
 傷之疾中風見寒脉傷寒見風脉則為榮

衛之兩瀉故以青龍湯主之傷寒表不解  
 則麻黃湯可以發中風表不解則桂枝可  
 以散惟其表且不解而又加之心下有水  
 氣則非麻黃湯所能發桂枝湯所能散乃  
 須小青龍湯始可祛除表裏之邪氣耳麻  
 黃味甘辛溫為發散之主表不解應發散  
 之則以麻黃為君桂枝辛熱甘草味甘平  
 甘辛為陽佐麻黃表散之用二者所以為  
 臣芍藥味酸微寒五味子味酸溫二者所

以爲佐者寒飲傷肺咳逆而喘則肺氣逆  
內經曰肺欲收急食酸以收之故用芍藥  
五味子爲佐以收逆氣乾薑味辛熱細辛  
味辛熱半夏味辛微溫三者所以爲使者  
心下有水津液不行則腎氣燥內經曰腎  
苦燥急食辛以潤之是以乾薑細辛半夏  
爲使以散寒水逆氣收寒水散津液通行  
汗出而解矣心下有水氣散行則傳不一  
故又增損之證若渴者去半夏栝樓根水

畜則津液不行氣燥而渴半夏味辛溫燥  
津液者也去之則津液易復栝樓根味苦  
微寒潤枯燥者也加之則津液通行是爲  
渴所宜也若微利去麻黃加芫花水氣下  
行瀆入腸間則爲利下利者不可攻其表  
汗出必脹滿麻黃專爲表散非下利所宜  
故去之芫花味苦寒酸苦爲湧泄之劑水  
去利則止芫花下水故加之苦噎者去麻  
黃加附子經曰水得寒氣冷必相搏其人

卽噎又曰病人有寒復發汗胃中冷必吐  
虬噎爲胃氣虛竭麻黃發汗非胃虛冷所  
宜故去之附子辛熱熱則溫其氣辛則散  
其寒而噎者爲當兩相佐之是以祛散冷  
寒之氣若小便不利少腹滿去麻黃加茯  
苓水畜在下焦不行爲小便不利少腹滿  
凡邪客於體者在外者可汗之在內者可  
下之在上者可湧之在下者可泄之水畜  
下焦滲泄可也發汗則非所當故去麻黃

而茯苓味甘淡專行津液內經曰濕淫於  
內以淡滲之滲溺行水甘淡爲所宜故加  
茯苓若喘者去麻黃加杏仁喘爲氣逆麻  
黃發陽去之則氣易順杏仁味甘苦溫加  
之以泄逆氣金匱要略曰其形腫者故不  
內麻黃乃內杏子以麻黃發其陽故喘逆  
形腫標本之疾加所同蓋其類矣

小青龍湯方

麻黃

三兩去節  
味甘溫

芍藥

三兩味  
酸微寒

五味子

半升  
味酸

温○得効乾姜三兩味甘草三兩炙細辛  
 方二兩半桂枝三兩去皮味辛熱半夏半升  
 三兩味桂枝○千金方桂心  
 味辛微温○得効方二兩半  
 寒邪在表非甘辛不能散之麻黃桂枝甘  
 草之辛甘以發散表邪水停心下而不行  
 則腎氣燥內經曰腎苦燥急食辛以潤之  
 乾姜細辛半夏之辛以行水氣而潤腎  
 逆而喘則肺氣逆內經曰肺欲收急食酸  
 以收之芍藥五味子之酸以收逆氣而安  
 肺

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上  
 沫內諸藥煮取三升去滓温服一升千金方

三服相去十加減法 若微利者去麻黃

加薤花千金方如雞子熬令赤色下利者

不可攻其表汗出必脹滿麻黃發其陽水

漬入胃必作利薤花下十二水水去利則

止 若渴者去半夏加栝萸根三兩辛燥

而苦潤半夏辛而燥津液非渴者所宜故

去之栝萸味苦而生津液故加之 若噎

者去麻黃加附子一枚炮經日水得寒氣

冷必相搏其人即餒加附子温散水寒病

人有寒復發汗胃中冷必吐衄去麻黃惡  
 發汗 若小便不利少腹滿去麻黃加茯  
 苓四兩水畜下焦不行為小便不利少腹  
 滿麻黃發津液於外非所宜也茯苓泄畜  
 水於下加所當也 若喘者去麻黃加杏  
 人半升去皮尖金匱要略曰其人形腫故  
 不內麻黃內杏人以麻黃發其陽故也喘  
 呼形腫水氣標本之疾千金翼 ○傷寒論  
 且堯花不治利麻黃主喘今此語反之疑

非仲景意

臣億等謹按小青龍湯大要治

水去利則止也又按千金形腫者應內麻  
 黃乃內杏人者以麻黃發其陽故也以此  
 證之豈非得效方右剉散每服五錢水二  
 升煎食前溫服虛噎去麻黃加熟附子一  
 錢小便不利小腹滿加茯苓一錢喘加杏  
 仁七枚去皮尖

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯

已渴者此寒去欲解也小青龍湯主之欬而微喘

者水寒射肺也發熱不渴者表證未罷也與  
 小青龍湯發表散水服湯已渴者裏氣溫水

氣散為欲解也太陽病外證未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝湯  
脉浮弱者榮弱衛強也太陽病下之微喘

者表未解故也桂枝加厚朴杏人湯主之下

大喘則為裏氣太虛邪氣傳裏下氣將脫也下後微喘則為裏氣上逆邪不能傳裏猶在表也與桂枝湯以解外加厚朴杏人以下逆氣

傷寒論桂枝三兩甘草二兩生薑芍藥各三

兩大棗十二枚厚朴二兩炙杏人五十枚不

七味以水七升微火煮取三升去滓溫服

一升覆取微似汗

太陽病外證未解者不可下也下之為逆欲

解外者宜桂枝湯主之經曰本發汗而復下之為逆也若先發汗

治不為逆太陽病先發汗不解而復下之脉浮者

不愈浮為在外而反下之故令不愈今脉浮

故知在外當須解外則愈宜桂枝湯主之經曰

柴胡湯證具而以他藥下之柴胡湯仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆則其惡矣

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不

解表證仍在此當發其汗服藥已微除其人

發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣

重故也麻黃湯主之脉浮緊無汗發熱身疼

九日而表證仍在亦當發其汗既服溫暖發

散湯藥雖未作大汗亦微除也煩者身熱也

邪氣不為汗解鬱而變熱蒸於經絡發於肌

表故生熱煩肝受血而能視始者氣傷榮寒

既變熱則血為熱搏肝氣不治故目瞤也劇

者熱甚於經迫血妄行而為衄得衄則熱隨

血散而解陽氣重者熱氣重也與太陽病脉

麻黃湯以解前太陽傷寒之邪也

浮緊發熱身無汗自衄者愈

衄則熱隨血散二陽併病太陽初得病時發

故云自衄者愈

其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出

不惡寒若太陽病證不罷者不可下下之為

逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣

怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不足言

陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知

痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人

短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何

以知汗出不徹以脉濇故知也

而太陽證未罷者名曰併病續自微汗出不

惡寒者為太陽證罷陽明證具也法當下之

若太陽證未罷者為表未解則不可下當小

汗不汗陽氣不得越數邪無從出擁甚於經  
 故躁煩也邪循經行則痛無常處或在腹中  
 或在四肢按之不可得而短氣但責以汗出  
 不徹更發汗則愈內經曰請過者切之濇者  
 陽氣有餘為身熱無汗是以脉浮數者法  
 濇知陽氣擁鬱而汗出不徹脉浮數者法  
 當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗  
 當自汗出乃解所以然者尺中脉微此裏虛  
 須表裏實津液自和便自汗出愈經曰諸脉  
 熱而浙洒惡寒言邪氣在表也是當汗出愈  
 若下之身重心悸者損其津液虛其胃氣若  
 身重心悸而尺脉實者則下後裏虛邪氣乘  
 虛傳裏也今尺脉微身重心悸者知下後裏  
 虛津液不足邪氣不傳裏但在表也然以津  
 液不足則不可發汗須裏氣實津液足便自

汗出而愈脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假  
 令尺中遲者不可發汗何以知之然以榮氣  
 不足血少故也針經曰奪血者無汗尺脉遲  
 脉浮者病在表可發汗宜麻黃湯得之以候  
 皮膚之氣內經曰其脉浮而數者可發汗宜  
 在皮者汗而發之麻黃湯受邪為病在表故當汗散病常自汗  
 出者此為榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣  
 不共榮氣和諧故尔以榮行脉中衛行脉外  
 復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯風則傷衛  
 寒則傷榮

衛受風邪而榮不病者為榮氣和也衛氣不和也衛氣不和則不能與榮氣和謂亦不能衛護皮膚是邪則不能與榮氣和謂亦不能衛護皮膚是以常自汗出與桂枝湯解病人藏無他病時散風邪調和榮衛則愈

發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯主之

藏無他病裏和也衛氣不和表病也外臺云裏和表病汗出之時發汗則愈傷其時者先其發熱汗出之時發汗則愈傷

寒脉浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之

傷寒脉浮緊邪在表也當與麻黃湯發汗若不發汗則邪無從出擁甚於經迫血妄行因致衄也

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發

汗若頭痛者必衄宜桂枝湯

不大便六七日宜當下若小便清者知裏無熱則不可下經曰小便數者大便必鞭不更反十日無所苦也况此不大更六七日小便清者不可責邪在裏是仍在表也與桂枝湯以解外若頭疼不已為表不能鬱甚於傷寒發汗解半日許經迫血妄行止為衄也

復煩脉浮數者可更發汗宜桂枝湯主之

煩者熱也發汗身涼為已解至半日許身復熱凡脉浮數者邪不盡也可更發汗與桂枝湯

病若發汗若吐若下若亡津液陰陽自和者必自愈

重亡津液則不能作汗必大下之後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得

小便利必自愈因亡津液而小便不利者不  
利必自下之後復發汗必振寒脉微細所以  
愈也然者以內外俱虛故也發汗則表虛而亡陽  
振寒者陽氣微也下之後復發汗晝日煩躁  
肝微細者陰血弱也不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微  
身無大熱者乾薑附子湯主之下之虛其裏  
既下又汗則表裏俱虛陽至於晝陽欲復虛  
不勝邪正邪交爭故晝日煩躁不得眠夜陰  
主陽虛不能與之爭是夜則安靜不嘔不渴  
者裏無熱也身無大熱者表無熱也又無表  
證而脉沉微知陽氣大虛陰寒  
氣勝與乾姜附子湯退陰復陽

乾薑附子湯方

乾薑一兩味辛熱○無附子一枚皮破八

片味辛熱  
內經曰寒淫所勝平以辛熱虛  
寒大甚是以辛熱劑勝之也

右二味以水三升煮取一升去滓頓服食  
同翼方○無求子活人書右剉如麻豆大每

服五錢匕水一盞半南陽活人書煎至七  
分傷寒活人去滓温服未知再服

發汗後身疼痛脉沉遲者桂枝加芍藥生姜

各一兩人參三兩新加湯主之

汗後身疼痛邪氣未盡也

脉沉遲榮血不足也經曰其脉沉者榮氣微也又曰遲者榮氣不足血少故也與桂枝湯以解未盡之邪加芍藥生

姜人參以益不足之血

傷寒論桂枝三兩芍藥四兩甘草二兩人參

三兩大棗十二枚生薑兩右六味以水一斗二

升煮取三升去滓溫服一升本云桂枝湯

今加芍藥生薑人參千金翼方同

發汗後錄下後不可更行桂枝湯汗出而喘

無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯主之

發汗後喘當作桂枝加厚朴杏仁易汗出則喘愈今汗出而喘為邪氣擁甚桂枝湯不能

發散故不可更行桂枝湯汗出而喘有大熱者內熱氣甚也無大熱者表邪必甚也與麻

黃杏子甘草石膏湯以散其邪

麻黃杏仁甘草石膏湯方

麻黃四兩去節味甘溫○總錄杏人五拾

箇去皮尖味甘甘草味甘石膏半斤碎

裏味

內經曰肝苦急急食甘以緩之風氣通於肝風邪外甚故以純甘之劑發之

右四味以水七升先煮麻黃減二升千金翼方

一二去上沫內諸藥煮取二升翼方去滓

溫服一升本云黃耳杯傷寒論同○無求子活

人書右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一

盞半煮至八分去滓溫服南陽活人書總錄同

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按

者桂枝甘草湯主之發汗過多亡陽也陽受氣於胃中胃中陽氣不

足故病叉手自冒心下悸欲得按者與桂枝甘草湯以調不足之氣

桂枝甘草湯方

桂枝四兩去皮味辛熱○神甘草二兩炙

甘平

桂枝之辛走肺而益氣甘草之甘入脾而緩中

右二味以小三升煮取一升去滓頓服千金

翼方○無求子活人書右剉如麻豆大每

服抄五錢匕水一盞半煮至八分去滓溫

服南陽活人書同

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝

甘草人棗湯主之汗者心之液發汗後臍下悸者心氣虛而腎氣發動

也腎之積名曰奔豚發則從少腹上至心下為腎氣逆欲上凌心今臍下悸為腎氣發動

故云欲作奔豚與茯苓桂枝甘草大棗湯以降腎氣

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓半斤味甘平 甘草二兩炙味甘平 大棗十枚擘

十五枚擘 桂枝四兩去皮

茯苓以伐腎邪桂枝能泄奔豚甘草大棗之甘滋助脾土以平腎氣煎用甘爛水者

揚之無力取不助腎氣也

右四味以甘爛水一斗翼方以一斗先煮茯苓

減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升

日三服作甘爛水法取水二斗置大盆內

以杓揚之水上珠于五六千顆相逐取用之

發汗後腹脹滿者厚朴生姜甘草半夏人參

湯主之吐後腹脹與下後腹滿皆為實言邪氣乘虛入裏為實發汗後外已解也

腹脹滿知非裏實由脾胃津液不足氣滯不通壅而為滿與此湯和脾胃而降氣

厚朴生姜甘草半夏人參湯方

厚朴半斤去皮 生姜半斤切 半夏半升洗

人參二兩炙 甘草二兩炙

內經曰脾欲緩急食甘以緩之用苦泄之厚朴之苦以泄腹滿人參甘草之甘以益

脾胃半夏生姜之辛以散滯氣

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一

升日三服千金翼方同

傷寒若吐若下後千金翼方傷寒心下逆滿

氣上衝胃起則頭眩脉沉緊發汗則動經身

為振振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯主之吐下

後裏虛氣上逆者心下逆滿氣上衝胃表虛

陽不足起則頭眩脉浮緊為邪在表當發汗

脈沉緊為邪在裏則不可發汗發汗則外動

經絡損傷陽氣外虛則不能止持諸脉

身為振振搖也與此湯以和經益陽

### 茯苓桂枝白朮甘草湯方

茯苓四兩味 桂枝二兩去皮 白朮三兩味

甘草二兩炙

陽不足者補之以甘茯苓白朮生津液而益陽也裏氣逆者散之以辛桂枝甘草行陽散氣

右四味以水六升煮取三升去滓分溫三

服○無求子活人書右剉如麻豆大每服

五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服南

活人書傷寒御藥院方治心下逆滿氣上

衝胃時發煩渴白茯苓去皮甘草炮白朮

各二官桂去麤皮右咬咀每服五錢水一

兩大盞煎至七分去滓溫服不拘時候

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附

子湯主之發汗病解則不惡寒今發汗病且不解

解又反惡寒者榮衛俱虛也汗出則榮虛惡寒則衛虛與芍藥甘草附子湯以補榮衛

芍藥甘草附子湯方

芍藥三兩味酸微寒甘草三兩炙味甘平附子一枚炮去皮破八片

味辛熱○千金翼方傷寒論南陽活人書六片

芍藥之酸收斂津液而益榮附子之辛溫固陽氣而補胃甘草之甘調和辛酸而安

正氣

右三味以水五升翼方三升煮取一升五合翼方

一升去滓分溫服傷寒論翼方三服疑非仲景意

○無求子活人書右剉如麻豆大每服五

錢匕水一盞半煎至七分去滓溫服南陽活人書傷寒活人書同

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯

主之發汗若下病宜解也若病仍不解則發汗外虛陽氣下之內虛陰氣陰陽俱虛

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯

邪獨不解故生煩燥與茯苓四逆湯以復陰陽之氣

茯苓四逆湯方

茯苓六兩味甘平○傷寒人參一兩味甘温附子一枚生用去皮甘草二兩炙乾薑一兩  
破八片味辛熱味辛熱甘草二兩炙乾薑一兩

辛熱四逆湯以補陽加茯苓人參以益陰

右五味以水五升煮取三升翼方去滓温

服七合日三服○無求子活人書右剉如

麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去

滓温服南陽活人書茯苓一人參八分甘草

二分乾姜三分中附子一个生去皮破右剉如

麻豆大作一服水一盞半煮至八分去滓

温服傷寒活人書茯苓一人參二分甘草乾

姜三字附子八片只用二片也右剉如麻

豆大作一服水一盞半煎至八分去滓温

服今用五錢為率

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也

當和胃氣與調胃承氣湯汗出而惡寒者表虛也汗出而不惡

寒但熱者裏實也經曰汗出不惡寒者此表解裏未和與調胃承氣湯和胃氣○傷寒論註玉函云與太陽病發汗後大汗出胃中乾小承氣湯

煩燥不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者與

五苓散主之發汗已解胃中乾煩燥不得眠欲飲水者少少與之胃氣得潤則愈若脈浮者表未解也飲水多而小便少者謂之消渴裏熱甚實也微熱滑渴者熱未成實上焦燥也與五苓散生津液和表裏

傷寒明理論苓令也號令之令矣通行津液剋伐腎邪專為號令者苓之功也五苓

之中茯苓為主故曰五苓散茯苓味甘平猪苓味甘平甘雖甘也終歸甘淡內經曰味淡滲泄為陽利大便曰攻下利小便曰滲泄水飲內畜當須滲泄之必以甘淡為主是以茯苓為君猪苓為臣白朮味甘溫脾惡濕水飲內畜則脾氣不治益脾勝濕必以甘為助故以白朮為佐澤瀉味鹹寒內經曰鹹味下泄為陰泄飲導溺必以鹹為助故以澤瀉為使桂味辛熱腎惡燥水

畜不行則腎氣燥內經曰腎惡燥急食辛以潤之散濕潤燥可以桂枝為使多飲煖水令汗出愈者以辛散水氣外泄是以汗潤而解也

五苓散方

傷寒論註曰即猪苓散是

猪苓

十八銖味甘平去皮

澤瀉

一兩六銖半味酸鹹

茯苓

十八銖味甘平

甘桂

半兩去皮味辛熱

白朮

十八銖味甘平

淡者一也口入一而為甚而反淡甘緩而淡滲猪苓白朮茯苓三味之甘潤虛燥而利津液散為散為散在枝之辛甘以和泄伏水辛甘發散為散在枝之辛甘以和

肌表

右五味為末

千金翼方各為散更於日中治之

以白飲和

服方寸匕日三服多飲煖水汗出愈

明理論此

下有如法將息四字

○無求子活人書太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水

者少少與飲之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者發汗已脉浮數煩

渴者傷寒汗出而渴者發汗已脉浮數煩

渴者傷寒汗出而渴者發汗已脉浮數煩

風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲

飲水水入則吐名曰水逆者 本以下之  
 故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口  
 燥煩小便不利者 太陽病寸緩關浮尺  
 弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞  
 者此以醫下之也如其不下者病人不惡  
 寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便  
 必鞭不更衣十日無所苦也欲飲水少少  
 與之但以法救之或渴者 霍亂頭痛發  
 熱身疼熱多飲水者並主之澤瀉一分猪

苓 夫黑皮秤 茯苓 夫皮秤 白朮 各三分 桂枝 半斤  
 火石擣篩為散拌和每服抄三錢白湯調  
 下 傷寒活人書同 此藥須各自事持秤見分兩然  
 後合 南陽活人書同

發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之 發汗已浮數者  
 表邪未盡也煩渴亡津液胃 傷寒汗出而渴  
 燥也與五苓散和表潤燥  
 者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之 傷寒  
 汗出而渴者亡津液胃燥邪氣漸傳裏也五  
 苓散以和表裏若汗出不渴者邪氣不傳裏  
 但在表而表虛也與茯苓甘草湯和表合衛

茯苓甘草湯方

茯苓 二兩味甘平 桂枝 二兩去皮味辛熱 生薑 三兩切味辛溫

甘草 一兩炙味甘平

茯苓甘草之甘益津而和衛桂枝生姜之辛助陽氣而解表

右四味以水四升煮取二升去滓分溫三

服 千金翼方同

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲

飲小水入則吐者名曰水逆五苓散主之 中風

發熱至六七日則當解若不解煩者邪在表也渴欲飲水邪傳裏也裏熱甚則能飲水入

則不吐裏熱少則不能消水停瀆不散飲而吐水也以其因水而吐故名水逆與五苓散

和表裏未持脉時病人手叉自胃心師因教

試令欬而不欬者此必兩耳聾無聞也所以

然者以重發汗虛故如此 發汗多亡陽胃中

手叉自胃心師見外證知陽氣不足也又試

令欬而不即欬者耳聾也知陽氣虛明矣耳

聾者陽氣虛精氣不 發汗後飲水多必喘以

得上通於耳故也 水灌之亦喘 喘肺疾飲水多喘者飲冷傷肺

也 肺發汗後水藥不得入口為逆若更發汗必

吐下不止 發汗後水藥不得入口為之吐逆發汗亡陽胃中虛冷也若更發汗

則愈損陽氣胃氣發汗吐下後虛煩不得眠  
大虛故吐下不止發汗吐下後虛煩不得眠  
若劇者必反復顛倒心中懊懣梔子鼓湯主  
之發汗吐下後邪熱乘虛客於胃中謂之虛  
煩者熱也胃中煩熱鬱悶而不得發散者  
是也熱氣伏於裏者則喜睡今熱氣浮於上  
煩擾陽氣故不得眠心惡熱甚則必神昏  
是以劇者反覆顛倒而不安心中懊懣而憤  
悶懊懣者俗謂鶻突是也內經曰其高者因  
而越之與梔子鼓湯以吐胃中之邪

傷寒明理論內經曰其高者因而越之其  
下者引而竭之中滿者瀉之於內其有邪  
者瀆形以為汗其在皮者汗而發之治傷

寒之妙雖有變通終不越此數法也傷寒  
邪氣自表而傳裏留於胃中為邪在高分  
則可吐之是越之之法也所吐之證亦自  
不同如不經汗下邪氣蘊鬱於膈則謂之  
膈實應以芫蒂散吐之芫蒂散吐胃中實  
邪者也若發汗吐下後邪氣乘虛留於胃  
中則謂之虛煩應以梔子鼓湯吐之梔子  
鼓湯吐胃中虛煩者也梔子味苦寒內經  
曰酸苦湧泄為陰湧者吐之也湧吐虛煩

必以苦為主是以梔子為君煩為熱勝也  
湧熱者必以苦勝熱者必以寒香豉味苦  
寒助梔子以吐虛煩是以香豉為臣內經  
曰氣有高下病有遠近證有中外治有輕  
重適其所以為治依而行之所謂良矣

梔子豉湯方

梔子 十四枚擘 香豉 四合解裏

味苦寒 酸苦湧泄為陰苦以湧吐寒以  
勝熱梔子豉湯相合吐劑宜矣  
右二味以水四升先煮梔子得二升半內

豉煮取一升半去滓分為二服溫進一服  
得吐者止後服 千金翼方同

若少氣者梔子甘草豉湯主之

傷寒論梔子 十四箇擘 甘草 二兩 香豉 四合 右

三味以水四升先煮梔子甘草取二升半

內豉煮取一升半去滓分二服溫進一服

得吐者止後服 千金翼方同

若嘔者梔子生姜豉湯主之 少氣者熱傷氣也加甘草以益

氣嘔者熱煩而氣逆也加生姜以散氣少氣則氣為熱搏散而不收者甘以補之可也嘔

則氣為熱搏逆而不散者辛以散之可也

傷寒論梔子十四生薑五兩香豉四合右三

味以水四升先煮梔子生薑取二升半內

豉煮取一升半去滓分二服温進一服得

吐者止後服千金翼方同

發汗若下之而煩熱胃中窒者梔子豉湯主

之陽受氣於胃中發汗若下使陽氣不足邪熱客於胃中結而不散故煩熱而胃中窒

塞與梔子豉湯傷寒五六日大下之後身熱

不去心中結痛者未欲解也梔子豉湯主之

傷寒五六日邪氣在裏之時若大下後身熱

去心胃空者為欲解若大下後身熱去而心

結痛者結胃也身熱不去心中結痛者虛煩

也結胃為熱結胃中為實是熱氣已收斂於

內則外身熱去虛煩為熱客胃中未結為實

散漫為煩是以身熱不去六七日為欲解之

時以熱為虛煩故云未欲解傷寒下後心煩

也與梔子豉湯以吐除之

腹滿臥起不安者梔子厚朴湯主之下後但腹滿而

不心煩即邪氣入裏為裏實但心煩而不腹

滿即邪氣在胃中為虛煩既煩且滿則邪氣

確於胃腹間也滿則不能坐煩則不能臥

梔子厚朴湯方

梔子十四枚厚朴四兩生薑五兩香豉四合右三

味苦寒

厚朴

味苦温 枳實四枚

去穰炒

味苦寒 酸苦湧泄 梔子之苦以湧虛 煩厚朴枳實之苦以泄腹滿

已上三味以水三升半煮取一升半去滓

分二服温進一服得吐者止後服千金翼方同

○無求子活人書梔子大者七枚擘碎厚朴去皮

炙二枳實二枚取去穰右剉如麻豆大分

作二服以水二盞半煎至八分去滓温服

得吐止後服南陽活人書同

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔

子乾姜湯主之丸藥不能除熱但損正氣邪

者則身熱不去而微煩與梔子乾姜湯吐煩正氣乾姜

梔子十四枚擘乾薑二兩味

苦以湧之梔子之苦以吐煩辛以潤之乾姜之辛以益氣

右二味以水三升半者取一升半去滓分

二服温進一服得吐者止後服千金翼方同○

無求子活人書梔子七枚乾薑兩右剉如麻

豆大分二服以水二大盞煎至七分去滓

温服得吐止後服南陽活人書同

凡用梔子湯病人舊微溘者不可與服之人病  
 舊微溘者裏虛而寒在下也雖煩則非蘊熱  
 故不可與梔子湯內經曰先泄而後生他病  
 者治其本必且調太陽病發汗汗出不解其  
 之後乃治其他病  
 人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地  
 者真武湯主之發汗不解仍發熱邪氣未解  
 也心下悸頭眩身瞤動振振  
 欲擗地者汗出亡陽也裏虛為悸上虛為眩  
 經虛為身瞤振振搖與真武湯主之溫經復  
 陽咽喉乾燥者不可發汗津液不淋家不可  
 發汗發汗必便血膀胱裏熱則淋反以湯藥  
 膀胱虛燥瘡家雖身疼痛不可發汗發汗則  
 必小便使血

瘥瘥表虛聚熱則生瘡瘡家身疼如傷寒不可  
 發汗發汗則表氣愈虛熱勢愈甚生風故  
 也變瘥也衄家不可發汗汗出必額上陷脉急緊  
 直視不能眴不得眠衄者上焦津液枯竭經  
 絡乾澁故額上陷脉急緊諸脉者皆屬於目  
 筋脉緊急則牽引其目故直視不能眴眴瞬  
 合目也衄經曰陰氣虛則目不亡血家不可  
 眩亡血為陰虛是以不得眠也  
 發汗發汗則寒慄而振奪針經曰奪血者無汗  
 汗則陰陽俱虛汗家重發汗必恍惚心亂小  
 故寒慄而振搖  
 便已陰疼與禹餘糧凡闕汗者心之液汗家  
 重發汗則心虛脫  
 惚心亂奪汗則無水病人有寒復發汗胃中  
 故小便已陰中疼

類聚四十三  
三十五

冷必吐虬病人有寒則當溫散反發汗損湯氣胃中冷必吐虬也。傷寒論註

日虬一本發汗而後下之此為逆也若先發

作逆

汗治不為逆本先下之而反汗之為逆者先

下之治不為逆病在表者汗之為宜下之為

為逆經曰陽益陰虛汗之則死下之則死傷寒醫

則愈陽虛陰盛汗之則愈下之則死

下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救

裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜

四逆湯救表宜桂枝湯傷寒下之續得下利

急當救裏者以裏氣不定必先救之急與四

逆湯得清便自調知裏氣已和然後急與桂

枝湯以救表身疼者表邪也內經曰病發而

不足標而本之先治其標後治其本此以寒

為卒病發熱頭痛脈反沉若不差身體疼痛

也發熱頭痛表病也脈反

當救其裏宜四逆湯沉者裏脈也經曰表有

病者脈當浮大今脈反沉遲故知愈也見表

病而得裏脈則當差若不差為內虛寒甚也

與四逆湯救其裏太陽病先下之不愈因復發汗

以此表裏俱虛其人因致冒冒家汗出自愈

所以然者汗出表和故也得裏和然後復下

之胃者鬱也下之則裏虛而亡血汗之則表

虛而亡陽表裏俱虛寒氣拂鬱其人因致

冒金匱要略曰亡血復浮寒多故令鬱冒汗

出則拂鬱之邪得解則冒愈金匱要略曰冒

類聚四十三

三十五

家欲解必大汗出汁出表和太陽病未解脉而裏未和者然後復下之  
 陰陽俱停必先振慄汗出而解但陽脉微者先汗出而解但陰脉微者下之而解若欲下之宜調胃承氣湯傷寒論註曰一主之陽俱停無偏勝者陰陽氣和也經曰寸口關上尺中三處大小浮沉遲數同等此脉陰陽為和平雖劇當愈令陰陽既和必先振慄汗出而解但陽脉微者湯不足而陰有餘也經曰陽虛陰盛汗之則愈陰脉微者陰不足而陽有餘也經曰陽盛陰虛下之則愈太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風者宜桂枝湯太陽中風風併於衛則衛實而榮虛榮者陰也

衛者陽也發熱汗出陰弱陽強也內經曰陰虛者陽必湊之故少氣時熱而汗出與桂枝湯解散風邪調和榮衛傷寒五六日中風往來寒熱胃脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胃中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者與小柴胡湯主之病有在表者有在裏者有在表裏之間謂之半表半裏論五六日邪氣自表傳裏之時中風者或傷寒至五六日也玉函曰中風五六日傷寒往來寒熱即是或中風或傷寒非是傷寒再中風中風復傷寒也經曰傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具者正是謂或中風或傷寒也邪在表則寒邪在

裏則熱今邪在半表半裏之間未自定處是以寒熱往來也邪在表則心腹不滿邪在裏則心腹脹滿今止言胃脇苦滿知邪氣在表裏之間未至於心腹滿言胃脇苦滿知邪氣在表裏也默默靜也邪在表則神今不安邪在裏則煩悶亂內經曰陽入之陰則靜默默者邪方自表之裏在表裏之間也邪在表則能食邪在裏則不能食不欲食者邪在表裏之間未至於心不能食也邪在表則不煩不嘔邪在裏則煩滿而嘔煩喜嘔者邪在表方傳裏也邪初入裏未有定處則所傳不一故有或爲之證有柴胡證但見一證便是卽是此或爲之證

傷寒明理論傷寒邪氣在表者必瀆形以爲汗邪氣在裏者必蕩滌以取利其於不

外不內半表半裏又非發汗之所宜又非吐下之所對是當和解則可矣小柴胡爲和解表裏之劑也柴胡味苦平微寒黃芩味苦寒內經曰熱淫於內以苦發之邪在半表半裏則半成熟矣熱氣內傳之不可則迎而奪之必先散熱是以苦寒爲主故以柴胡爲君黃芩爲臣以成徹熱發表之劑人參味甘平邪氣傳裏則裏氣不治甘以緩之是以甘物爲之助故用人參甘草

爲佐以扶正氣而復之也半夏味辛微溫邪初入裏則裏氣逆辛以散之是以辛物爲之助故用半夏爲佐以順逆氣而散邪也裏氣平正則邪氣不得深入是以三味佐柴胡以和裏生薑味辛溫大棗味甘溫內經曰辛甘發散爲陽表邪未已迤邐內傳旣未作實宜當兩解其在外者必以辛甘之物發散故生薑大棗爲使輔柴胡以和表七物相合兩解之劑當矣邪氣自表

未斂爲實乘虛而湊則所傳不一故有增損以禦之胷中煩而不嘔去半夏人參加栝樓實煩者熱也嘔者氣逆也胷中煩而不嘔則熱聚而氣不逆邪氣欲漸成實也人參味甘爲補劑去之使不助熱也半夏味辛爲散劑去之以無逆氣也栝樓實味苦寒除熱必以寒泄熱必以苦加栝樓實以通胷中鬱熱若渴者去半夏加人參栝樓根津液不足則渴半夏味辛性燥滲津

液物也去之則津液易復人參味甘而潤  
枯樓根味苦而堅堅潤相合津液生而渴  
自己若腹中痛者去黃芩加芍藥宜通而  
塞爲痛邪氣入裏裏氣不足寒氣壅之則  
腹中痛黃芩苦寒苦性堅而寒中去之則  
中氣易和芍藥味鹹苦微寒酸性泄而利  
中加之則裏氣得通而痛自己若脇下痞  
鞭去大棗加牡蠣內經曰甘者令人中滿  
大棗甘溫去之則鞭浸散鹹以稟之牡蠣

味酸鹹寒加之則痞者消而鞭者稟若心  
下悸小便不利者去黃芩加茯苓心下悸  
小便不利水畜而不行也內經曰腎欲堅  
急食苦以堅之堅腎則水益堅黃芩苦寒  
去之則蓄水浸行內經曰淡味滲泄爲陽  
茯苓甘淡加之則津液通流若不渴外有  
微熱去人參加桂不渴則津液足去人參  
以人參爲主內之物也外有微熱則表證  
多加桂以取汗發散表邪也若欬者去人

參大棗生薑加五味子乾薑肺氣逆則欬  
甘補中則氣愈逆故去人參大棗之甘五  
味子酸溫肺欲收急食酸以收之氣逆不  
收故加五味子之酸生薑乾薑一物也生  
者溫而乾者熱寒氣內滯則散以辛熱蓋  
諸欬皆本於寒故易生薑以乾薑是相假  
之以正溫熱之功識諸此者小小變通觸  
類而長焉

小柴胡湯方

柴胡半斤味苦微寒 黃芩三兩味苦寒 人參三兩味甘溫 甘草二兩味甘平 半夏半升洗 生薑三兩味辛溫 大棗十二枚擘

內經曰熱滯于內以苦發之柴胡黃芩之  
苦以發傳邪之熱裏不足者以甘緩之人  
參甘草之甘以緩中和之氣邪半人裏則  
裏氣逆辛以散之半夏以除煩嘔邪在半  
表則榮衛爭之辛甘  
解之薑棗以和榮衛

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再  
煎取三升溫服一升日三服 後加減法

若胃中煩而不嘔去半夏人參加枳實一

枚胃中煩而不嘔熱聚而氣不逆也甘者令  
 入中滿方熱聚無用人參之補辛散逆氣  
 既不嘔無用半夏之辛溫熱宜寒療若渴者  
 聚宜苦栝萋實苦寒以泄胃中蘊熱  
 去半夏加人參合前成四兩半栝萋根四兩  
 半夏燥津液非渴者所宜人參甘而潤若腹  
 栝萋根苦而涼徹熱生津二物為當  
 中痛者去黃芩加芍藥三兩去黃芩惡寒中  
 若脇下痞鞭去大棗加牡蠣四兩甘令人中  
 大棗之甘鹹以栗之痞鞭者加牡蠣六兩若心下悸  
 蠶之鹹○千金翼方加牡蠣六兩  
 小便不利者去黃芩加茯苓四兩飲而水畜  
 小便不利內經曰腎欲堅急食苦以堅腎則  
 水益堅故去黃芩淡味滲泄為陽茯苓甘淡

以泄若不渴外有微熱者去人參加桂三兩  
 伏水若不渴外有微熱者去人參加桂三兩  
 溫覆取微汗愈不渴者裏和也故去人參外  
 汗若欬者去人參大棗生薑加五味子半升  
 乾薑二兩欬者氣逆也甘則壅氣故去人參  
 之五味子之醜以收逆氣肺寒則欬血弱氣  
 散以辛熱故易生薑以乾薑之熱也  
 盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下  
 正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲  
 食藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也  
 傷寒論註曰一云藏府相連其痛必下故使嘔也  
 遠其病必下脇膈中痛小柴胡湯主之

氣血隨時盛衰當月郭空之時則為血弱氣盡腠理開疎之時也邪氣乘虛傷人則深針經日月郭空則海水東盛人血氣虛衛氣去形獨居肌肉減皮膚緩腠理開手髮殘賸理薄埃落當是時遇賊風則其入深者是矣邪因正虛自表之裏而結於脅下與正分爭作往來寒熱默默不欲飲食下為自外之內經絡與藏府相連氣隨經必傳於裏故曰其痛下痛一作病邪在上焦為邪高邪漸傳裏為與小柴胡湯以解服柴胡湯已渴者屬陽明半表半裏之邪服小柴胡湯表邪已而渴裏得也以法治之邪傳於陽明也以陽明治之得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足温醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身黃頸項

強小便難者與柴胡湯後必下重本渴而飲水嘔者柴胡湯不中與也食穀者噦得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足温則邪氣在牛表半裏未為實反二三下之虛其胃氣損其津液邪蘊於裏故不能食而脅下滿痛胃虛為熱蒸之重發於外面目及身悉黃也頸攻強者表仍未解也小便難者內亡津液雖本柴胡湯證然以裏虛下焦氣澁而小便難若與柴胡湯又走津液後必下重也不因飲水而嘔者柴胡湯證告木因飲而嘔者水停心下也金匱要略曰先渴却嘔者為水停心下此屬飲家飲水者水停而嘔食穀者物聚而殘皆非小柴胡湯所宜二者皆柴傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足温而渴者小柴胡

湯主之身熱惡風頭項屈者表未解也脇下滿而渴者裏不和也邪在表則手足通熱邪在裏則手足厥寒今手足溫者知邪在表裏之間也與小柴胡湯以解表裏之邪

傷寒陽脉澁陰脉弦法當腹中急痛者先與小建中湯不差者與小柴胡湯主之脉陽澁陰弦而腹中急痛者當作裏有虛寒治之與小建中湯溫中散寒若不差者非裏寒也必由邪氣自表之裏裏氣不利所致與小柴胡湯去黃芩加芍藥以除專裏之邪

傷寒明理論內經曰肝生於左肺藏於右心位在上腎處在下左右上下四藏居焉脾者土也應中央處四藏之中為中州治

中焦生育榮衛通行津液一有不調則榮衛失所育津液失所行必以此湯溫建中藏是以建中名焉膠飴味甘溫甘草味甘平脾欲緩急食甘以緩之建脾者必以甘為主故以膠飴為君甘草為臣桂辛熱辛散也潤也榮衛不足潤而散之芍藥味酸微寒酸收也泄也津液不逮收而行之是以桂芍藥為佐生薑味辛溫大棗味甘溫胃者衛之源脾者榮之本黃帝鍼經曰榮

出中焦衛出上焦是矣衛為陽不足者益之必以辛榮為陰不足者補之必以甘辛甘相合脾胃建而榮衛通是以薑棗為使或謂桂枝湯解表而芍藥數少建中湯溫裏而芍藥數多殊不知二者遠近之制皮膚之邪為近則制小其服也桂枝湯芍藥佐桂枝以發散非與建中同體爾心腹之邪為遠則制大其服也建中湯芍藥佐膠飴以建脾非與桂枝同用爾內經曰近而

奇耦制小其服遠而奇耦制大其服此之謂也

小建中湯方

桂枝三兩去皮 甘草三兩炙味甘平

大棗十二枚擘味甘溫 芍藥六兩味酸微寒 生薑

二兩切味辛溫 膠飴一斤味甘溫

翼方明理論三兩 膠飴一斤味甘溫

建中者建脾也內經曰脾欲緩急食甘以

散也榮衛不足潤而散之桂枝生薑之辛以行榮衛酸收也泄也正氣虛弱收而行以收正氣

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火消解溫服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故也

傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉

具柴胡證是邪氣在表裏之間也或胃中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心

下悸小便不利或不渴身有微熱或欬但見一證便宜與柴胡湯治之不必待其證候全

具凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者

復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解

邪在半表半裏之間為柴胡證即未作裏實醫便以藥下之若柴胡證仍在者雖下之不

為逆可復與柴胡湯以和解之得湯邪氣還表者外作蒸蒸而熱先經下裏虛邪氣欲出

內則振振然也正氣勝陽氣主却復發熱汗出而解也傷寒二三日心

中悸而煩者小建中湯主之傷寒二三日邪

裏之時心中悸而煩是非邪氣搏所致心悸者氣虛也煩者血虛也以氣血內虛與小建

建其裏太陽病過經十餘日反二三下之後

四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不

止心下急傷寒論註曰一鬱鬱微煩者為未

解也與大柴胡下之則愈日數過多累經攻

者亦須先與小柴胡湯以解其表經曰凡柴胡湯疾證而下之若柴胡證不罷者復與柴

辨要四十三  
明者是也嘔止者表裏和也若嘔不止證  
微煩者裏熱已甚結於胃中也與大柴胡湯  
下其裏熱則愈

傷寒明理論虛者補之實者瀉之此言所  
共知至如峻緩輕重之劑則又臨時消息  
焉大滿大實堅有燥屎非駛劑則不能泄  
大小承氣湯峻所以泄堅滿者也如不至  
大堅滿邪熱甚而須攻下者又非承氣湯  
之可投必也輕緩之劑攻之大柴胡湯緩  
用以逐邪熱也經曰傷寒發熱七八日雖

脈浮數者可下之宜大柴胡湯又曰太陽  
病過經十餘日反二三下之後四五日柴  
胡證仍在者先與小柴胡嘔不止心下急  
鬱鬱微煩者爲未解也可大柴胡下之則  
愈是知大柴胡爲下劑之緩也柴胡味苦  
平微寒傷寒至於可下則爲熱氣有餘應  
火而歸心苦先入心折熱之劑必以苦爲  
主故以柴胡爲君黃芩味苦寒王冰曰大  
熱之氣寒以取之推除邪熱必以寒爲助

故以黃芩為臣芍藥味酸苦微寒枳實味苦寒內經曰酸苦湧泄為陰泄實折熱必以酸苦故以枳實芍藥為佐半夏味辛溫生薑味辛溫大棗味甘溫辛者散也散逆氣者必以辛甘者緩也緩正氣者必以甘故半夏生薑大棗為之使也一方加大黃以大黃有將軍之號而功專於蕩條不加者審而行之則十全之功可得矣

大柴胡湯方

柴胡半斤味甘平 黃芩三兩味苦寒 芍藥三兩味酸微寒 半

夏半升味甘辛溫 生薑五兩味辛溫切 枳實四枚味苦寒 大棗

十二枚味甘溫 大黃二兩味苦寒 ○傷寒論明

柴胡黃芩之苦入心而折熱根實芍藥之

酸苦湧泄而扶陰辛者散也半夏之辛以

散逆氣辛甘和也姜棗之辛甘以和榮衛

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三服一方加大黃二兩若

不加大黃恐不為大柴胡湯也千金翼方同

傷寒十三日不解胃脇滿而嘔日哺所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒消湯主之也傷寒十三日再傳經盡當解之時若在表裏之間此為柴胡湯證若以柴胡湯下之則更無潮熱自利醫反以丸藥下之虛其腸胃邪熱乘虛入府日哺所發潮熱已而利也潮熱雖為熱實然胃脇之邪未已故先與小柴胡湯以解外後以柴胡加芒消湯以下胃熱

傷寒論柴胡六銖黃芩人參甘草炙生

薑 各一兩切 半夏 二十銖本云五枚洗 大棗 四兩切

芒消 二石八味以水四升煮取二升去滓內芒消更煮微沸分溫再服不解更作

臣億等謹按金匱玉函方中無芒消別一方云以水七升下芒消三合大黃四兩桑螵蛸五枚煮取一升半服五合微下即愈本云柴胡再服以解其外餘二升加芒消大黃桑螵蛸也

傷寒十三日不解過經讖語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞭而反下利脉調和者知醫以丸藥下之非其治也若自

下利者脉當微厥今反和者此為內實也調胃承氣湯主之傷寒十三日再傳經盡謂之過經嚴語皆陽明胃熱也當以諸承氣湯下之若小便利者津液偏滲大便當鞭反下利者知醫以丸藥下之也下利脉微而厥者虛寒也今脉調和則非虛寒由腸虛胃熱脇熱而利也與調胃承氣湯以下熱胃太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者愈其外不解者尙未可攻當先解外外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯方  
太陽膀胱經也太陽經邪熱不解隨經入府為熱結膀胱其人如狂者為未至於狂但不寧分經曰其人如狂者以熱在下焦太陽多熱熱在膀胱必與血相搏若血不

為畜為熱迫之則血自下血下則熱隨血出而愈若血不下者則血為熱搏畜積於下而少腹急結乃可攻之與桃核承氣湯下熱散血內經曰從外之內而盛於內者先治其外後調其內此之謂也○傷寒論註曰後云解外宜桂枝湯

桃核承氣湯方

桃人五十箇去皮 桂枝二兩去皮 大黃四兩

芒消二兩千金翼方朴硝 甘草二兩炙

甘以緩之辛以散之少腹急結緩以桃人取之熱甚搏血故加二物於調胃承氣湯中也

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒

消更上火微沸下火先食溫服五合日三服當微利○無求子活人書右剉如麻豆大每服五錢匕以水二大盞煎至八分去滓下消煎化溫服以微利為度未利移時再服袖珍方右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓入朴硝通口服南陽活人書

桃仁去皮雙仁十大黃兩一桂枝兩甘草兩

芒消兩半右剉如麻豆大水二大盞煮取八分去滓下芒消煎化溫服以微利為

度未利移時再服

傷寒八九日下之胃滿煩驚小便不利讖語

一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯

主之傷寒八九日邪氣已成熱而復傳陽經

者陽熱客於胃中也驚者心惡熱而神不守

也小便不利者裏虛津液不行也讖語者胃

熱也一身盡重不可轉側者陽氣內行於裏

不營於表也與柴胡湯以除胃滿而煩加龍

骨牡蠣鈎丹收斂神氣而鎮驚加茯苓以行

津液利小便加大黃以逐胃熱止讖語加桂

枝以行陽氣而解身重

柴胡加龍骨牡蠣湯方

半夏二合洗○傷寒論二合大棗六柴胡

四生薑一兩人參一兩龍骨一兩鉆丹一兩

半桂枝去皮茯苓一兩大黃二兩牡礪一兩

方加黃芩一兩半半熬○傷寒論翼

右十一味以水八升煮取四升內大黃切

如碁子更煮一二沸去滓溫服一升傷寒論翼

方此下云本云柴胡湯今加龍骨等○無求子活人書柴胡

黃芩龍骨各一兩鉆丹人參桂枝茯苓各三

大黃半兩半夏湯洗牡礪一分右剉如麻豆

大每服抄五錢匕生薑四片棗子一枚水

一盞半煮至八分去滓溫服南陽活人書

柴胡二兩黃芩半兩薑切鉛人參切桂枝茯苓

已上各半夏一合湯洗大黃一兩大棗三龍骨七

半牡礪七錢右剉如麻豆大每服五錢水

一盞半煮至八分去滓溫服

傷寒腹滿讖語寸口脉浮而緊此肝乘脾也

名曰縱刺期門腹滿讖語者脾胃疾也浮行乘土也經曰水行乘火木行乘土名曰縱此其類矣期門者肝之募刺之以寫肝經盛

氣傷寒發熱齋齋惡寒大渴欲飲水其腹必  
 滿自汗出小便利其病欲解此肝乘肺也名  
 曰橫刺期門傷寒發熱齋齋惡寒肺病也大渴欲飲水肝氣勝也玉函曰作  
 大渴欲飲醉漿漿是知肝氣勝也傷寒欲飲水  
 者愈若不愈而腹滿者此肝行乘肺小不得  
 行也經曰木行乘金名橫刺期門以寫肝之  
 盛氣肝肺氣平水散而津液得通外作自汗  
 出內為小便太陽病二日反躁凡熨其背而  
 利而解也  
 大汗出大熱入胃胃中水竭躁煩必發讖語  
 十餘日振慄自不利者此為欲解也故其汗  
 從腰已下不得汗欲小便不得反嘔欲失洩

足下惡風大便鞭小便當數而反不數及多  
 大便已頭卓然而痛其人足心必熱穀氣下  
 流故也太陽病二日則邪在表不當發躁而  
 發汗大出則胃中乾燥火熱入胃胃中燥  
 熱躁煩而讖語至十餘日振慄自下利者火  
 邪勢微陰氣復生津液得復也故為欲解火  
 邪去火汗出則愈若從腰以下不得汗則津  
 液不得下通故欲小便不得熱氣上逆而反  
 嘔也欲失洩足下惡風者氣不得通於下而  
 虛也津液偏滲令大便鞭者小便當數經曰  
 小便數者大便必鞭也此以火熱內燥津液  
 不得下通故小便不數及不多也若火熱消  
 津液和則結鞭之便得潤因自大便也便已  
 頭卓然而痛者先大便鞭則陽氣不得下通  
 既得大便則陽氣降下頭中陽虛故卓然而

痛穀氣者陽氣也先陽氣不通於下之大陽  
時足下惡風今陽氣得下故足心熱也  
病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢  
失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲  
衄陰虛則小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥  
但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或  
不大便久則讞語甚者至噦手足躁擾捻衣  
摸牀小便利者其人可治  
風為陽邪因火熱之氣則邪風愈甚  
迫於血氣使血氣流溢失其常度風與火氣  
謂之兩陽兩陽相熏灼熱發於外必發身黃  
若熱搏於內者為陰虛內熱必小便難若熱消  
熱搏於內者為陰虛內熱必小便難若熱消

血氣而氣少為陰陽俱虛血氣虛少不能榮  
於身體為之枯槁三陽經絡至頭三陰至胃  
中而還但頭汗出劑頸而還者熱氣炎上搏  
於腹滿微喘者熱氣內鬱也內經曰火氣內  
發上為口乾咽爛者火熱上熏也熱氣上而  
不下者則大便不艱若熱氣下入胃消耗津  
液則大便艱故云或不大便久則胃中燥熱  
必發讞語內經曰病深者其聲啞火氣大甚  
正氣逆亂則噦內經曰四肢者諸陽之本也  
陽盛則四肢實火熱大甚故手足燥擾捻衣  
而猶可傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚  
狂起臥不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍  
骨救逆湯主之  
傷寒脈浮貴邪在表醫以火劫發汗汗出大出者亡其陽

干者心之液亡陽則心氣虛心惡熱火邪內迫則心神浮越故驚悸起不安其桂枝湯解也火邪錯逆加蜀漆以芍藥益陰非亡陽所脫加龍骨牡蠣之瀝以固之本草云瀝可去脫龍骨牡蠣之屬是也

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯上之

桂枝三兩甘草二兩生薑三兩牡蠣五兩

酸龍骨四兩味大棗十二枚蜀漆三兩洗去鹹

右為末以水一斗二升以水八升先煮蜀漆減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一

升○無求子活人書桂枝蜀漆各一兩甘草兩半

炙一兩牡蠣二兩龍骨二兩○南陽活人書加生薑一兩半大棗六

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四

片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫

服傷寒指掌圖桂枝蜀漆各一兩甘草六錢

半牡蠣一兩六錢龍骨一兩三錢生薑兩大

棗十二枚水四升先煮蜀漆減七合內諸藥

煮取一升半去滓分三服

形作傷寒其脉不弦緊而弱弱者必渴被火

者必讖語弱者發熱脉浮解之當汗出愈形

傷寒謂頭痛身熱也。脈不弦緊則無傷寒。表  
 脈也。經曰：弱發熱則脈弱。為裏熱。故云：弱  
 者必渴。若被火氣兩熱相合，傳於胃中，胃中  
 躁煩，必發譫語。脈弱發熱者，得脈浮為邪氣，  
 還表當汗。太陽病以火熏之，不得汗，其人必  
 出而解矣。躁到不得必清血，名為火邪。此火邪迫血而  
 陽病，日火熏之，不得汗，則熱無從出。陰虛被  
 火必發躁也。六日傳經，盡至七日，再到太陽  
 經，則熱氣當解。若不解，熱氣脈浮，熱甚反灸  
 迫血下行，必清血。清則也。脈浮熱甚，反灸  
 之，此為實實以虛治。因火而動，必咽燥唾血。  
 此火邪迫血而血上行者也。脈浮熱甚為表  
 實，醫以脈浮為虛，用火灸之，因火氣動血，迫  
 而上行，故微數之脈，慎不可灸。因火為邪，則  
 咽燥唾血。

為煩逆，追虛逐實，血散脈中，火氣雖微，內攻  
 有力，焦骨傷筋，血難復也。微數之脈，則為熱也。灸則除寒，不能  
 散熱，是慎不可灸也。若反灸之，熱因火則甚。  
 遂為煩逆，灸本以追虛，而復逐熱，為實熱則  
 傷血。又加火氣，使血散脈中，氣主响之，血主  
 濡之，氣血消散，不能濡潤筋骨，致骨焦筋傷。  
 血散而脈浮，宜以汗解。用火灸之，邪無從出，  
 難復也。因火而盛，病從腰以下必重，而痺名火逆也。  
 脈浮在表，宜以汗解之。醫以火灸，取汗而不  
 得汗，邪無從出，又加火氣，相助則熱愈甚。身  
 半以上同天之陽，半身以下同地之陰。火性  
 炎上，則腰已下陰氣獨治，故從腰以下必重。  
 而痺，欲自解者，必當先煩，乃有汗而解。何以

知之脉浮故知汗出解也煩熱也邪氣還表

解以脉浮故燒針令其汗針處被寒核起而

為邪還表也赤者必發奔豚氣從少腹上衝心者灸其核

上各一壯與桂枝加桂湯更加桂二兩燒針

則損陰血而驚動心氣針處被寒氣聚而成

核心氣因驚而虛腎氣乘寒氣而動發為奔

豚金匱要略曰病有奔豚從驚發得之腎氣

欲上乘心故其氣從少腹上衝心也先灸核

上以散其寒與桂枝加傷寒論桂枝五兩芍藥生薑各三兩甘草二

炙大棗十二枚右五味以水七升煮取三升

去滓温服一升本云桂枝湯今加桂滿五

兩所以加桂者以能泄奔豚氣也千金翼

火逆下之因燒針煩躁者桂枝甘草龍骨牡

蠣湯主之先火為逆復以下除之裏氣因虛

生煩躁與桂枝甘草龍桂枝甘草龍骨牡蠣湯方

桂枝一兩傷二兩甘草二兩牡蠣二兩

龍骨二兩寒論去皮傷二兩牡蠣二兩

辛甘發散桂枝甘草之辛甘也以發散經

中火邪澁可去脫龍骨牡蠣之澁以收斂

浮越之正氣

右為末以水五升煮取二升半千金翼方二升去

滓溫服八合日三服○無求子活人書右

判如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮

至八分去滓溫服南陽活人書可傷寒指

掌圖桂枝三錢一字半甘草龍骨牡蠣各六錢二字半

水三升六合煎至一升二合去滓分三服

太陽傷寒者加溫針必驚也寒則傷榮榮氣微者加燒針則

血留不行驚者溫針振榮血而動心太陽病氣金匱要略曰血氣少者屬於心

當惡寒發熱今自汗出不惡寒發熱關上脉

細數者以醫吐之過也一二日吐之者腹中

飢口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲食

冷食朝食暮吐以醫吐之所致也此為小逆

惡寒發熱為太陽表病自汗出不惡寒發熱者陽明證本太陽表病醫反吐之傷動胃氣

表邪乘虛傳於陽明也以關脉細數知醫吐之所致病一二日為表邪尚寒而未成熟吐

之則表寒傳於胃中胃中虛寒故腹中飢而口不能食病三四日則表邪已傳成熱吐之

則表熱乘虛入胃胃中虛熱故不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐也朝食暮吐者晨食入胃

胃虛不能剋化即知至暮胃氣行裏與邪氣相搏則胃氣反逆而以胃氣尚在故止云小

逆太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡

寒不欲近衣此為吐之內煩也太陽表病醫反吐之傷於

胃氣邪熱乘虛入胃胃為邪熱病人脈數數

內煩故不惡寒不欲近衣也為熱當消穀引食而反吐者此以發汗令陽

氣微膈氣虛脈乃數也數為客熱不能消穀

以胃中虛冷故吐也陽受氣於胃中發汗外虛陽氣是冷湯氣微膈

氣虛也數為熱本熱則合消谷客熱則不能消谷因發汗外損陽氣致胃中虛冷故吐也

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胃中

痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先此時自極

吐下者與調胃承氣湯若不介者不可與但

欲嘔胃中痛微溏者此非柴胡證以嘔故知

極吐下也心下溫溫欲吐鬱鬱微煩胃中痛

微滿則邪熱已下於胃也日數雖多若不經吐下止是傳邪亦未可下當與柴胡湯以除

上中二焦之邪若曾吐下傷損胃氣胃虛則邪乘虛入胃為實非柴胡湯所能去與調胃

承氣湯下胃熱以嘔太陽病六七日表證仍

在脈微而沉反不結胃其人發狂者以熱在

下焦少腹當鞭滿小便自利者下血乃愈所

以然者以太陽隨經瘀熱在利故也抵當湯

主之 太陽經也勝胱府也此太陽隨經入府者也六七日邪氣傳裏之時脉微而沉邪氣在裏之脉也表證仍在者則邪氣猶淺當結於胃中若不結於胃中其人發狂者熱結在膀胱也經曰熱結膀胱其人如狂此發狂則熱又深也少腹鞭滿小便不利者為無血也小便自利者血證諦也與抵當湯以下畜血

抵當湯方

水蛭 三十箇熬 蠭蟲 三十箇熬去翅 桃人 二十箇去皮尖味苦甘 大黃 三兩酒浸味平○千金方二十枚 翼方 二兩 破六片 苦走血鹹勝血蠱蟲水蛭之鹹苦以除畜血甘緩結苦泄熱桃人大黃之苦以下結

熱

右四味為末

千金方

以水五升煮取三升

去滓溫服一升不下再服○無求子活人

書太陽病六七日表證仍在脉微而沉反

不結胃其人發狂者以熱在下焦小腹鞭

滿小便自利者下血乃愈所以然者以太

陽隨經瘀熱在裏故也或太陽病身黃脉

沉結小腹鞭小便不利者為無血也小便

自利其人如狂者血證諦也或傷寒有熱

小腹滿應小便不利今反利者為有血也  
 當下之不可餘藥並宜服 陽明證其人  
 喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血  
 故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑者  
 宜此藥下之或病人無表裏證發熱七八  
 日雖脈浮數者可下之假令已下脈數不  
 解今熱則消穀喜飢至六七日不大便者  
 有瘀血宜服大黃一兩去蠱蟲拾枚去桃  
 仁七枚去皮水蛭十枚熬去子碎水蛭  
 本尖提碎入腹再生化為害尤甚

須剉斷用石灰炒再熬 右剉如麻豆大須  
 ○南陽活人書三個 二服水二盞煎七分去滓溫服得效傷寒  
 活人書水蛭十枚大黃乙桃仁七枚右  
 剉如麻豆大須服水二盞煎七分去  
 滓溫服血不下再服兩服傷寒明理論人  
 之所有者氣與血也氣為陽氣流而不行  
 者則易散以陽病易治故也血為陰血畜  
 而不行者則難散以陰病難治故也血畜  
 於下非大毒駛劑則不能抵當其甚邪故

治畜血曰抵當湯水蛭味鹹苦微寒內經  
 曰鹹勝血血畜於下勝血者必以鹹為主  
 故以水蛭為君蟲蟲味苦微寒苦走血血  
 結不行破血者必以苦為助是以蟲蟲為  
 臣桃仁味苦甘平肝者血之源血聚則用  
 氣燥肝苦急急食甘以緩之散血緩令是  
 以桃仁為佐大黃味苦寒濕氣在下以苦  
 泄之亦濕類也蕩血逐熱是以大黃為  
 使四物相合而方劑成病與藥對藥與病

宜雖苛毒重疾必獲全濟之水蛭君三十枚熬

蟲蟲臣三十介桃仁佐三十大黃使三十

寬右四味判如麻豆大以水五升煮取三

升去滓溫服一升未利再服傷寒直格水

蛭炒蟲蟲炒去翅足桃仁七大黃錢一右判

如麻豆大分作二服每用水一盞煮半盞

絞去滓溫服未下再服宣明論治傷寒日

深表證乃甚畜熱下焦脉微沉不結胃發

狂者少腹脹而硬小便自和者瘀血證也

小便不和無血也或陽明畜熱內甚而喜  
 忘或狂大便雖硬而反易其色黑者有畜  
 血也無表裏證但發熱日深脉雖浮者亦  
 可下之或已下後脉數胃熱消穀善飢數  
 日不大便有瘀血也水蛭炒 蠱蟲各十箇  
去翅足 炒桃仁七箇 大黃一分 右剉如麻豆大分作二  
 服水一盞煮半盞絞去滓温服未下再服  
 傷寒指掌圖血結有讖語瘀血狂言小腹  
 滿漱水不欲燕水蛭蠱蟲各三箇 桃仁二十

大黃一兩 水三盞煎至一盞半去滓分二服

太陽病身黃脉沉結少腹鞭小便不利者為  
 無血也小便自利其人如狂者血證諦也抵  
 當湯主之身黃脉沉結少腹鞭小便不利者  
胃熱發黃也可與茵陳湯身黃脉  
沉結少腹鞭小便自利其人如狂者非胃中  
瘀熱為熱結下焦而為畜血也與此當湯以  
下畜 傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利  
 者為有血也當下之不可餘藥宜抵當丸傷  
有熱少腹滿是畜血於下焦若熱畜津液不  
通則小便不利其熱不畜津液而畜血不行  
小便自利者乃為畜血當與桃人承氣湯抵  
當湯下之然此無身黃屎黑又無喜忘發狂

是長至於甚故不可餘駛峻藥也可與抵當丸小可下之也

抵當丸方

水蛭二十箇味苦寒 蝨蟲二十五箇味苦

去翅足熬千金 桃人二十箇去皮尖 大

黃兩三

右四味杵分為四丸以水一升煮一丸取

七合服之晬時當下血若不下者更服○

無求子活人書桃仁四箇去皮尖○傷大

黃三分 蝨蟲五箇去翅足熬 水蛭五箇熬去子杵

所害尤甚須到斷 右搗篩只為一團水一

用石灰炒再熬 大白蒸煎至七分頓服晬時當下血不下

更作之南陽活人書同傷寒活人書以桃

大傷寒直格水蛭炒 蝨蟲炒各 桃仁八粒

黃錢一 右為細末蜜和作二圓用水一小盞

煮一圓至六分溫服晬時血未下者再服

宣明論治傷寒有熱小腹滿小便不利者

為有血也當下之不可餘藥水蛭炒 蝨蟲

各七個 桃仁八個 大黃一分 右為末蜜和作二

丸用水一小盞煮一九至六分温服晷時  
 血未下再服傷寒指掌圖當汗失汗熱毒  
 深入吐血身黃喜忘發狂小瘀血水蛭  
 七齒蟲八桃仁七箇大黃一為末分作四丸  
 水一盞煮一九取七分盞温服當下血未  
 下再服

太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便  
 少者必苦裏急也飲水多而小便自利者則  
 心下悸金匱要略曰食少飲多水停心下  
 者則悸飲衆多而小便不利則水畜於內而

不行必苦裏急也

內諸藥上音納 啜粥上音悅切 協熱上音挾 見

風脉上音現 漬疾智切 虻音回人復 莖音柴 瞑

音冥視也 悸其季切 人菴下音參 咬咀上音父

切如麻豆也 更衣音庚改也 沫音未 懊懣上音刀

刀切又女江切心室音庚改也 擘音入 胸音

也目搖 慄音栗 蘊紆同切 嘿音墨 但見下音

飴音怡 烝音諸 行也 募音墓 滲音色 諦音審

水蛭

音質

蟲

音盲

馱峻

上音决

下思

俊切

峻也

辨太陽脉證并治

問曰病有結胃有藏結其狀何如荅曰按之痛寸脉浮關脉沉名曰結胃也何謂藏結荅曰如結胃狀飲食如故時時下利寸脉浮關脉小細沉緊名曰藏結舌上白胎滑者難治

結胃者邪結在胃藏結者邪結在藏二者皆下後邪氣乘虛入裏所致下後邪氣入裏與陽相結者為結胃以陽受氣於胃中故爾與陰相結者為藏結以陰受之則入五藏故爾與宜通而塞故痛邪結陽分則陰氣不得上通邪結陰分則陽氣不得下通是二者

皆心下鞭痛寸脉浮關脉沉緊知邪結在陽也寸脉浮關脉小細沉緊知邪結在陰也陰結而腸不結雖心下結痛飲食亦自如故陰氣乘腸虛而下故時時自下利塗得湯則解藏結得熱證多則易治舌上白胎藏結無陽證滑者結胃中亦寒故云難治

不往來寒熱傷寒論註曰一其人反靜舌上胎滑者不可攻也藏結於法當下無陽證為表半裏無熱其人反靜為裏無熱經曰舌上如胎者以丹田有熱胃中有寒邪氣以表裏皆寒故病發於陽而反下之熱入因作結胃不可攻病發於陰而反下之傷寒論無求子活人因作痞所以成結胃者以下之太早故也發熱惡寒

者發於陽也而反下之則表中陽邪入表結於胃中為結胃無熱惡寒者發於陰也而反下之表中之陰入裏結於心下為痞結胃者項亦強如柔瘥狀下之則利宜大陷胃丸方結胃病項強者為邪結胃中胃膈結

滿心下緊實但能仰而不能俛是項強亦如柔瘥之狀也與大陷胃丸下結泄滿

大陷胃丸方

大黃

半斤味苦寒

葶藶

半升熬味苦寒

芒消

半升味鹹寒

杏

人

半斤去皮尖熬黑味苦甘溫

大黃芒消之苦鹹所以熱葶藶杏仁之苦甘所以泄滿甘遂取其直達白蜜取其胃利皆以下泄瀉實物也

右四味搗篩二味內杏仁芒消合研如脂

和散取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢匕

白蜜二合

千金翼方一兩

水二升煮取一升溫頓

服之一宿乃下如不下更服取下為效禁

如藥法○無求子活人書大黃

二兩或作四兩

消分杏仁

三分去皮尖熬黑

苦葶藶子

三錢

右搗

羅二味內杏仁芒消合研如脂丸如彈子

大每服一丸抄甘遂末半錢匕白蜜一合

水二盞煮取一盞頓服一宿乃下如不下

再服甘遂性猛宜斟量虛實服之南陽活  
 人書大黃二兩葶藶三分芒消杏仁一合已上  
 右搗羅二味內杏仁芒消合研如脂和散  
 取如彈丸一枚甘遂末一字白蜜少許水  
 二盞半煮取一盞頓服一宿乃下如不下  
 再服

結胃證其脉浮大者不可下下之則死結胃為邪  
結胃中屬上焦之分得寸脉浮關脉沉者為  
在裏則可下若脉浮大心下雖結是在表者  
猶多未全結也下之重虛邪氣結胃證悉具  
復結則難可制故云下之則死

煩燥者亦死結胃證悉具邪結已深也煩燥  
必太陽病脉浮而動數浮則為風數則為熱  
 動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而  
 反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈  
 內拒痛傷寒論註曰一胃中空虛客氣動膈  
 短氣躁煩心中懊懣陽氣內陷心下因鞭則  
 為結胃大陷胃湯主之若不結胃但頭汗出  
 餘無汗劑頸而還小便不利身必發黃也動  
皆陽脉也當責邪在表睡而汗出者謂之盜  
汗為邪氣在半表半裏則不惡寒此頭痛發

熱微盜汗出反惡寒者表未解也當發其汗  
 醫反下之虛其胃氣長邪乘虛則陷邪在表  
 則見陽脈邪在裏則見陰脈邪氣內陷動數  
 之脈所以變遲而浮脈獨不變者以邪結胃  
 中上焦陽結脈不得而沉也客氣者外邪乘  
 胃中空虛入裏結於胃膈膈中拒痛者客氣  
 動膈也金匱要略曰短氣不足以息者實也  
 短氣燥煩心中懊憹皆邪熱為實陽氣內陷  
 氣不得通於膈壅於心下為鞭滿而痛成結  
 胃也與大陷胃湯以下結熱皆胃中空虛陽  
 氣內陷不結於胃膈下人於胃中者遍身汗  
 出則為熱越不能發黃若但頭汗出身無汗  
 劑頸而還小便不利者  
 熱不得越必發黃也

傷寒明理論結胃猶邪在胃中處身之高  
 分邪結於是宜若可吐然所謂結者若繫

結之結不能分解者也諸陽受氣於胃中  
 邪氣與陽氣相結不能分解氣不通壅於  
 心下為鞭為痛是邪正因結於胃中非虛  
 煩膈實之所同是須攻下之物可理低者  
 舉之高者陷之以平為正結胃為高邪陷  
 下以平之故治結胃曰陷胃湯甘遂味苦  
 寒苦性泄寒勝熱雖曰泄熱而甘遂又若  
 夫間之遂直達之氣陷胃破結非直達者  
 不能透是以甘遂為君芒硝味鹹寒內經

日鹹味下泄為陰又曰鹹以稟之氣堅者以鹹稟之熱勝者以寒消之是以芒硝為臣大黃味苦寒將軍也蕩滌邪寇除去不平將軍之功也陷胃滌熱是以大黃為使利藥之中此為駛劑傷寒錯惡結育為甚非此湯則不能通利之劑大而數少取其迅疾分解結邪此奇方之制也黃帝鍼經曰結雖大猶可解也在傷寒之結又不能久非陷胃湯孰可解之矣

### 大陷胃湯方

大黃

六兩去皮苦寒

芒消

一升鹹寒

甘遂

一錢匕苦寒

大黃謂之將軍以古蕩滌芒消一名消石以其鹹能稟鞭夫間有甘遂以通水也甘遂若夫間之遂其氣可以直達透三結胃陷物為允

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒消煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服千金翼方同○無求子活人書太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而

反惡寒表未解也醫反下之動數變遲膈  
 內拒痛胃中空虛客氣動隔短氣躁煩心  
 中懊懣陽氣內陷心下因鞭則為結胃大  
 陷胃湯主之若不結胃但頭汗出餘處無  
 汗劑頸而還小便不利身必發黃傷寒  
 六七日結胃熱實脉沉而緊心下痛按之  
 石鞭者宜服傷寒十餘日熱結在裏復  
 往來寒熱者與大柴胡湯但結胃無大熱  
 者此為小結在胃脇也但頭微汗出者此

主之太陽病重發汗而下之不大便五  
 六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心  
 下至小腹鞭滿而痛不可近者此主之  
 傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而  
 以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯  
 此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱  
 汗出而解若心下滿而鞭痛者此為結胃  
 也此主之大黃一兩半去皮甘遂一字赤  
細羅芒消五分○南陽活人右以水二盞  
為末書一兩八錢半

先煮大黃至一盞去滓下消一沸下甘遂

末溫服得快利止後服 又大陷胃湯方

桂枝兩一甘遂一兩或兩大棗兩或作三枚

一作半兩南陽活人書

一人參兩一栝樓實一枚去皮只右剉如麻

豆大每服五錢匕水一盞或作二盞煮至

八分去滓溫服胃中無堅物勿服之具而

傷寒六七日結胃熱實脈沉而緊心下痛按

之石鞭者大陷胃湯主之病在表而下之熱

云下後而云傷寒六七日則是傳裏之實熱

也沉為在裏緊為裏實以心下痛按之實鞭

是以為結胃與大傷寒十餘日熱結在裏復

陷胃湯以下結熱

往來寒熱者與大柴胡湯但結胃無大熱者

此為水結在胃脇也但頭微汗出者大陷胃

湯主之傷寒十餘日熱結在裏是可下之證

復往來寒熱為正邪分爭未全歛結

與大柴胡湯下之但結胃無大熱者非熱結

也是水飲結於胃脅謂之水結胃周身汗出

者是水飲外散則愈若但頭微汗出餘處無

汗是水飲不得外泄停畜而不行也與大陷

逐其水以太陽病重發汗而復下之不大便五

六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱傷寒論

類聚

七

近者大陷胃湯主之重發汗而復下之則內

結致不大便五六日外重亡津液而邪熱內

熱者屬胃此日晡小有潮熱非但在胃從心

下至少腹鞭滿而痛不可近者是一腹之中

上下邪氣俱甚也與大陷胃湯以下其邪

小結胃病正在心下按之則痛脉浮滑者小

陷胃湯主之心下鞭痛手不可近者結胃也

淺謂之小結胃結胃脉沉緊或寸浮關沉今

脉浮滑知熱未深結與小陷胃湯以除胃膈

熱上結

小陷胃湯方

黃連乙兩半夏半升洗栝萸實大者乙

苦以泄之辛以散之黃連栝萸實

苦寒以泄熱半夏之辛以散結

右三味以水六升先煮栝萸取三升去滓

內諸藥煮取二升去滓分溫三服千金翼

○無求子活人書半夏湯洗秤二兩半

半黃連一兩○南陽栝樓一枚去皮或作

人書一枚用右剉如麻豆大水二盞先煮

四分之二一盞半下諸藥煎至八分去滓溫

括樓至一盞半下諸藥煎至八分去滓溫

服未知再服微利黃涎便安也

太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脉

微弱者此本有寒分也反下之若利止必作  
 結胃未止者四日復下之此作協熱利也  
 病二三日邪在表也不能臥但欲起心下必  
 結者以心下結滿卧則氣壅而愈甚故不能  
 臥而但欲起也心下結滿有水分有寒分有  
 氣分今脉微弱知本有寒分醫見心下結而  
 反下之則太陽表邪乘虛入裏利止則邪氣  
 留結為結胸利不止至次日復如前下利不  
 止者是邪熱下攻太陽病下之其脉促傷寒  
 腸胃為挾熱利也  
 日一不結胸者此為欲解也脉浮者必結胃  
 作縱也脉緊者必咽痛脉弦者必兩脇拘急脉細  
 也脉緊者必咽痛脉弦者必兩脇拘急脉細  
 數者頭痛未止脉沉緊者必欲嘔脉沉滑者

協熱利脉浮滑者必下血  
 者為陽盛下後脉促為陽勝陰也故不能結  
 胸為欲解下後脉浮為上焦陽邪結而為結  
 胸也經曰結胸者寸脉浮關脉沉下後脉緊  
 則太陽之邪傳於少陰之絡曰脉緊者屬少陰  
 內經曰邪客於少陰之絡令人隘痛不可內  
 食所以脉緊者必咽痛脉弦則太陽之邪傳  
 於少陽經曰尺寸俱弦者少陽受病也其脉  
 循脇絡於耳所以脉弦者必兩脇拘急下後  
 邪氣傳裏則頭痛未止脉細數為邪未傳裏  
 而傷氣也細為氣少數為在表故頭痛未止  
 脉沉緊則太陽之邪傳於陽明裏實故必欲  
 瀉脉滑為在裏緊為裏實陽明裏實故必欲  
 瀉則太陽之邪傳於腸胃以滑為陰氣有餘  
 邪氣人裏干於下焦也沉為血勝氣虛是為  
 協熱利浮為氣勝血虛是知必下血經曰不  
 宜下而便攻之諸變不可勝數此之謂也

病在陽應以汗解之反以冷水濕之若灌之其熱被得效方此下有却不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服病在陽為邪在表也法當汗出而解反以冷水濕之灌洗熱被寒水外不得出則反攻其裏更益煩內上粟起者水寒之氣客於皮膚也意欲飲水者裏有熱也反不渴者寒在表也與文蛤散以散表中水寒之氣若不差是水熱相搏欲傳於裏與五苓散發汗以和之始熱在表因水寒制之不得外泄內攻於裏結於胸膈心下鞭痛本以水寒伏熱為實故謂之寒實結胃無熱證者外無熱

而熱悉收斂於裏也與小陷胸湯以下逐之白散下熱故亦可攻傷寒論註曰一云與三物小白散無求子活人書龐安常云小陷胸湯非也

文蛤散方

文蛤五兩味鹹寒

鹹走腎則可以勝水氣

右一味為散以沸湯和一錢匕服湯用五

合千金翼方同○神攻萬全方文蛤五兩○無求子活人

書南陽活人書傷寒指掌右為末以沸湯

和一方寸匕服湯用五合

白散方 無求子活人書南陽活人書得效方永類鈐方名三物白散

桔梗 三分味辛 芭豆 乙分去皮心熬 貝母 三分味苦微温

辛苦平

辛散而苦泄桔梗貝母之辛苦辛用以下氣巴豆之辛用以散實

右件三味為末內芭豆更於白中杵之以

白飲和服強人半錢羸者減之病在膈上

必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利過

不止進冷粥 千金翼方註一杯身熱皮粟云一云冷水

不解欲引衣自覆者若以水濕之洗之益

令熱却不得出當汗而不汗則煩假令汗

出已腹中痛與 鈐方 芍藥三兩如上法 神巧

萬全方同

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結

胷心下痞鞭者當刺大椎第一間肺俞肝俞

慎不可發汗發汗則譫語脉 傷寒論此五六

日譫語不止當刺期門 太陽之脉絡頭下項

病也少陽之脉循胷脇如結胷心下痞鞭者少陽裏病也太陽少陽相併為病不純在

表故頭項不但強痛而或取胃亦未全入裏故時如結胷心下痞鞭此邪在半表半裏之

間也刺大椎第一間肺俞以寫太陽之邪刺  
 肝俞以寫少陽之邪邪在表則可發汗邪在  
 半表半裏則不可發汗發汗則亡津液損動  
 胃氣少陽之邪因干於胃土為木刑必發讖  
 語脉弦至四五日傳經盡邪熱去而讖語當  
 止若復不止為少陽邪熱甚也刺期門以寫  
 肝膽婦人中風發熱惡寒經水適來得之七  
 八日熱除而脉遲身涼胃脇下滿如結胃狀  
 讖語者此為熱入血室也當刺期門隨其實  
 而寫之中風發熱惡寒表病也若經水不來  
 表邪傳裏則入府而不入血室也因  
 經水適來血室空虛至七八日邪氣傷身之  
 時更不入府乘虛而入於血室熱除脉遲身  
 涼者邪氣內陷而表證罷也胃脇下滿如結  
 胃狀讖語者熱入血室而裏實期門者肝之

募肝主血刺期門者寫血室之熱婦人中風  
 審看何經氣實更隨其實而寫之  
 七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此  
 為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有  
 時小柴胡湯主之中風七八日邪氣傳裏之  
 時本無寒熱而續得寒熱  
 經水適斷者此為表邪乘血室虛入於血室  
 與血相搏而血結不行經水所以斷也血氣  
 與邪分爭致寒熱如瘧而發作有婦人傷寒  
 時與小柴胡湯以解傳經之邪  
 發熱經水適來晝日明了暮則讖語如見鬼  
 狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必  
 自愈傷寒發熱者寒已成熱也經水適來則  
 血室虛空邪熱乘虛入於血室若晝日

讖語為邪客於府而陽爭也此晝日明了暮則讖語如見鬼狀是邪不入府入於血室而陰爭也陽盛讖語則宜下此熱入血室不可與下藥犯其胃氣熱入血室血結寒熱者與小柴胡湯散邪發汗此雖熱入血室胃腸滿如結胃狀者可刺期門此雖熱入血室而無滿結不可刺期門犯其中焦必自愈者以經行則熱隨血去血下也巳則邪熱悉除而愈矣所為發汗為犯上焦者發汗則動衛氣衛氣出上焦故也刺期門為犯中焦者刺期門則動榮氣榮氣出中焦故也脉經曰無犯傷胃氣及上二焦必自愈豈謂藥不謂針耶傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡加桂枝湯主之傷寒六七日邪當傳裏之時支散也嘔而心下結者裏證也法當攻裏發熱微惡寒支節煩疼為外

證未去不可攻裏與柴胡桂枝湯以和解之傷寒五六日已發汗而復下之胃脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝乾姜湯主之傷寒五六日已經汗下滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者即邪氣猶在半表半裏之間為未解也胃脅滿微結寒熱心煩者邪在半表半裏之間也小便不利而渴者汗下後亡津液內燥也若熱消津液令小便不利而渴者其人必嘔今渴而不嘔知非裏熱也傷寒汗出則和今但頭汗出而餘處無汗者津液不足而陽虛於上也與柴胡桂枝乾姜湯以解表裏之邪復津液而助陽也

柴胡桂枝乾薑湯方

柴胡半斤桂枝三兩去皮乾薑二兩括藞

根四兩黃芩三兩牡蠣二兩熬甘草二兩

甘平

內經曰熱淫於內以苦發之柴胡黃芩之苦以解傳表之邪辛甘發散為陽桂枝甘草之辛甘以散在表之邪鹹以裏之牡蠣以固湯虛之汗津液不足而為渴苦以堅之括藞之苦以生津液

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服千金翼方初

服微煩復服汗出便愈○無求子活人書

右剉如麻豆大每服抄五錢永類鈔七水

一盞半煮至八分去滓溫服食頃再服南陽

活人書同

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞭脈細者此為陽微結必有表復有裏也脈沉亦在裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此為半在裏半在外也脈雖沉緊不得為少陰病所

以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰  
 也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解傷  
 五六日邪當傳裏之時頭汗出微惡寒者表  
 仍未解也手足冷心下滿口不欲食大便鞭  
 脈細者邪結於裏也大便鞭為陽結此邪熱  
 雖傳於裏然以外帶表邪則熱結猶淺故曰  
 陽微結脈沉雖為在裏若純陰結則更無頭  
 汗惡寒之表證諸陰脈皆至頸胃中而還不  
 上循頭今頭汗出知非少陰也與小柴胡湯  
 以除半表半裏之邪服湯已外證罷而不了  
 了者為裏熱未除與湯取其傷寒五六日嘔  
 微利則愈故云得屎而解  
 而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡  
 證仍在者後與柴胡湯此雖已下之不為逆

必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而  
 鞭痛者此為結胃也大陷胃湯主之但滿而  
 不痛者此為痞柴胡不中與之宜半夏瀉心  
 湯傷寒五六日邪在半表半裏之時嘔而發  
 湯熱邪在半表半裏之證是為柴胡證具以  
 他藥下之柴胡證不罷者不為逆却與柴胡  
 湯則愈若下後邪氣傳裏者邪在表半裏  
 則陰陽俱有邪至於下後邪氣傳裏亦有陰  
 陽之異若下後陽邪傳裏者則結於胃中為  
 結胃以胃中為陽受氣之分與大陷胃湯以  
 下其結陰邪傳裏者則留於心下為痞以心  
 下為陰受氣之分與半夏瀉心湯以通其痞  
 經曰病發於陽而反下之因  
 發於陰而反下之因  
 此作痞此之謂也

傷寒明理論凡陷胃湯攻結也瀉心湯攻痞也氣結而不散壅而不通爲結胃陷胃湯爲直達之劑塞而不通否而不分爲痞瀉心湯爲分解之劑所以謂之瀉心者謂瀉心下之邪也痞與結胃有高下焉結胃者邪結在胃中故治結胃曰陷胃湯痞者留邪在心下故治痞曰瀉心湯黃連味苦寒黃芩味苦寒內經曰苦先入心以苦泄之瀉心者必以苦爲主是以黃連爲君黃

芩爲臣以降陽而升陰也半夏味辛溫乾薑味辛熱內經曰辛走氣辛以散之散痞者必以辛爲助故以半夏乾薑爲佐以分陰而行陽也甘草味甘平大棗味甘溫人參味甘溫陰陽不交曰痞上下不通爲滿欲通上下交陰陽必和其中所謂中者脾胃是也脾不足者以甘補之故用人參甘草大棗爲使以補脾而和中中氣得和上下得通陰陽得分水升火降則痞消熱已

而大汗解矣

半夏瀉心湯方

半夏

半升洗

黃芩

苦寒

乾薑

辛熱

人參

已上各三兩甘

溫黃連

乙兩

大棗

十二枚

甘草

三兩炙

辛入肺而散氣半夏之辛以散結氣苦入心而泄熱黃芩黃連之苦以泄痞熱脾欲緩急食甘以緩之人參甘草大棗之甘以緩之

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取

三升溫服一升日三服

千金翼方同傷寒論註云一方用半

升夏一○無求子活人書黃連半兩黃芩乾薑

炮人參甘草

炙各一兩半

半夏

一兩一分

湯洗

人書加大棗六個

右剉如麻豆大每服五錢匕大

棗二枚水一盞半煎至八分去滓溫服三

因方治心下痞滿而不痛者半夏湯洗七

錢一黃芩人參甘草

炙

乾姜

炮各兩半

剉散每服五錢水盞半

醫方大成集成南

每服四錢

姜五片棗一箇煎七分去滓溫

服或傷寒中風醫反下之下利日數十行

穀不化腹中鳴心下痞硬乾嘔心煩者加

甘草半兩人參一兩名甘草瀉心湯或汗  
出解後胃中不和心下痞硬乾噎食臭脇  
下水鳴下利者加生姜一兩減乾姜一兩  
餘如正方名生姜洗心湯

太陽少陽併病而反下之成結胃心下鞭下  
利不止水漿不下其人心煩太陽少陽併病  
為邪氣在下表  
半裏也而反下之二經之邪乘虛而入太陽  
表邪入裏結於胃中為結胃心下鞭少陽  
裏邪乘虛下于腸胃遂利不止若邪結陰分  
則飲食如故而為藏結此為陽邪內結故水  
漿不下脈浮而緊而復下之緊反入裏則作  
而心煩

痞按之自濡但氣痞耳

浮而緊浮為傷湯緊為傷陰當發其汗而

反下之若浮入裏為陽邪入裏則作結胃而  
浮不入裏而緊入裏者陰邪入裏則作痞太

陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漿

熱汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下

痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和

也十棗湯主之

下利嘔逆裏受邪也邪在裏者  
可下亦須待表解者乃可

攻之其人漿熱汗出發作有時不惡寒者表  
已解也頭痛心下痞鞭滿引脅下痛乾嘔短

氣者邪氣內畜而有伏飲是裏  
未和也與十棗湯下熱逐飲

十棗湯方

芫花熬味辛苦甘遂寒苦大戟苦寒大棗甘温十枚擘

辛以散之芫花之辛以散飲苦以世之甘遂大戟之苦以泄水水者腎所主也甘者脾之味也大棗之甘者益土而勝水

右三味等分各別搗為散以水一升半

先煮大棗肥者十枚取八合去滓內藥末

強人服一錢七羸人服半錢温服之平旦

服若下少病不除者明日更服加半錢得

快下利後糜粥自養千金翼方同○無求子活

人書芫花炒赤甘遂大戟右各等分異篩

秤末合和之入臼中再杵治三百下先以

水一升半煎肥棗子一十枚煎取八合去

滓內藥末強人一錢七羸人可半錢再單

飲棗湯途下平旦服若下少病不除者明

日更服加半錢利後糜粥自養合下不下

令人脹滿通身浮腫而死南陽活人書傷寒活人書同

傷寒直格芫花慢火炒大戟甘遂各等右

為散細末用水一盞肥棗十枚切開煮取

汁半盞調下半盞七強實人服一錢七以

意加減快利爲度宣明論治太陽中風下  
利嘔逆短氣不惡寒熱熱汗出發作有時  
頭痛心下痞硬引下痛兼下水腫腹脹并  
酒食積腸垢積滯疰癖堅積畜熱暴痛瘧  
烝久不已或表之正氣與邪熱并甚於裏  
熱極似陰反寒戰表氣入裏陽厥極深脉  
微而絕并風熱燥甚結於下焦大小便不  
通實熱腰痛及小兒熱結乳癖積熱作發  
驚風潮搐斑疹熱毒不能了絕者芫花慢  
火

炒變色仲景鄉俗異語言炒大戟甘遂各  
作熬下凡言熬者皆乾炒也  
分右爲末水一大盞棗十枚切開煮取汁  
半盞調半錢匕實人每一錢

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下  
痞表裏俱虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加  
燒針因胃煩面色青黃膚潤者難治今色微  
黃手足溫者易愈太陽病因發汗遂發熱惡  
寒者外虛陽氣邪復不除  
也因復下之又虛其裏表中虛邪內陷傳於  
心下爲痞發汗表虛爲竭陽下之裏虛爲竭  
陰表證罷爲無陽裏有痞爲陰獨又加燒針  
虛不勝火火氣內攻致胃煩也傷寒之病以

陽為主其人面色青膚肉顫動者陽氣大虛  
 故云難治若面色微黃手足溫者即陽氣得  
 復故云 心下痞按之濡其脉關上浮者大黃  
 易愈 黃連瀉心湯主之 心下鞭按之痛關脉沉者  
 實熱也心下痞按之濡其  
 脉關上浮者虛熱也大  
 黃黃連湯以導其虛熱

大黃黃連瀉心湯方

大黃 二兩 味苦寒  
 黃連 乙兩 味苦寒

內經曰火熱受邪心病生焉苦人心寒除  
 熱大黃黃連之苦寒以導瀉心下之虛熱  
 但以麻沸湯漬服者  
 取其氣薄而泄虛熱  
 右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓

分溫再服 等看詳大黃黃連瀉心湯諸本

皆二味又後附子瀉心湯用大黃黃連黃  
 芩附子恐是前方中亦有黃芩後但加附  
 子也故後云附子瀉  
 心湯本云加附子也

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

心下痞者虛熱內伏也惡寒汗出者陽氣  
 外虛也與瀉心湯攻痞加附子以固陽 本

以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴

而口燥煩小便不利者五苓散主之 本因下

當與瀉心湯除之若服之痞不解其人渴而

口燥煩小便不利者為水飲內畜津液不行  
 非熱痞也與五苓散發汗散水則愈一方忍  
 之一日乃愈者不飲者外水不入所停之水

得行而痞 亦愈也 傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者生姜瀉心湯主之

胃為津液之主陽氣之根大汗日後外亡津液胃中空虛客氣上逆中焦氣未和不能消穀攻下痞鞭金匱要略曰胃虛而不殺谷也脇下有水氣腹中雷鳴土弱不能勝水也與瀉心湯以攻痞加生姜以益傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使

鞭也甘草瀉心湯主之

傷寒中風是傷寒或中風也邪氣在表醫反下之虛其腸胃而氣內陷也下利日數十行谷不化腹中雷鳴者下後裏虛胃弱也心下痞鞭乾嘔心煩不得安者胃中空虛客氣上逆也與瀉心湯以攻表加甘草以補虛前以汗後胃虛是外傷陽氣故加生姜此傷寒以下後胃虛是內損陰氣故加甘草

服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止者當利其小便

傷寒服湯不止而心下痞鞭者氣虛而客氣上逆也與瀉心湯攻之則痞已豎復以他藥下之又虛

其裏致利不止也理中丸脾胃虛寒下利者服之愈此以下焦虛故與之其利益甚聖濟經曰滑則氣既欲其收也如開腸洞泄便溺豐失澁劑所以收之此利由下焦不約與赤石脂禹餘糧湯以澁河泄下焦主分清濁下利者水谷不分也若服澁劑而利不止當利小便以分其氣

赤石脂禹餘糧湯方

赤石脂 乙斤碎 禹餘糧 乙斤碎 味甘平 〇

本草云澁可去脫石脂之澁以收斂之重可去怯餘糧之重以鎮固已上二味以水六升煮取二升去滓三服

千金翼方同 ○無求子活人書右劉每服抄五

錢匕水一盞半煎八分去滓溫服 南陽活人書同

傷寒吐下後發汗虛煩脈甚微八九日心下

痞鞭脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脈動惕者

久而成痿 傷寒吐下後發汗則表裏之氣俱

獨在至七八日正氣當復耶氣當罷而心下

痞脇下痛氣上衝咽喉眩冒者正氣內虛而

不復邪氣留結而不去經脈動惕者經傷寒

發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者

旋復代赭石湯主之 大邪雖解以曾發汗吐下胃氣弱而未和虛氣

上逆故心下痞鞭噫氣不除與  
旋復代赭石湯降虛氣而和胃

旋復代赭石湯方

旋復花三兩味 人參二兩味 生薑五兩切

代赭石二兩味 大棗十二枚 甘草二兩炙

半夏半升洗 味辛温

鞭則氣堅鹹味可以與之旋復之鹹以與

痞鞭怯則氣浮重劑且以鎮之代赭之重

以鎮虛逆辛者散也生薑半夏之辛以散

虛痞甘者緩也人參甘草大棗之甘以補

右件七味以水一斗煮取六升去滓再煎

取三升温服一升日三服千金翼 〇袖珍

方右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去

滓通口服不拘時候無求子活人書旋覆

花三人參兩 代赭一分 甘草三分 半夏三分

〇南陽活人書加生薑 右剉如麻豆大每

服抄五錢匕生薑四片棗子一枚煎至八

分南陽活人書每服五錢 去滓温服

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱

者可與麻黃杏子甘草石膏湯前第三卷十

後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者為  
 與此證治法同干下雖殊既不當損正氣則  
 一邪氣所傳既同遂用一法治之經太陽病  
 所謂若發汗若下若吐後者是矣  
 外證未除而數下之遂協熱而利利下不止  
 心下痞鞭表裏不解者桂枝人參湯主之外證  
 未除而數下之為重虛其裏邪熱乘虛而入  
 裏虛協熱遂利不止而心下痞若表解而下  
 利心下痞者可與瀉心湯若不下列表不解  
 而心下痞者可先解表而後攻痞以表裏不  
 解故與桂枝人參湯和裏解表

桂枝人參湯方

桂枝 四兩 去皮  
 甘草 四兩 炙  
 白朮 三兩  
 味甘平

人參 三兩 味甘温  
 乾薑 三兩 味辛熱  
 方已上三味各二兩

表未解者辛以散之裏不足者甘以緩之  
 此以裏氣大虛表裏不解故加桂枝甘草  
 於理中湯也

右五味以水九升先煎四味取五升內桂  
 更煮取三升温服一升日再夜一服○傷

寒括要桂枝 兩 人參 兩 白朮 兩 乾姜 兩

甘草 兩 右為麤末每服三錢水一盞煎

六分去滓不計時候無求子活人書枝枝

一兩 甘草 一兩 三 乾薑 炮 人參 白朮 各一

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半

南陽

活人書煎至八分

南陽活人書煮至一盞

去

滓管見大全良方此温服日再夜一服傷

寒指掌圖桂枝一字半甘草上白朮人

參乾薑各一兩水三升先煮四味取一升七

合內桂更煮一升分三服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解

也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表

宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯大下後復發汗

則表裏之邪當悉已此心下痞而惡寒者表裏之邪俱不解也

因表不解而下之為心下痞先與桂枝湯解表表解乃與大黃黃連瀉

心湯攻痞內經曰從外之內而盛於內者先治其外而

後調其內傷寒發熱汗出不解心下痞嘔

吐而下利者大柴胡湯主之

傷寒發熱寒已成熱也汗出不

解表和而裏病也吐利心腹滿裏為裏虛嘔

吐而下利心下痞嘔者是裏實也與大柴胡

湯以下病如桂枝證頭不痛項不强寸脈微

裏熱浮胷中痞鞭氣上衝咽喉不得息者此為胃

有寒也當吐之宜瓜蒂散

病如桂枝證為發熱汗出惡風言邪

在表也頭痛項强為桂枝湯證具若頭不痛

項不强則邪不在表而傳裏也浮為在表沉

為在裏今寸脈微浮則邪不在表亦不在裏  
而在胃中也胃中與表俱應故知邪在胃中  
者猶如枝登而寸脈微浮也以胃中痞鞭  
上衝咽喉不得息知邪客於胃中而不在  
表也千金曰浮上部填塞胃心胃中滿  
者吐之則愈與瓜蒂散以吐胃中之邪

傷寒明理論華佗曰四日在胃則可吐之  
此迎而奪之之法也千金方曰氣浮上部  
填塞心胃胃中滿者吐之則愈此隨證治  
之之法也大約傷寒四五日邪氣客於胃  
中之時也加之胃中煩滿氣上衝咽喉不  
得息者則為吐證具乃可投諸吐藥而萬

全之功有之矣芡蒂味苦寒內經曰濕氣  
在上以苦吐之寒濕之氣留於胃中以苦  
為主是以芡蒂為君赤小豆味酸濕內經  
曰酸苦湧泄為陰分湧膈實必以酸為助  
是以赤小豆為臣香豉味苦寒苦以湧泄  
寒以勝熱去上膈之熱必以苦寒為輔是  
以香豉為使酸苦相合則胃中痰熱湧吐  
而出矣其於亡血虛家所以不可與者以  
芡蒂散為缺劑重亡津液之藥亡血虛家

補養則可更亡津液必不可全用藥君子必詳究焉

### 瓜蒂散方

瓜蒂一分熬黃赤小豆一分味

其高者越之越以瓜蒂散鼓之苦在上者湧之以赤小豆之酸內經曰酸苦湧泄為陰

右二味各別搗篩為散已合治之取一錢

七千金翼方以香豉一合用熱湯七合無

子活人書南陽活人書此下有先漬之須臾五字煮作稀糜去滓

取汁和散溫頓服之不吐者少少得快

吐乃止千金方張文仲以諸亡血虛家不

可與瓜蒂散聖濟總錄承○宣明論治傷

寒表證罷邪熱入裏結於胃中項滿而飢

不能食四肢微厥而脈乍緊者宜以吐之

經云在上吐之在下洩之瓜蒂赤小豆等

右為末香豉半合豆水一盞半煮取汁半

盞調下一錢七不吐加服吐止醫方大成

治傷寒四五日病在胃膈痰氣緊滿於上

不得息息者當以此吐之瓜蒂一兩赤小  
 豆一兩右咬咀每服三錢水盞半入豉六合  
 同煎至六分去滓溫服以吐得快為度亡  
 血體虛者不可服醫方集成南北經  
 病脇下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰筋  
 者此名藏結死素有宿昔之積結於脇下為  
 積相筋使藏真之氣結而不通致傷寒病若  
 連在臍傍痛引少腹入陰筋而死傷寒病若  
 吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱  
 時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升

者白虎加人參湯主之若吐若下後七八日  
 結在裏表熱者身熱也裏熱者內熱也本因  
 吐下後邪氣乘虛內陷為結熱若無表熱而  
 結為裏熱則邪熱結而為實此以表熱未罷  
 時時惡風若氣純在表則惡風無時若邪氣  
 純在裏則更不惡風以時時惡風知表裏俱  
 有熱也邪熱結而為實者則無大渴邪熱散  
 漫則渴今雖熱結在裏表裏俱熱未為結實  
 邪氣散漫熏蒸焦膈故大渴舌上乾燥而煩  
 欲飲水數升與白虎傷寒無大熱口燥渴心  
 加人參湯散熱生津  
 煩背微惡寒者白虎加人參湯主之無大熱  
 無大熱也口燥渴心煩者當作陽明病然以  
 背微惡寒為表未全罷所以屬太陽也背為  
 陽背惡寒口中和者少陰病也當與附子湯  
 今口燥而渴背雖惡寒此裏也則惡寒亦不

至甚故云微惡寒與白虎湯傷寒脉浮發熱和表散熱加人參止渴生津無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之傷寒脉浮發熱無汗其表不解者宜五苓散非白虎所宜大渴欲水無表證者乃可與白虎加人參湯以散裏熱臨病之工夫官精別太陽少陽併病心下鞭頸項強而眩者當刺大椎肺俞傷寒論此下有肝俞二字慎勿下之心下痞鞭而眩者少陽也項項強之邪以太陽脉下項俠脊故尔肝俞以寫少陽之邪以膽為肝之腑故尔太陽為在表少陽為在裏即是在半表半裏證前第八證云不可發汗發汗則譫語是發汗攻太陽之邪少

陽之邪益甚于胃必發譫語此云慎勿下之攻少陽之邪太陽之邪乘虛入裏必作結胃經曰太陽少陽併病太陽與少陽合病自下而反下之成結胃利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生姜湯主之根湯發汗陽明少陽合病自下利為在裏可與承氣湯下之此太陽少陽合病自下利為在裏為在半表半裏非汗下所宜故與黃芩湯以和解半表半裏之邪嘔者胃氣逆也故加半夏生姜以散逆氣黃芩湯方

黃芩 三兩 味苦寒  
 甘草 二兩 味甘平  
 芍藥 二兩 味酸平  
 大棗 二十枚 擘 味甘温  
 ○傷寒論十二枚

虛而不實者苦以堅之酸以收之黃芩芍藥之苦酸以堅斂腸胃之氣弱而不足者甘以補之甘草大棗之甘以補固腸胃之弱

右四味以水一斗煮取三升去滓服温一

升日再夜一服千金翼方同若嘔者加半夏半

升生薑三兩○傷寒論黃芩加半夏生薑

湯方黃芩兩三芍藥甘草各二兩炙大棗十二枚擘半

夏半升洗生薑方三兩切右六味以水一斗

煮取三升去滓温服一升日再夜一服千金

同翼方

傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐

者黃連湯主之濕家下後舌上如胎者以升

裏而為下熱上寒也此傷寒邪氣傳裏而為

下寒上熱也胃中有邪氣使陰陽不交陰不

得升而獨治於下為下寒腹中痛陽不得降

而降陰陽黃連湯方

黃連味苦甘草炙味甘平乾姜味辛熱桂枝去皮未辛

熱各人參二兩味甘温○半夏半升洗味

三兩活人書永大棗十二枚擘味甘温○無

類鈞方二兩半活人書無大棗唯服

法有

上熱者泄之以苦黃連之苦以降陽下寒者散之以辛桂姜半夏之辛以升陰脾欲

緩急食甘以緩之益胃

甘草大棗之甘以益胃

右七味以水一斗煮取六升去滓温服一

升日三服夜二服傷寒論云疑非仲景方

二枚煎殘○無求子活人書右判如麻豆

大每服抄五錢匕棗二枚水三盞煎取一

盞半去滓分二服南陽活人書甘草三分

黃連三分草姜三分大棗三個人參二分半夏六錢

桂枝三分右判如麻豆大水三盞煮水一盞

半去滓分二服玉機微義黃連甘草炙乾

姜桂枝各二錢人參半夏大棗二枚右咬

咀水煎

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉

側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主

之傷寒與中風家至七八日再經之時則邪

體疼煩不能自轉側者風濕相搏也煩者風

也身疼不能自轉側者濕也經日風則浮虛

無邪也脉得浮虛而濇身有疼煩知風濕但

在經也與桂枝附子若其人大便秘傷寒論  
 湯以散表中風濕云臍下小便自利者去桂枝加白朮湯主之  
 桂枝附子湯方  
 桂枝四兩去皮附子三枚炮去皮生薑三  
 切辛甘草二兩炙大棗十二枚擘  
 溫在表者散以桂枝甘草之辛甘濕在經  
 者逐以附子之辛熱姜棗辛行榮衛通  
 津液以不  
 和表也  
 右五味以水六升煮取三升去滓分溫三

服千金翼方此下云朮附子湯於前方中  
 日許復服之盡其人如冒狀勿怪即是附  
 子朮併走皮中逐水氣未得除故使之耳  
 法當加桂四兩以大便堅○無求子活人  
 小便自利故不加桂也  
 書治傷寒八九日醫方大成此下風濕相  
 薄身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉浮  
 虛而濇者屬太桂枝二兩○南陽活甘草  
 一兩○南陽活附子一枚半炮去皮○南  
 人書六錢三字  
 皮破作右剉如麻豆大每服抄五錢匕水  
 十六片  
 一盞半生薑四片棗子一枚  
 聖濟總錄薑  
 五片棗二枚

煎至八分去滓溫服醫方大成桂枝一兩三錢  
 甘草六錢三字附子一个炮右咬咀每服五錢水  
 一盞薑四片煎八分溫服醫方集成南北經驗方袖珍方  
 同永類鈴方傷寒八九日風溫身體煩疼  
 不能轉仄不嘔不渴脉浮虛而瀼屬太陽桂  
 枝乙兩三錢附子乙枚炮甘草三分炙若大便鞭  
 白朮乙兩三錢右咬咀每服三錢生薑四片棗一  
 枚煎八分溫服傷寒論去桂加白朮湯方  
 附子三枚炮去皮破白朮四兩生薑三兩切甘草二兩炙

大棗十二枚擘右五味以水六升煮取二升去  
 滓分溫三服初一服其人身如痺半日許  
 復服之三服都盡其人如冒狀勿怪此以  
 附子朮併走皮內逐水氣未得除故使之  
 耳法當加桂四兩此本方二法以大便  
 鞭小便自利去桂也以大便不鞭小便不  
 利當加桂附子三枚恐多也虛弱家及產  
 婦宜減服之  
 風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則

痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或  
 身微腫者甘草附子湯主之風則傷衛濕流  
 關節風濕相搏  
 兩邪亂經故骨節疼煩掣痛不得屈伸近之  
 則痛劇也風勝則衛氣不固汗出短氣惡風  
 不欲去衣為風在表濕勝則水氣不行小便  
 不利或身微腫為濕外薄也與甘草附子湯  
 散濕固衛氣

甘草附子湯方

甘草 二兩炙 附子 二枚炮去皮 白朮 二兩  
味甘平 破 味辛熱 味甘  
 溫○千金翼方 桂枝 四兩去皮  
 聖濟總錄三兩 桂枝 味辛熱  
 附子 白朮之辛甘解濕氣而溫經

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一

升日三服初服得微汗則解能食汗出傷寒

論作復煩者服五合恐一升多者宜服六

七合為妙○聖濟總錄右四味咬咀如麻

豆大每服五錢匕以水一盞半煎取七分

去滓溫服日三服初服得微汗則解能食

汗止復煩者少減服之千金云身腫者加

防已四兩悸氣小便不利者加茯苓三兩

既有附子今加生薑三兩無求子活人書

甘草

炙白朮各一兩

附子

一枚炮去皮○南陽活人書四片

桂枝

三兩或作二兩身腫者加茯苓一兩半○

傷寒活人書悸氣即動氣也

不利者加茯苓一兩半○

匕水一盞半煎至七分去滓溫服汗出即

解

傷寒脉浮滑此表有熱裏有寒白虎湯主之

浮為在表滑為在裏表在熱外有熱也裏有寒有邪氣傳裏也以邪未入府故止言寒如瓜蒂散證云胃上有寒者是矣與白虎湯以解內外之邪

傷寒明理論白虎西方金神也應秋而歸

肺熱甚於內者以寒下之熱甚於外者以

涼解之其有中外俱熱內不得泄外不得

發者非此湯則不能解之也夏熱秋涼暑

喝之氣得秋而止秋之令曰處暑是湯以

白虎名之謂能止熱也知母味苦寒內經

曰熱淫所勝佐以苦甘又曰熱淫於內以

苦發之欲徹表熱必苦為主故以知母為

君石膏氣必以甘寒為助是以石膏為臣

甘草味甘平小甘寒熱則傷氣寒以勝之

甘草味甘平小甘寒熱則傷氣寒以勝之

甘以緩之熱勝其粳米味甘平脾欲緩急  
 食甘以緩之熱氣內餘消燥津液則脾氣  
 燥必味甘平之物緩其中故以甘草粳米  
 為之使是太陽中暍得此湯則頓除之即  
 熱見白虎石盡矣立秋後不可服以秋則  
 陰氣半矣白虎為大寒劑秋生之時若不  
 能禁服之而為噦逆不能食成虛羸者多  
 矣

白虎湯方

知母 六兩 味苦 寒 石膏 乙斤 碎 味甘 寒 甘草 二兩 味甘 平  
 粳米 六合 味甘 平

丙經曰熱淫所勝佐以苦甘知母石膏之  
 苦甘以散熱熱則傷氣甘以緩之甘草粳  
 米之甘以益氣

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓温服

一升日三服 千金翼方同傷寒論註曰臣  
 億等謹按前篇云熱結在裏

表裏俱熱者白虎湯主之又云其表不解  
 不可與白虎湯此云脉浮滑表有熱裏有  
 寒者必表裏自差矣又陽明一證云脉沉  
 遲表熱裏寒四逆湯主之又少陰一證云  
 裏寒外熱通脉四逆湯主之以此表  
 裏自差明矣千金翼云白通湯非也 ○無

求于活人書治傷寒脉浮滑者表裏有熱  
 又三陽合病腹滿身重難以轉側口中不  
 仁面垢讖語遺尿發汗則讖語下之則額  
 上生汗手足逆冷若自汗出者傷寒脉  
 滑而厥者裏有熱並主之知母三兩甘草一兩  
 炙石膏八兩碎粳米三合右剉如麻豆大每  
 服五錢匕水一盞半煎至八分取米熟為  
 度去滓温服南陽活人書同  
 傷寒脉結代心動悸炙甘草湯主之結代之脉動而

中止能自還者名曰結不能自還者名曰代  
 由血氣虛衰不能相續也心中悸動知真氣  
 內虛也與炙甘草湯  
 益虛補血氣而復脉

炙甘草湯方

甘草四兩炙生薑三兩切桂枝三兩去皮  
 人參二兩生地黄一斤阿膠二兩  
 麥門冬半升麻子半升大棗二十  
 枚擘味甘温○千金  
 補可以去弱人參甘草大棗之甘以補不  
 足走氣桂枝生薑之辛以益正氣聖濟經  
 曰津耗散為枯五藏痿弱榮衛涸流濕劑  
 所以潤之麻人阿膠麥門冬地黄之甘潤

經益血復  
脉通心也

右九味以清酒七升水八升先煮八味取  
 三升去滓丙膠烱消盡温服一升日三服  
 一名復脉湯○無求子活人書甘草二兩  
 人參一兩生地黃八兩桂枝一兩半麻人一分  
 麥門冬一分右剉如麻豆大每服五錢  
 匕永類鈴入姜五片棗一枚水一盞半入  
 酒半盞煎至八分去滓內阿膠一片膠烱  
 盡温服日三服南陽活人書甘草一兩生

姜三分人參半兩生地黃四兩桂枝三分麥門

冬一分大棗八個麻仁二合右剉如麻豆大每

服五錢水一盞半入酒半盞煎至八分去

滓內阿膠一片膠溶盡温服日三服

脉按之來緩而時一止復來者名曰結又脉

來動而中止更來小數中有還者反動名曰

結陰也脉來動而中止不能自還因而復動

名曰代陰也得此脉者必難治結代之脉一

一為真氣虛衰脉來動而不止若能自還更  
來小數止是邪氣留結名曰結陰若動而中

止不能自還因其呼吸陰陽相引復動者是  
真氣衰極名曰代陰為難治之脉經曰脉結  
者生代者死此之謂也

釋音

來

俛音免

目

置

疢

癘

癘

癘

癘

柔

音軟

也

也

也

也

也

也

也

醫方類聚卷之四十三

