

外科全書百效
下冊

豫章儒醫龔履建德縣人父順者

胸腹部

乳癰



乳癰

乳癰之症有孕曰內次養子者曰外吹廼婦人飲食厚味忿怒憂鬱以致胃火上蒸乳房汁化為濁膿肝經氣滯乳頭竅塞不通致令結核不散痛不可忍

大凡乳上纏竟硬腫作痛宜以葱餅熨之其法用個潤口瓶以炭
 火八瓶內上以熱灰填滿瓶口用葱葉及葱白搥損令遍覆瓶
 口用手帕裹瓶倒執將瓶口向腫處任意輕匕熨之切莫亂施
 針刀以傷其房縫或初起隔蒜灸炙猶可

相傳內吹初起單方鹿角磨酒多服外吹初起單方用百齒霜
 垢為丸雄黃衣服七丸出汗就愈不出汗再服七丸神効

龔如傳秘方治乳癩用漏芦川山甲金銀花白芷稍連喬貝母未
 京赤芍甘草節各等分白水煎數沸方入大黃煎一二沸取起

頓服被蓋出汗次日膿血盡從大便出神効不愈再服腦繼內
 干釜托裏散
 龔應圖製治乳癩乳癰神方外用鉄楹散敷內即服防丰連喬

姜蚕陳皮青皮貝母漏芦烏藥薄荷銀花羌活甘草煎湯如
 不消再用土烏藥燉水洗三次果勢甚即服防丰當歸白芷陳

皮青皮貝母姜製漏芦川山甲喇成乳香沒藥人參黃芪肉桂

一惟內吹者不可用桂恐桂動胎也如潰爛外用化毒丹攪後用

白硃砂散或生肌散攤之如有孔久不合口用青黛陳皮各等

分將帛條拌麻油蘸藥未透入如体薄人不出膿必用針刀仍

核久內脹依痛外腫堅硬手不可近謂之乳癰未潰者宜服瓜蒌

湯將遺兩乳間出黑頭瘡預下作黑眼者宜服內托升麻湯已

潰者宜服方括歌內十宣散及髮疽內補中益氣湯之類

○瓜蒌湯 瓜蒌 箇當歸 甘草 絡五乳香 沒藥各一 水酒煎服

○內托升麻湯 升麻 葛根 連喬 黃芪 當歸 鼠粘子

肉桂 黃栢 甘草 水煎入酒開服

又有鬱怒傷肝脾結核如蟹碁子大不痛不痒五七年後外腫紫

黑內漸潰爛名曰乳癰滴盡氣血方死急用痰核內十六味流

氣飲及單青皮湯兼服如虛者只用潰肝解鬱湯更加清心淨

養庶可苟延歲月以後必于乳下潰一穴出膿

清肝解毒湯 當歸 川芎 白芍 熟黃 柴胡 白朮

人參 陳皮 炒梔 茯苓 牡丹皮 貝母 水煎服

婦人乳頭裂治宜秋後茄花陰乾清油調敷或秋後茄子裂開者

陰乾燒灰存性為末水調敷

乳勞癰爛見心者用猫兒腹下毛乾鍋內煨存性為末干摻或八

輕粉少許清油調搽

乳中瘰癧起痛用川黃連大黃各二兩水煎服

乳痒先以粉草磨水搽後以油醬搽効

乳後乳如石硬不散用陳皮一斤夫自鹽水大半下半斤生薑

共為丸青黛為衣每將菱霄花炆水送下三四十九丸或酒吞嗽

乳中番花石櫛砭此症治者少不治者多亦宜生肌之藥內吃外


敷而不生肌必死

疔子乳疾治與婦人微異甚怒火房熬過度以致肝虛血燥腎虛

精法不得上行痰瘀凝滯方能結核大槩男子兩乳腫首尾痰核內十六味流氣飲左乳者足于陰虛鬱怒所致用痰癥內八物湯加山枝牡丹皮或前清肝解鬱湯火盛風熱者更加炒黑草丸胆五分如飲食少進依嘔胸脇作痛眩昏頭痛溺澀者宜大頭腫內六君子湯加芩歸柴胡山梔

如潰爛作痛者宜用痰癥內八物湯加黃芪肉桂腎虛再加故芷如因勞怒則痛併發寒熱者宜用髮疽內補中益氣湯加炒黑山梔子不可輕用清熱敗毒之劑

臟腑癰疽圖




中門
大腸

肝
胃
脾
小腸

關

○每穴內隱也痛也爲疽肉上微起者爲癰假如中府隱痛者肺癰也余各穴做此宜流氣飲或托裏散加當歸山枝黃芩杏仁

疽 井



癰 脇 兩



肺痿肺癰

是症經年久咳熱極葉焦而爲痿猶草木亢甚則枝葉痿落也火燥甚則腐脹爲膿血成癰病因汗吐下後亡津或督虛火炎或厚味燻蒸而成其候惡風咳嗽鼻塞流涕頃強不能轉側皮膚不潤澤胸脇脹滿呼吸不利吐痰血腥穢若要辨真假將黃豆根研水服也得者真服不得者不是肺癰也

肺痿脉数而寔咳多寒熱自汗宜知母茯苓湯去門冬

○知母茯苓湯 知母 茯苓 黃芩 五味 半夏 柴胡

白朮 人參 桔梗 薄荷 川芎 阿膠 甘草 欬散

如咯血將交癰者紫苑散金銀花

○紫苑散 紫苑 知母 貝母 人參 茯苓 桔梗 五味

阿膠 甘草 生姜煎服 火盛者人參平肺散為丸含化

○人參平肺散 桑皮倍下 人參 知母 地骨皮 五味子

青皮 棘破 茯苓 黃芩 麥門冬 各等分為未密調力彈子大

喘急而浮鼻塞胸脹及喘不眠者宜用葶藶三兩為末大棗三千

以水三升煮取二升再去棗煎至七合頓服盡三日一劑

或單以葶藶隔昏炒為末水煎服是知肺痿有寒有熱而以清金降火豁痰為主也

祖傳腫癰之症始則易治膿成難愈脉微緊而數未成膿也脉緊

而數已成膿也男子以氣為主十救一二女子以血為主十全

六七九初起口燥咽乾胸脇隱痛咳唾膿血氣息瞿曼治宜
桔梗 三茸草 礞石 門冬 法礞煎服或加味敗毒散調之

○加味敗毒散 薄荷 瓜蒌 白芷 烏梅 生黃 黃芩

歸尾 半下 桑白皮 茅根 灯心

如有膿腥氣上衝嘔而嗽及吐膿者俱宜消膿飲或用生地黃熟
地黃 天門冬 生薑 蜜水 飪上蒸熟細匕頰服若收口以槿木皮

白欬煎服

○消膿飲 貝母 知母 生薑 阿膠 桑皮 防干 天門

冬 桔梗 薄荷 蘇子 白芷 身枚 南星 半下 川芎

射干 杏仁 茸草 白芷 身枚 姜煎服

如咽痛者韡桔梗湯便秘者前太乙膏為丸白湯下

又有胸脇間開一竅口中所咳膿血與竅相應而出者宜大補氣

血七多者梅豆湯冷熱不調者前雲母膏為丸并桔湯下

豆湯 黑豆 烏梅

慧以仁水煎服以阿膠薄黃人肉再煎數沸服之

如穀 胃水不足虛火上炎咳吐

膿血喘而短氣發熱依渴小便不調

治宜參芪補肺湯如皮虛

少食加升麻桔梗去山茱如山藥熟地黃

○參芪補肺湯

人參 黃芪

白朮

茯苓

陳皮

當歸

山藥

五味麥冬

甘草 絡

五熟地黃

分一五

牡丹皮

姜煎

大槩面赤當補脾唇面白當

補肺蓋補脾以生肺金補肝以生腎

水也如陰火發熱面赤咳吐

膿血痰如糯米粥脉浮大者火剋金

也不治如脉浮短滑可治以其有本脉也

心癰

心癰之症生兩乳中間狀如

豆大三四日起不早治入于腹十日

死又云外候可治內候傷膜

難治

如疔此症小便澀者宜黃芩

黃連甘草桔梗白芷天花粉瞿麥淮

或清心散如大便秘者

用前方括歌內固清心散或黃芩黃

連耳草 桔梗 白芷 生地 天花粉 大黃

●清心散 遠志 赤苓 赤芍 生地 麥冬 知母 母草

生姜 棗子 同煎服

如生于胸乳上些有几孔者亦名蜂窠癰發乃心火熱盛治宜急

以疏導心火之藥稍遲則熱極難治

如心頭有孔常出氣水謂之心漏治宜鹿昔去銛附子炮去鹽花

仁為未燻肉二兩搗為丸空心酒下

予治一人病井疽已潰內服托裏清心之劑外用敷洗燻割生肌

歛口如法治之一月全愈

脇癰

脇癰之症蓋由脇肝心火盛虛中有熱決不敢投陽藥倘誤投熱劑則虛挾愈盛易傷骨膜慎之

初起宜乳瘋內瓜蒌湯或鬢疽內柴胡清肝湯治之唯潰後方

敢清熱托裏兼滋腎水

胃癰

胃癰之症多因飲食七情火鬱復被外感寒氣所隔使濁熱之氣填塞胃脘胃中清氣下陷故胃脉沉細惟寒氣所隔故人迎緊盛有此二脉者胃癰真也

外症寒熱如瘧胃濁則肺金失養故身皮錯縱或咳或嘔或嗽膿血俱宜大射干湯主之

●大射干湯 射干 赤苓 赤芍 白朮 枝子 升麻 用

水煎入蜜生地黄汁間服

如痰壅者并桔湯如大便不利者前太乙膏為丸服

如小便不利者及腹滿不食宜三仁湯

○三仁湯 冬瓜仁 薏以仁 桃仁 牡丹皮 白水煎服

如膿出食少者宜補中益氣湯升提胃氣或佐以前藥調之不可

專治其瘡

腸癰

腸癰之症濕熱鬱積成癰小腹疼痛小便澀似淋大便澀難也若

腹脹大轉側聞有水或遠臍生瘡出膿大便屢下膿血者不治

此症脈遲緊若未有膿也用大黃湯下之或用射香乳香下香沉

香木香連喬大黃通草獨活扁竹甘草下之方可不散不則以散

●大黃湯 大黃 芒硝 牡丹皮 瓜蒌 桃仁

若脈乳濡者 宜用當歸 川芎 白芍 玄胡索 地黃 桃

仁 紅花 木香

如脈洪數者已有膿也宜前胃癰內三仁湯或乳瘋內瓜蒌湯妙

如脈數外無潮熱內無積聚身皮甲錯腹急如腫按之却軟乃內

虛陰冷凝痰成癰宜牡蠣餅或十宣散之類

●牡丹散 人參 黃芪 天麻 白苓 白芷 川芎 木香

芩當歸 慧以仁 桃仁絡一官桂 甘草路五水煎服

如小腹疼痛小便不利此膿瀝滯也亦宜牡丹散治之

如冷熱相併或痛甚或大便從小便出者俱宜前雲母膏為丸牛

膠煎酒下利去瘀膿則愈

如下膿過多者宜肺癰內傷豆湯加甘草桔梗和之蠟丸丸妙

如虛兒傳治腸癰小腹痛二更難者用當歸而甜瓜子合蛇退

條水煎服四五貼○如腸中痛不可忍者用敗醬甜瓜子赤芍

枳仁芒硝大黃水煎服六七貼○如腸癰成膿者用牛黃和血

蝟蝟大黃牙硝牽牛匕旁子故芷共為末温酒調服以利為度

若膿止後用髮疽內補中益氣湯或痰癰內入物湯以固本元

愈後却官靜養稍動作燥暴及破驚恐必腸斷而死又云癰生

小腸分尤可治癰生大腸分近肚門者難治肚門破者即死

腹癰

方... 卷之三... 陽... 七

腹癰之症生于肚腹皮裏膜外左關脉洪數而腹痛甚者真也乃膏梁七情火鬱以致皮虛氣滯而成小兒多因驚積屬損而成食積疝氣相類不可誤治

此症幔腫堅硬肉色不變未有膿也宜 人參 白朮 茯苓

川芎 白芷 當歸 枳壳 甘草 或前方括歌內托裏散

如炊腫痛甚者邪氣寔也先用腦疽內活命飲隔蒜炙以殺其毒後用托裏散以補其氣

如腫起而軟色不赤者膿成也宜方括歌內托裏消毒散若膿成而不外潰者氣血虛也針刺之

又云此症不問初起已潰未潰但宜此胃元氣而佐以行經活血若誤用剋代及利下涼藥則腫不能潰不能斂決難治之若曾經誤下及服降火破氣消癰之藥大劑參芪姜附或疔癰內八物湯加桂芪急救之

臍癰

一人臍腫紅痛久服流氣飲針開口膿出四五箇月不止後用蒜

盛艾炙內服五香連喬湯全愈

○五香連喬湯

丁香

南木香

沉香

乳香

當歸

貝母

連喬

人參

各一

羌活

五分

射香

四分

如臍上生瘡出水不于用枯凡白龍骨煨過為末攪上如神

小兒臍瘡以紅綿燒灰黃土糞燒灰干胭脂各等分溫則攪上于

則香油調搽

小兒臍水不干用鳳凰衣燒灰存性攪之

壯角癰用腦疽內干金托裏散神效

背

腰


部

脾肚發




此名脾肚發生在肩下吞上脾肚之間乃因飲食感毒或廣一尺
 深一寸雖漬在骨不穿膜不死急治脾胃中之毒內服方括內歆
 護心散外用敷藥恐毒奔心大要服藥截住如通吞背腫者不治

右脾蓮蓬發




○此名右脾蓮蓬發外如蓮蓬內有子孔失治恐其毒奔人心大
 要用方括內托裏散加黃芩連栢芽蓋散之不令攻心漸消可
 治通背腫亦危

左脾發又曰左時發




○此名左脾發坐于左膊之間初起灯心點
內服後疥瘡內迫
疥湯汗之即愈

脊中蜂窠發




口此名春中蜂窠發生在正當春心形如蜂窠但有孔在上者迺
 是友病不宜治亦以前方括內托裏散加菊花生肌定痛妨毒
 攻心八膜難療

右搭肩串發



○此名右搭肩發生在右搭肩骨上以動之處可治若串左肩難
 治宜服前方括內托裏散加升麻桔梗外用玉紅散或綿絮燒
 灰雞黃皮焙干爲末摻之干者麻油調搽

左搭肩發



○此名左搭肩發生在左搭肩骨上以動之處可治若申右肩治此難矣


對心發



○此名對心發生在對心處是症極重乃因心火盛而熱氣會生


于此其毒壯盛走暴急用疎導心火之藥解之然後用生肌藥

龜背發



○此名龜背發生于背上頭尾俱尖四邊散大如龜之形乃因飲食所致而氣食相關合陰虛而成之氣虛而散者所以開口而濶急以托裏補藥治之

走流注發



○此各散走流法發又名瓜藤發乃毒氣乘風熱而志急宜隨風定熱治之則氣自息若流注于手脚臄者必死無疑治宜十六味流氣飲各服潰膿針破單用化毒丹久攪

發背

蓋背田勝脫督脉所主缺竅藏所徠於背或醇酒厚味或鬱怒房勞以致水枯火炎痰凝氣滯或被外邪與毒相搏隨處發生祖傳云真背發腫處多小口如沙眼樣若無者乃陽毒也又云背發黑暗對心者死不對心但乎冷不痛不紅黑陷者救急以生姜貼毒上艾炙變紅方可外治又云背發之症先疼後痛最爲惡症始起如豆者便是宜灸之初灸不痛灸之極痛則止初灸痛灸之不痛則止使毒氣隨火而散或稍大不可灸者用針刺破火筒吸拔之五次去惡血又有甚腫而大已成不可破者急以斷法斷之用白霜梅兒角二味燒灰存性爲末不發熱者米

泄姜汁調塗四圍則外即不走謂如發熱者用茶調塗後以烏

不伏根水洗淨醋煨熱氣薰二三次活肉去盡方用黃柏草烏

川山甲炒為末鴨子清調敷或用白芨白飲荆芥赤芍黃柏大

黃當歸白芷南星赤豆草烏寒水石煨商陸等分為末地黃

汁調塗留口後用片腦龍骨乳香沒藥兒茶血竭輕粉為末攪

或炒雄黃漂硝白凡硃砂為末攪之內服前方括內十宜散咸

張指揮傳治初起背發陽毒陰消方用官桂法被連喬去乳香

沒藥絡二子黑牽牛七大黃五麥虫二酒子白芷一粉草節二當

歸五子子川山甲三炒子未每酒調三錢服

應圓製自壽貴下發已成未成服之無不應効

先武白芨川芎防丰官桂桔梗白芷瓜蒌仁金

大合一貼用生頭酒煎熱服出汗為度後服


川山甲二炒子珠石乳香暗沒藥暗白芨暗田暗炒子

母草糸大黃細皂角刺炒糸已上八味藥要真潔製煉依法共
研為極細末用當歸四糸剉碎將半酒半水三盞同煎調煎藥
末空心通口盡服如當歸酒不足加好酒調服以利膿血三五
次為度利後用粥補即止服藥後忌用油膩生冷煎炒熱毒及
諸丸發物且慎弗行動勞碌視為常疾須靜坐六七日此方百
發百中無不應驗

如虛兒傳治皆發已潰未潰得效良方


外用厚朴三糸姜陳皮白糸去甘草節二糸蒼朮五糸桑黃拔
紐其為細末清油調塗一內服乳香沒藥赤芍絡二貝母
川山甲炒皂莢當歸絡二防丰紐白芷一糸退紅大黃紐
天花粉八金銀花五二糸甘草節八水煎生酒開服如已潰者用
黃連煮過竹筒吸毒上其膿出後用黃連炆水洗七後用化毒
生肌斂口如法

腎俞發



此名腎俞發乃濕熱色勞所致急宜用藥解內腎之毒更用生肌夾攻之治法詳後

丁腎俞雙發



○此各腎下双前發亦由湿热房勞鬱怒過度故兩腎則俱生湯
治詳後

腎俞發

腎俞發症原因受湿并怒氣飲热酒傷于腎內流毒在腎俞生疽
若下腎俞發更加房勞鬱怒過度所致也又有腎愈一發脾腎
上一發肩腹上三生一發亦各發但此三症陽發于外者易治
陰發痰發傷腎臨及膿稀者死
此症初起焮腫發熱疼痛色赤作渴昧滑數有力先宜服驢痘內
消命飲後用方括內托裏消毒散

如腹腫不熱微痛色黯作渴脉數無力腎虛也宜方括內托裏散
如發熱陰虛者宜四物湯加人參白朮

如惡寒熱四邊甚大者陽氣虛也宜單人參湯或八物湯加芪桂
如初起食少者邪盛脾虧急用補中益氣湯

祖傳治腎俞總方

內服用方括內托裏散加車前木通淡竹葉

牽牛何首烏脚連復用內消散及生肌定痛散敷之及膏藥貼

更以痰核內十六味流氣飲加減服

大凡厥腫氣血勝毒者易治腹腫服托裏藥不應者乃毒勝氣血死


在旬日或已發出而不腐潰者急用托裏散兼硝脾胃不應者

死在二旬若已潰而色不紅活者用托裏散加人參黃芪肉桂

及補脾之藥如不能生肌瘡口黯暈大而不能生脾崩也死在

腎腿部

腎瘰



便毒

腎證

腎癰之症乃陰虛血熱所致當知腎居小腹之後部位僻奧詳曰
之血然氣既罕到血亦罕來尤忌此誠為可慮

此症初起未成膿者隔蒜灸之再用葱熨法

如欲作膿者內托羌活湯如痛甚者前方括內活命飲

○內括羌活湯 酒黃柏 黃芪 防丰 當歸 槁本 連喬

甘草 蒼朮 陳皮 肉桂 牛水半酒煎

如腫硬痛者宜方括內托裏消毒散或托裏散



如脾虛不能消穀或食少不化膿者或偏右臀腿者宜大頭風內

六君子湯加蒼朮黃芪

如脾虛誤服消導藥以致氣陷下腫痛甚者宜補中益氣湯或八

物湯加芪桂潰後亦宜進此二藥以固其裏兼節酒色戒燥暴

乃可萬全如內傷房室兩臂腫硬二便不通者宜八物加芪桂

車全牛夕故並小茴之類

曾一人近肛門處作一毒如碗大名曰臍毒已作成膿用艾依法

灸一二十壯次日將麵粉作一團糰毒上又將槐樹皮為一圓

片蓋麵粉圈上將大艾丸置槐皮中間灸出黃水為度其槐皮

要將粗皮存下嫩皮在上如此治之即愈

臀疽瘡

管瘋

方用硫黃末

帛上捲箇為條將麻油浸透攤攤點炒滴出藥

油參冷頻搽

二方川核桃肉七箇人桐子肉一个硫黄加水銀犯其爲

便癰

便癰俗云便毒實血疝也生于腿膀小腹之間近陰上處乃厥陰肝經及衝任督三脉隨道精氣出入之路也或入房忍精或思色不遂或泄不泄敗精凝滯爲癰腫痛在胯腹之間

江氏傳先用蘇葉 陳皮 香附 麻黃 干葛 升麻 赤芍

羌活 一貼煎服 後以川山甲 炒白姜蚕 炒皂角 炙五灵脂

炒大黃共爲細末酒調下通三次而安或去五脂加白芷貝母

亦妙 体虛者用 人參 三 炒熟再入大黃 同炒畧熟取服

初起及久欲成漏者俱宜蠟 凡丸神効

應員製 治便毒用 姜虫 楝 牽牛 貝母 白芷稍

大黃川山甲 各二 同煎炮 皮硝 三 生磨大黃 細 空心服通四

五次以粥止之外用倍子 白丸 醋調敷如要腫破用烏豆去皮

生搗爛鴨清調敷過一夜即破出膿

瘡氣 是症凡便毒下些返陰下 治宜大黃 紅川山甲 牡黃柏

黃芩 姜黃 白芷 絡三 白水煎生酒開服被蓋出汗為度或

黑牽牛 七糸 大黃 五糸 牛蒡子 貝母各三糸 羌活 獨活 各

錢 甘草一糸 好酒煨空心 熱服 四貼

騎馬 是症即便毒左右兩邊俱發或先有疔瘡而發或卒然起

核疼痛而發治法同使毒但潰後亦如總要敷洗化毒生明嗽

路岐 俗名瘰癧些小勝瘡 此症小兒患之或因食積痰滯

用牽牛雄黃川練子花粉枳壳貝母甘草等分為末南酒調

服三五劑出膿即消

如痛不可忍者用細辛黃連川山甲乳香沒藥連喬歸尾大黃枝

子銀花牡礪車前子防丰 鞞核桃去油酒煎五更服

腫不消用陀生黃連黃柏輕粉為末摻之鹽湯洗之內以赤葛

生姜同搗爛銚熱酒服之汗出為度滓用敷瘡

過稟 治宜山菇貝母川山甲大黃茫硝栝榔莪木煎服或大黃

川山甲姜豕黃芪牡礪酒水各半同煎空心服

懸癰

懸癰之症乃足三陰虧損生谷道前陰囊之間初發甚痒狀如松子或如蓮子曰久如桃李加以赤腫若破則大小便從此中而出不可救也輕則滴盡血而死重則內潰而亡

此症初起濕熱壅滯依痛燉腫者治宜腦疽內活命飲去大黃加

蒼朮枳如不成膿不潰者入物湯或腫脹已成者急針之微其生册收飲

如血虛者宜歸芍黃八參白朮氣虛者參朮苓芍歸甘草

如脾虛者補中益氣湯如久成漏者入物湯加芪桂或蠟丸丸此

病當服固老膏雖患亦輕雖潰亦淺若誤用涼寒必不可救

固老膏 粉草帶節所用 山間水一碗浸三時令透以慢火炙

于初投水浸透再炙至水干為度酒三盞煎至八分共查空
心服三日一服

谷道中生瘡 治宜水中荷葉卷筒綿裹納下部日三次即愈

肛門爛出水作痛或痒或出血用石硫黃五錢水庄一斗為末搽

但先每用銀花蘄艾花椒槐花水洗

肛門腫痛熱毒用枳殼荊槐角黃連各乙兩陳冬瓜皮二兩右為

末空心酒調服

痔瘡

痔瘡不論男婦小兒俱有何也經白富因酒色財氣病緣負重擔

輕婦人因經後受冷月後傷風小兒多母腹受熱利後積血搥之

臟腑虛而血脈未貫風濕犯而食毒胃因七情鬱結聚怒交成於

是血氣下墜蘊聚肛門宿滯不散而衝突為此症也然症分二十

四原有歌謠云痔漏分二八 憑君有細看穿腸并鼠尾酒色兩相

子莫言翻花怨蜂窠亦不寬雌雄并氣血子母及盤腸玄殊猶可
怪勾腸痛荏鎖核桃與流氣聞見即心酸粟子於中大雞心在外
安刪瑚形可患脫肛狀不堪內時肛邊出搭腸裏內盤垂珠裏游
治日久有雞冠治疝虛寔毋妄施針刀此症凡毒深者大如雞冠
連花核桃毒淺者小如松子牛奶乳心鼠櫻桃雖種七不同皆
三陰肛也治法亦不甚殊當知痔非外邪乃臟內濕熱風燥四氣
相合濕熱流八大腸而成毒但瘡頭向上或硬者熱多向下或軟
者濕多也

神傳治血痔用槐花槐角地榆黃芩當歸枳殼荆芥黃連蒲黃木
香酒糊爲丸空心酒下有熱者宜飲下外以文以白丸桑寄生
朴硝蓮房煎水先熏後洗

如氣痔肛門腫痛便難強力則肛出不收用紫蘇陳皮枳殼槐荏
桃仁木香檳榔香附甘草姜三壘一煎服

如酒痔飲酒則發用于姜枳壳半下生黃茯苓杏仁黃芩并草黑

豆麵白梅一箇姜三片煎服

如角痔浸淫爛濕葳積月累及腸穿穴用黑玉丹

黑玉丹 牛角腮 蝟皮略六 雷丸 芝蔴略二 猪蹄用煨 机

角三頭髮 敗棕各四 苦練根二兩 右藥俱入罐內燒存性取

出八乳香三射一為末酒糊丸 梧子大先嚼胡桃三枚温酒下十

五丸日二服甚者三服忌別藥此方善治男婦痔漏腸瘋疼痛

及谷道虫痒不忍者

如雞冠痔 用生桃橙葉杵爛煎水燻洗得効或五倍子朴硝桑

寄生蓮房倍荆芥先燻後洗

如牛奶痔 用明雄黃一兩班蝻五十將雄黃為末同班蝻入新

竹筒內七日去班蝻以雄黃燻痔其効如神

如翻花痔先用期芥村硝所丰煎湯洗之次用木別薛金研末入

龍腦少

用猪胆十個和均點尤妙

如湯肛痔用花椒一輕粉一杏仁十個搗為末猪胆汁調搽如瘰

後可以防手通聖散加減煎服

如梅毒用象牙

龍骨一兩

杏仁

煨皮

輕粉各一

冰片七厘

其將

公猪脚火筒骨髓調搽

如虛元傳治痔血箭肛脫方用槐角地榆川黃蓮連喬荆蠶半菱

子絡一歸尾

只壳各七

防非

合以仁赤芍黃芩車前木通路

分李仁白芷胡朮甘草各三分每發時空心服三四貼

如牛奶腸瘋瀝血及腸出不以惡痔疼痛用經霜後收的冬瓜皮

火上焙切為末每老酒調服一錢

陳進主傳治穿腸痔漏二十四種惡痔及楊梅惡瘡悉皆神効

用蟾酥一硃砂

雄黃一乳香

沒藥各一

丁香

草烏一

用姜許煮過

海蚌

雞

每用筆管

盛焙于

各為末或為丸

茯苓湯送下每日用二分藥末早米打糊為丸如痔漏腫瘡米

湯下如毒瘡及筋骨痛去海蚌加蜈蚣為妙此方與眾不同專

治痔漏大有神功如綿花瘡筋骨酸痛者削草除根神效無比

黃氏傳治內痔用黃連枳壳漏芳槐角地榆芫寔川芎吳萸川山

甲枝子蒲黃甘草黃芩同煎又用干馬齒莧湯煎一磁開損藥

一磁服但必先服過藥後五日方放出腸擦洗

放腸法馬錢子二箇合起用麩包火炙成炭去麩為末一錢初

生小兒脬帶為末五分四時以津調根子上敷肛門四圍其腸

即出用竹刀刮去腸上毒物後用刺蝟皮燒過磁石末分花蜘蛛

包一個黃泥為末以三味將病人涎調敷上即收病即念其洗用鹽

茶洗切宜久忌毒物及房事

如內痔八數藥後大便緊急宜閏腸丸破阿黑丑牛白芷各二兩

半生或姜一兩酒黃連五錢枳壳廿木香紅其屬末米

糊丸如梧子大每五十空心服酒下服一二次爲止

如小便不通用葱一握煎湯洗小腹則通

如大小便不通用澤瀉紅朱苓赤苓一白朮絡七益智仁陳

皮一枳壳車全不通絡一小茴五分草三灯心煎空

如血不止用烏梅阿艾葉紐井花水煎服或五倍阿生青丸紐石

芟茶二兩煎水洗肛其血自止

如痛甚者用前服水片乳香沒藥爲末水調搽

如肛不收者用蝟皮一個確內燒焦黃存性磁石醋碎肉桂三錢

驚甲線三爲末水飲調服炙熱燕窩托上

如大腸結硬下墜多血痛不能忍用蹄尾澤瀉生地黃只壳大黃

郁李仁蒼朮藜苳皂角仁研成膏麻子仁一錢半水煎空心服

祖傳細方不問男婦遠年近日二十四種痔漏不用刀針

○枯痔藥白砒一匙白凡一匙二味入鉢杓肉芫用白凡末

又放砒在一叶又放錢白丸蓋面將慢火熬至烟淨出火毒八後

葉兒茶錢血燭五蛇含石步鐵火堯花仁殊砂五雄黃 礪砂

錢各一乳香 沒藥各五粉五油輕粉五青耳石醋鐵右十二味

共同一處為極細末合五分之一用滾津調開捏作薄毒餅子

如此大藥餅又放些簪脚大用陰于聽用大凡醫痔之法首用

喚痔散當先喚出痔來纔好下手上枯痔藥

○喚痔散單用生胡椒紅為極細末空心用生酒一瓶隨量大小

送下待半上午其痔即番出來方用津液調前枯痔藥如稀

糊樣週圍搽上枯藥谷道中納一葉餅痔孔內挿上簪脚樣

的錠子一枚後用白帛封固但上藥之後痔痛難禁則不必

憂心書云若藥不晒眩厥疾不廖故曰惡病還用惡醫也但

是上藥之後血即隨手而止疾則刻日而安每三洗二換親

葉若是大便堅硬須用大黃酒蒸透孰為極細末每日用酒

調服一錢以稀糞為度問服蠟皮散

○蠟皮散一治二十四種痔瘡出血裏急疼痛

槐花炒艾葉炒枳壳地榆當歸川芎黃芪白芍

白凡枯黃粟蠟皮炙酪頭髮燒灰三禾皂角煨黃祛猪後

蹄重甲炙十枚右為未煉蜜為力如梧子大每服五十九

煎米湯下換藥敷至六七日看痔瘡變黑色堅寔乾枯不痛

方曰浸洗之藥拔去病根若是痔瘡未曾乾枯過脚還要上

藥凡朝以乾枯堅硬為度

○浸洗脫落痔根方 川土艾葉 白頭翁 牽灌草 冬青葉

左纏藤 綿花子及谷棣疎風散血之藥煎出木來將痔瘡

燻洗待藥水溫七之時坐在脚盆之內日日洗浸五七次待

其痔瘡浸洗至五七日之內其痔根自然脫下以落盡為度

經不用浸洗待落下痔根隨用生肌散攤在痔窠之內每日

又用新鮮之葉頻洗次上生肌散首尾前後半月之內可以除根脫躰而復舊也

○生肌散

嫩老景子

干

一

雞內金

三

日

沒藥

絡

一

茶

輕粉

一

其石

三

雄黃

一

破絲

細頭

二

血

蝟

兒骨

性

一

碎吃

生

一

黃柏

一

大黃

一

右

為

細末

日

一次

洗

換

新

藥

自

脫

生

肌

乎

復

矣

漏症

凡瘡疽久則宿膿腐肉停蓄其間穿口必透風冷外侵消亡穢膿

流出如缸甕之有漏孔九漏肝主狼漏胃主鼠漏大腸主蝮漏

腸主轉筋漏原因氣血壅滯而染觸而動含毒之毒而名其因治則

一也在痔則有穿腸穿登穿陰者又有無痔肛門左右別生膿流

出膿而名爲草漏竅在皮慮者易愈瘡肺損者難治

如漏忘初起淡紅微腫小核宜涼而清熱燥烈用加味槐角丸

則內如稿白外如黑腐淫虫惡臭官收竅殺虫温補用前
內黑玉丹或方括內蠟凡丸

加味槐角丸 槐角 生地 酪二龜膠 川芎 路三當歸 黃

芩 黃芪 黃連 秦苑 防丰 只壳 地榆 升麻

連喬酪一白芷伍其為未蜜丸或酒糊丸梧子大每五十漸

至七八十温酒送下

又有初起因風冷者久則虛而挾温熱者丹溪用參朮黃芪芎歸

為君佐以蝟皮蛇退牛角腮蜂房之類服之外用津唾調附子

未作餅如錢厚放瘡上漏大炷大艾漏小炷小艾灸令微熱不

可令痛乾則易新餅再灸如倦暫其次日又灸宜至肉平為度

外用雲母膏貼之畏灸者內生肌丸最妙枯凡鹿角芝麻等分

祖傳治漏症 用人言牝錢明凡耐乳香 沒藥 朱砂各五分

含石醋一兩七次先將人言為末入沙鍋內火煨待烟起將明凡

蓋人言上看有烟起處以凡末填之漸用凡末蓋為度候凡
 乾白色待冷去上面凡末取人言為末入前藥共為細末將一
 半麵糊作針一半綿皮作條蘸麵糊拖藥末槎乾用真綿纏凡
 遇漏先將藥針入漏內漏深入深漏淺入淺待三日毒盡却用
 帛條入痛處漏深入深漏淺入淺日漸抽出其帛條即生肉
 凡遇穿腸痔漏用好細絲線入煨蛇含石醋內煮過要從夏秋月
 內收取蜘蛛網過細絲一相共合絲線穿入漏孔內穿法先將
 野灯心草破開些穿入透出却將藥線入于野灯心破開處透
 出如無野灯心草將嫩布線兩掛繫銀絲上穿入却將長線入
 糞門內接出去銀絲却將絲線入一根于布線內抽過絲線再
 將原絲線頭入第二根布綿內抽過絲線來却不見來去兩轉
 收緊縛一盞待明日解開盞又收緊些仍縛一盞莫令寬日日
 如此線浴後以生肌合口

○煮線法

芫花根大戟根全項玉梅花五瓜龍鶴糞共入水內

煮汁去滓將後嫩絲線入汁內煮一二沸取線風乾聽用

如痔漏不脫綿者用百草霜草烏尖

錢為末并花水調筆點

如脫線不生肉用枯凡五倍子為末摻之即生

如穿線不收口用栳樹皮為極細末生肌甚快涼藥煮過差并石

次之如痔漏痛不可忍用黃連黃柏鬱金硃砂水片乳香沒藥白

芷等分為末水調作錠子陰干插入孔中

如痔漏血下止用陳棕箬葉枳寔炒性灰歸尾炒鱉甲炙蜂房猪

左懸歸蟻存黃柏槐角共為末米糊為丸梧子大每米湯打丸

如原有痔漏肛門別生二塊作膿就在痔孔出者乃食積注下也

宜連魏散

○連魏散

黃連

阿魏

山查

神曲

桃仁

槐角

連翹

皂角等分為末以少許置掌上時時搥之津吞下

予尊治一人 肛門外陡生一毒其勢如核久而破出膿甚臭遂將

猪肉湯鴨毛刷洗以貝母末攪即安後復成一孔出水子以未

漏用白雷丸切兩皮硝兩將公猪大腸一頭線扎將皮硝築入

一層雷丸築入一層如此築凡層兩頭蔴扎將瓦盛腸火焙乾

用如吃下取出雷丸同石乳香錢真沒藥錢苦株粉兩刺蝟皮

一焙切共為細末酒調服

龔應圓製透漏丹 治漏如神

象牙末錢黃蔞錢姜蚕錢去虫退錢瀨廣木香錢乳香

沒藥血竭錢三石八味錢為末次用黃蠟兩而銅銚熔化放白色

離火人前藥末攪勻成汁傾入水中取起為丸此一種藥分作

百丸臨睡時服一九早晨空心一九俱白湯下又服後方枯几

兩鹿角末兩芝蔴兩煉蜜丸如倍子大溫酒下三十塞去鹿

角加象牙兩黃蠟錢為丸常服斷根

如虛兒傳加味蠟凡丸

善治腸

癰痔漏瘰癧等症曰夜疼痛膿

冰不乾用黃蠟兩白凡

一兩三 楮過辰砂

雄黃 陀僧各一右各

為末先將黃蠟入銅銚內鎔化再入蜂蜜五錢同鎔隨人四味

木末藥攪勻待冷為丸如梧寔大每服二十或酒或白湯送下病

在上飯後服病在下空心服

囊癰

囊癰腎疝之症屬肝腎經都親而腫極熱如小兒因啼叫怒氣積

聚或虫咬風吹治者每宜詳因而施治之

腎囊初紅腫小便澀滯者用 正散主之

○八正散 車前 瞿麥 備菴 滑石 山枝仁 太黃 木

通 甘草

如陰囊腫脹二便不利者用白芷 白朮 桑白皮 木通 猪五

為末每姜湯下五錢小兒服五

百力全書卷之三 三

如全因入房囊腫大如斗許小腹服悶便澁發熱口乾痰壅命在
友掌宜腎氣丸料加車前子牛膝煎吞滋腎丸後仍腫痛者宜
補陰托裏再候膿而針之

若膿燉而便閉者熱毒壅滯也以方括內托裏治毒散或又不愈
者熱毒未解也宜清肝益榮湯膿已成者用腦疽內活命飲

○清肝益榮湯 當歸 川芎 白芍 柴胡 沙枝 炒車前

茯苓 木瓜 胆草 熟地

如膿潰皮脫翠丸懸掛或內見筋一條不消陰囊柔腐王莖下而

貼膿者亦腐如半邊筆管只宜方括內托裏散加故芷黃芪五

珠兔糸或兼服補中益氣湯倍參芪歸木大補氣血脾胃牙塗

白蠟膏囊莖旬日可愈雖曾囊九腐爛亦無妨以白臘膏貼

如腎囊下有五六托出膿宜以當歸 川芎 白芍 熟地 生

地 白苓 巴戟 川練 肉桂 大附子 鹽便發透包

附益智仁 防風 金銀花 皂角炭或加升麻土茯苓每貼

用猪胰子油四兩或肉同煮 心酒下如孔爛出膿用次寔肉

疔青鹽伍牛黃分射香豕膠束 肉為丸服外用化毒丹 七日

狀後以生風散攤之

陰囊玉莖癢爛甚者用防羊肉 白蒺藜白附子錢一為末以猪

腰一箇用刀破開將末藥調温 昏包浸温裹以有殺火燬熟空

心服下不効再服屢試有驗 陰囊氛瘡用蒼朮紫蘇煎水洗

囊癢抓破流水用黃連細茶鳳凰 衣為末木油調搽或蒼朮茯苓

皮蒺藜厚朴甘草三煎湯攤洗

腎囊生瘡作癢或癢後流水作痛 治宜用川椒蛇床細茶槐柳條

茄根煎水燻洗七後用村硝搽之

陰囊兩傍生瘡温癢甚者用牡礪 黃丹略一枯瓦二兩為末搽二

紫福瘋即陽物紅紫癢不可當者 用山枇杷柴莫及觀音茶葉二

味注酒吃其滓用火上略烘乾敷藥上冷了又烘熱敷三次不經
子屋南京見一人陽物上生白芽一二根如菜豆芽脚樣其痛如

針刺難忍用艾置芽下貼肉處一炙即倒痛上全愈如神

小兒外腎腫大陽物透明用左顧物礪二錢乾也龍一錢為

末津液調敷外腎即消狀若鷄子清調敷痛處

小兒啼怒氣積聚陰腫用桃仁炒牽牛炒葵藶炒去官桂批丹

皮大黃猪三為末蜜丸如菽豆大每用青木香葱白鹽少許

煎水送下五七丸小兒囊執腫痛用蛆蝨糞并草汁調茶

小兒外腎赤腫痛不日退皮如蚕壳愈而復作用老松皮燒灰

膩粉香油調搽

小兒坐地為風吹或虫吹而腫外用蟬退錢煎水洗再温再洗內

用末苓澤瀉茯苓白朮甘草煎心煎服

小兒陰狀生瘡用黃丹黃連青黛等分為末泥鯁煎麻油調搽

大人小兒陰伏痛不可忍單用金砂酒調服神效

小兒大人陰囊併玉莖紅腫大疼用 鹽炒熱令病人坐定將布

由堯炒鹽包閉囊玉莖即消

瘡

丸陰頭玉莖腫痛生瘡乃督任衝三脉之屬督脉属陽任脉属陰

衝脉属厥陰夫陽脉主氣陰脉主血皆出氣血大熱有毒有風

故生此疾也玉莖紅腫痛爛流膿出汗日夜不乾其草水頻洗

後用羊角燒灰存性為末每老酒調服三錢

玉莖挺長腫硬皮塌磨股難行兩脇走氣逆以柴胡人參黃芩黃

連黃柏煎服其腫漸收莖中有核未消以青皮為君少佐風藥

未服之外以絲瓜子五倍子末敷之

陰頭出膿莖下痛之痛用柴胡赤苓升麻朱苓澤瀉木通車前遠

志山棧瞿麥牛夕生姜灯心酒煎空心服

玉莖腫痛出膿日難行步夜卧掣痛先服囊離內八正散如故後服遵水丸加桃仁芒硝三五次腫消痛減即安

玉莖腫爛流水先將芭蕉堯艾葉白凡川椒煎水先燻後先再用游標硝二錢輕粉二分枯凡一分水片一厘共爲末搽

如因熱毒陰頭結毒或麤衣磨破用嫩上筋霜刮下一攤即愈

或白螺螄一箇灌杭粉入內火逼再入片三厘爲末攪之如神

如由腎虛風濕相搏邪氣成之瘡癢成瘡浸淫汗出狀如疥癬各

溫陰瘡宜黃柏磁鋒刮下末同蛤粉等分摻之

如因久曠房室思色動慾以致敗精流入莖內初發如粟赤腫潰

爛作白疹疔闊各妬精瘡先宜用地骨皮蛇床子煎水燻洗

洗後用黃連款冬花等分爲末津調敷

如因婦人子宮有敗精滯濁或月水未淨與之交合後又未洗男

子腎虛邪穢滯氣逐令陰莖連舉丸腫痛小便如淋名陰蝕瘡

治宜科用鳳凰衣獸黃連等分輕粉片腦諺為未乾搽或鴨子
清調敷內用蹄尾赤芍生地防丰黃連黃柏知母澤瀉小茴
草煎服 如陰毛間生虫作痒者搗桃仁泥塗之

華中痒出白津多因脾土軟弱不能蒸生金水以致肝經血虛火
燥宜用髮疽內補中益氣湯與清心蓮子飲間服

清心蓮子飲 黃芩 車前 茯苓 麥門冬 地骨皮 黃芪

玉莖痛不可忍用石乳香一錢葱汁調搽

下疳瘡皆因所欲不遂 交接不潔以致邪毒侵潰成瘡毒七日

久不愈或成便毒或損爛腸物多致危篤故俗云疔瘡未已便

周居白先生傳一方用細茶濃煎入鹽少許洗七後用天竺黃片

如虛兒傳用杏仁五個輕粉分冰片錢其研爛口涎作餅貼或用

麻梗燒水洗七後用年久白螺螄取過冰片錢為末搗

應圓製治癩瘡神方內用防風 荆芥 連喬 獨活 黃連

黃芩 知母 黃柏 蒼朮 赤芍 木通 胆草 柴胡

甘草 燈心煎空心服十余貼外用文蛤仁二分半黃 冰片各

分珍珠分輕粉分黃柏借册汁搽入煎數共研為細末于攪之

如男婦疔瘡騷旋用五倍子性燒過存一錢輕粉三分冰片分為末攪之

若女人先用五倍子兩將小確煨至糜爛置桶內令婦人以陰

門端坐于確口土燻至水冷為度又將此藥水傾出煨熱為末

乾曉煎藥如疔瘡腫不退用益元散加防風荆芥何首烏煎水薰洗

祖傳治疔瘡極甚者風以黃荆子兩乳香為末茶豆粉為丸每白

水送下半錢一日二服外以甘草兩防丰兩皮硝兩用公猪肉

湯洗一日二次後以白螺螄壳錢公雞肉金三箇搥乳香沒藥

象牙未錢各一珍珠 龍骨錢各一雄黃 黃連錢各一共為細末或

蠟燭發 是症腫爛如蠟燭瀉形初起若腫爛不消宜用地茄根

炆水燻沉或用松毛樟葉烏藥葉楓葉桐葉俱取表前水燻洗

外用搵子片燒灰片搵兒茶共為末攪或磨鏡布燒灰搵患處
內服黃連解毒湯

應員製治蠟燭發爛去一邊極其者內以姜虫五錢蒺藜四錢蟬退

仁二十牙皂五錢銀花五錢杏仁四錢士茯苓五錢牙皂子仁十精猪

肉斤俱分作四大貼煎服肉與皂子仁皆要吃下肚外用上好

徽墨磨水久浸漸消鹽茶洗再用乳香沒藥俱製兒茶血

蝎輕粉海礫硝白芷鎔冰片芬海巴子仁為末攪如

水不乾者用海礫硝指甲挾落成粉米泔浸一宿火培乾每一

錢八輕粉一分為極細末攪之

又方不問年深日久出汗流膿日夜疼痛不止或病去一邊或病

去一截服之神効但用蠅油一條去入熱酒內自狀成水服之

一日一次不過三服即乾水止痛佳體矣甚妙

婦陰瘡

婦人陰中生疾多因七情鬱火傷損肝經濕熱下注也

如陰突挺出一條尺許如蛇痛墜出水湯痛者黷髮疽內補中益

氣湯晚服龍胆瀉肝湯外塗藜蘆膏

如陰中突出如菌如雞冠四圍腫痛者乃憂鬱脾虛下陷先以補

中益氣湯加山枝茯苓車前青皮以清肝火兼升脾氣漸愈更

以瘦瘠內歸皮湯加山梔茯苓川芎調理外亦塗藜蘆膏

陰中生細虫癢不可忍食人臟腑即死令人發熱七與勞症相似

先以蛇床子煎湯洗後用梓樹皮焙乾為末入枯凡四分之一

射香少許敷之

又方治陰痒搗爛桃葉納人或雞肝煮熱盛熱人陰中或用大黃

微炒黃芩黃芪一炙略赤芍玄參丹參小茱萸蛇床子各五錢為

末空心溫酒調二錢服

陰內或癢或痛用文蛤皮硝煎水燻內服囊襠內入正散次用

當歸川芎芍藥地黃荆芥蕤荊煎服

陰明濕痒先用茄花根夏枯草煎水燻洗次日用雞子一隻炙半

熟覆在陰門上過一夜取出虫物復用茄花煎水洗劫

陰柳濕淹瘡用文蛤粉錢五白凡銅青錢一輕粉錢一乳香錢五為末擦

陰內腫痛小便時皆痛大便有血以芙蓉葉壘煮置桶內坐燻內

服朱芩澤鴻白札茯苓黃連黃柏黃芩防丰金銀花木通之類

陰內腫痛小便欲去不去或痒和兼用茹苓湯加木通車前牛夕

枝子七八貼煎服

陰腫如石硬痛不可忍二便不利欲死者用枳是陳皮略四炒令

香熱以絹袋盛之遍身從上至下及陰腫處緩七熨之冷則又

換直至喉中齋積寒氣則驅止腫消便到矣

如時常陰痛者用四物湯加稿本防丰

蟬殼風用防風歸尾全蝎蕤荊倍不虫退姜手蒼朮黃連耳草服

五六貼每二貼煎洗

茄病內用酸車前白馬骨而茄根茄花一猪精肉兩全煎服

外用地茄根木通瞿麥罌罌桶中插一孔坐燻待溫洗三四

婦人陰痔用草烏在性燒瓦罐盛入米醋煎熟將搭昏上開一孔

婦人陰冷用吳萸入牛胆內令滿陰乾每取二十粒細嚼未綿

如陰燥臭甚用柴胡歸尾澤瀉木通地草生地車前水煎服每食

壓之陰內生瘡或出蛆虫用黃芩川芎當歸黃連大黃川椒細辛

煎水燻洗婦人交接出血乃房室有傷肝脾虛不藏血宜髮痘內

補中益瀕煎服外用熟艾貼入陰中或用亂髮青皮燒灰敷

之若出血過多見雜症者調補肝脾自愈

附骨疔 多病腿間

附骨疽症內痛如錐外肉不紅腫突多因冷露所侵或濕熱疾火所致也如此症初起古方用青皮甘草節煎服或隔蒜如法火炷

艾凡灸患處伏以易慰法熨之若膿已成

用火針便毒不

丙深帶生用亦無妨且不痛又易斂口

祖傳用

奪命散

人參

木香

當歸

雄黃

乳香

猪七益母草

研砂

檳榔

三錢

水撓麵

做餅中火穿眼候

乾香炉灰為衣好熱酒調服久不治用蜈蚣製過入藥內同前

服攻之或用黃鯁串根非菜生姜搗爛敷患處或將艾火炙服

煎藥雜魚潰膿深針出膿出膿如不念用昏蘸玉紅散

緩疽廼寒氣伏于骨髓其腫與皮肉相似疼痛堅硬如石一者初

起便宜溫熱托裏補虛次乃隨證調治

如外感因露卧風冷寒熱深者初起痛不能轉寒熱無汗經从

寒鬱便秘者漏芦飲主之

漏芦飲子

黃芩

白欬

麻黃

枳寔

升麻

苟藥

朴硝

各一錢

大黃一錢

甘草三分

煎服

如不敢下者須分經內托汗散但在尻臀者用臀疽內類托羌活
 易在腿內近膝股漫腫木硬者內托芪柴湯在腿外者內托酒
 煎湯在左腿外側漫腫長闊行步作痛以手按至骨大痛者宜
 腦疽內黃連消毒散通疔鶴膝瘋類棋蘇散

○內托芪柴湯

黃芪

柴胡

當歸

黃連

羌活

肉桂

生地

上瓜蒌

黃芩

半水半酒煎服

○內托酒煎湯

黃芪

柴胡

當歸

黃連

肉桂

升麻

白芷

大力兒

黃柏

耳草

半水半酒煎

內傷厚味及勞役與酒後乘涼浴水邪入脾樞環跳穴左右積痰
 瘀血轉成宜青草蒼柏湯微汗服此不愈恐疽將成者急搗地
 坑用火燒紅沃以小便令患者赤躡坐其上以被席圍抱下截
 使挑氣燻丞藤理開氣血暢而愈
 內傷生冷飲食寒涼藥物丘凝于內
 食如常宜腦疽類活命飲

如食少寐倦者用火頭風類六君子湯加當歸藿香

如因勞役傷食右腿偏腫者用髮疔內補中益氣湯

內傷鬱怒腫痛如錐赤暈散浸先用蠶痘類活命飲次用痒癩類

八物湯加柴胡仕丹皮山枝

內傷勞鬱而腿腫痛寒熱食少此濕痰下注也亦宜髮癩類補中

益氣湯加半夏茯苓芍藥

內腿膿血瘡甚用苦參皮硝絡五煨水洗數次後用爛豬肉油搽

搽極効

腿上一切寒熱皆用鷄子糞煨過為末乾摻加煤痛加黃丹少許

桐油調敷

重刻秘授外科百効全書卷之四

豫章儒醫龔居中應圖父輯著

手足部

手背發



手疔 附肩疽

疔文各手背發此症屬肝經小腸經患于手背及指間或如黃豆
大或如聚粟或如熱棋拔之則絲長三四寸要知不赤黑者其
狀黑者死九人病手癢如風熱血燥毒急者宜耳瘡納散八味道加黃連
如因怒火而疾者用鬢疽內柴胡清肝湯煎服

如亡精腎枯筋縮宜腎氣丸之類、忌寒涼降火之藥及艾炙等
症若犯之則輕者反劇重者大潰腫痛發熱出血而死慎之慎
江氏治手皆發 用痰核肉十六味流氣飲解毒生肌之藥

甲疽

甲疽之症乃毒氣攻于手足指努肉叢上指甲疼痛出血瘡中有
虫或因剔日傷肌或因甲長侵肌遂成腫痛

右症俱用綠凡五丙置鉄板上以炭火烘之吹令火熾其凡即
溶流出黑汁者是真俟流汁盡去火待冷取爲末色似黃丹取
之先以鹽湯洗拭後用綠凡爲君八射香少許敷之重者用綠
凡五錢芦會一錢射香二字爲末以絹袋盛藥納所患指于袋
中線上定以瘻爲度

代指

指頭先腫焮熱掣痛狀後以瓜甲邊結膿甚者瓜甲俱脫
治宜先用茫硝煎揚淋洗狀後用烏梅核中仁爲末醋調成

膏入指潰之自愈或用猪脂和蚯蚓搗爛敷之

梭肚了口治宜天南星五倍子白芨草烏大黃酒麩酒糟搗爛之

又方初起用野茅查堯炆燻或酒糟半盞曲果四个扛豆子半盞醋半盞共搗爛菴之

天蛇頭

蛇頭瘡生手指上或足指上瘡傍一塊開口腫痛是也治宜用雞蛋一個畧搗碎一窟如指頭大將人言雄黃_五八于蛋内肤後以患指入于其中浸一宿次早更以蜈蚣燒烟燻病指一二

次即消

如痛甚流血不止用雄黃蜈蚣全蝎為末搽瘡頭上却以麻油抹

帛上托之

又方山砒霜醋炆燻或先將麻油煎雞蛋捲手指一夜次日用

猪胆一箇將雄黃末三錢人言末三錢射一分八胆内將指籠

住一日疼痛極甚一日後去藥胆即好

蛇頭臭爛久不愈用密霜為末麻油調搽

鵝掌瘋癬 治用川烏草烏何首烏天竺粉赤芍藥荆芥蒼相防

丰肉地丁各一兩艾葉四兩煎水燻洗

一方用杏仁去皮尖輕粉等分為末猪胆汁調搽患處炭火上炙

二三次將麥粒大的艾在拇指盡處灸三壯未遠不發

如多年不愈者先用磁鋒磨刮次以草麻子一兩枯凡二錢為末

桐油調搽火烘極熱再以豕肉三兩水銀五錢枯凡三錢搗爛

如泥每日擦手千餘下次以肥皂酒精洗淨十次神效更炙勞

宮或內關一火斷根神效

又方黃糞晒乾并草麻子研火上燻之一炷香為度

手癩瘡 發如豆梅痒温如豆汁爛如浸淫瘡之狀治宜以皂角

枯凡輕粉黃柏黃連為末麻調敷

紅絲瘡

紅絲瘡乃因喜怒不常血氣逆行而生于手足間有黃疱其中忽

紫黑色即有一條紅絲迨迤血上而生若至心腹則使人昏亂

不救或有生兩三條紅絲者治宜急以針橫截紅絲所到之

處利之令其出血以膏藥貼或嚼萍草根敷之立愈

手足腫毒

治宜芙蓉葉草烏

絡三

天南星

五

大黃

七 柏絡二

酒麴三箇及頭酒糟搗爛醋調敷上

雞爪瘋

手足不能搖動不能舉物者是也治宜乾姜肉桂絡二

五加皮海桐皮

略

一川烏

麵包八

牛

丹皮川芎

赤芍

絡五 右為

細末每紅水一盞將古錢一文八清油浸每貼入此錢同煎如

婦人病此症用艾火在陰戶尖處

離一分灸一九即好

牛勒瘋

是症手寧紅腫痛不能屈伸有似牛勒樣

治宜用四五枚布針畧蘸老虎藥針之即安若潰而膿出仍服

十宜散之類外燻洗化毒生肌

腋隻 是症受寒痰所發脾下核腫如雞子大

治宜防丰當歸人參小芪土烏藥大棗子肉木香川芎桔梗枳

壳粉草乳香沒藥白芷羌活白芍蘇葉姜煎開服如有潮加連

喬無潮加官桂或用腦疽內子金托裏散犹妙

狐臭 脚腋 耳內多濕治宜蜜化僧一硃砂五分枯白丸仁辰砂此銅

青白附子絡一共為細末用皂刺煎濃汁調末擦兩腋下夜靜

時先用皂刺煎水洗淨然後擦藥至一七又將大其草一兩煎

濃汁服之外用其遂末細猪油調搽腋下一日夜拔出身內臭

物再將枯丸一兩蛤粉五樟腦為末搽之少許永去病根

一方黑鉛二錢溶化入水銀二錢攪勻白丸枯過銅青二共為末

先將黃荊子洗患處後擦七次又一方用他僧一兩射香半分

枯丸一錢輕粉一分細辛五分共為末用口涎塗搽三日二次

又方每次用嫩黃荆表七個擦上後以小便洗七後用嫩松枝搗
 爛投歇下每日換以小便頻洗至一七日又用田螺螭一個米
 泔洗去泥水方八射八匣朋砂一分人言三厘于內用碗盛之
 至晚放在屋上連露三四晚用螺螭水手蘸擦四五日即効
 有痘 痒而出水負擔者多生用石灰二兩火炒赤頑手濃醋碗
 內遂入水粉二錢攪勻以雞毛刷上數次即愈

脚背癩



麻瘡



鶴膝瘋

鶴膝瘋症乃是三陰虧損風邪乘之以致內熱炒食肌瘦肢體疼痛久則膝愈大而腿愈細有如鶴之膝然

初起宜用芩芩法以內清之寒熱者五積變加散加烏藥姜桂如已潰者用活膏生湯膿海肌肉不生者用癩瘡八物湯

鶴膝瘋單方 用左纏藤三十餘斤鍋內煮成膏以酒調開久服

而愈 祀傳治兩膝虛腫成兩足痿弱痛軟或沉重木痺不能行

動併痲後病此症者先服棋種散一二貼治以大防仲湯抄子抄

○板蘇散 棋郎 蘇葉絡二址草 陳陂各一錢姜葱白煎服

○六防風湯 當歸 川芎 白芍 淮地黃 人參 黃芪

白朮 羌活 防卡 牛膝 杜仲 苴草

應圓製治合膝瘋 用暗杉節 暗松節 茄根 海桐皮 川

青藤 五加皮 羌活 独活 當歸 川芎 白芍 厚桂

黃芪 杜仲 牛膝 南星 半夏 陳皮 枳壳 石南藤

細辛 秦芫 白苓 助丰 孔香 沒藥 木瓜 檳榔

苴草節 蒼朮 生姜 歧酒 空心服不効再加川烏姜汁煮過

草烏切碎滾濃茶泡過

過膝瘋

夫過膝瘋症右脚先病愈而左脚復疾或左脚先病愈而右脚復

病是也治宜以

人參

生冬

苦參

朱苓

當歸

桑寄生

茵陳

陳皮

防風

白朮

知母

羌活

蒼朮

獨活

升麻

白朮

甘草

生姜酒煎服

如虛兄傳治膝頭腫痛用朱苓

宅舍

楨耶

小尚

牛膝肉

石南藤

獨活

杜仲

名二兩

末瓜

一兩半

番

甘草七

為朱每空心酒調下三

月經不調發熱口渴兩膝腫痛者用耳類逍遙散加牛膝杜

仲黃柏

應圓製治瘋發脚痛不能動者用當歸

川芎

白芍

白朮

厚桂

枸杞

杜仲

故芷

木瓜

牛夕

防風

楨榔

防已

羌活

獨活

蒼朮

乳香

沒藥

甘草

真寄生

薏以仁

土烏燕

上扶苓

姜虫

虎脛骨

製過煨煎

南木香

生砌同生酒

開藥服每早用雞子下

外用牛膠

生姜汁一盞乳香沒藥各二錢花絹片上藥貼痛處并腫處神效

破槌瘋 是症兩脚痛如搗鼓然治宜以地龍 防丰 羌活

當歸 牛夕 川烏 草烏 財香 荆芥 白芍 川芎

赤芍 灵脂 乳香 沒藥 白芷 山甲 盧脛骨 紫全

皮 柏子仁 骨碎補 共為細末酒煮糊為丸空心末瓜湯

人面瘡

是瘡似人面眼口鼻全多生膝上亦有臂患者乃冤業所致也須

清心悔過作善襮保內服痰核類十六味流氣飲外用貝母為末

敷之或敷生肌定痛末藥乃聚眉閉口仍用生服藥併膏藥欽日而愈之

腎臟瘋瘡

是症初起兩足時熱脚根作痛多于內脛或臙上痒極抓破成瘡

如癖瘡痒滴膿水久則能漸延開失治延及兩股遍身者有之

如內症肺熱盜汗口燥咽乾吐痰躄瘦腰脚倦怠治宜以腎囊類

腎氣丸為主治以

○四生散 獨活 黃芪 白附子 皇角絡 一共為末薄荷膠

又有遍身生瘡膿水淋瀝兩腿尤甚躄倦作痒經年不愈乃腎虛

穴也宜疔瘰類八味丸主之

外治白膠香散 赤石脂 枯九絡五黃丹 沒藥 乳香

輕粉絡二為末乾糝或油調搽

內外腫瘡初起用獨脚烏桕或根柴三七 生地 想柴表 新

茶葉共搗爛每曰一換鹽茶洗不效或用礞硝 龍骨 乳

香 沒藥 兒茶 黃柏末 血竭各一分 鮮猪肉兩 輕粉五

冰片三雞子 油五 黃白蠟各一 豚桐油各半 櫟油一匙 已上七

味為細末輕粉片腦各另 先將各藥 黃白蠟 溶化去渣將七味

入鍋內熬沸數次提起碩八碗內候畧冷將輕粉在內調境極

冷將冰片在內推膏每毒但用一七則愈 日一換

應員製治廉瘡神方

用黃蠟四兩開化人黃丹兩輕粉紅攪勻

作隔昏膏貼絹片繫扎三日一換每先以鹽茶洗之如貼膏肉

白將愈則以黃丹輕粉為極細末一攪即乾水結蓋神效

又廉瘡作痛者宜用諸般神膏類金華隔昏膏或四應膏神效

瘡作痛者宜用五油隔昏膏

頑廉久不收口或爛痛吳槭法當貼隔昏白玉膏內服蠟丸丸之

類且翹足端坐勿多行履庶可全愈

裙漏瘡

裙漏瘡症生于脚脛或因打撲而成其瘡口狹皮肉極濶皮薄如

竹膜極痒痛終日黃水流延蔓而生其者數十年不愈又易染人

患者須忌房室則易愈初起用塘內久浸過茶葉貼數次不效

再用黃蠟二錢麻油一兩以飛過一兩細火熬

成膏隨瘡口大小攤膏如或月四應膏亦妙

婦人裙襖瘡用紅花梔子枯丸五倍共為末搗

向前瘡 治宜黃連五斤牡礪三斤為末井水調敷或用松香黃

蠟溶化為膏貼以絹帛緊扎鹽茶洗一日一換七日全愈

脚肘上瘡 初如粟漸大抓搔不已成片黃水流出血不可忍先

用貫衆煎湯淋洗後用百葉煎為末津唾調敷自外而入

瘡腫痛作痒抓破汁流或打撲成瘡治宜猪屎火煨棋柳各五

片腦一斤花椒龍骨各三斤有膿水加輕粉一斤温則搽乾則麻油一斤

脚跟瘡

脚跟瘡症迺腎脉發源腎經過脉內因飲食起居虧損足三陰所

致或被大鬼所咬而成也

是症慢腫少食者宜髮疔類補中益氣湯咳嗽吐痰者宜疾癒

類八物湯加茂桂或八味丸外治祝病而施若久不欬已洞盡

螺螄發初起者宜用石螺螄打爛或用小田螺燒灰一兩大

黃一兩硫黃末五錢輕粉三錢乳香沒藥各五分將黃蠟二兩
熬化調前藥作隔昏膏貼或以萬應膏久貼後攤生肌 俱內
服痰核內十六味流氣飲加減煎服

螺螄骨腫痛不可忍者外用生姜葱白醋搗爛敷患處內以當歸
川芎土烏藥木瓜板郎海桐皮秦艸獨活中桂蒼朮威靈仙黃
相生姜蘇葉煎服

螺螄因跌破成毒紅痛腫爛用細茶嚼爛併將芝麻用嚼爛罨如
此二次肉白將麻茶百草霜煎水洗或麻油茶白草霜係未桐
油調搽
踝上先一孔約深半寸至下半日疼痛異者此濕毒注成漏也用
人中白或人中黃灸出水滴人瘡口

脚發

脚發之症生足掌或指縫間色赤腫痛膿稠者屬足三陰濕熱下
注易治微腫膿清者屬足三陽虧損難治若黑暗不腫痛不潰

膿煩執作渴小便淋瀝者陰敗未傳惡症不治

治法溫熱下注者先用隔蒜灸法及腦疽類活命飲以解蘊毒

次用髮疽類補中益氣湯加小茴故芷以補精氣如三陰虛者

初起用方括內托裏消毒散或托裏散加牛夕板榔杜仲潰後

用鶴膝風內大防丰湯或疔瘰類八物加芪桂明虛心熱者用

富歸川芎白芍大黃知母黃柏之類

脚背發

是症又名脫疽疔原因膏梁房室損傷脾腎或先渴而後發或先發而後渴也

輕者色赤作痛自潰可治先用隔蒜灸內服腦疽類活命飲或

敗毒散加銀花白芷大黃如痛止用托裏散挾氣者用陵核內

十六味流氣飲下虛者用八味丸或八物湯加芪桂

黑者色黯不痛先用隔蒜灸更服補樂固內則惡肉不致上侵

確可保生矣

又行外塗生肌涼藥內服尅伐兼犯房室則患處不潰不痛色黯
上延亦多致殞重者不用利刃解去其筋則筋骨出而毒得深
又甚在指則斬去其指在肉則割去其肉外治用桐油及無名
異煎一沸八花椒一勺看瘡大小蓼花在外同煎浸一七後單
以此藥貼瘡上即安

嵌甲

夫嵌甲之症多因靴衮研損爪甲隔入四邊腫焮黃水流出浸淫
相染五指濕爛漸匕引上脚疾疱漿四起如湯潑火燒日夜倍
增不能行動治宜以陳皮濃煎湯浸良久甲肉自相離開輕手
剪去肉中爪甲外用蛇退一條燒灰雄黃四錢爲末乾糝乾者
香調敷與用直條秦治

甲生肉刺 是症手足甲忽狀長倒生肉刺如錐痛不可忍治宜
用葵菜多吃自愈

脚打成泡 治宜以井水調生麩糊貼過夜即干不可穿破或用

水浸過新松樹嫩皮貼

脚指丫瘡爛濕 治宜以枯凡三錢黃丹五分為末搽之或鵝掌

黃皮燒灰搽之○一人病梅瘡後脚指了生瘡濕爛臭穢子用

象皮徽墨枯凡胆凡炒過黃丹為末攪數次而愈

經搔痒成瘡血出不止 治宜以多年糞桶箱篾燒灰敷之

指上及指縫中沙瘡爛者 治宜先以鹽茶洗匕後用燕窠泥罌

炒和黃柏為末香油調敷痛者加乳香

脚上松皮爛方 治宜用黃柏黃芩黃丹各一兩大黃四兩防丰一兩滑

石兩樟腦枯凡松香水粉雄黃各四為末木油燻油調黃蜡溶化

脚瘡似松皮爛卑痒出水用桐葉水煮將葉裹脚葉乾又換

脚瘡似松皮爛卑痛不痒流水不乾用山上經過久霜露牛糞燒

灰麻油調搽

脚瘡作痛 治宜以乳香沒藥輕粉各二 兒茶瓦片腦脾水銀分

只為末用蜡紅同清油少許溶化調搽如瘡口大紅痛先宜用

吳桐炆水洗後攪前藥

兩脚生瘡甚者 治宜用娣子油一斤以川黃連配同炆酒空心

服外貼五油膏或先以楊蒂龜金艮花嫩楓葉苦參煎水洗後

用黃連二分黃柏一分黃丹大黃蜈蚣各一分冰片分共為末攪

脚上瘋癩毒 治宜以防丰 當歸 白芷 黃芪 独活

蒼朮 牛夕 防已 川烏 草烏 檳榔 木瓜 威灵仙

石南藤 五加皮 何首烏 南木香 生研大甘草 姜 速煎空

脚瘡有孔出水 治宜用貝母一分白丸 林 過雄黃紅共為末攪

每以苦茶先洗

遠年爛脚 治宜用老松樹皮 爛牛皮 鳳凰巢 黃竹箬

硫黃蛇退 灰独脚烏 柘根蛇床子 雄黃各為末木油調塗或隔

膏白王膏亦妙

又方用桃葉麩包七次應用白果葉

貼即愈

脚因石磕破成瘡毒

治宜用青龍糞无焙乾為極細末桐油搽

脚墊毒

是症人脚走長路被石子脚底墊腫不能行走痛不忍

治宜用舊草鞋浸尿桶內一夕或半日外用新磚燒紅將浸草

鞋放磚上以腫脚踏定火逼尿氣入裏即消如走長路脚腫痛

者用此方亦妙

遠行脚上打損用雜草燒鑊綉和飯粘研成膏貼之用昏封上若

打泡用油線穿過兩頭剪斷亦用鑊綉飯粘貼之

遠行脚心腫痛用蚯蚓敷腫處高閣起脚一夕即愈

脚疔俗去雞眼睛男婦俱有之但用福州減水浸蜈蚣末調搽雞

眼上即時自落

脚出汗 用白丸于葛煎湯頻洗

遍身部

遍身流注



宜宣毒行血用瓜蒌根 酒煎入乳香沒藥五靈脂皂刺等分
 以下其毒次用清心行血之劑如係蛇毒赤足蜈蚣最妙雄黃
 白芷次之或蠟丸九令酒 八射香送下外用荆芥白芷川椒葱
 白煎湯入塩俟湯温自手 臂上盪下一日三次其癰疽毒氣走
 腫所至處宜緊繫之自手 發者毒走至心白足發者毒走至臂
 不救各有小紅筋尋其筋 之佳處灸三炷即瘥經云在指則截
 在肉則割恐毒氣入心入 腹令人煩燥嘔噎昏悶或瘡出清水
 穢汗者腎極虛也死人至 速此瘡極慮引風癰症開一寸則一

寸引風非必風入于其中風邪襲虛則肉爛透骨惡血橫流宜
南星半夏白芷稍最能去風可以頓敷其諸瘡理推廣癰疽法
度行之

癩發

凡瘡氣血相搏有頭有面風邪內作無頭無面若癩無頭無面
裏開瘡低貼肌肉走注牽連生於手足或掌心或腰腿或臂下伸
縮之處初起渾身壯執手足不遂增寒頭痛虛渴多汗嘔逆四肢
沉重較之諸癩渴為甚或腫毒已平數月後復於他處大發但
作肉色微帶淡紅終不能救大要培養內氣以防滑瀉如瘡出米
泔汁者必死 治與癰疽類推

癩毒

癩毒之疔多內因飲食熱毒外感寒氣暑氣而成治者亦宜詳因
而施癩毒內消治宜以當歸尾 赤芍稍 白芷稍 防未肉桂

石乳香

真沒藥

川山甲

煖成連喬酒煎服如癩毒在上如

升麻或以黃柏二錢五倍子五錢共為末醋調敷

流注

流者行也注者住也或結塊或慢腫皆因素有痰火或外感風寒邪氣流行至其痰注之處而發或內傷鬱怒以致痰火聚發內傷房室陰虛陽氣湊襲逆於肉理而成或內傷勞役飲食博動而發或跌撲閃挫下時逆血凝而成或產後惡露未盡復被感傷凝注多生四肢或胸腹腰臀關節之處

初起宜用葱熨法寔者用痰核內十六味流氣飲虛者大頭風內六君子湯加芎藭或髮疽內補中益氣湯加木香枳殼選用令其白潰白消若潰久不斂者縱有表邪只托裏為主以疔瘰內八味丸八物湯加芪桂或腦疽類托裏益氣湯更佐以豆豉餅祛散寒邪補接湯膿成以火針破之內有膿管以赤搗入應圓製治流注初起者但毒在上以升麻為主毒在下以羌活生

藤木瓜爲主佐以土赤芍 川黃連白芷稍何百鳥舊枳壳小茴
香土烏藥當歸尾川獨活 大粉草半水半酒煎以葱根泡服

癰疽又各蛇瘡

是症烟瘡地面多有之先依點而後露肉四畔若牛唇黑硬小者
如粟如豆劇者如梅如李發無定處或臂或臀或口齒或肚臍多
見手足指間赤黑青白色交不常根深入肌走腎逆腫毒血流注
貫串筋絡爛肉見骨出血極多合人串痛狂言痛入于心即死矣
出於外腎亦死原因感受惡風入於脉理或烟瘡地面傷寒瘡後
及感觸蛇毒所致二十已後四十以前皆積傷之毒入胃壅聚而
成四十以後六十以前乃血開不壅熱積而得之
如癰毒生于脚腿肚上俱有者宜荆芥牛夕 薏以仁 川羌活
川厚朴 杭白芷 矢楨 椰 官桂 蒼朮 海桐皮 陳蘇
硬 南木香 大甘草 酒煎服七八貼而愈

如暑日男婦小兒滿頭生癩 治宜用香茹 扁豆 白芷 稍

厚朴 黃連 羌活 防非 連喬煎服 四貼或外搗則未碎花

如癩毒痛腫不用刀針只以新幾生的卵壳 燒灰存性 破出曲

如癩毒膿欲出不出宜以敷鹽柴根老鴉鶻 二味炆水燻口上則

出膿 如癩毒膿不乾宜用薤菜打爛同 蜂蜜調四弦敷

癩毒外治總方用芙蓉葉白馬尿日芷山桃 細葉松木皮 其為末

軟癩 用陳早古谷存性為極細末有水乾 攪無水麻油調搽

過五六次則愈

又方 用鮓魚牙齒燒灰麻油調搽或獨子肥皂去子八鹽子內

火燒過為末麻油調搽

又方 用篩過石灰 赤 典枯凡及糯米飯 搗爛搽上

如多年不愈者用猪頸上毛猫頸上毛名一握燒存性鼠屎一粒

輕粉少許共為末清調敷

癩瘋 則癩瘋又名大麻瘋

是症受大地間肅殺風氣酷烈暴悍最爲可畏一因風毒或汗出解衣入水或酒後當風二因濕毒或坐卧濕地或冒雨露三因傳染狀未必皆由外也內傷飲食熱毒過甚大寒大熱房勞穢汚以致火動血熱更加外感風寒冷濕而發初起身上虛痒初起白骨紫雲如癩風狀或發紫疱疥瘡流膿上先是者氣分受病上躰必多下先見者血分受病下躰必多上下俱見者氣血俱病從上而下者爲順風從下而上者爲逆風但從上從下以漸來者可治頓發者難愈治失其法以致皮死麻木不仁脉死血潰成膿肉死割切不痛筋死手足緩縱骨死鼻梁崩塌典夫眉落眼昏唇翻舌噎甚則蝕傷賬目或腐爛玉莖拳上肢休病至千此大刑難解矣應圓製治大麻風初起先用烏葉葉搗爛炒熱遍身久熨又用苦練根杉木根茶葉樟葉桼更葉土烏葉葉每煎水遍洗更覓病

減一半只服後藥

防羊肉 荆芥穗 淨連 喬 白蒺藜 金銀花 海桐皮

白蘚皮 何首烏 真青藤 蔓荆子 威靈仙 皂角刺

石菖蒲 土牛夕 宣木瓜 意以仁 大楓子 川續斷

土苦參 胡麻仁 當歸尾 白芷稍 川黃連 亦芍稍

川独活 北柴胡 大甘草 渴加天花粉甘草少下余均合

不記貼數每黍醇酒同煎多服切忌鹽併各毒物若有瘡口用

蒼朮荷葉同為末塗上自愈

如虛兒傳治厲風症眉毛脫落鼻梁倒塌遍身生癩者治宜

○聖化丹 防丰 荆芥 羌活 独活 胡麻 炒金毛狗

苦參 祛牙皂 祛皮 當歸 各二 蟬退 姜蚕 炒全蝎 祛頭 白芷

何首烏 去破 炒各 蒼耳草 燻各五錢右為細末大楓子 二斤

搗爛如泥同藥和勻將陳米飯打糊為丸如梧棗大每服四十

至五十九如病人身骨腫肩膊上痒不止或是風氣拔睛手足

拘牽先服此藥一料將青茶送下日進四服或婦人四肢麻痺

手若刺痛腿膝生瘡先服奪命一料後服此聖化丹服藥後十

口无鋒面上放血次于膊上放血後于腿脚上放血而遇天氣

清明五六日放一次量病輕重不可乱放血若婦人多破血癩

祖傳用木别子炒泡草烏炒老公鬚炒川烏泡細草青木香大

黃肉桂略一當歸酒炒二兩雄黃三蜈蚣一條炒青竹蛇一條茨

為細末酒打糊為丸如桐寔大每服五十丸白湯送下

王氏傳用川芎生地當歸赤芍白芷羌活姜蚕一

蒺藜蝉退天麻炒黃柏烏蘘荆芥防丰雄黃

胡麻子威灵仙川山甲石菖蒲金銀花五灵脂略

水川烏畏过皂次炒草烏炒全蝎大枫子蜈蚣條蒼耳

齧一白花蛇酒炙右為細末老米打糊為丸如悟寔大每服大

臭氏換肌散 治癩瘋年深 不愈以致眉髮脫落鼻梁崩損重者

方可服之 烏稍蛇 鱧白 花蛇 鱧地龍 酪一大麻 細辛 白

芷 蔓荊 當歸 苦參 其菊花 荆芥 威灵仙 川

本賊 紫參 沙參 甘草 川芎 赤芍藥 胡麻 石灰

木通天門冬 蒼朮 木 别 定風草 何着烏 紫苑 蒺藜

石菖蒲 草烏各一兩共 各製過為末每以五錢 温酒調服

梅瘡

楊梅瘡之症由肝腎脾內風濕熱之毒間有天者温毒傳染但形如楊梅焮紅温爛痒痛属心多生乳脇形如鼓釘黃豆者属脾多生滿面謂之大風豆形如棉花属肺多生毛髮形如紫葡萄蓋按之腎痛者属肝腎多叢生豚聲及筋骨之處如發髮鬚額口鼻穀道边者属陽明及少陽太陽如發于足胫陰莖脇肋者属肝腎經焮陰大抵上先見者氣分受病上体必多下先見者血分受病下体

百力全書卷之四 易每卷頁 一五

必多上下俱見者氣血俱病 初起即服方拈內防風通聖散一

貼去麻黃用硝黃以去內毒待胃氣稍定再以一貼去硝黃用

麻黃發汗以去外毒已後用薏以仁 蹄尾 小芎 牙皂

荆芥 銀花 木通 牛夕 蘘皮 羌活 獨活 木瓜

防丰 茸草各二分 土茯苓今斤分作六大貼酒水全煎服外用

輕粉三系油帛包置 銀硃一系油帛包置 鉛粉五置傾 銀小鍋

內煨至黃色胆丸三分 杏仁二十箇 去皮火帛搗去油共為末

或麻油或猪泔煎搽 泔

應圓製治梅瘡神効用 紅花防風天花粉金銀花每貼土茯苓

四兩全煎空心服外用 杏仁半夏各一分 輕粉一分 為末猪胆

汁調搽如生在玉莖上爛而痛者仍先服下藥二貼後服川堇

薛三金銀花仁山慈姑仁紅花紫草各一分烏梅四箇 共分作

四貼每貼用灯心全煎服下用杏仁去皮龍牙即龍骨也如輕

粉絡一冰片觚共爲末温則灑乾則用猪脚上少筒骨髓調搽
如瘡似靴釘及掩蓋厚者用人言行爲末以小紅棗去核搗爛
包人言八炭火內煨過爲末猪胆調搽

如虛兒傳水火丹

牙硝

青丸

白丸

淮鹽酪一水銀五

硃砂礪砂

絡一

冰片

共

研如泥不見水銀星爲度用銀鋪沙

窩一箇燒紅入前藥溶化起泡整開待冷用粗大碗一箇將砂

窩裏于碗內以火帟作條塞四圍用瓦打破取三角四圍排佈

周密以炭火四圍堆過砂鍋又用脚盆注水將大碗置於內水

淺大碗半寸許即發火扇紅俟盆內水熱佳火候砂窩冷取起

砂窩起大碗上丹砂收貯每用三分搗飯爲丸七粒每日一丸

姜湯送下外仍用此藥濃細茶調搽治梅瘡神效

如梅瘡爛成窩者用皂茶

小兒骨

芙蓉葉

各五分

赤石脂二分

硃砂分輕粉

乳香

沒藥

絡二蜈蚣

燒

其爲細末

但每

先宜苦參 荆芥 花椒 煎水洗

如生梅毒瘡服藥百餘劑還有二三枚不愈者用好膏藥一兩溶化

入銅青胆丸兒茶朱砂各一錢為細末攪勻抹厚皮昏貼之

如病梅毒瘡服上茯苓大便秘閉者用川椒貫公猪大腸內線扎兩

頭爇熟去椒服湯腸

如梅毒傳絡作筋骨疼痛用川芎 當歸 熟黃 白芷 木通

牛膝酪一白木 皂角 厚桂 檳榔各五 土茯苓各五 全煎

上午服三碗下午服三碗 服至二十日自愈

但瘡愈時若躰厚寔者用防風通聖散加減調理若躰薄虛者用

當歸 白茯苓酪一 荆芥 蘇皮 乾姜 蒼朮各八 川芎

白芷 肉桂 木通 木瓜 黃芪 白木 桔梗各七 赤芍

厚朴 牛膝 麻黃 皂角仁絡五 粉草各五 姜各五 煎分作數貼

服以此調理斷根

梅毒

楊梅毒症乃因夫治久則風毒深入經絡或挾人而成頑癬或氣

血虛敗而成漏或誤服輕粉水銀不遵禁戒而成風堆腫爛流

膿出汗謂之癰病至於此亦有蝕傷眼鼻腐爛玉莖峯上肢休

祖傳楊梅結毒用當歸兩牛膝一兩在脚龍骨煨存生地黃八

牙皂狔防丰荆芥略一金銀花一兩沉香少七絲土茯苓厘

石切片分作十八貼服三貼又服貼後遠服九貼服二貼間二

日每貼用水四碗煎二碗分作四處服之但先宜花椒葱茶苦

參煎水洗之藥完全愈妙不可言

如虛兒傳五寶散 治梅毒如神用珍珠琥珀冰片略四鍾乳粉

一匙朱砂六匙先將土茯苓兩切碎煎極汁又炒過飛麩一匙

再煎調前未藥腫瘡在下空心服瘡在上飯後服外用五倍皮

硝煎水洗上後搨解毒生肌之藥貼太乙膏

聖藥製治梅毒風漏筋骨疼痛遠年不愈用冷飯團仁白蘚皮

防風荆芥 五加皮 威灵仙 木瓜酪半 白芷 當歸 川

芎 白芎 生地酒洗 地骨皮 尋風藤 牛夕酒洗 甘草 黃

連白茯苓 令槐花炒 酪一 杜仲二 兩炒 皂角仁 白牽牛仁 十分作

十貼每以水一鍾酒半鍾煎至半樣痛在上飯上服在下食前

服每日一服如初服三五貼其瘡腫似前是托出其毒輕者十

貼重者二十貼仍以菜渣晒乾煎水洗切忌房事生冷炙煨毒物

黃氏傳梅毒漏癰頭胸爛成火孔用毒魚一尾五月五日午時破

去腹尿將蓍簽草子放滿腹外以水數升同入鍋煮熟去皮食

之連服三五次即愈

如皇傳拈痛散 治遠年近白生過綿花楊梅等瘡結毒五年十

年爛見骨者起泡疼痛行步艱難用 防丰 荆芥 連喬

皂角 麻黃 生地 熟地 牙硝

共爲細末用土茯苓二兩半每日服二貼服至七日見効

汁氏傳梅毒治方用白砒一兩水銀一兩老姜一兩取汁老鴉半斤沂山藥

料斫三味共研取汁先搗爛砒同水銀入汁內瓦錐張將

鐵灯盞蓋口用鉄線縛緊將泥塗裏文武火昇以炷香盡爲

度后月原藥爲丸白砒半分芝麻七分辰砂三分雄黃四分百

草霜一兩靈藥二兩各藥共爲末煉蜜爲丸做成十四箇每服二丸

白湯送下神効無比

應圓弟傳治遠年梅毒風症神方

白芍威靈仙石南藤山藥生地黄當歸一兩

木通絡五荆芥白芷稍天麻絡七黃芪獨活羌活

宣木瓜連喬蕙以仁土牛夕各一兩金銀花

土五加皮防風酪一麻黃六兩白蘚皮小芩甘草絡

糸條芩半兩牙皂五兩共爲粗末每日用藥末五錢及土茯苓二兩

易每厚頁

用大罐收服

梅癰外治用生白果肉杏仁食鹽搗爛剔破頻察或乳香沒藥

龍骨全蝎輕粉人言雄黃巴豆為未擦

如楊梅風毒及誤服輕粉以致癱瘓肌肉疼痛不能動履或壞肌

傷骨者宜仙遺糧湯

○仙遺糧湯 土茯苓一兩 木瓜 防風 木通 薏以仁 白

麝皮 各五分 金銀花 六分 皂子 四分 共合一大劑煎服七半月

有効如氣虛者加參芪血虛者加芩歸熟地牛夕肺熱去上茯苓

苓倍加薏以仁金銀花

如病梅瘡後腫塊成癰宜仙遺糧湯

○仙遺糧丸 茯苓一斤 防風 木通 薏以仁 防已 白茯苓

金銀花 木槿皮 鮮皮 皂刺絡五 白芥子 四錢 當歸

身為未蜜丸或浸酒服切忌生冷魚雞煎炒茶酒房室一月餘

氏傳一掃光專治梅瘡風癬男婦疥癩神方

白砥一硫黃四俱碾為末用生豬膏拌勻將帛捲定以麻

油灯上燃着取油調後傾棄末輕粉一水銀一班猫頭

藜苳一栝郎一磨製死水白附一和均搽上即愈

天疱

天疱瘡症內多白水按之不緊形如魚炮乃出風濕熱毒所致小

兒亦多患之

治宜以防風通聖散加減服外以馬錢子白芨青水香研水搽或

蚯蚓糞略炒為末香油調搽或白果搗爛搽神效

新刻秘授外科百効全書卷之五

豫章儒醫龔居中應圓父輯著

疔瘡

夫疔瘡者皆由臟腑積受熱毒邪氣相搏於經絡之間以致血氣凝滯法於毛孔手足頭而各隨五臟部分而發也其形如粟米或痛或痒以致遍身麻木頭眩寒熱時生嘔逆甚則四肢沉重心驚眼花益疔腫初發熱突起如疔益故謂之疔七瘡含蓄毒氣突出寸許痛痒異常一日間害人甚速內經以白疔發於右鼻赤疔發於舌根黃疔發於口唇黑疔發於耳前青疔發於耳下蓋取五色以應五臟各有所屬部位而已朕或胃或腰或足發無定處如在手頭而骨節間最急其餘尤可緩也近世多見因食瘟牛疫馬之肉而成此症其形有十三腫皆以形而名之耳一日麻子疔始末極痒忌麻子油犯之多不救二曰石疔三曰雄疔四曰雌疔五曰火

疔六曰爛疔七曰三十六疔八曰蛇眼疔九曰益膚疔十曰水洗

疔十一曰刀鑣疔十二浮鷗疔十三曰牛狗疔惟三十六疔最為

可畏其狀頭黑浮起形如罌豆四畔大赤色今日生一明日生二

後日生三乃至十數尤為可治若滿三十六則不可治矣又有所

謂紅絲疔魚臍疔之類其名甚多其紅絲疔者或生手足間有紅

絲一條急宜用針刺斷不狀其絲入心必難治矣魚臍者狀如魚

臍也 凡療疔瘡皆宜刺瘡中心至痛處又刺四邊十餘下令去

惡血乃以藥放之仍服蟻酥丸之類發汗諸疔名目雖多其治

法畧同如身冷自汗嘔逆燥喘狂喝妄語有視者皆毒氣攻內不可治矣

祖傳飛龍奪命丹 治疔瘡發腦疽乳癰附骨疽一切無頭腫毒

惡瘡服之便有頭不痛服之便痛已成者服之立愈此乃惡症

藥中至室危者服之立安 雄黃仁朱砂為衣輕粉分五血竭分

乳香仁沒藥仁蟾酥仁銅綠仁胆仁凡仁寒水石仁射香五分

片腦殭蜈蚣二條去頭足蝸牛二十一令

右為未先將蝸牛連殼研如泥和為丸如菉豆大如丸不就入

酒打麵為丸之每服二丸先加葱白三寸令病人嚼爛吐于男

左女右手心將藥裹在葱白內用無灰熱酒三四盃送下干避

風處以衣蓋覆之約人行五里之久再用熱酒數盃以助藥丸

發熱大汗為度如重者無汗再進三丸汗出即効如疔瘡走黃

過心者并出冷汗者難治病人不能嚼葱研爛裹之瘡在下食

前服瘡在上食後服忌冷水土瓜茄子油膩雞魚肉濕麵一切

外治輕者單蟾酥為末以白麵和黃丹搜作丸如麥米大用針挑

破錢頭以一粒納入神効重者賽金丹危篤者用提疔錠子

賽金丹明丸明溶化入金丹明銀釵撿之慢火熬令紫色先以

針週迴挑破用津液調敷數度無令瘡乾其疔即潰而不潰入

信一錢雄黃硃砂各五分貼之治一十三種瘡如神

百方全書卷之五 疔毒方頁 二

○提疔錠子 用雄黃朱砂絡二青鹽砒霜白疔者輕粉班猫各

分五蟾酥射香兩一草麻廿个右為未用黃蠟溶化和丸梧

寔大捻作錠子將針刺破疔頭放一箇于疔上又刺四邊令血

出水粉膏貼之

凡暴死者多是疔毒急用灯焰遍身若有小瘡宜急灸之并服前
飛龍奪命丹亦有服醒者如偏僻之處藥難導達惟灸有回生
之功若專疎利表散者危

多骨疽

大多骨疽症由瘡久潰氣血不能營慮處久則腐爛骨脫出肉外
治宜補脾胃壯元氣以疔癰類八物湯加茱桂外以附子餅灸
或葱熨法祛散寒邪補接榮氣則骨自脫瘡自斂若有氣虧損
其骨漸腫甚則歲月潰膿出骨亦當用葱熨法若投以尅夫則
真氣益虛邪氣益甚鮮不有誤

翻花瘡

翻花瘡症因瘡將斂原氣虛弱肝火血燥生風翻一肉突如菌大小長短不一

治宜內服疔瘡類八物湯倍參芪歸朮出血乃肝不能藏脾不能約宜鬢疽類補中益氣湯加五味麥門冬有怒火者宜耳類八味逍遙散若用風藥速其亡也汗多必脫發瘡危哉

外治宜藜芦一味為末猪油調塗週日一易須候元氣漸復膿毒將盡塗之則努肉自入不脫雖人復出若候用針刀火灸其勢益甚或出血如注寒熱嘔吐等症急補脾胃為善若似蛇形長數寸者用雄黃末敷之

蝸瘡

大蝸瘡之症生手足間相對如新菜莢痒痛折裂搔則黃汁淋漓有孔如蝸久而生虫

治宜杏仁乳香絡三碗黃輕粉各半為末用麻油三人黃蠟

五錢溶化八前未煎攪成膏云火毒磁器收用

又方用燕窠取抱子處土為末乾摻每先用白芷大腹皮湯洗淨

肤後敷藥

走皮風

夫走皮風症面忽爛紅而出水延至胸手俱生紅點如豆疹

治宜先以老鼠茨根刮皮紋酒服以消其紅如而上爛處只將

生地黃汁搗毛刷上再內多服防風荆芥連喬蒺藜黃連玄參

午勞子金銀花歸尾赤芍白芷粉草

走皮癩瘡

夫走皮癩瘡之症生蒲煩項發如豆梅痒而多汁延蔓兩耳外內

濕爛治宜先以桑寄生桑根皮各一握白芷黃連各少許煎

湯以綿蘸洗候惡血出盡拭乾次用皂莢麻竹穰俱燒灰存性

黃柏黃連樟葉白芷各等分爲末麻油調搽忌醋

侵淫瘡

夫侵淫瘡症初生甚小先痒後痛汁出侵淫濕爛肌肉延至遍身若從口發出流散四肢者輕從四肢發生然後入口者重治宜每先以苦參大腹皮煎湯洗次用苦練根晒干燒存性爲末猪脂調敷濕則乾摻

月蝕瘡

夫月蝕瘡症隨月盛衰生且鼻面間及下部諸竅宜枯凡輕粉摻

白蛇纏

是症有頭尾儼似蛇形或前胸生至後皆足也

初起宜隔蒜於七寸上灸之仍用雄黃爲末酒調服之再以雄

黃爲末醋調敷或內服三黃丸外用蜈蚣燒灰麻油調搽

蛇皮瘡 治宜以松香二兩白桐子六筒搗爛搽甚妙

五疥

夫五疥者乾疥癢痒皮枯屑起温疥胃腫作痛久則水流如黑豆汁砂疥如砂子細箇或痒或痛抵之有心焮赤虫疥痒不知痛延便易拔傳染膿窠疥畚藥稠膿色厚掀痛皆由五臟結毒而發屬足三陰者尤多但瘡有遍躰難分經絡必憑外症以斷虛實如焮腫作痛便秘硬發熱者為風毒温熱如慢腫痛痒脯熱或時寒熱休倦少食便順利者為血虛風熱

治此五疥更宜分上下
 肥人多風濕瘦人多血熱瘦弱虛損腎枯火炎縱有便秘發熱依渴等症只宜滋陰降火畧加藜朮蒼耳連喬之類決不可純用風藥涼血傷胃而壞臟腑內服通用方括內散血疎風湯或連歸湯氣虛合四君子湯血虛合四物湯風合消毒飲湿合平胃散外治搽藥通用合掌散摩風膏便異散洗藥荆芥黃柏

參等分煎湯痒加蛇床川椒腫加黃白

仙子散雲來傳治遍身瘡疥經年舉發者

威灵仙 蔓京子 何首烏 荆芥 苦參 右各等分爲細

末每二錢食前酒調服日進三服忌發風物

洗疥藥 蒼朮 皮硝 花椒 苦參 水煎類洗

燠疥藥 艾葉 雄黃 人言抄核桃壳爲末捲作筒燒烟燠之

一掃散 治各色疥瘡神効

大楓子肉紅枯丸紅蒺藜 花椒絡一倍子一不硫黃 雄黃

青丸 水銀絡一人言強共爲細末木油調搽

便易散 應員製治乾疥諸瘡甚神更不廢本以便製賣 花椒兩

香附兩枳榔兩蛇床兩白丸兩共爲極細末核桃油或木搽油調

合掌散如虎傳洽乾疥諸瘡黃泡坐板等瘡俱効

樟腦紅水銀 蛇床 白芷 花椒絡一白丸五大楓子一

百効金膏卷之五 首不卷頁 五

共為細末油核桃肉為丸置手掌磨擦鼻嗅之

磨風膏

治疥癬風癩諸濕痒瘡及婦人陰蝕瘡火丹諸般惡瘡

神効

蛇床子伍大楓子十杏仁二柘九 樟腦絡川椒

輕粉

水銀絡三雄黃五分銀硃一共為末水油三兩研為丸

彈子大磁器收貯每用少許遇痒遍擦

五癬

五癬之症乃血分熱燥以致風毒尅於皮膚發則肌肉癢疹或圓

或間或如苔梅走散風癬即乾癬搔之則有白屑濕癬如虫行搔

之則有汗出積癬全肤不知痛痒牛癬如牛頸土皮厚且堅馬癬

微痒白點相連 治宜通用前方括尚防手通聖散去硝黃加浮

萍皂刺水煎服久年不愈休盛者兼吞頑癬丸体虛者不可安

用風藥有虫者間服前方括內蠟丸九白癩癬併梅癬宜註應

○頑癬丸 浮萍 蒼朮 蒼耳絡 紅桂參一兩 琴紐香附

半酒調為丸白湯送下

立應湯 蔓京 防羊 荆芥 苦參 蒼耳 黃荆子 牛

芎子 胡麻仁 其枸杞 余良石 白芷稍 蒼朮 連喬

土茯苓 羌活 獨活 三兩 同煎 阜空心服

外治乾癬 用生姜 二兩 切片 內夾鹽及鹽梅火昏包定燒灰為

末再人人言未擦甚効古力用狼毒草烏各二兩 以滿七枚

生為末津唾調擦

濕癬 用枯凡黃連絡 五胡粉 黃丹水 銀絡二為末 猪脂油 兩夾

研令水 銀星散 盡磁器收貯 搽之 或用必効散 用木槿皮 兩班

猶行半下 棋即木別 祛瘡各 雄黃 紅白砒 各 右俱切成片 另將

雄砒 研細 共合一處 以井水 一碗 河水 一碗 浸晒 三日 露三夜

將藥水 用鵝翎 掃癬上 百發 百中

牛癬 用牙硝 胆凡 自朕 銅兒 茶銀花 乳香 沒藥 銅青 為末 生桐

油調搽或用烏梅刺破蘸蜂蜜復人輕粉擦之古方用舊皮鞋底燒灰存性人輕粉少許爲末麻油調敷

馬癬 併疔頭用羊舌頭根將竹扞究起搗爛加明凡紅又搗以

好醋調勻將夏布塊捺或用濕癬內必効散亦妙

綿花癬 用泔陀僧末捺用水龍骨燒烟燻更以桐葉煎湯洗之

搗掌風癬 有虫吃開用黃丹輕粉各三錢猪臟頭燒油調藥搽之

通用洗藥 用紫蘇樟腦蒼耳浮萍煎湯洗之或用骨灰頭洗敷

如女子兩股間濕癬長四五寸發時極痒上刺百餘下其血出盡搥湯洗之如此三四次方除

痒時左癬上刺百餘下其血出盡搥湯洗之如此三四次方除

蓋濕淫子內其血不可不針後服浮萍散出汗

○浮萍散 治諸風疥癬癩瘡

浮萍兩 當歸 川芎 赤芍 荆芥穗 麻黃 甘草各二

右剉二劑葱白二根豆豉五六十箇煎至八分熱服出汗

小兒諸瘡癬 宜用蛇床菴剪草無夷仁龍牙草陳菜黃各持

分爲未先用甜藤蕉葉煎水洗後用黃蠟煎南油調搽

癩瘋

白癩瘋 治宜內用嚼魚散或金櫻丸外治三黃散

嚼魚散 露蜂房仁將生塩築滿諸孔眼火燒存性去塩後用

胆凡天花粉蟬退各等分俱爲細末均分用帛包三分將活鯽

魚一對同酒煮熟無風處細嚼連刺飲酒後弄自上而下起人

○金櫻丸 倚堂傳何首烏片胡麻仁二兩蔓荆子二兩芡子二兩酒炒二兩白

茯苓二兩蒼耳子二兩蛇床子酒炒兔絲子酒製肉從容二兩牛夕酒

配蒼朮一兩金櫻子酒炒苦參斤右爲末麵糊爲丸如梧桐

子大每至七十九温酒送下

○三黃散 雄黃二兩硫黃二兩黃丹 天南星絡二蜜陀生 枯丸

絡二右爲未先以姜汁擦患處姜蘘葉末擦後漸黑次日再

擦黑散則無恙矣

紫癩風 治宜用官粉五斤流黃三斤為末雞子清調搽服藥難

諸瘡

血風瘡症乃三陰經風挾鬱火血燥所致癢癢不常抓破成瘡膿

水淋瀝內症肺挾盜汗惡寒少食休倦所以不敢忘用風藥

治宜通用內服蹄尾川芎淮生地赤乃浮萍等分或方括內活

血踈風湯甚者紫雲風丸外治用簡易散大馬齒膏或五疥內

摩風膏

紫雲風丸 五加皮二兩何首烏二兩 麥虫二兩苦參 當歸略二全蝎

五兩牛蒡 羌活二兩 獨活 細辛 防己 生地黃 白芷

黃連 赤芍 蟬退 防丰 荆芥 蒼朮 酪一為木蜜丸梧

子大温酒米飲任下

簡易散 煨石膏兩 燒黃五斤 共為細末猪油調搽

○大馬齒膏

馬齒莧

焙 五錢

黃芩

黃柏

枯凡

兒茶各三錢

輕粉無桐油調推油昏上葱椒煎湯洗

如因飲酒後遍身發而風瘡抓至出血又痛者用蟬退薄荷非分

為末每二錢水酒調服即愈

黃芩瘡

治宜內服防丰

荆芥

疾箱

連喬

枝子

金銀

花黃芩

黃連

苦參

歸尾

甘草

鼠粘子

外用槐

花煎濃水洗洗後用檳榔硫黃磨槽油搽或用枯凡神曲川椒

硫黃水銀各一錢為末香油調搽

如遍身四肢俱生黃泡瘡有膿刻而痛者宜用防丰 白芷 木

瓜 七厘

皂刺

何首烏

威靈仙

金銀花

當歸身

甘草

連喬

黃芪

輕者八

貼重者一二十貼

外用硫黃一

錢

明凡

錢

明凡

二五 半生半枯

羌活

七 分

川椒

二 錢

吳黃

二 錢

枝

子

子

大黃

一 錢

俱存性為末

木油

調搽

或用簡易散

俱妙

諸毒瘡痛不可忍宜用 白芷 當歸 乳香 沒藥 川山甲

金銀花 各等分爲末每服一錢姜湯送下

熱虫血風瘡焮痛不可忍或有時痒而難當者用胡腦細白丸二

牙命紅大楓子二蛇床子紅硫黃紅人言七爲末或油備或搽

遍身作痒抓即出水作爛加癬先宜用蒼朮花椒各紅雄黃紅共

爲末搥爛艾葉捲筒燻七後內服防丰蒺藜歸尾干葛苦參胡

麻仁何首烏甘草四五貼

每瘡水不乾者用黃丹輕粉代僭等分攪或用猪胆調搽

瘰後遍身生瘡內宜用黃連枝子大黃猪油四兩煎酒服外搽

凡人皮燥遍身生瘡甚者乃血虛也宜用當歸碎猪油碎生酒十

餘斤封固火煨一二時侯油溶化退火氣每日隨量飲之

雜治部

湯火傷

凡遇湯火所傷先以鹽末和米醋調和瘡上次以醋泥塗之仍用醋塗下絕暫救痛苦一面急搗生地黄醋調敷瘡上直候痛止須厚至數不妨慎勿以冷水冷物冷泥熨之使熱不能出爛入筋骨又方 用陳壁上真豆粉糝麻油井水各半調敷或用舊杉木尿桶板燒灰研井水以包頭巾蓋患處以水刷 立效或用水銀二分津制死用鮮猪油二兩取油去渣同水銀連攪勻放水中心退冷人水凡半分輕粉乳香兒茶硼砂各五分爲末搽李氏以清烟膏用雞子清磨京墨塗患處上用三層溫帛蓋則不起泡冷如冰効

錦鄉傳湯火神方用真鉛粉鴨蛋白調搽外用貓兒肚下中脊毛細七剪爛鋪上即愈

曾治一人因炒硝黃被火傷遍身外用陳杜黃金烏桕嫩皮百草霜爲細末攪麻油抹肉用解毒湯頻服七日全愈

治湯火呪云七龍樹王如來授吾行持北方壬癸焚火大法
龍樹王如來吾是北方王癸水收斬天下火星辰千里火星神必
降急上如律令呪畢即渥真武訣吹之即用少許水洗雖火燒
手足成瘡可瘡矣

杖瘡

杖瘡之症宜先破瘀止痛後宜定心補益如杖瘡忽乾毒攻腹內

恍惚煩問嘔吐者難治

一杖畢即飲重便和酒不可吃茶免血攻心外用熱豆腐鋪

在杖處其氣如茶其腐即紫復再易熱豆腐鋪之以紫肉散盡

紅淡為度或用蜜陀僧濃研醋開麻油雞毛刷乾則又刷神効

○或用菜豆粉微炒雞子清調刷○或水粉一兩赤石脂水銀一

為末麻油調成膏傘昏擁貼緊縛如肉陷用此膏填滿尤妙

○又法打傷皮不破肉損者用羅菴搗爛罨之

內用吳亮 苑仁 大黃 歸尾 黃芩 校子 桔梗 柴

胡木通 車前 甘草 忌葷三四日 體薄者去大黃若休

薄者瘡收寒熱惡心少食宜 歸尾桃仁赤芍烏藥香附蘇木肉

桂柴胡羌活水酒煎氣鬱加 木香心腹脹痛加童便心下脹滿

氣不通暢加香查檳榔

如極甚者外貼膏藥用白丸一兩 秋冬用白丸四兩 公羊油半斤

水一盞同煎取油與蠟或膏 俟器溫入片腦潮腦各五射分 礪

砂研水銀五輕粉 紅金銀箔各一百同攪勻或搽或貼內服乳

香 當歸 白木 白芷 沒藥 羌活 甘草

爲末酒調服隨以熱酒盡量而飲虛者潰後宜大補氣血脈胃

雲林傳退血止痛散一治杖衣 腫痛瘀血不散氣血攻心或曾寒

壯熱 歸尾 赤芍 生地 白芷 防丰 荆芥 羌活

連喬 黃芩 黃連 黃柏 大黃 校子 薄荷 枳壳 桔

梗 知母 石羔 車前 甘草 木煎服

刘文庵傳金箔散 治杖打極重痛不可忍昏悶欲死者

白蠟一兩 乳香三 沒藥仁 金箔貼 銀箔貼 右為末每一錢酒調

林侍郎傳敷杖散 專治杖瘡重傷成坑日久不愈神效

用大桐子葉取茂盛者不拘多少以米醋煮至爛熟陰乾

隨大小剪貼

如虛見傳補氣生血湯 治杖後潰爛久不愈者

人參 白朮 茯苓 常歸 芍藥 熟黃 陳皮 香附

貝母 桔梗 甘草 往來寒熱加柴胡地骨皮 口乾加五

味子麥門冬膿清加黃芪 膿多加川芎 肌肉遲生加白 斂

內府秘傳二黃膏 專治杖瘡打成坑肉皆朽腐者神效

黃柏 枝子 連喬 黃連 大黃 苦參 荆芥 薄荷

牛勞 七利 威灵仙 蔓京子 右為散各等分將清油伴

慢火熬至渣黑去渣不用將油熬定後人黃蠟半兩白蠟兩待

溶傾入磁器內後乘藥入細藥在內部骨過血蝟 兒茶

輕粉 乳香 沒藥 白芷 大黃 雄黃 樟腦 水銀

銀硃 射香 各等分 八內撓勻收貯取用

鬼代丹 乳香 沒藥 自然銅火服過木別子去壳無各異

地骨龍去上名石為末煉蜜丸如彈子大每服一丸温酒下任

打着不痛

寄杖散外方用白蠟一細七切爛滾酒淬入碗內服之打着不痛

折傷

夫打跌損傷者此血氣在身不能流行因此或成血片或血死不痛者或昏悶不醒人事或寒熱往來或日輕夜重變作多端致令血氣不調你梗故也醫者不審原因妄投藥劑枉死者多矣誠可惜之當時當下貴得其宜或受傷至平日綿醫者死血已固不能

通水道既表後再不可復表但看仔細輕重吃藥吃藥後受傷處
 原瀆青腫轉紅色者此血沽將愈如傷重復藥將愈用慰法後服
 千金不奪散浸酒服盡之後庶得全愈如病人攻重牙關緊急將
 死者宜擊開牙關將返魂奪命丹隨用正藥方內加羌活防非荆
 芥胡黃連煎既已人藥不死如不納者不治切忌當風處及地下
 坐卧并忌一切冷水冷茶冷酒之類油膩毒食之物如遇傷重者
 先令人解開病人衣服遍身烙見看形色何如又要去魚除骨上
 下看有脉調和否如絕脉不至者死沉細者生山根好除囊內尚
 有子可治如腎子在小腹內去即醉莫医又用神妙佛手散如病
 人口內人藥不進可將大鰮魚煮熟取腦子和眼睛調下藥未人
 腹略醒可救再用鳳仙子匙沉香研水吞下○一從吻食管既斷
 可治用桑白皮取絲縫蜜却將難絮破開去食取膜匕定患處墮
 川護菓護之後服菓可愈 一從吻氣管斷即死不治 頂門既

●骨未破者可治 食飽受傷及跌 三日不死者可治頂門既破

骨陷人者不治 腦後受傷者不治 若心胸緊痛青色未裂心

乃徧心受傷可治 心胸^今緊痛經既畏心乃心口受傷不治 男

子兩乳受傷可治 婦人兩乳堂受傷不治 正腰受傷重自笑

者立死不治 小肚受傷七重吐盡者不治 氣出不收眼開不

治 小腹受傷禾傷肚者可治 孕婦小腹受傷犯胎不治 腎

子受傷人小腹者立死不治 腎子受傷皮破者脊子未上小腹

可治 如眼未宜瀕糞何害 脉大而緩瀕四至不治 口如魚

口纏風不治 顛門出髓即死 兩眼有傷可治正心口青腫二

七內即死 兩乳有傷宜當急救兩脚有傷可治來脊斷者不治

小腸有傷不分陰陽難醫 頂門有傷難治 兩臂有傷怕血人

五臟兩腿有傷瀕朋無事後必有損方其手後

●返魂奪命丹 專治跌撲打傷牙關緊閉心腹痛悶不醒人事

將筋孽開灌人碗即愈

銀絲草一兩即山槐始葉長而毛雞子一個用過一月者不去毛不二味

共研爛如泥熱酒刺起布瀝過調小兒骨未仁服即愈神効後

服稜莪散●稜莪散專治跌撲打傷遍身疼痛不能卒止者神効

三棱一兩莪朮一兩赤芍一兩西香八分玄胡子八分黃柏一兩枳榔八分

青皮五卷活狸防丰一兩大腹皮五兩黃一兩芒硝三分黃連三分

桔梗二分荆芥三分柴胡一分陳皮八分紫蘇一分半夏一分千里馬

一兩只川右依製法如等分姜五片葱白五根桑白皮半水

半童便煎空心熱服十分汗大除紫葱白只用一根如要利

用大黃茫硝有痰用半夏如孕婦受傷除三稜莪朮如血出

甚亦除之及葱白加當歸蒲黃用水煎服偏心受傷者加紅

花二分煎顙門受傷三稜葱白如出血多就停止血金鎗丹

如手傷斷用手摧正用灯心火昏捲定要厚是停當外用杉

皮押定進接骨回生丹再用小畏脚繫七扎定杉皮乃無有不愈但攻下之藥多加乳香沒藥痛重加西香二錢赤芍玄胡素乳香沒藥或有咳乃肺氣旺加乾葛杏仁勿用半夏加貝母如重傷心痛加石菖蒲如原處痛今結痞瘁如乾葛赤芍甘草桔梗防丰荆芥連喬每用原湯子煎帶熟滾隨意加通經活血止痛散 專治跌撲打傷敗血冲心胸緊痛者神效

三稜 莪朮 赤芍 黃柏 黃連 青皮 柴蘇 野馬

香附 比胡 乳香 初起不下此藥十分重者方下內加

紅花蘇木石菖蒲

仙傳火龍行氣法 生姜兩四 食塩兩四 麻油兩四 瑞香葉兩三 大黃兩二

頭酒糟兩四 京芥兩二 澤蘭兩二 生地兩二 牙硝兩二 其一處研爛以麻

油炒熟帶熟欵上七八次冷了又炒熟熨七熨上白肤安愈

後逢千金不奪散及佛手散神效

千金不奪散 防丰 京芥 生地 勾藤 角回 木瓜

芎勞 紫金皮 五加皮 白芷 檳榔 木香 羌活

獨活 歸尾 天台烏 威灵仙 杜仲 芍藥 牛夕

乳香 沒藥 故芷 五灵脂 石南藤 自朕銅人热者

加黃連赤芍為散各等分每用頭酒一埕用絹袋兜定浸五

七日取出隨量不拘時常熱服忌紅酒鹽醃油膩等物如孕

婦服除牛膝赤芍加歸身比艾服此藥七日見功不問諸虛

百損遍身疼痛無不全效此方珍之

神妙佛手散 專治筋骨断折金鎗重傷將死者總用此藥大

有奇功子孫宜珍寶之

鹿茸 當歸 從容 禹餘糧 鬼絲子 熟地 白芍

川芎 乾姜 琥珀 比艾 葵盆子 桑漂硝 牡礪

白茯苓 紫石英 五味子 酸枣仁 有為散依製治各等

分姜三片末一板煎慎勿輕用

春再造散 專治手足及筋骨斷折者神效無比

銅錢五文醋木香錢一白狀銅一錢射香三分為細末每服錢二無

灰酒送下令病人先嚼丁香一粒乳香一粒方進此藥神

效傷在上食上服傷在下空心服如即日未安次日再服此

方如未斷折骨者慎勿輕用此方專能接骨別無奇妙

同生續命丹 專治筋骨斷折損傷疼痛不吐者神效

川烏二兩草烏二兩五靈脂 木別子 骨碎補 威靈仙

金毛狗 自然銅二兩地龍去上烏藥 青皮 陳皮白

回香兩半乳香兩半礪紅外子 未藥 射香一分牽牛錢五禹餘

糧四各石為末酒調服一錢神效後服再生活血止痛散

再生活血止痛散 治症如前 大黃錢五柴胡錢二當歸錢二桃仁

五紅花五天花粉一川山甲一甘草一半水半酒煎空心帶服

茲榮雙解散一專治打傷之後榮衛虛弱外受風寒內傷經絡

沒藥醋煨為水當歸 白芷 石連肉 玄胡子 川烏 自狀銅

飛各一兩 生地 川芎各二兩 右為細末每二錢空心老酒送下

萬金不換乳香尋痛散 專治遠年近日諸般傷損遍身疼痛

者神効 乳香 沒藥制 血燭各錢 楠木香五 沉香三 當歸 川

芎 白芷略一兩 甘草五 天粉 木瓜 肉杜各七 獨活 羌活

名去 西香 茴香各五 草烏三 去皮各 右為細末每服四錢熱酒送下

回生再造散 專治男婦跌折損傷遍身疼痛昏悶將危者妙

川芎 當歸 羌活 神活 木瓜各 一角回 穿山甲炒

小茴各五 肉無 甘草各八 川烏三 烏三 虎骨炙五 自然

銅五 氣喘加沈香木香傷頭加肉桂前胡天麻肉從容夜

散驚恐加雄胆亂語恍惚失主加人參神砂金箔銀箔遠志

右各依製法于內未曾抄用半酒半童便煎服神効

傷骨碎暖骨奇方 用當歸白芷絡三草烏鉞錢各生爲末温

酒調服二一覺身麻揣正斷骨端坐隨用糯米粥調牡研末塗

傷處或用沽生雞打爛貼外用杉木皮夾定繩縛毋令移動即

服乳香沒藥白芍川芎當歸川椒名五白肤銅火煨過三共爲

末用黃蠟二兩溶開入前末下內攪勻作丸如彈子大以好酒

煎開熱服隨痛處側卧少時數進幾次大效如覺破傷風腫宜

用南星防手爲末温酒調人姜汁一匙服仍用酒餅敷貼患處

金瘡

一人騎馬跌打被所佩鎖匙傷破陰囊二丸脫落得筋膜懸繫禾

斷痛苦無任諸匠措手或以線縫其囊外加敷貼生肌痛不三五

日線爛而後脫矣予思常泊刀傷出血但敷壁錢而効敏蓋此亦

傷破之類也是以令人慢匕托上多取壁錢敷貼其傷破之處曰

新其囊如故

力全書卷之五

二卷六頁

二二

應員製金鎗神方 用女帶血勒馬片燒灰攪 或松香白凡寺

分爲末攪 或半夏六分白蠟四分爲末攪 或生好石灰篩

過將韭菜汁作成清餅貼于陳壁土俟乾爲末攪 或礦石灰

大黃切碎同炒七次以桃紅色爲度研末攪

金鎗丹周梅江傳佳痛止血生血

嫩老鼠未生小者韭菜根與老鼠一般多石槽搗爛入嫩石灰

未于內摻乾依餅爲度陰乾用時以刀刮菜末敷傷處布包裏立愈

金鎗迎刃散 專治金鎗傷重出血不止者神効

白芍兩甘草兩水龍骨兩右爲末鋼內文武火炒赤旋入大黃

未三兩鳳凰退兩以焦爲度復用嫩蒙葉韭菜葉取自狀汁調

前藥陰乾後入杉漆一兩血竭一兩片腦三分牛胆南星一兩

野羊五錢遇傷處搽上一字立愈

新刻秘授外科百効全書卷之六

豫章儒醫龔居中應圖父編輯

破傷風

內經曰風者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有大風苛毒而弗能為害也若夫破傷風症乃因事擊破皮肉往匕視為尋常不知風邪乘虛而客襲之漸而變為惡候又諸瘡久不合口風邪亦能內襲或用湯淋洗或着艾焚炙其湯人之毒氣亦與破傷風邪無異甘為症也皆能傳播經絡燒燥毒氣是以寒熱間作甚則口焚目邪身體強直如角弓反張之狀死在旦夕誠可哀憫法當同傷寒處治因其有在表在裏半表半裏三者之不同故不離乎汗下和三法也是故在表者汗之在裏者下之在半表半裏之間者宜和解之又不可過其法也

○如聖散

川烏

草烏

各三錢

蒼朮

細辛

川芎

白芷

防丰各錢共為末每服五七分酒調服忌油膩暈腥麵類

如癩狗咬加兩頭尖紅娘子各一錢○中風身体麻木或走痛

酒調下○風旋頭暈酒調下○頭風茶調下○偏頭風口噙水

摘鼻○傷風熱茶調下出汗○風牙虫痛頻擦患處流涎○金

瘡血不止乾搽之○惡瘡久不愈口噙水洗綿城乾搽之○犬

咬蛇傷蝎螫口噙鹽水洗之仍搽上○癰疽疔瘡魚睛紅絲發

皆腦疽等瘡發時新汲水調塗帑封再用酒調服○湯火傷皮

新汲水調雞翎刷上○杖瘡破血乾敷之○瘰癧口噙水洗搽

之○乾濕疥癬香油調搽

○定風散 治破傷風及金刃傷打撲傷損并癩狗咬傷能定痛

生肌 天南星為防丰制七服之不麻防風各等分

右為細末破傷風以藥敷瘡口後以温酒調一錢服○如牙關

緊急角弓反張用藥二錢童便調下○打傷欲死但心头微温

以童便灌下二錢并進二服○癩狗咬破先噙將水洗淨用

拭乾貼藥更不再發無膿大有功效

○一字散 治破防風塌榻角弓反張 蜈蚣去毒炒一條全蝎炒去

頂右為細末如發時用一字擦牙縫內或吹鼻孔

○羌活防丰湯 治破傷風初傳在表

當歸 川芎 白芍 防丰 羌活 稿本 細辛 地榆

甘草炙各錢右剉一劑水煎熱服○若大便閉加大黃○熱効

○水調膏 治初破傷風熱紅腫風邪欲將傳播經絡而未入深

者用杏仁去皮細切飛白麵各等分

右和勻用新汲水調如膏付傷處腫消熱退

汗斑 宜用密陀僧一兩硫黃一錢礞硝二錢川椒七个共為細

末將絹巾燒佳俟洗澡後即篩干上二七見効或用雄黃硫黃

全蝎姜蚕白附子密陀僧各五分射香二分右為末蘸生姜干

患處搽之五日除根決効

去而臂刺字 宜用川山甲一片以糯米蒸如泥照儀有字處搽
帕包一夜次早不見

取瘰神方

用雪白礬灰全煎銀爐內常在坐砂窩處久熱七灰

蓋調借彼銀氣以去黑也二味各等分隨意畧用水調成劑做

成砂窩樣上一個下一個如盒子樣中入雪白糯米數十粒上

下蓋定莫令走氣腰間再用原石灰及爐灰剩者封固放地下

過一宿取起壁開取出裡面糯米聽用臨時用布針挑破出

血將製過糯米如糊樣點在瘰上即時紅腫過一晚即去矣過

三五日即合肉色

又方

用糯稗心灯火燒成球以針撥破瘰入內即去或用巴豆

油点瘰上光妙

夏暑心神鬱燥熱逼瀝漬成瘡遍身或出膿血赤爛如火

治宜南星 半夏 黃連 黃柏 鎔一五告子 黃丹 殆五為

未乾摻如痒枯九雄黃常服黃連阿膠且以清其心

熱汗浸漬成瘡痒痛不止 治宜黃芪 當歸 防丰 京芥穗

地骨皮 木通 鎔二白九兩 共為末每藥一兩水三碗煎五六

分濾去渣稍熱淋洗患處拭乾避風少時立効輕者只用蠟雪

水和蛤粉敷之

癩瘡 因汗出見濕而生輕者狀如散粟青蒿煎湯洗之或速

葉亦好重者熱汗浸漬匝七成瘡菜豆滑石 鎔五為末綿蘸模

之摩破成瘡加黃柏 棗葉各五錢 片腦少許

冬月下虛且觸寒熱血澁生瘡 頑滯不知痛痒 治宜內服升麻

和氣飲土大黃外用木香 栝郎 硫黃 吳黃 姜黃 紮

香為末麻油調搽

凍瘡 是症先痒後痛狀後腫破出血黃水六止治宜用

雄黃雞腦一枚搗爛黃蠟各等分情油臧牛同于慢火上熬成膏去渣塗之久不愈者亦効
又方附子為末麵調塗之或白

芫不拘多少為末調敷

寒天手足折裂依痛 治宜清油五錢慢火熬沸入黃蠟一塊再

煎溶入鉛粉五倍子末各少許熬紫色為度先以熱水泡手足火上烘乾後用藥敷以紙貼之其痛立止入水亦不落或桐油

膏塗之亦妙

又方 每遇寒凍之時將石榴子內取汁塗其耳面手足自狀潤

澤如女子仍取石榴子汁調粉搽面更加艷色

手足皸 治宜先以百沸湯泡洗皮軟拭乾狀後用櫟油一兩黃

蠟一兩其熬勻敷之或用五倍子為末牛骨髓調磁罐收貯理

地中七日取出填皸中即愈或桐油調蜜任僧塗之尤効

疔瘡 具痘如魚鱗痣干日瘡 橡多生干足及各悔氣瘡

治宜以艾九灸初走的則餘者皆落神効

漆瘡 是症因見生漆中毒面痒而腫連眼微赤痒處捶之隨起

瘡症重者遍身如豆如杏膿焮作痛

治宜生蟹取黃隨瘡大个遍敷之或臘茶為末麻油調搽或柳

葉煎湯洗之或磨鉄槽中泥塗之

竹木刺人肉不出 治宜霜梅陳爛肉柿乾等分搗爛罨或牛父

根嚼爛塗之或頭垢或蜻蟬虫搗爛敷如出後內爛以象牙為求接之

針刺折在肉內瓜蒞搗爛敷一日換三次自出或用上內新南星

個野芋三個雄磁石一錢同搗爛罨傷處自出神効

針灸致傷經絡出膿不止 治宜猪骨燒灰存性象牙珍珠血蝎

各等分為末將蠟作一條將一頭蘸藥末入窩內剪斷外截

灸火瘡水出不止 治宜炒黃連一兩石乳正錢為末攪

火瘡瀉血 用舊貼過好膏藥燒灰敷

南京金文斗秘授黑髮烏鬚益腎延年強龜久戰奇方

黑豆五升揀去扁破用一大砂窩將烏骨老鷄一隻母的煮湯

二大碗無灰老酒二大碗何首烏兩四新者用竹刀切碎陳者用

木槌打碎陳米兩四旱蓮草兩四桑椹兩三生地黄兩四歸身兩四苡苳兩四

俱為咬咀拌豆以酒湯為水砂窩大作一料砂窩小作二料用

文火煮豆以乾為度去藥存豆取出掠去潮氣以磁罐盛之空

心用淡鹽湯食豆一小合以其曾用雞湯煮過早晚宜慎于蓋

藏以防蜈蚣也食完再製但自此後永不可食蘿蔔服至半載髮

鬚從內黑出目明如少日又能塵戰極妙

應真製烏鬚神方 用麻油烟鏹核桃蒲亂射香分為末大小竹

筒盛理冬青樹下七日化成水將水擦鬚上即黑

景前家兄傳烏鬚方 用五倍子打碎去灰用銅鍋炒成豆豉起

黑艷將青及一大片濃茶打濕先放地上將倍子包裏脚踏成

餅粿看火色莫炒過了稱過一錢紅銅末上好醋炒十次以黑
為度歸過細末三分沒石子二分明凡二分食鹽二分上下半
分俱為極細末用極濃好細茶調煎如鏡而樣方好每用敷上
以皮昏包過一夕後用核桃油染之

春方各遍宮春鴉片二錢蟾酥一錢丁香一錢硃砂五錢封半分

右為末以津調二三厘塗玉莖如晚行事必要未時調塗至晚
臨行事時切要溫水洗去久戰不泄妙不可言

長思丹 公土狗一个火灼天龍一个馬食虫地龍一條即根

人龍吐食即虫朝腦一个金頭蜈蚣一條其為末將蟾酥和丸如

菜豆大每用一九施干玉莖上自朕堅大令美女長思

黑髮香頭油 用何首烏 墨斗草 白芷 細辛 茸松 三

奈一排草 生地黄 桑椹 側柏葉 紅豆 良姜 黑葱

核桃肉 香油久浸極妙或芭蕉葉同膠速蒸油搽

髭髮脫落不生 用黑附子 蔓京子 柏子仁 烙五為末烏雞

脂和搗研乾置瓦合內封固一日取出塗在脫處如因癩落者

先用生姜擦三次后用半夏木麻油調搽

急救諸方

救縊死 目旦至暮但心下微溫雖一日以上可活急抱起死

將繩寬解去切不可割斷極湏按定其心却撚正喉嚨放倒封

令一人以手掌掩其口鼻兩人吹其兩耳一人急牽其髮不放

手及屈伸其手足摩換之少活即以粥飲與之此法救人無不

又法 男用雄雞女用雌雞冠刺血滴口中即活或細辛射香雄

黃芩分吹入鼻中痰出即醋

救溺死 先以刀扶開口放筋一根啣住使可出水然後解去其

衣服以艾炙臍中令兩人以筆管吹其耳即活或以生人到時

死人即負持走吐水即活外用綿裹皂角末納穀道中水出便

活內以鴨血灌之

救凍死 其症四肢強直口禁畧有微氣者且慢向火急用布袋盛熱灰放在心頭冷即換熱待眼開却用溫酒或米飲灌之冬月墮水凍死亦宜

救挾暑死 宜用溫湯常摩洗其心腹問如路途急切用路上熱土置腹臍間令人便尿于臍中即活不可用冷水冷之即死如暑極腹痛卒沒死者即移陰處地上掘水孔將人尿撒在內撓起泥水塗臍

救墜死 墜下瘀血衝心欲絕者用豆豉濃煎湯服若便竟氣絕不能言取藥不及急扳開口以熱小便灌之

接命方 或打死或吊死或喉風不醒人事或傷寒重結只用威靈仙一味研水瀘去渣服半盞即吐出痰就活

中毒

人遇事急智盡銜窮或爲人所陷始自服毒或悞中其毒其脉洪大者生微細者死又曰洪大而楚者生微細而數者死

大凡中信毒若于飲食中得者易治酒中得者難治若在胸腹作

楚可吐急用胆凡研木灌之即吐若在腹中可下後用黃丹

甘草 青黛 朴硝 菉豆粉爲末以小藍將水調下腹痛倍

黃丹豆粉并花水調下

解信石毒 治宜錫灰爲末冷水調服一二碗或羊血陰乾水調

服三五錢此方亦医水粉山砒或猪冉尿灌或胆凡爲末凉水

調七厘一服若吐出原藥水信石即愈不吐再服七厘但好後

忌鹽酒及熱物此方治山砒水粉

解山砒毒 治宜燕口青嫩莖葉一大握以手搗爛將甘草爲末

和爲九菘豆煎湯吞下仍用下截根研冷水吃即吐如不退又

用木槿根皮研冷水吃即泄又方冥猪柴根南桐葉研水吃

解水粉毒 治宜肥皂去子搗爛菘豆粉為於如梧子大滾水下

六七箇吐即愈或甘草菘豆粉各錢生明瓦炒為末每水送下

一錢 又方 用黃連研細末再用臘月黑牛胆一個將口填

在碗內將黃連末拌勻復入胆內線縫口透風處陰乾不可見

日遇症急取胆內藥一錢并水調下兼救懸梁赴水氣未絕者

解川烏附子毒心煩燥悶甚則頭岑七朕遍身皆黑勢危必死煎

菘豆或黑豆冷飲或防手甘草煎湯冷服一切藥毒及田蕪物亦宜重要

心間煖者不妨朱子全集云緊急無藥令冬汲新水連飲大嘔吾而愈

解口豆毒 今人大瀉或吐煩渴發熱急用黃連黃柏煎湯冷服

更以冷水浸手足掌忌食熱湯熱性藥物或黃連大豆並藹蒲外

解諸草毒 治慢食毒草并百物毒救人以必死拔藍根四兩貫

衆青黛生甘草各一兩為末蒸餅九梧子大另用青黛為衣如

瘴精神恍惚惡心即是誤中諸毒急取十五大嚼爛新汲水下

解毒方頁 七

如半夏毒以生姜解之

解豆腐毒 過食令人生瘡暖氣 遺精白濁用生蘿七煎湯服或

子煎湯亦可

解諸菌毒 掘新地取真黃土以泠水於日撓之令濁澄少頃取

飲之可解亦治楓木菌食之令人笑不止 又用生芫花為人

每一錢 汲水下以利為度菌之毒者蓋因蛇虫毒氣蒸所致

解諸菰毒 用南桐葉研水吃甘草研水吃芡芝菰研水吃生薑

搗汁一碗吃或絲瓜葉汁服或藜葉搗水服

解鼠莽毒 用大黑豆煮汁服之 如欲拭其驗先刈鼠莽苗葉以

汁澆其根從敗爛不復生發矣

解鷓鴣毒 即孔雀毛并翅也用 干葛為末水調服 食鷓鴣中

毒以糯米泔温服即消

解六畜肉毒 用犀角磨濃汁一碗服之 如食牛馬肉生毒鳥

柘根一兩黃豆 合葱頭一兩 生酒三碗煎服汗出即愈 如

食自死六畜毒 相末一二錢 服不解再服

解河豚魚毒 一時困急殺人急用清油吐出或服槐花末龍腦

末皆可至宝丹尤妙諸魚毒橄欖解之如服河豚子作豚用雷

內糞水灌之或若根水尤妙

解鱉蟹蝮毒 用生豆豉一合新汲水半碗浸汁煩服即愈此

三物令小便閉臍下蔽痛有致死者

解斑蝥毒 其症吐逆不止急用菜豆或烏豆或糯米煎湯服一

方用澤蘭葉搗汁服或乾者為末白湯下

解中金蠶蠱毒 總資中毒宜先呪白丸味茸而不澁次嚼黑豆

不腥者是也 用石榴根皮煎濃汁飲之即吐出活虫無不愈者

解石蟹中毒 紫蘇濃煮汁飲三盃

解中諸物毒 白丸細茶等分為末每三錢新汲水調服得吐即

百病全書卷之六
中黃丸類
効不吐再服或萬病解毒丹九下之

誤吞諸物

誤吞銅鉄磁瓦 萬病解毒丸 大黃 大戟 連喬 寒水石 酪 二 白 玉

簪白芷 黃芩 茯苓 石膏 滑石 天花粉 酪 三 身 草 薄荷 干葛 三 四

山蒸姑 兩 貫衆 一 兩 青黛 鈿 爲 未 棗 豆 粉 糊 爲 丸 彈 子 大 每 服

一 九 薄荷 磨 下 治 一 切 中 毒 能 化 銅 鉄 磁 瓦 同 嚼 化 爲 粉 碎

比 其 驗 也 抑 論 中 毒 之 症 辨 其 破 害 何 物 之 中 審 其 遠 近 久

則 不 救 治 法 上 宜 吐 之 以 鵝 鴿 探 吐 急 以 桐 油 灌 吐 之 下 以 解

毒 丸 靛 漿 利 之 中 毒 手 足 面 青 遇 時 者 不 救 緊 急 只 以 玄 朋 粉

煎 草 利 之 亦 可

誤吞鉄針 用蚕豆煮熟同韭菜汁吞下針與菜從大便而出矣

用孰艾煮汁濃飲便解

誤吞銅錢 不一絀者用砂仁煎濃汁飲之其銅自下或用荸荠

研爛服之其銅自化或用堅炭爲末米飲調服于大便中瀉下
如烏枚狀或桑柴炭細研米飲調下二錢

誤吞金銀等物 飴糖一片漸匕食盡遂出或用石灰一杏核大

硫黃一皂角子大同研末酒調服

誤吞禾芒刺喉 治宜鵝口涎灌之

誤吞蜈蚣一用生猪血令病人吃瀕史生清油灌口中惡心其蜈

蚣衮在血中吐出繼以雄黃末水調服一人醉酒因地蜈蚣入

喉用生雄雞血調冷水灌人立時吐出

誤吞水蛭 人服經久必生小蛭能食人肝血腹痛不可忍面目

黃瘦全不進食若不早治能令人死用田中乾泥一小塊小死

魚三四箇將猪脂溶攪勻用巴豆十枚研爛入泥內爲丸菜豆

大用田中冷水吞下十九小兒三五瀕史大小水蛭一時皆

下却以四物湯加黃芪煎服生血補脾

誤吞田螺 饅嗑不下死在湏臾用鴨乙隻以水灌入口中少頃

將鴨倒懸令吐出涎水與患人服之其螺即化

諸骨鯁

神仙鈎骨丹 徐通府傳 其骨自隨藥帶下或出如神

朱砂一錢丁香一錢血蝎五錢磁石五錢龍骨五錢各共為末黃蠟三錢為丸

朱砂為衣每服一丸香油煎好醋吞下如要吐用矮荷煎好醋

吃後用濃茶任服如無矮荷桐油代之 又方 用人指甲燒

存性吹入喉中立効○一方用礪砂一塊噙之骨自下一方用

金鳳花子研爛噙下無子用根亦可

又治雞魚等骨撞入喉中仙方 用斬蛇劊即是人間園中栽有酒各巒椒葉似莖蒲

大如三指瀾 削些下來臨時搗爛為丸如黃豆大每用溫水

下一丸不再服一丸以下為度甚重者不過十九

汗諸骨鯁神符 但已下字號俱不用勻

只就咬處牙跡上灸之一日灸三壯灸至一百二十日乃止常宜
食炙韭菜永不再發亦良法也

○疥源散 治癩狗咬

班猫七箇去頭翅足為末温酒調服于小便桶內見衣凍似狗
形為効如無再瀆七次無狗形亦不再發後用益元散一兩水
煎服解之忌飲酒食猪肉雞魚油膩百日終身忌食犬肉凡遇
此患依前針洗艾灸更服此藥無不愈者

○扶危散 周景陽 治癩狗咬

盤螿 七日内用七個七日外每日加一個十日十 雄黃射香

个百日百个去頭翅足令淨糯米全炒赤 雄黃射香

一 飲下或從大小便出或吐出毒即愈以傷處去三寸灸之三壯

求不再發

應員製癩狗咬傷神効 用糯米一勺班猫七箇炒出綠烟為慶

去斑猫只用糯為夫以香油九點同調冷水吃以利出毒為度

不利再服若毒入腹中作痛以黃連煎湯雄黃為末調服

如虛兒傳常天傷方 每宜水洗去血用刀刮舊瓶上錫按口上

或萬汁滴咬處或馬全子磨乳刷神効

治狗咬袖法 用徽墨濃磨筆蘸書 吾勅令一尾火虎從此阻

九字念三遍馬三遍干咬處即愈

治蛇咬 宜急用麻繩或頭髮紮七縛在上面莫令毒氣奔上即

勉強飽食隨用雞蛋破些口放咬處引出毒氣其蛋白隨黑若

再不愈又換必至蛋白不黑方止又用土烏蕪葉生搗酒温熱

醉服又用嫩藜葉搗爛酒炆吃以醉為度其渣以貼患處若咬

一二口毒傳經絡用斬艾鋪咬處灸之俟其痛止再無後患

口同生酒 周梅江傳 治毒蛇所傷後死

扛板歸 不拘多少其草四五月生至元月見霜即敗葉 右取研

爛用與生酒調服隨量飲之用渣貼患處立愈治若火

○海上方 治蛇咬

絲瓜根洗淨搗研生酒吃一醉立愈 又方用半边蓮研酒服

治蛇傷神法

進門諗云本師在前祖師在後三元將軍不離

左右豆昌將軍不離前後又化為西天羅漢遂抹頭頓足

二下頓開一十八重地獄一禁蛇頭二禁蛇嘴遂將金鎖訣將

卸畜生金鎖七鎖蛇頭銅鎖上蛇腰將下解云即立西東柱

將水一盆架蛇傷即于上深針蛇咳口边併指了遂念起眼望

西天羅漢獅子在前一閉獅子在前二閉獅子在前三閉獅子

子在兩傍畜生係氣不行我氣先行傳授法度師爺莫誤弟子

悞了弟子山尙可悞了後代無人傳遂將劍訣着力削去毒水

口諗金劍銀劍蛇毒盡不見金削銀削蛇毒遂永滅

治蝎螫 痛不可忍宜用白丸半夏各等分爲末醋調塗之

○神妙凡列前溪傳治蝎螫端午日製忌婦人雞犬

雄黃 蟾酥 胆礬 半夏 各等分 射香 小許

右為末用猫兒草搗汁和為丸用口足痛處令淨用丸葉摺擦

○二神散 周東泉傳 治蝎螫 肥杏仁 葱白 根 已嚼為泥塗處

治蝎螫法 每年除夜左手搜起前裙右手挽三尺長棍向門楣

上敲三下念呪云蝎已螫已不向梁上走却來這裏 螫敲七八

次即已遇有蝎螫以手摩之即不痛可用一年 次年除夜又如

治虎咬 先以清油一碗次用油洗痛處或白丸為末納傷處痛

正立効或用砂糖水調塗併服一二碗或三角楓紅內消忍冬

藤嫩楓葉鴉掌葉嫩松毛 狗脊臭桐葉霹靂葉嫩水燻後洗

治馬 入踏傷人用艾炙合并腫處或用人屎或馬屎燒灰為

末皆可敷之

治鼠咬 猫毛燒灰人射香少許津液調敷或猫糞填咬處

治蠨蛛咬 用雞屎塗之 一方用蜘蛛吸去其毒待蜘蛛醉

死急用以蜘蛛按冷水中免傷其命或野蓼葉久擦或野苜蓿

擦或野雞蘇葉擦或雄黃酒吞內服外敷

治蜘蛛咬 用醋磨炷鐵汁或桑白皮汁塗之亦治蜈蚣咬或香

油燃灯吹滅以余烟燂之或山豆根和醋塗之

治壁虎咬 毒人必死用桑柴燒灰以水煎三四沸瀘濃汁調白

凡未塗傷處兼蛇咬口

治黃蜂螫 用熱油洗之清油抹之亦可或用頭垢敷或用鹽擦

或醋磨雄黃塗之

治入脚虫傷 其虫隱于壁間以屎射人遍身生瘡如湯火傷用

烏雞骨燒灰為末雞子清調城敷

治溪毒 兼避射工夏月出行取知母為末自隨欲人水先取少

許投上流亦取服之 一方用蒼耳子鷄汁服之

治蛇蝎毒 用鷄屎塗之 又方急煎鹽湯洗浸腫處即消或蟬脫四

箇煎水洗再用牡利煨過為末口涎調敷

人咬傷 用龜杖或鱉用燒灰為末用香油調塗

夏月諸般損傷蛆蠅極盛臭惡難當 外用塞水石末敷脚蟬脫青黛

洛五分 蛇退一兩燒 華陰細辛一名五分 共為末每黃酒送下三錢蛆皆

水化而出蠅亦不近其效如神

藏身仙法 水一碗將自己巳生年月用劍馘烙寫入水碗內口念言不

言月不月此是玉皇真口訣後書三字號蓋水碗上 雷譚 雷霹

寫七遍用金脚決蓋上此水碗置家靜處 八病門時口暗念 吾

身不是非九身吾是北方鎮天真武披髮伏劍脚踏龜蛇黑雲點七

蓋吾身神不見吾身鬼不見吾形若見吾形室刀寸斬不留停急如
祖師律令勅念完將祖師馘放下或將真阿魏一塊藏身中或用
雄黃塞鼻中亦可

新刻大醫醫院首效全書六卷終