

沈氏尊生書

沈氏尊生書卷五

雜病源流犀燭

腫脹源流 痘滿

沈金鳌

腫脹脾肺腎三經病也。攷內經，五臟六腑五運六氣，司天在泉。勝復淫鬱，無不成腫脹之病。而張介賓以爲末有不干於脾肺腎三臟者。其意以脾主運化精微，肺主氣行治節，腎主五液而行水。凡五氣所化之液，悉屬於腎。五液所行之氣，悉屬於肺。輸轉二臟，利水生金，悉屬於脾。所以腫脹之生，無不由三者失職。旨哉洞本之論也！然又必先腎氣不足，下氣厥上，三合而成。經曰：厥氣在下，營衛留止，寒氣逆上，真邪相攻，兩氣相搏，乃合爲脹。又曰：五臟陽已竭，又曰：合之于真，三合乃得。夫厥氣在下，此病根也。人身上下，陽布陰生，則肺行而腎納。於何有厥？厥氣在下，則肺不行而腎失納。

矣。至氣已厥，必營衛之流行經絡者，留止無根之陰氣，於是逆上與真氣相搏，寒留而不行，乃合爲脹也。况臟陽卽元運之氣，臟陽竭，諸停而不行可知。其曰合之於真三合，乃得者人之脹，雖由衛逆於營，而旣在血脉，則合經絡，合臟腑，陰陽俱有故。曰三合，乃得特厥氣在下，究爲脹之本耳。故經又以診之。而其脉大堅以濇者，爲脹。蓋大者邪氣盛也。堅者邪氣寔也。兩氣相攻，脹勢已成，故其脉大堅，以厥於陽而寔也。濇者氣血虛而不流利也。是爲陰氣衰，陰氣衰卽真氣衰。此厥於陰而虛也。陰虛陽堅，中氣已損，能勿脹乎？是以濇而堅者，其病在陰，卽脹在臟，經故曰陰爲臟大而堅者。其病在陽，則脹在腑，經故曰陽爲腑。於是脉脹有膿，脹有五臟脹，有六腑脹，而又有水脹，有鼓脹，有蠱脹，有單腹脹，有石水，種種之症，而其爲症，又虛寔不倫。虛中有寔，寔中有虛，行寔當顧虛。

補虛無忘寔。而其要惟大補脾胃以培根本。則得之矣。至于辨驗。
虛寔。莫善于士材其說云。陽症必熱。熱者多寔。陰症必寒。寒者多
虛。先脹于內而後腫於外者爲寔。先腫于外而後脹于內者爲虛。
小便黃赤大便秘結者爲寔。小便清白大便溏泄者爲虛。脈滑數
有力者爲寔。脈浮弦細濶者爲虛。色紅氣粗者爲寔。色瘁聲短者
爲虛。凡寔或六淫外客。或飲食內傷。陽邪急速。其至必暴。每成于
數日之間。凡虛或情志多勞。或酒色過度。日積月累。其來有漸。每
成于經月之後。故治寔易。治虛難。士材之言。當奉以爲則。而于虛
寔。疑似之間。復能察脉審形。辨别毫釐。庶無寔寔虛虛之害。試先
卽脹病條分之。經曰。五臟六腑各有畔界。病各有形狀。營氣循脉
衛氣逆之。爲脉脹。蓋清者爲營。營行脉中。其氣專精。未卽致脹。濁
者爲衛。衛行脉外。其氣慄疾。滑利而行內分。此必由衛氣之逆而

後病及營而爲脉脹也是知凡病脹皆發於衛經又曰衛氣並脉循分爲膚脹蓋衛氣逆而並於脉復循肉分之間故爲膚脹然脹無常所旣脹皮膚卽排臟腑而廓胸膈凡膻中心主之宮城脾之太倉咽喉小腸之傳送胃之五竅閭里門戶廉泉玉英之津道應無不受脹者又曰心脹者短氣煩心卧不安肺脹者虛滿而喘咳肝脹者脇下滿而痛引少腹脾脹者善噦四肢煩冤體重不能勝衣卧不安腎脹者腹滿引背央央然腰髀痛胃脹者腹滿胃腕痛鼻聞焦臭妨于食大便難大腸脹者腸鳴濯濯而痛冬日重感于寒則飧泄不化小腸脹者少腹填脹引腰而痛膀胱脹者少腹滿而氣癃三焦脹者氣滿于皮膚中輕輕而不堅胆脹者脇下痛脹口中苦善太息以上經言臟腑之脹總以治脹藥爲主

宜藿香正氣散升麻白芷

木香調氣散蘇子湯等

各加引經之劑療之

心黃連細辛肺桔梗升麻白芷柴胡川芎青皮吳萸脾升麻

蒼朮葛根白芍。腎獨活知母細辛肉桂。胃芷升麻葛根石膏大
腸白芷升麻黃芩石膏小陽黃柏藁本赤芍木通膀胱滑石羌活
三焦柴胡連翹下焦地骨皮。膽柴胡青皮連翹方爲正治。經又曰。膚膿者。寒氣客於皮膚。
之間。慄慄然不堅。腹大。身盡腫。皮厚。按其股脣而不起。腹色不變。

此其候也。蓋以寒客皮膚間。陽氣不行。病在氣分。故有聲若鼓。氣無形。故不堅。氣無不至。故腹大。身盡腫。凡腫因水。則皮澤而薄。因氣。故皮厚。氣在膚腠。故按散之。猝不起。腹皮厚。故色不變。此膚膿乃氣病也。枳术丸宜加味。前文言膚膿。以脹必見於膚。乃總言致脹之由。

此則專爲一症也。經又曰。鼓脹者。腹脹。身皆大大與膚膿等。色蒼黃。腹筋起。此其候也。此鼓脹亦氣分病。故與膚膿相似。惟腹有筋起。爲異。但膚膿病。根在肺。鼓脹病。根在脾。由脾陰受傷。胃雖納穀。脾不運化。或由怒氣傷肝。漸蝕其脾。脾虛之極。故陰陽不交。清濁相混。隧道不通。鬱而爲熱。熱留爲濕。濕熱相生。故其腹脹大中空。

無物外皮繃急旦食不能暮食也。但臍突出肚見青筋皮光如油皆不治。脉亦喜浮大忌虛小。蓋鼓有土敗木賊之象。濕熱相兼。猶饅頭得火與湯乃發胖。治者先令却鹽味厚衣衾斷妄想禁忿怒以調和氣血藥必大補脾土養肺金使金能制木脾無賊邪之害。

宜調中健脾丸更審虛寢權輕重辨其所因而以蘇梗厚樸木通陳皮柴

胡白芍大腹皮延胡索爲主寒加熱熱加寒虛加補皆製爲大劑。

服數十貼亦有生者久服藥忽手足腫病爲自內達外不久愈若

自手足腫至腹病爲從外入內難治其或朝寬暮急或朝急暮寬

或先脹後喘宜治脾二陳湯或先喘後脹宜治肺寧肺湯雖多分別大法不外乎

此曷言乎辨其所因也蓋同屬鼓脹有因六氣而成者宜藿香正氣散有

因七情而成者宜沉香降氣散有因飲食傷而成者必嘔吐嗳噫而脹

宜砂調中丸有因畜血而成者必青紫筋見小便仍利宜代抵當湯有因憂思

太過而成者必二便不利。脈虛濇。腸鳴而脹。宜蘇子湯有因血熱而脹者。必喘燥虛汗。肢厥溲赤尿黑而脹。宜人參有因氣爲痰所隔而脹者。必心下堅滿而脹。宜枳壳散有因積聚痞塞而成者。必膈滿嘔吐口苦吞酸而脹。宜枳木湯有因氣爲痰所隔而脹者。必多虛羸狀而脹。宜六湯有因老人虛寒而成者。必氣弱惡寒不善食而脹。宜先服香朴養榮湯或二方參用有因婦人產後敗血入胞而成者。必胞不下而脹。血消卽下。宜奪命丹其或素虛弱或過服峻劑而患鼓症必補之。宜胡服金匱晚服補中或壯寢人而患鼓症不妨攻之。宜先服五脾散二劑益氣湯。再按法服石幹散。諸鼓脹之因如此至如蠶脹又是一症不得混蠶爲鼓乃由脾胃家濕熱積滯或內傷瘀血而成。蓋人之腹中雖長或寸白皆賴以消宿食然太多卽爲病。况如白蟄三戶食肛應聲赤九種腸痙瘞癆瘕等症爲類不一皆能使心腹作痛而脹甚則面青口涎治以

補脾健胃爲主。兼用消導。其或因跌撲閃挫。負重努力。致血瘀於

內而成脹痛。亦以補脾健胃爲主。兼用去瘀生新之品。宜參用土材新製。陰陽攻積丸。

宜用參木健脾丸。蓋所謂蠱者。若虫侵蝕。有蠭壞之義。而蠭與鼓之脉。

亦相反。蠭脉必寔。鼓脉必浮。蠭與鼓之形。更相異。蠭之脹。以手按

腹隨手而起。以其爲血之積。而寔也。鼓之脹。以手按腹。凹而不

起。以其爲氣而虛也。二者皆非輕病。此外更有脹滿之病。雖亦腹

脹。却不至腫。不如鼓脹之生死相關。或因傷食。消導可已。宜香砂調中丸。

或因氣滯。行氣卽痊。宜木香順氣散。有久有暫。寔者峻下之。宜承氣湯。上鬱則

奪之也。畜血者。用破血藥。宜桃仁。病後氣虛作脹。惟補益元氣。宜

中益氣湯。使元氣歸元卽愈。又有單腹脹。卽俗名蜘蛛鼓。其症四肢不

腫。但腹脹。其原皆由脾氣虛而傷風與食。宜健脾丸。至若腹脹經久。

忽瀉數升。日夜不止。服藥不效。爲氣脫最難救治。惟濃煎益智仁。

湯服之立愈。且夫脹與腫。內因則各殊。而外形多相似。要有其易辨者。如先腹大。後四肢腫。爲脹病。先頭足腫。後腹大。是水也。但腹腫。四肢竟不腫。爲脹病。脅腹四肢悉腫。是水也。皮厚色蒼。或一身皆腫。或自上而下。爲脹病。皮薄色白。或自下而上。是水也。至若脹病。有腫。有不腫。脹病有脹。有不脹。皆當分辨。茲更卽腫病而條分之。腫不一。而爲害莫有大於水腫者。經曰。水始起也。目窠上微腫。如新起之狀。其頸脉動。時咳。陰股間寒。足胫腫。腹乃大。其水已成矣。以手按其腹。隨手而起。如裹水之狀。此其候也。頸脉者。足陽明人迎。陽明胃脈自人迎下循腹裏。水邪乘之。故頸脉動。水之標在肺。故時咳。陰邪結。陰分。故陰股間寒也。又曰。三陰結。謂之水。三陰者。太陰脾也。太陰爲六經之主。三陰邪結。則坤土不能運精。如是而二陰腎獨主裏。而氣更盛。反來侮土。故氣盛陽不得入。陽不得

入則肺氣不得通調。斯寒水不行而壅。故成水腫之病。蓋中州結。則氣壅。而關門不利。不利。則水聚而從其類。類者。本在腎。標在肺也。此言腎與肺之水。因脾虛而類聚者。又曰。肺移寒于腎。謂之涌水。涌水者。水氣客於大腸。如囊裹漿者。形寒飲冷。肺氣不足。則肺寒。母病傳子。則寒可移于腎。腎本寒水。以寒濟寒。故水氣不升。而爲涌。涌不於腎。而於大腸。大腸爲肺下流。故如囊裹。不能散也。此言肺腎之寒之水。相移而由臟歸腑者。以上皆致水之原也。由是觀之。水之爲病。有不由脾土虛弱。不能制水。水逆上行。干及于肺。滲透經絡。流注谿谷。灌入隧道。血亦因而化水精。亦因而化水者乎。顧嘗反覆究之。水雖制于脾。寔主於腎。腎水臟也。元氣寓焉。若土陽虛。則命門火衰。既不能自制陰寒。又不能溫養脾土。陰陽不得其正。則化而爲邪。蓋氣卽火陰。卽水陽。旺則化。而精能爲氣。陽。

衰則不能化而水卽爲邪也。夫水盛水虧則病燥水盛火虧則病濕故火不能化則陰不從陽而精氣亦皆化爲水所以水腫又未有不由於陽虛。腎爲胃關不惟腎氣不化而閉卽胃亦能令關閉故水之聚不待腎水後成卽所飲湯水亦聚而爲患蓋胃主中焦爲水穀之海。胃和則升降出納之氣行。水穀從其道而輸泄。胃不和則出納之關滯。水穀之液皆積而成水故經言胃所生病大腹水腫膝膿腫痛。又言五穀精液因陰陽不和則并于腸胃中留於下焦不得沁入膀胱則下焦水溢而爲水脹。又言腎者牝臟勇而勞甚則腎汗出遇于風內不得入臟腑外不得越皮膚客于元府行于皮裏傳于跗踵本之于腎名曰風水所以水腫又未有不由于胃虛經又曰肝腎脉并浮爲風水蓋肝腎同居下焦腎爲陰主靜脈常沉肝爲陽主動脈常浮二臟俱有相火動于腎者猶龍火

出于海動于肝者猶雷火出于澤龍起而火隨風發而水隨今水從風是以腎與肝並浮猶言腎脉本沉因從肝化而與之俱浮也所以水腫又未有不由乎肝盛經又曰三焦爲決瀆之官水道出焉者氣化也氣卽是火三焦病氣滿小腹光堅不得小便溢則水流作脹以火衰則水勝也所以水腫又未有不由乎三焦病夫既明其水之所由來當必稔乎水之所由治其一爲水腫之常法腫在腰以上者宜發汗卽經所謂開鬼門也鬼門卽腠理宜麻黃羌活防風柴胡牛蒡子葱白忍冬藤以開之

或用柳枝煎湯洗腫在腰以下者宜利小便卽經所謂潔淨府也

淨府卽膀胱宜澤鴻木通香茹甘草燈心冬葵子蜀葵子葶苈防已昆布海藻海金沙赤小豆茯苓猪苓青蛙海蛤白螺鯉魚鯽魚白魚鱸魚綠頭鴨秋石代鹽以潔清之

上下分消使陰陽平治水氣可去卽經所謂去菀陳莝是也菀者積也陳者久也莝者腐也宜甘遂芫花大戟牽牛子續隨子同大麥麴作麵食或商陸全赤粳米作飯日食大效或郁李仁酒服七七粒或末之和麵作餌食或老絲瓜巴豆拌炒又同陳粳米炒去巴豆先服然皆治

其標而已。尤當理氣養脾以治其本。治參術使脾氣寔而健運則

健脾丸

使脾氣寔而健運則

水自行故宜以參术爲君更視水之所屬或爲陰或爲陽加減治之。蓋病水者脾必虛故必健脾爲主也。其一治水腫太甚者權宜之法大抵水腫多由肝盛脾弱之人肝盛則觸怒益脹而干于脾脾弱則食傷不化而生濕濕鬱甚則化爲水。上至頭下至足中滿身之前後浮腫如匏寒冷如石行坐卧起不安本宜專利小水以除其腫但腫勢太甚內而膀胱外而陰囊相連緊急道路阻塞卽欲利小便苦無一綫之通惟宜權開大便以逐水隨下而隨補水宜硝黃等補水宜參术等漸漸調理可痊若腫不極甚只宜利小水以治標養脾胃以治本而水有陰陽之別陽水多外因或涉水冒雨或感風寒暑濕其腫先現上體其脉沉數其症兼發熱煩渴溲赤便秘輕則四磨湯五苓散重則疏鑿飲子陰水多內因因飲水及茶酒饑飽勞役房勞其腫

先現下體。其脉沉遲。其症兼身涼不渴。溲清便利或溏。宜寢脾飲或小

便照常時。赤時不赤。晚則微赤。却不濇。亦屬陰也。

宜先用木香香附烏藥茯苓猪苓等次進

復元丹。未可驟補。宜分次第治之。有一身惟面與足腫。早則面甚晚則足甚。面腫爲風。宜白蒺藜益母草杏仁葶苈附麻黃赤小豆等或敗荷葉同藁本煎湯洗或杏葉葱白楠木桐木煎洗

防風昆布甘遂郁李仁足腫爲水。宜防

更須察二便通秘。別其陰陽。

即用前文陽水之藥水之脹腫又有內外之別。先脹于內後腫于外

者。小便赤濇。大便秘結。色澤紅亮。聲音高爽。脉滑數而有力。寢熱。

也宜以治脾爲主。宜木香沉香砂仁枳壳厚朴蒼朮大腹皮兼理肺。宜桑皮葶苈蔻仁桔梗蘇子陳皮

專利小便。宜木通通草茯苓防己車前子澤瀉猪苓或發汗。宜麻黃防風羌活川芎桂枝如氣壯

年少新病者。必瀉其寢熱。硝黃亦可酌用先腫于外後脹于內者。小便淡

黃。大便不寢。氣色枯白。語音低怯。脉微細而無力。虛寒也。宜以補

脾爲主。宜陳皮白术。兼補肺理氣。補肺宜人參黃芪桔梗苡仁理茯苓甘草。氣宜沉香木香陳香擦佛手

專利小便宜五苓散或發汗。宜升麻柴胡。如虛甚多寒。必須大劑頻投方可。

救援。

宜多用參术卽桂附乾姜吳茱萸亦可選用

古人以金匱腎氣丸治水。誠爲切要。

至其他藥品有與本病相關者。亦須研核其所以然。如白芍能于

土中瀉木。忍冬簾能和緩下氣。木瓜赤豆利水。下氣交長。片腦雄

鷄金溫中與寬膨並用。牙皂灰燒灰存性。神曲爲丸。取利甚捷。鷄

屎白炒熟袋盛。浸酒空心飲。下水大奇。青蛙入猪肚烹爲饌。皆奇

方立效。水之脹腫。在女科。又有氣分血分之別。先病水脹。經水後

斷。因而心脅堅大。病發于上者。屬氣分。宜木香調氣散經水先斷。後病水

脹。因而血結胞門。病發于下者。屬血分。宜代抵當湯而又有上半身脹

太甚者。宜羌活防風升麻白芷蘇葉有下半身脹太甚者。宜五苓散加蒼朮木通有脹而

心腹堅脹喘滿者。宜當歸散有頭身俱腫。腹前脹疼者。宜桃丸有腫而不

能食。不能卧。小便秘者。宜白朮木香散有大病後腫。明屬脾虛。不能通調

水道者。宜補中益氣。有腎水不足。虛火燦金。小便不生而患腫者。

急補之。宜補中益氣湯。六味丸互用。久服自效。投金

匱腎氣丸。有血熱生瘡變爲腫病。煩渴小便少者。經曰。純陽者腫

尚可救。九味丸。有血熱生瘡變爲腫病。煩渴小便少者。經曰。純陽者腫

四肢。此熱症也。如便閉。更須和氣。宜消風敗毒散。有遍身水腫。喘滿。小便

閉滯。諸藥不效者。宜導水茯苓湯。有腫而因于風者。宜黃芪。

寒者。宜中滿分消湯。有腫而因于熱者。宜中滿分消丸。有寒有腫而

因于濕者。宜二岐散。如虛宜間服加味。胃苓散。此二方百發百中。無不效。有孕婦遍身浮腫。腹脹

滿。小便不利者。宜防己湯。有產後腫滿。喘息而渴。小便不利者。宜

調經。凡此皆水病之支分派委所可溯流以窮源者也。吾因舉水

之發源于五臟者而分言之。大凡水腫必有目胞上下浮肿。肢體

沉重。咳嗽怔忡。腰間清冷。小便黃滯。皮膚光亮諸狀。今若心水病。

必兼身重。少氣不得卧。煩而躁。其陰必大腫。肝水病必腹大不能

轉側脇腹痛。時時津液生。小便續連。肺水病。必身腫。小便難。時鴨
溏。脾水病。必腹大。四肢重。津液不生。少氣。小便難。腎水病。必腹大。
臍腫。腰痛。不得卧。陰下濕。足逆冷。而黃瘦。大便反堅。皆當審形辨
脈。知其水從何經而來。于治水藥中。各加引經之品。以開導之。各
經藥已。五臟之外。又有九種水。其根緣症狀治法。有可一一明之。
詳在前五臟之外。又有九種水。其根緣症狀治法。有可一一明之。
者。一曰青水。先從兩脇腫。起根在肝。主治宜大戟二曰赤水。先從舌根
腫。起根在心。主治莖蘚三曰黃水。先從腰腹腫。起根在脾。主治甘遂四曰白
水。先從足腫。起根在肺。主治桑皮五曰黑水。先從陰上腫。起根在外腎。主治芫花七曰風水。先從四肢
連六曰元水。先從面頰腫。起根在外腎。主治芫花八曰高水。先從少腹腫。起根在小腸。主治巴霜九
曰氣水。或盛或衰。根在三焦。主治赤小豆右九種藥等分配合
主治某經者倍之。蜜丸赤茯苓湯下。三丸日三服。忌鹽。凡患水腫者。皆自此推之。可知其所從來而治。

二三十日自愈

脾

腫脹

卷五

九

之不差矣。大約水腫之病。唇黑傷肝。缺盆平傷心。臍突傷脾。背平傷肺。足心平傷腎。五傷者必死。不可不知之也。血腫一症。尤爲奇害。其爲狀。四肢浮腫。皮肉間必有紅痕赤縷。皆由血溢離經。留滯于中。與水濕相化。因變爲水也。宜調榮飲或酌用代抵當湯而產婦敗血留滯以致化水。亦能成腫。必四肢浮。面皮黃。宜小調經散不論婦人女子。經水爲患。亦能化水。四肢腫。小便不通。此血不歸經之故。宜椒目丸三者皆不易治。皆水腫病之類也。石水一症。內經雖有其名。却無明文。然本章雖未詳言。而陰陽別論篇曰。陰陽結邪。多陰少陽。曰石水。少腹腫。以旣見于陰陽篇。故不必重出也。並非闕文。其理自可互參。邪應作斜。陽結腫四肢。是在陽之發處。陰結便血。是在陰之聚處。今邪交入陰陽。而交結之勢。必結于陰陽之所共生處矣。生陰惟腎。生陽惟膽。皆根原下焦。而腎職行水。胆職沁水。若兩家交壅。

正所謂不能通調水道也。然陰多陽少，則腎病爲多。腎病則陰之真水沉寒，而無陽以化氣。此病固不在膀胱而在腎。腎旣留水，不能化精，故石堅一處，惟見少腹而不及他所也。水壅一症，因水毒之氣結聚于內，遂令其腹漸大，動搖有聲，常欲飲水，皮膚粗惡，其原多因他病久而變成，蓋亦有蠱敗之義焉。故亦名蠱。其爲症治，有可指陳者。或因雨濕而浮腫。宜平胃散加白术赤苓草蔻仁或飲水過多而浮腫。宜胃苓湯或久喘後積水氣而浮腫。宜葶苈丸或久瘧變水氣而浮腫。宜黃連丸或久瘧變水氣而浮腫。宜補中益氣湯加附子此等皆水症之別也。而水症之外，又有結陽症。內經曰：結陽者，腫四肢。註曰：素嘗氣疾，濕熱加之，氣燭熱，故爲腫也。邪氣漸甚，正氣漸微，陽氣衰少，致邪伐正，氣不能宣通，故四維發腫。諸陽受氣於四維也。今人見手足關節腫痛，槩以爲風症治者，誤矣。宜犀角湯嗟乎，脹腫之爲患，重且大如此。

倘忽視之。不幾委人命於草莽乎。業師孫慶曾先生嘗謂余曰。脹腫門。惟水病難治。其人必真火衰微。不能化生脾土。故水無所攝。泛溢于肌內間。法惟助脾扶火。足以概之。而助脾扶火之劑。最妙是五苓散。肉桂以益火。火煖則水流。白朮以補土。土寔則水自障。茯苓。猪苓。澤鴻以引水。則水自滲洩而可不爲患。每見先生治人水病。無不用五苓散加減。無不應手而愈。如響應者。可見無人不知。五苓散而不能用。治水病以致決潰而死者。皆未明病之根源。方之奧妙。而尊之信之。加減以收功也。然其加減。則必有神明。乎藥物之性。洞悉乎病根所在者。而後所加所減。悉與原方配合。悉與本病無乖。故可投之立效。否亦無益也。

脉法。內經曰。其脉大堅以濇者。脹也。又曰。脉盛而緊曰脹。脉訣曰。脹滿脉絃。脾制于肝。洪數熱脹。遲弱陰寒。浮爲虛滿。緊

則中寔浮則可治虛則危急。得效曰、關上脈虛則內脹遲而

滑者脹虛而緊濶者脹或弦而遲或浮而數皆脹也。又曰諸氣

脹滿浮大可治虛小難治此係脹滿之脉

脈法

仲景曰

脈得諸沉當責有水身體腫重

脈經曰水病

脈大者可治微細者不可治水病腹大如鼓寔者生虛者死

東垣曰水氣得沉脈則逆比陰脈也

得效曰水氣浮大則宜

沉細則愈而復作又曰上氣浮腫浮滑可安微細難治

正傳

曰水腫脈多沉伏又曰病陽水兼陽症脈必沉數病陰水兼陰

症脈必沉遲

三因曰陽虛陰寔爲水必矣

此係浮腫之脉

脹滿爲真臟病

丹溪曰脹滿由脾虛之極乃真臟病

如反胃

癆瘵亦皆真臟受病

凡人真臟不病則五行相生相制以適于

平雖不服藥而自愈如火極傷金有水以制之有土以生之之

脈

腫脹

類所謂亢則承。害乃制也。雖然亦有惡藥忌醫而悞之者。蓋正氣與病邪不兩立。一勝則一負。久則病劇。正脫而不免於死。然則有病不服藥可乎。不延醫可乎。

脹滿症治 內經曰飲食不節起居不時者陰受之。陰受之則入五臟。入五臟則填滿閉塞。又曰腹滿填脹。支膈胠胸。下厥上胃。過在足太陰陽明。又曰脹者皆在于臟腑之外。排臟腑。廓胸脇。脹皮膚。故命名脹。 內經註曰寒氣在上聚而不散。則成脹。 脈經曰胃中寒則脹滿。 仲景曰腹滿按之痛者爲實。不痛者爲虛。又曰腹脹時減復如故。此爲寒宜溫之。又曰脹滿不減。減不足言。須當利之。 入門曰凡脹初起是氣久則成水。治比水腫更難。蓋水腫飲食如常。鼓脹飲食不及。每病根深病必三五年而後成治。腫補中行濕足矣。治脹必補中行濕兼以消導。

更斷醫音樂妄想不責速效乃可萬全。又曰：脹有虛實虛脹陰寒爲邪。吐利不食時脹時減按之則陷而軟。寔脹陽熱爲邪身熱咽乾。常脹內痛按之不陷而硬。醫鑒曰：中滿腹脹者其面目四肢不腫而肚腹脹起中空似鼓者是也。本事曰：臍腹四肢悉腫者爲水。但腹脹四肢不甚腫者爲虛脹卽脹也。回春曰：脹病亦謂鼓脹。其脇痛面黑是氣鼓。脇滿少腹滿身上有血絲縷是血鼓。嗳氣作酸飽悶脹腹是食鼓。惡寒手足厥冷瀉水是水鼓。胸腹脹滿有塊如鼓者是痞散成鼓。

脹病有七 醫旨曰：一曰寒脹。腹滿濡時減吐利厥冷宜溫之。二曰熱脹。以陽并陰則陽寔陰虛。陽盛生外熱陰虛生內熱脉必浮數。浮爲虛數爲寔。陰虛不能宣導飲食如故腹中脹滿者爲寔脹。三曰穀脹。卽食脹失餓傷飽。痞悶停酸朝則陰消陽長

穀氣易行故能食暮則陰長陽消穀氣難化故不能食是爲穀
脹四曰水脹脾主水濕水浸腸胃而溢皮膚瀝瀉有聲怔忡喘
息者是五曰氣脹七情鬱結氣道壅塞上不得降下不得升身
體腫大四肢瘦削六曰血脹煩躁漱水迷忘驚狂痛悶嘔逆小
便多大便黑婦人多有之七曰蠱脹但腹脹而四肢頭面不腫
是也而此症之類又有名蜘蛛蠱脹者單腹腫大四肢極瘦皆
由脾氣虛極真臟已傷病也古方雖有諸蠱保命丹用肉蔻容
三兩紅棗青礬各一斤入罐內煅烟盡爲末再將香附一斤便
製麥芽一斤半炒爲末和前末糊丸食後酒下二三十丸以治
之者然爲死症未必盡效也

脹滿不治症靈樞曰腹脹身熱脉大一逆也腹鳴而滿四肢
清泄脉大二逆也腹大脹四末清脫形泄甚三逆也腹脹便血

四逆也。並不治。得效曰腹脹未久。或脹或消。腹皮稍軟。不泄。不喘。此則隨治隨差。若臍心突起。利後腹脹急。久病羸乏。喘息不得安。名曰脾腎俱敗。不治。又曰腹滿欬逆。不得小便。不治。腹大滿而下泄不治。綱目曰。腹滿或兼身熱。或兼如瘧。皆不治。直指曰。久病羸乏。卒然腹滿。喘息不得。與夫臍心突起。或下利頻頻。未見一愈者矣。

浮腫徵兆。內經曰。諸有水氣者。微腫先見于目下。以水者陰也。目下亦陰也。腹者。至陰之所居。故水在腹也。必使目下先腫也。鰲按。如男子陰囊。女人陰戶。兩傍亦必先微腫。又曰。腰脊者。身之大關節也。腋脰者。人之管以趨翔也。莖垂者。身中之機。陰精之候。津液之道也。故飲食不節。喜怒不時。津液內溢。乃下流于睾。血道不通。日夜不休。俛仰不便。趨翔不能。此病榮然有水也。

浮腫形症。內經曰水病下爲骭腫大腹上爲喘呼不得卧者。標本俱病故肺爲喘呼腎爲水腫肺爲逆不得卧。又曰濕勝則濡泄甚則水閉跗腫。仲景曰水病有五種一風水其脈自浮外症骨節疼痛惡風二皮水脈亦浮外症跗腫按之沒指不惡風其腹如鼓不渴當發其汗三正水脈沉遲外症自喘胸石水脈沉外症腹滿不喘五黃汗脈沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必生癰膿又曰久則肌肉潰爛陰囊足腫水出一直指曰其狀目胞上下微腫如裹水通身浮腫喘咳怔忡腰闊清涼小便濁黃皮薄而光手按成窟舉手卽滿此浮腫也。

浮腫可治不治症。人門曰凡浮腫陰囊軟者可治又曰男從脚下腫而上女從頭上腫而下皆爲逆不治得效曰浮腫善症男從上而下女從下而上所患未久旋利腫退喘定則愈矣。

又曰。凡水腫大喘氣粗不食乃腎水盈溢上行旁侵於肺也不治。直指曰。大凡腫病先起于腹而後散于四肢可治。先起于四肢而後入于腹不治。又曰。蠱脹而肚上有青筋或腹滿而大便滑泄或久瘧而變作虛浮與夫肝傷而唇黑心傷而缺盆平脾傷而臍突腎傷而足心平肺傷而背平皆不治之症。又曰卒唇腫而蒼黑者死掌腫無紋者死臍腫凸出者死陰囊陰莖俱腫者死。脉絕口張足脹者死足跗腫脹如斗者死。

水腫禁忌。人門曰。凡水腫極忌甘藥助濕作濁。本草曰。病嗽及水全宜忌鹽。

胸腹脹悶導引。保生秘要曰。雙手交叉低頭觀臍以兩手貼胸口將身往下不論數推拂能寬胸脹止腹疼兼後功效。運功。保生秘要曰。先定歸元後行斡旋至胸前搜撤散法左

右分開如未通暢。以艮背佐之。無不效矣。

臍脹導引 保生秘要曰。坐定擦手足心極熱。用大指節仍擦摩迎香二穴。以暢肺氣。靜定閉息存神半晌。次擦手心摩運臍輪。按四時吐故納新。從玄雍竅轉下至丹田。捫氣面撮穀道。緊尾閭。提升泥丸。下降官復氣海。週天一度。如此七七。身心放下。半炷香許。如久病難坐。用得力人扶背。慎勿早睡。恐氣脉凝滯。神魂參錯。效難應期。手足可令人摩擦。患輕者一七能取大效。重則二七三七五臍盡消。屢屢取驗。妙入神也。

運功 保生秘要曰。反瞳守歸元。念四字訣。定後斡旋。推入大腸曲行。提回抱守。能清鼓脹。氣脹加推散四肢。時吐濁吸清。飲食宜少。降氣安心。而食自然加。或病酒過用湯水而成。宜通其二便。摩臍輪督輪二穴。吹噓其氣。或開腠理。以洩微汗。其

脹自效。血脹加運血海效。

痞滿脾病也。本由脾氣虛及氣鬱不能運行。心下痞塞填滿。故有中氣不足不能運化而成者。有食積而成者。有痰結而成者。有濕熱太甚而成者。虛則補其中氣。宜調中益氣湯。寔則消食。宜資生丸。豁痰宜導痰湯。除濕。宜二陳湯加苓澤鴻。有濕熱清熱。宜當歸拈痛湯。而消導之。亦不可用峻劑。致傷元氣又有傷寒下早。因而成痞結胸。則從傷寒門治之。夫痞與脹不同。痞則內雖覺其痞悶。而外無脹急之形。痞祇見於胸膈。與脹不同。脹則連腹少腹都急也。

脉法 仲景曰。凡痞關脈須沉。若關脉沉者。三黃瀉心湯。

痞滿症治 仲景曰。心下滿而不痛。此爲痞。陶節菴曰。胸滿者。胸膈間氣塞滿悶也。非心下滿。脹滿者。脇肋下氣墳脹滿也。非腹中滿。蓋邪自表傳裏。必先胸脇以至心腹入胃。是以胸滿。

多帶表症宜發汗惟脇滿多帶半表半裏小柴胡湯加枳實和之。

治脹腫方五十七

藿香止氣散

主治
茯苓

藿香

紫蘇

白芷

厚朴

桔梗

心

木香調氣飲

又
甘草

白蔻仁

木香

藿香

砂仁

甘草

蘇子湯

又
木香

大腹皮

蘇子

草果

半夏

厚朴

甘草

陳皮

木通

白术

枳實

人參

加味枳朮丸

膚脹
桔梗

枳壳

內桂

紫蘇

陳皮

橘榔

調中健脾丸

鼓脹
白朮

人參

蒼朮

黃芪

吳萸

茯苓

苡仁

沉香

陳皮

半夏

香附

查內

菔子

黃連

白芍

蘇子

澤鴻

草蔻

荷葉

腹皮湯
打黃米粉

五加皮

全瓜萎

川椒

礀

荷葉

此方分量合法詳後瘡滿方內查之可也

二陳湯

脹喘

茯苓

陳皮

半夏

甘草

寧肺湯

喘脹

黃芩

桑皮

貝母

花粉

杏仁

沉香降氣散

七情加鹽

知母天冬

沙參

枇杷葉

沉香

香附

烏藥

砂仁

甘草

香砂調中湯

食傷加鹽

霍香

砂仁

茯苓

蒼朮

半夏

代抵當湯

畜血生地

桃仁

蓬术

大黃

芒硝

當歸

人參芎歸湯

血熱砂仁

人參

內桂

烏藥

蓬术

木香

五靈脂

炙草

川芎

當歸

半夏

蘇葉

枳壳散

氣痞內桂

三稜

蓬术

枳壳

陳皮

枳榔

厚朴乾姜

厚朴乾姜

青皮

甘草

木香

肉蔻

益智仁

六君子湯

瀉虛半夏

人参

茯苓

白术

炙草

陳皮

香朴丸

老人

厚朴二錢

附子七分

木香三分

人參養榮湯

又當歸白朮

人參熟地

黃芪陳皮

炙草茯苓

白芍遠志

五味子

奪命丹

血敗丹皮

乾漆炒烟盡

大黃各一錢

金匱腎氣丸

附子五分懊藥澤瀉

熟地山藥

丹皮茯苓

補中益氣湯

附子三錢甘草

肉桂黃芪

牛膝當歸

五痔湯

附子細辛柴胡

山藥升麻

丹皮車前

石幹散

附子錢石幹

梔榔黑丑頭末

海金沙各一

共爲末先服五痔湯二帖後以葱白湯空心送此未一錢隔日再服輕者二服重亦不過三

服愈後服健脾藥忌食鹽醬量腥

參术健脾丸

靈脈白芍人參

炙草大棗

白朮陳皮茯苓當歸

陰陽攻積丸

又胡索吳萸

乾姜官桂川烏各一兩

半夏橘紅茯苓梔榔

黃連人參沉香

菖蒲巴霜另研五錢琥珀

枳實人參沉香

巴霜另研五錢琥珀

桔梗各八錢皂角六兩煎

汗泛丸每服八分漸加至一錢半姜湯下

木香順氣散

氣滯
藿香

丁香
炙甘草各

八兩
砂仁四兩

每服二

錢滾湯入鹽少許

下

承氣湯

寃脹
氣湯去芒硝名小承氣湯

大黃
芒硝

厚朴
桃仁

枳實
肉桂

此大承

桃仁承氣湯

畜血
大黃

芒硝
芒硝

厚朴
桃仁

枳實
甘草

下

四磨湯

陽水

五苓散

下腫
陽水

肉桂
白术

茯苓
猪苓

澤瀉
澤瀉

疏鑿飲子

秦艽
陰水

澤瀉
枳榔

商陸
茯苓皮

羌活
大腹皮

椒目
赤小豆

寃脾飲

草果
附子二兩

厚朴
乾姜

澤瀉
白术

白术
木瓜

赤小豆
附子

木香
橘紅

吳萸
肉桂各一兩

厚朴
枳榔各五錢

復元丹

芍藥
獨活

澤瀉二兩
附子二兩

白术
白术

木香
橘紅

吳萸
肉桂各一兩

厚朴
枳榔各五錢

當歸散

心腹堅
芩

丹皮
赤芍

當歸
丹皮

肉桂心
陳皮

木香
白术

木通
枳榔

赤

蟠桃丸

身腫
琥珀

沉香

木香

沒藥

乳香各三錢

黑丑頭末

橘榔一錢

牙皂
半半

汗浸半日半用生半

生半培熟八分

生半培熟

皂角汁浸培熟

皂角水下神效

橘榔二錢

砂糖湯下神效

白术木香散

不治

白术

枳榔

赤苓

猪苓

澤瀉各

官桂七分

桂石三錢

陳皮各一錢

滑石

三錢

陳皮

八分

加姜

六味丸

病後

熟地

山萸

山藥

丹皮

茯苓

消風敗毒散

血熱

導水茯苓湯

諸藥不效

赤苓

麥冬

澤瀉

白术各二

兩

桑皮

紫蘇

枳榔

木瓜各一兩

大

腹皮

陳皮

砂仁

木香各七錢半

共爲

粗末

每五錢加

燈草

七根

煎連進

三服

小水自利

因風

黃芪

防已

白术

甘草

姜

棗

中滿分消湯

因寒

黃芪

吳萸

厚朴

草寇

黃柏各

三分

半夏

茯苓

五分

人參

青皮

當歸

升麻

益智仁

三分

柴胡

草澄

茄

澤瀉

生姜

乾姜

麻黃

柴胡

草澄

川

烏

中滿分消丸

因熱
炙草

黃芩

黃連

姜黃

白朮

人參

神芎導水丸

丸每百丸

黑丑頭末

滑石

川芎

薄荷

黃連

黃芩

枳實

知母

澤瀉

厚朴

陳皮

砂仁

半夏

二蛟散

將硝鍋內鎔化

三年老黃米炒

乾爲未和米研細

芒硝各三兩

大人服三

錢小兒一錢半黑糖調服至午便

一次晚再便

一次病久虛者間服

加味胃苓丸

加味胃苓丸

因虛

藿香

白术

白芍

陳皮

茯苓

人參

防已湯

不過五服

甘草

女人加香附

本方總加姜燈心至重

此二方百發百中無不愈者

孕婦

防已

桑皮

赤苓

紫蘇

木香

葶藶散

大黑豆五錢

茯苓三錢三分

西柏

白朮

當歸

白芷

梔榔

大調經散

產婦三分半

每末三錢

紫蘇湯下日三服

血腫

蓬术

川芎

當歸

白朮

西柏

調榮飲

陳皮延胡索

腫脹方

小調經散

又

沒藥

西珀

桂心

白芍

當歸各一

椒目丸

錢

細辛

麝香

各五分

酒姜汁調下

仁

黑牽牛

五靈脂

吳萸

當歸

延胡

索各五錢

羌活

一錢

琥珀十枚去頭翅足

同研青

胆丹一錢

全米炒

桑螵蛸

一枚製同研青

附子

干金子

郁李

平胃散

水蠶

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

胃苓湯

又

亭莖丸

又

葶藶

防已

木通

杏仁

川貝各一

黃甲丸

又

犀角湯

又

結陽症

犀角

元參各一錢

升麻

木通

各八分

棗肉丸

桑皮

湯下治肺氣喘促

面目浮腫

川貝各一

甘草各五分

連翹

柴胡各六分

沉香

射干

麥冬各四分

鋪臍藥餅

外治

真輕粉二錢

巴豆四兩

生硫黃一

錢

研勻成餅先用新棉鋪臍上次鋪藥餅外

以帛緊束之約人行五七里許自然瀉下惡水

待下三五次卽去藥以溫粥補之一餅可治

一

敷藥

二十人久患者隔日取水根赤者杵爛貼臍上以帛繅定水從小便出
又大戟 荒花 甘遂 海藻 等分醋糊時水卽下矣

灸法

又水分穴在臍上一寸宜灸如年敷壯中
腕穴在臍上四寸上下一寸居岐骨與臍之分
中灸二七壯 灸神闕以鹽滿臍中灸之
以上外用三方皆專治水腫 凡患水腫者切
忌用刺刺之水盡卽死

附載嵩崖水腫神方

回生丹

專治 青皮 陳皮 三稜 蓬術各三錢
連翹三錢用巴豆一兩五錢同炒去豆 木香
甘遂 商陸 木通 澤瀉 乾漆炒至烟
盡 菊菔子各三錢 赤苓 桑皮 椒目各
五錢 胡椒一錢 黑丑一兩 醋糊丸初服
酒葱湯五更下十五丸二服陳皮桑皮湯下十
八丸三服射干湯下二十丸 凡患水腫忌食
鹽魚肉鷄麵羊湯七件並房事

治痞滿方八

脾

腫脹方

痞滿方

卷五

十九

調中益氣方

子 中氣虛

人參 黃芪 白朮 甘草 五味

當歸 升麻 柴胡 陳皮 白芍 甘草

資生丸

消食 編豆 人參

黃連 神曲 澤瀉 桔梗

茯苓 橘紅 蕃香 查內

豁痰丸

導痰 甘草 南星

半夏 赤苓 枳實 橘紅

二陳湯

除濕 甘草 加姜

茯苓 陳皮 半夏 甘草

三黃瀉心湯

脉浮

小柴胡湯

和解

調中健脾丸

單腹脹 葛根 各二錢

五加皮

蒼朮

人參

黃芪

白朮

茯苓

苡仁

當歸拈痛湯

濕熱 葛根 升麻

羌活

甘草 苍朮

茵陳

人參

苦參

當歸

知母

白朮

猪苓

澤瀉

防風

沉香散

用瓜蔓一个挖一孔入川散三錢

沉香六分

用瓜蔓一个挖一孔入川散三錢

沉香二錢


外用紙糊監泥封固晒乾火煅去泥并

沉香二錢

沉香二錢

沉香二錢

葉共爲末荷葉大腹皮煎湯打黃米粉糊丸每
服百丸湯下日三服



沈氏尊生書卷六

雜病源流犀燭
臟腑門

心病源流 伏梁 心癱 心痛

沈金鰲撰

手少陰心脈起心中出屬心系下鬲絡小腸其支者從心系上挾咽繫目系其直者復從心系上肺下出腋下下循臑內後廉行太陰心主之後下肘內循臂內後廉抵掌後銳骨之端入掌內後廉循小指之內出其端次注于手太陽小腸經 每日午時週身氣血俱注于心 手少陰心經少血多氣

十二經皆聰命于心故爲君位南方配夏令屬火故爲君火十二經之氣皆感而應心十二經之精皆貢而養心故爲生之本神之居血之主脉之宗蓋神以氣存氣以精宅其理洵不誣也惟心精常滿故能分神於四臟惟心氣常充故能引精於六腑此所以爲心之大槩也心與腎連經曰心舍脉其主腎經不以其尅而反以爲主故必腎水足而後心火融腎水不足必至心火上炎而心與

腎百病蠭起矣。故心當無病時養之之法有二。從本經以養其氣。勿過思抑志。或事未至而迎事已往而懲。使神明耗散。若過用其心。則傷其氣。氣傷並傷其精。而神無以爲守。試觀孔子毋意毋必。毋固毋我。孟子必有事焉。勿正。勿忘。勿助。養心之法。至孔孟爲已極。孔孟並未嘗言醫。其所以養心。曷嘗有外於是哉。一從腎經。以養其精。勿縱情房慾。勿貪戀女色。致相火常炎。不能據固。若守腎無節。則傷其精。精傷遂傷其氣。而水不能制火。陰不能爲陽宅。而水氣因以凌心矣。是以象川翁曰。精能生氣。氣能生神。榮衛一身莫大于此。養生之上。先寶其精。精滿則氣旺。氣旺則神旺。神旺則身健。身健則少病。朱丹溪曰。主閉藏者腎。司疏泄者肝。二臟皆有相火。而其系上屬於心。心君火也。感則動。心動則相火亦動。而精自走。可知精之走泄。固由于腎。累于肝。傷于心。一病則俱病。象

川丹溪明揭其旨固可爲千古養心家炯戒也然則心失所養而心病腎失所養而心不亦病乎且夫心主血血卽精也心氣原自有餘特精傷而失血心便不足故血盛則神明湛一血衰則志氣昏蒙凡火之有餘皆由血之不足而血之不足又能使火益就衰也然則心病之有餘不足詎得與運氣司天之火淫火鬱徒屬平火者同視哉亦惟握精以固其氣養陰以凝其神以調劑其有餘不足使歸子和而已以上皆言心之所由致病與養其心所以至於無病也然而病不能已試據經以觀心之病經曰心病者胸中痛脇支滿脇下肩背胛間痛兩臂內痛虛則胸腹痛大脇下與腰相引痛就經所言病皆在血脉而不在心何也以心爲血脉之主故其寔其虛皆不見本臟而在血脉其在血脉必先於在經絡者病之也若胸腹腰脇間皆心與心包之所在故先病於本經也其

虛而腹脇大則緣脾胃不上納氣於心而然虛而脇下與腰相引
痛又緣肝腎不主貢精於心而然此其病非止于本經絡可由本
經絡而推者也經又曰若心經絡病者動則嗌乾心痛渴而欲飲
以及所生病目黃脇痛臍臂內後廉痛厥掌中熱痛其皆爲本經
絡病固已而其病却能及心蓋支脈挾咽病則通於心故嗌乾者
心火必炎故心痛火炎則陰耗而心液乾故必渴且心部在陽明
心痛而熱及陽明陽明亦必熱故渴而欲飲目黃等症皆心脉熱
逆之故所謂經絡病而及心者如此經又曰精氣并於心則喜驚
而奪精汗出于心又曰憂思則傷心何謂歟喜者心之浮陽心好
勝精氣并于心則心有餘故陽浮動而喜驚者肝胆虛怯之氣肝
胆失利不能衛心故心氣內空而奪精神不守榮而汗出思者心
之神明思而弗遂則憂憂思不已必神明內擾而往來憧憧故傷

心。凡諸心病皆由於不能養精以馭氣而使神以氣存氣以精宅也。欲求心無病者可不於此加之意哉。

脉法 脉訣曰。心脉充陽氣作聲。或時血痢吐交橫。溢關骨痛。心煩躁。更兼頭面赤。驛驛大熱由來面赤風燥痛。面色與心同。微寒虛惕應寒熱急則腸中痛不通。寢大相兼并有滑舌滑心驚語話難。單滑心熱別無病。濇無心力不多言。沉緊心中逆冷痛弦時心急又心懸。又脈訣曰。五臟不同各有本脉。左寸之心浮大而散。仲景曰。心傷者其脉弦。

心病緣由症治 靈樞曰。邪在心。則病心痛。善悲時。仆眩。又曰。心藏脉。脉舍神。心氣虛則悲。寔則笑不休。素問曰。腎傳之心。病筋脉相引而急。病名曰癲。又曰。心熱者色赤而絡脈溢也。又曰。大骨枯。大肉陷。胸中氣滿。喘不休。內痛引肩項。期一月死。真

臟乃與之期曰。又曰。心病者。日中慧。夜半甚。平旦靜。又曰。心苦緩。急食酸以收之。註曰。苦緩心氣虛也。又曰。心欲喫。急食鹹以喫之。用鹹補甘瀉之。又曰。心病禁溫食熱衣。難經曰。憂愁思慮則傷心。仲景曰。心家陰氣衰者爲癲。陽氣衰者爲狂。又曰。心傷者勞倦。則頭面赤而下重。心中痛。而自煩。發熱。脣上跳。其脈弦。此爲心藏傷所致也。難經曰。外症面赤口乾善笑。內症脣上有動氣。按之牢若痛。其病煩心。心痛。掌中熱而腕有是者心也。無是者非也。

手少陰無脈。靈樞曰。少陰者心脉也。心者五臟六腑之大主也。其臟堅固邪不能容。容則傷心。心傷則神去而死。故諸邪在於心者。皆在心包。心包者。心主之脉也。故少陰無脈。又曰。其外經病而臟不病。故獨取其經于掌後銳骨之端。即神門也。

心絕候。靈樞曰。手少陰氣絕則脈不通。脈不通則血不流。血不流則色不澤。故其面黑如染柴者。血先死。王日篤。癸日死。仲景曰。形體烟煤。直視搖頭者。此爲心絕。脈經曰。心絕一日死。何以知之。肩息回視立死。一云二日死。

心氣滯濇保養法。保生秘要曰。凡人氣旺則血榮而潤澤。氣絕則血枯而滅形。故氣虛弱滯濇而成病。如滯於心。心爲一身之主。統領血海。故心血少。則神不定。寢不安。百病集作。諸痛痒瘡痍。皆屬心火。當常呵以泄其火。吸以和其心。諸心切勿食穢氣觸我靈。夏至夜半後。地氣一陰生。大熱勿食冷。受寒霍亂侵并忌房中事。元氣離命門。大抵當甚暑。人善于養心。則無秋患。時當飲六一燈心湯。荳蔻香茹水。醉飽勿頂風前卧。慎此則無患矣。

心臟修養 養生書曰。常以四月五月朔望清旦。面南端坐。叩金梁九。漱元泉三。靜思注想。吸離宮赤色氣入口。三吞之。閉氣三十息。

心臟導引 耀仙曰。可正坐。以兩手作拳。用力左右互相築各六度。又可正坐。以一手按腕上。一手向下托空。如重石。又以兩手相叉。以腳踏手中。各五六度。能去心胸間風邪。諸疾閉氣。爲之良久。閉目三嚥津。三叩齒而已。

心之積曰伏梁。起臍上。大如臂。上至心下。久則令人煩心。身體脛股皆腫。環膚而痛。脈沉而芤。皆由心經氣血兩虛。以致邪留不去也。治宜活血涼血散熱通結。宜伏梁丸斯得之矣。

伏梁有二症。內經曰。帝曰。病有小腹盛。上下左右皆有根。此爲何病。可治否。岐伯曰。病名曰伏梁。裏大臙血。居腸胃之外。不

可治治之每切按之致死矣。帝曰人有身體股肱皆腫環臍而痛是爲何病。岐伯曰病名伏梁此風根也。其氣溢于大腸而着于膏肓之原在臍下故環臍而痛不可動之動之爲尿濇之類。此二病同名而寔異也。

心痛色絡病寔不在心也。心爲君主不受邪。或君火衰盛。大寒觸犯心君亦或汗血冲心。素無心病。卒然大痛無聲。咬牙切齒。舌青氣冷。汗出不休。手足青過節。冷如冰。是爲真心痛。且發夕死。夕發旦死。若不忍坐視。或使心經寒散。亦可死中求活。宜用猪心煎湯去渣煎麻黃肉桂附子。如但爬床搖席。面無青色。四肢不厥。痛亦不至無聲。卽非真心痛。由包絡捧心。或寒或痰。或重或食上干。包絡脂膜緊急作痛。宜各從其類審脉用藥。總治宜必應湯。夫心主諸陽。又主陰血。故因邪而陽氣鬱者。痛陽虛而邪勝者。亦痛。因邪而陰血凝注者。痛陰虛。

而邪勝者亦痛。其痛分九種曰食必飽悶。噫敗卵氣。由食生冷。或

食物過多也。

宜青皮丸

曰飲必惡心煩悶。時吐黃水甚則搖身作水聲。

由傷水飲痰涎積聚也。

宜小腹丹丹蔴芩湯熱飲加黃連甘遂寒飲加肉桂茯苓蒼朮半夏

水飲流

注胸膈痛。

宜三花神佑丸

曰風因傷風冷或肝邪乘心兩脇引痛也。

宜羌活荆

芥附等曰寒外受寒當溫散內受寒當溫利久則寒必鬱當疏解。

總治宜术

湯虛寒當溫補。

宜歸脾湯加乾姜肉桂菖蒲

腎寒乘心痛則心懸如饑泄利下

重宜五積散寒氣客背俞之脉則血脉濇血脉濇則血虛血虛則痛其

俞注于心故相引而痛宜桂枝四七湯神效散

曰熱必身熱煩躁掌熱口渴。

便秘面目赤黃大熱作痛由積熱攻心或暑熱入心也。

宜金鈴子散剪紅丸

甚者宜大氣湯大痛不止熱未清也。

宜清中湯

曰悸勞役則頭面赤而下重自

煩發熱脈弦臍上跳心中痛由心傷也。

宜辰砂妙香散加味四七湯

曰血脉必

滯壯盛人宜下。

宜代當湯

抵虛弱人須補而帶行。

宜四物湯加桃仁穿山甲肉桂心蓬朮降

香飲下作呃亦須行之。宜手拈散

宜半月頭向上易治

曰。亟必面色青黃有白斑唇紅能食。

或食後卽痛或痛後卽能食或嘔吐涎沫或吐青水凡吐水者亟
痛不吐水冷心痛也。亟心痛小兒多有之上半月頭向上易治
之隨服妙功丸或剪紅丸曰。痘。鬼。痘也。必心痛神昏卒倒。先以鷄肉汁或蜜糖飲

之。

或剪紅丸曰。痘。鬼。痘也。必心痛神昏卒倒。先以鷄肉汁或蜜糖飲

卒感惡也。

宜蘇合丸此所謂九種心疼也。顧經言心痛未有不兼五臟

者。經曰。厥心痛與背相控。善憲如從後觸其心區雙者。腎心痛也。

宜神保元神聖復氣湯腹脹胸滿胃腕當心痛上支兩脇。咽膈不通。胃心痛

也。宜草荳蔻丸如以錐針刺其心心痛甚者脾心痛也。

宜金銀子散復元通氣湯內外邪犯心

散色蒼蒼如死狀終日不得太息。肝心痛也。

宜金銀子散復元通氣湯內外邪犯心

之包絡或他臟之邪犯心之支脉故心亦痛此厥心痛也謂之厥

者諸痛皆肝腎二經氣逆上冲又痛極則發厥也。但分寒熱二種

手足厥逆。冷汗尿清不渴氣微力弱而心痛則寒厥心痛也。宜

附湯

六

身熱足冷煩躁脉洪大而心痛甚則熱厥心痛也宜金鈴子散清鬱散經又

宜金鈴子散清鬱散經又

曰陽明有餘上歸于心滑則病心痛心痛引少腹滿上下無定處洩便難者取足厥陰肝心痛腹脹竇然大便不利取足太陰脾心痛短氣不足以息取手太陰肺心痛引背不得息取足少陰腎以上皆他臟之病干之而作痛者非心本經自病也治法當兼用各臟藥經又曰邪在心則病心痛喜悲時眩仆此則包絡受邪痛在腑不在臟者也經又曰手少陽三焦脉動則病嗌乾心痛渴而欲飲此則別絡受邪痛在絡不在經者也二者之痛皆因忧惕思慮傷神涸血而然宜心湯而亦有卒心痛脉洪數者宜黃連一兩煎湯頓服如按之痛減則爲虛宜酸收不應辛散宜歸脾湯加乾姜肉桂菖蒲有心膈大痛嘔逆發厥藥不納者趁勢以鵝毛探吐痰盡而痛自愈內服藥宜南中湯有蛲虫嗜心者痛有休止或吐蛲虫動則惡心嘔吐宜烏梅丸星安

心痛之不同如此。總之七情之由作心痛，食積、痰飲、瘀血作胃痛。二語正是分明。曷言乎心痛由七情也。經云：喜則氣散，怒則氣上，憂則氣沉。思則氣結，悲則氣消，恐則氣下。驚則氣亂。除喜之氣能散外，餘皆足令心氣鬱結而爲痛也。然心痛亦有虛寢。按之痛止者虛也。宜參散按之痛反甚者寢也。宜振黃丸凡痛多用溫散之藥，獨不可用補氣藥。以氣旺不通，則痛愈甚也。

脉法 脉訣曰：心腹痛，脉沉細宜浮，大弦長命必殂。又曰：沉弦細動，皆是痛症。心痛在寸，腹痛在關下部，在尺。脈象顯然。丹溪曰：心痛左手脈數熱多也。脈濇有死血也。右手脈緊寢，是痰積也。脈大必是久病也。兩手脈堅寢不大，便可下之。痛甚者，脉必伏。正傳曰：心脉微急爲痛，微大爲心痺。引背痛，短而數，或

濇者心痛。

心 心痛

卷六

七

心痛症治 入門曰心痛引背多屬風冷。心痛嘔瀉難以俛仰。多屬熱。丹溪曰凡心胃痛須分新久。若明知身受寒冷。口吃寒物而得者于初得之時當與溫散。如桂枝四七湯之類或溫利之。如九痛丸之類若得之稍久則成鬱鬱久必生熱。熱久必生火。若溫散溫利則助火添邪。由是方中多以山梔爲熱藥之嚮導。則邪易除。正易復。痛易安。又曰心胃痛須用刲藥。痛乃止。如倉卒散。山梔四十九枚連皮炒大附子一个炮去皮臍共爲粗末。每三錢水一盞酒半盞煎七分入鹽少許服。加川芎一錢尤妙。能治氣自腰腹間攀急疼痛不可屈伸。痛不可忍。自汗如洗。手足冷而垂死者。又如愈痛散五靈脂延胡索蓬朮良姜當歸等分共爲末。每二錢醋湯調服。能治急心痛胃疼。又曰心胃痛用山梔刲藥止之。又復發前藥必不效。可加元明粉一錢服。

之卽止矣。

飲食禁忌。丹溪曰。心胃痛日數多。雖不吃飯。不死。若痛止便吃物。卽復發。必須三五日服藥。方可吃物。

導引。保生秘要曰。于足三里掐之九九。擦亦九九。運行後功。痛氣降而愈。

運動。保生秘要曰。行歸元逐痛處。流行胃火。自然發散。此導

功二法不但治心
痛兼治胃口痛

心癱。心熱病也。經曰。諸痛癢瘡瘍。皆屬心火。其發于他經者。且莫不由心火。况本經積熱而卽發于本經部位者乎。其所以致熱之故。則必其平日好飲酒。或嗜食辛辣熟物。以致日久凝聚而生此症也。宜先用涼血飲次。
服加味十奇散

心癱症治。靈樞曰。巨闕穴名隱隱而痛者。心疽。上肉微起者。心

癰也。入門曰：心癰者，于胸乳間生蜂窠癰，發靈樞經所謂一名井疽，狀如豆大，三四日起，不早治，則入于腹，七日死。急用疏導心火之藥，宜用清心丸、清心散、內固清心散、瀉心湯。瘍科選粹曰：心癰發胸乳間者，名井疽。若在鴟尾者最緊要。係心熱極盛者，當導心火緩，則不救。小便濁者，清心散或涼膈散去硝黃加白芷花粉、木通、瞿麥。大便秘者，內固清心散、涼膈散去硝加白芷花粉、生地。發于膺，名甘疽。其色青，狀如穀寃，瓜蔓常苦寒熱，不急治，十日死。死後出膿。

治心病諸藥要品及方五

心寢宜降火清熱

黃連
犀角

石膏

甘草

麥冬

牡丹皮

丹皮

大便結燥須大黃、芒硝、發狂詫語亦如之

心虛宜益氣補血

人參
生黃

炙草

圓眼

茯神

金石斛

五味子

鹿茸

丹砂

炒鹽

琥珀

柏子仁

龍齒

金箔

牛黃

麥冬

代赭石

桔梗

竹瀝

貝母

鬱金

陳胆星

鈎鉤

白芍

黃連

元參

北沙參

黃芩

黃柏

當歸

黃茋

元參

補虛

水飛株砂

一兩

麥冬

牙硝

寒水

半

茯苓

山藥

甘草各五錢

冰片二分

蜜丸

每兩作三十丸

每丸砂糖水化下

醒心散

心虛熱 人參 麥冬 遠志 茯神 五味

子 石菖蒲 生地 等分水煎

瀉心湯

瀉心熱 黃連不拘多少爲極細末每服二分
半或五分或一錢溫水調下

導赤散

心熱 生地 木通 甘草各一錢 竹葉七
片 此雖治心熱寔小腸之藥也

十味導赤散

寔熱 赤芍 木通 生地 甘草 麥冬 半夏 茯苓
姜五片 此治心臟寔熱一切口舌生瘡

驚悸煩渴諸症

分牛黃 黃連 生地 甘草 地骨皮各用五

附載仲景大法及分別標本方藥

有餘爲熱氣血

牛黃

黃連

冰片

黃柏

天竺黃

心

心病方

生地

黃芩

冰片

黃柏

卷六

九

不足爲寒

氣

人參

茯苓

乾姜

菖蒲

心盛則生熱

子能令母寔
寔則瀉其子

心虛熱收內

母能令子虛
虛則補其母

逆則多盛

大黃川黃連

大則病進

熟地黃硃砂

心悸

汗多桂枝
陰症茯苓
雜病硃砂

少陰柴胡
寒白朮乾姜
濕茯苓澤瀉

痞悶

虛半夏
寔枳實
熱大黃黃連

燥木瓜芍藥
旋覆花

痞心下

下有水枳實
無水木瓜芍藥

旋覆花

下之心下

痞雜病半夏芍藥
傷寒甘草瀉心湯

下之脇下痛

虛芍藥
寔牡蠣
柴胡

一法火鬱則發之謂汗之令疏散也

標黃連

子能令母寔
寔則瀉其子

地黃 生者自病丁與丙同治

本

治伏梁方二

伏梁丸

總治
黃芩

黃連一兩半
人參 厚朴各五錢

桂枝

丹參 茯苓各一錢

乾姜

首滿
蜜丸

巴霜 川烏各五分

紅豆蔻二分

增損五積丸

通治
茯苓

黃連 厚朴

藥品分量加減製法俱詳息賁症

川烏 乾姜

人参

治心痛方三十九

必應湯

類心痛
仁姜

延胡索

香附

艾灰

歸身

砂

青皮丸

飲痛
食痛

青皮

山楂

神曲

麥芽

草果

小胃丹

飲痛
白术前膏丸

芫花

甘遂

大戟

大黃

黃柏

白术前膏丸
丸子大臨臥湯下一錢欲利空心
服之

胃苓湯

又
苓

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

白术

茯

苓

猪苓

澤瀉

肉桂

姜

棗

木附湯

寒痛

白术

附子

甘草

甘草

白术

茯

苓

澤瀉

肉桂

姜

棗

歸脾湯

虛弱

人參

黃芪

當歸

白朮

茯神

棗

金鈴子散

熱痛

金鈴子

延胡索

痛止

當與香砂枳

枳

剪經丸

又末丸

蓬莪术

京三稜

雄黃

木香

尖柵

清中湯

大熱

黃連

山梔

陳皮

茯苓

半夏

加味歸脾湯

悸痛

甘草仁

人參

黃芪

當歸

白朮

桂圓

桂圓

木香

甘草

茯神

姜棗

加菖蒲

遠志

肉桂

代抵當湯

虛弱

川芎

當歸

白芍

生地

手拈散

呃痛

延胡索

五靈脂

草果

沒藥

等

妙應丸

正痛

枳榔

一兩二錢

黑牽牛

頭末

三錢

大黃

雷丸

錫灰

蕪夷

木香

使君子

肉各一錢

葱白煎濃湯

露一宿

和丸

粟米大

每四錢五更葱湯下如取寸白正以石榴根皮大

每四錢

更葱湯下如取寸白正以石榴根皮大

煎湯下小兒服一錢或五分天明取下瓦物此丸不損真氣有垂則下垂有積卽下積有氣卽消氣一服見效

蘇合丸

痘痛 白术 犀角 詞子 珠砂 草撥
香附 木香 檀香 沉香 丁香 膜香
安息香 薰陸香 蘇合香油

補心湯

絡痛 人參 當歸 茯神 遠志 地黃
甘草 柏子仁

南星安中丸

膈痛

烏梅丸

蛇痛 川椒 細辛 附子 人參 肉桂 黃柏各
烏梅十五個 黃連七錢半 當歸

三錢 醋浸烏梅取肉打和爲丸米飲下一二
十九丸

蕪夷散

叉 蕪夷 雷丸各五錢 乾漆一錢 共爲
末溫水調下二錢小兒服五分

三花神佑丸

因飮

五積散

因寒

桂枝四七湯

因

寒

桂枝 半夏各二錢 酒白芍一錢半

茯苓 厚朴

枳壳各七分

人参

乾姜炮

附子三兩

吳萸

人參

桂枝

半夏各二錢 酒白芍一錢半

茯苓 厚朴

枳壳各七分

人参

紫蘇

九痛元

因

令

附子三兩 巴霜各一兩

附子三兩

吳萸

人參

乾姜炮

附子三兩

吳萸

人參

桂枝

半夏各二錢 酒白芍一錢半

茯苓 厚朴

枳壳各七分

人参

紫蘇

神效散

因

稜

木香 蓬术

青皮 神曲

陳皮 內桂

枳壳 白芷

桂枝 白芍

桂枝 甘草

桂枝 桂枝

辰砂妙香散

因

稜

桂枝 各一分

桂枝 各三分

加味四七湯

因

神

桂枝 半夏各二錢

桂枝 蘇葉各八分

桂枝 茯苓各五分

大承氣湯

因

寒

寒

寒

寒

寒

寒

寒

寒

寒

寒

寒

寒

寒

寒

寒

神保元

因

寒

寒

寒

寒

寒

寒

寒

寒

寒

寒

寒

寒

寒

寒

寒

下五七丸

神聖復氣湯

又俱用新水浸

酒連

酒生地

枳壳

蔓荆子

柴胡各一

細錢

辛以上七味各三分

又羌活

當歸六分

郁李仁

防風

人參各五

分附子

炮姜各三分

白葵花

三朵去心

碎水五盞煎至二盞入黃芪

草蔻各一錢

橘紅五分

煎至一盞乃入前浸

兩藥連水

傾入前至一盞去渣熱服

參术散

因虛

人參

白朮

炮姜

白豆蔻

縮砂

仁丁香

陳皮

甘草各一錢

姜三片

加炒

蚌粉二錢尤妙

梔黃丸

氣寢

山梔一兩半

吳萸

香附各二錢半

蒸餅九

生姜生地煎湯

下二三十丸

胃解丸

生姜煎湯

枳殼二兩

草蔻

煨白朮各二兩

草豆蔻丸

神曲

半夏各五錢

乾姜

青皮

陳皮各二錢

炒鹽五分

蒸餅九

白湯下

清熱解鬱湯

又錢

山梔一錢半

枳壳

川芎

香附各一

炒黃連

蒼朮各七分

陳皮

姜炭

炙草各五分 姜三片煎服戒飲食半日

服即止

訶子散

胛皮 心痛 炮訶子 厚朴 炮姜 草果 陳皮 炒良姜 茯苓 神曲 麦芽 炙草 等分爲末每三錢入鹽少許痛時煎服

復元通氣散

又一兩白丑頭末二兩穿山甲炙炒茴香各五錢去白陳皮延胡索炙草各一兩木香五錢共爲末每二錢姜湯下

清鬱散

附厥心痛 半夏 陳皮 蒼朮 茯苓 便香神曲 姜黃連 姜梔子各一錢 川芎六分 姜炭五分 炙草三分 姜三片

倉卒散

黑山梔四十九個 大附子一個炮搗薑爲粗末每三錢水酒盪少許煎服

五靈脂

延胡索

蓬木

炒良姜

當

當

等分爲末

每二錢醋湯調服

總治

歌曰

三個烏梅

七粒杏仁

心頭痛方

東子俱去核杏仁泡去皮尖射香如小葵豆許共搗如泥黃酒一杯酒兩沸溫服正痛時服之人尤神效當時即止

治心癰方七

涼血飲

主治
花粉
木通

瞿麥
赤芍

荆芥
麥冬

薄荷
山梔

連翹
白芷

加味十奇散

又

人參

黃芪

當歸

肉桂

川芎

白芷

車前

甘草各

入分

加燈心

竹葉

一名引

連翹

清心丸

又

黃連一兩

茯神

赤苓各五錢

蜜丸

蜜丸

蜜丸

清心散

又

遠志

赤苓

赤芍

生地

麥冬

知

瀉心湯

澤蘭

連翹

蘇木各七分

蜜丸

蜜丸

蜜丸

蜜丸

內固清心散

又

白豆蔻

人參

硃砂

赤苓

雄黃

雄黃

藥豆各一分

共爲末

每一錢

蜜水調下

涼膈散

又

連翹


山梔

大黃

薄荷

黃芩各七

片



怔忡源流

卑蝶

沈金齋撰

怔忡心血不足病也。人所主者心。心所主者血。心血消亡。神氣失守。則心中空虛。快快動搖。不得安甯。無時不作。名曰怔忡。或由陽氣內虛。宜人參黃芪白朮炙甘草茯神或由陰血內耗。宜人參麥冬當歸地黃圓眼或由水飲停於心下。水氣乘心。侮其所勝。心畏水不自安。宜茯苓茯神白朮半夏橘紅或急急富貴。戚戚貧賤。或事故煩冗。用心太勞。甚至一經思慮。便動皆當以養心血。調心氣。清熱豁痰爲主。宜酌用清鎮湯如心火熾。又須安神。宜安神丸或由汗吐下後。正氣孱弱。宜人參黃芪白朮白芍或由榮衛俱涸。脈來結代。而心惕不甯。宜養心湯或由虛弱怔忡。而卧不安。宜棗仁湯或思慮多而怔忡。兼不寐。便濁。宜養榮湯或心虛怔忡。而兼自汗。宜參歸腰子或由痰爲火動。而時作時止。宜二陳湯或由憂愁悲苦。致心虛而動。宜歸脾湯或由氣鬱不宣。而致心動。宜加味四七湯或陰火上冲。怔忡不已。甚

至頭暈眼花。齒髮脫落。或見異物。或腹中作聲。急應滋陰降火。加

養心之品。

宜四物湯加知母黃柏

丸。如久服降火藥不愈。爲無根失守之火。宜

味或由所求不遂。或過縱自悔。吁嗟夜語。真若有失。

宜溫胆湯加人參柏子仁

砂爲衣疎日進三服以上皆怔忡所致之由也。若心澹澹動此係包絡所生病。

宜鎮胞湯

蓋心爲君火。包絡爲相火。火陽主動。君火之下。陰精承之。

相火之下。水氣承之。則爲生氣而動得其正。若之所承。則煩熱而

爲心動。法當補其不足以安神氣。未瘥。則求其屬以衰之。若由于

痰飲者。當用逐水消飲之劑。

宜二陳湯。芎夏湯

况乎各臟有痰。皆能與包

絡之火合動。而爲怔忡。隨所犯而補瀉之。更須調平包絡。若各臟

移熱于心。以致包絡火動者。治亦如之。然則怔忡固由于虛。所以

致此怔忡之症。則各有異。亦安可不察之哉。

脈法 灵樞曰。手厥陰之脉甚動。則心中澹澹大動。

怔忡形症

內經曰胆病者亦心中澹澹如人將捕又曰太陽司天寒淫所勝則病心澹澹大動寒傷心主也註曰澹澹水搖貌此屬水病直指曰心虛而停水則胸中滲滳虛氣流動水旣上升心火惡之心不自安使人有怏怏之狀是爲怔忡又曰怔忡因驚悸久而成也綱目曰怔忡惕惕然心動而不寧無時而作者是也又曰心澹澹動者因痰動也謂非驚怕而心自動也資生曰內經謂胃絡名虛里貫膈絡肺出左乳下其動應衣虛而有痰則動更須臾發一陣熱者是也

怔忡治法

入門曰怔忡因驚悸久而成也痰在下火在上參胡溫胆湯加黃連梔子當歸貝母氣鬱者金箔鎮心丸停飲者二陳湯加茯苓枳榔沉香麥冬直指曰心下有水氣怔忡宜

五苓散

醫鑑曰怔忡亦曰怔忪與驚悸同看宜益榮湯姜术

湯四物安神湯朱雀丸加味甯神丸天王補心丹。

卑憊心血不足病也與怔忡病一類其症胸中痞塞不能飲食如痴如醉心中常有所歉愛居暗室或倚門後見人卽驚避無地每病至數年不得以癲症治之也宜天王補心丹人參養榮湯古菴心腎丸

治怔忡方二十三

清鎮湯

勞心
當歸

茯神
生地

遠志
貝母

菖蒲
麥冬

石蓮
柏子仁

川芎
如犀

角硃砂
西珀龍齒牛黃麝香等病深者方可酌

加之不得概用也

心火
黃連六錢

殊砂五錢

生地二錢半

當歸各二錢

安神丸

脈結代
半夏各

錢半
甘草

黃芪

當歸

茯苓

川芎

黃連六錢半

甘草五分

黃芪

當歸

茯苓

遠志

甘草一分

黃芪

當歸

茯苓

遠志

蓮子各

甘草一分

黃芪

當歸

茯苓

遠志

蓮子各

甘草一分

黃芪

當歸

茯苓

遠志

蓮子各

棗仁湯

草

陳皮各五分

養榮湯

思慮
木香
當歸

小草
白芍
黃芪

柴七
麥冬
炙甘草

茯神
柏子

參歸腰子

虛弱
膜細切
人參
全煎并
歸身各五錢
腰子藥汁食之
猪腰一隻去筋

二陳湯

痰火
茯苓
陳皮
半夏
甘草

芎夏湯

心動

加味四七湯

氣鬱
蘇葉
半夏二錢
赤芩
厚朴各錢二分
茯神各八分
姜遠志
炙甘草各五
分
石菖蒲半寸
姜七片
棗二枚

歸脾湯

憂愁
遠志
人參
黃芪
龍眼
當歸
木香
炙草
姜
棗

四物湯

陰火
川芎
當歸
白芍
生地

八味丸

游火
熟地
山萸
山藥
丹皮
澤瀉
包絡動
肉桂
附子
生地
人參
茯神
遠志
硃砂
金石
解
柏子仁
生地
麥冬
棗仁
甘草
五味子

溫膽湯

心
怔忡方
單渫方

參胡溫胆湯

痰火

香附二錢四分 橘紅錢二分

半夏

枳實 竹茹各八分 人參 茯苓 柴胡

棗二分 此卽加味溫胆湯能治心胆虛怯觸事易驚涎與氣搏變生諸症

金箔鎮心丸

氣鬱五錢

膽星一兩 牛黃 雄黃 真珠各二錢

西珀 腸砂 西珀 天竺黃各

分蜜丸每兩作三十九金箔爲衣薄荷湯下

兼治癲癇驚悸怔忡一切痰火之疾

麝香五分

五芩散

水氣一錢

肉桂 白术 茯苓

猪苓 澤瀉

益榮湯

總治茯神

黃芪 白芍 柏子仁 小草

當歸 紫石英各一兩

香人參

甘草各五錢

右剉每七錢加姜

五棗二煎服

此方專治思慮過度耗傷心血

恍惚怔忡一切之症

姜朮湯

又白姜桂皮

生白朮 甘草各二錢

赤苓 右剉每五錢加姜

半夏曲各五錢

棗二煎服

此治虛人停飲怔忡

生地 黃連炒

熟地 柏子仁炒

麥白

四物安神湯

又當歸

茯神

白芍 生地

熟地 人參

冬竹茹各七分
梅二个煎另研辰砂五分冲服此治心中

無血如魚無水怔忡跳動之症

朱雀丸

又 荀神二兩沉香五錢蒸餅丸辰砂五錢爲衣人參湯下五十丸此治心神不定恍惚健忘火不下降時復振跳之疾

加味寧神丸

又 生地兩半當歸白芍茯神麥冬陳皮棗仁貝母各一兩姜遠志川芎各七錢爲衣棗湯下五七十丸此治心血不足驚悸

怔忡健忘恍惚一切痰火之疾

天王補心丹

又 酒生地四兩酒黃連二兩石菖蒲一兩人參酒當歸天冬麥冬五味子

梗棗仁柏子仁元參丹參茯神桔梗遠志各五錢蜜丸辰砂爲衣臨卧竹葉燈心湯下此能寧心保神令人不忘除怔忡定驚悸養育心神

治單慄方三

人參養榮湯

桂總治白芍錢牛人參黃芪陳皮肉當歸白朮炙甘草各一錢熟地

心

單慄方

白朮

人參

黃芪

陳皮

肉

卷六

十七

五味子 茯苓各八分 遠志五分 姜三

卷之二

天王補心丹

又見上

古菴心腎丸

又
歸

朝地

生地
酒監

炒
山

七
藥

卷之三

半答

二
山苗

當

卷之三

卷之三

卷之三

卷之二

牛膝

十一
五
七

通鑑

卷之三

卷之三

兩爲衣空心鹽
虛而乍熱驚慄

湯或
仲仲

遺精失溫酒

下

此治家

子昭耳目

俱在

驚悸悲恐喜怒憂思源流

沈金鰲撰

驚者心與肝胃病也。內經言驚屬之肝胃，但心氣强者雖有危險，觸之亦不爲動。惟心氣先虛，故觸而易驚也。然則因所觸而發爲驚者，雖屬肝胃，受其驚而輒動者，心也。故驚之爲病，仍不離乎心。其由乎？肝者何也？肝屬木，屬風，木多震動，故病驚駭也。其由乎胃者何也？胃多氣多血，血氣壅則易熱，熱故惡火而易驚。且胃氣厥則爲憂懼，故惡人之煩擾而驚。陽明屬土，土畏木，故聞木聲而驚也。大抵驚之因，多由於外。或耳聞大聲，或目見異物，遇險臨危，當其外有所觸，心忽一虛，神氣失守，神去則舍空，舍空則液與痰涎着于包絡之間。宜控涎丹加珠砂遠志多致目睛不轉，不能言，短氣自汗，體倦坐卧不安，多異夢。忽驚覺多魘。宜溫胆湯獨活湯，琥珀養心丹與悸恐不同。若因大驚而病者，脉必動如豆粒。寸脉止而復來曰動脈而無頭尾急當鎮。

定之。

宜黃連
安神丸

有由腎虛而驚者。宜人參黃芪當歸白朮元參陳皮黃柏

有由胆虛而驚者。
安神丸

白朮元參陳皮黃柏

有由胆虛而驚者。

驚者。

宜人參枳壳肉桂五味子
棗仁熟地杞子柏子仁

有由肝胆俱虛百藥不效者。須補
腹下五錢極效

有由肝膽俱虛百藥不效者。須補
腎。宜酒化鹿角膠空

腎。宜酒化鹿角膠空

有由肝無虛不可補。補腎正補肝也。有被

物所驚心跳不寧者。宜秘方

有心氣不足神不定而驚者。宜妙香散

古人謂肝無虛不可補。補腎正補肝也。有被

虛受風卧若驚狀者。宜珍珠母丸

有血虛而驚者。宜殊砂

有由痰盛而驚者。宜加味定志丸

有思慮過度者。

宜清心補血湯

有氣血俱虛者。宜養心湯皆當求

其端而治之而驚始可安矣。

脈法

脈訣曰心中驚悸脉必結代。

正傳曰寸口脉動而弱。

動爲驚弱爲悸。又曰肝脉動暴有所驚駭。

得效曰驚則脉顫

顫者動也。

入門曰驚傷胆則脉動。

驚病形症

內經曰血并于陰氣并于陽故爲驚狂。

綱目曰

驚者心卒動而不寧也。

三因曰因事有所大驚而成者名曰

心驚胆攝。病在心胆經。其脉必大動。丹溪曰。驚悸者。有時而作。大概屬血虛。與痰瘦人多是血虛。肥人多是痰飲。時覺心跳者。亦是血虛。入門曰。驚悸因思慮過度。及大驚恐而作。甚則心跳欲厥。又曰。驚悸當補血安神。宜靜神丹寧志元。若氣鬱驚悸。宜交感丹加味四七湯。正傳曰。心虛而痰鬱。遇險臨危。觸事喪志。使人有惕惕之狀。是爲驚悸。

悸者。心痺病也。非緣外有所觸。自然跳動不寧。其原由水衰火旺。故心胸躁動。宜天王補心丹。或水停心下。心爲火而惡水。故築築跳動不自安。宜茯苓飲子。半夏麻黃湯。或汗吐下後。正氣虛而悸不得卧。宜溫胆湯。此皆悸病之由也。總而論之。要不外乎心傷火動。火鬱痰生二語。其爲症狀。舌強恍惚。善悲。丹溪以血與痰槩之。虛宜天王補心丹。可以識。

其端矣。

悸病形症 仲景曰心悸者水懼火也。惟腎欺心故爲悸。傷寒飲水多必心下悸。又曰食少飲多水停心下甚者則悸。微者短氣三因曰五飲停蓄閉于中腕使人驚悸屬飲家 綱目曰水飲爲症必頭眩心悸

悲者心肝兩虛病也。凡人心氣虛神失所守。肝虛又不能生之。則志不能伸。已無暢遂之致。而金來乘木。肺氣復與相并。肺本主悲。故遂生悲病也。所謂善悲者不必寔有可悲之事。心中只是怏悒不快。雖遇可喜亦祇強爲歡笑而已。宜加味溫胆湯
安神補心湯

脉法 得效曰悲則脉結。或云緊。入門曰悲傷心包。則脉必緊。

悲病原由 內經曰肺在志爲悲。又曰心虛則悲。悲則憂。又曰精氣并于肺則悲。又曰悲則氣消。又曰肺主殺。故其志爲悲。

靈樞曰悲憂動中則傷魂。又曰悲哀動中者竭絕而失生。

恐者心腎肝胃病也。心藏神。神傷則心怯而恐。火傷水也。胃屬土。腎屬水。土邪傷水則爲恐。肝者腎之子。水強則胆壯。水衰則血虛。故易恐。而恐者又腎之情志。故心肝胃三經皆有恐病。其原莫不由乎腎也。此則內經之旨也。故恐病由心者宜鎮其神。宜定志丸。琥珀犀角 龍齒等 恐病由胃者宜壯其氣。宜四君子湯。加金銀箔。琥珀犀角 紅花等 恐病由膽與肝者宜養其陰。宜酸棗仁湯去黃芪蓮肉加山萸丹皮白芍。湯加茯苓 恐病由腎本經傷者宜壯其水。宜參散去肉桂。人參 加牛膝遠志。

脉法 得效曰恐則脉沉。入門曰恐傷腎則脉必沉。脉經曰人恐怖其脉何狀。師曰脉形如循絲纍纍然。其面白脫色也。又曰人愧者其脉何類。師曰脉浮而面色乍白乍赤也。恐病原由 內經曰腎在志爲恐。又曰胃爲恐。註云胃熱則腎。

氣微弱。故爲恐。又曰。精氣并于腎。則恐由心虛而腎氣并之。故爲恐。靈樞曰。足少陰之脈病。善恐。又曰。恐懼而不解。則傷精。又曰。恐者。神散蕩而不收。又曰。恐則氣下。註云。上焦固禁。下焦氣還。故氣不行矣。子和曰。肝藏血。血不足。則恐。綱目曰。恐與驚相似。然驚者。爲自不知也。恐者。爲自知也。蓋驚者。聞響乃驚。恐者。自知如人將捕之狀。及不能獨自坐。不能獨自卧。或夜必用燈者。是也。

喜者心肺二經病也。凡人心有所樂。則動。動而其氣達于外。爲喜。其氣卽肺氣也。肺氣舒鬯。喜迺以成。然是喜也。或觸乎事。或因乎境。爲情之正。中庸所謂喜怒哀樂發而皆中節。謂之和者。是也。若過其節。則情蕩而不能收。心肺二臟俱傷矣。二臟既傷。而病于是作矣。宜定志。尤加顧安。可逞情怒。志爲哉。

脈法 得效曰喜則脈散 入門曰喜傷心則脈虛

喜病原由

內經曰心在志爲喜。又曰心寔則笑。笑則喜。

鰲按 心寔

者邪氣寔于心也。邪氣或痰或火是也。

又曰暴喜傷陽。又曰喜怒傷氣。又曰喜怒

不節。寒暑過度。生乃不固。又曰喜則氣緩。蓋喜則氣和。志達。榮

衛通利。故氣緩矣。靈樞曰喜樂者。神蕩散而不藏。又曰喜樂無極則傷魄。魄爲肺神也。

怒者肝膽病也。怒本情之正。惟發不中節。則肝膽之氣橫逆。而二經遂傷。且木盛。克土。久必傷脾。怒所以爲病也。程子云。因是人有事而怒之。聖人之心本無怒。如此用怒。便是情之正。便是發而中節之和。豈至成病。今所謂怒者。以肝胆屬木。木性本直。木勢必伸。稍有所鬱。不能遂其直達之性。不能順其上伸之勢。因激而成怒。則此怒已非情之正。已非中節之和。卽其怒已。是病。况木

鬱則激。激則橫。橫則變。生諸症。有不可意計測者矣。程子又云。治怒爲難。惟克己可以治怒。此聖賢治怒之法也。余亦云。治怒爲難。惟平肝可以治怒。此醫家治怒之法也。言肝而胆在其中。宜香甘散

脉法 得效曰怒則脈激。入門曰怒傷肝則脈必濡。

怒病原由 內經曰。肝在志爲怒。又曰。暴怒傷陰。又曰。大怒則氣絕而血菀于上。菀鬱也 使人薄厥。又曰。血并于上。氣並於下。心煩惋善怒。又曰。怒則氣逆。甚則嘔血及飧泄矣。又曰。膽爲怒綱目曰。怒在陰陽。爲陰閉遏而不得伸也。

憂者肺與脾病也。肺居華蓋之頂。下通心肝之氣。心有所愁苦而不樂。則上薄乎肺而成憂。故憂爲肺病。肺與脾同稱太陰。同行氣以給衆臟。肺既成憂病。則閉結不解。氣固于內而不通。氣不通。則大小便閉而傷脾。故憂又爲脾病。宜靜神丹歸脾湯

脈法 得效曰憂則脈濇 入門曰憂傷肺 則脈必濇

憂病原由

內經曰肺在志爲憂 又曰憂則氣沉

靈樞曰愁

憂不解則傷意 意爲脾神也 又曰憂則隔塞 否閉 氣脈斷絕而上下不通也

思者脾與心病也 脾之神爲意 意者心之所發也 由發而漸引焉
曰思則當其發屬在脾 及其思屬在心 故元晏先生曰思發于脾
而成于心也 中庸曰有弗思思之弗得弗措 論語曰君子有九思
孟子曰心之官則思 是思固不可不用者 然思之太過則流蕩失
節 必至傷神 神傷百病 雜集矣 其何以堪 故或有勞心思慮損傷
精神 致頭眩目昏 心虛氣短 驚悸煩熱者 宜清心
心神不足而不能寐者 宜養心湯 有憂思過度 令人惕然心跳動而不
自安者 宜靜補血湯 有思慮傷心致

宜靜

神丹

宜養

心湯

宜清心

補血湯

宜清心

補血湯

宜清心

補血湯

宜清心

補血湯

宜清心

補血湯

宜清心

不祥者。

宜定志丸

有思慮太甚。心血耗散。竟至怔忡恍惚者。

宜益榮湯有因

思勞傷心脾。致健忘失事。言語顛倒如痴者。

宜歸脾湯

有思力太猛。心

神失守。致痰涎聚于心包。漸成痴癲者。

宜加味茯苓湯

凡此皆思之病也。

皆過用其思之病也。

乃若過用其悲憂恐懼。病亦有類于此者。

治

法大約可以相參。

脉法 得效曰。思則脈沉。一云結。入門曰。思傷脾。則脈必結。又曰。凡七情之脈。惟氣口緊盛而已。細分之。乃有如此等項之不同也。

思病原由。內經曰。脾在志爲思。又曰。思則氣結。註云。繫心不散。故氣亦停留而結也。靈樞曰。因志而存變謂之思。因思而遠慕謂之慮。又曰。怵惕思慮則傷神。神蕩則恐懼流淫而不止也。

治驚方十四

控涎丹

去痰
姜湯下

甘遂
大戟

白芥子
等分糊丸淡

溫膽湯

驚屬
甘草

半夏
姜

枳壳
竹茹
陳皮
茯苓

黃連安神丸

大驚
黃連

硃砂
生地

甘草
歸頭

秘方

物驚
熱食之
大效

猪心一个劈開入硃砂子內紙包火煨

硃砂安神丸

血虛
當歸二錢半

黃連六錢
硃砂一錢半

甘草
生地各三錢半
蒸餅九黍米大

津唾嚙二三十丸

加味定志丸

痰盛
人參一兩

茯苓三兩
琥珀

遠志
麝金各五錢
硃砂爲衣

清心補血湯

思慮
麥冬

川芎
人參

當歸
茯神
白芍
陳皮
生地
山梔
炙草

妙香散

神虛
黃芪

麝香一分
山藥

茯苓
茯神各一錢
木香二分半
人参

桔梗

甘草各五分

硃砂三分

珍珠母丸

肝虛受風

珠母

熟地

當歸

人參

棗

硃砂爲衣

蜜丸

薄荷金銀器煎湯

下三錢

沉香

龍齒

柏子仁

養心湯

氣血虛

茯苓

茯神

當歸

生地

姜遠

靜神丹

養血

黃芪各八分

柏子仁

川芎

棗仁各

分

七分

半夏曲六分

炙甘草

肉桂各三分

分

五味子十四粒

停水恆仲加赤苓

硃砂二錢

梔榔

分

牛黃一錢

金箔十五片

姜遠志

茯神各

分

石菖蒲

黃連各二錢半

猪心血

和丸添

分

米大金箔爲衣燈

金箔十五片

硃砂二錢

梔榔

分

又人參

赤苓

山梔

琥珀

當

歸

酒遠志各五錢

乳香

硃砂

分

石菖蒲各二錢半

蜜丸棗湯下三十丸

當

分

交感丹

氣篩

香附一斤

長流水浸三日炒

茯神四

分

兩

蜜丸彈子大

每一丸細嚼再以製香附

茯神四

分

神甘草各一錢水

煎名降氣湯送下

當

分

加味四七湯

茯神

半夏二錢

赤苓

厚朴各一錢二分

分

分

蘇葉各八分

姜遠志

炙甘草各五

分

姜七片

棗二枚

石菖蒲半寸

分

治慳方五

天王補心丹

水衰火旺
五味子

人參
麥冬

當歸
丹參

天冬
元參

柏子仁
茯苓

棗仁
蜜丸

遠志
桔梗

生地

黃連

蜜丸

茯苓飲子

水停
枳榔

沉香

甘草

麥冬

赤苓

半夏

橘紅

半夏麻黃丸

又錢

半夏

麻黃

等分

蜜丸日三服每服一

溫胆湯

正虛
甘草

半夏
姜

東

枳

寒

陳皮

茯苓

竹茹

辰砂遠志丸

痰涎
各

五錢

辰砂

遠

志

人參

茯神

石菖蒲

桂枝
細辛

川芎

山藥

鐵粉

麥冬

白附子

半夏

生姜
五兩

打汁入水

煮糊丸

珠砂爲衣

臨卧姜

湯下一錢

治悲方二

加味溫胆湯

總治

半夏

枳實

竹茹各八分

香附二

片胡

柴

胡

麥冬

桔梗

各六分

甘草四分

即參

胡溫胆湯

心

慳方

悲方

恐方

喜方

卷六

舌

安神補心湯

當歸
麥冬二錢

生地
黃芩各一錢

遠志
白芍
白朮各一錢

棗仁各八分

川芎七分

元參五分

甘草三分

治恐方四

定志丸

心恐
白朮

人參
麥冬

菖蒲
硃砂

茯苓

遠志
黃芪

蓮肉
陳皮

人參
甘草

四君子湯

胃恐
當歸

人參
茯苓

白朮
茯苓

甘草

酸棗仁湯

肝恐
當歸

棗仁
茯苓

遠志
茯神

黃芪
陳皮

蓮肉
甘草

人參
姜

棗仁
甘草

人參散

腎恐
山萸

人參
五味子

枳壳
杞子各七錢半

桂心
柏子仁

甘菊
柏子仁

熟地各一兩

共爲末酒下二錢

治喜方一

定志丸

總治
白朮

人參
麥冬

菖蒲
硃砂

茯苓

遠志
黃芩

人參
甘草

桂心
柏子仁

治怒方一

香甘散

治憂方二

總治
白湯下

香附 甘草各一兩 共爲末每三錢

靜神丹

總治
五錢

酒當歸 酒生地 姜遠志 茯神各

菖蒲 黃連各二錢半 珠砂二錢

歸脾湯

又
三分

牛黃一錢 猪心血丸添米大金箔十五片爲
衣燈心湯下五十丸

治思方七

清心補血湯

損傷
棗仁

人參一錢二分
麥冬各一錢

當歸 川芎 生地 黑山

梔子

炙甘草 陳皮各五分

川芎 五味子十五粒

養心湯

不寐
蜜黃芪

茯苓 茯神
姜遠志各八分

當歸 柏子仁 川芎
生地各一錢

此方一名補血湯

又名當歸飲

甘草 各七分
內桂各三分

半夏麴六分

人參五分
川芎

五味子十四粒

姜三
片

靜神丹

心跳 酒當歸 酒生地 姜遠志 茯神各

五錢 菖蒲 黃連各二錢半 辰砂二錢

牛黃一錢 猪心血丸 桃米大金箔十五片爲

衣燈心湯下五十九

定志丸

恐怯

姜遠志各二兩

砂一兩半爲衣

菖蒲

琥珀

辰砂

柏子仁

蜜丸

益榮湯

恍惚

黃芪

當歸

小草

棗仁

木香

柏子仁

木香

歸脾湯

傷心脾

當歸

龍眼

棗仁

遠志

人參

柏子仁

木香

加味茯苓湯

痰聚

人參

半夏

陳皮

各一錢半

益智

茯苓

香附

仁

香附

各一錢

甘草

五分

姜三

烏梅

一个

煩躁健忘源流

沈金鰲撰

煩躁心經熱火病也。內熱心煩曰煩。故煩者。但心中鬱煩也。外熱身躁曰躁。故躁者。并身外熱躁也。內熱屬有根之火。其原本于熱。凡但煩不躁。及先煩後躁者。皆易治。外熱屬無根之火。其原本于寒。凡但躁不煩。及先躁後煩者。皆難治。傷寒亦有煩躁症。其所主屬肺腎二經。與此心經主病者不同。故傷寒之煩氣也。火入于肺也。傷寒之躁血也。火入于腎也。若諸虛煩熱。又與傷寒相似。但不惡寒。身頭皆不痛。脉不緊。數耳。切不可汗下。誤攻必害。茲卽心經所主。煩躁而歷言之。有身不熱。頭昏口乾不寐者。是心虛煩。宜人葉湯有煩熱誤汗。熱益甚。致嘔者。宜陳皮湯有內熱頭痛。氣短心悶亂者。宜竹茹湯有煩熱。睡卧不寧者。宜遠志湯有憂思成虛煩勞病者。宜小草湯有腎虛心躁。煩下部瘦弱。小便痛者。宜八味丸其不得一例視之也。明矣。若

夫傷寒煩躁另詳本條。

煩躁原由。內經曰。夏脈者。心也。不及則令人煩心。又曰。肝虛腎虛脾虛。皆令人體重煩冤。

健忘。心腎不交病也。心不下交于腎。則濁火亂其神明。腎不上交于心。則精氣伏而不用。火居上。則因而爲痰。水居下。則因而生躁。故惟補腎而使之時。上養心而使之善。下。則神氣清明。志意常治。而自不健忘矣。其爲症可枚舉也。或思慮過度而病在心脾。宜引神歸丹或精神短少。宜人參或痰迷心竅。言語如痴而多忘。宜導痰湯送下或素多痰飲。苓湯或疾迷心竅。言語如痴而多忘。宜養榮湯或上盛下虛心火不降。腎水不升。神志不寧。宜朱雀丸或勤政勞心。讀書刻苦。宜安志。或稟賦陰魄不足。神志虛擾。宜定志丸。孔聖枕中丹或年老神衰而善忘。

宜加減固本丸。健忘之故。約畧盡矣。而世俗相傳有治健忘秘法。用菖蒲。

遠志等分爲末。戊子日服二錢。令人不忘。又一法擇丁酉日密自至市買遠志。着巾角中爲末。服之勿使人知。能不忘。未知何如。姑記以備採擇。

健忘原由症治 灵樞曰上氣不足下氣有餘。腸胃寔而心肺虛。虛則榮衛留于下。久之不以時上。故易忘也。又曰腎盛而不止則傷忘。志傷則漸忘其前言。內經曰血并于下氣并于上。亂而善忘。丹溪曰健忘精神短少者多亦有痰者。入門曰怔忡久則健忘。由心脾血少神虧也。醫鑑曰健忘者陡然而忘其事。盡心力思量不來也。主心脾二經。治法必先養心血。理肝土。以甯神定志藥調理之。

治煩躁方六

人參竹葉湯 心虛 竹葉 人參
冬石膏 梗米 甘草 熟半夏
健忘 煩躁方 或去石膏加茯苓淮 小麥
卷六 麥門

亦可

陳皮湯

調汗 陳皮 甘草 人參 竹茹

竹茹湯

內熱 麥冬 小麥 灸甘草 人參 熟半夏 茯苓 竹茹

遠志湯

煩熱 遠志 黃芪 當歸 麥冬 人參
金石斛 茯神各七分 甘草五分 甚者加
竹葉 知母

小草湯

憂思 腸虛 小草 黃芪 當歸 麥冬 金石斛
各一錢 人參 薏仁 各錢二分 灸甘草五分
分 加竹葉

八味丸

腎虛 熟地 山萸 山藥 丹皮 茯苓
澤瀉 肉桂 附子

治健忘方十三

引神歸舍丹

心脾 胆星二兩 硫砂一兩 附子七錢
猪心血九蒸米大每五十九萱草根湯下

歸脾湯

神 痘飲 半夏 陳皮 茯苓 甘草 姜 荸
龍眼 人參 黃芪 木香 甘草 姜 荸
遠 快飲 夏 附子 附子 附子 附子 附子
益智仁 人參各一錢 陳皮 茯苓 甘草 姜 荸
茯苓湯

導痰湯

痰迷
甘草

半夏
姜

南星

赤苓

枳實

陳皮

壽星丸

又
當歸

姜遠志
生地

人參

黃芪

白术

甘草

加減固本丸

老人
草

熟地
天冬各一兩半

麥冬

炙甘

石菖蒲

遠志

硃砂各五錢

蜜丸

此方兼治中風後善忘

人參

石菖蒲

人參養榮湯

神短
肉桂

白芍一錢半

人參

黃芪

陳皮

白术

養心丹

子上盛

天冬

麥冬

菖蒲

遠志

白术

熟地

人參

茯神

牛膝

當歸

黃芪

上虛

龍眼

丹參

人參

遠志

麥冬

心腎不交

黃芪

甘草

升麻

柴胡

黃芪

沉香一兩

茯神四兩

人參三

朱雀丸

兩

蜜丸

健忘方

心

健忘

方

卷六

三

安神定志丸

勞心
遠志

人參

白术

茯苓

茯神

菖蒲

菖蒲

麥冬

東仁

半黃

硃砂

龍眼核

龍眼核

膏加蜜

丸日

三服

定志丸

稟弱
遠志各二兩

人參

茯苓

茯神各三兩

菖蒲

孔聖枕中丹

又

鼈甲

龍骨

遠志

菖蒲

蜜丸

菖蒲

不寐多寐源流夢魘

沈金齋撰

不寐。心血虛而有熱病也。然主病之經雖專屬心。其寢五臟皆兼及也。蓋由心血不足者或神不守舍故不寐。宜歸脾湯琥珀養心丹有由肝虛而邪氣襲之者必至魂不守舍故卧則不寐怒益不寐以肝藏魂。肝主怒也。宜珍珠母丸有由真陰虧損孤陽漂浮者水虧火旺火主平動氣不得寧故亦不寐何者肺爲上竅居陽分至高腎爲下竅居陰分最下肺主氣腎藏氣旦則上浮于肺而動夜則下入于腎而靜仙家所謂子藏母胎母隱子宮水中金也若水虧火旺肺金畏火不納腎水陰陽俱動故不寐法宜清熱宜六味丸加知柏有由胃不和者胃之氣本下行而寐亦從陰而主下非若寤之從陽主上今胃氣上逐則壅於肺而息有音不得從其陰降之道故亦不寐宜

紅甘草金石斛茯苓半夏神曲山楂

總之不寐之由在肝則不快之狀多見左在肺

則不快之狀多見右。在心則不快之狀多見于上部之中。在胃則

不快之狀多見于胸腹之中。在腎則不快之狀多見于下部之中。

須分經而治。若因雜症所致及傳經移邪又當細究試詳言之。

勞心之人多不寐。宜養心湯治之。年高之人多不寐。宜四君子湯加黃芪棗仁。痰多之人

多不寐。宜安臥胆湯。虛煩之人多不寐。宜酸棗仁湯。此其大較也。而亦有通宵

不寐者。宜神湯。有寐卽驚醒者。宜龍甲湯。有喘不得寐者。宜蘇子羨活湯。有

虛勞煩熱不寐者。宜棗半湯。有肝虛驚悸不寐者。宜四君子湯加白芍。有大病

後虛煩不寐者。宜二陳湯加芡實竹茹。有方卧卽大聲鼾睡。少頃卽醒。由於

心肺有火者。宜加味養心湯。有不能正偃。由於胃不調和者。宜和胃湯兼肺氣

盛。必瀉肺。宜參用瀉白散。有勞心膽冷。夜卧不寐者。宜定志元加棗仁柏

溫。或加味溫胆湯。有癲狂病發。火盛痰壅不寐者。宜砂散。有傷寒吐下後虛煩

不寐者。宜酸棗仁湯。有心膽俱怯。觸事易驚。夢多不祥。虛煩不寐者。宜溫

胆

有失志鬱抑痰涎沃心。怔忡不寐者。

宜溫胆湯加味。

胆湯加味。

二陳湯有思慮。

湯。

過度因脾主思致脾經受邪。兩手脈緩經年累月不寐者。宜益氣。

有神氣不寧。每卧則魂魄飛揚。覺身在床而神魂離體。驚悸多驚。

通夕不寐者。此名離魂症。由肝藏魂。肝虛邪襲魂。無所歸故飛揚。

離體也。宜前後服珍珠母丸獨活湯。

不寐之症狀固如此其多矣。蓋可忽乎哉。

總之怔忡以下諸病都緣痰涎沃心。心氣不足以至變生種種。若

涼心太過則心火愈微痰涎愈盛漸至難治故必以理痰順氣養

心安神爲第一義。

不寐原由形症。靈樞曰壯者之氣血盛。其肌肉潤氣道通。榮衛之行不失其常。故晝精而夜瞑。老者之氣血衰。其肌肉枯氣道澀。五臟之氣相搏。其榮氣衰少而衛氣內伏。故晝不精而夜不眠。內經曰人有卧而有所不安者。藏有所傷及精有所倚。

人不能知其病則卧不安。又曰肺者藏之蓋也。肺氣盛則肺大。不能偃卧。又曰胃不和則卧不安。夫不得卧而喘也是水氣之害也。鄭康成曰口鼻之呼吸爲魂。耳目之聰明爲魄。以耳目與口鼻對言。則口鼻爲陽。耳目爲陰。以耳目口鼻與藏府對言。則耳目口鼻爲陽。藏府爲陰。故陽氣行陽分二十五度于身體之外。則耳目口鼻皆受陽氣。所以能知覺視聽動作而寤矣。陽氣行陰分二十五度于藏府之內。則耳目口鼻無陽氣運動。所以不能知覺而寐矣。圓春曰。傷寒及雜病多睡者。陽虛陰盛也。無睡者。陰虛陽盛也。喜明者。屬陽。元氣寔也。喜暗者。屬陰。元氣虛也。睡向外者。屬陽。元氣寔也。睡向壁者。屬陰。元氣虛也。綱目曰。人卧則血歸于肝。今血不靜。卧不歸肝。故驚悸而不得

卧也。

多寐心脾病也。一由心神昏濁不能自主。一由心火虛衰不能生

土而健運。其原有如此者。試言其症狀。體重或浮而多寐。濕勝也。

宜平胃散加食方已。卽困倦欲卧。脾氣弱不勝食氣也。俗名飯醉。

宜六君子湯加山楂神曲麥芽。四肢怠惰而多寐。氣弱也。宜人參

湯加益氣湯

長夏懶怠四肢無力。坐定卽寐。肺脾兩經之氣本弱。復爲炎暑所逼也。

宜清暑益氣湯

病後多眠。身猶灼熱。餘邪未清。正氣未復也。宜沈氏歲時湯。狐惑症舌白齒

晦。面目乍白乍赤。乍黑變異。無常。四肢沉重。默默多眠。大病後腸

胃空虛。三更求食。食人五臟。食其喉則爲惑。其聲啞。上唇必有瘡。

宜三黃

湯食其肝則爲狐。其咽乾。下唇必有瘡。

宜雄黃銳散

此症殺人甚

急當急治也。通用宜黃連犀角湯治惑桃仁湯。

風溫陽脉浮滑。陰脉濡弱。發熱咽喉乾口苦。微惡寒。閉目欲眠。少陰伏邪發出。更感太陽客邪也。

宜芩湯

加桂枝石膏甚。亦有陰陽俱浮。具如前症。太陽受邪。悞發汗也。宜黃

則葛根湯加減。麻桂枝湯加減。亦有陰陽俱浮。具如前症。太陽受邪。悞發汗也。宜黃

黃升麻湯去二麻。熟病得汗後。脉沉細。身冷喜卧。脉沉細。昏沉不省。陽氣遏也。急與藥令四肢溫煖不爾。有熟睡死者。宜四逆湯傷寒諸般多寐症。各詳本條。茲不贅。惟汗下後酣眠者。爲正氣已復。可勿藥也。醫者察其由。治其症。神而明之。其庶幾矣。

多寐原由形症。靈樞曰。足太陽有通項入于腦者。正屬目。本名曰眼系。在項中兩筋間入腦。乃別陰蹻。陽蹻。陰陽相交。陽入陰。陰出陽。交于目內。皆陽氣盛則瞑目。陰氣盛則瞑目。又曰。腸胃大則衛氣行。留久皮膚濕。則分肉不解。其行遲。夫衛氣者。晝行於陽。夜行於陰。故陽氣盡則寐。陰氣盡則寤。故腸胃大則衛氣留久。皮膚濕分肉不解。則行遲。留于陰也。久其氣不精。則目瞑。故多卧矣。入門曰。衛氣不得入於陰。常留于陽。留于陽。則陽氣滿。陽氣滿。則陽蹻盛。不得入于陰。故目不瞑。衛氣留于

陰不得行于陽。留于陰。則陰氣盛。陰氣盛。則陰蹻滿。不得入于陽。故目閉。

夢者。神與魂魄病也。心藏神。中虛不過徑寸。而神明居焉。故心者。神明之舍。而神卽精氣之所化成。靈樞經曰。兩精相薄。謂之神。隨神往來。謂之魂。並精出入。謂之魄。是神、魂、魄三者。固非判然不相屬者也。自人心多欲。神明外馳。因而氣散于內。血隨氣行。榮衛紛亂。魂魄不安。于是乎百疾作。疾作者。神離故也。故太上貴養神。其次。纔養形。凡欲神之存乎舍也。凡欲神之存乎舍。而百疾不作也。若夫夢者。亦神不安之一驗耳。凡人形接。則爲事。神遇。則爲夢。神役乎物。則魂魄因而不安。魂魄不安。則飛揚妄行。合目而多夢。又况七情擾之。六淫感之。心氣一虛。隨感而應。諺云。日之所接。夜之所夢。洵有然也。宜別離散益氣安神湯若古之真人。其寢不夢。非神存之故。

哉。夢而魘。則更甚者。或由心寢。則夢驚憂奇怪之事。而魘。宜靜神丹。或由心虛。則夢恍惚幽昧之事。而魘。宜清心補血湯。甚有精神衰弱。當其睡卧。魂魄外遊。竟爲鬼邪侵迫。而魘者。此名鬼魘。宜雄朱散。另詳邪祟條中。甚矣。夢非細故也。其如太上之養神而可哉。

五藏虛寢爲夢。內經曰。肝氣虛。則夢菌香。生草寢。則夢伏樹下。不敢起。心氣虛。則夢救火。陽物寢。則夢燔灼。脾氣虛。則夢飲食不足。寢。則夢築垣蓋屋。肺氣虛。則夢見白物。見人斬血藉藉。寢。則夢兵戰。腎氣虛。則夢舟船溺人。寢。則夢伏水中。若有所畏恐。

淫邪成夢。靈樞曰。陰氣盛。則夢涉大水。而恐懼。陽氣盛。則夢大火。而燔灼。陰陽俱盛。則夢相殺。上盛。則夢飛。下盛。則夢墮。甚饑。夢取甚飽。夢與肝盛。夢怒。肺盛。夢哭泣。心盛。夢善笑。恐畏。脾

盛夢歌樂身體不舉。腎盛夢腰脊兩解不屬。又曰厥氣客于心則夢邱山烟火。客于肺則夢飛揚見金鐵奇物。客于肝則夢山林樹木。客于脾則夢邱陵大澤壞屋風雨。客于腎則夢臨淵沒居水中。客于膀胱則夢遊行。客于胃則夢飲食。客于大腸則夢田野。客于小腸則夢聚邑街衢。客于胆則夢訟鬪自剗。客于陰器則夢接內空。客于項則夢斬首。客于脰則夢行走而不能前。及居深地竈苑。客于股肱則夢斬首。客于胞腹則夢溲與便。

魂魄爲病 仲景曰邪客使魂魄不安者血氣少也。血氣少者屬於心。心氣虛者其人多畏合目欲眠。夢遠行而精神離散。魂魄妄行。

歸脾湯

心血少 人參 黃芪 當歸

龍眼 遠志 茄仁 龍齒

遠志 茄仁 柏子仁 黃連

人參 生地 茄仁 姜棗

當歸各 木香 遠志 甘草

白术 茄神

琥珀養心丹

又 琥珀 琥珀

龍齒 茄蒲

柏子仁 黃連

人參 生地 茄仁

當歸各 木香 遠志

白术 甘草 姜棗

珍珠丸

肝虛 肝虛 茄神 珍珠

麝香各三錢

熟地

當歸各

犀角

兩半 茄神

沉香各五錢

柏子仁各一錢

冰片一錢

虎睛一

薄荷

對 沉香各五錢

柏子仁各一錢

冰片一錢

虎睛一

薄荷

荷

六味丸

陰虧 熟地八兩 丹皮 茄苓 澤瀉各三兩

山藥

山萸各四兩

丹

丹

養心湯

勞心 半夏 遠志 陳皮

當歸

黃芪

川芎

五味

柏子仁 姜

棗

六君子湯

高年 陳皮 陳皮 半夏 茄苓 白朮

山萸

山萸

炙草

半夏

溫胆湯

痰多 竹茹 陳皮 半夏 茄苓 白朮

山萸

山萸

炙草

枳實

半夏

酸棗仁湯

虛知母 石膏二錢半 甘草各一錢

赤芩

人參

棗仁各錢半

內桂五分

姜

安卧如神湯

通宵

茯苓

茯神

白术

山藥

寒水石

硃砂

東仁各一錢

遠志

炙草各七分

川芎

五味

鼈甲羌活湯

驚醒

鼈甲

東仁

羌活

獨活

川芎

蔓荆子

人參

甘草

黃芪

牛膝

五味

蘇子竹茹湯

喘氣

蘇子

竹茹

橘皮

桔梗

甘草

六一散

煩躁

滑石

甘草

棗半湯

虛煩

棗仁二兩研極細入水二杯取汁

半夏二合煮爛入地黃汁一合更煮時時呷之

四君子湯

肝虛

人參

茯苓

白朮

甘草

二陳湯

病後

茯苓

陳皮

半夏

甘草

加味養心湯

心肺火

茯苓

茯神

黃芪

半夏

歸身

川芎各二錢半

炙甘草二錢

柏子仁

五味子

棗仁各一錢

加羚羊角犀角俱磨冲

遠志二分

肉桂二分

人参二分

五味子二分

棗仁二分

加羚羊角犀角俱磨冲

和胃湯

胃不和

瀉白散

肺盛 鈴山

桑皮 地骨皮

黃芩 煙心

桔梗 馬兜

竹葉 元

參連喬

定志丸

胆冷 姜遠志

人參 各二兩

茯苓 茯神

各三兩

菖蒲

蜜丸

炒棗

半

辰砂散

仁各五錢 瘫狂

上好辰砂

一兩

乳香

光瑩者

共爲細末

先量病人酒量幾何

置

病人靜室中以藥作一服溫酒調下飲至沉醉
但勿令吐如不飲隨量取醉服訖令卧蓋好病
淺者半日至一日病深者三日熟睡令人潛

伺之勿驚勿喚待自醒卽神魄定矣萬一驚覺

不可復治

加味溫膽湯

失志 夏胡片

香附 麥冬

橘紅 枳實

四分 柑皮各八分

人參

茯苓

柴桔梗各六分

甘草四分

姜三

加味二陳湯

又

益氣安神湯

傷脾

當歸

茯苓各一錢

生地

麥冬

人參

黃芪

胆星

棗仁

遠志

甘草

黃連各四分

姜三

棗二

竹葉各

真珠母丸

離魂 真珠母七錢半 熟地當歸各一兩
人參 桂仁 柏子仁 犀角 茯神各

一兩 沉香 龍齒各五錢 蜜丸硃砂爲衣
每四五十丸薄荷湯下日二服 此方真珠母
爲君龍齒佐之真珠母入肝經爲第一龍齒與
肝同類龍齒虎睛人皆以爲鎮心藥不知龍齒
安魂虎睛定魄龍能變化故魄遊而不定虎能
專靜故魄止而有守魄不甯者宜用虎睛魄飛
揚者宜用龍齒

獨活湯

又 獨活 羌活 人參 前胡 細辛 半
夏 沙參 茯苓 桂仁 甘草 五味子各
七分 姜三片 烏梅一个

治多寐方十

平胃散

濕勝 蒼朮 厚朴 陳皮 甘草

六君子湯

脾弱 陳皮 人參 茯苓 白朮 炙草 半夏

人參益氣湯

氣弱 黃芪一錢半 人參 防風 升麻各
七分 熟地六分 生地 白芍各五分 生

草一分 炙甘草三分 五味子二十粒 肉桂二分

不寐方 多寐方 夢方

卷六

三五

清暑益氣湯

暑倦

蜜炙黃芪一錢

人參六分

姜炒白

木

麻油炒蒼朮

醋炒升麻

神曲

陳皮

各五分

炙草

當歸

來

黃柏各三分

澤瀉

青皮各

二分

徐徐服

沈氏葳蕤湯

病後

葳蕤

茯苓

棗仁

石膏各一錢

苦參

黃連各二錢

共余自製

方也用之頗效

三黃瀉心湯

狐惑

大黃

黃連各二錢

黃芩一錢

共

粗末以麻沸湯

一盞浸之良久去渣分溫再

服

雄黃銳散

又桃仁一錢

雄黃

青箱子

苦參

黃連各二錢

共爲末以生艾汁和如棗核大綠

綿裹納下部如無生艾卽以乾艾五錢煎濃汁

代之

黃連犀角湯

又

黃連一錢

犀角

烏梅

木香

桃仁各一

治惑桃仁湯

又

桃仁

生槐子碎

艾葉各二錢

四逆湯

熱病

治夢方五

別離散

總治 白朮一兩 天雄

內桂 乾姜 茴茴

根各五錢 苗芽葉

桑寄生各五錢 細辛

菖蒲各二錢 共爲末每取二錢空心白湯

當歸 生地各五錢 此方能治心風男夢

熟者去天雄 姜桂加知母

黃柏各三錢

益氣安神湯

又

仁

遠志

八分

甘草

人參

蜜黃芪

胆星 竹葉各

清心補血湯

夢魘

人參一錢二分

當歸

白芍

茯神

棗仁

川芎

生地

陳皮

山梔

炙甘草各五分

五味子十五粒

靜神丹

又 錢

菖蒲

黃連各二錢半

辰砂二錢

犀

黃一錢

金箔十五片

猪心血丸

黍米大金

箔爲衣燈心湯下五十丸

雄黃各一錢

硃砂五分每取

雄朱散


鬼魘牛黃

雄黃各一錢

硃砂五分每取

一錢

床下燒之再取一錢酒調灌下



沈氏尊生書卷七

雜病源流犀燭臘牘門

癲狂源流

沈金鰲撰

癲狂心與肝胃病也而必挾痰挾火癲由心氣虛有熱狂由心家邪熱此癲狂之由癲屬腑痰在包絡故時發時止狂屬臟痰聚心主故發而不止此癲狂之屬癲之患雖本於心大約肝病居多狂之患固根於心而亦因乎胃與腎此癲狂兼致之故經曰癲疾始生先不樂頭重痛視舉目赤啼呼喘悸反僵而及骨與筋脉皆滿若脈大滑久自已脈小堅急死不治蓋不樂者肝乘心也頭重痛肝氣上顛也視舉肝之目系急也目赤肝火上炎于竅也啼呼喘悸肝滿乘心而惑志失神也反僵急在筋也及骨與筋脉皆滿則與癲癲同但無止時也脈大滑久自已陽搏於陰而脉滑陰猶盛

也。小堅急死不治。肝之真臟見也。惟及骨與筋脉皆滿故。骨筋脉皆能患癲而症狀各異。故經曰。骨癲疾者。頤齒諸膾分肉皆滿而骨居。汗出煩冤。筋癲疾者。身拳攀急。脈癲疾者。暴仆。四肢之脉皆脹縱。脈滿若嘔。多沃沫氣下泄者。不治。蓋骨筋脉之癲皆癲病之所統。而及嘔多沃沫氣下泄。總承諸癲言之。凡患癲者。皆以如此而不治也。嘔多胃氣逆。沃沫脾運已弛。氣下洩。腎關不守。且二者俱無胃氣故不治也。經曰。狂之爲病。先自悲也。喜忘。善怒。善恐。少卧。不饑。已而自高賢也。自辯智也。自尊貴也。善詈罵。日夜不休。又好謗樂。妄行不休。多食。善見鬼神。此言心疾。或由於有所大恐大喜。大憂大驚。以至失神之爲患也。然而邪並於陽明亦能發狂。上屋登高呼棄衣走罵詈不避親疎。蓋邪者。熱邪也。陽明之部。心君所居。其部熱勢必及心。是以亦失神也。此言熱病也。君夫心腎不

交二陰二陽。兩傷之氣。交至則腎水空而龍火逆上。與陽明之熱交并。亦能惑志失神。而癲狂罵詈。所謂腎精不守。不能主理。使心火自焚也。此言虛病也。又有所謂怒狂者。陽氣因暴折而難决。少陽胆木。挾三焦相火。太陽陰火而上升也。古人治法。先奪其食。使不長氣于陽。飲以生鐵落湯。使金以制木。木平則火降也。此言陽厥病也。此癲狂之症候。王叔和云。陰附陽則狂。腰以上至頭。熱腰以下寒也。蓋陰氣不能治于內。則附陽而上升。陽無承而不下降。故上熱而下寒。陽附陰則癲。腰以下至足。熱腰以上寒也。蓋陽氣虛。不能衛于外。則附陰而下陷。故下熱而上寒。此癲狂陰陽相附之異。癲因謀望失志。抑鬱無聊而成。狂因陽氣遏抑。不能疏越而得。要必由心神耗散氣虛。不能勝敵。故痰與火得猖狂犯上而爲是。二疾此癲狂之原本相同。癲爲久病。狂爲暴病。癲病多喜狂病。

多怒癲。有時人不之覺。是癲之輕者。狂有時人不及防。是狂之驟者。癲病痰火。一時忽動。陰陽相爭。亦若狂之狀。狂病痰火。經久煎熬。神魂迷瞀。亦兼癲之狀。此癲狂之形勢。宜辨治。癲先以吐劑。湧去痰涎。宜控次進安神之劑。宜琥珀散治狂。先奪其食。次下其痰瀉其火。宜山楂丸此治癲狂之大要。而癲之病。有因驚得者。宜抱丸有因怒得者。宜寧神導痰湯有因心藏虛損。氣血不足者。宜清心溫胆湯有因痰迷心竅者。宜金箔鐵心丸有因痰火俱盛者。宜甘遂散有因思慮過度者。脾湯有因心經畜熱。或時煩躁。眼鼻覺熱者。宜芩連清心丸有因陰虧。不時暈倒。痰壅搐搦者。宜滋陰寧神湯有因心氣不足。神不守舍者。宜歸異狀者宜清心。有因久年癲疾。氣血俱耗者。宜活神丹有因大病後心虛神散。元氣羸弱者。宜歸丹有因痰火驟壅。發爲怪異。狀者。宜滾痰丸有因婦人而患癲。皆由血分不調。宜加味逍遙散或心發作止無常者。宜斷癰丹

風血迷之故。宜甘遂散狂之病。有因上焦實者。

宜生鐵有因陽明實者。

落飲

宜承氣湯有因熱入血室。狂不知人者。

宜牛黃

有因火盛而爲詳狂奔走者。

宜當歸承氣湯有因心經邪熱狂亂而精神不爽者。

宜牛黃瀉心湯

黃連瀉心湯

有因驚憂得之痰涎久留于心竅者。

宜鬱金丸

有因風涎暴作氣塞倒仆者。

宜泄散有因失魄狀若神靈所憑者。

宜朱丹

有因失心失志或思慮過多積成痰涎留在心包者。

宜葉氏雄朱丸

有因勞神太過致傷心血。

驚悸不甯若有人捕漸成心疾癲狂者。

宜辰砂

有因悲哀動中而傷魂魂傷則狂妄不精不精則不正當以喜勝之以溫藥補魂之

陽者。

宜驚氣丸

有因喜樂無極而傷魄魄傷則狂狂者意不存人當以

恐勝之以涼藥補魄之陰者。

宜鬱金丸苦參丸

有癲狂初起者。

宜甯化痰湯

有癲狂久不愈者。

宜鬱金丸

此治癲狂之詳法或緣痰火鬱結而癲狂有

宜清心丸或緣風痰迷心竅而癲狂。

宜鐵粉散

或緣癲狂而不

宜清心丸或緣風痰迷心竅而癲狂。

宜鐵粉散

或緣癲狂而不

得睡卧。宜辰砂散其或癲或狂均可審其原而以方治之。此治癲狂之通畧。

脈法 內經曰：癲疾脉搏大滑久自已。脈小堅急死不治。又曰：癲疾脉虛則可治寔則死。靈樞曰：凡脈急甚皆爲癲狂厥疾。脈訣曰：癲癇之脉浮洪大長滑大堅寔痰畜心狂。又曰：大堅疾者癲狂。得效曰恍惚癲狂寔大爲順沉細爲逆。

癲病原由 內經曰：癲得之于母腹中名爲胎病。其母有所大氣上而不下精氣并居故令子發爲癲疾也。又曰：厥成爲癲疾。又曰：邪搏陽爲癲疾。綱目曰：痰邪逆上頭中氣亂脈道閉塞孔竅不通故昏眩而倒仆也。以其病在頭巔故曰癲疾。又曰：大人曰：癲。小兒曰：癇。其寔一也。釐按大人亦有患病者。另詳諸癇條中。綱目以大人小兒分癲癇而

以爲寔屬一症恐非是。

癲與癇不同 綱目曰癲者異常也若平日能言癲則沉默平

日不言癲則呻吟甚而僵仆直視心常不樂言語無倫如痴如醉癇則卒然暈倒咬牙作聲吐涎沫不省人事隨後醒

癲癇又與中風不同 綱目曰癲癇仆時口中作聲將醒吐涎沫省後又發時作時止而不休息中風中寒中暑尸厥之類則仆時無聲省時無沫後不時發

狂病原由 內經曰怒生于陽也陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥又曰陽明病甚則登高而歌甚以四肢爲諸陽之本陽盛則四肢寔故能登高也棄衣而走以熱盛于身故欲棄衣也妄言罵詈以陽盛則使人罵詈不避也不欲食故妄走也又曰邪入于陽則狂又曰陰不勝其陽則狂

癲病異處 內經曰多喜曰癲多怒曰狂 難經曰重陰者癲

重陽者狂。入門曰癲者異常也。精神痴呆。言語失倫。狂者凶狂也。輕則自高自是。好歌好舞。重則踰垣上屋。又甚則不避水火。且欲殺人。此痰火壅盛而然也。直指曰。陽虛陰寔則癲。陰虛陽寔則狂。綱目曰。癲謂僵仆不省也。狂謂妄言妄走也。經有言狂癲疾者。又言癲病爲狂者。是癲狂爲兼病也。醫鑑曰。癲者。顛倒錯亂于癪。于狂皆兼病也。故有癲癪癲狂之名。

治癲方十五

控涎丹

主治

甘遂去心

大戟去皮

白芥子

等

琥珀散

又

杏仁

琥珀

人參

牡蠣

遠志

菖蒲

乳

甘遂散

因痰

開入末于內合以線縛

甘遂末一錢

砂末一錢和勻分作四

丸每一丸將所

燒化下如大便下惡物即止如不效再下一

丸

寧神導痰湯

因怒
甘草

南星
遠志

半夏
菖蒲

枳寃
黃連

竹茹
黃芩

朱砂
橘紅

抱胆丸

因驚
鉛一兩半

水銀二兩

硃砂

乳香各一兩

黑花子

金箔鎮心丸

痰迷
五錢

胆星一兩

天竺黃

琥珀

硃砂

黑花子

清心溫胆湯

心虛
白朮

陳皮

半夏

茯苓

枳寃

竹茹

歸脾湯

各一錢
白朮

菖蒲

香附

當歸

白芍

姜黃連

芩連清心丸

心熱
丹參

思慮
茯神

龍眼

麥冬八分

川芎

遠志

承氣湯

胃寒
丹參

大黃

牛黃

芒硝

枳寃

厚朴

滋陰寧神湯

陰虧
茯神

當歸

川芎

白芍

熟地

人參

甘草各五分

白朮

遠志

南星各一錢

酒黃連四分

姜三片

歸神丹

病後
蒸二炊久取出另研

當歸各二兩
金箔銀箔各二十片爲衣

丸至二丸
夢不卧

大塊硃砂二兩入豬心內燈草扎好酒
人參研
東仁
茯神

龍齒各一兩
姜遠志

酒糊丸每九
酒糊丸每九

清心導痰丸

瘦火
硝煅如金色

沉香二錢半
下六七十九

黃芩各四兩
犀角

皂角
麝香五分

水丸硃砂爲衣水

青礞石同研
硃砂各五錢

活虎丹

久癩
冰片麝香各少許

次用薄荷湯調此藥作一服化下勿令病人知

之恐不肯服也

此藥能補心神心全則病差

復發
黃芪

鈎鈎細辛
甘草各五錢

斷癩丹

蛇退
復發

一條燒存性

此藥能補心神心全則病差

黃芪

鈎鈎細辛
甘草各五錢

牛黃

加味逍遙散

婦人
芩各一錢

柴胡
炙甘草五分

酒當歸
丹皮

白芍
山梔各八

茯苓
大塊硃砂二兩入豬心內燈草扎好酒
人參研
東仁
茯神

龍齒各一兩
姜遠志

分

姜

薄荷葉

山楂丸

總治

生鐵落飲

又先煮鐵落水入石膏三兩 龍齒 茯神
防風各一兩半 元參 秦艽各一兩 煎

好入竹瀝

承氣湯

胃寔 大黃 芒硝 枳寔 厚朴

驚氣丸

補魂 天麻 萬根 附子 木香 白花蛇 橘紅 姜蚕 麻黃

冰片

麝香各五分

硃砂一錢爲衣

蘇葉一兩

通泄散

圓眼 風涎 瓜蒂末三錢加輕粉一匙水半合調勺
大薄荷湯下一丸 即出

薈金丸

補魄 硫砂 薈金 白礬

苦參丸

又 苦參一味蜜丸每十九薄荷湯下

牛黃解熱丸

熱入血室 牛黃錢半 硫砂 薈金
各三錢 水片 甘草各一錢 蜜丸

當歸承氣湯

火盛 草五錢 當歸 大黃各一兩 芒硝七錢
共爲末每一兩加姜五片棗十枚煎 甘

黃連瀉心湯

又黃芩二兩

黃連

生地

知母各一兩

甘草五錢

共爲末

每五錢水煎

牛黃瀉心湯

又

牛黃一錢

大黃一兩

牛黃

冰片

硃砂各一錢

極延生湯

清心滾痰丸

疾結

酒大黃

黃芩各四兩

礞石全焰硝

半

犀角

皂角

硃砂各五錢

沉香二錢

鐵粉散

痰迷

真鐵粉

半夏

南星

白附子

羌

活各二兩

生川烏一兩半

硃砂

琥珀

白姜

桑各一兩

枯礬

五錢

全蝎

五十個

金箔三十片

共爲末

每四錢

姜汁

調下

或水

調亦可

本事方曰

鐵粉不但化痰

鎮心

至于

摧抑肝邪特異若多恚怒肝邪本盛鐵粉能制

伏之也

鎮心丹

失心

硃砂

枯礬

等分

水丸芡子大

每一

丸參湯下

猪心血丸

雄黃各一錢半

白附子一錢

朱砂

另用硃砂爲衣每五丸七丸九丸人

葉氏雄朱丸

又

雄黃各一錢半

白附子一錢

朱砂

另用硃砂爲衣每五丸七丸九丸人

參菖蒲湯下無人參黃芪代之

辰砂寧志丸

勞神

辰砂二兩用酒二升煮酒存二盞留用

茯神

姜遠志

菖蒲

東仁

乳香

當歸

茯

寧志化痰湯

又

天麻

胆星

半夏

陳皮

茯苓

姜黃連

人参五錢

猪心一個研

如泥并酒丸臨卧棗湯下

養血清心湯

又

姜遠志

茯神

生地

各一錢半

人參

白朮

大棗仁

菖蒲各一錢

五分

煎服再服

養血清心湯

辰砂散

不卧

塊硃砂

一兩

棗仁

乳香各五錢

服法詳上癲方中

通治癲狂方五

清心滾痰丸

痰火

方詳上

牛黃清心丸

又

方詳上

鐵粉散

風痰

方詳上

鬱金丸

又

方詳上

辰砂散

不寐 方詳上

諸汗源流 淚淚泄睡

沈金鰲撰

睡則汗出。醒則條收。名曰益汗。不分寤寐。不因勞動。自然汗出。名曰自汗。

諸汗心虛病也。汗者心之液。故其爲病雖有別。因其原總屬於心。然腎又主五液。心陽虛不能衛外而爲固。則外傷而自汗。亦腎陰衰不能內營而退藏。則內傷而盜汗。故汗之病。耑屬心。汗之根未有不兼由心與腎。且腎陰既衰。心血必不足以精。即是血心虛。必本於腎虛。腎虛必至於心虛也。而自汗盜汗二者又有冷熱之分。寒氣乘陽虛而發汗必冷。熱氣乘陰虛而發汗必熱。又有熱火過極反兼勝已之化者。汗亦冷。此不可不細辨也。夫汗固爲心與腎二經之虛。其寔五臟虛衰皆能致汗。其寔由心虛而汗者。法當益其血脉。宜當歸六黃湯。其寔由腎虛而汗者。法當助其封藏。宜五味子湯。若由脾虛而汗。則必固其皮毛。宜黃芪六一湯。由肺虛而汗。則必壯其中氣。宜補

中益氣湯

由肝虛而汗。則必禁其疏泄。

宜白芍湯

五臟所致之汗。各有治法

如此。然此皆五臟之氣先虛。而後汗出。非汗之出分。屬於五臟也。

經云。驚而奪精。汗出于心。宜遠志 桔子仁持重遠行。汗出於腎。宜人參 痘

走恐懼。汗出于肝。宜棗仁 山藥搖體勞苦。汗出于脾。宜人參 白术 飲食過飽。

汗出于胃。宜陳皮 白术 則又當因乎汗之由以分治其臟腑。至若肺主

氣。又主皮毛。肺虛則表不能衛。而汗從肺自出。宜玉屏風散 思慮太過

當心一片津津。而汗從心自出。宜天王補心丹 名曰心汗。胃家虛。水穀氣

脫散。而汗從胃自出。宜補氣運脾丸 邪在內元府不閉。而汗從腎自出。宜無比山藥丸

邪在表。腠理不閉。而汗從經絡出。宜調榮活絡飲 又皆臟腑兼及之

餘症也。而陰陽氣血之際。尤不容不察。蓋陰虛者。陽必乘。故發厥自汗。

宜黃芪建中湯 肌膚濶而尺脉

滑。榮血自涸者。必多汗。宜當歸黃芪湯 肌膚濶而陽弱者。必體倦自汗。

宜當歸黃芪湯

自汗。宜當歸陽虛者。陰必乘。故發厥自汗。宜黃芪建中湯 肌膚濶而尺脉

滑。榮血自涸者。必多汗。宜當歸黃芪湯

六黃湯陽虛者。陰必乘。故發厥自汗。宜黃芪建中湯 肌膚濶而陽弱者。必體倦自汗。

宜當歸黃芪湯

不順者必多汗

宜小建中湯加白芍內桂木杏甘草姜棗

陰陽偏勝者必多汗

宜黃芪湯

火盛者必多汗

宜正臟腑之陰風散

拒格衛氣浮散于外無所依歸者必多汗

宜玉屏諸虛不足羸瘦枯瘦心忪驚惕者必多汗

宜狂癲散

病後氣血俱虛者必多汗

宜十全大補湯

審乎此而陰陽氣血各得其理矣

他如津脫者汗大洩

宜調衛湯

痰盛者汗自流

宜理中火氣上蒸胃濕者必作汗

宜涼膈散

表虛者汗出溱溱

宜丹溪降痰湯

治汗湯濕勝者汗滲肌肉

宜調衛湯

胃熱者多於食後汗下如雨

宜二甘湯

飲酒中風者惡風少氣汗出如

浴內經謂之漏風其狀或多汗常不可單衣食則汗出甚則身熱

喘息衣常濡口乾善渴不能勞事者

宜白术散

以上七症悉自汗之患者當治者也惟汗出如珠如油如膠淋漓而揩拭不逮者皆不可

治人有汗出額上偏多者以頭爲諸陽所會故蒸熱而汗此就無病者言之也又以左頰屬肝右頰屬肺鼻屬脾頰屬腎額屬心三

焦之火。涸其腎水。溝渠之水。迫而上屬於心。故血虛而偏多汗。此

就有病者言之也。

宜額

若頭汗出齊頸而還則爲血症。

宜四物湯加減濕

邪轉陽亦汗出頭額。

宜額

用勝瀉湯調衛湯。

水結胸無大熱亦汗出頭額。

宜小半夏湯

加茯苓陽明胃寒亦汗出頭額。

宜調胃承氣湯

而又有手足汗者液自胃

府旁達于外則手足自汗有熱聚胃府逼而出之者此陽明病也。

必當下。

宜大柴胡湯

有手足汗用涼藥補藥俱不效者此陰陽不和經

絡不調也。

宜八物湯加半夏茯苓爲君

川烏白附子爲佐使卽止

有兩腋汗脚心汗久不愈

者此濕熱流注也。

宜桂枝湯

而又有陰囊汗者則爲腎虛陽衰。

宜安腎丸小安

腎有陰囊汗出久而生瘡其痒甚苦搔之不足後必自痛者則爲

濕熱流注。

宜牡蠣丹

而又有血汗者汗出污衣甚如蘇木水湔染卽內

經之癩症則由胆經受熱血遂妄行又與手少陰氣并故成此症

宜定命散

亦或由大喜傷心者則以喜必氣散血隨氣行故成此症

宜黃

芪建中湯兼用小麥麥門冬亦或有產婦血汗者則以氣血虧耗

金銀器煎湯調下妙香散

也宜猾皮散而又有黃汗者則以汗出時入水澡浴濕熱內鬱之故宜

芪

陳另詳黃疸門若乃汗多不止真陽亡脫名曰亡陽症其身體必

冷多成痺寒或四肢拘急

宜桂枝附子湯

又陽虛亡陽汗不得出亦名曰

亡陽症必致頭眩身寒

宜再造散

以上總指自汗言經曰腎病也者

寢汗出憎風蓋腎傷則陽衰陽衰則衛虛所虛之衛行于陰分當

目瞑之時無氣以固其表則腠理開而盜汗出醒則行陰之衛氣

復于表而盜汗止法當益氣補陰降火則自愈

宜當歸六黃湯四

或盜汗此其大較也或有緣陰火盛者

宜正製白朮散牡蠣散

良方

龍

或有緣氣血兩虛者

宜當歸

地黃湯或有緣諸虛不足者

宜參其病雖

同而源則異以上總指盜汗言然則自汗盜汗烏容忽視之也哉

哉

脈法 內經釋曰尺膚濶而尺脉滑此自汗而血涸津脫也

脈訣曰。汗脈浮虛。或濶或濡。軟散洪大。渴飲無餘。又曰。肝脉浮虛。或濡或濶。自汗在寸。盜汗在尺。仲景曰。寸脉微。尺脉繁。其人虛損多汗。知陰常在絕。不見陽也。又曰。傷寒脉浮而遲。面熱赤而戰惕者。當汗出解也。脈遲者爲無陽。不能作汗。其身必痒。

脈經曰。男子平人脉虛微細者。喜盜汗出。

汗卽津液。內經註曰。腠理發泄。汗出潦滌。是爲津。津滲於孔竅。留而不行者。是爲液。資生曰。津脫者。腠理開。汗大泄。液脫者。骨屬屈伸不利。色夭。腦髓消腫。瘦耳數鳴。東垣曰。大腸主津。小腸主液。二腸受胃之榮氣。乃能行津液於上焦。灌溉皮毛。充寢腠理。若飲食不節。胃氣不足。二腸無所稟受。故津液涸竭也。

汗因濕熱。內經註曰。陽氣上薄。陰能固之。則蒸而爲汗。

難

經曰腎邪入心爲汗。正傳曰心爲君火。脾胃爲濕土。此濕熱相薄而爲汗明矣。綱目曰衛氣虛則多汗。榮血虛則無汗矣。

丹溪曰風病多汗。風散氣故也。痰症亦多汗。頭眩嘔逆也。火

氣上蒸胃中之濕亦作汗。

諸汗症治。內經曰汗出偏沮使人偏枯。正傳曰盜汗者陰虛榮血之所主也。宜補陰降火。明理曰頭者諸陽之會。邪搏諸陽津液上湊則汗見于頭。本事曰頭者三陽之會。蓋三陰之脉至胸而還。凡有頭汗出自是陽虛。故曰汗出爲陽微。是陰不得有汗也。得效曰凡心腋汗大人乃心血溢盛而常發赤者是也。小兒因驚得之。有人患心腋盜汗久不止。用參歸腰子以收斂心血。遂愈。其方人參當歸各五錢。豬心一個破作數片。并心內血。以水二碗先煮猪心至一碗半。乃入二藥同煎至八

分取清汁卽吃猪心以汁送下令盡。入門曰：凡發汗過多則陽虛不固。汗出多則津液亡而小便難。四肢者，諸陽之本。液脫者，骨屬屈伸不利。是以四肢拘急也。仲景曰：柔汗發黃爲脾絕。釋云：柔爲陰，柔汗卽冷汗也。一云：油汗卽黏汗也。醫鑑曰：內經言絕汗，註謂汗出如珠不流復旋轉也。蓋以六陽氣俱絕，絕汗乃出。朝占夕死，夕占朝死。東垣曰：凡內傷及一切虛損之症，自汗不止者，總用補中益氣湯少加附子、麻黃、根浮小麥，其效如神。但升柴必用蜜水製炒，以殺其升發勇悍之性，又欲其引參芪等藥至肌表也。又曰：仲景桂枝湯治外感風邪，自汗之聖藥也。黃芪建中湯治外感氣虛自汗之神劑也。補中益氣湯治內傷氣虛自汗之妙方也。

汗出齒症，直指曰：傷寒熱病，汗出髮潤，一不治也。汗出如油

二不治汗凝如珠三不治入門曰傷寒熱病頭汗如珠不流者陽脫卽死活人書曰傷寒陽病自汗有九症皆有治法陰病不得有汗惟陰毒則額上手背有冷汗甚者如水洗此是陽虛陰盛亡陽而將脫也其死必矣

蓋按汗出內症一切病皆然不特傷寒熱病爲忌也因前人祇于傷寒熱病詳言之茲故雖非言傷寒亦借錄

其語于此以爲凡病有自汗內症者亦知所忌也

禁忌法

活人書曰冬月天地閉血氣藏縱有病亦不宜多出

汗蓋按不宜多出汗言不
宜用藥使之多汗也

丹溪曰自汗大忌生姜以其開腠

理故也又曰凡有汗一切辛辣之味五辛之屬並忌食之

涕淚涎唾五臟所出或爲病或不爲病也難經曰腎主五液分化五臟入肝爲淚入心爲汗入脾爲涎入肺爲涕自入爲唾然則汗涕淚涎唾五者雖皆由腎灌施而旣灌施各臟則卽爲各臟之液也入心之汗已詳言之若夫涕者由肺所出或清或濁皆肺之病

也。如肺傷風。則流清涕。宜川芎茶調散。肺傷熱。則流黃濁涕。如膿狀。甚或

大如彈丸。從鼻中出。不出。損肺而死。宜黃連湯。

宜參蘇飲。肺兼傷風熱。亦流濁涕。宜荆防鴻白湯。肺氣冷。亦流清涕。宜半夏溫肺湯。

然而肺系上通于腦。故鼻淵一症。則爲腦病。其原皆由肺經感受風

寒。久而凝入腦戶。太陽濕熱。又爲蒸鬱。宜辛夷消風散。或好飲熱熾。風邪

相乘。而風與熱交結不散。宜辛夷荆芥散。皆能成此症。以致濁涕下不止。

經又云。胆移熱于腦。則辛額鼻淵。是病更兼屬乎胆者也。宜奇授藿香散

其教另詳于鼻門。淚者由肝所出。其因悲哀愁哭。而淚出。不爲病

者。無論已至如迎風淚出。宜加味地黃丸。陰滯淚出。宜芎歸明目丸。羞明淚出。宜

明立勝散。皆肝之病也。蓋肝發竅于目靈樞。謂目者肝之所聚。上液之

道。則使宗脈有所感而成病。必液道開。液道開而淚于是出矣。其緣乎迎風者。肝陰虧血不能榮及乎睛。故爲風邪所搏而淚出也。

其緣乎陞濬者。肝經熱邪上壅于本竅而烏珠正屬肝。其熱邪遂由本竅而攻擊乎所屬故本經之氣不勝而淚出也。其緣乎羞明者。肝屬木。木本生火。肝主風。風勢更疾。今在內之風木爲外來之風火所觸。故反受其制而淚出也。肝與胆相表裏。故胆熱者亦淚出。宜湯泡散老人火盛水虧。胆汁慳者哭則無淚。笑反有淚。宜養肝丸明目四神丸是病亦兼屬乎胆者也。其數另詳于目門。涎者由脾所出。從口角流溢而不禁者是也。涎與痰同爲火盛所生。故曰痰涎。涎與沫同爲水濕所聚。故曰涎沫。而痰也沫也涎也同伏于脾。脾與胃相表裏。故伏于脾者溢于胃口爲胃之門戶。故溢于胃者流于口。由內出外自相連屬。其或時吐清水冷涎。自下涌上。脾熱所致也。宜陳加白术白芍土炒升麻芩連山梔神曲麥芽乾姜或煎或丸服其或涎自兩腮流出而不自知。睡則更甚。氣弱不能筦攝也。宜六君子湯倍茯苓半夏加瓜蒌霜其或涎流不已。脉

洪大甚兼喜笑舌瘡

土病而反傷乎母也

宜沈氏止涎湯

其或始而口角

流涎漸至口眼喝斜

木不能剋土致受脾熱反傷而肝風轉助爲

災也

宜用通天愈風湯送下

夫脾與胃相表裏

如靈樞謂飲食入

于胃胃中有熱則亟動

亟動則胃緩胃緩則廉泉開而涎下

宜烏梅丸去人參附桂合平胃散服

是病更兼乎胃也而不得專取脾腫者由腎所出凡

人口曰華池口中津唾曰玉泉舌曰靈根黃庭經謂玉泉清水灌

靈根審能修之可長存修煉家以舌抵上腭則津唾滿口嚥之足

以減火足以養心此唾之無病且可却病者也若胃中有寒則多

唾

宜理中丸加益智仁

陽明正府有積冷則多唾

宜理中丸加半夏

胃家有濕滯則

多唾

宜勝湯加益智仁

陽明正府有宿食則多唾

宜平胃散加神曲

大病新愈胃陽

未復則喜唾不休

宜理中丸加益智仁

亟症往往來痛五更心嘈牙關硬面色

青黃則多唾或吐清水

宜追正取積散

其或肚大青筋時痛時止人中鼻

唇一時青黑亦多唾

宜萬應丸

又或往來痛無休。腹中有塊起以手按

之不見。鍾聚痛則咬。心亦多唾。宜蕪黃散另詳垂門。茲撮其略。以上皆病之兼乎胃者。以唾爲腎液而腎爲胃關。故腎家之唾爲病必見于胃也。若乃腎寒則多唾。宜溫腎丸腎虛亦多唾。宜虎膏則腎本經病然則此五者固卽五臟之津液而猶不免於病焉。謹身之士盍亦加之意也夫。

涕淚涎唾原山形症 直格書曰。積液生氣。積氣生液。朱子

語類曰。或問曰。天一生水。有可驗乎。曰。人身可驗矣。貪心動則津生。哀心動則淚生。愧心動則汗生。慾心動則精生。方人心寂然不動時。則太極也。此心之動。則太極動而生陽。所以心一動而水生。卽可以爲天一生水之証也。資生曰。水穀入于口。輸於腸胃。其液則爲五。天寒衣薄則爲尿與氣。天熱衣厚則爲汗。

悲哀氣并則爲泣。中熱胃緩則爲唾。邪氣內逆則氣爲之閉塞而不行。不行則爲水脹。靈樞曰液者所以灌精輸孔竅者也。故上液之道開則泣。泣淚泣不止則液竭。液竭則精不灌。則目無所見矣。命曰奪精。內經曰泣涕曰腦也。腦者陰也。

腦滲爲涕。

延壽書曰

真人曰當習不唾地。蓋口中津液是金

漿玉醴能終日不唾。嘗吞而嚥之令人精氣常流面目有光。蓋人身以津液爲本。在皮爲汗。在肉爲血。在腎爲精。在口爲津。伏脾爲痰。在眼爲淚。曰汗曰血曰淚曰精已出則皆不可回。惟津唾則獨可回也。回則生生之意又續矣。有人喜唾。液乾而體枯。遇至人教以回津之術。久而體復潤。

治汗方四十四

當歸六黃湯

總治當歸

熟地

生地

黃芩

黃柏

黃連各一錢

黃芪二錢

五味子湯

腎汗

五倍子

山萸

龍骨

牡蠣

首烏

黃芪六一湯

肺汗

黃芪六錢

炙草

一兩

共爲末每五

補中益氣湯

脾汗

人參

黃芪

歸身

白朮

升麻

白芍湯

肝汗

白芍

棗仁

烏梅

天王補心丹

心汗

人參

五錢

當歸

五味子

天冬

茯苓

遠志

肉桂

丹參

元參

桔梗

各五錢

熟地

四兩

杜仲

黃連二兩

蜜丸

珠砂爲衣

心竹葉湯

下

巴戟

杜仲

首烏

玉屏風散

衛氣汗

防風

黃芪各一兩

白朮二兩

白朮二兩

白朮二兩

白朮二兩

白朮二兩

補氣運脾丸

胃汗

人參二錢

白朮三錢

茯苓

橘紅

砂仁八分

炙草四

分

各一錢半

黃芪一錢

砂仁八分

姜三

棗二

無比山藥丸

腎虛

赤石脂

茯神

山萸

熟地

巴戟

杜仲

首烏

牛膝

澤瀉各二兩

菟絲子

熟地

杜仲

首烏

杜仲

首烏

額汗方

黃芪
陰陽偏勝
表虛
濕邪
陳皮各
根
汗方

丹參
蜜黃芪一錢二分
防風五分
當歸
圓眼
當歸錢二分
生地
浮麥
甘草各七分
當歸
當歸錢二分
麻黃
甘草各七分
當歸
當歸錢二分
地黃
棗仁

黃芪湯

根
麥冬一錢
水結胸

白芍
天冬各一錢半
炒知母
黃柏各錢半
炙草五分
圓眼
蜜黃芪一錢二分
生地
浮麥
甘草各七分
當歸
當歸錢二分
地黃
棗仁

正氣湯

陰火
水結胸

炒知母
黃柏各錢半
炙草五分
圓眼
蜜黃芪一錢二分
生地
浮麥
甘草各七分
當歸
當歸錢二分
地黃
棗仁

二甘湯

胃熱
等分共爲末每五錢加姜二片
表虛
防風
陳皮各
根
汗方

生甘草
炙甘草
厚朴
牛夏各錢半
白术
牡蠣粉
麻黃
藿香
棗二

丹溪治汗方

表虛
防風
陳皮各
根
汗方

黃芪
黃柏
白术
牡蠣粉
麻黃
藿香
棗二

小半夏湯

水結胸

厚朴
牛夏各錢半
甘草五分
姜七
棗二

調胃承氣

胃寢
手足汗

八物湯

又
牡蠣粉
黃丹各二兩
枯礬四兩
共

牡蠣丹

又
牡蠣粉
黃丹各二兩
枯礬四兩
共

奪命散

又
牡蠣粉
黃丹各二兩
枯礬四兩
共

血汗
新汲水
水調下
又名定命散

妙香散

又一兩

茯苓

黃芪

山藥

黃芪

姜遠志各

一錢

人參

桔梗

甘草各五錢

硃砂三

錢

木香二錢半

麝香一錢

共爲細末每

每

刺

豬皮燒灰每米飲調下

二三錢肉煮食

之更妙

猾皮散

芪陳湯

黃汗

石膏二錢

黃芪

赤芍

茵陳草

續斷各一錢

豆豉各一錢

甘草五分

姜五片

大柴胡湯

手足汗

豆豉各一兩半

柴胡

黃芩

白芍

大黃

川練肉

茵香

枳實

安腎丸

囊汗

胡蘆巴

補骨脂

川練肉

茵香

續斷各一兩半

杏仁

桃仁

山藥

茯苓

各一兩

蜜丸

桂枝湯下

又有三味安腎丸補

骨脂

茴香乳

香等分蜜丸

鹽湯下

桂枝附子湯

亡陽

桂枝

附子

白芍

炙草

姜

棗

陶氏再造散

又活

防風

川芎

炙草各一錢

桂枝

附子

細辛

羌

人參

黃芪

姜

四製白术散

盜汗

白术四兩分四包

以黃芪石斛壯蠅小

麥麸各一兩各炒

白术爲黃色只取

白术爲末

每三錢粟米湯調下

盡服爲妙

牡蠣散

又 滾牡蠣 黃芪 麻黃根 等分剉每五錢浮麥百粒同煎服 又方牡蠣粉白米防風等分爲末酒服三錢盜汗卽止

參芪湯

又 人參 黃芪 白朮 茯苓 白扁豆 山藥 陳皮 葛根 半夏曲 甘草各一錢

當歸地黃散

又 地黃 茯苓 當歸熟地 生地 酒白芍

龍膽散

又 枝 茯苓 當歸熟地 生地 酒白芍 陳皮各八分 龍胆草 浮小麥一撮 甘草三分 蜜知母

治涕淚涎唾方二十八

川芎茶調散

風涕 川芎 薄荷 羌活 荆芥 甘草

白芷 防風 細辛 為末茶調下

黃連清肺散

熱涕

川芎 薄荷 羌活 荆芥 甘草

參蘿飲

寒涕 人參 柴蘿 葛根 半夏 前胡

桔梗 枳壳 陳皮 木香 甘草 姜 藤

荆防瀉白散

風熱涕 花 荆芥 防風 連翹 桔梗 金銀

元參 赤芍 甘草 生地 黃芩 桑

皮 青黛 葛花 亦名荆防瀉白湯

半夏溫肺湯

肺冷心

半夏

細辛

旋覆花

陳皮

肉桂

芩六分

姜五片

辛夷消風散

風濕蒸酒

辛夷

黃芩

薄荷

甘菊

川芎

辛夷荆芥散

酒涕星半夏

辛夷一錢

荆芥

甘草

生地

赤芍

奇授藿香散

胆熱涕胆汁一個和服

廣藿香

五錢水

一碗煎七分加猪

若將胆汁熬膏入藿香末

一

雨丸湯下二錢亦可

加味地黃丸

迎風淚

芎歸明目丸

隱濁甘草

川芎

當歸

白芍

生地

牛膝

羞明立勝散

羞明

川連

秦皮

防風

黃芩

內障加珍珠

杞子

天冬

甘菊

外障加木賊草

草

湯泡散

胆熱渴

渴

赤芍

當歸

黃連各一錢

湯泡

養肝丸

老人
當歸

熟地
白芍

防風
川芎

車前子

柏實

蕤仁

明目四神丸

丸

二陳湯

脾熱泄
茯苓

甘草
半夏

陳皮

六君子湯

心氣弱
陳皮

人參
茯苓

白术
炙草

半夏
陳皮

沈氏止涎湯

心熱涎
神各一錢半

川連四分
白术

黃柏八分
茯苓

荳蔻
半夏各一錢

荳蔻
甘草各一錢

通天愈風湯

肝風
金

連翹

瓜萎仁十五粒去壳打如泥

荆芥

威靈仙

南星

貝母各一

南星

五分
貼加姜三片水煎好入荆瀝一呷

少許溫服

生姜自然汁

即以此湯送下清心導痰丸亦可

清心導痰丸

又子姜製各一
兩

姜南星
半夏各二兩

花粉
白附

白附

白附

炒姜蚕
天麻

姜汁打糊丸
十五個

黃連七錢半

肉桂
當歸

黃柏各

烏梅丸

川椒
涕淚延垂方

細辛
附子

人參
肉桂

當歸

黃柏各

三錢 醋浸烏梅取肉搗如泥研勻丸米飲下
二三十九

平胃散

又

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

理中丸

寒唾

勝濕湯

濕滯

追風取積丸

虫唾 機

燕荑

雷丸

錫灰

使君子肉

梔

牽牛子頭末

等

分蜜丸

麻子大茶清

下二三十丸

古應丸

又

大黃八兩

枳榔五兩

黑牽牛頭末四

錢

共爲末以皂角十錠苦棟根皮一斤同熬

膏

和丸梧子大先用沉香末爲衣次用雷丸末

爲衣又用木香末爲衣五更時以砂糖水吞下
七丸九丸

蕪荑散

又

蕪荑

雷丸各五錢

乾漆

炒令烟盡一

錢

共爲末溫水調下二錢小兒五分

巴戟

炒杜

溫腎丸

仲

腎寒

熟地錢半

牛膝

內蔻容

五味子

麥冬

炙草各八分

茯神

炒杜

虎潛丸

腎虛

龜板

黃柏各四兩
熟地

知母各二兩

陳皮

三兩

白芍

當歸

瑣陽各二兩

如加人

杞子

虎骨各一兩

乾姜五錢

酒糊丸

如加人

杜仲五味子

杞子

參牛膝山藥破故紙

酒糊丸


如加人

杞子

杞子

杞子

猪脊髓丸名加味虎潛丸大補心腎虛勞



小腸病源流 小腸氣 小腸癰

沈金鰲撰

手太陽小腸脈起於小指之端。循手外側上腕。出踝中直上循臂骨下廉。出肘內側兩筋之間。上循臑外後廉。出肩胛繞肩胛。交肩上入缺盆。絡心。循咽抵膈至胃。到小腸。其支者從缺盆循頸上頰。至目锐眥。却入耳中。其支者別頰上頤。抵鼻。至目內眥。斜絡於額。次注足太陽膀胱經。每未時氣血至小腸。手太陽小腸經少氣多血。

經曰小腸者受盛之官。化物出焉。其爲器亦止爲胃役使。特以與心絡並行隧道。又與足太陽膀胱連經。故亦以三陽歸之。非謂其職能與足太陽並列也。儻一拈太陽。即以小腸膀胱並舉。不知要矣。所以小腸之職任與大腸相倣。大腸之腑無靈。小腸亦無靈。大腸之經非當陽之用。小腸亦非有巨陽之用。經故俱以器目之也。惟小腸與大腸皆爲胃化物之器。故其病亦與胃同。惟本經與心絡並行隧道。故本經病亦延及于心。然亦止在經絡而已。無與于心之臟也。其爲病寢則嗌痛領腫。不可以顧肩似拔膚似折節弛。

肘廢。小水不利。及赤或濇痛。尿血虛。則遺尿。面白苦寒。耳前熱。小腸氣生膀。小者患指癰疥虛寢之病。各有別矣。至遺溺閉癃。更有由肝所生病。及膀胱不約者。固不盡由小腸也。各詳本症。

小腸形質 靈樞曰。唇厚人中長。以候小腸。又曰。心應脈。皮厚者脉厚。小腸亦厚。皮薄者脉薄。小腸亦薄。皮緩者脉緩。小腸大而長。皮薄而脉小者。小腸小而短。諸陽經脉皆多紆曲者。小腸結。入門曰。凡胃中腐熟水穀。其滓穢自胃之下口傳入于小腸。上口。自小腸下口分別清濁。水液入膀胱。上口滓穢入大腸。上口難經。以大小二腸之會爲闌門。言闌分隔也。

小腸症治 靈樞曰。中氣不足。腸爲之苦鳴。又曰。小腸病者。小腹痛。腰脊控睾而痛。時窘之後。當耳前熱。內經曰。小腸爲泄。入門曰。小腸有氣。則小腹痛。小腸有血。則小便濇。小腹有熱。

則莖中痛。又曰。小腸者心之府也。有病宜通利。

小腸絕候。脉經曰。小腸絕六日死。何以知之。髮直如乾麻。不得屈伸。自汗不止。

小腸氣小腸經病也。小腹引睾丸連腰脊而痛。小腸虛風冷乘間而入邪氣。旣寔則厥而上冲肝肺。控引睾丸上而不下也。宜棟寔丸。葫蘆散。千金方以爲癰。疝有四種。其一腸癰。卽小腸氣吊。外腎偏墜。腫瘻。故綱目等書多因其說。并云得之于地氣卑濕。亦當備參。而其爲症。有甚而熱痛。小便不通者。宜加味通心飲。有年久不愈者。宜橘核丸。有莖囊抽痛。不可忍耐者。宜立效散。楊氏麝香元四味茴香散。各宜詳究。

脉法。正傳曰。肝脉滑甚爲癰。疝。小腸氣痛。

小腸氣症治。綱目曰。大抵小腸氣屬濕。多故江淮間多有之。宜以去濕之劑下之。以苦堅之不可溫之補之。

小腸瘻。小腸火熱病也。或因七情飲食。或因經行產後。瘀血留積。其症發熱惡寒。脈芤而數。膚皮錯縱。腹急漸腫。按之內痛。大便重墜。小便濇滯。若淋。或小腹隱痛堅硬。如掌而熱。肉色如故。亦或焮赤微腫。甚者臍突腹脹。轉側有水聲。宜大黃湯如瘀血去盡。則安矣。若體虛脉散。不敢輕下。用輕劑可也。宜活血散瘀湯瘻已成。則腹痛腹滿。不食。便淋刺痛。宜仁湯腹濡痛。小腹急。必時時下膿。宜丹皮散膿後疼痛淋瀝不已。必見諸虛症。宜參芪地黃湯此病亦不可驚。防腸斷坐卧轉側皆宜徐緩。嘗少進稀粥。靜養調理爲要。但古方書但載腸瘻。無大小之別。故其治法亦約畧相仿。參考可也。

脈法 脉訣曰。關內逢芤。腸裏瘻。

小腸瘻症治 瘡科選粹曰。若小腹硬痛。脈遲緊者。未有膿也。用大黃湯下之。不敢下者。用敗毒散加秦艽連翹。脉芤濇者。四

物湯加桃仁紅花延胡索木香小腹軟痛脉洪數者已有膿也。
用薏苡仁湯排之或三仁湯神效瓜萎湯小腹疼痛小便不利。
膿壅滯也牡丹皮散主之若大便或臍間出膿者不治。

治小腸病諸藥要品及方二

小腸寔宜滲利

茯苓
木通

甘草
黃柏

知母
牛膝

黃連
黃芩

麥冬
生地

童便
燈心

琥珀
陳皮

瞿麥
車前

赤豆
石膏

滑石
山梔

海金沙
山梔

紫苑
扁豆

小腸虛宜補氣

人參
五味

黃芪
牡蠣

山萸
茯苓

麥冬
茴香

金櫻子肉
益智仁肉

白芍

粳米

溲而便

膿血加赤石脂

導赤散

小腸熱
葉七片

生地
此治小腸熱而小便不利者

木通

甘草各一錢

枳榔

竹

赤茯苓湯

又
赤芍

麥冬

生地

枳榔

姜五片

附載仲景分別標本方藥

標 茯苓 石膏

本導赤散 淡竹葉 木通 甘草

治小腸氣方七

棟寃丸

主治

川棟子

茴香

吳萸

陳皮

馬蘭

花酒送下如不用

淡姜湯下

葫蘆巴散

又葫蘆巴子

益智仁

大茴

蓬术

牽牛

防風

甘草

共爲末

每二錢

酒下

加味通心飲

熱痛 瞿麥

木通

山梔

黃芩

連翹

二十莖

車前草

五葉

橘核丸

久痛

炒橘核

鹽酒

炒海藻

鹽酒

炒昆布

監水洗海帶

炒桃仁

炒川棟子

各一錢

燈心

二十莖

枳壳

甘草

川棟子

各一錢

內桂

木香

酒炒延胡索

厚朴

枳寃

內桂

木通各五錢

酒糊丸或酒或鹽湯下

如久不消

加醋煮砂

二錢

此方總治

一切癩疝

卵核腫脹偏有大小或硬如石或小

腹絞痛甚則囊腫潰爛出黃水無不效

如小腸氣新發者不必此方只用橘核

一錢半

桃仁十五个 山梔一錢 炮川烏 吳茱萸
各五分 各炒爲粗末水煎 此名橘核散
橘核单止痛川烏散寒鬱山梔除濕熱又引川

立效散

抽痛

全蝎七个 砂仁三七枚 茵香一錢

共爲末分三服熟酒調下空心卽效

楊氏麝香丸

又四錢

木香 胡椒各一兩

炒全蝎

巴霜各

熟水下

五七丸

此方能尋諸處痛凡小腸氣

及膀胱氣脇下痛最難治此藥主之

烏藥酒浸一宿培

高良薑

青皮 茵

大黃

砂爲衣

丸子大肚子大珠砂爲衣

砂爲衣

砂爲衣

四味茴香散

又香各一兩

烏藥酒浸一宿培

高良薑

青皮 茵

大黃

砂爲衣

丸子大肚子大珠砂爲衣

砂爲衣

砂爲衣

共爲末每二錢發時酒下

高良薑

青皮 茵

大黃

砂爲衣

丸子大肚子大珠砂爲衣

砂爲衣

砂爲衣

砂爲衣

大黃湯

初起

熟大黃

芒硝各一錢

丹皮 白芥

丹皮 白芥

丹皮 白芥

丹皮 白芥

丹皮 白芥

丹皮 白芥

活血散瘀湯

又壳

川芎

木瓜

當歸

赤芍

蘆木

丹皮

枳

大黃

黃二錢

丹皮

白芷

當歸

川芎

各一錢

丹皮

白芷

<p

肉桂 甘草各五分 木香三分

參芪地黃湯

補益 人參 黃芪 茯苓 熟地 山藥

敗毒散

下毒

山萸 姜 索

四物湯

下瘀 川芎 當歸 白芍 地黃

三仁湯

下膿 芎仁二錢半 冬瓜仁 桃仁 丹皮

神效瓜蔞湯

下膿 瓜蔞一個 當歸 甘草各五錢 乳香

牡丹皮散

又 没藥各一錢 此是重劑勿輕用
丹皮 人參 天麻 茯苓 薏苡仁
黃芪 桃仁 白芷 酒當歸 川芎各一錢
炙甘草七分

膀胱病源流

膀胱氣

轉胞症

沈金鰲撰

足太陽膀胱脉起于目內眞上額交顱。其支者從顱至耳上角。其直者從顱入絡腦。還出別下項循肩膊內挾脊抵腰中。入循督絡臂屬膀胱。其支者從腰中下挾脊貫臍入臍中。其支者從髀內左右別下貫脾。挾脊內過髀樞循蹠外從後廉下合臍中。以下貫蹠內出外踝之後循京骨至小指外側。次注足少陰腎經。每日申時周身氣血俱注於膀胱。

足太陽膀

膀經少氣

而多血

膀胱本州都之官藏津液州都者下邑也遠於京師。且津液必待氣化而後能出。則其爲器有不得與諸陽並者。乃其經反納太陽何也。以太陽起于少陰今歸之以陽故借納于此也。其寔太陽爲三陽之主。膀胱乃必待氣化而後能出。則太陽豈膀胱能爲之耶。後人不明經旨。此謂膀胱爲太陽寒水以主寒令。不知六氣之寒水惟腎能主之人身太陽之經既非寒令而膀胱之水亦非寒水。固不可混也。則膀胱之所以爲腑有可識矣。試進詳之。人身太陽

之經。起於足。上于顛腦及額顱內。下于膺中。包心肺。皆太陽經所貫。太陽居六經之盛。故爲巨陽。而爲諸陽主氣。然以同衝氣起于少陰。乃以其陽借納膀胱。而膀胱雖居卑賤。所以得稱太陽也。膺中爲心肺所居。肺主皮毛。心主血脉。太陽之經既下膺中。則皆與太陽合。是以寒邪一犯太陽。遂傷肺及心。以犯皮毛。血脉爲心肺之所合。如皮毛愾慄。鼻塞聲重。畏寒無汗。以及心煩。皆太陽病而肺與心皆爲之變也。仲景治太陽傷寒。設麻黃湯發汗以疏肺。設桂枝湯和表止煩以寧心。豈非治太陽。卽以治太陰。少陰且治太陰。少陰正所以治太陽乎。是太陽一經寢兼攝手二陰矣。故其爲病寢則鼻窒。頭痛。目似脫。淚出。項似拔。腰似折。髀不可以曲。膕如結。膕如裂。是爲踝厥。痔瘡。癲狂。腑反出。下腫便膿血。肌肉瘦。少腹脹痛。按之欲小便不得。若虛則骯靉。小便不禁。遺尿。膀胱氣皆其候也。

古人謂太陽病，并有時連及陽明。經曰：肝胆同歸津府，所以太陽厥陰同爲一治。又曰：膀胱腎合爲津液，腎所以主二便之難。此膀胱所以連及諸經而爲病也。故膀胱病小便秘不得任用執藥。經

又曰：胞移熱于膀胱，則爲遺溺閉癃。又曰：小腹膀胱按之內痛若沃以湯，濇于小便上爲清涕，則爲胞痺。注云：胞內居之，則知胞居

膀胱之內也。其胞痺之症由風寒濕邪客于胞中，氣不能化出，故胞滿而水道不通，以致小腹膀胱俱痛，而濇于小便也。宜腎瀝湯。巴

丸而胞與膀胱皆有上口無下口，至胞之爲患，有轉胞症，另詳于

後。然轉胞爲胞本病，而患之所及，又能令目病。如能遠眴，不能近

視，有其火無其水也。當補腎。宜地芝丸。六味地黃丸。能近視，不能遠視，有其

水無其火也。當補心。宜定志丸。加茯苓。通及心腎而近視不能遠視。宜空心服。

四物湯加澤瀉茯苓牡蠣。加甘菊蜜蒙花。皆胞所致病也。總之凡目病血勝則

臥服遠志丸

加澤瀉茯苓牡蠣。

皆胞所致病也。

總之凡目病血勝則

痛血勝則痒。又能致頭風。宜川芎瓜蒂又能致頭汗，亦皆胞所致病也。

膀胱形質。內經曰：水液自小腸沁，則津滲入膀胱之中。胞氣化之，而爲尿以洩出也。東垣曰：膀胱雖爲津液之府，至于受盛津液，則又有胞居膀胱之中，類纂云：膀胱者，胞之室也。靈樞曰：鼻孔在外，膀胱漏泄。又曰：腎應骨，密理厚皮者。三焦膀胱厚，粗理薄皮者。三焦膀胱薄，疎腠理者。三焦膀胱緩皮急而無毫毛者。三焦膀胱急毫毛多而粗者。三焦膀胱直稀毫毛者。三焦膀胱結。

膀胱症治。內經曰：膀胱不利爲癃，不約爲遺尿。入門曰：膀

胱病者，熱結下焦，小腹苦滿，胞轉，小便不利，令人發狂冷，則濕痰上溢而爲多唾。小便淋瀝，故遺尿。熬按：小便不禁，由膀胱氣虛，加減八味丸，倍山萸加烏藥益智仁補骨脂，是主藥也。小便不通，由膀胱邪熱，五苓散。

益元散是主藥也。

膀胱絕候 內經曰遺尿狂言目反直視此膀胱絕也。又曰膀

胱絕者戴眼反折癩癩其色白絕汗乃出絕汗出則死矣。

膀胱氣膀胱經病也。其症小腹腫痛必小便祕滯。宜五苓散加茴香葱白鹽服藥後若下小便如墨汁膀胱之邪去矣。邪去而便通痛止矣。宜隨用明砂丸

入門以癥瘕有四種其一種水癥外腎腫大如升如斗不痛不痒爲卽膀胱氣宜偹參究而其爲症有由膀胱腎虛結成腫痛者。

宜茱萸有膀胱氣連脇下痛者。宜楊氏內消丸有由蘊熱陰囊腫脹大小

便不通者。宜三金散有膀胱氣痛不可忍者。宜蠲痛元金有症由新得

者。宜橘核丸核散有年久不愈者。宜橘核丸

膀胱氣症治 綱目曰小腹痛者三肝病小腹引脇痛小腸病

小腹引睾丸腰脊痛膀胱病小腹腫痛不得小便又曰神保元

治膀胱氣脇下痛最妙通用橘核丸橘核散。

導引保生秘要曰用手緊鼎幽闕納氣數口而緊緊頂閉納之立效。

運功保生秘要曰因慾火積滯外腎復感冷氣故作脹痛不可勝言。注意從外腎提氣至內腎右運二七遍卽從內腎想一火提至頂門畧凝而後行吹吸之法。

轉胞症水逆氣迫病也亦名轉脬症直指曰此症皆由強忍小便或尿急疾走或飽食走馬或忍尿入房使水氣上逆氣迫于脬故屈戾而不得舒張也脬落卽殂又曰此症孕婦多有之患在忍縮小便或醉飽入房使小腸之氣逆而不通大腸之氣與之俱滯外水不得入膀胱內水不得出膀胱淋瀝急數每欲尿時如不可言大便亦裏急頻併似痢非痢必以手按臍下庶可立出小便甚者因此腹脹浮腫治法用涼藥疏利小腸中熱仍與通洩大腸迨其

腹中攬痛大便入下則尿脬隨卽歸正小便自然順流丹溪曰胎
婦轉脬之症稟受弱者愛悶多者性急躁者食厚味者大率有之
古方用滑利疏導無效因思脬爲胎所墮展在一邊脬系了戾不
通爾胎若舉起懸在中央脬系得疏水導自行一婦患此診之兩
手似濇重取則弦此得之憂患濇爲血少氣多弦爲有飲遂以參
术飲空心煎服遂以指探喉中吐出藥汁俟少頃又與一貼次早
亦然如是與八帖而安此法恐偶中後歷用數人皆驗據此二說
一用瀉一用吐皆所以疏通其氣而使之流注也至轉脬之候必
臍下急痛小便不通此所以與尋常溺閉有異若老人有脬轉困
篤欲死者又與少年不同治宜六味丸倍澤鴻蓋少年不須補益只與利
導足矣宜蒲黃散滑石散又有驚憂暴怒氣乘膀胱鬱閉而脬系不正遂
至小便卒果不通小腹膨脹氣上冲心悶絕欲死者此其治法必

當兼氣分。宜葱白湯即如孕婦轉脬治法雖不同要必兼補氣血。宜參飲參木此皆胞之爲病所當從胞而治者也。

胞爲尿器 東垣曰膀胱雖爲津液之府至于受盛津液則又有脬而居膀胱之中焉故內經云脬移熱于膀胱靈樞云膀胱之脬薄以濬類纂云膀胱者脬之室夫脬之居于膀胱也有上口而無下口津液旣盛于脬無由自出必因乎氣化而後能漸漬浸潤于胞外積于胞下之空處遂爲尿以出于前陰若使脬下無空處則人尿急時至廁安能卽出乎夫惟積滿脬下之空處而不可再容故急急則至廁卽出矣。

治膀胱病諸藥要品及方十

膀胱寢宜潤滲

黃柏
桔梗

滑石

木通

瞿麥

車前

膀胱虛宜補氣

人參
金櫻子

旋覆花
山萸

天冬
麥冬

猪苓
牛膝

澤瀉
杞子

柏子仁
益智

虛加

牡蠣

鹿茸

桔梗

桑螵蛸

鷄

既濟丸

膀胱虛
胎皮

菟絲子
益智仁
肉蓯蓉

茯苓
鹽黃

柏

鹽知母
酒山萸去核各三錢

熟地各五錢
牡丹

五味子
鹽黃

葵子丸

膀胱寒
瞿麥
滑石
冬葵子
木通

赤苓
猪苓

附子
官桂各三錢

枳實
枳實

各一錢
姜五片

治小便不通

巴戟丸

胞癰
酒生地
一兩
杜仲
子
五味子
心酒
下五十丸

巴戟雨半
山藥
金石斛
山萸

附子
鹿茸

酒川斷

酒蓯客各

腎着湯

又
共爲末每服用四錢水一鍾煎七分空心溫

服
此方兼治腎虛傷濕腰極重極冷而痛不

渴小便自利此名腎着症

腎瀝湯

又
麥冬去心
桑螵蛸
杜仲
錢

炒杜仲
一个

桔梗
水
白朮各二兩
赤芍
木通各一錢半

地芝丸

補腎
二兩
熟地

天冬各四兩
枳壳
甘菊各

六味地黃丸

又
蜜丸

山藥
山萸
丹皮
茯苓
澤

定志丸

補心
洛二兩
茯苓

茯神各三兩
石菖蒲
遠志

四物湯

又
近視
川芎

當歸
白芍
生地

遠志丸

又
杞子
麥冬

石菖蒲
甘菊
遠志各五錢

附載仲景分別標本方藥

標麻黃

桂枝
黃芪

白朮
防風
防已
製蒼术

本五苓散

白朮
肉桂
茯苓

猪苓
澤瀉
加滑石

治膀胱氣方十

五苓散

湯閉
肉桂
白朮
茯苓

猪苓
澤瀉

硼砂丸

硼砂
腎虛
山萸

木香
沉香
巴霜
青皮
川練子
馬蘭花

茱萸內消丸

青皮
陳皮
山藥

肉桂
各二兩
木茴

香一兩 酒湖丸 此方兼治膀胱腎虛致成
寒疝偏墜引痛及小腸奔豚痃癖等症

楊氏麝香元

胸痛 四錢 麝香一錢 胡椒各一兩 蒸餅丸 麻子大珠砂爲衣
全蝎巴霜各

湯下五七丸 能毒諸處痛凡膀胱氣脇下痛
最難治此方主 神保元卽此方無麝香亦是
治膀胱氣痛要藥

三白散

蘊熱 白丑頭末一兩 桑白皮 白术 木
通 陳皮各二錢半 共爲末每一錢姜湯下

蜀痛元

痛甚 白丑頭末當歸 高良姜 蒜皮 木香
延胡索一兩 川棟肉 茴香各五錢

金鈴散

又 金鈴子三十枚 巴豆肉三十枚各切片
烏藥各二錢半 全蝎七个 姜汁浸蒸餅糊
丸燒綿灰調酒送下三五十丸

又 全炒焦色去巴豆以茴香炒與金鈴內等分并
入木香一錢半 共爲末每二錢水酒各半煎

葱白湯調下

三疝湯

又 車前子二錢四分 茴香一錢六分 葱
白一錢二分 沙參八分

橘核散

新病 橘核錢半 桃仁十五粒 山梔一錢
吳萸各五分 各炒爲粗末水煎

橘核丸

久病 橘核炒鹽酒炒海藻鹽酒炒昆布
鹽水洗海帶 芬炒桃仁 炒川棟肉各一

治轉胞症方六

兩 酒炒延胡索 厚朴 枳寃 內桂 木
香 木通各五錢 酒糊丸溫酒或鹽湯下 木

六味丸

老人 熟地 山萸 山藥 丹皮 泽瀉

蒲黃散

總治 濟調下 蒲黃 滑石 等分爲末每三錢鷄子

渭石散

又 寒水石二兩 滑石 亂髮灰 車前
木通各一兩 冬葵子一合

葱白湯

驚憂 陳皮三兩 冬葵子一兩 葱白三莖
孕婦 水五升 升煎三升 分三服

參术飲

當歸 白芍 地黃 人參
白朮 半夏 陳皮 甘草 姜三 束二

服後探吐

參术湯

又 人参 白朮 當歸 白芍 半夏 陳皮
皮 甘草 服後探吐

小便閉癃源流

小便黃赤
交腸症

遺溺

沈金鑑撰

小便閉癃肝與三焦及督脈病也言三經而不及膀胱者以膀胱但主藏溺而不主出溺也經云肝脉過陰器病閉癃又云女子督脉入繫廷孔延孔正中直孔卽窮竅也男子循莖下至纂陰莖之病不得前後端也之病不得前後又云三焦下肺並太陽正脉入絡膀胱約下任寢則閉癃虛則遺溺據經觀之閉癃之症舍三經何屬哉雖然其致病之由寔各有異膀胱藏溺氣化則出而主氣化者肺也若燥則不能生水氣化不及膀胱法當清金潤肺宜紫苑麥冬車前丹皮茯苓如脾濕不運水穀不精不能上輸于肺使肺得行其津液以生水法當燥濕健胃宜萸苓半夏白朮木蒼如腎水燥熱以致膀胱不利法當滋腎滌熱宜知母黃柏茯苓通草澤瀉又或水液只滲大腸小腸因而燥竭宜以淡滲之品分利之宜萸苓通草澤瀉又或氣滯不能通調水道下輸膀胱必以順氣爲急宜枳壳木

芩通草澤瀉

又或氣滯不能通調水道下輸膀胱必以順氣爲急

宜枳壳木

通橋紅
蘿子

又或心火盛以致小腸多熱急當清心。宜黃連犀角紅。

天冬麥冬角

又或

由乎大虛須與溫補以行其水。宜金匱又或忿怒氣結閉遏不通。

須開鬱破氣。宜鬱金枳榔

桔梗枳殼

至若三焦寔熱則惟用純陰之品以化

其陽而已。

上焦熱宜山梔黃芩中焦熱宜黃連下焦熱宜知母黃連此治閉癃之大法也。乃

丹溪獨以吐法通小便蓋亦猶滴水之器上竅通下竅自出之意。

其旨微妙有可叅用其法氣虛者先服藥。

宜補中益氣湯

後用吐血虛者

亦先服藥後用吐。

宜芎附歸湯

痰多者亦先服藥。

宜二陳湯

後用吐氣閉者用

藥爲探吐。

宜香附木通

血瘀小便閉者則以牛膝桃仁爲要藥嘗採其

法用之頗效雖然閉癃之異究何如哉新病爲閉閉點滴難通也。

久病爲溺癃屢出而短少綱目謂即癃病也此二症之寔也若夫

溺有餘瀝全由於腎氣之虛須當補益爲要。

宜覆盆子菟絲子五味子沙蒺藜益智仁

鱗鬚山萸牡蠣

脉法 仲景曰、腎脈滑蹇爲癃瀆。 脉訣曰、便血則芤數則赤。
黃寃脉癃閉熱在膀胱。 醫鑑曰、少陰微者氣閉膀胱。 綱目
曰、癃病脉細不治。

小便不利 仲景曰、陰虛則小便難。 丹溪曰、小便濇者血因
火。 滯下焦無血氣不得降而滲泄之令不行也。 宜補陰降火。
入門曰、小便難者出不快也。 經曰、陽入陰分則膀胱熱而小便
難。 直指曰、腎虛小便數而瀝如欲滲之狀宜溫補。 綱目曰、
小便數而不利者有三。 若大便泄瀉而津液濇少一也。 宜利而
已。 热搏下焦津液不能行者二也。 必滲瀉乃愈。 若脾胃氣濇不
能通調水道。 下輸膀胱而化者三也。 可咽氣令施化而出。 如茯
苓琥珀散用澤瀉滑石赤苓白术猪苓琥珀肉桂炙草者是也。
不得混治。

小便不通

內經曰。胞移熱于膀胱。則癃尿血。

元素曰。熱在

下焦。填塞不通。其症小便閉塞而不渴。時見躁者是也。

東垣

曰。小便不通。有氣血之異。如渴而小便不通者。熱在上焦氣分。

宜清肺。如不渴而小便不通者。熱在下焦血分。宜滋腎。又曰。血濇致氣不通而竅塞。宜導氣除燥。

綱目曰。小便不通。臍下狀

如覆椀。痛閉難忍。治法有二。如氣不能化而不通。則用陳皮茯苓湯調木香沉香末二錢空心服。

兼用吐法以提之。如血瘀于

下而不通。則用桃仁承氣湯之類。

回春曰。嘔噦而小便不通。

者。難治。中滿鼓脹病。小便不通者。難治。

正傳曰。老人氣虛短。

作小便不通。爲下焦血氣乾者死。

鼻頭色黃者
小便必難

閉癃宜吐瀉。丹溪曰。水道不通。屬氣虛血虛。有寢熱。有痰氣。

閉塞。皆宜吐之。以提其氣。氣升則水自降。蓋氣承載其水也。又

曰。寔熱癃閉。用八正散。蓋大便動。則小便自通矣。直指曰。水道不行。其本在腎。合用牽牛澤瀉。其末在肺。合用葶苈桑皮。更以木通滑石佐之。又能透達。雖然。大便小便。脉絡相貫。人有多日小便不通。但使大瀉數行。則小便自通。

尿色。內經曰。水液渾濁。皆屬於熱。資生曰。小便有五色。惟赤白色者多。赤色多因酒得之。白色乃下元虛冷。

導引。保生秘要曰。搓小紙捻入鼻。候打嚏噴。小水自通。此治閉塞。若遲塞。多搓掌心及湧泉穴。退火安靜。或再行運功法。自效。

運功。保生秘要曰。及小腸症同法。從歸元法旋運。而下旋至病處。多運數十回。復遶而上。撒而散之。週而復始。如法漸行。穀道去濁。提回守靜。

小便黃赤。是熱病也。凡臟腑皆能爲之。而下焦更甚。經曰。肝熱病者。小便先黃。宜火府丹又曰。胃氣盛。則身以前皆熱。消穀善饑。溺色黃。宜涼。此二條言。肝胃有寃熱。故黃赤也。又曰。肺氣虛。則肩背痛寒。胃湯。

少氣不足以息。溺色變。宜加味補又曰。各脈不及。令人眇清脊痛。小便變。宜溫腎湯此二條言。肺腎虛寒。故黃赤也。又曰。厥陰之勝。胠腋

氣并化。而爲熱。小便黃赤。宜青皮赤芍防風柴胡此一條言。氣運之屬風。而

黃赤者也。又曰。少陰司天。熱淫勝。病。溺色變。宜黃柏又曰。少陽之

勝。溺赤。善驚。宜山梔又曰。陽明司天。燥氣下臨。暴熱至。陽氣鬱發。

小便變。宜黃芩此三條言。運氣之屬熱。而黃赤者也。又曰。中氣不足。溲便爲之變。宜加味補此一條言。脾家虛。故黃赤也。又曰。小便

黃者。小腹中有熱也。此則言下焦之熱。不可不清之利之者。宜四苓散

然下焦之熱。豈但是哉。或由腎虛。有火。宜陰丸或由膀胱蓄熱。宜葵子湯

亦或由小腸燥結

宜赤苓湯

固當分別治之。

小便黃赤形症 得效曰上盛下虛小便赤澀必致成淋
尿色 內經曰足陽明之脈病氣盛則尿色黃 仲景曰疸症
小便如黃柏汁 正傳曰下焦無血小便濤數而黃色

遺溺腎小腸膀胱三經氣虛病也而經又推及肺肝督脈緣肺主
氣以下降生水輸于膀胱肺虛則不能爲氣化之主故溺不禁也
宜補中益氣湯不愈當以川芎白芍
黃柏生地麥冬清其熱 肝督二經之脈並循陰器繫廷孔病則
營衛不至氣血失常莫能約束水道之竅故遺溺不止也宜荆芥黃連防風
身澤瀉白芍督脈病若夫腎上應于肺爲子母母虛子亦虛其遺
數宜也宜兎絲子散小腸主傳送故其氣虛亦患遺溺也宜茯苓澤瀉
生膀胱者水泉所藏虛則不能收攝而溺自遺也宜兎絲子散
赤石脂白芍非子丸挾熟白微以上皆小便不禁之由子諸經者也至如小兒
散滑脫牡蠣丸

睡中遺尿，多由于寒熱而間或因寒，宜沈氏閟泉丸。扶寒去老人淋漓不禁，多由于虛寒而間亦有熱，宜大丸子丸爲主。不可不審也。妊婦尿出不知，或由脬熱，宜加味。或由脾肺氣虛，益氣湯。或由肝腎陰虛，味丸。不可不審也。產後小便不禁，或由脬損，宜補中湯。或用八珍湯補脬飲。或由膀胱氣虛，宜加味。或由膀胱陰虛，宜補固胞湯。逍遙散。或由膀胱陰虛，宜補肺腎不可不審也。果如是，遺溺之病，亦何足慮哉。

遺溺原由症治。內經曰：膀胱不約爲遺尿。又曰：水泉不止者，是膀胱不藏也。直指曰：腎與膀胱俱虛，內氣不充，故脬中自滑，所出多而色白。是以遇夜而陰虛愈多。又曰：下焦虛寒，不能溫制水液，則勞內損，則便尿自遺而不知。又曰：下焦虛寒，不能溫制水液，則尿出不禁。又曰：經云：水之本在腎，其末在肺。則知天一之水，自上而下，相爲貫通也。丹溪曰：小便不禁，屬熱，屬虛。熱者五苓

散合黃連解毒湯虛者五苓散合四物湯加山萸五味子又曰
下虛內損而不禁宜補膀胱陰血瀉火邪爲主入門曰傷寒
熱病及風溫狂言直視遺尿者不治

尿色 丹溪曰小便不禁赤者有熱白者氣虛

飲後卽便精氣耗散病也內經曰飲入于胃游溢精氣上輸于脾
脾氣散精上歸于肺靈樞曰人飲酒酒入胃穀未熟而小便獨先
下蓋酒者熟穀之液其氣悍以清故後穀而入先穀而液出焉以
是知飲入胃而遽覺至膀下卽欲小便者皆精氣衰耗不能輸于
脾歸于肺也東垣以爲不輸脾歸肺心火必上攻使口燥而咽乾
旨哉言矣

宜補中

益氣湯

便溺原委 東垣曰溲尿者水也水之下流其性則然也飲入
於胃其精氣雖上升其本體固不能上升則豈可謂小便獨爲

氣化所成哉。

交腸症陰陽失度病也。此症惟婦人多有之。或因病後或因嗜酒血枯氣耗陰陽失于傳送故大小腸錯亂往往小便中出大便亦大便中出小便而成此症也。宜五苓散如不愈以舊幞頭燒灰酒服

交腸症治 丹溪曰一婦人嗜酒常痛飲忽糟粕出前竅溲尿出後竅六脉皆沉濶與四物湯加海金沙木香枳榔桃仁木通服之而愈此人酒多氣升不降陽極虛又酒濕積人生熱煎熬其血陰液大虛陰陽俱虛而暫時活者以其形寔而酒中穀氣尚在故也三月後必死果然回春曰一婦人病愈後小便出屎先服五苓散二劑又用補中益氣湯而愈

治閉癃方六

金匱腎氣丸大虛澤瀉附子肉桂牛膝山萸山藥川皮草薢

補中益氣湯

氣虛柴胡

人參炙草

當歸

白朮

升麻

黃芪

陳皮

姜

棗

芎歸湯

血虛川芎

當歸

二陳湯

痰多

茯苓

甘草

半夏

陳皮

桃仁承氣湯

血瘀

當歸

白朮

升麻

黃芪

八正散

寒熱山梔

大黃

木通

瞿麥

扁蓄

渭石

治小便黃赤方七

火府丹

肝熱空心服

黃芩錢半

生地三錢

木通四錢

涼胃湯

胃熱空心服

黃連

甘草

陳皮

當歸

白朮

加味湯

補中益氣

肺寒柴胡

人參甘草

黃芪陳皮

當歸茯苓

白朮車前

升麻姜

溫腎湯

腎寒附子

人參附子

肉桂

熟地

牛膝

升麻

補陰丸

腎火側柏葉

知母砂仁

五味子

甘草

龜板

杞子杜仲

黃膏爲丸

四苓散

下熱 茯苓 猪苓 澤瀉 白朮

葵子湯

膀胱熱 冬葵子 赤茯苓 猪苓 枳實
瞿麥 滑石 木通 黃芩 車前子 甘草

各一錢 姜五片

治遺溺方十七

補中益氣湯

肺虛 人參 黃芪 當歸 白朮 升麻
柴胡 陳皮 甘草 姜 粢

加味益氣湯

補中 膀胱虛 柴胡 人參 黃芪 當歸
牡蠣 甘草 陳皮 茯苓 肉蓯容 車前
菟絲子

菟絲子散

腎虛 牡蠣 雞肫去黃皮微炒 共爲末 每服二錢
膀胱虛 甘草 五味子 肉蓯容 杜仲
固脬丸

絲子 酒糊丸 附子 戎鹽 桑螵蛸 兔

家韭子丸

挾寒 菖子 鹿茸 牛膝 熟地 歸身
肉蓯容 菟絲子 金石斛 巴戟 杜仲

內桂 乾姜 酒糊丸

白微散

挾熱 牡蠣 白微 白欽 白芍 等分

牡蠣丸

滑脫 牡蠣 赤石脂 酒糊丸

沈氏闕泉丸

小兒

梔

白芍

桂

附子

金石斛

熟地

茯苓

石龍芮

肉

白术

白芍

白斂

黑山

大菟絲子丸

老人

菟絲子

澤瀉

鹿茸

川斷

肉蓯蓉

杜仲

防風

補骨脂

山萸

川芎

肉桂

牛膝

肉

五味子

桑螵蛸

覆盆子

加味逍遙散

肝腎虛

六味丸

肝腎虛

沈氏固胞湯

肝損

酒炒

桑螵蛸

二錢

酒黃芪

五錢

炒

當歸

生黃絹

一尺剪碎

白牡丹根皮

一錢

菟子

萸肉各

三錢

酒炒

全當歸

茯苓

桂

附子

各二錢

生白芍

錢半

升麻

二錢

炒

茺蔚子

各二錢

生白芍

錢半

升麻

二錢

炒

羊小腸子

一個洗淨

煎湯代水煎藥

此余自

製方也屢用神效

八珍湯

又川芎

人參

茯苓

白朮

甘草

生地黃

補脬飲

又白芨

生黃絹

一尺剪碎

白牡丹根皮

一錢

將二味爲末

水一碗煮至絹爛如

餡空心頓服

服時不得作聲

如作聲即不效

五苓散

因熱 肉桂 白术 疦苓 猪苓 澤瀉

黃連解毒湯

又 黃連 黃柏 黃芩 山梔 等分

四物湯

因虛 川芎 當歸 白芍 地黃

治飲後卽便方一

補中益氣湯

總治
柴胡 人參

黃芪

當歸

白术

升麻

陳皮 甘草 姜

棗

治交腸症方三

五苓散

總治
茯苓 猪苓 澤瀉

白术

升麻

肉桂

補中益氣湯

又 胡 人參
甘草

黃芪

當歸

白术

升麻

柴

四物湯

又 川芎

陳皮

姜

棗

當歸

白芍

地黃