

自在壺天

豆去皮油淨三錢右先為末後入巴豆同研極細重羅過以磁罐收之黃蠟封口臨用以生蜜調一丸如黃豆大新汲井水送下行三次瘡即愈又看瘡執大小用之多寡若瘡日久執大丸如大黃豆大若瘡新起則丸如小黃豆大若急口噤得藥下即愈臨用旋丸久則不效

○癰疽生肌方

寒水石

鹽泥火煨過

黃丹

水飛過各五錢

龍骨

火煨便

輕粉

二錢

共為末攪膏封固妙甚

○惡瘡腫毒不能完口方

各一錢七分化開 傾在地上取起入輕粉一錢 潮腦

二分 水銀一錢 冰片一分 為末聽用共重四錢

○破諸毒方

蜈蚣一條 推車客一個 鹿角一錢 共煨存性為末將

巴仁炒黑研入前藥插用少許敷之即破

○又方

蛇蛻瓦上焙乾為末香油調用筋頭蘸藥點之其毒即出頭如筋頭神效

癰疽瘡癩膿潰之後外觸風寒腫掀結硬膿水
不絕肉腠空虛惡汁臭敗瘡邊乾及好肉不

生方

黃連

木香

檳榔

各等分

為細末摻膏貼

○腫毒無頭久不破方

出過蚕繭

一個

燒灰存性生酒下立效

又胆礬

雀屎

各少許

點之

又白砒

一分

麝

半分

冰片

半分

青

鹽

五分

雄黃

五分

共為末每用三釐入螺螄內化水

以新筆點患處其核自出

又木螫子川烏二味磨

水翎掃留錢大出膿乾再掃一時穿

○射膿法

枯礬 黃丹 各一砵 五分 為末 麩糊為丸 捻為錠子

粘於頭欲出處以膏封之自潰

○錠子方

江子 一個 枯礬 人信 各一砵 砂 燒 三分 硃砂 五分 雄

黃 五分 百草霜 一錢 共為細末 糊丸如穀米 大隨毒

之大小用此 外科總要如珍之重

○腫毒惡瘡痛不可忍方

蜒蝥

十條
搗爛

冰片

一分

白礪

三分

和勻塗圍四邊止痛

○又方

糖鷄屎

白梅

即霜梅

醬豆

十數粒

蜒蝥共搗爛敷患處

○對口方

先以甘草湯洗淨用猪眼臊

大者用一個
小者用二個

蒸占米飯

同搗敷上外以膏封自長落萬愈

○又方

以猪胆帶汁貼患處更勿移動有膿亦愈

○又方

皮硝 二錢 荔肉 三錢 糖鷄屎 少許 搗勻敷之定痛

○又方

猪肝切片貼換二三次即消 又蜨螂塗臍即好

○痒腮方

赤小豆為細末新水或蛋清調敷乾再敷妙 又礮

石灰炒窰七次好醋調敷腫處立愈

○又方

如腫痛潰爛青黛芒硝為末米醋調敷 如出膿不

收口者名曰漏疔以白螺壳 煨存 水粉 煨過 輕粉燈

草灰灑之加膏貼收功

又指方

手大指次指隔界處忽生腫毒痛不可忍俗名又指
用生螃蟹搗爛塗上立消若不早治必爛人手

了指蛇頭瘡不愈方

海金沙一兩姜汁搗酒服渣敷患處立消如蛇口流

膿血不止者雄黃蜈蚣全蝎水洗等分為末攪膏敷又

代指用烏梅仁搗爛和醋敷浸

○指頭毒痛方

蜈蚣為末雞清猪胆調敷 又猪胆連汁套

○又方

鷄蛋

一個去黃全蝎燒灰存性連壳戴指上立效

○又方

小黑田鷄石灰 一撮 搗爛敷上過一宿有小蛇在茄

中出 又鷄蛋少去白荔枝肉嚼碎套之內服人參

敗毒散

○疔瘡方

紫礪一錢石灰一錢烏龍尾五分共為末真燒酒調

膏用筋頭點三四次用小針捻之如痛再點到骨者除根要認得頭點之

○又方

核桃仁一個古錢一個二者細嚼酒服至死不過二服又蔥白搗敷

○又方

生蜜老蔥共搗如泥將瘡挑破上藥用線縛住如人行五里其疔自出執醋洗之

○又方

人信

明雄

阿魏

蟬酥

各一

硃砂

六分

麝

二分

以上六味米糕以水和濕入藥和作小薄餅陰乾入磁罐每用取米粒大一塊以醋濕患處將銀簪挑破瘡頭用藥點上外貼膏藥過夜次日揭開看有一塊黑肉疣瘡去之即愈

○又方

疔生十四日諸藥敷之皆不效用螻螂心治一夕而百苦皆除只一味貼疔半日再易血盡膿出遂愈螻螂股下度取心其肉稍白是也忌羊肉

○又方

蟬酥 雄黃

硃砂

各一分

為末將病人抬來止用大

針孔多藥用瘡上其人即活外用雄黃

五錢

酒服五

分若未斷氣可以復活秘之

又香油調雄黃末服

以解其毒

○又方

烏梅核

連仁

同醋搗爛敷患處即止痛而消

○又方

透明松香

瀝青

各五錢

麻子肉

二錢

冬

大青石上以

鉄槌搥至前藥粘在槌上如清水一般如度加飛丹

一錢再搥數百下取收小磁盃內如遇初起疔毒以

新厚青布照瘡攤貼之即止痛少頃毒水流盡時

如燈草一條拔出仍以此舊膏貼之至重者再換一

膏全愈

小磁盃煇化竹
筋攤一文厚

○又方

草烏頭

一兩

蟬酥

七米許

巴豆

七個去皮

麝香

一字

右為細

末麪糊和就熬作錠子如瘡透針不痛無血者用針

深刺入痛處見血用此錠經之上用膏藥貼之疔瘡

四畔經之其疔二三日自然拔出

○又方

白礬

末三錢

葱白 七根

共搗極爛分作七九每一丸熱

酒一盃送下服畢用厚被蓋之用加葱白湯一鍾少刻汗出從緩去被其病若脫

○又方

刮下多年釘鏽用糖鷄屎調塗半夜崩開取出黑疔

○又方

雄黃

一錢瓦上焙焦黃

為末以病人尿調敷瘡上一時拔出

如發熱欲死者以菊花葉汁入口即活冬用其根莖
紫梗黃花者佳

○又方

緊磁石末醋調敷封患處少時力拔出疔神妙 又
吳茱萸大蒜搗爛敷四圍即消 又鹽一錢菊花根
數根搗敷拔疔愈 如疔瘡走黃打滾欲死者用
牡蠣 大黃 山梔 金銀花 木通 連翹 牛
旁 地骨皮 乳香 沒藥 皂角針 瓜篔 每各五錢
氣壯者加朴硝右水一碗酒半碗煎一服定愈

○疥瘡癢痛異常心如火燒方

芫花根

五錢

生姜

五片

蜜

一小鍾

酒醪糟

一大鍾

同搗爛

取汁加好酒溫服出汗瀉下毒氣即安 又先刺出

血以海螵蛸末搽之其疔自出

蛇頭疔方

銀硃

五分

松香

二分

血竭

一分

細末麻油調搽立時

定痛 又雄黃同猪肉搗包即愈

○蛇眼疔方

此乃極惡之毒慎不可割用鷄蛋

一個大頭處用針挑一孔存內薄皮

不得漏
青黃 將孔合在瘡上即燃香記之輕者一炷香重
者一炷半香至重者二炷香看瘡慘淡人覺清明方
起鷄蛋擲入溝渠鷄犬不食切不可剗割自速其死
犯者十有十死

○又方

獨蒜橫切一片去心將孔對心瘡口上灸七壯常疥
灸三壯愈

○牛肉疔方

菊花根 五錢 葛蒲 五錢 搗生酒去渣服立愈

紅絲疔方

於初起處繩紮兩頭磁鋒刺去惡血口嚼浮萍敷之

又方

胡椒一分為細末糖鷄屎調敷其紅絲即沒矣百發

百中

魚臍疔方

韭菜連頭葱絲瓜葉共入石臼搗如泥以酒

和服以渣貼腋下隨瘡左右脚貼臍中中貼心臍並

用布帛縛住候肉下紅絲處皆白則可有潮熱亦用

此法却用人抱住恐顛倒不可救
又瞿麥燒灰和油塗之甚佳

○癬藥方

土槿皮一兩擯榔三錢用水一大碗煎至半碗罐盛
外用水浸罐齋口不即要乾穿山甲抓破搽一二次
即愈先飲酒數盃使發癢驗過多人

○又方

鮮銀杏外皮同礬搗擦神效

又赤石脂

一錢 枯礬 五分

一錢 撫丹 五分 白砒 三分 細末香油調搽永不發

又方

花椒子 胡椒 等分
為細末用桐油與松香熬成攤
油紙上照瘡大小貼以椒末洒滿貼上一夜自愈

○又方

決明子 為細末 水銀 輕粉 各少許
同搗為膏以物擦破
瘡上用藥敷之

○又方

滑石 三錢 大黃 五錢 斑蝥 二錢
信 一錢 穿山甲 三錢
雄黃 三錢
共為細末入大碗內上用桑皮紙封口上

堆糯米糠以火燃着其油滴入藥末內和勻搽之
必抓破其紙以針刺小孔

○諸般頑癬方

川連

一錢

雄黃

一錢

人信

一錢

黃柏

一錢

山甲

瓦焙
乾取

末一錢

斑蝥

占米炒
黃一錢

共六味

如升打靈藥法用茶鍾一

個上用厚棉紙一張蒙在鍾上用藥三分安在中用
安蘄艾在藥上四圍用糠圍住中間用火在艾上燒
其靈藥盡在鍾內將靈藥用清水調搽癬上即起泡
水流盡則乾二七全愈艾只一文厚不可多

○又方

蘆會

一兩

甘草

五錢

為末先洗拭乾後搽上

○牛皮癬方

川烏

草烏

鬧羊花

等分

為細末將癬抓破捏些

搽上微痛過性即愈

○又方

香油

一兩

入全蠋

七個

巴豆

二十粒

斑蝥

十個

同熬色

焦者先去之去完入黃蠟

一錢

候溶收起朝搽暮愈

不損好肉

陰陽癰方

水銀一錢 鉛一錢 鈎一錢 銅砂仁一錢 花椒一錢 大黃一錢

硫一錢 為末青布包醋浸過擦數次愈

○楊梅結毒方

紫草 血竭 黃蠟 麻油熬塗貼

○又方

土茯苓半斤 出山鉛二兩 猪肉數兩 以上三味入磁罐內着水四五碗煎湯當茶吃其肉啜飯五七日全好不用鹽爛鼻能長如長不正又復長陽物爛去能

長如舊

此係抗僧用厚禮求得者
吳公御傳於汪文長轉授

○又方

治人舌斷并陽物害去一節用狗頭一個入鉛一兩
在內腦中外用鹽泥封固入炭火煨紅取出每用

鉛一錢

水銀

五分半將水銀投
入化鉛內煉細末

配乳香

三分

沒藥

三分

粉霜

三分

硼砂

一分

雄黃

一分

凝水石

四分

共為末

同鉛水銀和勻收貯如舌斷先用米泔水入蔥頭煮
湯嗽口淨以棉胭脂拭乾將藥敷上只一時長如舊
去藥如陽物爛去蔥湯熏洗淨上之如舊

又方

木通 一两 皂子 七粒 僵蚕 七條 蝉退 七個 土茯苓 半

分作七次水煎服甚者再煎一單則爛鼻復出忌油
醬醋一百日

○又方

乳香 沒藥 硃砂 雄黃 硫黃 各二錢 白硫 一錢

共為細末用黃蠟 五錢 化開傾在水面上浮上取出
再化如此三次却再化開入前藥調勻為丸芥子大
每日早用土茯苓四兩用水十碗入牙皂末 三分 待

冷送下七釐日進四五服宜多次不可多添釐數專
治結毒潰爛能完耳鼻復長腎莖二服定痛服至四
五日流出腥臭膿血此是毒氣攻出流清水不作氣
味者毒盡即止痛服藥自然漸收口如多服肉必
長高矣

○又方

大黃

一兩

蓮肉

三十個

直大僵蚕

三十個

穿山甲

三十片

明

雄

三錢

共為末每服七分好酒調下功效在出汗之

後即見

○又方

牛黃一錢 珍珠一錢 琥珀八分要真正者 硃砂一錢要透明者 明雄

一錢 滴乳石一錢五分假 乳香 沒藥各一錢去油 母丁香

沉香各一錢 麝香二分 歸尾二錢五分 白芷稍二分 人參右

各製為細末老米飯為丸如粟米大每服一分空心

晚各一服以淡土茯苓湯下此丸以牛黃硃雄解其

毒以珍珠琥珀滴乳石生其肌以乳香沒藥解毒生

肌蕪之止痛以麝沉丁香通竅更引諸藥入於毒所

血微氣滯始結成毒故以歸尾消其血之凝白芷稍

散其氣之滯又以人參壯其正氣所謂正人進而邪人退矣如此施治寧有厥疾不瘳者哉

○又方

輕粉 杭粉 等分 為末乾搽上立時起蓋結疤神效

○梅瘡方

活鱖魚 去腸淨入紫背浮萍令滿扎好 盛大碗內浸之以酒鍋內重

湯頭執連食數個取汗蛻落而愈

○又方

龜板 一塊 羊油 四兩 塗龜板 搗碎末 和酒飲 極醉 蓋

取汗如兩自消

又方

土茯苓四兩猪胰子一個腰帶一條肉四兩煎湯不
時用忌茶只用花椒湯

○又方

初起時用羊肚內入檳榔三四個白水煮爛只食肚

○又方

羊屎晒乾為末為丸酒服五錢取汗如血珠即愈

○又方

苦參

童便浸晒七次曬乾

黃丹

水藥

水銀

鉛

各五錢

俱為細末

用大鯽魚

一個當中刮開去腸屎留胆

飯上蒸熟若

食何處即何處先愈神妙

又胆礬入黑枣內火煨

為末少加硃砂潮腦點上即好

又方

硫

五錢

汞

三錢

用水一鍾入鉄鍋內以二藥入內用

杯覆之用火煎乾水升藥於杯內取下每用六釐和
亭歷子和麴皮包吞輕者五日重者十日安

○又方

大蠶墓

一個刮去穢入人參
三分入麻黃三分

復入健猪肚內用好酒

煮極爛去墓食肚飲酒數杯取大汗凡梅瘡已有出
意滿身骨節痛如針刺不可忍者服之其毒盡解其
瘡盡發出其痛盡去無後患

○又方

穿山甲

焙燥
研碎

將胡桃劈開去肉入在內把頭髮纏住

泥固煨過去泥研末每一胡桃加輕粉

四分
冰片二分

以猪脊髓調點

又杏粉

輕粉

共細末

猪脊髓調搽

○又方

淨槐花

細茶葉

胡桃肉

各四兩

短水酒十觔煎五

觔不拘時服即褪無餘毒一日吃完十日全愈二日

吃完二十日愈神妙

此方不用土茯苓不忌茶醋燒酒牛羊

○又方

健猪肚子

一個去淨不洗用花椒四兩

煮極爛去墓

椒不用連湯任意服之取大汗屢驗

○又方

蜒蝨螺插生酒盡醉服之次日則毒盡發於外三四

日禿愈約用半碗如怕吃用猪肉同蒸肉圓或包餃

餌食之亦妙

○又方

杏仁

七個打碎

僵蚕

七個白而直者

蟬退

七個去頭足

皂角子

肥皂

子

各七個打碎

每用土茯苓

四兩

同前藥用河井水各三

碗煎至三碗每日早中晚各服一碗忌陰人手及茶

酒酸醎之類

○楊梅漏方

輕粉

官粉

新瓦焙黃各一兩

杏仁

七個去皮尖油淨

同猪脊髓杵

爛攤膏如深填滿坑用膏封護

○又方

牛黃

麝香

各五分

小丁香

乳香

沒藥

明雄

去油

硃砂

輕粉

用薰湖青布角炒
或人乳浸一宿

白芷稍

微火焙

歸尾

酒洗

各一錢五分

槐花

乳汁炒
一兩

右藥分兩秤準俱為細末陳老

米糊為丸如粟米大微火焙乾不可日晒每三四釐

日五服土茯苓

六兩

牙皂

一個

煎湯送下重者五錢

輕者三錢止食白菜臘肉飯餘皆忌半月又囊爛

見子用鳳仙花子甘草

等分

蒜油調敷即生肉皮

○去面上梅瘡方

輕粉 銅錄 龍骨 胆礬 為末點上次日脫去

○止梅瘡不上面方

油頭髮煨灰 三錢 空心酒下三次即止

○多年爛楊梅瘡方

猪油 四兩 白蠟 一兩 白龍骨 一錢 軟石羔 五錢 輕粉

五錢 官粉 五錢 白石脂 一錢 冰片 五分 螻蛸 一錢 共

為極細末先化猪油淨入末藥和成聽用

○去瘡疤方

新橄欖核磨水塗漸白肉 又白蘿蔔切片貼數夜

即白 又大黃 白礬 等分 研細搽之

○瘡後髮落復出方

黑羊屎炒溫熱絹袋盛之夜睡時鋪上落髮處自生。

○咽喉梅瘡飲食難下方

兒茶為末加些雄黃紙包撚成條蘸油蘸點着吹滅以刺患處三五次即痊若怕者用末藥加些胆礬吹之或蜜調含之搽之俱用綿包索粉洗喉淨即安

○父母害過梅瘡生子爛皮方

明雄 桑葉 等分 為末香油調搽母乳頭令兒吮數

次極效每五分重者一錢亦可作稀痘丹

○結毒方

猪板油汁 一兩 松香 五錢 黃蠟 五錢 共化一處熬盡

藥熱貼之一月即愈忌犬肉芥菜椿頭

○又方

輕粉 鉛粉 各一錢 硃砂 三錢 細末猪脊髓搗膏先用

甘草湯洗去腐肉後以膏搽上妙不可言

○又方

經霜紫荊花葉取陰乾臨用飯上蒸軟貼之

○又方

輕粉

抗粉

各一兩

白蠟

五錢

乳香

沒藥

各三錢

樟腦

冰片

各二錢

用公猪熟油

五兩

同白蠟熬化傾入碗內

入上藥和勻水內頓一時取起臨用抵脚挑藥於手心捻化攤油紙上用葱湯洗淨貼之

○又方

當歸

金銀花

各一兩

皂莢子

百粒

防風

五錢

土茯苓

五錢

分十劑水煎鉛為碎片分妙

○頭面結毒方

蘄艾

去筋膜 一兩

川椒

去核 八錢

麻黃

去節 二錢

川芎

二錢

猪頭天

靈蓋

火煨存性 五錢

白茯苓

二兩

共

細末

蒸餅丸

如棗豆大

飯後

白湯送下

三錢

服後

二三日

瘡口

乾不臭

是其

效也

服至瘡口

平復

方住

忌口

并房事

久患者

宜服

十全大補湯

十數劑

○結毒在喉成瘡方

牛黃

琥珀

冰片

珍珠

煨各三分

麝香

三分

犀角

三錢

象皮

一錢 土炒

龍骨

一錢 煨

乳香

沒藥

各三錢

各另為末

和

勻

每日吹

五七次

不要換人

忌鹽

油

黃酒

等發物

○女人懷孕有結毒方

生地 川貝母 川連 酒洗 花粉 川芎 厚朴

黃栢 鹽酒炒 蟬退 僵蚕 苦參 桑皮 各四兩 荆芥穗

防風 金銀花 各三兩 土茯苓 十兩以竹刀刮去粗皮 共為細末

麩糊為丸梧子大每晨鹽湯下二錢不可斷間可免

孕子傳染之患

○結毒頑不收口方

胆礬 一兩 精猪肉 三兩兩切片夾以泥陰乾煨存性為礬在內紮包

末搽之立刻收口長肉

○廣東惡瘡方

雄黃

一錢五分

杏仁

三十枚
去皮

輕粉

一錢

為末洗淨瘡再以

雄豬胆汁調上二三日即愈百發百中天下第一方
出武定侯府中積德堂方

○梅癬方

汞

輕粉

楓子肉

等分

為末塗之

又輕粉

二錢

杏仁

四十二個
去皮

為末塗之

又青風藤

二兩

三白酒煎

空心服出汗三四服愈

○又方

水銀一錢鉛二錢化製醋牛舌草根汁絹包擦

○又方

雄猪胆一個栢油同熬入硫細末再入黃蠟冷定出
火毒塗之或少入銅青

○取輕粉毒方

出山鉛五觔打壺一把盛燒酒十五觔入土茯苓半觔

乳香三錢封固重湯煮一日夜埋土中出火氣每日

早晚任意飲數杯後用瓷杯接小便自有粉出為驗
服至筋骨不痛乃止

○又方

黑鉛

三錢化開

以好麻

二錢

作刷研鉛汁務要以鉛汁乾

為度取出羅細末水銀

二分半鉛瓦

山甲

五分半刷黃

乳香

沒藥

各五分

共研生蜜丸成一丸以麻黃煎酒送下出

汗即愈

又凡因服輕粉以致結毒者筋骨疼痛可

於當服藥內加碎鉛

五錢

同煎可治粉毒而必效

○解毒方

蟬退

六十

肥皂子

六十

皂針

二兩

金銀花

四兩

杏仁

二兩分為四劑每入土茯苓

四兩

水五碗煎至減半

分服有粉毒者亦宜加鉛

○又方

皂子

二十個

金銀花

三兩

燈心

三百根

土茯苓

五觔

白酒

三十觔封煮埋土七日任服

○梅瘡魚口疳瘡方

穿山甲

大黃

僵蚕

白芷

五靈脂

各一兩 炒半熟

末

分四服空心服一兩如行補之不行以大黃湯催之

一服即愈已發未發俱宜服

○魚口方

五倍子

同石 灰 蚶 黃 芩 去 灰

攤地出火毒砂盆內為細末乾搽

五次即愈

○又方

滑石

水 飛 二 兩

斑蝥

二 個 去 頭 足 翅

分作二服空心溫水下又用

木通煎湯常服

○又方

黃栢

三 兩

蒼朮

二 兩

猪胆汁杵敷立消 又雄羊角

尖炙焦為末每服六分好酒下痛即止腫即消如出

膿者亦易收口不二服

○疔瘡方

燈草灰

一分

冰片

一分

輕粉

少許

敷上

即愈

○又方

牛黃

八釐

珍珠

一分

胎髮

一分

靈蓋

一錢

血竭

一分

冰片

一分

人筋

一分

輕粉

二分

龍骨

一錢

細末

頻篩

一些

○又方

嫩苦松

兒茶

陀僧

蛤粉

各少許

為末

洗拭

灑之

○又方

黃栢 白芨 共細末勻搽上三日愈妙不可言

○又方

麻油四兩入章腦五錢煎三四滾烟盡即起冷定浸

一夜即消腫

○又方

輕粉末乾搽即結疤愈 女人爛疔用油松節碎煎

熏洗二三次愈

○又方

下腫包住其膿不能出者

黃連一錢黃栢五分黃芩五分車前子一錢山梔錢二

燈心根三十水煎空心服渣洗患處腫自消皮自翻

○又方治蛙

蝸牛 兒茶 為末吹敷亦治喉風
喉痺如神

又方

黑鉛五錢化開入水銀成細末入寒水石三錢
五分研砂

一錢共為細末貯以磁罐先將葱艾椒煎水入瓶內

將陽向瓶口熏待痛止再洗淨乾拭之搽上玉莖腐

爛亦能長只少頭 又陰頭欲斷者黃連黃栢末敷

內疳方

謂似遺精但陽物紅腫色用塘內泥竹稍破開以碗盛其水以陽物浸於內沾此水氣即安

○下疳方

鮮大薊

鮮地骨皮

各五兩

煎濃汁浸之三四日即愈

○又方

凡出黃水經年不乾此方極效

粗草灰

一錢

輕粉

一錢

金元丹

五分

冰片

一錢

朴硝

煎洗後搽即收口

○又方

鉛粉

以綿紙包盛於瓦上炒至粉紅色為度

每一錢加輕粉

五分

冰片

二分紅蓮灰五分搽之立愈點瘡亦妙

○又方

鏡銹不拘多少猪脊髓調搽妙
又扁螬壳燈上合炙乾
為末加冰片塗上即長肉

○蠟燭卸疔方

橄欖核

燒性

存

燈心

燒性

存

先用米泔調濕晒乾加冰片

天靈蓋

少許

細末敷愈又花椒淮鹽

煎洗拭乾

兒茶末敷

○便毒方

獨子肥皂入亂髮在內燒存性為末酒服外用肥皂

和米醋搗塗敷之

○又方

大斑蝥

一個去頭足翅

滑石

三錢水飛淨用

磁盆內為細末加木通

淡竹葉煎湯早晨空心服作三次每服一次用滾白湯三四茶鍾趕催藥性一日即愈

○又方

水膠化塗即消或加姜汁亦妙
又白礬 葱白 各一兩
搗丸空心酒送下立消

○又方

綿地榆 四兩 白酒二碗煎一碗空心服雖已成膿亦

愈如同處山甲 二片 引經更妙

土炒

○又方

綿地榆 四兩 粉草 一兩 金銀花 一兩 白芷 三錢 皂針

二錢 水二鍾煎一鍾空心溫服

○又方

便毒已潰不能長肉收口先取肥狗肉 三觔 聽用將

肉湯洗瘡口將狗肉漸塞入瘡口令滿外用絹扎定

不可走動安息數日瘡內肉漸長狗肉漸出出盡瘡

內漸平神效

肉或碎切

又方

歸尾

角針

大黃

芒硝

穿山甲

炮各五錢

核桃肉

三錢

古錢一文

好酒二碗煎一碗露一夕空心服百

發百中不可輕傳將破者亦可內消

○又方

蜈蚣

二條瓦焙貫衆

大者一枚燒為炭色

為細末以生酒調服一劑

則消矣

○又方

黑丑大黃二錢 歸尾五錢 僵蚕一錢
山甲壁土炒 木鳖
三個 甘草節一錢 好酒煎服空心勿食瀉安

○ 臙瘡方

定粉一塊將土塊研空一孔置粉於中上用杉木炭微火煨以黃為度取出覆地上一時細研二錢
加輕粉一錢 臙瘡用茶洗淨以猪脊髓調搽將乾時
搽之如受輕粉毒者亦如之如禿瘡用推猪水洗淨
臙亦如之如抓傷手足下疳則乾搽之 又方以二
粉末入人乳一小鍾葱白同搗做餅貼臙布扎三日
一換多年者不過四餅

○又方

杭粉四錢輕粉二錢蘇油調碗內艾熏攪黑次加水

片攤紙貼

○又方

杭粉煨黃柏以油調油紙滾水蘸過瘡用苦茶洗淨

油紙包七日其瘡自落

○又方

輕粉用新瓦焙錫色用初生男之乳調濕搽上又團魚甲

燒過先以猪肉貼去火毒再以末上結蓋為妙

○又方

黃栢

去皮

雄猪胆

一個炙栢以胆盪為度

細末搽之如乾加麻

油七日愈

○又方

先用茄子切作兩半個去穰合出黃水七日後用細藥收功 又臙不合用葱汁溫洗拭乾以葱汁調輕粉敷 又生芝蔴杵膏一貼長肉又口嚼敷裙邊瘡妙 又久臙用雄黃 三錢 陳皮 五錢 青布捲作大撚燒烟熏之輒出黃水數次愈

○又方

黑大棗

一枚
去核

砂仁

一粒

同搗作夾紙膏其瘡先用甘

草湯洗其紙亦用甘草湯洗煮過二面刺孔貼上用

布扎定過七日方開若愈則用甘草湯洗如未愈再

貼一膏七日方開無不愈者 又半蹄甲燒反搽

○又方

新打油反攤在油紙上貼患處先以槐條煎湯洗淨

○又方

松香麪濃槐汁調作餅貼換 又黃栢末柿餅和打

爛貼之立效

○內外臙瘡方

先以漿水溫洗拭乾再上藥
羌活 獨活 枯礬

各等分 為細末上之

○足臙爛瘡方

韭田蚯蚓泥乾研入輕粉清油調敷

○臙瘡不收口方

烏梅燒過存性研末敷之

○爛腿臙瘡寒濕方

金僧

煨紅好醋
內淬七次

蓋地上出火毒為末生桐油調搽一

次即愈

○血風瘡方

白酒糟

桃葉

共搗敷之乾潤酒漿不用換六七

日愈

○又方

新鎔銀入成塊銅青煨成白灰放青石上去火毒入
冰片少許搽三四次即愈

○又方

血風瘡已愈未愈之時癢入骨者糯稻草燒烟熏之

○又方

韭田蚯蚓屎 一兩 潮腦 一錢 松香 三錢 火石灰 二錢

水化 猪油 搗加桐油 敷上紙 裹扎七日後開洗如神

○血風裙邊風腫瘡方

晒乾蚯蚓屎油調如麵糊樣搽在瘡上如癢用扁栢枝燒烟熏患處三五次效

○脚上惡瘡方

無名子 研末 生桐油調勻做夾紙膏貼之最妙

○煉抗粉法

每觔插碎盛於金膏紙內先一日用乾淨地一塊掘一小塘以碗按下務令泥填塞空隙處多以水洒搥結實取去碗以稀泥泥光候乾燒紅炭置於其中用扇搨紅其地以金膏紙所盛抗粉烙在其中仍以黃泥做一土碗放火內燒紅蓋於其上煉九回其粉如金色用之愈靈藥百倍

○疥瘡方

杏仁去皮尖 輕粉一錢五分 生乳香一錢五分 同杏搗千杵其油

自出成丸搽如乾加麻油

○又方

川椒 三錢 蛇床子 五錢 大楓肉 五錢 水銀 一錢 章腦 一錢
五分錢共研極細以蓋盛熏之不必搽

○又方

水銀 一錢 用好茶葉嚼碎 同水銀共研不見星 加雄黃末 一錢 紅棗 七個
搗作三丸作三次熏每午熏被晚蓋作三晚熏之全
愈若毒盛者內服消風敗毒藥一二劑

○又方

明雄 一兩 松香 五錢一兩作熬 蘇油浸透倒燒滴油任搽

或加花椒末煎治小兒頭面諸瘡

○治膿疥方

川連 三錢 猪板油 一觔 白酒 十觔 煮三香退火氣飲

之 又黃栢 一兩 公猪胰 一個 時酒 二觔 煨服之

○又方

紅土 四兩 硫黃 半觔 礬 二兩 硝 半觔 共化開傾青石

上冷定香油磨搽

○又方

蒼朮

皮六兩炒褐色
皮硝四兩即起

下入猪胆二個以胆皮擦洗妙

○渾身疥癩癢惡瘡方

檳榔

藁本

硫黃

蛇床

枯礬

五倍子

白

膠香若乾香油調頭瘡不用剃三五次平復如故

○暑癩方

鹽梅和瓦松搗爛塗之立愈

又頭癩槿樹皮加醋

搗爛成膏抹上即好

又銅錄

火煨
為末

白燭油調搽

○漆瘡方

白蠶頭煎湯洗

又生蟹黃塗之二三次愈

又川

椒湯洗 又杉木湯洗 又羊乳敷之飲之妙

○鱧瘰頭方

草麻子肉 一錢 松香 二錢 搗膏貼之立效 又桑樹

蛀屑炒焦色先洗淨敷之或桑枯枝燒灰亦妙

○天泡瘡方

木螫子井水磨塗 又陀僧末桐油調搽 又樟冰

一錢 銀硃 一錢 絲瓜葉汁調搽

○舌瘡方

海螵蛸 去皮 一錢 銅青 三錢 研末搽之

○唇上生瘡方

連年不瘥者以八月藍葉汁洗三日愈
如臉上熱瘡涎出以蒲黃末敷之

○面瘡方

艾葉煎醋搽之
又鯽魚頭燒和醬汁塗
又研砂和水洗并敷
又女人面瘡燒艾葉熏定粉搽

○奶癬瘡方

人乳調輕粉搽之

○頭極癢不痛生瘡方

鴿屎炒好醋調膏熬之兩沸每日塗二三次

○發指徹骨疼不可忍方

乳香

少許
研泥

蜂窩

壁間採
研為末

醋調塗乾以醋潤立止

又

手指忽痛腫以烏梅入醋研浸患處立瘥

○蛇纏瘡方

雄黃為末醋調塗仍用酒調服 又香油白礬敷之

又雄黃末釘銹磨醋濃拌勻搽之

○蛇窠瘡方

香附子衆人口嚼敷患處一二遍愈

○蜘蛛瘡方

蚯蚓糞占米搗井水調敷

○馬蟻瘡方

百草霜 研細 以生桐油調搽數次愈

○老鼠瘡方

芝蔴花揉擦數次即落無痕

○番花瘡方

馬齒莧 一觔 燒灰研細末以猪脂調敷上妙

○蠟瘡方

甘蔗皮

燒反

為末以黑砂糖調刺頭緩搽

又松脂

同黃蠟蔗油石录熬膏貼

又芫花末以香油調搽

○小兒腦疳方

以鯽魚胆滴入小兒鼻中

○陰頭瘡方

頭髮

盪水洗去垢又用米泔洗又用米泔

敷上即結疤

又玉莖

瘡臭爛者以兒茶末搽或五倍子末敷

○陰戶瘡方

桃葉搗爛以綿裹納

又陰戶瘡癢用枯礬

五分杏

仁一錢 蛇床一錢 輕粉三分 麝半分 以棉裹納 又

男陰生濕泡 女子陰瘡 以硫黃細末塗之

○女人足上濕風瘡方

男子頭垢和桐油作隔紙膏貼

○遍身濕瘡方

菖蒲為末 卧之 又下焦濕瘡 黃栢 蒼朮 等分 蜜丸

服 又脚丫濕瘡 蒼朮七錢 硫黃三錢 為末 洒炒 菘

蒼朮 上退火 為末 攪 又蒼朮於罈中燒烟熏 又

脚縫瘡 血出不止 糞桶種燒灰敷

凍瘡方

皮爛痛不可忍川大黃末新水調搨 又茄梗連根
煎水洗 又櫻桃核研末蜜調塗上 又足跟凍瘡
煎熟桐油調陀僧敷 又凍裂用頭髮二兩蛇退二兩
猪板油二觔同煎化無渣入黃蠟四兩攪勻收用以
抵塗入 又脚裂五倍子為末牛骨髓調填縫內
又生麩半夏並塗遠行足趺一夜平 又皸裂以猪
腦塗抹

○妬精瘡方

其於陰頭以爛蜆壳鯽魚胆並塗
又陰頭壞爛木
香同陀僧末塗

○火灸瘡方

以水蚌肉切片貼
又兔皮及毛燒灰塗
又灸瘡
血不止黃芩末二錢酒服即止以青布灰貼
又火
燒不識人發熱以人尿頰服一升
又蚯蚓泥油調
搽蚓泥敷燕窠瘡亦妙

○湯盪火燒方

礦石灰凉水攪入桐油攪勻敷
又陳貫仲切焙為

末井水調敷如破即乾敷 又秋葵花浸油搽 又
狗油搽立效 又冷水塗之止痛 又鼠屎敷紅消
痛止 又葶藶搗爛敷不起泡愈 又鷄蛋黃熬油
先刷上次將猪鷄毛灰篩上 又地榆炒黑色為末
燒酒先洗敷上定痛 又生礬末香油調敷腐爛者
不害即愈 又麩皮炒黑色為末敷上有補性終始
可用 又紫口蛤蚧灰搽 又見血者以寒水石細
末貼之 又轆油湯火瘡疼不可忍石豪搗末細研
粉貼 又石膏末以桐油和膏或加黃丹井水調敷

○麻藥方

大草烏 十個 半夏 三錢 川姜 一錢 孰信 五分 乳香
沒藥 錢各一 雄黃 三分 南星 二錢 右為末 點在肉上 割
不痛

○又方

草烏 三錢 當歸 白芷 各二錢 共末 每服五分 熱酒
調下 麻倒不知痛 然後用手如法 整治 鹽水 解

○又方

川烏 草烏 南星 半夏 川椒 等分 為末 唾調塗之

○諸瘡収口生肌方

汞 一兩 硝 九錢 礬 八錢 蛇會石 八分 滕黃 四分 雄黃 三分 硃砂 三分 入碗內以磁碗蓋棉紙封固將淨沙蓋於碗上平鍋口上紅者是神效下脚可搽疥

○又方

汞 二兩 枯礬 二兩 火硝 二兩 金僧 二兩 共研極細末入汞再研後入鍋內上以粗碗蓋之鹽泥封固用鐵線封縛底三四轉用炭火於鑪中煨之三炷香為度取時若有五色光彩數瘡下痛而愈更速

○又方

燈草灰 一兩 番木螫灰 一兩 冰片 少許 共末完口妙

○又方

乳香 沒藥 各炙 去油 蛇退 炒黃 共為細末搽上收口

○又方

降香節 三錢 硃砂 炒黑 五倍子 炒 鷄肫皮 焙 共末先

將瘡洗淨搽上立效 如瘡口有一點難完者參末

搵之

○瘡爛見骨方

白芨

大黃

黃栢

等分

為末搽在內五七日即好

○去諸瘡爛肉方

地榆皮末搽上死肉即出止痛生肌

又巴豆

炒烟起為

度為極細末敷去舊生新

○去諸瘡努肉方

硫黃塗之即縮 又烏梅燒點甚捷

又諸瘡血不

止棉花子燒存性為末搽即止

○癰毒喉風方

新生鷲蛋壳燒存性醋調敷患處立時自破出血

○金瘡方

血竭敷之止血 又牡丹皮末服立尿出血 又白

芍末塗之止痛止血 又花蓋石童便酒服並搽之

血化為水不作膿 又石灰敷之止血定痛神品或

同韭汁搗收 又廣三七內服外敷 人屎灰敷金

瘡腸出 又楓香敷金瘡腸斷 又地骨皮止血神

品 又燈花止血定痛 又降真香末貼之入水無

斑痕絕妙 金瘡血不止 五倍子生末乾貼 又金
瘡腸出者以桑白皮作線縫之 鵝鷄血塗之立愈 井
花冷水噴面腸自入矣 又凝水石生末少油調若
唇口內有瘡傷粉乾上之痛立止

○金刃箭鏃入骨肉方

半夏白斂末敷 又牡鼠燒研酒服瘡癢即出 又
生地黄丸服百日自出 又酸枣仁燒末水服立出
又巴豆同蟻螂塗之拔出 又鏃在膈及刺不出
蟻螂糞汁滴上三五度自出外 又箭頭入骨蟻螂

搗如泥煎水執洗患處 又乾羊屎以猪油調塗

又箭頭在骨遠年不出者牡丹皮去心白欬各一兩桑

皮二兩霍香葉 丁香 麝香各一分共末每服二錢

溫酒調下日三服淺者十日深者二十日自出 又

白頸蚯蚓十四條納銅罌中次日入鹽一兩於日中晒

並化為水汁塗之須臾癢出 又象牙刮屑和水上

即出 又胡椒研末飯搗爛和一處貼之不過三四

次即出 竹木刺入肉亦妙 又螳螂肚內白漿敷之即出

又箭穿並割耳以執馬屎敷痛處

○烏錠傷方

真蜜半觔煎一滾入頭燒酒一觔燒執服取汗盡量

○錠子入肉方

水銀二錢滴入孔中自出如痛不止以白鷄冠花燒

錢酒下即止又蜜冲好酒飲醉即出或黃蠟冲酒

亦妙

○起砲子法

土狗去頭足將身項入砲眼又用青布撚條入香油

浸燒身尾其子即出點捻之防之勿對

○刀斧傷方
如破血流不止以何首烏研細末搽封

○又方

以獨壳大栗研末敷之如急即嚼敷之亦可立止

○又方

老松香八兩風化石灰十二兩韭汁拌勻晒乾研細入磁罐收貯臨用搽上如神

○針入肉中方

松脂敷裹五日拔出不痛不癢
又蝼蝨腦子同硃

黃研細調敷以紙花貼之覺癢針出

○針入腹方

黃蠟入磁石細末合勻撚如針涼水下裹針從大便
出又蚕豆煮熟同韭菜食之從大便出 又象牙
末炒調滾水服立下針

○針刺竹木入肉方

鼠腦搗塗即出 又刮人爪末同酸枣仁塗之次日
出 又竹木刺入肉鹿角末水塗久者不過一夕
如木竹刺入深不得出以烏羊糞搗爛和水罨敷患

處厚敷之四更自出

○夾棍傷方

獨子肥皂連子搗爛多子亦可陳酒糟同蒸熟敷骨
折者自接 又豆腐打碎和硫黃敷之

○又方

松香 一觔 用酒脚入砂鍋畧淺二指上用箬隔放豆
腐一塊腐上安蔥一根煮至腐色黑為度扯拔罨貼
三日愈外用棉花纏扎煖護

○拶指傷方

訶子 一枚 將水少許磨汁敷搽處立止痛加銀硃妙

○夾拶等傷方

大肥皂 一觔 生姜 半觔 共搗爛輕者用二錢罨上可

接骨凡遇官司必不免者先一日罨過夜受刑不傷

○夾打重傷方

舊蒲包燒灰砂糖調服 如打死用蚯蚓火煨為末

酒下立活 又鮮南星搗爛同潮腦敷立效

○棒瘡方

松香 蜜 葱 共搗敷少入香油去青腫以火紙

十數層護之帶布扎定即服發汗藥一劑三日即好
不必換藥如瘡中有黑子作痛以針刺去惡血以雄
黃摻之名棒疔凡有腐爛輕粉上之 又高郵監內
紅膏藥油紙二十張蜜一觔煮過一炷香松香一觔
四兩為極細末皮酒童便煮一日銀硃一兩二錢童
腦一两同青銀三分草麻仁一升共為一處鍋內頓
一炷香用

○杖打極重昏悶欲死方

白蠟

一兩
生研

乳香

沒藥

各三錢

金銀箔

各二十張

每二錢溫

酒下或為丸硃砂為衣酒下三錢名護心丹 又芋

蕪燒存性酒下三五錢昏暈者服此散血

○夾棍傷骨方

鷄蛋抱成形不出鷄者三個去壳白內同執占米飯半升

搗如泥執敷

○又方

白酒脚四五滾洗脚如冷再加執者後用大黃五錢

潮腦五錢白酒藥一兩占米半升煮飯合藥搗作餅

四個執敷患處次日即能行走

○寄杖散方

白蠟

一兩
切爛

滾酒淬入碗內服打着不痛

○千杖不痛方

胎狗

四五個

陰陽瓦兩頭用黃泥固將瓦入火燒焙

枯存性研末用酒調之候審四五起之前服如不用
酒茶調徐服之杖打不痛此神方也 又於未打
之先服六安茶木耳等分末三四錢酒下

○英雄丸刑杖不痛方

乳香

沒藥

各去油

木螫子

去油

自然銅

醋煨淬七

次各二錢無

名異

川烏

故紙

各二分
五分

地龍

二條
去泥土

共末

蜜丸

彈子大辰砂金箔為衣好酒下一丸如不刑洗浴可

解 又木耳炒存性黃酒預服三錢夾打血不奔心

○又方

紅花

一兩

白糯米耳

一兩

硃砂

五錢

為末每三錢酒

下 又無名異 末臨時溫酒服三五錢杖不甚痛亦

不甚傷

又人骨

燒反

酒服妙

○鐵布衫方

芝蔴

錢妙三

廣三七

三分

草烏

五分

每服一分於末打

之先空心木香酒下

○刑後一劑回生方

三七 二錢 當歸 二錢 荆芥 一錢 牛膝 杜仲 山查

玄胡 桃仁 丹皮 菖蒲 赤芍 紅花 茜根

厚朴 枳壳 蘇木 烏藥 以上各一錢 冰酒 碗各一 煎服

○杖瘡方

蒜油 四兩 鷄蛋 二個 男子血餘 一錢五分 黃丹 二錢 黃蠟

三錢 冰片 麝香 二分 將油煎滾將蛋去壳入內燒

枯去渣入血餘再熬枯待溫去渣入丹熬至紅色即

入蠟數滾離火冷定入冰麝拘之聽用穿蓋過如堅
實者舊棉花攤貼每日一換六七日愈如破者井花
水少入炒鹽洗之不可揉

○杖瘡未破方

乾黃土末童便入鷄清調塗刷上乾即上隨以熱水
洗之復刷復洗以紫轉紅為度仍刷兩膀防血攻陰

○杖瘡青腫方

濕棉紙鋪上用燒過酒糟厚罨良久如蚊行消

○跌打損傷方

磕破出血不止者米飯嚼爛卷之或麥麩亦可痛血
俱止

○又方

筋骨腰頭手足胸背并出血不止者用鮮蟹

去肉將
壳焙乾

黃色研細
末二錢

執酒冲服醉卧煖蓋放屁即愈若碎蟹壳

懸露一宿如前製焙留用

○又方

草烏頭一兩 桂皮一兩 細末每服一分酒下立效

○又方

皮破骨碎成瘡屢治不效者用牡蠣不拘多為細末

溫茶洗淨香油調搽一日一次神效

○又方

腕折筋損者龜授

三刀

生地

一筋

薑糟

一筋

生姜

四兩

切搗勻炒熟以布裹罨折傷處冷則易之

○跌傷方

童尿酒服不拘有無瘀血推陳致新勝於他藥

○又方

羊角砂糖以水炒焦酒服止痛

又方

雄鷄血和酒執飲至醉痛立止 又麻油入酒服燒
執地卧之痛腫俱消

○跌打方

孔蘇：根搗爛和生酒釀糟敷上縛緊次日愈 又
損傷在胸膈不食者生剝猪肉溫水送下一錢即思
食 又黃明膠同冬瓜皮炒焦酒服取汗亦治多年
損痛 又瘀血攻心面青氣短用鴉左翅七枚燒研
酒服吐惡血愈

○面目打傷方

生地黄

酒浸
乾

搗爛卧時湯內頓執塗上紙護數夜愈

○接指方

真正沉重蘇木為細末敷斷處外以蚕蛋包縛完固
數日如舊 又夾斷指頭以蟾窠纏上煖包

○鐸折骨方

赤銅

火煨
水淬

自落下者以水淘淨以好酒入鍋炒見火

星取研酒服

○續筋方

旋復花根搗絞汁對筋續如故

○接骨方

壁螬 五枚 每一枚黃蠟包丸不可弄死硃砂為衣酒送下一醉自覺骨响之妙神方

○又方

月月紅根 燒 存性焙為末生酒服六分多一分多一骨 又白芨酒服二錢乃散血止痛接骨之要藥

○又方

土螿 炒乾 巴霜 半夏 等分 研細每服一二分如神

○又方

蜘蛛焙乾五分研細酒調服其骨即接

○又方

硼砂一錢五分定粉 當歸各一錢右為末煎蘇木湯調下

二錢服訖時服蘇木湯投之治從高墜下馬踏車碾筋斷骨碎痛不可忍此能接骨續筋止痛活血

一人分為兩形難辨真假名曰離魂症方

硃砂 人參 茯苓等分為末每一錢滾水下三次

愈全

○口内生肉球方

麝香 一錢 水調不時漱口三日愈

○眉動眼不能開方

大蒜 三兩 搗汁以好酒送下即愈

○遍身毛孔出針痛方

外用青皮葱燒灰汁水洗內服豆豉煎湯下 又遍

竅生虱皮肉俱爛以鹽醋湯洗之 又皮肉裡生蟹

有形有聲行走用雄黃雷礬 等分 為末摻之 又腹

中有虫知人言能應聲以大藍散煎服之

○十指發脫方

名曰經解以白茯苓胡黃連煎服

○別離丸方

白朮

一兩

天雄

附子

茵根

各三錢

茵芋葉

桑寄

生

各五錢

細辛

菖蒲

各二錢

有執去附雄加知母

三錢

當歸

地黃

各五錢

為末空心白湯下治相思宜此去

邪不復見故名

○玉莖硬精流不止方

以韭子

三錢

破故紙

三錢

煎湯服

○腹硬方

人間龜病不能言肚腹生來硬似磚自死僵蚕白馬
尿服之時刻軟如綿

○足傷跛不能行方

骨碎補

姜汁炒

虎脰骨

用苡仁

鮮木瓜

牛膝煎

湯磨二藥服之

○破傷入水腫潰方

鉛

黃丹

蛤粉

等分

同炒令變色搽出水愈

○鮮頤脫臼方

南星末姜汁調塗兩頰一夜即上 又草麻子搗塗

顛門即上

○瘰癧方

桂枝濃煎湯塗之并入藥內

○項腫方

以牛膝草搗汁用酒沖服

○脚凹淌黃水方

此病發熱惡寒謂之牛領風用黃牛皮

燒灰

花椒

末

真麻油調搽即愈

○適他方不服水土方

取鞋底泥土以水和服之即安

○露水傷犯瘡口身弓反張方

以鹽豉和麪作盃子於瘡上灸一百壯出惡水數升
乃知痛癢而瘡

○麥穀芒入喉不出方

以鷲口涎灌入即出或以筋頭蘸鹽入喉芒隨涎出

○麥芒入目方

以大麥煮汁洗之即安

○誤吞金銀錢物方

羊脚骨 燒灰 存性為末以米飲調服三錢即下而安

○神鬼箭方

狗骨 燒灰 存性三錢山梔 七個 飛麵 香糟 各一兩 老

酒調敷忌針刺

○抓傷面皮方

鉛粉以香油調搽之一夕即愈 又生姜自然汁調

輕粉末搽之無痕

○羊毛疔方

黑豆 蕎麥 共為粉塗擦毛落而愈

○身冷方

身冷痼疾實難痊生用烏頭細二研好醋拌調攤絹上貼於冷處溫如綿

○流火方

槐花 苡仁 等分 為末空心酒下三錢胡桃過口

又陳醬茄油搽之 又陳醬茄瓦上焙乾為末醋調敷 又煤為細末醋和搽乾潤以蜜

○轉筋方

男左腿轉則以手扯陽物向右及囊女人扯乳此千

金秘訣

○甌氣撲面浮腫方

用僧寺炊布要久用者燒灰敷之

○飲食不住口仍饑方

菽豆

黃麥

占米

各一升
炒作粉

每服一鍾滾湯調服三

五日效