

# Synopsis

## der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera

von **Gustav Zehe**,

Oberförster in Volpersdorf (Grafsch. Glatz.)

(Fortsetzung.)

### **Ptinoidae.**

- Hedobia pubescens* F. Oestr.  
 „ *imperialis* L. Gl. n. s. 4. 5. Deutschl.  
 „ *regalis* Dfts. Oestr. Rgsbg.
- Ptinus variegatus* Rossi. Gl. aus Taubenmist s. ausgesiebt. 9.  
 Oestr.  
 „ *6-punctatus* Pnz. Gl. unter Ahorn-Rinde, auch in Kellern  
 n. s. 3—10. Erl. Kl. Rhn. Mch. Hbg. Oestr. Rgsbg.  
 Frbg.  
 „ *fur* L. Deutschl.  
 „ *pallipes* Dfts. Mhr. Han. Rhn. Mch. Tyr. Hbg. Thrg.  
 Oestr. Rgsbg.  
 „ *raptor* St. Oberschles. Han. Rhn. Mch. *Thrg.*  
 „ *rufipes* Oliv. Gl. s. 4—9. Erl. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch.  
 Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.  
 „ *pusillus* St. Rhn.  
 „ *latro* F. Mhr. Erl. Han. Rhn. Mch. Tyr. Thrg. Oestr.  
 „ *nitidus* Dfts. Han. Rhn.  
 „ *dubius* St. Han.  
 „ *crenatus* F. Gl. in Kellern gem. Erl. Han. Kl. Rhn. Pr.  
 Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.  
 „ *minutus* Dfts. Mch. Hbg. Oestr.
- Gibbium scotias* F. Erl. Pr. Mch. Tyr. Thrg. Oestr. Sachsen.  
 Rgsbg.
- Mastigus palpalis* Hfng. Baiern.
- Anobium tessellatum* F. Deutschl.  
 „ *pertinax* L. Deutschl.  
 „ *denticolle* Crtz. Oberschl. an schadhafte Weissbuchen  
 s. Han. Rhn. Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Frbg. Rgsbg.  
 „ *serricorne* Dfts, Hbg. Oestr.  
 „ *brevicorne* Rtzb.  
 „ *rufipes* F. Deutschl.  
 „ *nitidum* F. Gl. an Fichten s. 6—8. Deutschl.  
 „ *striatum* Oliv. Deutschl.  
 „ *fulvicorne* Dhl. Han. Kl. Rhn. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr.  
 „ *cinnamomeum* St. Tyr.  
 „ *brunneum* Oliv. Han. Rhn. Hbg. Oestr. Mark.

- Anobium emarginatum* Mgl. Gl. z. s. 4--10. Han. Rhn. Tyr.  
Thrg. Oestr.
- „ *pini* Er. Rhn. Oberschl.
- „ *abietinum* Gyll. Han. Tyr. Thrg. Pr. Oberschl. Rgsbg.
- „ *longicorne* Kn. Thrg.
- „ *angusticolle* Rtz. Gl. einige Mal auf freien Grasplätzen gekötschert. 6—8. Rhn. Thrg. Hz.
- „ *nigrinum* Er. Gl. mit *Tortrix Resinana* zusammen erzogen. Pr. Thrg. Oestr. Rgsbg.
- „ *molle* L. Gl. s. Deutschl.
- „ *abietis* F. Gl. in Fichtenzapfen gem. Erl. Rhn. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.
- „ *gentile* Rosenhr. Tyr.
- „ *paniceum* L. Deutschl.
- „ *plumbeum* Ill. Deutschl.
- „ *minutum* F. Erl. Han. Kl. Rhn. Mch.
- „ *castaneum* Kug. Han. Rhn. Pr. Mch.
- „ *immarginatum* Millr. Hz. Oestr.
- Dryophilus pusillus* Gyll. Gl. auf Holzschlägen n. s. 5—9. Han. Mch. Tyr. Thrg. Pr. Oestr. Rgsbg. Frbg.
- Ochina sanguinicollis* Dfts. Oestr. Rgsbg.
- „ *hederæ* Müll. Han. Kl. Rhn. Mch. Tyr. Hbg. Oestr.

### Cioidae.

- Hendecatomois reticulatus* Mell. Mhr. Mch. Tyr. Thrg. Oestr.
- Cis boleti* Scop. Deutschl.
- „ *micans* F. Deutschl.
- „ *hispidus* Pk. Deutschl.
- „ *festivus* Pnz. Gl. s. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Thrg. Oestr.
- „ *laricinus* Rehn. Oestr.
- „ *2-dentatus* Gyll. Gl. an birkenen Schwämmen s. 9. Han. Kl. Rhn. Pr. Hbg. Thrg.
- „ *perforatus* Gyll. Deutschl. (gen. *Rhopalodontus* Mellié.)
- „ *alni* Gyll. Han. Kl. Tyr. Oestr.
- „ *glabriculus* Gyll. Pr. Erl. Han. Kl. Rhn. Mch. Tyr. Thrg.
- „ *cornutus* Gyll. Han. Kl. Rhn. Pr. Oestr. (Ennearthron.)
- „ *laminatus* Er. Brl. Erl. Han. Kl. Mch.
- „ *punctulatus* Gyll. Han. Kl.
- „ *2-dentulus* Rosenhr. Tyr.
- „ *affinis* Gyll. Gl. in Fichtenschwämmen h. Han. Kl. Rhn. Pr. Hbg. Thrg. (Ennearthron.)
- „ *elongatulus* Gyll. Han. Kl.
- Entypus fronticornis* Pnz. Brl. Han. Kl. Rhn. Pr. Tyr. Hbg. Oestr. Erl. Mch. (gen. *Ennearthron* Mell.)
- Oróphius mandibularis* Gyll. Erl. Han. Mch. Tyr. Oestr.
- „ *nitidus* F. Gl. s. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Thrg. Oestr.

- Dorcatoma dresdensis* Hbst. Gl. aus Erlen-Schwämmen h. erzogen. Deutschl.
- „ *chrysomelina* Mgl. Erl. Han. Mch. Tyr. Oestr.
- „ *flavicornis* F. Gl. s. s. Rhn. Thr. Oestr.
- „ *bovistae* Koch. Gl. s. 5. Deutschl.
- „ *affinis* St. Han. Mch. Oestr.
- „ *rubens* Koch. Han. Kl. Thrg. Oestr.
- Xyletinus pectinatus* F. Deutschl.
- „ *ater* Pnz. Erl. Mch. Pr. Rgsbg.
- „ *laticollis* Dfts. Kl. Pr. Oestr.
- „ *testaceus* Crtz. Rhn. Mch. Hbg. Oestr. Rgsbg.
- „ *niger* Mllr. Mch. Oestr.
- Ptilinus pectinicornis* L. Gl. aus anbrüchigen Buchen n. s. erzogen. Deutschl.
- „ *costatus* Gyll. Gl. Mhr. in Weiden s. 4—10. Deutschl.
- Apate capucina* L. Oberschl. Mhr. in Eichen. Erl. Han. Rhn. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Oestr. Frbg.
- „ *Dufouri* Latr. Han. Hbg. Oestr. Darmstadt.
- „ *substriata* Pk. Oestr.
- „ *elongata* Pk. Oestr.
- „ *muricata* L. Tyr. in Weinreben. Oestr.
- „ *sinuata* F. Erl. Kl. Mark.
- „ *humeralis* Luc. Tyr.
- Psoa Viennensis* Hbst. Oestr.

### Lymexylones.

- Hylecoetus dermestoides* F. Gl. in Buchen- und Nadelholz-Stöcken h: 5. Deutschl.
- Lymexylon navale* L. Deutschl.
- „ *flabelllicorne* Shlb. Pr.

### Tenebrionina.

- Asida fascicularis* Grm. Tyr.
- *Blaps mortisaga* L. Deutschl.
- „ *fatidica* St. Deutschl.
- „ *obtusa* St. Deutschl.
- Platyscelis melas* Fisch. Oestr.
- *Pedinus femoralis* L. Mhr. auf Sandboden s. 4. 5. Pr. Tyr. Oestr. Rgsbg.
- Heliopates gibbus* F. Pr. Oestr. In den Dünen an der Ostsee h.
- Pandarus emarginatus* F. Tyr.
- *Opatrum sabulosum* L. Deutschl.
- „ *Viennense* Dfts. Oestr.
- „ *pedestre* Rosenhr. Tyr.
- „ *pusillum* F. Oestr. Rgsbg.

- Microzoum tibiale* F. Mhr. in Gemülle s. 4. Erl. Han. Rhn. Pr.  
 Mch. Hbg. Thrg. Oestr. bei Stettin gem.
- *Crypticus quisquilius* L. Auf Sandboden. Deutschl.
- Lithophilus connatus* F. Oestr.
- Eledona crenata* F. Gl. in faulen Buchen und deren Schwämmen  
 s. 4—9. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Frbg.
- „ *interrupta* Ill. Oestr.
- „ *armata* F. Rhn. Mch. Hbg. Oestr. Frbg.
- „ *agaricola* Latr. Gl. aus Birnbaum-Schwämmen h. er-  
 zogen. Deutschl.
- Pentaphyllus testaceus* F. Han. Kl. Rhn. Pr. Hbg. Thrg. Oestr.
- Alphitophagus 4-pustulatus* Steph. Kl. Oestr.
- Phyletus populi* Meg.
- Scaphidema bicolor* F. Gl., Brl. Erl. Rgsbg. Han. Kl. Rhn. Pr.  
 Mch. Tyr. Thrg. Oestr.
- Platydema violacea* F. Han. Kl. Rhn. Pr. Hbg. Oestr. Rgsbg.  
 Stettin.
- „ *Dejeanii* Lap. Rhn. Oestr.
- Hoplocephala haemorrhoidalis* F. Pr. Oestr.
- Diaperis boleti* L. Gl. in Buchen-Schwämmen gem. 5—9. Erl.  
 Han. Kl. Pr. Mch. Tyr.
- Heterophaga diaperina* Kug. Pr. Mch. Oestr.
- „ *fagi* Pnz. Oestr.
- „ *mauritanica* F.
- „ *chrysomelina* Rossi. Oestr.
- Uloma culinaris* F. Deutschl.
- Tribolium castaneum* M. L. Rhn. Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Pr.
- „ *2-foveolatum* Dfts. Rhn,
- „ *madens* Charp. Pr. Oestr.
- Cerandria cornuta* F. Brl.
- Hypophloeus castaneus* F. Deutschl.
- „ *pini* Pnz. Mch. Hbg. Oestr. Rgsbg. Steyermark.
- „ *fraxini* Kug. Mch. Hbg. Oestr. Obschl.
- „ *linearis* Gyll. Han. Rhn. Pr. Oestr.
- „ *bicolor* F. Han. Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Pr.  
 Rgsbg. Oberschl.
- „ *fasciatus* F. Han. Kl. Pr. Mch. Hbg. Thrg. Oestr.  
 Berl.
- „ *depressus* F. Erl. Han. Kl. Pr. Mch. Tyr. Hbg.  
 Thrg. Oestr. Brl.
- „ *piceae* Rtz. Gl. Erl. Oberschl.
- „ *fagi* Rtz. Mark. Han. Münden.
- „ *rufulus* Rosenhr. Brl. Windsheim.
- Eustrophus dermestoides* F. Deutschl.
- *Orchesia micans* Ill. Deutschl.
- „ *fasciata* Pk. Rhn. Pr. Oestr.

- Orchesia* (flaticollis Redtb. Oestr. Tyr.  
 (puncticollis Rosenhr.  
 „ (sepicola Rosenhr. Tyr.  
*Hallomenus humeralis* F. Gl. auf Blumen s. 7. Erl. Rhn. Pr.  
 Mch. Tyr. Thrg. Oestr.  
 „ fuscus Gyll. Gl. unter Rinde fichtner Störcke s. Mch.  
 Oestr. Pr.  
 „ affinis Pk. Gl. mit dem vorigen. Rhn. Mch. Tyr.  
 Hbg. Pr. Oestr.  
 „ flexuosus Pk. Gl. aus Erlen-Schwämmen h. erzogen.  
 Erl. Han. Rhn. Mch. Hbg. Thrg. Pr. Oestr.  
*Dircaea discolor* F. Gl. Kl. Rhn. Pr. Mch. Tyr. Oestr. Rgsbg.  
 „ tenuis Rosenhr. Erl. Tyr.  
 „ 4-guttata Pk. Pr. Oestr.  
 „ 3-guttata Gyll. Pr. Stettin s. selten.  
*Xylita ferruginea* Pk. Han.  
*Osphyia praeusta* Oliv. Rhn. Thrg. Oestr. Hrz.  
*Hypulus 2-fasciatus* F. Pr. Brl. Mch. Oestr.  
 „ quercinus Pk. Rhn. Pr. Thrg. Oestr. Brl. Oberschl.  
*Serropalpus barbatus* Schall. Pr. Mch. Hbg. Oestr. Frbg. Ober-  
 schlesien.  
 „ Vaudouerii Latr. Darmstadt.  
*Conopalpus flavicollis* Gyll. Oestr.  
*Melandrya caraboides* L. Deutschl.  
 „ canaliculata F. Pr. Mch. Tyr. Thrg. Oestr.  
 „ flavicornis Dfts. Kl. Pr. Oestr.  
*Phryganophilus ruficollis* F. Oestr.  
 „ nigriventris Hampe. Oestr.  
*Pytho depressus* L. Gl. in alten Stöcken s. s. Pr. Mch. Oestr.  
*Tenebrio obscurus* F. Deutschl.  
 „ molitor L. Deutschl.  
 „ curvipes F. Han. Pr. Hbg. Oestr. Frbg.  
 „ loripes Ill. Pr. Oestr.  
*Boros corticalis* Pk. Oestr. Erl. Han.  
*Helops coeruleus* F. Tyr. Dalmatien.  
 „ lanipes F. Deutschl.  
 „ badius Redtb. Oestr.  
 „ caraboides Pnz. Deutschl.  
 „ dermestoides Ill. Tyr. Oestr.  
 „ quisquilius F. Hbg. Oestr.  
*Laena viennensis* St. Oestr.  
*Allecula morio* F. Deutschl.  
*Prionychus ater* F. Deutschl.  
 „ fuscus Pnz. Kl. Rgsbg. Frbg.

- Mycetochares flavipes* F. Gl. aus faulem Holze von Jugl. regia  
erzogen. Erl. Han. Kl. Rhn. Mch. Tyr. Hbg.  
Thrg. Oestr.
- „ *2-pustulatus* Ill. Erl. Kl. Pr. Mch. Tyr. Hbrg.  
Oestr. Rgsbg.
- „ *morio* Redtb. Mch. Tyr. Oestr.
- „ *barbata* Latr. Erl. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Tyr.  
Hbg. Oestr. Rgsbg.
- „ *brevis* Pnz. Mch. Kl. Oestr. Brl.
- „ *scapularis* Pnz. Kl. Mch. Oestr.
- „ *axillaris* Pk. Kl. Pr. Hbg. Rgsbg.
- „ *humeralis* F. Rhn. Pr. Tyr. Hbg. Frbg.

### Cistelina.

- Omophlus lepturoides* F. Mhr. auf Holzplätzen, auch an Getreide  
h. 5. Han. Pr. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Frbg.
- „ *pinicola* Redtb. Oberschl. Oestr.
- „ *picipes* F. Mhr. auf trocknen Grasplätzen gem. 5.  
Han. Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Oberschl.
- *Cistela ceramboides* L. Erl. Han. Rhn. Pr. Mch. Thrg. Oestr.  
Hbg. Tyr. Rgsbg. Frbg. Schles.
- „ *varians* F. Erl. Oestr.
- „ *rufipes* F. Gl. Erl. Han. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg.  
Oestr. Rgsbg.
- „ *fulvipes* F. Mhr. auf Blüten s. 5. Han. Rhn. Pr. Mch.  
Tyr. Hbg. Oestr. Hrz. Thrg. Rgsbg. Frbg.
- „ *nigrita* F. Tyr. Oestr.
- „ *sulphurea* L. Deutschl.
- „ *2-color* F. Erl. Pr. Oestr.
- „ *sulphuripes* Grm. Mhr. auf Blumen s. s. 5. Oestr.
- „ *murina* L. Deutschl.

### Lagrioidae.

- *Lagria pubescens* L. Deutschl.

### Pyrochroidae.

- *Pyrochroa coccinea* L. Gl. die Larve in Laub und Nadelholz-  
stöcken h. Deutschl.
- „ *rubens* F. Mhr. unter Eichenrinde n. s. 5. Deutschl.
- „ *pectinicornis* F. Gl. die Larven unter Buchen-Rinde  
lebend. Deutschl.

### Anthicoidae.

- Agnathus decoratus* Grm. Oestr.
- *Notoxus monoceros* L. Deutschl.
- „ *major* L. Rhn. Tyr. Oestr. Rgsbg.

- Notoxus cornutus* F. Rhn. Meh. Tyr. Oestr. Gl. in Gemülle  
s. s. 6.
- „ *3-fasciatus* Rossi. Oestr.
- „ *armatus* Schmidt. Tyr.
- „ *rhinoceros* F. Meh. Thrg. Oestr. Magdeburg.
- Anthicus sellatus* Pnz. Mhr. au. Sandbänken der March s. 5.  
Rhn. Oestr. Magdeb. Erl. Frankfurt.
- „ *2-maculatus* Ill. Rhn. Pr. Hbg. Frankf. a. O. Swinem.  
Seestrand h.
- „ *nectarinus* Pnz. Magdeb. Hbg. Mannh. Kiel.
- „ *antherinus* L. Deutschl.
- „ *longicollis* Schm. Tyr.
- „ *floralis* F. Deutschl.
- „ *hispidus* Rossi. Mhr. in Gemülle s. 5. Pr. Tyr. Oestr.  
Sachsen.
- „ *4 guttatus* Rossi. Hbg. Oestr. Frbg.
- „ *2-fasciatus* Rossi. Han. Oestr.
- „ *1-fasciatus* Schm. Tyr.
- „ *ater* Pnz. Pr. Oestr. Kiel. Braunschw.
- „ *unicolor* Schm. Oestr.
- „ *flavipes* Pnz. Mhr. in Gemülle s. 5. Han. Rhn. Pr. Tyr.  
Hbg. Thrg. Oestr.
- „ *gracilis* Pnz. Han. Pr. Oestr. Brl. Erl. Swinemünder  
Seestrand s.
- „ *axillaris* Schm. Tyr.
- „ *luteicornis* Schm. Oestr. Baiern.
- „ *humilis* Grm. Han. Meh. Tyr. Thrg. Oestr. Mag-  
deburg.
- „ *pedestris* Rossi. Mhr. um Bäume n. s. 5. Rhn. Tyr.  
Oestr.
- „ *gsnistae* Rosenhr. Tyr.
- „ *Schmidtii* Rosenhr. Tyr.
- Ochthenomus tenuicollis* Schm. Brl. Oestr. Tyr.
- Xylophilus oculatus* Pk. Hbg. Oestr.
- „ *populneus* F. Erl. Han. Kl. Meh. Tyr. Hbg. Thrg.  
Oestr. Pr. Rgshg.
- „ *pygmaeus* Gyll. Tyr.
- „ *nigrinus* Grm. Gl. auf Waldplätzen s. 8. Han. Pr.  
Hbg. Thrg. Brl.
- Scraptia fusca* Ltr. Han. Kl. Tyr. Oestr.
- „ *fuscula* Mllr. Kl. Pr. Oestr.

### **Rhipiphorides.**

- Pelecotoma fennica* Pk. Pr. Birstein am Donnersberg. Erfurt.
- Metoecus paradoxus* F. In Wespennestern. Pr. Erl. Meh. Rgsh. Oestr.
- Rhipidius blattarum* Sundev. Oestr.

**Mordellina.**

- Mordella 12-punctata Rossi. Mch. Tyr. Oestr.  
 „ guttata Pk. Gl. auf Blumen s. 7. Erl. Pr. Tyr. Thrg.  
 Oestr.  
 „ 2-signata Redtb. Mch. Oestr.  
 „ fasciata F. Deutschl.  
 „ aculeata L. Deutschl.  
 „ villosa Schek. Oestr. Thrg.  
 „ grisea Frhl. Gl. s. s. Hbg.  
 „ parvula Gyll. Han.  
 „ pumila Gyll. Gl. Mhu. s. 5—7. Erl. Kl. Rhn. Pr.  
 Mch. Hbg. Frbg. Thrg. Oestr.  
 „ pusilla Redtb. Pr. Mch. Thrg. Oestr. Schles.  
 „ abdominalis F. Deutschl.  
 „ ventralis F. Gl. Rhn. Mch. Thrg. Pr.  
 „ humeralis L. Gl. auf Waldwiesen s. 7. Han. Rhn.  
 Mch. Tyr. Thrg. Oestr. Pr. Brl.  
 „ axillaris Gyll. Rhn. Mch. Hbg. Oestr. Erl.  
 „ variegata F. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Hbg. Thrg.  
 Oestr. Rgsbg.  
 „ testacea F. Thrg. Rgsbg. Frbg.  
 „ brunnea F. Obschl. Rhn. Mch. Thrg. Oestr. Rgsbg.  
 „ flavescens Mrsh. Rhn.  
 — Anaspis frontalis L. Deutschl.  
 „ clypeata Er. Rhn. Thr. Ems.  
 „ rufilabris St. Deutschl.  
 „ lateralis F. Han. Rhn. Pr. Mch. Thrg. Oestr. Ems.  
 Frbg. Schles.  
 „ humeralis F. Erl. Rhn. Oestr. Rgsbg. Frbg.  
 „ ruficollis F. Gl. s. s. 6. Rhn. Thrg. Oestr. Ems. Rgsbg.  
 Frbg.  
 „ Geoffroyi Mllr. Shn. Oestr.  
 „ phalerata Grm. Oestr.  
 „ 4-pustulata Mllr. Han. Rhn. Ems.  
 „ maculata Geoffr. Rhn.  
 „ aretica Schh. Rhn. Thrg.  
 „ flava L. Mhr. Erl. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Hbg. Thrg.  
 Oestr. Frbg. Rgsbg.  
 „ thoracica L. Deutschl.  
 „ atra F. Gl. 5—8. Han. Kl. Rhn. Ems.  
 „ nigra Megl. Erl. Kl. Rgsbg.

(Fortsetzung folgt.)