国立公文書館
National Archives of Japan





国立公文書館
National Archives of Japan

走痃痛

大夫婦人體虛受風邪之氣隨血而行或淫易皮膚卒然掣痛遊走無有常處故名爲走痃也加減小續命湯主之薛東垣云若人身體沉重走痃疼痛此濕熱相搏或風熱鬱而不得伸附著於有形也是證多因飲食起居失節七情勞役失宜脾胃虧損腠理不密外邪所侵以致內熱脯熱自汗盜汗或經候不調飲食不甘治法濕熱腫痛者清燥湯雜病傷暑兼痰佐以二陳湯雜病痰飲肝火作痛者加味逍遙散脾鬱作痛者加味歸脾湯血虛作痛者四物湯氣虛作痛

者四君子湯氣血俱虛者八珍湯俱加羌活川芎月經先期而痛者加味逍遙散頭眩倦怠而痛者補中益氣湯大抵按之痛甚者病氣實按之痛緩者元氣虛勞役而痛者亦元氣虛也飲食失宜而痛者脾氣虛也惱怒而痛者肝火盛也若晝輕而夜重者血分病也一婦人歷節發熱作渴飲食少思月經過期其脉舉之洪大按之微細用附子八物湯四劑而痛止用加味逍遙而元氣復用六味丸而月經調一婦人體肥胖素有熱月經先期患痛風下體微腫痛甚則小便頻數身重脉緩此風濕血虛有熱用羌活勝濕湯二劑腫痛漸愈用清燥湯數劑小便漸清用加味逍遙散內熱漸愈又為飲食停滯發熱仍痛面目浮腫用六君加柴胡升麻而愈又因怒氣小腹痞悶寒熱嘔吐用前藥加山梔木香而安惟小腹下墜似欲去後此脾氣下陷用補中益氣而愈後因勞役怒氣作嘔吐痰遍身腫痛經行寒熱此肝木侮脾土用六君加柴胡山梔腫痛嘔吐悉退後用補中益氣而安一婦人飲食少思畏風寒患痛風嘔吐寒熱脉弦緊用附子八物湯而四肢痛愈用獨活寄生湯而腰痛漸痊惟兩膝腫痛用大防風湯而痛漸愈用

歸脾逍遙而元氣復
沒藥散 治婦人血風走痒肢節疼痛發時來往不
定
沒藥 另研 乳香 另研 芎藭
當歸 炒去蘆 桂心 漏蘆 去蘆
木香 各半兩 白芷 琥珀 另研
地龍 去土微炒各半錢 麝香 另細研各貳錢半
爲細末入研藥拌勻每服壹錢温酒調下不拘時
琥珀散 治婦人血風走痒疼痛來往疼痛
琥珀 另研 當歸 去蘆 牛膝 酒浸

羌活 去蘆 川大黃 剉微炒各半錢
桂心 壹兩 沒藥 另研
乾漆 炒烟盡 血竭 另研
羚羊角屑 各半兩 玄胡索 防風 去蘆
右爲細末每服貳錢温酒調下不拘時日進貳服
虎骨散 治婦人血風走痒疼痛不可忍
虎脛骨 貳兩酥炙 乾蝎 炒 琥珀 另研各半兩
當歸 炒 牛膝 酒浸
威靈仙 各壹兩 漏蘆 去蘆
桂心
沒藥 另研各半錢
芎藭

右為細末每服貳錢温酒調下不拘時候日進貳服

雄黄散 治婦人血風走疰疼痛

雄黄 研水飛 血竭 另研 赤箭

側子 炮去皮臍 桂心 沒藥 另研

白芥子 地龍 炒去土 蝎 各半兩 生用

麝香 貳錢半 另研 烏蛇 貳兩酒浸去皮骨炒微黄

木香

右為細末入研藥更研令勻每服貳錢熱酒調下不拘時候日進貳服

漏蘆散 治婦人血風走疰疼痛無有常處

漏蘆

桂心

羌活

甜瓜子 各半兩

右為細末每服貳錢熱酒調下無時

麝香丸 治白虎歷節諸風疼痛遊走不定狀如蟲齧晝靜夜劇及一切手足不測疼痛

大八角川烏頭 參枚去皮臍 生用

生黑豆 貳拾粒

當歸 牛膝 各參分

地龍 去土 防風

白芷 沒藥 研

虎脛骨 酥炙 敗龜板 醋炙 各壹兩

四生丸 見前

爲細末入麝香壹字同研停糯米糊爲丸如菉豆大每服七丸甚者拾丸夜卧令高空温酒吞下微出冷汗一身便瘥許學士云予得此方凡是歷節及不測疼痛一二服便瘥在歙州日有一貴家婦人遍身走注疼痛至夜則發如蟲齧其肌多作鬼邪治予曰此正歷節病也三服效

芍藥知母湯 三因 治諸肢節疼痛身體魁瘣脚腫如脫頭眩短氣温温欲吐

桂心　防風　各肆兩
芍藥　知母　麻黄去根節　甘艸炙各參兩

附子貳兩炮

右㕮咀每服四錢水壹盞半生薑五片煎七分去滓空心服一方有白朮川芎杏仁半夏

附子八物湯 治風歷節疼痛四肢如鍼鍛不可忍

附子　乾薑　茯苓　芍藥
桂心　各參兩　人參　甘艸
白朮　肆兩

右㕮咀每服四大錢水貳盞煎七分去滓食前服

一方去桂用乾地黄貳兩

獨活寄生湯 方見雜病腰痛

小續命湯 治白虎歷節痛不可忍方見雜病中風

陳一婦人先自兩足踝骨痛不可忍次日流於膝三日流於髀骨甚疼至於肩肩流於肘肘流於後溪或如鎚鍛或如虫嚙痛不可忍晝靜夜劇服諸藥無効召僕診之六脉緊云曰此真歷節證也非解散之藥不能愈但用小續命湯一劑而痊又鄧安人夏月亦病歷節痛不可忍諸藥無効名僕診之人迎與心脉虚此因中暑而得合先服酒蒸黄連丸泉醫莫不笑用此藥服一貼即愈自後與人良驗

治婦人血風走痃腰膝骨節疼痛不可忍

薰陸香　杏仁研
附子生　當歸
桂心　芸薹子
芫花

右為細末鎔黄蠟五兩攪和諸藥揑作片子包裹痛處立効

又方

芫花　桂心各壹兩
桑根白皮參兩　漢椒貳兩
芸薹子　柳蚡屑各伍兩
右為細末用醋一升拌和蒸令熟用青布裹熨痛

處冷即更入醋蒸用之
治婦人血風走痒腰胯脚膝疼痛
天仙子　川烏頭生　附子生各壹兩
右為細末以酒煎成膏攤於帛上敷貼痛處多生
者不過三十上効

頭目眩暈

大婦人頭眩由氣虛風入於腦循脉引於目系目系
急而然也邪甚則必癲素問云頭痛癲疾下虛上實
過在足少陰巨陽甚則入腎狗蚤招搖目瞑耳聾下
實上虛過在足少陽厥陰甚則在肝下虛者腎虛也
故腎厥則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則暈狗蚤者
如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暈之狀故肝
厥頭痛不同也醉丹溪先生云眩者言其黑運旋
轉其狀目閉眼暗身轉耳聾如立舟船之上起則欲
倒蓋虛極乘寒得之亦不可一途而取軌也若風則

有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛而眩暈也若欝結生痰而眩暈者此七情虛火上逆也若淫慾過度而眩暈者此腎虛氣不歸源也若吐衄漏崩而眩暈者此肝虛不能攝血也有早起眩暈須臾自定者元氣虛也正元飲（雜病下黑錫丹（雜病頭痛）傷濕頭暈用腎着湯（雜病傷濕）加川芎有痰用青州白丸子（雜病中風）頭風風熱也久則目昏偏頭風相火也久則目緊便溏皆宜出血以開表之竊謂前證肝虛頭暈用釣藤散腎虛頭暈六味丸（雜病虛勞）頭暈吐痰養正丹不應八味丸（雜病虛勞）血虛四物參苓白朮不應當歸補血湯（雜病勞倦）氣虛四君歸芪不應補中益氣湯（雜病勞倦）肝木實瀉青丸（雜病頭痛）虛用地黃丸（雜病虛勞）不應川芎散脾氣虛二陳參朮柴胡升麻不應益氣湯加茯苓半夏脾胃有痰半夏白朮天麻湯風痰上涌四神散發熱惡寒八物湯（雜病虛勞）七情氣逆四七湯傷濕而暈除濕湯（雜病中濕）一婦素頭暈不時而作月經運而少此中氣虛弱不能上升而頭暈不能下化而經少用補中益氣湯而愈後因勞什地月經如涌此勞傷火動用前湯加五味子一劑而愈前證雖云氣無所附實因脾胃虧損耳一婦人內熱口乾勞則頭暈吐痰帶下

詳下嘈雜門

養正丹 治虛風頭眩生涎不已蓋此藥升降陰陽補接眞氣非止頭眩而已

黑鉛　水銀　硫黃 研

朱砂 研 各壹兩

右用建茂壹隻火上鎔銷成汁次下水銀用柳枝子打停取下歇少時入試味打停候冷取下研爲粉以糯米軟飯丸如菜豆大每服叁拾丸棗湯吞下空心食前日貳服

鈎藤散 本事

鈎藤　陳皮 去白　半夏 湯洗柒次切片子

麥門冬 去心　茯苓 去皮　茯神 去木

人參 去蘆　甘草 貳錢半炙

石膏 壹兩　甘菊花　防風 去蘆各半兩

右㕮咀每服四錢水壹盞半生薑七片煎至壹盞去滓熱服日進貳服

獨活散 治婦人風眩頭疼嘔逆身體時痛情思昏悶

獨活 壹兩　白朮 去蘆　防風 去蘆

細辛 去苗　人參 去蘆　芎藭

荊芥各等　半夏湯洗末次　炙甘草
半錢半　切片子
赤芍藥各半　石膏貳兩
兩
右咬咀每服八錢水壹中盞半生薑七片薄荷七
葉煎至壹大盞去滓温服不拘時
川芎　甘菊花野菊不用　山藥　白茯神去木
川芎各半兩　人參去蘆　山茱萸肉壹兩
右為細末每服貳錢温酒調下不拘時候日進參
四神散　治婦人血風眩暈頭痛
服

菊花　當歸去蘆　旋復花
荊芥穗各等分
右為細末每服貳錢水壹盞葱白叁寸茶末壹錢
煎至七分通口服良久去枕仰卧少時
斗門方　治血風頭旋或不知人事用喝起草嫩心
陰乾為末酒服貳錢其功甚効即前蒼耳散
治頭旋如天動地轉名曰心眩膽襟壹兩細研用麪
餅劑壹箇拌勻勒如骰子大五上焙乾每服壹骰
為末燈心竹茹煎湯調下此去痰之法當審而用
之

頭痛

薛東垣云足太陽頭痛脉浮緊惡風寒川芎羌活獨活麻黄爲主手足陽明頭痛身熱目疼鼻乾惡寒發熱脉浮緩而長升麻湯（升麻葛根）或石膏白芷爲主手太陽頭痛有痰體重或腹痛爲痰癖脉沉緩蒼朮半夏南星爲主足少陰經頭痛足寒氣逆爲寒厥脉沉細麻黄附子細辛湯（傷寒太陽）爲主足厥陰頭項痛或吐涎沫厥冷脉浮緩吳茱萸湯（傷寒吐）主之諸血虛頭痛當歸川芎爲主諸氣虛頭痛人參黄芪爲主氣血俱虛頭痛調中

益氣湯 雜病勞倦 少加川芎蔓荊細辛痰厥頭痛半夏白朮天麻湯 雜病眩暈厥逆頭痛羌活附子湯 雜病頭痛 如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治若脉雜亂而病見不一 一婦人因勞耳鳴頭痛體倦用補中益氣加麥門五味而瘥三年後得子因飲食勞倦前證益甚月經不調晡熱內熱自汗盜汗用六味地黃丸補中益氣湯頓愈經云頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也故脾胃一虛耳目九竅皆爲之病 一婦人兩眉稜痛後及太陽面青善怒此肝經風熱之證用選奇湯 雜病頭痛 合逍遙散 調經 加山梔天麻黃芪半夏黃芩而愈此證失治多致傷目或兩耳出膿則危矣

旋覆花湯 許叔微云婦人患頭風者十居其半每發必掉眩如在車船上蓋因血虛肝有風邪襲之爾予嘗處旋覆花湯此方修合服之比他藥甚效

川芎 當歸去蘆 羌活去蘆 防風去蘆 荊芥穗 甘草炙各半兩 旋覆花 細辛去苗 蔓荊子 石膏 藁本去蘆 半夏麴 乾地黃

右㕮咀每服五錢水壹盞半生薑五片煎至七分
去滓溫服日進貳服

七生丸　治男子婦人八般頭風及一切頭痛痰厥
氣厥飲厥傷寒傷風頭痛不可忍者並皆治之

川烏頭　草烏頭　天南星　參味並生去皮
半夏 冷水洗去滑 川芎　白芷
石膏 並生用 各等分

右為細末研韭菜自然汁丸如梧桐子大每服七
丸加至拾丸嚼生葱茶送下食後日進貳服

陳嘗治都安人頭痛如破諸藥無効加北細辛等分全蠍減半為丸服貳拾粒即愈

藥隱老人云若頭痛連齒時發時止連年不已此由風寒中於骨髓留而不去腦為髓海故頭痛齒亦痛謂之厥逆頭痛宜白附子散灸曲鬢穴此穴在耳上將耳掩前正尖上可灸七壯左痛灸左右痛灸右

白附子散

白附子 炮壹兩　烏頭 炮去皮臍　天南星 炮
麻黃 不去根節 各半兩　乾薑 炮　辰砂 研各貳錢半
全蠍 炒伍枚　麝香 另研壹字

右為細末每服壹錢溫酒調下不拘時候

治頭風痛不可忍

硝石　人中白　腦子 各等分
右研令極細每用一字摘入鼻中
川芎茶調散　治諸風上攻頭目昏重偏正頭痛
薄荷 捌兩　川芎　荊芥 各肆兩
羌活　白芷　防風
甘草 炙各貳兩　細辛 壹兩
右為末每服貳錢食後茶清調下
如聖餅子 和劑　治男婦氣厥上盛下虛痰飲風寒伏留
陽經偏正頭疼痛連腦顛吐逆惡心目瞑耳聾常
服清頭目消風化痰暖胃

防風　生半夏　天麻 各半兩　天南星 洗
川烏 去皮尖 乾薑 各壹兩　川芎　甘艸 炙各貳兩
為細末湯浸蒸餅和丸茶實大捻作餅子曰乾每
服伍餅同荊芥穗參伍莖細嚼茶酒湯任下無時
若頭痛筋攣骨重少氣噦腹滿時驚不嗜卧欬嗽
煩寃其脉舉之則弦按之石堅由腎氣不足而內著
其氣逆而上行謂之腎厥頭痛宜玉眞丸與硫黃丸
玉眞丸
硫黃 研 參兩　硝石 貳分 研
石膏 煅研　半夏 湯洗為末 各壹兩
右研令停勻生薑自然汁打糊圓如梧子大生薑

湯下參拾圓　一方無半夏有天南星
硫黄丸　治頭痛不可忍或頭風年深暴患無所不
治服此除根
硝石 壹兩　硫黄貳兩
右研令極細滴水丸如指頭大空心蠟茶清嚼下
壹丸百一方云中暑者以氷水服之下咽即洒然
治傷冷以艾湯下
裕陵傳王荊公偏頭疼方云是禁中祕方用生薑蘸
汁蜆殼仰卧注鼻中左痛注左右痛注右或兩鼻皆
注亦可數十年患皆一注而愈

大夫婦人血氣心痛者由臟腑虛血氣不調風冷邪
氣乘於心也其痛發有死者有不死者成證者心為
諸臟之主而主於神其正經不可傷傷之而痛者名
為真心痛朝發夕死夕發旦死心之支別絡為風冷
所乘而痛者故痛發乍輕乍甚而成證者也　薛前
證若寒邪所傷温散之飲食停滯消導之肝火妄動
辛平之脾氣鬱結和解之仍與後六證方藥同用
一婦人久患心痛飲食少思諸藥到口即吐予以為
脾土虛弱用白朮一味同黄土炒去生每服壹兩以

時卽服此等藥瘧亦不作矣

[大]烏藥散 治婦人血氣攻心痛發歇不定

烏藥 莪茂 桂心

當歸 炒 青皮

木香 各等分 桃仁

爲末每服貳錢熱酒調下

阿魏丸 治婦人血氣攻心疼痛及一切積冷氣

當歸 桂心 青皮

附子 炮 阿魏 麪裹煨以麪熟爲度 白朮

川芎 各壹兩 吳茱萸 炮 木香

米泔煎濃徐服少許數日後自能大飲用二斤餘而安 上舍陳履學長子室素怯弱產後患疥瘡年餘不愈因執喪旬月每欲眩仆一日感氣忽患心脾高腫作疼手不可按而嘔吐不止六脉微細或見其形實誤認諸痛不可補氣乃用青皮木香五味吳茱萸等藥而愈繼復患瘡且墮胎又投理氣行血之藥病雖去元氣轉脫再投參芪補劑不應矣六脉如絲欲絶迎予至診之曰形雖實而脉虛極反用理氣之劑損其眞氣故也連投參芪歸朮附子薑桂二劑間用八味丸五日寢食漸甘六脉全復此證若心脾疼痛

乾薑各參分　檳榔　肉豆蔻煨
延胡索　義茂各壹兩　朱砂細研半兩

右為末先以醋壹升煎阿魏成膏和藥末搗參百杵丸如梧桐子大每服貳拾丸食前熱酒下

雞舌香散　治男子婦人九種心痛一切冷氣

良薑剉細麻油炒　桂心　赤芍藥各壹分

右為細末每服貳錢水壹盞入鹽木瓜參片同煎七分溫服鹽湯點亦可血氣亦瘕痛用熟醋湯調下忌生冷

應痛散　治心脾痛不可忍者婦人脾血氣作心脾痛尤効前方同只無桂心用醋煎醋湯點亦可

乙丑年春初次年十五經脉未行初一日心痛如刺吐飲不止脉沉緩弦細以蘇合香丸神保丸沉香丸理中丸訶子散七氣湯皆無効余思之此證非蟲即飲作疾非宿食方九痛丸則不可遂合與服二十一丸即愈矣

陳氏三神丸　治婦人血氣不和作痛不止及下血無時月水不調

真蒲黃炒　蓽撥鹽炒

右等分為細末煉蜜丸如梧子大每服參拾丸空

心温酒下如不能飲米飲吞下兩服即止

陳日華抽刀散　治婦人血風血氣等疾武典戎司機宜侯愷云見一道人用此方療病不一而足遂以爲獻眞是奇妙

五靈脂炒壹兩　蒺藜茂　桂心

芸薹子炒各半兩

右爲末每服貳大錢酒半盞水半盞煎至八分疾作熱服

失笑散見產後　訶子散見霍亂　亦妙

靈苑方　治婦人卒血氣心痛只用生五靈脂爲細末每服壹錢酒壹盞煎沸熱服

局方四七湯加良薑又況香降氣湯分心氣飲皆治

心痛良三方並見雜病諸氣

心腹痛

大婦人血氣心腹痠痛由臟腑虛弱風邪乘於其間與真氣相擊而痛其痛隨氣上下或上衝於心或下攻於腹故云血氣心腹痛也 醒前證若氣滯血瘀用沒藥散（雜病傷勞條）治肝脾鬱結用四七湯（雜病氣）怒動肝火用小柴胡湯（熱入血室）肝脾血虛用四物湯（雜病虛勞）中氣虛弱用補中益氣湯（雜病傷勞條）氣血俱虛用八珍湯（即雜病虛勞）

婦人每怒心腹作痛久而不愈此肝火傷脾氣也用炒山梔一兩生薑五片煎服而痛止更以

陳加山梔桔梗乃不再發一婦人懷抱欝結不時心腹作痛諸藥不應用歸脾湯雜病健忘倍加炒山梔而愈一陳湖陸小村母久患心腹疼痛每作必胸滿噫吐手足俱冷面赤唇麻咽乾舌燥寒熱不時月餘竟夕不安其脉洪大衆以痰火治之屢止屢作迨乙巳春發頻而甚仍用前藥反劇此寒凉損眞之故內眞寒而外假熱也且脉息洪弦而有怪狀乃脾氣虧損肝木乘之而然當温補胃氣遂用補中益氣湯加半夏茯苓吳茱萸木香二服熟寐徹曉洪脉頓斂怪脉頓除諸證釋然

三神丸 治室女血氣腹中刺痛痛引心端經行澀少或月水不調以致疼痛

橘皮貳兩焙 當歸酒浸炒 玄胡索醋煮各壹兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸空心温酒送下

没藥散 治一切血氣臍腹撮痛及産後惡露不下兒枕塊痛

㊀無没藥 血竭 桂心 玄胡索 當歸 蒲黄 紅花 乾漆炒烟盡 木香

芍藥 各等分

右爲細末每服貳錢食前溫酒調下

大延胡索散 治婦人血氣攻心腹疼痛

延胡索　當歸　川芎
桂心 各半兩　木香　枳殼
赤芍藥　桃仁 各半兩　熟地黃 壹兩

右㕮咀每服參錢水壹盞薑參片煎至七分去滓
熱服

琥珀散 治婦人血氣攻心腹煩躁悶亂疼痛不止

琥珀 另研　沒藥 另研　當歸 炒

赤芍藥　牡丹皮　延胡索
蒲黃　莪茂　桂心 各等分

右爲末每服壹錢溫酒調下

瑞金散 治婦人血氣撮痛月經不行頭疼嘔吐疼痛

玄胡索　牡丹皮　紅花 各壹錢
片薑黃 貳錢半　赤芍藥　莪茂
川芎　當歸 各壹錢半　官桂 半錢

作壹服水壹鍾酒壹鍾同煎至壹鍾食前服

牡丹散 治婦人久虛羸瘦血塊走注心腹疼痛不

思飲食ヲ
牡丹皮
京三稜
赤芍藥
右煎服スル法同前ニ

八僊散 治ス血氣心腹疼痛ニ並驗アリ
當歸
枳殼 製
茯苓 各伍分
厚朴
芍藥
人參 各肆分
甘草
右爲末水貳升煮取八合空心分テ三服ス

玄胡索 官桂 各壹錢
當歸 各壹錢半 莪茂
牛膝 各貳錢

又八仙散 靈苑 治證同前ニ
棕櫚 貳兩 當歸 壹兩並剉碎テ
麝香 壹錢 細研
右同研令停每服壹錢溫酒調下ス

玄胡索湯 治ス婦人室女七情所感血與氣併ヒ心腹疼痛或連腰脇甚作掻擾一切血氣經候不調並宜服之

玄胡索
片薑黃
當歸 去蘆各壹錢半 乳香
官桂 不見火 沒藥 各壹錢
木香 不見火 赤芍藥
蒲黃

甘草 半錢

右作壹服水貳鍾生薑叁片煎至壹鍾食前服大效琥珀散 靈苑 治婦人心膈迷悶腹臟搖撮疼痛氣急氣悶月信不調等疾

烏藥 莪茂 各貳兩 當歸 壹兩

右並生爲細末温酒調一錢服服後以食壓之忌生冷油膩等物如是産後諸疾炒生薑酒調下治血氣不調臍下疼痛

菴蕳子 桂心 川芎 各肆分 甘艸 貳分

桑耳

又土瓜根

牛膝

白芍藥 各陸分 乾地黃 捌分

右爲末煉蜜丸如梧桐子大醋湯吞下貳十丸

赤茯苓 各五分 大黃

蠲痛散 治婦人血氣刺痛

荔枝核 燒存性 半兩 香附子 去毛炒 壹兩

右爲細末鹽湯米飲調下貳錢不拘時候

沒藥散 治婦人血氣疼痛不可忍者出博濟方

紅花 當歸 各等分 沒藥 研 延胡索 炒

右爲末每服貳錢童便半盞酒半盞同煎至六分

熱服用燒赤秤錘淬過調服亦可當服只用温酒
菖蒲丸　治婦人脾血積氣及心脾疼
菖蒲 九節者 陸兩　吳茱萸 炮　香附子 炒去毛 各肆兩
右三味並剉細以釀醋五升者乾爲度焙乾研細
末以好神麯打糊爲丸如梧桐子大空心食前以
淡薑湯吞下四五拾丸日叁服橘皮湯下亦好
手拈散　治血氣心腹疼痛
草菓　玄胡索　五靈脂
沒藥 各等分
爲末每貳錢温酒調服

木香枳朮丸　破滯氣消飲食開胃進食消化痰涎
木香　枳實 炒各 壹兩　白朮 貳兩
右每服五錢薑棗水煎服
木香化滯湯　治脾胃虛弱飲食停滯腹脹作痛或
心下痞滿不思飲食若憂怒飲食而致者尤宜用
之
木香　紅花 各叁錢　橘皮
當歸尾　枳實 炒各 貳錢　柴胡 肆錢
草豆蔻　甘草 炙各 半兩　半夏 壹兩
右每服叁五錢薑水煎服

心腹痛

大婦人小腹疼痛者此由胞絡之間夙有風冷搏於血氣停結小腹因風虛發動與血相擊故痛也醉前證若氣寒血結用蘇靈仙散氣滯血疑用當歸散肝經血虛用四物湯通治加參术柴胡肝經濕熱用龍膽瀉肝湯雜病淋肝脾氣虛用六君子湯雜病虛勞加柴胡芍藥肝脾虛寒用六君子加柴胡肉桂若兼嘔吐加木香四肢逆冷再加炮薑通府張孟威云其妹小腹痛服附子理中湯附子服過八十餘枚此乃沉寒痼冷之甚不多有者

大威靈散　治婦人久冷氣滯血刺小腹疼痛

威靈仙 壹兩　當歸 桂心 各半兩　沒藥

木香

右爲細末無時熱酒調下壹錢服已緊

當歸散　治婦人久積血氣疠刺小腹疼痛四肢無力不能飲食

當歸 炒　赤芍藥　劉寄奴

沒藥　枳殼

右爲細末熱酒調下壹錢無時候

追氣丸 靈苑　治婦人血刺小腹疼痛不可忍

芸薹子 微炒　桂心 各壹兩　良薑 半兩

爲細末醋糊丸如梧桐子大每服五丸不拘時淡醋湯下常服補血虛破氣塊甚有効

石灰散　治婦人血氣痛不可忍者陳五婆方

右取豬貼脊血半盞於湯上煖用杖子攪停後用石灰於火上燒令黃爲末羅過灰壹錢同血攪停放温服立愈

予嘗用紫金皮爲細末醋糊丸如櫻桃大又治婦人血氣小腹疼痛以温酒磨下壹丸及有心腹痛者亦良

吳茱萸湯　治婦人素虛又爲風冷乘氣停滯腹脇刺痛

吳茱萸湯洗　當歸去蘆各貳錢　桔梗去蘆　細辛去苗　防風去蘆　乾薑炮各壹錢　熟地黃貳錢半　甘草炙半錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾空心服

椒紅丸　治婦人血氣不調臟腑積冷臍腹疠痛肌體日瘦

椒紅　訶梨勒煨去核　沉香　當歸去蘆　蓬朮　附子炮去皮臍

白朮各壹兩　肉豆蔻　良薑　丁香各半兩　麝香另研貳錢半

右爲細末煉蜜和丸如梧子大每服參拾丸空心用溫酒送下

大腹皮飲　治婦人血癖單腹痛

大腹皮　防己　木通　桑白皮　厚朴　瓜蔞　黃芪　陳皮　枳殼麩炒　大黃蒸各壹錢　青皮壹錢半　五味子半錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾入酒半盞再煎一二

佛去滓食前服

陳良甫云婦人項筋拘攣強痛每得此疾療之似易而實難然方冊中所載亦少縱有言之議論亦畧以亨老之然既有是方何古人言此疾證尚且略又無的然之論詳之必是挾諸疾而生所以絶無專門亨因暇日摭古名方以備檢閱然自明學識淺鄙未必全備博學之士見其遺缺尚冀補而完之

夫頸項之處乃屬足太陽膀胱之經又許太學云是足少陰腎之經蓋腎與膀胱爲表裏故也以感外邪論之則有太陽經先因感風又感寒濕致令邪證

發熱惡寒與傷寒相似頸項強急腰身反張如中風狀痙痓口噤其身體凡凡古人以強直爲痙其脉沉遲弦細新產血虛多汗出喜中風亦有此證詳見產後中風玆不贅錄 又有挫閃轉項不得者與三五七散追風散仍與急風散揉項上若因被風吹頭目昏眩太陽并腦俱痛項背筋脉拘急可與蝎附散都梁丸 許太學治項筋強痛不可轉側以木瓜煎

[薛]前證若因肝木自旺用瀉青丸頭痛精血不足六味丸雜病虛勞一風熱淫肝加味逍遙散調經怒動肝火加味小柴胡湯熱入血室肝經血虛加味四物湯即四物加柴胡丹皮山梔

腎不能生肝六味丸胸脇氣滯羌活勝濕湯雜病腰痛大抵肝火旺則肝血虛而筋燥頸項強急或腰背反張或四肢攣拳或頸項筋處結核 一婦人耳內或耳後項側作痛寒熱口苦月經不調此肝膽經火兼傷脾胃用四君加柴胡升麻黃芪芍藥而愈後因勞役怒氣嘔吐脇脹用六君子湯加山梔柴胡而安 一婦人因怒寒熱作渴左目緊小頭頸動掉四肢抽搐遍身疼痛此血虛肝熱則生風也用加味逍遙加釣藤鉤數劑諸證漸愈又用八珍湯而痊 追風散 治年深日近偏正頭疼又治肝臟久虛血

氣衰弱風毒之氣上攻頭痛頭眩目暈心忪煩熱百節痠疼腦昏目痛鼻塞聲重項背拘急皮膚瘙痒面上遊風狀若蟲行及一切頭風兼療婦人血風攻痒頭目昏痛皆治之

川烏 炮去次皮臍 防風 去蘆 石膏 煅
甘草 炙 荊芥穗
川芎 天南星 炮 羌活
白僵蠶 炒去絲各壹兩 地龍 白附子 炮
天麻 全蝎 去尾針 草烏頭 炮去皮臍 炙
白芷 各半兩 沒藥 研 乳香 研 各貳 雄黃 研 錢半

右為細末每服半錢入好茶少許同調食後及臨臥服常服清頭目利咽膈消風化痰

慈風散

草烏頭 叁兩一半燒存性於酒 丹砂 另研壹兩 水飛
黑豆 貳錢伍分同草烏一處為末 麝香 另研貳錢半

右為細末入研藥勻停酒調塗痛處

蝎附散 治一切風邪頭痛夾腦風痰涎壅盛嘔逆惡心吐清水暗風旋暈眼見黑花牙關緊急口眼喎斜面胃瞤動頭項拘急肩背引疼耳痒目昏四肢麻木及沐浴出暴感風邪頭目昏痛兩太陽

疼遠年頭風服諸藥無効並皆治之

全蝎炮 雄黄水飛 硃砂水飛各壹錢半
附子炮去皮臍 川烏頭炮去皮臍 麻黄去節
天南星薑製 防風去蘆 白殭蠶炒各叁錢
藁本去蘆土二兩 白芷各半兩

右爲細末每服半錢葱茶調下食後孕婦不可服
京城之醫用此藥兼嚼如聖餅子治眼羞明多
淚見物不明有効 一方用白附子蝎稍
木瓜煎
宣州木瓜貳枚切頂作蓋刻去瓤 沒藥貳兩另研

乳香貳錢半另研

右二味入木瓜中用蓋子合定竹簽定之飯上蒸
三四次爛研成膏子每服三匙生地黄汁半盞無
灰好酒二盞調和服之 有人患此病自午後發
黄昏時定予曰此患必先從足起經言十二經絡
各有筋惟足下少陰之筋自足至頭大抵筋者肝
之合也日中至黄昏天之陽陽中之陰也又曰陽
中之陰肺也自離至兌陰旺陽弱之時故靈寶祕
法云離至乾腎氣絶而肝氣弱肝腎二藏受陰氣
故發於是時予授此方三服而愈

兩脇脹痛

大夫婦人兩脇脹痛者由臟腑虛弱氣血不調風冷之氣客於腸胃傷於胞絡之間與血氣相搏壅塞不宣邪正交爭衝擊故令兩脇脹痛也 醉東垣先生云胸脇作痛口苦舌乾寒熱往來發嘔吐四肢滿悶淋溲便難腹中急痛此肝木之妄行也竊謂前證若暴怒傷血用小柴胡苓歸山梔氣虛用四物參朮柴梔若久怒傷氣用六君苓歸山梔若氣血俱虛用六味地黃尤若經行腹痛寒熱晡熱或月經不調發熱痰咳少食嗜卧體痛用八珍柴胡丹皮若脇脹發

熱口渴唾痰或小便淋瀝頸項結核或溢汗便血諸血失音用六味丸若兩脇作脹視物不明或筋脉拘急面色青小腹痛或小便不調用補肝散若欲用香燥之劑反傷清和之氣則血無所生諸證作焉丹溪先生云右脇痛用推氣散小龍膏丸當歸龍膏丸控涎丹抑青丸十棗湯皆病氣元氣俱實之劑用者審之一婦人性急吐血發熱兩脇脹痛日晡益甚此怒氣傷肝氣血俱虛也朝用逍遥散倍加炒黑山梔黃檗貝母桔梗麥門冬夕以歸脾湯送地黃丸而愈

一婦婦內熱晡熱肢體痠麻不時吐痰或用清氣化痰藥晚間不利白帶腹脹用行氣散血藥胸痛不利肢體時麻此鬱怒傷肝脾而藥益甚也予則朝用歸脾湯以解脾鬱生脾氣夕用加味逍遥散以清肝火生肝血百餘劑而愈後因怒飲食日少肢體時麻此乃肝火侮土用補中益氣加山梔茯苓半夏而痊又飲食失調兼有怒氣肢體痲甚月經如注脉浮洪而數此脾受肝傷不能統血而致崩肝氣虧損陰血而脉大繼用六君加芎歸炮薑而血崩止又用補中益氣加炮薑茯苓半夏而元氣復更用歸脾湯逍遥散調理而康

靈寶散　治婦人血氣攻刺痛引兩脇

丁香　木香　乳香

玄胡索　當歸　白芍藥各等分

右爲細末每服貳錢食前温酒調下

草豆蔻散　治婦人脾胃虚氣攻兩脇脹痛

草豆蔻　訶子肉各壹兩　桂心

苦梗　厚朴各叁分　甘艸壹分

川芎　當歸　乾薑

檳榔各半兩

右爲粗末每服肆錢水壹盞煎染分去滓食前熱

服之

菴蔺子散　治婦人臟腑虚冷宿冷氣攻兩脇脹痛

坐卧不安

菴蔺子　延胡索　桃仁

當歸　桂心各壹兩

琥珀　木香　沒藥各半兩

赤芍藥

右爲末每服貳錢温酒調下

人參紫金丸　治婦人榮衛不和心腹刺痛胸膈脹滿不進飲食

紫金皮　蒼术　石菖蒲各壹兩

香附子 貳兩
右爲末米糊丸如梧子大食後薑湯吞下參拾丸
氣針丸 治久積風壅疎利氣滯空胸膈止刺痛
木香 青皮去白 大黃炮
檳榔各壹 黑牽牛貳兩半生半炒
右爲末煉蜜丸如梧子大溫水下參拾丸 鄧安
人年五十忽然氣痛投神保丸愈不二十日再痛
再服神保九六七十粒大腑不通其疾轉甚亦有
要用沉香木香薑桂芍藥而未敢投痛甚則築心
築背築之兩脇似有兩柴十字挿定心脇叫聲徹

天召予診之六脉沉伏乍來乍去衆問何如予曰
夫九痛之脉亦可準也但以證辨用藥觀其人質
肥偉問其大腑數日不通余曰實痛也其不必脹
但以人拯之痛甚手不可向邇此太實也經云太
滿太實者可下之用氣針丸伍陸百粒是晚愈
又已未在金陵有家提幹巽內人病心脇脹痛衆
醫投木香沉香檳榔大腹芍藥薑桂之類益甚召
予診之六脉弦緊而和不似病脉但診之時兩手
如次以此知其實痛也衆問如何治療僕曰大凡
心腹刺痛不可便作虛冷治之有一醫荅曰非冷

卽何熱卽生風冷生氣是也子曰不然難經云虛則痒實則痛又仲景云腹痛者桂枝加芍藥湯痛甚者桂枝加大黃湯提幹曰荊布素弱子曰有可辨處遇痛時使一婢按之若痛止是虛寒證也按之轉甚手不可近此實痛也卽令婢按之手不可近叫呼異常子曰此實熱無可疑者當用大柴胡湯治之衆不從予責狀而投之八服愈

論脇肋痛服木通散亦可

心下脇肋少腹疼痛皆素有積寒而温暖湯散亦可主治甚者以温藥下之心下與小腹痛諸書並有效方而脇肋下痛鮮獲治法此

木通散 治脇肋苦痛偏效併心下脇肋并少腹牽引痛者皆主之

木通去皮節 青皮去白 川楝子去皮核 各壹兩

以上三味用巴豆半兩炒黃去巴豆不用

蘿蔔子炒 木香 各半兩

滑石 壹兩

右爲細末煎蔥白酒調參錢壹服愈甚者不過再服

三脘散 治中焦虛痞兩脇氣痛面目手足浮腫大

便秘澁兼治脚氣ノ
大腹皮　紫蘇
乾木瓜　獨活　各壹兩
川芎　木香　沉香　白朮
陳皮　檳榔　各參分　甘草
右㕮咀每服參錢水壹盞煎至柒分去滓空心熱
服日中再服　戊午秋在京城有一婦人中焦虛
痞腹膨脹痛大便秘結六脉虛弱諸醫服藥無效
予投此藥不終劑而愈
補遺局方青木香丸治沉香降氣湯小烏沉湯四磨湯
皆可用

薛左金丸　三六名四金丸下
治肝火胸脇脹痛或發寒熱或頭目作痛或大便不實或小便淋秘或小腹疼痛及一切肝火之證
黃連　炒陸兩　吳茱萸　壹兩湯煮片時用
右爲末粥丸白朮陳皮湯下
當歸龍薈丸　治肝經實火胸脇痛或大便秘結小便澁滯凡屬肝經實火皆宜用之
當歸　龍膽艸　炒焦　梔子仁　炒
黃連　炒　黃芩　炒各壹兩　大黃　炒

蘆薈
麝香 另研 伍分
青黛 各伍錢
木香 貳錢半

右為末用神麴糊丸桐子大每服貳拾丸薑湯下

補肝散 治肝腎二虛經氣血虧損脇脹作痛或脇脹頭暈寒熱發熱或遍身作痛經候不調

山茱萸肉
山藥
木瓜 各半兩
獨活
當歸
黃芪 炒
熟地黃 自製
酥棗仁 炒各肆兩
五味子 炒杵
川芎
白朮 炒宣錢各

右為末每服五錢棗水煎服

腰痛

藥隱老人論曰夫腎主於腰女人腎藏繫於胞絡若腎氣虛弱外感六淫內傷七情皆致腰痛古方亦有五種之說如風腰痛宜小續命湯加桃仁杜仲煎服脾胃氣弱及寒濕腰痛宜五積散雜病中寒加桃仁如虛損及五種腰痛服青娥丸雜病腰痛神應丸仝上皆可用也如氣滯腰痛服如神湯必效薛陳無擇先生云若形體虛羸面色黧黑腿足痿軟不能行立此失志所為也腹急脇脹目視眩眩宗筋弛縱白淫下注此鬱結所為也肌肉不仁飲食不化腸胃脹滿閉塞腰

脇此憂思所爲也皆屬內若腰冷作痛身重不渴小便自利飲食如故因勞汗出腰倦脇痛或墜墮血滯或房勞精竭皆屬不內外因也竊謂前證失志腎虛熱者六味丸（雜病虛勞）腎虛寒者八味丸（雜病虛勞）鬱怒傷肝實用龍膽瀉肝湯（雜病淋）虛用六味丸補肝散（雜病腰痛）憂慮傷脾者歸脾湯（雜病健忘）逍遙散（調經）腎着者寒則术附湯（雜病傷濕）虛則腎着湯（上）腰膝痛者寄生湯養腎散（雜病腰痛）瘀血滯者如神湯舒筋散房勞腰痛者青娥丸十補丸（見前虛勞）一婦人腰痛三年矣每痛必面青頭暈目緊余以爲肝脾氣虛用補肝散而愈三年後因勞役患頭痛羞惡心用補中益氣湯（雜病傷勞陰）加茯苓半夏蔓荊子而愈一婦人苦腰痛數年不愈余用白术一味大劑服不三月而痊乃胃氣虛閉之證故用白术也

如神湯 治男子婦人氣虛腰痛（一方有杜仲無當歸）

玄胡索 當歸（去蘆） 桂心 等分

右爲細末每服叁錢温酒調下甚者不過數服

獨活寄生湯 夫腰痛者皆由腎氣虛弱卧冷濕地當風所得不時速治喜流入脚膝爲偏枯冷痺緩弱疼重或腰痛拘攣脚膝重痺宜急服之

獨活 叁兩　桑寄生　續斷
杜仲 炒去絲　北細辛　川牛膝
秦艽　茯苓　白芍藥
甘桂心　川芎　防風
人參　熟地黃　當歸 各貳兩

右㕮咀每服叁錢水壹鍰煎至七分去滓温服空心氣虛下利除地黃并治新產腹痛不得轉動及腰脚攣痛痺弱不得屈伸此藥最能除風消血肘後有附子故無寄生人參當歸粉草近人將治歷節風脚氣流注亦効

舒筋散　治腰痛神効閃挫亦良

玄胡索 炒　杜仲 薑汁炒　官桂 去粗皮
羌活　芍藥 各等分

右爲末酒調下貳錢

又方　痛核炒香研酒去粗下青木香丸方見

又方　天羅布瓜子仁炒焦搥酒熱服留查炒熱封痛處効

腰脚疼痛

夫腎主於腰脚女人腎臟繫於胞絡若勞傷腎氣虛弱而風冷客於胞絡邪氣與眞氣交爭故令腰脚疼痛也治當以補元氣爲主佐以祛邪之劑 薛前證若眞陽衰敗寒邪乘襲手足俱冷頭痛惡寒或嘔吐腹痛等證宜用本方若氣血虛弱寒邪所感惡寒發熱頭痛作渴或嘔吐腹痛等證宜用五積散 雜病中寒 若元氣虛弱濕熱所傷兩脛腫痛寒熱身疼或嘔吐不食等證宜用檳蘇敗毒散 雜病傷濕 若脾胃虛弱元氣下陷寒熱嘔吐發熱頭痛喘渴體倦等證宜用補中益

氣湯（雜病勞倦）若足三陰精血虧損陰火內動內熱晡熱作渴痰甚小便頻數等證宜用六味地黃丸（雜病虛勞）若足三陰陽氣虛敗惡寒發熱手足俱冷吐痰不食二便滑數等證宜用八味地黃丸（雜病虛勞）一婦人先腰膀作痛後兩腿亦痛余以為足三陰虛寒外邪所傷用小續命湯及獨活寄生湯或作或止所用飲食極熱腹中方快余曰邪氣去而元氣虛寒也診其脉果沉細用養腎散（本條漸愈又用十補丸（虛勞）而痊

一婦人所患同前但發熱作渴喜冷飲食脉洪數按之尾濇余以為血虛有熱用羚羊角散（身體痛去檳榔加白朮茯苓數劑更用加味逍遙散（結核）而瘥

一婦人患前證時或腿膝作痛脉浮數按之遲緩此元氣虛而風濕所乘用獨活寄生湯頓愈又用八珍湯而安

一婦人因怒患前證寒熱往來口苦不食晡熱內熱余以為肝火血虛先用小柴胡湯加山梔頓愈又用加味逍遙散而瘳

一婦人患前證寒熱頭痛殊類傷寒此寒邪之證用穹蘇敗毒散而安又用補中益氣調補而愈

虎骨丸　治婦人血風攻注腰脚骨節疼痛不可忍

虎脛骨（酥炙）　敗龜（酥炙）　檳榔

牛膝 酒浸各壹兩　當歸 去蘆炒　川大黃 炒

木香　桃仁 浸炒　海桐皮 各柒錢半

防風 去蘆又　附子 炮去皮臍　赤芍藥

桂心　地龍 去土炒各半兩　血竭　沒藥 另研

右爲細末煉蜜和搗三五百下丸如梧桐子大每服叁拾丸空心食前温酒下日貳服

仙靈脾散　治婦人血風攻注腰脚疼痛

仙靈脾　桃仁 麩炒　槟榔 各壹兩

羌活 去蘆又　海桐皮　牛膝 酒浸

當歸 去蘆炒　芎藭　骨碎補

玄胡索　桂心　枳殼 去瓤麩炒

木香　麝香 另研貳錢半　菴蔺子 各柒錢半　蝉蛻 炒半兩

右爲細末每服貳錢食前用豆淋酒調下日進一服

藁本散　治婦人血風流注腰脚疼痛不可忍

藁本 去蘆土壹兩半　狗脊　天麻

骨碎補　桂心　沒藥 另研

蝉殼 微炒各壹兩　虎脛骨 醋炙

敗龜醋炙
右為細末入麝香拌勻每服貳錢生薑豆淋酒調下空心食前日二服
敗龜散　治婦人風毒流注腰脚疼痛行步艱難
敗龜酥炙　虎脛骨酥炙各貳兩　白僵蠶炒各壹兩　當歸去蘆　杜仲剉炒去絲各壹兩　桂心　乳香另研各貳錢半
薏苡仁　地龍炒去土　沒藥半兩另研
右為細末每服貳錢食前温薄荷酒調下
骨碎補散　治婦人血風氣攻腰脚疼痛腹脇拘急並宜服之
骨碎補炒　革薤酒浸　牛膝酒浸
桃仁麩炒　海桐皮　當歸去蘆
桂心　檳榔各壹兩　赤芍藥
附子炮去皮臍　川芎各柒錢半　枳殼半兩去瓤麩炒
右為散每服五錢水一大盞半生薑叁片棗壹枚煎至一大盞去滓温服
附子散　治婦人腰脚積年疼痛不瘥
附子炮去皮臍　桂心　沒藥另研
威靈仙　乾漆炒去煙　牛膝酒浸各壹兩

右爲細末每服貳錢温酒調下食前日進二服
養腎散　治腎經虛弱風寒所侵以致腰脚疼痛不
能步履
蒼朮壹兩　乾蝎參錢　天麻
草烏頭炮去皮臍　黑附子炮去皮臍各貳錢
右爲末每服壹錢酒調服麻痺少時隨愈孕婦勿
服此治風寒傷腎腑脫虛寒之良藥用之得宜殊
有神効

腎痛

大夫婦人腎痛筋脉攣急不得屈伸遇寒則劇由肝
虛爲風寒邪氣流於血脉客於經絡搏於筋筋不榮
則乾急而痛其脉緊細宜服栢子仁丸舒筋湯若腎
痛不能舉或左或右時復轉移一腎由中腕伏痰脾
氣滯而不行上與氣相搏四肢皆屬於脾脾氣滯而
氣不下上攻於腎故痛其脉沉細宜茯苓丸控涎丹
薛前證若肝血虛用加味逍遥散中氣虛用補中
益氣湯血氣俱虛用八珍湯風熱血燥用秦艽地黄
湯脾腎虛寒用栢子仁丸脾胃實熱用茯苓丸水不

能生木用六味丸逍遙散怒動肝火用小柴胡加川芎當歸眩暈痛熱用四物柴梔丹皮痛熱月經不調用加味逍遙散食少體倦無寐盜汗用加味歸脾湯先太宜人偏身作痛筋骨尤甚不能屈伸口乾目赤頭眩痰壅胸膈不利小便赤短夜間殊甚遍身作痒如蟲行此屬肝腎氣虛而熱也用六味地黃丸料加山梔柴胡而愈

栢子仁丸 指迷

栢子仁 乾地黃各貳兩 茯苓

枳殼 去穰麩炒 覆盆子 炒 北五味子 炒

附子 炮 石斛 去根切酒蒸炒 鹿茸 酥炙

酥棗仁 炒 桂心 沉香

黃芪 蜜水炙各壹兩 一方二云等分十一

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心酒下叁拾丸

舒筋湯 治臂痛又名五痺湯亦治腰下疾

片子薑黃 肆兩 甘草 羌活 各壹兩

白朮 海桐皮 當歸

赤芍藥 各貳兩

右為粗末每服叁錢水一盞半煎七分去滓溫服

如腰以下疾空心服腰以上疾食後服

茯苓丸　治臂痛不能舉手或左或右時復轉移由伏痰在肉中脘停滯脾氣不行上與氣搏四肢屬脾脾滯而氣不升故上行攻臂其脉沉細者是也後人謂此臂痛乃痰證也用以治痰無不効者予嘗以此藥治人隨服隨愈世所謂痰藥多矣未有立効如茯苓丸速也

茯苓壹兩　半夏貳兩　枳殼半兩去穰麩炒　風化朴硝半兩

右為末薑汁煮糊丸如梧子大生薑湯下貳拾丸

食後服

控涎丹　凡人忽患胃脘背手足頸項腰胯隱痛不可忍連筋骨牽引鈎痛坐卧不寧時時走易不定俗醫不曉謂之走痧便用藥及針灸皆無益又疑是風毒結聚欲為癰疽乳藥貼亦非也此乃痰涎伏在心膈上下變為此疾或令入頭痛不可舉或神意昏倦多睡或飲食無味痰唾稠粘夜間喉中如鋸聲多流唾涎手脚重腿冷脾氣肌不通誤認為癱瘓亦非也凡有此疾但以此藥不過數服即愈

甘遂去心 大戟去皮 眞白芥子炒各等分
右爲細末糊丸如梧桐子大臨臥淡薑湯下五七丸
白芥子散 治臂痛牽引背胛或輟或作由榮衛循
行失度痰滯經絡或似癱瘓
眞白芥子 木鼈子各叁兩炒 沒藥另研
桂心 木香各半兩
右爲末每服壹錢溫酒下 愚按前三方脾氣虛
弱者必佐以六君子湯中氣虛弱者必佐以補中
益氣湯氣血虛者必佐以八珍湯脾氣鬱滯者必
佐以歸脾湯肝經怒氣者必佐以逍遙散若專用
前方治之胃氣益虛病氣益甚不可不謹
流氣飲 治七情氣滯胸脇痞悶痞咽喉不利嘔喘面
浮二便不調或氣攻肩背脇肋作痛或脚氣喘急
腹脹便閉元氣充實者宜用此藥愼之
紫蘇葉 黃芪炒 青皮去白
當歸 半夏薑製 烏藥
芍藥炒 茯苓 桔梗
防風各伍錢 陳皮各柒錢伍分
枳實麩炒 川芎各貳錢伍分 甘草炙壹兩貳錢半
木香各貳錢伍分

大腹子 薑製 豆豉 各壹錢
右每服半兩薑棗水煎服
四物湯 治血滯中風血虛手足不遂如臂痛加紅花煎服
交加散加木瓜牛膝治冷痺肩臂作痛即人參敗毒散和五積散
烏藥順氣散加羌活木瓜治外邪氣滯筋骨作痛或痰氣不利方見雜病中氣
秦艽地黃湯 治肝膽經風熱血燥肩臂疼痛或筋脉引急或時牽痛其內證發熱或寒熱晡熱月經不調或肢體酸痛等證
秦艽 熟地黃自製 當歸 各壹錢
川芎 芍藥 牡丹皮
白朮 茯苓 各壹錢伍分 釣藤鉤 壹錢
柴胡 甘草 炙各叁分
右水煎服

脚氣

陳臨川云凡頭痛身熱肢節痛大便秘或嘔逆而脚屈弱者脚氣也輕者可與香蘇散加木瓜檳榔生薑煎服然後隨證治之要知有脚氣之人先從脚起或先緩弱疼痺或行起忽倒或兩脛腫滿或脚縢枯細或心中忪悸或小腹不仁皮頑不知疼痛或舉體轉筋或見食嘔逆惡聞食氣或脅滿氣急或遍體酸痛皆脚氣之候黃帝所謂緩風濕痺是也頑弱為緩風疼痛為濕痺寒中三陽所患必冷小續命湯主之煎成入生薑自然汁最妙暑中三陰所患必熱小續命湯去附子減

桂一半主之大煩躁者紫雪最良若無紫雪以白合
薄荷煎冷水調服極妙大便祕者脾約丸麻仁丸三
和散主之仍針灸爲佳服補藥與湯淋洗皆醫家之
大禁也　夫婦人脚氣與丈夫不同男子則腎臟虛
弱爲風濕所乘女子以胞絡屬於腎也腎主於腰脚又肝脾腎三臟經絡起
於足十趾若臟腑虛損則風邪先客於脚從下而上
動於氣故名脚氣也此皆由體虛或當風取涼或久
坐卑濕或產後勞損或恚怒悲傷肝則心氣不足致
月候不通因其虛傷風毒傳入筋骨則令皮膚不仁
筋脈疼痛肢體不隨筋脈拘攣或時冷疼或發腫滿
或兩脚痺弱或舉體轉筋目眩心煩見食嘔吐精神
昏憒肢節煩疼小便赤黃大便祕澁如此證候其婦
人脚氣療之與丈夫不同以其氣血不調胎姙產損
傷之是以療寡婦及尼與妻妾殊別即其義也　醫
嚴用和先生云前證初患不覺因他病乃發先從脚
起或緩弱痺痛不能行履或兩脛腫滿或足膝細小
或心中怔忡或小腹不仁或舉體轉筋或見食作嘔
或胸滿氣急偏體酸痛其脈浮而弦者因於風濕而
弱者因於濕洪而數者因於熱遲而澁者因於寒男

子由於腎氣虧損女子血海虛弱七情所致竊謂前
證若足三陰虛弱用還少丹（雜病虛勞）若脾氣虛寒用八
味丸（雜病虛勞）若飲食停滯臍腿痠脹浮腫作痛此脾氣
下陷用六君子（雜病虛勞）少加柴胡升麻不應須用八味
丸若發熱口渴月經不調兩腿無力此足三陰血虛
火燥用六味八味二丸兼服前證兩方之人多患之
因素食乳酪脾胃壅滯脛足腫滿至於南方亦有因
膏粱厚味濕熱下注而患者故古人謂之壅疾所用
之方多疎通發散之劑然感於房勞過度虧損三陰
治法又當以固本爲主故六物附子湯元氣虛弱寒

邪內侵之聖藥

大腹皮散　治婦人風毒脚氣肢節煩疼心神昏悶
並宜服之

大腹皮　桑白皮　木通（去皮）
羌活（去蘆）　赤芍藥　荊芥
獨活（去蓋）　青橘皮（去白）　乾木瓜（各壹兩）
枳殼（去瓤麩炒）　紫蘇葉（各貳兩）

右㕮咀每服八錢水壹中盞半生薑五片蔥白七
寸煎至壹大盞去滓食前温服

紫蘇飲　治婦人風毒脚氣心腹痞塞痰飲停積不

思飲食脚重虛腫
紫蘇葉　木通去皮　茴香
桑根白皮各壹兩　獨活去蘆　羌活去蘆
乾木瓜　青橘皮去白　甘草炙各半兩
大腹皮半兩　枳殼去瓤炒貳兩　荆芥半兩
右㕮咀每服八錢水一大盞半生薑五片連鬚葱
白壹莖煎至二大盞去滓温服不拘時日進二服
四白散　治男子婦人血虛發熱夜多盜汗不進飲
食四肢羸瘦筋脉拘攣脚痛不能行立
黃芪去蘆　厚朴薑製　益智仁
陳皮去白　藿香　白扁豆
白朮去蘆各壹兩　白茯苓去皮　白豆蔻仁
人參去蘆　甘草炙　天台烏藥各半兩
芍藥壹兩半　檀香　沉香各貳錢半
右爲細末每服參錢水壹盞生薑參片棗子壹枚
煎至七分和滓温服日進二服諸證減退只有脚
攣痛不能行服蒼朮丸治之
蒼朮丸　大治乾濕脚氣筋脉拘攣疼痛不能行履
兼補下部
乳香另研　沒藥各貳錢另研　川牛膝酒浸

青鹽 各半兩 研 熟苓 肆錢 米糊過研末 全蝎 壹錢 炒研 川烏頭 叁錢炮去皮臍

右件爲細末入研藥令勻用大木瓜壹枚切一頭留作蓋去穰入上件藥於木瓜內將蓋簽定安於黑豆中蒸令極爛取出去皮連藥研成膏却入生蒼朮末不以多少拌令得所丸如梧桐子大每服五十丸空心用木瓜湯下或溫鹽酒亦得日進三服忌血與鮓

餘證方論並詳雜病本門

癮疹瘙痒

大夫婦人體虛爲風邪氣客於皮膚復傷風寒所以則發風瘙癮疹若赤疹者由寒濕客於肌中極熱熱結則成赤疹也得大熱則發取冷則瘥也白疹者由風氣客於肌中熱熱與風相搏則成白疹也得天陰雨寒則發出風傷亦發得晴煖則減著衣煖亦瘥肌浮而洪浮卽爲風洪則爲氣風氣相搏則生癮疹身體瘙痒凡人汗出不可當風露卧及浴後出早使人身振寒熱以生風疹也　藥隱老人云治婦人遍身時發瘙痒或赤腫癮疹五心煩熱血風攻注與人參

荊芥散虛勞而風消風散雜病頭痛四物湯通治加荊芥或人參當歸散或逍遙散兼服導赤丸如不通者食後服皂角丸氣虛老人不可久服如服皂角丸不退者此凝滯熱甚者宜先服青木香丸三兩服以開氣道服蔌蔌散立効辟前證有身發疙瘩或如丹毒痒痛不常或膿水淋漓發熱煩渴或頭目昏眩日晡益甚或寒熱發熱月經不調皆肝經風熱血燥用加味逍遙散調經爲主佐以四君芎歸若忿怒身發疙瘩痛痒寒熱乃肝火血燥用加味小柴胡湯熱入血室氣血俱虛用八珍加柴胡牡丹皮若夜間發熱作渴譫語乃熱入血室用加味逍遙散若發熱煩渴用加生地黃血虛四物合小柴胡後用加味逍遙散調理若鬱結食少體倦內熱晡熱乃脾經血燥用加味歸脾湯寒熱加山梔熟地黃若遊走瘙痒乃血風走注用何首烏散血虛逍遙散風熱消風散若專用風藥復傷陰血必致筋攣等證一婦人身發疙瘩或如丹毒痒痛不常搔碎成瘡膿水淋漓發熱煩渴頭目眩暈日晡益甚此血虛內熱之證也以當歸飲加柴胡山梔仁治之而愈一婦人患前證肢體疼痛頭目不清自汗盜汗月水不調肚腹作痛食少倦怠先用人參荊芥散後用逍遙散治

之而痊一婦人因忿怒身發疙瘩憎寒發熱余謂肝火用小柴胡湯加山梔黃連治之而愈後口苦脇痛小便淋瀝復用前藥全愈一婦人患前證發熱夜間譫語此血分有熱以小柴胡湯加生地黃治之而安後用四物加柴胡山梔丹皮而熱退又用逍遙散全愈一室女年十四歲天癸未至身發赤斑瘙痛左關脉弦數此因肝火血熱以小柴胡湯加山梔生地黃牡丹皮治之而愈若因怒而致者又當治以前藥

何首烏散 治婦人血風皮膚瘙痒心神煩悶及血風遊走不定並宜服之

何首烏　防風　白蒺藜
枳殼　天麻　殭蠶
胡麻　荊蔚子　蔓荊子　各等分

右爲細末每服貳錢煎茵蔯湯調下無時

蒺藜散 治婦人風瘙皮膚中如蟲行及生癮疹搔之作瘡面腫心煩並宜服之

白蒺藜炒　莽艸炒　麝羊角屑　各柒錢半
人參去蘆　苦參去蘆
黃芩　秦艽去蘆　防風去蘆
蛇床子

麻黃去節　當歸炒去蘆　甘草炙
枳殼麩炒去瓤　細草去苗各半兩

右㕮咀每服五錢水壹中盞半煎至壹大盞去滓
温服不拘時日進二十服

治婦人風痒癮疹不瘥

蒼耳花葉子各等分

右爲細末每服貳錢豆淋酒調下不拘時候日進
二服

治癮疹

右用白蜜不以多少好酒調下已試有驗

治皮膚有風熱遍身生癮疹

牛蒡子水壹盞煮壹兩沸淨晒乾炒令香　浮萍蒸過焙乾等分

右爲細末每服貳錢薄荷湯調下日二十服

又治風氣客於皮膚搔之不已

蟬蜕洗　大葉薄荷

右等分爲細末每服貳錢温酒調下無時

又方

露蜂房洗過密炙令焦　蛇蛻洗炙令焦各等分

右爲細末每服壹貳錢温酒調下不拘時

治婦人風瘡癮疹身痒不止宜用淋漬方

馬蘭　芫蔚子　白礬
白蒺藜　茵芋　羊桃根
凌霄花 各貳兩　蒴藋根　革蘇葉 各壹兩
右㕮咀以水貳斗煮取壹斗去粗於避風處洗之

又方

凌霄花 叁兩　蒴藋根 半斤
右件藥以水七升煮取叁升濾去滓入白礬末貳兩攪勻以綿漬頻拭於疹上後煮槐柳湯浴之

又方　以醋漿水磨白礬塗之



国立公文書館
National Archives of Japan