

敗天公平主鬼疰精魅

云此人所飲竹筴之
敗者也取上竹燒酒服之

一十一種陳藏器餘

毛莨鈎吻注陶云鈎吻或是毛莨蘇云毛莨是有毛石
龍芮也百一方云菜中有水莨葉圓而光有毒生水旁
蟹多食之蘇云又注似水莨無毛其毛莨似龍芮而有
毒也

陰命鈎吻注陶云有一物名陰命赤色著木懸其子生
海中有毒又云海薑生海中赤色狀如龍芮亦大毒應
是此也今無的識之者

毒菌地漿注陶云中多有毒菌地漿解之地生者為菌
木生者為櫛江東人呼為蕈爾雅云中禰菌注云地蕈子

也或云地鷄亦云鸞頭夜中光者有毒者不熟者有毒者
訖照人無影者有毒有惡蟲鳥從下過者有毒欲爛無
虫者有毒久春無毒及秋夏有毒者為蛇過也

草禹餘糧注陶云南人又呼平澤中一藤如菝葜為餘糧
言禹採此當糧根如盞連綴半在土上皮如茯苓肉赤味澁
人取以當穀不飢調中止洩健行不睡云昔禹會諸侯弃
糧於地化為此草故名餘糧今多生海畔山谷

鼠萋草莎草注陶云別有鼠萋草治體異此有名無用條
有萋草味苦寒主溫瘧寒熱酸斯利氣生淮南山谷即此也

廩薑杜若注陶云若似廩按廩薑熱主胃中冷吐水不下食似
薑生嶺南劔南人多食



草石蠶蟲石蠶注陶云今俗用草根黑色按草石蠶生高山石上根如箸上有毛節如蠶葉似卷柏山人取浸酒除風破血主溪毒者食之本經從蟲部出復有蟲石蠶已出拾遺漆姑草杉木注陶云葉細細多生石間按漆姑草如鼠跡大生階墀間陰處氣辛烈主漆瘡按碎傳之熱更易亦主溪毒瘡蘇云此蜀羊泉羊泉是大草非細者乃同名耳

麋目苴苴注陶云麋目小冷按麋目云出嶺南如麋目食之發冷痰餘別無功

梨豆蚰蚘注陶云蚰蚘如梨豆生江南蔓如葛子如皂莢子作狸首文故名梨豆爾雅云慮涉子人炒食之一名虎涉別無功

諸草有毒瓜兩蒂兩鼻害人瓜瓠正苦有毒簷溜滴著菜有毒薑黃花害人苾赤葉害人狐首蜜食下痢生葱不得雜白大肉食之令人九竅流血食戎葵并鳥肉令人面無顏色食葵發狂犬咬食葫葱青魚令人腹生蟲薤不得和牛肉食成癥瘕痼疾婦人妊娠食乾薑令胎肉消生葱和鷄子食變嗽蓼蕪食生食令人氣奪之令陰痿九月食霜下瓜血必冬發三月不得食陳蒞夏熱病發惡瘡瓠牛踐苗子即苦

本草綱目卷第十



臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

重修政和經史證類備用本草

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



重修政和經史證類備用本草卷第十

十二

救校勘

木部上品總七十二種

一十九種神農本草經白字

六種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家嘗用有効注云今附

一種新補

一種新定



七種新分條

一種唐慎微續補墨蓋子下是

八種海藥餘

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

桂

松脂

實藥根節等附松黃松
唐注五粒松續注

槐膠

新定

槐花

新補

牡桂

茵桂

槐實

枝皮根等附

枸杞

葉上蟲窠續注

琥珀

酸棗

乾漆

生漆附

桂實

葉皮側柏等附

空

元附琥珀下今新分條

藥木

根附

褚實

葉皮莖白汁等附穀帑續注

榆皮

附花

茯苓

扶神附

五加皮

牡荊實

蔓荊實

辛夷

楓香脂

皮附唐附

桑上寄生

女真實

枸骨冬青續注

杜仲

木蘭

蕤核

丁香

今附母丁香續注

沉香

董陸香

雞舌香

藿香

麝糖香

檀香

乳香

已上六種元附沉香下今各分條

蘇合香

佛子果續注

金櫻子

今附自草部今移

降真香

八種海藥餘

藤黃

返魂香

海紅豆

落鴈木

紗木

柵木皮

無名木皮

奴會子

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮

舍水藤中水

翠蘆葉

蜜香

阿勒勃

鼠藤

浮爛囉勒

靈壽木皮

絞木

斑珠藤

阿月渾子

不彫木

曼遊藤

龍手藤

放杖木

石松

牛妳藤

震燒木

木麻

帝休

河邊木

迦桓

木蜜


朗榆皮

那者悉

黃肩




桂花



賓州桂



桂



宜州桂

桂味甘辛大熱有小毒主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止嘔吐欬嗽鼻鼈能

神船堅骨節通血脉理疎不足宜導百藥無所畏久服
仙不老生桂陽二月八月十月採及陰乾得人參麥門冬甘草大黃

其平調中益氣得此胡紫石英乾地黃廢吐逆
有齒壯二桂即桂用體大同小異今俗用便有三種以半卷多脂者
名曰桂入藥最多所用悉與前說相應仙經乃並有三桂常服食以
忘勞和雲母蒸化為水者正是此種爾今出廣州者好湘州始興
亦好經云桂葉如柏葉器黑皮黃心赤齊武帝時湘州送樹以植芳
苑中今東山有桂皮氣粗相類而葉重異亦能凌冬恐或疑桂
人為多呼丹桂正謂皮赤爾北方今重此每食輒瀆之蓋禮所云蓋
桂以為芬芳謂桂葉似柿葉中有縱文三道表裏無毛而光
海桂桂葉長尺許高云小桂或言其葉小者陶引經云似柏葉驗之
殊不相類不知此言從何所出今按桂有二種桂皮稍不同若蘭桂
七人堅板無肉全不與用其技薄卷及二三重者或名蘭桂或名
筒桂其性極燥枝皮名為肉桂亦名桂枝其老者名木桂亦名大桂
得入參差良本是蘭桂刺出中桂條陶為深誤也今按陳藏器本草
云蘭桂性極燥心口上三色並同是一物按桂林桂嶺因桂為名今
之所生不詳桂從嶺以南等海盡有桂樹惟柳象州最多味既辛
烈及天厚堅二人所採厚者被薄者必老以老薄者為一色以厚
有為云桂既香又潤桂必味淡自然板薄板薄者即桂

身後人誤而書之習而成俗至於書傳亦復因循桂心即桂樹
上甲錯取其近裏辛而有味桂樹心即桂樹
蘭桂華似柿葉桂葉似柿葉此乃云華如柿葉以桂華然以
折葉者乃云陶為深誤刺山此條今據陶注云蘭桂止圓如計三
者良杜桂皮薄色黃多脂肉氣如木蘭味亦辛此桂則桂半卷後
者此云仙經有三桂以慈草合和雲母蒸化為水服之此則有三
則矣陶又云齊武帝時湘州得樹以植芳林苑中陶隱居雖身
亦時人實生自宋孝武建元三年歷齊為諸王侍讀故得見此
信也桂恭但只知有二種亦不能細尋事跡而云陶為深誤
之甚也范梈子云桂可以竹澀合解之亦可以龜腦和服之
云桂心君亦名紫桂殺草木毒忌生慈味苦辛無毒主治九種
殺三蟲主破血通利月閉治軟脚痺不仁治胞衣不下除痰
痺痺止腹內冷氣痛不可忍去下痢治鼻息肉目云桂心
切風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目暖腰膝
破眩癢癢消痰血治風痺骨節痠痛筋骨生肌肉圖經
生交趾山谷桂生南海山谷桂生桂嶺舊經載此三種之異
功用亦別而爾雅但言棧木桂一種郭璞云南人呼桂厚皮者
桂蘇恭以謂杜桂即木桂及單之者是也今嶺表所出則有
肉桂桂心官桂板桂之名而醫家用之罕有分別者舊說蘭桂正
如竹有二三重者則今所謂筒桂也筒節字近或傳寫之誤耳三
重者則今所謂筒桂也筒節字近或傳寫之誤耳三

去津適寒 又方 治反腰有血痛擣桂篩三分 葛氏方 治卒吐

溫盡服 方寸匕晝夜含二十許服亦 又方 治產後腹中痲痛未桂溫酒

療下血大神驗千金方同 又方 服方寸匕日三子母秘錄同

孫真人食忌 水三外煎取一外服取汗 又方 治唾血取桂心

方寸 梅師方 蜀椒閉口者有毒誤食之便氣欲絕或下白沫身體

濃或汁 又方 治卒外腎偏腫疼痛方寸匕塗之 又方 治產後血泄不禁

桂心乾薑等分為末 斗門方 治中風失音用桂心一兩去其麋皮

空酒調服方寸匕 姚和衆方 治小兒臍腫取桂心炙

為三服每服用水二盞煎取 一盞服之 差大妙聖惠方同 姚和衆方 治小兒臍腫取桂心炙

抱朴子云 龜腦和而服之七年能步行水上長生不死又云趙

他子服桂二十年延年下毛 生日行五百里力舉千斤

衍義曰 桂大熱素問云辛甘發散為陽故漢張仲景桂枝湯治傷

寒以熱藥故知三種之桂不取菌桂桂若蓋此二種性止溫而已

不可以治風寒之病獨有一字桂本經言曰辛大熱此正合素問辛

桂枝者蓋亦取其枝上皮甘木身鹿厚處亦不中用諸家之說但各

執已見終無諸據今又謂之官桂不知緣何而立名慮後世

為別物故書之又存桂心此則諸桂之心不若一字桂也

生桂味辛溫無毒主上氣欬逆結氣喉痺吐吸心痛

脅風脅痛溫筋通脈止煩出汗利關節補中益氣久服

通神轉身不老生南海山谷 陶隱居云南海郡即是廣州今

皮色黃胎肉其少氣如木蘭味亦類桂不知當是別樹為復猶是桂

生有老宿者亦小所未究 爾雅云浸音寢木桂古方亦用

木桂或云牡桂即今水桂及單名桂者是也此桂花子與菌桂同惟

葉倍長大小枝皮俱名牡桂然大枝皮肉理鹿處如木肉少味薄不

及小枝皮肉多半卷中必皺起味辛美一名肉桂一名桂枝一名桂

心出狀州桂州交州其良 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉狹長於菌

桂葉一二倍其嫩枝皮半卷多紫肉中皺起肌理虛軟謂之桂枝又

名肉桂削去上皮名曰桂心藥中以此為善其厚皮者名曰木桂二

者為木桂桂樹葉似枇杷而大白華華而不著子叢生巖嶺枝葉冬

夏常青開無雜木本草謂之牡桂是也 圖經 文具桂 經驗

論云牡桂君味甘辛能去冷風痲痛 圖經 條下 經驗

後方

治大人小兒與雜果子多腹脹氣急方取肉桂碾末飯丸如棗豆大小兒熟水下五九大人十九未痊再服

菌桂味辛溫無毒主百病養精神和顏色為諸藥先聘

通使久服輕身不老面生光華媚好常如童子生交

陟桂林山谷巖崖間無骨正圓如竹立秋採陶隱居云交州桂

林屬廣州而蜀都賦云菌桂臨崖谷中不見正圓如竹者准嫩枝破

卷成圓猶依桂用非真菌桂也仙經乃有用菌桂云三重者良則明

非今桂矣必當別是一物應更研訪唐本注云菌者竹名古方用

筒桂者是故云三重者良其筒桂亦有二三重卷者藥似柿葉中三

道文肌理緊薄如竹大枝上枝皮俱是菌然大枝皮不能重卷味極

淡薄不入藥用今惟出韶州自謂按蜀本圖經云葉似柿葉

而尖狹光淨花白藥黃四月開五月結實樹皮青黃薄卷若筒亦

名筒桂厚硬味薄者名板桂又不入藥用三月七月採皮日乾


圖經文具桂列仙傳范蠡好食桂飲水討藥人世世見之又

服之韓終采藥詩開河之桂實大如栗別說云謹按諸家所說

可用考今交廣商人所販及醫家見用唯陳藏器一說最近然筒厚

實氣味重者宜入治藏及下焦藥輕薄者宜入治頭目發散藥故本

松脂



松脂味甘溫無毒主疽惡瘡頭瘍白秃疥癩風氣安

五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌鍊之令白

其赤者主惡瘡及服輕身不老延年一名松膏一名松

肪生太山山谷六月採

經以菌桂養精神以牡桂利關節仲景傷寒論發汗用桂枝桂枝條非身幹也取其輕薄而能發散今又有一種柳桂乃桂枝條條也尤宜入治上焦藥用也

松實味苦溫無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月採陰乾

松葉味苦溫主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年六松葉無毒

松節溫主百節久風風虛脚痺疼痛

松根白皮主辟穀不飢

松根白皮主辟穀不飢中以其灰汁或酒煮軟按內寒水不可多得惟禁止是斷穀所宜細切如粟以水及麵飲服之亦其乾搗為屑丸服者人患惡病服此無不差比來苦脚弱人藥以酒亦皆愈松柏皆有脂潤又凌冬不凋理為佳物但人多忽之
亦皆愈松柏皆有脂潤又凌冬不凋理為佳物但人多忽之
藥及脂其子味甘性平非也松取枝燒其上下取汁名
謂耳也
青白可愛也
聾牙有少許交之
風關
又方
五葉
松道
服食

子如巴豆新羅往往之云松脂潤心肺下氣除邪煎膏

廣爛則膿松葉暖無毒多胃寒瘡風濕瘡佳
又方
松節無毒

胸軟骨節風又方
松根白皮
圖經曰
松脂生泰山山谷今處處有

者為勝道入服餅或合挾艾松柏實補花作丸皆先鍊治其法用大

益加水置甑用白茅藉甑底又加黃砂於茅上厚寸許可矣然後布

之於於冷水既凝又蒸如此三過其白如玉然後入藥亦可單服其

以根白皮古亦有服食法但今松實多作藥品餘不聞堪入藥其

用高遠燒其枝上下承取汁液名松脂音詣主牛馬瘡皮上綠衣名

又香用合諸香燒之其煙不散方書言松為五粒字當讀為履音

不及塞上者佳好也中品有墨條不載所出州郡然亦出於松

聖惠方絕穀昇仙不食法取松實搗為膏酒調下三錢

又方服松葉令人不老身生綠毛輕身益氣久服不已絕穀
不飢渴松葉不以多少細切更研每日食前以酒調下
亦可將汁服之
又方
治牙齦腫痛齒根暗黑
又方
治一切
神仙銅松實用七月取松實過時即落
收去木皮搗碎每服如雞子大日三服

高郵軍槐實



槐實味苦酸鹹寒無毒主五內邪氣熱止涎唾補絕傷

五痔火瘡婦人乳癭子藏急痛以七月七日取之擣取

汁銅器盛之日煎令可作丸大如鼠屎內竅中三易乃

愈又墮胎久服明目益氣頭不白延年

枝主洗瘡及陰囊下濕痒

皮主爛瘡

根主喉痺寒熱生河南平澤可作神燭

景天為之使

相連多者為好十月已日採之新益咸合泥百日皮爛為水核如大

百服之令腦滿駭不而長生今更與有此云七月取其子未堅及

搗絞取汁

大風癢時甚效槐耳味苦辛平無毒主五痔心痛婦人陰中瘡痛槐

樹節也常取堅如桑子者枝炮製止蝎毒

論云槐子日主治大熱難產皮煮汁淋陰囊墜腫氣痛又云槐白皮

味苦無毒能主治口齒風疳腫血以前漿水煮含之又煎林浴男子陰

疝如腫

如茶明目除熱淚頭腦心背間熱風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉

養養如船車上者花堪染黃子上房七月收之染皂木為女長毛髮

日華子云槐子治丈夫女人陰瘡濕痒催生香七粒又云槐皮草治

中風皮膚不仁喉痺浸洗五痔并一切惡瘡婦人產門痒痛及湯火

圖經曰

槐實生河南平澤今更與有之其木有極高

長肉消癰腫

槐實合夜開者名守宮槐葉細而青綠者但謂之槐其功用不言有

別四月五月開花六月七月結實七月七日採嫩實擣取汁作煎十

月採老實入藥皮根採無時今醫家用槐者最多春採嫩枝服為黑

灰以搗齒去蚰蝻青枝取漚以塗癬取花之陳久者篋末飲服以治

下血精取嫩房角作湯以當者主...
齒及下血水吞黑子以變白...
五痔脫肛等皆常用有殊效者...
上巴日取槐子去皮內新鹽中...
日十枚還從一枝始大良劉禹...
痔法以槐枝濃煎湯先洗痔便...
西川安撫使判官乘驛入駱谷...
貴於腸頭熱如塘灰火至驛僵...
差及命所使作槐湯洗款瓜上...
入陽中因大轉瀉先血後穢時...
至痛焚瀉後遂失胡瓜所在登...
而馳

雷公云 凡採得後去單子并五子者只取兩子三子者凡食
使用銅鏈提之令破用烏牛乳浸一宿蒸過用

療 主邪氣產難絕傷春初嫩華
亦可食主癰癤牙齒諸風疾

如棗許正發和水服若不
止飲熱水一外細虫出

千金方 療胎赤眼取槐木枝如馬鞍
大長二尺作二段齊頭麻油

一匙置銅鉢中且使童子一人以其木研
之至暝止令仰卧以奎向眼背日三度差

內銅器中盛宅中高門上曝之二十日已上煎
成取鼠糞大內穀道中日三亦主瘦百種瘡

身輕三十日白髮黑百日内通神

又方 治九種心痛當大歲上
取新生槐枝一握去兩

又方 治鼻氣室塞以水五外煮槐葉
取三外下葱豉調和再煎飲

肘後方 治內瘡用槐白皮精丸
綿裹內下部中得効

百一方 治中風身直不得屈伸反
覆者取槐皮黃白者切之

以酒或水六外煮取二外
去滓適寒溫雜服之

經驗方 洗痔上便以艾炙之七壯
又

梅師方 治崩中或赤白不問年月遠
近取槐枝燒灰食前酒下方

又方 治痔有蟲咬殺道痒或下膿血多取槐白皮濃煮汁安盆
坐湯之虛其殺道令更殘良久欲大便當出不過三度

食醫心鏡 治野雞痔下血腸風明目方
斤蒸如造灸法取葉碾作末如茶法煎

廣濟方 療牙齒疼痛取槐樹白
皮一握切以醋一外煮

必効方 療陰瘡及濕痒槐樹北而不見日處
大槐水二外煮取一外洗之三

張文仲 療腸痔方槐樹上耳搗末米飲服
方寸匕日三又槐白皮一擔剉以

傷寒類要 大熱心悶者槐子
燒末酒服方寸匕

子母

秘錄 日月未足而欲產者槐樹產寶 產寶 產前中不止不問年月遠近方掘耳燒作灰為末以酒服方

太清草木方 槐者虛星之精以十月巳日採子服之去百病長生通神

衍義曰 槐實止言實今當分為二實本出夾中若槐夾作煎者當言夾也夾中子大如豆堅而紫色者實也今本條不析出

夾與夾中子蓋其用各別皆疎道可風熱

槐膠主一切風化涎治肝藏風筋脉抽掣及急風口噤

或四肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或破傷風口眼

偏斜腰脊強硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煮

和諸藥為丸及作湯下藥 新定

槐花味苦平無毒治五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及熱治

皮膚風并腸風瀉血赤白痢並炒服葉平無毒煎湯治

小兒驚癇壯熱疥癬及子腫皮莖同用 新補見 圖經 具

簡要濟眾 治婦人漏下血不絕槐花搗不以多 少燒作灰細研食前溫酒服二錢匕

衍義曰 槐花今染家亦用收時折其未開花者一沸出之釜中有 所渣下稠黃滓滓瀝為餅染色更鮮明治腸風熱瀉血甚

過不可

茂州枸杞



枸杞味苦寒根大寒子微寒無毒主五內邪氣熱中消

渴厚痺風濕下脊脅氣客熱頭痛補內傷大勞噓吸

堅筋骨強陰利大小腸及服堅筋骨輕身不老耐寒暑

一名杞根一名地骨一名枸杞一名地輔一名羊乳一

名却暑一名仙人杖一名西王母杖生常山平澤及諸

丘陵阪岸冬採根春夏採葉秋採莖實陰乾

堂邑而石頭烽火樓下最多其葉可作羹味小苦俗謔云夫家千里

勿食雞摩枸杞此言其補益精氣強盛陰道也藤摩一名苦丸葉厚

大伴藤生編之有白乳汁人家多種之可生吸亦蒸煮食也枸杞根

實為服食家用其味甚美仙人之杖遠有百子

云杞一名枸杞郭云今枸杞也詩四牡云集于苞杞陸機云名苦杞否

地骨春生作羹茹微苦其莖似苧子秋熟正赤莖葉及子服之輕身

益氣論云枸杞子藥同滋味且平能補益精諸不足易顏色變白明

目安神令人長壽榮和羊肉作羹益人甚除風明目若渴可煮作飲

代茶飲之白色無刺者良明乳酪相惡發熱諸毒煩悶可單煮汁解

之能消熱毒又根皮細刺者熟煮吞之主治腎家風良又益精

氣法取單上蟲穿子暴乾為末入乳腫黃中為丸益陽事主患眼風

障赤膜昏痛取藥搗汁注眼中沙

五勞七傷壯心氣去皮膚骨節間風消熱毒散瘡腫即枸杞也

經曰 枸杞生常山平澤及丘陵阪岸今處處有之春生苗葉如石

榴葉而較薄嫩食俗呼為甜菜其莖幹高三五尺作叢六月

生小如檉花而便結實形微長如棗核其根名地骨春夏採

其莖似苧子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣淮南枕中記著西

河文子服枸杞法正月上寅採根二月上卯治服之七月上辰採莖

八月上巳治服之五月上午採葉六月上未治服之十一月上子採

二月上酉治服之九月上戌採子十月上亥治服之十一月上子採

其功並等今人相傳謂枸杞與枸棘二種相類其實形長而枝

刺者真枸杞也圓而有刺者枸棘也枸棘不堪入藥而下品瘦音

林高又許白皮其子七月八月熟似枸杞子味甘而兩兩相並今

云難相似然瘦疏有刺枸杞無刺以此為別是三物相似而二物

不刺瘦疏亦有巨骨之名如枸杞謂之地骨當亦相類用之百細

神良世傳蓬萊縣南丘村多枸杞高者一二丈其根蟠結甚固故

亦人多壽考亦飲食其水土之品使然耳潤州寺大井傍生枸杞

亦歲久故土人目為枸杞并云飲其水甚益人瘦疏生熊耳川谷

田野白墟地四月採古今方書鮮見用者當亦難別耳又按枸杞

生子昔嘗餌之此役地息意滋味成人有薦嘉蔬者此物存焉
 為喬公唱言其功時東萊王仲烈亦同放聞之喜而甘心食之旬
 五日行人有言謂知蔡者謂喬公曰此白棘也仲烈遂疑曰吾亦
 嘗其味甘喬公信是言乃譏予子因作觀王篇按此仙人杖作菜茹
 可藥似苦昔白棘木類何因相似而致疑如此或曰喬公所謂白棘
 是拘棘拘棘是拘杞之有針者而本經無白棘之別名又其味苦
 人枝味甘設疑為拘杞之有針者而非甘物乃知草木之類多而難
 人惑疑似之言以真為偽失青黃甘苦之別而至於宜乎子
 雷公云 後待乾破去心用熟甘草湯浸一宿然後焙乾
 其根若似物命形狀者上春 食療 寒無毒葉及子並堅筋能去虛
 食葉夏食子秋冬食根并子也 除風補益筋骨能益人去虛
 湯藥主去腎熱消渴華和羊肉作羹尤善益人代茶法煮汁飲之益
 湯藥能去眼風痺赤膜搗葉汁點之良又取洗去泥和麩拌作飲
 去良又益精氣 聖惠方 拘杞子酒主補虛長肌肉益顏色肥
 二斗研搗勿碎浸七日漉去滓飲之初 千金方 拘汁含之
 以三合為始後即任性飲之外臺秘要同 拘杞子取肥者二外搗破以
 方 治肝虛或當風眼淚等新病方拘杞子取肥者二外搗破以
 方 治虛勞客熱用拘杞根末 調服有固疾人不得喫

肘後方

治大赫瘡此患急宜防毒氣

又方

療目動生瘡

洗日五

又方

大食為肉生狂方忽鼻頭燥眼赤不食避人驚身皆
 以蓋塗其鼻筋 經方 金釵煎拘杞子不計多少逐日取換煎如
 紙之則飲食矣 經方 煎者去燥帶子揀令潔淨便以無灰酒於
 淨器浸之須是常用酒浸以兩月為限用蠟紙封閉緊密每令透氣
 候日數足漉出於新竹器內盛貯旋於沙盆中研令爛細然後以細
 布濾過候研漉皆畢去滓不用即并煎濃酒及濾過藥汁攪勻量
 銀鈞內多少外斗作膏次慢火熬成膏切酒不住手用物攪恐乾底
 不勻候稀稠得所持冷用淨瓶器盛之勿令泄氣每早晨溫酒
 下二大匙頭夜臥服之百日中身輕氣壯積年不廢可以羽化

驗後方

治五勞七傷無事衰弱拘杞藥半斤切瘦米二合以
 輕身拘杞子二外十月壬癸日採採時面東摘生地黃汁三外以
 酒二外於蒸餅內浸二十一日了開封添地黃汁同浸攪之却以紙
 三重封其頭了更浸候至立春前三十日開瓶空心暖飲
 一盃至立春後隨曠却黑勿食燕蕪葱服之耐老輕身無比

備急方

治滿口齒有血拘杞和根苗煎湯
 食後喫又治骨膈風經驗後方同

沈存中方

陝西拘杞長一二丈其圍數寸無刺根皮
 如厚柑甘美異於諸菓生子如櫻桃金少

補神効拘杞

汁點眼立驗

橫暴乾如餅 外臺秘要 療眼暴天行腫痛地骨皮三斤水三斗
煎爛有味 煮取三升絞去滓更內蓋一兩煎取二升

傳目或加 治疽 凡患癰疽惡瘡出膿血不止者取地骨皮不拘多
乾薑二兩 淨洗先刮上面度皮留之再刮取細白膠取後皮

地骨一處煎湯淋洗病令膿血淨以細穰貼之立効有一朝士
間病疽經歲不差人燒灰傅貼之初淋洗出血一二外其家人輩

欲止病者曰疽似少寬更淋之再用五升許 血漸淡遂止以細穰貼之次日結痂遂愈

別說云 枸橼亦非其物今按諸文所說名極多故使人疑然此物
用甚衆花小而紅紫色採時七月上申日圖經所說實

長而枝無刺者真枸橼也此別是一種類必多根而致疑又用根去
上浮麁皮一重近白者一重色微紫極薄陰乾治金瘡有神

衍義曰 枸橼當用梗皮地骨當用根皮枸橼子當用其紅實是一
物有三用其皮寒根大寒子微寒亦三等此正是孟子


謂性由杞柳之杞後人仿勢分別又為之枸橼故強生名耳凡杞未
有無棘者雖大至有亦然亦有棘但此物小則多刺大則少刺

如酸棗及棘其實皆一也今人多用其子直為補 腎藥是曾未考究經意當量其虛實寒熱用之

栢實



乾州栢實



密州側栢

栢實味甘平無毒 主驚悸安五藏益氣除風濕痺癢恍

惚虛損吸吸歷節腰中重痛益血止汗女服令人潤澤

美色耳目聰明 不飢不老輕身延年生太山谷栢葉

尤良○栢葉味苦微溫無毒主吐血衄血崩中赤白

輕身益氣令人耐寒暑去濕痺止飢四時各依方面採

陰乾。柏白皮主火灼爛瘡長毛髮。壯補及桂瓜子為之使。

翅陶隱居云柏葉實亦為服餌所重服餌別有法柏葉實有當以大

山為佳並忌取塚墓上者雖四時俱有秋夏為好其脂亦入用此云

惡類人有以釀酒無妨恐酒米相和異單用也。唐本注云柏枝節黃

以釀酒主風痺麻節風燥取諸瘡痂疥及癩瘡良今子人惟出陝州

宜州為勝太山無復採者。蜀本注云此用偏葉者

今所在皆有八月收子葉餘無時。論云柏子人君惡菊花生畏

羊蹄草味甘辛能治脾胃中冷膀胱冷膿宿水與腸道益壽去頭風

治百邪鬼魅主小兒驚癇。又云側柏葉君與酒相宜止尿血味苦辛

性溫能治冷風麻節疼痛。目華子云柏子人治風潤皮膚此是側柏

子入藥微妙用。又云柏葉炙罾凍瘡燒取汁塗頭黑潤髮。又云柏

白皮。圖經曰柏實生泰山山谷今處處有之而乾州者最佳三月

無毒。開花九月結子候成熟收採蒸暴乾春礪取熟入子

用其葉名側柏密州出者尤佳雖與他柏相類而其葉皆側向而生

功效殊別採無時張仲景方療吐血不止者柏葉湯主之青柏葉一把

乾薑三片阿膠一挺炙三味以水二升煮一外去滓別絞馬通汁一

外相和合煎取一升綿漉一服盡之山東醫工亦多用側柏然云性

寒止痛其方採葉入日中濕漉令極爛如泥冷水調作膏以治大人

及小兒湯湯火燎塗傅於傷處用帛子繫定三兩日瘡當斂仍滅癩

又取華焙乾為末與川黃連一味同煎為汁服之以療男子婦人小兒

大腹下黑血茶脚色或膿血如液色所謂蠱痢者治之有殊效又龍

雷公云凡使先以酒浸一宿至明漉出曬乾即用黃精白

於常拍也。然汁於日中煎手不住攪若天久陰即於釜中著

水用瓶器盛柏子入箸火緩緩煮成煎為。又云凡使勿用花柏葉其

度每煎三兩柏子入酒五兩浸乾為度。叢柏葉有子圓葉其

有子圓葉成片如大片雲母葉葉皆側葉上有微赤毛若苑栢葉其

樹濃葉成孕無子叢栢葉其樹綠色不入藥中用若修事一斤先揀去

兩畔并心枝子用糯泔浸七日後漉出用酒拌蒸一伏時却用黃精

自然汁浸了焙乾又浸又焙待黃精汁乾盡然後用之如修事一斤

用黃精自。聖惠方治時氣瘴疫用社中西南栢樹東南枝取曝乾

然汁十二兩。擣羅為末以水調下一錢匕日三四服肘後方同

又方治大風疾令眉鬚再生用側栢葉九蒸九曝擣羅為末煉蜜

和丸如梧桐子大日三服夜一服熱水下五九十九日即生

又方治憂悲嘔血如滿少氣胃中疼痛用栢葉。又方小兒嘔啼

不乳食大便青白色用栢。經驗後方治霍亂轉筋先以煖物裹脚

子人末溫水調下二錢。然後以栢樹木細剉煮湯淋之

又方小兒洞下痢。梅師方治中熱油及火燒瘡以栢白。孫真

黃栢葉服之。皮猪脂煎塗瘡上鬼遺方同。孫真

人食忌。生幾方取栢葉陰。孫真人枕中記採栢法當以

乾作末和油塗之。三月四月採新

手卒

二

生松葉可長三四寸許并花葉取細葉末其葉取深山
 谷中採當年新生可長三二寸者陰乾細搗為末用白蜜丸如小豆
 大常以月一十五日日出時燒香東向手持藥八十一丸以酒下
 服一年延十年命服二年延二十年命欲得長肌肉加大麻巨勝欲
 心力壯健者加茯苓人參此藥除百病益元氣添五臟六腑清明耳
 目強壯不衰老延年益壽神驗用七月七日露水丸之更佳服時乃
 呪曰神仙真藥體合自然服藥入腹天地同
 年呪訖服藥漸諸雜肉五辛最忌慎之
姚氏方 治鼠瘦腫核
 拍葉傳著腫上熱鹽著
抱朴子 漢成帝時獵者於終南山見一人
 腫上破令熱氣下即消
 飛乃密伺其所在合圍取得乃是一婦人問之言我見秦之宮人開
 東賊至秦王出降驚走入山飢無所食泊欲餓死有一老公教我喫
 松拍葉實初時苦澁後稍便契遂不復飢冬不
 寒夏不熱此文是秦人至成帝時三百餘載也
列仙傳 赤松子好
 落更
別說云 謹按陶隱居說拍取坂墓上者今云出乾州者最佳
 生 則乾州拍茂大者皆乾陵所出他處皆無大者但
 取其州土所宜子實氣味豐美可也乾陵之拍異於他處其木未有
 無文理者而其文多為菩薩雲氣人物鳥獸狀極分明可觀有盜得一
 株徑尺者可直萬錢開陝人家多以為寶宜其子實最佳也又以其
 枝節燒油膏傳惡瘡久不差者蟲者牛馬畜產有瘡疥名為重病以
 傳之三五次
 無不愈也

衍義曰 拍取諸以療馬瘡疥今未見用松諸者老人虛松拍子仁
 大麻子人松子人等分同而溶白臘丸桐子大以少黃丹
 湯服二三十丸食前嘗官吹西每食高望之雖千萬株皆二西拍蓋
 此木為至堅之木不畏霜雪得木之正氣他木不逮也所以受金之
 正氣所制
 故二向之

西京茯苓

兗州茯苓



茯苓味甘平無毒主百病逆氣憂悲驚邪恐悸心下

結痛寒熱煩滿逆口焦舌乾利小便止消渴好睡大

腹淋瀝膈中痰水水腫淋結開胃腑調藏氣伐腎邪

長陰益氣力保神守中久服安魂養神不亂延年一名茯

菴其有抱根者名茯神○茯神平主辟不祥療風眩風虛

五勞口乾止驚悸多悲怒善忘開心益智安魂魄養精

神生太山山谷大松下二月八月採陰乾馬間為之使得甘

其素門又其毒五藏惡白缺畏牡蒙地榆雄黃秦芫龜甲陶隱居云

按藥無馬間或長馬莖聲相近故也今出鬱州彼土人乃假研松作

之形多小虛亦不佳自然成者大如三四外器外皮黑細皺內堅白

形如鳥獸龜鼈者良作丸散者皆先煮之兩三沸乃切暴乾白色者

補赤色者利浴用甚多仙經服食亦為至要云其通神而致靈和氣

而煉服明察而益肌厚腸而開心調榮而理胃上品仙藥也善能斷

穀不創為藥無朽蛀嘗掘地得昔人所埋塊計應三十許年而色理無

異明其真今不朽矣其有偷松根對度者為茯神是其次按苓後結

一塊也仙方惟云茯苓而細按神為瘡既同用之亦應無嫌陶隱居

云季氏本草云馬刀為茯苓使無名馬間者間字草書似刀字寫人

不識計為間陶陶不悟云是馬莖謬矣今太山亦有茯苓白實而塊

小而復採用第一出華山形極龐大雍州南山亦有不知華山者

枯松樹下形塊無定以似人龜鳥形者今所在有人松處皆有惟

華山最多陶隱居云茯苓出崑崙三輔淮南子云下有茯苓上有菟絲

云茯苓入地千歲為茯苓望松樹赤者下有之廣志云茯苓汁

所作勝茯苓或曰松根茯苓貴著之生朱提漢陽陶隱居論云茯苓

臣忌米醋能開胃止嘔逆善安心神主肺痿痰壅治小兒驚癇療心

腹脹滿婦人熱淋亦者破結氣陶隱居云茯苓味甘無毒主驚癇安神

定志補勞之生心下急痛堅滿人虛而小腸不利加而用之其心名

黃松節偏治中偏風口面喎斜毒風筋掣不語心神驚悸虛而健志



圖經曰茯苓生泰山山谷今

大松下附根而生無苗華花實作塊如拳在土底大者至數斤似人

形龜形者佳皮黑肉有赤白二種或云是多年松脂流入土中變成

或云假松氣於本根上生今東人採之法山中古松久為人斬伐者

其枯折搯枝葉不復上生者謂之茯苓撥見之即於四面丈餘地

內以鐵頭錐刺地如有茯苓則錐固不可拔於是掘土取之其撥大

者茯苓亦大皆自作塊不附著根止其抱根而輕虛者為茯神然則

假氣而生者其說勝矣二月八月採者良皆陰乾史記龜策傳云伏

靈在蕙然之下狀如飛鳥之形新雨已天清靜無風以夜稍或作燒

葛絲去之即購燭此地籍音轉世蓋然火而籠罩其上過火滅即
記其處以新布四丈環置之明乃掘取入地四尺至七尺得矣此類
今固不聞有之神仙方多單餌之其法取白茯苓五斤去黑皮搗篩
以熟絹囊盛於三斗米下蒸之米熟即止暴乾又蒸如此三過乃取
牛乳二斗和合著銅器中微火煮如膏收之每食以竹刀割取隨性
任飽服之則不飢如欲食先煮葵菜汁飲之任食無礙又茯苓乾蒸
云取白茯苓三十斤山之陽者甘美山之陰者味苦去皮薄切暴乾蒸
之以湯淋去苦味淋之不止其汁當甜乃暴乾篩末用酒三五蜜三外
相和內末其中并置大瓮攪之百匝封之勿洩氣冬五十日夏二十五
日蘇自浮出酒上掠取之其味極甘美以作餅人如手掌空室中陰乾
色亦如粟飢時食一枚酒送之終日不須食自飽此名神仙度世之法
又服食法以合白菊或合桂心或合木九散自任皆可常服補益
殊勝或云茯苓中有赤筋最能損目若久服者當先將末水中飛澄
熟按去盡赤滓方可服若合他藥則不須爾凡藥有茯苓皆忌米醋
舊說琥珀是千年茯苓所化一名江珠張茂先云今益州永昌出琥珀
而無茯苓又云燒蜂窠所作三說張皆不能辨按南蠻地志云林
邑多琥珀云是松脂所化又楓脂為之彼人亦不復知地中有琥珀
如桃膠久乃堅疑其方人以為枕然
雷公云凡採得後去皮心
古今相傳是松類故附於茯苓耳
聖惠方治而研炮及
盆中攪令濁淨者去之是茯苓筋若誤服之
令人眼中童子并黑睛點小兼盲目甚記之

後方姚氏藥點茯苓亦白
經驗後方
後方姚氏藥點茯苓亦白
經驗後方

神仙服茯苓法
白茯苓去皮酒浸十五日漉出
為散每服三錢水調下日三
宋王微
茯苓齋
抱朴子
孫真人枕中記
義曰伏苓乃樵斫訖多年松根之氣所生此蓋根之氣味壹鬱
未絕故為是物然亦由土地所宜與不宜其津氣盛者方
血於外結為伏苓故不抱根而成物既離其本體則有苓之義伏
者其根但有津氣而不甚盛故止能伏結於本根既不離其本故
曰伏神此物行水之功多益心脾不可闕也或曰松既醴矣而根尚
取主物于谷曰如馬穀菌五芝木耳石耳之類皆生於枯木石菌土
一上精與去論安得不為物也其上
信苑終下有茯苓之說其為輕信

琥珀味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血

行義曰琥珀今西戎亦有之其色差淡而明濼南方者色深而
名螺贏蜂蟻宛然完具者是極不然也地里誌云林邑多琥珀寶
 所化耳此說為勝但土地有所宜不宜故有能化有不能化者
 以光又為琥珀室所作不知得於
 何處以手擊之可以捨芥餘如經

擊切分味甘平無毒古來相傳云松脂千年為茯苓之
 千年為琥珀又千年為鑿然二物燒之皆有松氣為用
 與琥珀同補心安神破血尤善狀似玄玉而輕出西戎來
 而有茯苓處見無此物今西州南三百里磧中得者大
 則方尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名為木鑿謂玄玉
 為石鑿洪州土石間得者燒作松氣破血生肌與琥珀
 同見風折破不堪為器量此二種及琥珀或非松脂所
 為也有此差舛今略論也新見陳藏器蘇於琥珀注後出
 唐本陳藏器鑿功狀按鑿本功

外小兒帶之辟惡
 磨滴目醫赤障等
 車輪未服之攻婦
 人小腸癥瘕諸疾

太平廣記梁四公子傳曰交河之間平磧中掘
 深一丈下有擊珀黑逾純潔或大如

秦州榆皮



榆皮味甘平無毒主小便不通利水道除邪氣腸胃

邪熱氣消腫性滑利又服輕身不飢其實尤宜療小兒

頭瘡痂疔

花主小兒痢小便不利傷熱一名愛榆生潁川山谷二月採

皮取白暴乾八月採實並勿令中濕濕則傷人此即今榆

樹剥取皮刮除上赤皮亦可臨時用之性至滑利初生英人以作糜羹令人多睡公所謂榆令人暝也斷穀乃屑其皮并擗皮服之即令人不飽陳藏器云榆三月實熟尋即落矣今稱八月採實恐本經誤也

收實作醬似蕪美殺蟲以陳者良嫩葉作羹食之壓丹石消水腫江東有刺榆無大榆皮入用不滑刺榆秋實故陶錯誤也目

刺如拓其葉如榆蓋為蔬美滑於白榆詩云山有樞是也論云榆白皮滑能主利五淋治不眠齋齋取白皮陰乾後焙研為末每日朝夜用水五合末二錢煎如膠服差論云生皮主暴患赤腫以皮

三兩搗和三年醋滓封之日六七易亦治女人妬乳腫服丹石人採葉生服一兩頓佳子作醬食能助肺殺諸蟲下氣令人能食消心腹

間惡氣卒心痛食之良圖經曰榆皮生傾川山谷今處處有子云榆白皮通經脈涎傳藥彙今無復食者惟用陳者實作醬耳然榆之類有十數種葉皆相似似似皮又木理有異耳白榆先生葉知著莢皮白色剝之刮去上麤

取白暴乾四月採實並勿令中濕榆皮荒歲農人食之以當糧不損

取白暴乾四月採實並勿令中濕榆皮荒歲農人食之以當糧不損

人食療生榆皮利小便王石淋又取華煮食之時復食一頓木仙家長服服丹石人亦食之取利開節故也又榆人可作醬食之亦甚香美有少辛味能助肺氣殺諸蟲下氣令人能食又心腹間惡氣

內消之藥者尤良又塗諸瘡癩妙又卒患冷氣心痛食之差并主小兒痢小便不利外臺秘要治渴小便

榆皮二片去黑皮以水一劑千金方五色丹俗名油腫若犯多致

煮取五外一服三合日三服千金方死不可輕之以榆白皮末和

雞子白千金髓皮熱備急方瘡身腫暴腫滿榆皮末和

利小便子母秘錄下胎榆白皮煮汁服二外又方小兒白禿

皮末醋和塗楊氏產乳療身腫及頭悉生瘡取榆白皮炒令黃搗

之蟲當出出即穉叔夜養生論云願別說云謹按榆白皮焙乾為末婦人姓

易墜下兒身尚皆塗之信其驗也又濕搗治如糊用粘衍義曰榆皮今初春先生夾者是去上嫩蓋乾枯者將中開撒處

為美加嘉嘉年過豐沛人關食鄉民多食此

酸棗



酸棗味酸平無毒主心腹寒熱邪氣聚四肢酸疼濕痺

煩心不得眠膈上下痛血轉久洩虛汗煩渴補中益肝

氣堅筋骨助陰氣令人肥健久服安五藏輕身延年生

河東川澤八月採實陰乾四十日成惡防已陶隱居云今出

子似武昌棗而味極酸東人以醒睡與此療不得眠正反灸厚李
注云此即楸音或棗實也樹大如大棗實無常形但大棗中味酸者
是本經惟用實療不得眠不言用人今方用其人補中益氣白補中
益肝已下此為酸棗人之功能又於下品白棘條中復云用其實今

醫以棘實為酸棗大說今陶云醒睡而經云療不得眠蓋其子肉

味酸食之使不思睡核中人服之療不得眠正如麻黃發汗振節止

其核中人微痛大棗人大而長不類也臣禹錫等謹按蜀本圖經云

河東及滑州以其木為車軸及匙筋等木甚細理而硬所在有之

月採實日乾藥性論云酸棗人主筋骨風炒末作湯服之陳藏器云

預酸事既足棗中之酸更無代異此即貞棗何復名酸既云其酸又

未離於棗若道棗中酸者處條無令晒之功道棘子不酸今人有眾

呼之曰棗棘一也酸胡兩焉竊令以棗當之終其非也嵩陽子曰奈

家于滑臺今酸棗將即滑之屬邑也其地名酸棗焉其樹高數丈徑

圍一二尺木理極細堅而且重其樹皮亦細文似蛇鱗其棗圓小而

味酸其核微圓其人稍長色赤如丹川醫之所重居人不易得今市

之賣者皆棘子為之又云山棗樹如棘子如生棗裏有核如骨其肉

圖經曰

酸棗生河東川澤今近京及西比州郡皆有之野生多在坡坂及峻

壘間似棗木而皮細其木心赤色莖葉俱青花似棗花八月結實紫

色似棗而圓小味酸當月採實取核中人陰乾四十日成爾雅棗

棗之種類曰實小而酸曰棘棗孟子曰養其棘棗地歧注所謂酸棗

是也一說惟酸棗將出者為真其木高數丈徑圍一二尺木理極細

止洩痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡療驚氣在皮間肌

膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神根

心腹百病安魂魄不飢渴久服輕身延年通神生漢中

山谷及永昌惡乾漆陶隱居云今出邵陵者輕薄色深為勝出東

服之及有一種小樹狀如石櫛其根於道家入木芝品今人不知取

又一種小樹多刺皮亦黃亦主白瘡云子藥一名山石櫛子

似女貞皮白不黃亦名小藥所在有今云皮黃恐謬矣按今俗用子

藥皆多刺小樹名刺藥朴小藥也陳藏器本草云藥皮主熱瘡

起蟲瘡瘡下血殺蟲煎服主消渴黃蘗樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫栝皮黃其根如松下茯苓今所

紅有平出房商合等州山谷緊厚二三分鮮黃者上二月五月採

皮日乾黃蘗使平男子陰痿治下血如雞鴨肝片及男

子莖上瘡屑未傅之云安心除勞治胃蒸洗肝明目多淚口

乾心熱殺疔虫治婦人痛疥癩瘡治鼠耳眼風瀉血後分急熱腫

痛身皮力圖經曰以酒中者為上品及水引今有之

微於根經考不於外白裏色如去酸暴出用其根名檀桓准南

三枚大棗七枚和膏湯洗而乃塗藥四五日光澤矣唐韋宙獨

方主卒消渴小便多黃蘗一斤水一斗煮三五沸渴即飲之恣意

飲日使止別有一種多刺而小如藥者名刺藥不入藥用又下品有

小藥條木如石櫛皮黃子赤如枸杞兩頭尖人刺以海黃今醫家亦

用雷公曰凡使用刀削上屨皮了用生蜜水浸半日瀝出曬乾

兩外臺秘要口中及舌生瘡千金方治小兒重舌以黃蘗

肘後方咽喉卒腫食飲不通黃蘗搗傅又方傷寒時氣溫病毒

亦治毒攻陰腫細判黃蘗五斤葛氏方黃蘗洗白蜜塗之

方卒喉痺取黃蘗片切含之又黃蘗一斤又方食自死六畜肉中毒

解再經驗方治嘔血黃蘗好者以蜜塗之乾杵為梅師方治

背或發乳房初起微赤不急治之簡要濟眾治吐血熱極七黃

即熬人搗黃蘗末和雞子白塗之十金傳救治小兒熱瀉用黃蘗削皮後焙碎

火上炙焦搗末每服深師方療傷寒熱病口瘡黃蘗皮削去上屨皮取裏川

二錢溫糯米飲調下飲下薄劑以崖蘗漬之一宿唯欲令濃舍其汁良久

更合若胃中執有瘡時子母秘要錄小兒臍疝不衍義曰今用
 做三五合尤佳聖惠方同皮以蜜勻炙與青黛各一分同為末入生龍腦一字研勻治心脾熱舌頰
 生瘡當搽瘡上有涎即吐又張仲景藥皮湯無不驗傷寒論中已著

滁州楮實




明州楮實

楮實味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不
 飢不老輕身生少室山一名穀實所在有之八月九月採
 實日乾四十日成

重修政和經史證類備用本草

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN. R.O.C.



藥味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡

瘡生肉

樹皮主逐水利小便

莖主癰癤痒單煮洗浴

皮間白汁療癰

和丹用亦乾服使人通神見鬼南人呼穀紙亦

此即今穀音構樹也仙方採擣取汁

樹有二種取有子葉似葡萄者佳八月採實所在皆識也

木皮亦可單用味甘平無毒能治水腫氣滿葉乾妙末搜麩作餅乾

食之主水刑

無曰構日華子云構實壯筋骨助陽氣補虛勞助腰膝益顏色皮斑

者是構皮白者是穀又云構葉涼無毒治刺風身痒此是斑穀樹

云穀樹汁傳與蟲蜂犬咬能

謂之斑穀今人用為冠者一種皮無花枝葉大相類但取其葉似葡

萄葉作瓣而有子者為佳其實初夏生如彈丸青綠色至六七月漸

赤紅色乃成熟八月九月採水浸去皮釀取中子日乾仙方單服其

實正赤時收取中子陰乾末水服二錢匕

乃能

之

一

書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

穀田久廢必生穞藥有醫曰穞無曰穞詩小雅云爰有樹檀其下
 推殺陸機疏云幽州謂之穀桑或曰穞桑荆揚交廣謂之穀江南人
 績其皮以為布又穞以為紙長數丈光澤甚好又食其嫩芽以當菜
 如主四服風痺赤白下痢其藥主鼻洪小品云鼻切數外不斷者取
 穞葉搗取汁飲三外不止再三飲神良久切亦差紙亦入藥見劉禹
 錫傳信方治女子月經不絕來無時者取案帝干張燒灰以清酒半外
 和調服之頓定如冬月即煖酒服葶中血暈服之立驗已穞者去板
 穞布不見有之醫方但貴穞實餘亦稀用俚俗或取其木枝中白汁
 塗癰甚效楊炎南行方治瘴疔無問老少日夜百餘度者取穞搗藥
 二兩熬穞為末煎烏梅湯服方寸匕日
 再服取羊肉裹末內穀道煎出即止
 攪旋投水浮者去之然後曬乾却用酒浸
 伏時了便蒸從已至亥出培令乾用
雷公云 凡使採得後用
 水浸三日將物
聖惠方 治癰濕痒用穞
 藥半斤細切搗
 爛傳
外臺秘要 近効天行後兩脅脹滿臍下
 如水病面腫脚不腫穀穞葉兩以
 水一斗煮取六外去滓內米煮粥喫
 穞作灰待冷細研如麴每
 點於醫上日三五度漸消
又方 頭風白屑如髮糠方豎穞穞
 木作梳六十日一易新者
肘
後方 治卒風不得語對穞枝藥酒
 煮熟皮中沫出隨多少飲之
又方 治少小鼻切小勞輒出
 穞穞藥取汁飲三外不

止四五飲良此
 方久明亦差
經驗後方 煉穀子煎法取穀子五外六月六日
 如鋤即
廣利方 治樹瘡入痛不止方
 穀樹白汁塗之立差
子母秘錄 小兒疳白痢
 又嘔逆方多構華令香黃以飲漿半外浸構華使水綠色然後去
 葉以木瓜一箇切內華汁中煮三三沸去木瓜使煖細細服渴停
朴子 穞實赤者服之老者成少令人夜應徹視見鬼神道士梁
 頓年七十乃服之更壯到百四十歲能夜出行及走馬
楊
堯輔 說患人賦睡穞
 穞穞藥服驗
修真秘旨 服穞實者輒
 為骨軟疾
丹房鏡源
 穞汁搜
 穞砂子

峽州乾漆



乾漆味辛溫無毒有毒主絕傷補中續筋骨填髓腦安

五藏五經六急風寒濕痺療欬消瘀血痞結腰痛女子

疝瘕利小腸去虻蟲

生漆去長蟲久服輕身耐老生漢中川谷夏至後採乾

之半夏為之使畏雞子今又忌油脂... 有廣州漆性急易燥其諸與漆桶上蓋裏自然有乾者狀如蜂房... 畏漆人乃致死外氣亦能使身肉瘡腫自別有療法仙方用蟹消之... 為水練服長生... 油解破滯者難得可重製... 好黃雌若蜂窠者不佳... 花子若牛李木心黃六月... 云乾漆日味辛鹹能殺三... 除風入藥須精研炒熟不... 欲鐵漿并黃蠟汁及... 廿五湯實蟹並可制... 似椿花似櫻子若牛李木... 約古今注曰以剛斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆是也乾漆

舊云用漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔關者今多用筒子內乾者以

黑如堅壁若蠟石為佳漆藥中藥見華佗傳彭城樊阿少師事佗求

服食法佗授以漆葉青粘散方云服之去三蟲利五藏輕身益氣使

人頭不白阿從其言年五百餘歲漆藥所在有之青粘生豐沛彭城

及朝歌一名肥節一名黃芝主理五藏益精氣本出於迷入入山者

見仙人服之以出佗佗以為佳語阿阿秘之近者人見阿之壽而不

力強或怪之以問所服食因醉亂誤誤人服多驗其後無復有人

戰青粘或云即黃精之正者神仙方乃有單服漆法傳於世云

外臺秘要 療蠱蟲心痛惡心吐水乾漆熬 經驗方 治婦人不

氣藏膈疼痛不可忍及治丈夫元氣小腸氣根痛者並宜服二聖丸

草漆一兩為木濕漆一兩先將濕漆入銚子內熬如一食飯間已來

住火與乾漆末一匙拌和丸如半皂子大每服一丸溫酒吞下無時

如元氣小腸膀胱氣痛牙關緊急但幹開牙開溫酒化一丸灌下必

簡要濟眾

治九種心痛及腹背積聚帶氣筒子乾漆

杜壬 治小兒胃寒蟲上諸證危惡與癩

席延賞 治女人經血不行及諸癩癩等病室女萬

抱朴子 內篇

不枯者服之通神長生法或以大蟹投其中或以雲母水或以玉水合之服九蟲悉下惡血從鼻出一年六甲行周至也

子 漆見蟹而不乾

衍義曰

乾漆若濕漆藥中未見用凡用者皆乾漆耳其濕者在燥熱及霜冷時則難乾得陰濕則寒月亦易乾亦物之性也若需漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細而不斷歛而急收起又塗於乾竹上蒸之速乾者並佳餘如經

衡州五加皮

無為軍五加皮



五加皮... 苦溫微寒無毒... 氣復痛益氣...

小兒不能行疳積... 男子陰痿囊下濕小便餘...

女人陰痒及腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中...

精堅筋骨強志意久服輕身耐老一名特漆一名特...

葉者良生漢中及冤句五月七月採莖十月採根...

遠志為之使畏蛇皮女參... 今道與處有東開...

諸亦好者根莖... 家州此作灰亦以煮石與地榆...

秘法... 云云... 云云... 云云... 云云...

小毒能破... 風血四股不遂... 賊風傷人... 數脚...

痰血在皮... 治痺... 內不足... 主虛羸... 小兒三歲不能行... 用此便行...

補五勞七傷... 葉... 皮... 風... 可作蔬... 食... 圖經曰... 五加皮生漢中及...

昔有之春生... 苗... 葉... 俱... 青... 莖... 赤... 莖... 又似... 藤... 蔓... 高三五尺... 上有黑刺... 生... 五... 又作... 葉... 者... 最... 多... 為... 次... 每... 一... 葉... 下... 生... 一... 刺... 三... 四... 月... 開... 白... 花... 結... 細... 青... 子... 至... 六... 月... 漸... 黑... 色... 根... 若... 荆... 根... 皮... 黃... 黑... 肉... 白... 骨... 堅... 硬... 五... 月... 七... 月... 採... 莖... 十... 月... 採... 根... 陰... 乾... 用... 蘄... 州... 人... 呼... 為... 木... 骨... 一... 說... 今... 所... 用... 刀... 有... 鐵... 梅... 京... 師... 比... 地... 者... 大... 片... 類... 素... 皮... 黃... 藥... 筆... 平... 直... 如... 板... 而... 色... 白... 絕... 無... 氣... 味... 香... 風... 痛... 瀕... 效... 餘... 不... 入... 用... 吳... 中... 乃... 剝... 野... 椿... 根... 為... 五... 加... 皮... 柔... 韌... 而... 無... 味... 味... 為...

乖失今江維關所生乃為真者類地骨輕脆芬香是也其苗莖有
 類薔薇長者至丈餘葉五出如桃花香氣如嫩櫻春時結實如豆
 而扁春青得霜乃紫吳中亦多俗名為追風使亦曰刺通刺取
 漬以療風乃不知其為五加皮也江淮吳中往往以為藩籬正
 藏金櫻華一如上所說但此間多不知用此
 種耳亦可以釀酒飲之治風痺四肢痺急
 者治眼腫人搞
 末酒調服自正
 雷公曰 蒲葉者其葉三花是雄五葉花是雌剥皮
 陰乾陽人使陽外臺秘要 治服諸藥石後或熱多向冷地卧又不
 陰陰人使陽外臺秘要 得食諸熱酒等方五加皮二兩以水
 外煮取二升半候石發 楊氏產乳 療驚丹從兩脚赤如火燒五加
 之時便服未定更服
 中水和
 東華真人煮石經 用便息正道此乃五加也又異名曰
 金盞昔西域真人王屋山人 言何以得長久何不食石經
 母何以得長壽何不食石經 王政王政者即地榆也五加地榆皆
 煮石而解得長生之藥也昔尹公度開孟綽子董士因共相與言
 曰寧得一把五加不用金玉 寧得一斤地榆不用日月
 定公 母單服五加神效 子世等言服此而所生不絕
 壽三百年有子二十人 然也大有君謂九加二
 可勝計或只為微以

又有五市之星精也金應五州人應五德位應五方物應五車故青
 花入華則有東方之液白氣 節則有西方之津赤氣入華則有南
 之光玄精入根則有北方之松黃燧入皮則有戊己
 之靈五神鎮生相轉育成用之者真仙服之者反嬰也

蜀州牡荊



牡荊實味苦温無毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下
 氣生河間南陽冤旬山谷或平壽都鄉高岸上及田野中
 八月九月採實陰乾 得水抽實青補共療頭風防風為之使恐
 石膏 云河間冤旬平壽並在北南

陽在西論蔓荆即應是今作杖尾之州而復非見其子殊細正如小
附子色青黃荆子質小大如比也杜荆子及出北方如烏巨大正圓
無刺多用杜荆今人都無識之者李當之藥錄乃注波疏下云波
色味甘苦冬月熟各仍無識者當此實是莫非人籬域陽盧也按如
此說波疏主瘰癧與杜荆都不同其形類乖異恐乖實理而仙方用杜
荆云能通神見鬼非惟其實乃枝葉並對又云有荆樹必枝枝相對此
是杜荆有不對者即非杜荆也為杜荆則不應有子如此並莫詳虛實
云更博訪乃詳之爾唐公注云此即杜荆也實細黃色蔓荆作
為幅竿此則明蔓不堪為竿今所注皆有此荆既非本經所載按今
生處乃是蔓荆將以附此條後固為誤矣別錄云荆葉味苦平無毒
王久刺霍亂轉筋血淋下部瘡濕蠱薄脾主胸氣腫滿其根味甘苦
平無毒水煎服主心風頭風肢體諸風解肌發汗有青赤二種以青
者為佳出類聚方今人相承多以杜荆為蔓荆此極誤也
蓋本草云荆木取莖截於火燒以物承取煎飲之六心門類聚頭
風黃荆也枝葉如杜荆子大如豆九月採實陰乾此
花之作種實細而香如麻子大如豆九月採實陰乾此
花之作種實細而香如麻子大如豆九月採實陰乾此

神見鬼精注大尋荆有三種直云荆木即是今可作簞杖者葉
有花子子不入藥方術則用荆荆子入藥北方人略無識
者六甲陰符說一名羊墟一名空疏理白而中虛漸植即生今
所植亦生而花實微細藥家所用者天監三年上將合神仙飯
論杜荆曰荆花白多子子魚人歷歷疎生不過三兩莖多不能
編或異或多似竹節葉與餘荆不殊蜂多採杜荆荆汁冷而甜
荆被燒則煙火氣苦杜荆體瘦汁實煙火不入其中主右心風
于時即遠近尋覓遂不值猶用荆葉今之所有者云崔元亮集
治腰脚蒸法取荆葉不限多少蒸令熟熱置於釜中其下著少
使以綿衣蓋避風仍進葱或酒及豆酒並得以差為度又取此
條截於火上燒之兩頭以器承取煎飲之
目收心中養養欲吐卒失音小兒
心熱驚瀉止消渴除痰令人不睡
聖惠方 治濕癩瘡方用荆
臺秘要 限多少服集驗方同
千金方 療九竅出血方用荆
方 治心虛驚悸不定癯瘦方荆瀝二外以火煎
至一外六合分服四合日三夜一集驗方同
千金翼 治瘡
方取荆瀝 稍稍煎之
肘後方 療目卒痛瘡荆
木出黃汁作之
又方 姚氏下赤白痢五六年
五六合 又方 蛇毒荆葉袋
即得差 深師方 取汁傳之
姚和衆 兒

五六合 又方 蛇毒荆葉袋
即得差 深師方 取汁傳之
姚和衆 兒

通耳方取蟲食荆子中白粉和油滴耳中日再之

眉州蔓荆



蔓荆實味苦平微寒平溫無毒主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利久數去白蟲長蟲主風頭痛腦鳴目赤出益氣久服輕身耐老令人光澤而緻音小荆實亦等

張烏石膏陶隱居云小荆山應是牡荆牡荆子七於蔓荆一而反

荆實今人呼為牡荆子者是也其蔓荆子大故呼牡荆子為小荆實亦等者言其功用與蔓荆同也蔓荆苗蔓生故名蔓荆生水濱葉似小葉而細莖長丈餘花紅色今人誤以小荆為蔓荆遂將蔓荆子為牡荆子也音注云今據陶匪惟不別蔓荆亦不知牡荆爾以理推之即蔓生者為蔓荆作樹生者為牡荆蔓生者大如梧子樹生者細如麻子則牡荆為小荆明矣圖經云蔓荆蔓生水濱苗莖蔓延春因舊枝而生小葉五月葉成如杏葉六月有花淡紅也藥黃九月有實黑如天如梧子而虛輕冬則葉凋藥論云蔓荆子目治賊風能長鬚髮音云利關節治赤眼痼疾注云蔓荆實舊不載所出州土今近京及秦隴明越州多有之苗莖高四尺對節生枝初春因舊枝而生葉類小棟至夏盛茂有花作穗淺紅色藥黃白色花下有青萼至秋結實斑黑如梧子許大而輕虛八月九月採一說作蔓生故名蔓荆而今所有並非蔓也唐本

注長 雷公云一伏時後蒸從已至未出曬乾用

衍義 曰蔓荆實諸家所解蔓荆牡荆紛紜不一經既言蔓荆明知是蔓生即非高木也既言牡荆則自是木上生者况漢書

郊祀志所言以牡荆莖為幡竿故知蔓荆即子大者是又何疑焉後有藥荆此即便非牡荆也子青色如菜萼不合更立藥荆條故文中云本草不載亦無別名但有藥花功用又別斷無疑焉注中妄稱石荆當之其說轉見穿鑿

辛夷



辛夷味辛溫無毒主五藏風寒頭痛面黥濕

中解肌利九竅通鼻寒涕出治面腫引齒痛眩冒身兀

兀如在車船之上者生鬚髮去白蟲及服下氣輕身明

目增年齒老可作膏藥用之去心及外毛毛射人肺令

八款一云辛夷一名桃一名房木生漢中川谷九月

採實暴乾其葉為之使五石脂畏呂蒲蒲黃藜連石膏黃環

所呼辛夷者唐本注云此其樹花未開時收之正月二月好採今見

用者其九月採實者恐誤其樹大連合抱高數仞葉大於柿葉所

在皆有實臭不任藥也方云去毛用其心然難得而滋人面此用花

開者易得而日香也唐藏器本草云辛夷今時所用者是未發

花時如小桃子有毛未取之所云用花開者及在二月此殊誤

爾此花江南地暖正月開地寒二月開初發如筆扎人呼為木筆

其花最早南人呼為迎春唐本注云此其樹高數仞葉

似柿葉而狹長正月二月花似著毛小挑色白而帶紫花落而無子

夏抄復著花如小筆又有種三月花開四月花落子赤似相思子

花葉與無子者同取花欲開者勝所在山谷皆有此二種今苑中有

樹高三四丈花葉一如圖經所說但樹身徑二尺許去根三尺已來

便有枝柯繁茂可愛正月二月花開紫色花漸大如有毛小挑至來年正月二月始

生花如小筆經秋歷冬葉花漸大如有毛小挑至來年正月二月始

開初是興元府進來其樹緣可三四尺有花無子謂之木筆花樹種

經二十餘載方結實以此推之即是年歲淺者無子非有二種也其

花開早晚應各隨其土風爾唐本注云辛夷臣能治面生黥面脂

用主光華唐本注云通關脉明目治頭痛憎

寒體瘰癧瘰癧入藥微炙已開者劣謝者不佳

圖經曰辛夷生漢中

有之人家園庭亦多種植木高數丈葉似柿而長正月二月生花似

著毛小挑子色白帶紫花落無子至夏復開花初出如筆故北人呼

為木筆花又有一種枝葉並相類但歲一開花四月花落時有子如

相思子或云都是一種經一二十年老者方結實其花開早晚亦

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

不一

隨南北節氣寒溫九月採實暴乾用或
 云用花葉編者良已開者劣謝者不佳
 即以芭蕉水浸一宿漚出用漿水蒸後已至未出
 焙乾用若治眼目中患即一時去皮用向裏實者
 從文經辛夷車芍結桂煇注辛夷香草也言山鬼出入
 乘赤豹從神狸結桂與辛夷以為車旗言有香紫也
衍義曰 辛夷花後葉即木筆花也最先春以具花未開時其花
 苞有毛光長如筆故取像曰木筆有紅紫二本一本如桃
 花色者一本紫者今入藥當用紫色
 者仍須未開時收取入藥當去毛苞

江寧府桑上寄生



寄生味甘平無毒主腰痛小兒背強
 癰腫
 傷不足產後餘疾下乳汁
 一名萬木一名寄生一名萬
 樹上三月三採莖葉陰乾

用揚上楓上者則各隨其樹名之形類猶具一般但根津所因處為
 異法生樹枝間寄根在皮節之內葉圓青赤厚澤易折實自生枝節
 冬夏生四月花白五月實赤大如小豆今處處皆有以出彭城為勝
 俗呼為續斷用之按本經續斷別在上品藥主療不同豈只是一物
 市人混雜無識者服食方是桑儒與此又不同
 柳水揚楓等樹上子黃大如小棗子惟號州有桑上者子其甚黏
 核大似小豆葉無陰陽如細柳葉而厚晚莖短江南人相承用為
 續斷殊不相開且寄生實九月始熟而黃今翻五月實赤大如小豆
 蓋陶未見也
 似云是烏鳥食一物子糞落樹上感氣而生葉如橘而厚軟莖如槐
 而肥脆今處處有方家惟須桑上者然非自採即難以別可斷莖而
 視之以色深黃者為驗圖經葉似龍膽而厚闊莖短似雞脚作樹形

三月四月花黃赤色六月七月結子黃綠色如小豆以汁稠粘者良也
性論云桑寄生臣能令胎牢固主懷妊漏血不止
 筋骨益血脉採人多在樹上收呼為桑寄生在桑上者極少綴有
 形與樹上者亦不同次即掘樹上力同樹上者黃色七月八月採
圖經曰 桑寄生出弘農山谷桑上今處處有之云是烏鳥食物子
 四月生花黃白色六月七月結實黃色如小豆大三月三日採莖葉
 陰乾凡樹柳水楊楓等上皆有寄生惟桑上者堪用然殊難辨別
 醫家非自採不敢用或云斷其莖而視之其色深黃并實中有汁稠
 粘者為真謹按兩雅寓木宛童郭璞云寄生一名葛詩頗弁云葛與
 女蘿陸機疏云葉似當盧子如覆盆赤黑甜美而中品有松蘿條即
 女蘿也詩所謂葛與女蘿施于松上見世舊云生熊耳川谷松上五
 月採陰乾古方入吐瀉藥今醫家鮮用此極誤矣今醫家非不用也第以辨得真桑上者嘗得真
 刀和根枝莖細對陰乾了任用勿令見火

衍義曰 桑寄生所舊書云今處處有之從官南北實處處難得豈
 歲歲窳穢摘之苦而不能生邪抑方宜不同也若以為
 鳥食物子落枝即間感氣而生則麥當生麥穀當生穀不當但生此
 一物也又有於桑樹細枝上生者如何得子落枝即間由是言之自
 是感造化之氣別是一物古人當日惟取桑上者寔假其氣耳又云今
 醫家鮮用此極誤矣今醫家非不用也第以辨得真桑上者嘗得真

桑寄生下噉必驗如神向承之吳山有求藥於諸邑者乃遍令人搜
 嶺原不可得遂以實告甚不樂蓋不敢以偽藥罔人鄰邑有人偽以
 作木寄生送之服之逾月而死哀哉

成州杜仲



杜仲味辛甘平温無毒主腰痛補中益精氣堅筋骨

強志除陰下痒濕小便餘瀝脚中酸疼不欲踐地久服輕

身耐老一名思仙一名思仲一名木綿生上虞山谷及上

黨漢中二月五月六月九月採皮
惡蛇蛻皮玄參 上虞在豫州虞山之虞非

會稽上虞縣也今用出建平宜都者狀如厚朴折之多白絲為佳用
 之薄削去上皮橫理切令絲斷也圖經云生深
 山大谷樹高數丈葉似辛夷折其皮多白綿者好今所在大山皆有
 直風也腰不利加而用之回華子
 云暖治腎勞腰脊擊入藥灸用
 峽州近處大山中亦有之木高數丈葉如辛夷亦類拓其皮類厚朴
 折之內有白絲相連二月五月六月九月採皮用江南人謂之棉初
 生葉時採食主風毒脚氣及久積風冷腸痔下血亦宜乾末作湯
 謂之綿芽花實苦澁亦堪入藥木作屐亦主益脚膝中方主腰痛補
 腎湯杜仲一大斤五味子半大外二物切分十四劑每夜取一劑以
 水一大外浸至五更煎三分減一濾取汁以羊腎三四枚切下之再
 煮三五沸如作羹法空腹服用用鹽醋和之亦得
 此亦見崔元亮海上方但崔方不用五味子耳
 雷公云凡使
 削去麤皮用酥蜜和作一兩炙之盡為度炙乾了細剉生惠方
 用凡患事一斤酥二兩蜜三兩二味相和令一處用也卒治
 患腰脚疼痛補腎杜仲一兩去麤皮炙微黃對以水二大盞煎至一
 盞云用羊腎二對細切去脂入藥中煮入雞白七菴
 薑等如作肘後方 腰背痛杜仲一斤切酒膝方
 與空腹食之肘後方 二升黃十日服三合膝方
 定并產後諸疾宜服杜仲丸上黃於太和中補益
 六黃素為丸如彈子大每服一丸凡屬酒以糯米飲下

楓香



楓香脂味辛苦平無毒主癰瘡風痺浮腫齒痛一名白
 膠香其樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣煮汁用之

所在大山皆有

圖經云 樹高大葉三角商洛之間多有力
唐本先附 樹為坎十一月採脂

楓香 脂皮共三條主治稍異注云按王璠廣輶轉本紀云黃帝
 蚩尤於黎山之丘擲其械於大荒之中采山之上其械化為楓木之
 林爾雅楓楸楸似白楊而有歧其脂入地千年為琥珀圖經云樹高
 大木肌理硬葉三角而香圖經 云說文云楓木厚葉弱枝善搖一
 名楓楸郭云葉圓而歧有香今之楓香是也南方草木狀 曰楓香
 子大如鴨卵二月花發乃連者實八九月熟暴乾可燒惟九真郡

非木子冬青藥性酸熱此子浸酒去風血補益木肌白有文作象齒易冬月青翠故名冬青江東人呼為凍生李邕又云出五臺山葉似椿子赤如郁李酸熱與此亦小有異同當是

兩種冬青冬青皮涼無毒去血補益肌膚圖經曰實生武陵川谷今處處有之山海經云泰山多真木是此木也其葉似狗骨及冬青木極茂盛冬不凋花細青白色九月而實成似牛李子立冬採實暴乾其皮可以浸酒或云即今冬青木也而冬青木肌理白文如象齒道家取以為簡其實亦浸酒去風補血其葉燒灰面膏塗之治瘡疥效兼破癩疔又李邕云五臺山冬青葉似椿子如郁李微酸性熱與此小有同異當是別有一種耳又嶺南有一種女真花極繁茂而深紅色與此殊異不聞中藥品也狗骨木多生江浙間木肌白似骨故以名南人取以旋作合器甚佳詩小雅云南山有狗骨浸酒補膏膝脫其枝葉為灰淋汁塗白癩風亦可作煎餅之

蜀州木蘭



春州木蘭



韶州木蘭



木蘭木苦寒無毒生長於水邊及膏肓中其面熟亦能酒

酸惡風腫疾治一切瘡疔目療中風傷寒及癰疽水

腫去臭氣一名杜蘭皮似桂而香生零陵

山谷及太山十二月採皮陰乾圖經云零陵諸處皆有狀

益州有皮厚狀如厚朴而氣味為勝今東人皆以山桂皮當之亦相

類道家用合香亦好云木蘭似茵桂葉具葉氣味辛香不及桂也國經云樹高數仞葉似茵桂葉有三道縱紋皮如切桂有細橫文今所在有三月四月採皮陰乾

圖

經曰 木蘭生零陵山谷及泰山今湖嶺蜀川諸州皆有之木高數丈葉似蘭桂華亦有三道縱文皮如板桂有縱橫文香味劣於桂山與桂全別而韶州所生乃云與桂同是一種取外皮為木蘭中肉為桂心蓋是桂中之一種耳十一月十二月採陰乾用任防述異記云木蘭川在潯陽江中多木蘭又七里洲中有魯班刻木蘭舟至今在州中今詩家云木蘭舟出於此

要 瘳面上皴破疔腫方木蘭皮一斤細切以三年酢漿

錄 瘳小兒重舌木蘭皮一尺廣四寸削去麋皮用醋一外漬取汁注重舌上

外臺秘 子母秘

并州蕤



蕤核味甘温微寒無毒主心腹邪氣明目赤痛傷

種皆爛鼻破心下結痰瘕年久服輕身無氣

生山谷川谷及巴西

形如烏豆大圓而扁有文理狀似胡

圖經曰 蕤核生山谷川谷及巴西今河東亦有之其木高五七尺

生類五味子六月成熟五月六月採實去核殼陰乾古方惟用者

主之旨則黃連等分合取無神病革棗三枚割頭少許留之去却核以


耳與黃連等分合取無神病革棗三枚割頭少許留之去却核以

皆應今醫家亦多用得效故附也

雷公云 凡使先湯浸去皮

陳

廣州丁香



丁香味辛溫無毒主溫脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫
疔疔能發諸香其根療風熱毒腫生交廣南蕃二

八月採

按廣州送丁香國樹高丈餘華似櫻華花圓細黃
香根注中有心入心腹之用六字恐其根必是有毒故不入心
陳藏器本草云丁香於其母丁香主健白以生薑汁研
之則理即所到病處甚多云丁香白能主冷氣助
云治口瘡反胃嘔吐疔疔毒及痔瘡承氣陰痛壯陽

勝治冷氣得心毒

圖經曰

丁香出交廣南蕃心惟廣出
高丈餘華似櫻華花圓細黃

海藥

按海藥云生東海及崑崙國二月三月花開紫白色至七
月方成實大者如四巨鳥之母丁香小者實為之丁香主

風濕骨痛勞氣治氣烏蟻蟻後毒瘡五痔辟惡去邪治
疔疔止五色毒痢正氣止心腹痛樹皮亦能治齒痛

雷公云

凡使有知唯唯小唯顯大似櫻華方中多使唯力
聖惠方治
凡使有知唯唯小唯顯大似櫻華方中多使唯力
聖惠方治

千金方

治乾霍亂不吐不下方丁香十四枚末
以沸湯一升和之頓服不差更作服

師方

治乳頭裂破癢
丁香末調之
又方
治如乳乳癰取丁香
搗木水調方寸匕服
又方
治崩中
止取丁香二兩以酒二升
取半分服外臺秘要方同

簡要濟眾

治傷寒咳嗽不止及嘔逆
不定丁香一兩乾柿蒂一

兩倍乾柿蒂為散每服一
錢煎人參湯下無時服

衍義曰

丁香日華子云治口氣此正是御史所舍之香治胃寒及
脾胃冷氣不知有大者名母丁香氣味尤佳為末縫紗囊

如小指實末內囊中
主陰冷病中病便已