

一  
禮  
多  
醫  
書

上海千頃堂印行

印行

痘疹傳心錄卷之六

西吳朱惠明 著

松江李林馥啟賢氏重校

報點口訣

凡痘之初發也發熱可決輕重肖形可占順逆是以痘瘡見點便視形色細密榮枯  
攸分善惡色澤神安點如珠粟神枯色黯瘡出乾焦點粗肥稀疎可必標舒頸屑  
細密也繁密非常帶熱敷瘡陸續出齊雖甚密猶為可治一齊湧出掀紅平塌縱稀疎  
未泄生長細細白頭如癩瘡乾枯必作內攻形啾啾紅點似丹朱焦萎定成憔悴勢  
粗肥饅頂點子不紅終白陷頭尖腳斂桃紅光潤定為祥蚊迹蚤斑刻日而登鬼錄  
堆沙攢簇引日而返泉鄉肌白嫩則皮薄嬌紅體黃瘦則痘多褐色人黑皮粗痘色  
必死慘黯宜辨肌色不同未可一例而識只要尖痏有神不喜嬌紅平塌未熟先敷  
數點或一俗名報痘又名  
屬痘無何複熱舒瘡吉凶未審先發塊而後發瘡塊名風毒而  
急瘡先發瘡而後發塊塊名鬼腫以難醫痘始報於太陽頭頰脣肋者多凶瘡初生  
于兩耳舌喉胸背者不吉故曰順不憎多逆嫌一點黑疔先見諸瘡誰敢彰形賊痘  
諸痘未起脹間有色如黃金者若生諸痘不堪貫汁辨認若真急宜挑剔是以裏症未平  
吐利便閉睡卧安寧身雖熱而毒已  
出外補兼升發安表相兼設使內外症平斯又不須過治矣

一凡雜痘初出形色似乎正痘當辨及之

一為風熱發為瘡疹形色初見亦似乎正痘

痘始

且夫痘之為毒也。稟於有生之初藏於臟腑天一所生之臟腑也。內隱顯莫測聲臭不聞隨感而見猶鏡之取火鏡中之火雖在使無日之晶光相射何能發也。先哲曰痘藏伏處藥銃相似火未至也寂然無聲火既及也赫然震烈矧痘毒之猛烈非可言喻及其呈見利害妍媸有難悉舉殆非刻舟求劍者所可語也。

一凡痘初見點於正面吉部相去二三寸一顆尖細淡淡桃紅色者必稀而轉也。若初見點於正面凶部二三相並或五六成叢或赤或白頂平而少神者必密而重也。一經曰病有輕重藥有淺深故痘之初出有輕而有重也。稀者輕而密者重夾癰疹而出者半輕半重如發熱一日報點者太重二日報點者重微微發熱三日報點者為輕四日身涼報點為尤輕自報點三四日方齊磊落如珠大小不一等尖圓緊實顆粒分明淡紅漸加明亮根窠紅活頭面稀少心胸無人事安盪飲食如常二便清調順也。痘初報點雖易粗肥形似饅頭或一熱雖齊出而勻朗紅澤雖稠密而陸續出來能食便調此險之可治也。一熱齊湧出顆粒不分粘聚成叢頂若火刺乾紅灰白色不光澤頭面頸項胸背舌喉稠密無縫嘔吐噦瀉腹痛腰疼喘急腹脹煩燥悶

亂失血者此逆之不可治也

一或問發熱痘便一齊出者或發熱數日而陸續出者何曰一熱齊出者乃表虛也肺主皮毛脾主肌肉肺氣虛則腠理不密肌肉不實不能約束於外則毒火攻擊而出太驟也譬君失其正則寇盜蜂起若熱久而陸續出者乃正氣充足肌膚厚肉分堅則毒受制歸附故陸續而漸出也譬君正則四夷皆化而為善也故曰表虛者易出而難醫表實者難出而易醫也

一凡痘初見點以火照之簇簇于皮中不見不起者若非風寒壅遏必氣虛不振風寒宜散之氣虛宜補益而兼升發為主也

一凡痘疹出不快者症必有因當詳審而調之○一素壯實之人皮膚厚肉腠密毒氣難以發越宜勻氣為主經曰氣勻則出快○一素虛弱之人先曾瀉利而元氣不足不能拘血運毒而出者宜溫補而兼升發為主經曰正氣足而痘自生化也○一天時嚴寒運氣又在寒水司天毒氣為寒氣鬱遏而不能快出者宜辛熱之劑發之經曰毒得熱則行得寒則凝正此謂也○一炎暑亢極運氣又在君相司天煩渴昏曠此為兩火相擊而陰水乾涸經曰少水不能滅盛火而陽獨治獨治者不能生長也宜清暑益氣為主○一客受風寒發散之劑表之得汗而痘自出也○一內傷飲食胃氣不行氣血凝注而毒不能快出者宜濁陰之劑利之○一稟賦腎水不足毒

火彌熾水不能制反為所勝毒邪留連於裡而不快出此為獨陽不生也宜滋水以制陽光

一或問經曰痘出身涼微熱為上吉熱微而痘出反密熱甚而痘出反疎者何也曰熱微而痘出密者必其兒口燥渴唇焦裂表雖不大熱而裏熱甚也熱甚而痘出疎者必其兒口不渴唇舌滋潤能食便調身雖大熱而裡氣和平也豈可以熱之輕重論哉

一或問痘必假天行時氣鼓擊而出有出而亦有不出者何也曰夫痘毒中於有生之始畜無形臭及有外邪觸之則忽焉盡發若不感動其邪縱時行發痘而不出也一報點紫色或黑滯而腰背痛者不治方見前腰痛門

一凡報點青色如筋頭大不起凸此冷疔凶也紅斑如錦紋者偏身如蛇皮者如疹如瘡者逆候也

一痘報點而口中腥臭者乃毒乘肺胃煎熬潰爛內潰症也之故臭也宜清金解毒湯或甘桔湯加連翹蟬蛻芍藥治之隨應藥者醫之功也若失聲喘急噦嗇者凶也

附治驗

一兒痘初出便身作痒爬搔不盡余謂風寒外乘滯於皮膚而作痒也搔之者運動以散之也以升麻葛根湯服之又用荆芥穗焙熱以紙包之運其痒處應手而愈

一兒痘出隱隱不見喘咳寒熱交作以升發藥不應召余視之曰時天大寒毒氣為寒氣所抑腠理封閉氣血凝滯而然也當用辛熱之藥佐之治以桂枝葛根湯得微汗而前症悉平痘豁然透出調理愈

一兒痘已見形噦吐不止面色槁枯口唇焦黑余謂胃氣脫絕毒伏於內不能盡出三日而死

一兒痘不易出吐瀉不已醫咸謂毒氣上行則吐下行則瀉擬升發之劑使痘盡透吐瀉自止治之愈甚名余視之熱微安靜痘勻朗嬌紅曰此脾胃氣虛治宜溫補而兼升發或曰痘未盡出而溫補豈不黨邪為禍乎曰醫無定法合宜而用以透肌散又六君子湯加蟬蛻升麻桂枝陳倉米生姜大棗治之愈○又一兒痘症如前咸以升發而不固真元致伏陷不治

一兒痘隱隱不出面白神疲熱微飧泄余謂脾胃氣虛不能送毒以小異功散加升麻川芎蟬蛻木通陳倉米服之瀉止痘出又補中益氣湯調理愈

一兒痘出勻朗形綻凸而色淡紅兩腿痛甚呴涕不已召余視之曰身半已上俱屬陽分身半已下俱屬陰分腿亦屬陰腎所主也陽虛陰弱則痘毒乘虛凝滯於腿而作痛耳以活命飲治之二劑痛稍止繼以十全大補湯加附子間服八味地黃丸調理而愈○又一兒痘症類前不以早治痛傷元氣色漸微白而唇白面青四肢厥冷

痘變紫黑而六日死。○一張氏子五歲痘出隱隱腿痛不息余謂稟賦督家精氣不足逆也痘不能盡出喘脹狂亂痘變紫黑五日而亡。○凡病之始神氣尚存可以藥制之若其始謀不豫宜然罔知生氣已去化工難續雖聖人豈能改天命也哉故曰履端於始序則不愆此之謂也。

一兒七歲痘初報點于上唇右及右太陽身肢稠密正額平塌少神額頰不現四肢厥冷人事昏曠喘急腹飽便秘余謂風寒壅遏毒火彌熾于內氣血不能運行於經絡故肢冷痘不易透者此寒包熱之症治宜疏散表邪為主用升麻葛根湯加川芎蟬蛻山楂山甲等服之又加味獨聖散桑蛭蟲攻之六朝正面俱起七朝空處補出贈痘諸症悉平調理而愈。

一兒初發熱頸項間紅腫如桃痘雖標形而癰作膿痘伏腦而卒。○又一兒痘三日耳前紅腫如桃余謂癰毒也以葛根湯加荆防牛蒡甘桔治之外以圍藥塗之腫退痘起而愈亦有不應藥者毒起痘陷而死。

一兒痘初報點驚搐不止余謂心血不足邪因而客之以歸地赤芍川芎茯神遠志酸棗仁蟬蛻少加石菖蒲治之搐止愈。

一兒痘初報點驚搐不止眾曰驚痘多吉或言邪從搐散無害余謂曰驚出於心搐發于脾若發之不止乃脾虛血少也未可以為吉不信醫治之二八而卒每驗發驚

不正者後難收拾也○又一兒痘初見點癰搗不止昏曠不甦而逝

一兒痘出二三日而發驚搐余謂毒不透撤乘於心心受邪而不安治以導赤散加蟬蛻黃連紅花天麻鈎藤石菖蒲治之愈

一兒痘出隱隱發狂不已便祕溺溢余謂毒火鬱結手陽明以大柴胡湯利下而愈

一凡報點二三日其間碎密如麻子者此夾疹也

方見前夾疹門

有皮肉鮮紅成塊者此夾

癰也

方見前夾癰門

二症有吉有凶當究正痘形色而斷

一兒痘已半出喘急腹脹煩躁便祕譏語不寧余謂毒火彌盛以承氣湯得利行數次諸症悉平而愈

一丙子孟春五日談氏女痘已三日閱歷諸名家皆曰磊落綻凸勿約有喜舉家大慰居無何乾焦紫黑氣絕而死仍懇諸家往視之則默然無以應舉家哭罷而余至閱視審詳曰此兒身肢雖冷心胸尚溫六脈雖無而衝脈不絕猶有生氣蓋變色而死非痘之故也究其初熱時為年糕歲食所傷不能運化以致氣血凝滯不行靜如死狀用承氣湯以漸灌之則行黑糞二次少間身肢溫熱六脈如原又用補中益氣湯調理而愈紫黑為紅乾焦為潤諸名家讓三舍而去

一兒痘正出而小便秘余謂膀胱為津液之府氣化則出氣為火食不能傳化故津液不出而溺閉也以導赤散加疏解藥治之而愈

一兒痘出未齊而腹痛噉腐吞酸大便穢臭余謂飲食停滯用保和丸二服愈

方見傷食門

一兒痘半出偏身作痛余謂熱毒鬱滯而未盡外出故也以活命飲加蟬蛻一劑而痛愈亦有六淫所感而痛不可不察

一兒痘正出時而痰喘壯熱煩渴余謂肺胃二經實熱以前胡枳壳赤茯苓大黃甘草煎服而安又食少面白此邪氣去而真氣虛也用補中益氣湯調理愈

一癰兒痘出細密如瘡色白乾枯余謂毒盛氣血兩虛之候毒不能盡出透必內攻腹脹喘急而五日不治果已

一兒點報粗肥而有紅盤間有細密隱隱咸謂夾疹痘名余視形色是痘紅點是疹盤雖紅而歪斜乃客冒風熱鬱於肌表不散兼食辛物風熱相搏發為水痘夾疹非正痘疹也今內症安寧但表邪未解宜解散之用葛根湯加防風荆芥連翹白芷服之二劑痘成疣疹沒而愈

一兒患痘勻朗粗綻紅澤咸曰順不必治偶余過彼招余視形色雖順但左腮腫塊其色青紫熱盛而煩燥不寧余曰先發瘡而後發塊名曰鬼捻以難瘥急宜服紫金錠救焚散稍遲則毒攻心必驚搐不治主人以為謔不從次日果發痰喘搐搦竄視而死

一兒痘三日溏泄無度四肢厥冷痘點隱見余審視其瀉已有旬日乃脾虛之甚也

以附子理中湯數劑瀉漸減而肢漸溫又以補中益氣湯去歸加肉果官桂調理愈一兒痘四日而尚未齊出壯熱煩躁頭疼喘嗽余謂外感寒邪腠理閉密宜汗解之以升麻葛根湯加麻黃蟬蛻山查治之汗出如浴痘盡生長前症悉平愈

一兒痘三日而間有膿泡者皆云行癧為吉召余視曰痘尚未盡出而便間有膿泡者此未至而至謂之太過名曰賊痘為逆經曰賊痘若生諸痘不堪貫汗或問何名賊痘曰夫痘之成始成終合四時順逆之理初出猶春之生起發猶夏之長成膿猶秋之收結痂猶冬之藏此自然之次序遞相而成功者也今痘出三四日之間正春生之候而便間有膿胞者此乃春行秋令金來剋木是謂賊邪故名之曰賊痘也內經曰逆春氣則少陽不長肺氣內變火無生氣而長養之令不行故痘不堪貫汗也一兒痘未齊出利下赤白無度余謂血熱毒甚之痘兼有素積以升麻葛根湯加山查麥芽蟬蛻芎歸等主之稍愈而目赤溺數又犀角地黃湯治之再補中益氣湯調理而愈

一兒痘出四日反焦紫陷伏煩燥腹飽憤亂不寑皆云逆者不必治余同毛小泉視謂風寒封閉腠理雍塞氣道非表散不可以四分散桑蛀蟲發之升麻葛根湯加酒炒麻黃以疏肌表山查麥芽以消宿食痘漸生長然尚少神以保元湯加芎歸內托膿成結痂而愈

一甲午孟春有族姪三歲痘初報點於山根粗肥咸云報點粗肥稀疎可必為順三朝躁熱狂亂母痘塌頤頰隱隱余謂山根部位屬脾雖粗肥形似饅頭乃毒乘脾腎以人牙散又恙活散鬱湯痘齊出稠密陷痘復起以補中益氣湯漿足結死痕色乾紅少潤唇口裂血腹飽便秘溺赤以滋養清解之劑治之便通安枕又口齦發瘡則以清胃解毒湯加連翹牛蒡子治之愈

一壬辰臘月沈氏女六歲泄瀉旬日報痘患荆書夜無度痘隱見不振咸用升發藥不效勢在危急余視曰形色淡白少神診脈浮大無根乃大虛症也非附子理中湯不可日進二劑便積少愈而痘覺紅潤脈漸有根然猶飲食不進用補中益氣湯加桂枝炮姜遂能飲食睡卧得宜漿雖充滿而便完穀痘不易結痂以小異功散加木香芍藥又參苓白朮散調理愈

一兒痘未盡出濱泄肢冷搐搦竄視予謂慢脾候以陳氏異攻散數劑愈

一兒痘未齊出而手足搖動醫謂寒顫以異攻投之而愈戰慄余謂顫慄者似寒而寔熱也由筋脈約束不住而莫能任恃風之象也內經曰諸風掉眩皆屬肝木木主風風主動此木氣太過而兼火之化也治宜平肝制火以升麻葛根湯加防風川芎柴胡治之愈

一兒痘出三日夾癰赤色不退壯熱便祕余謂毒滯不能宣發以四順清涼飲利行

二次癥退痘起又以補中益氣湯調理愈

一富兒患痘四朝廷余及同道毛小泉視之稀朗紅潤而神順也順者不藥自安及至七八日漿尚不得行冰陷九日而卒余意此等順症而有變故疑其間必有致毒之由因詢其父乃曰未痘之先嘗製丹砂稀痘等藥服之或是之悞乎余曰有是哉蓋痘毒原於有生之始藏於至陰之下必待天行時氣而與相火兩相提携乃能發之于外今丹砂等藥味甘寒而性沉石入心而安神鎮脈以致君火受制相火無委任權力陽氣不能生發以使血脉冰凝毒伏不化也不斂而何哉

一兒十三歲痘已半出勻朗乾紫腹脹喘急煩躁便祕余診六脈沉滑謂此氣血凝滯之症心食物所致明以告我彼曰因食粽四五而熱始以保元湯加酒麴二錢利行二次愈

一兒痘出未齊而頭面浮腫余謂風熱上攻以葛根湯加防風荆芥白芷蟬蛻治之愈一兒痘出妄言妄見或狂或愚或哭或笑余謂癲症由心血不足而毒火乘之使邪不守舍以升麻葛根湯合寧神湯治之痘齊出愈

一兒痘已出齊粗肥紅澤而頂陷咸謂少起脹欲升發之余視曰內外症平不宜服藥不從以桑蛭蟲并升發藥雖行漿而清稀痒塌復求余治以大補益之劑雖愈難為力矣

一兒痘已盡出潤流不止痘不易起脹余謂肝經氣絕而然也經曰木絕則火無生氣治當調脾益腎以培其根肝木自生而長養之令行矣東垣曰滋苗者必固其根正此謂也早服補中益氣湯夕服八味地黃丸而愈亦有斯症不同前治不能起脹而卒

一兒痘已齊出勻朗不易長大瘡色少神能食便溏余謂脾氣不足而然也故曰脾胃充足飲食入胃精氣先輸脾歸肺上行春夏之令以滋養周身之榮衛也然後下輸膀胱行秋冬之令傳化糟粕轉味而出也若脾胃虛衰久不能升則真氣下溜是有秋冬而無春夏生長之用陷于殞殺之氣故痘不易長大而少神也治宜補中益氣而升陽得脾土固則陰升陽降四時之序行矣以補中益氣湯去當歸加桂枝蟬蛻等又保元湯加白朮官桂川芎等治之愈

一兒痘已盡出勻朗綻凸咸曰順余謂皮嫩色嬌乃晃痘也必有痒塌之患蓋皮在內約束經脈膚在外分布腠理凡痘之出皮厚色老為佳若皮嫩色嬌者皮肉已虛不能約制邪毒故痒癟也治當固中益氣為主不從余治後果痒癟泄瀉而卒

一兒痘四日稀疎紅綻為順余視正額平塌少神煩熱無益以火燭之隱隱于皮膚以如金散發出密如蠶種色乾紫無神乃氣血虛而毒盛逆也六朝痘漸為紫黑喘脹而卒或問痘之變黑者何也內經曰火極而反兼水化又曰火之炎也則紅火之

過也則黑黑乃水之色此兼水化之義也譬炒豆然火微則黃火盛則焦而枯黑矣  
一兒痘四日勻朗綻凸紅潤而順余視審其煩燥不食睡卧不寧此痘尚未盡出而  
然也蓋外症之吉凶必審內症之虛實輕重經曰裏症未平痘雖出而毒猶在內治  
宜升發之以升麻湯治之其痘盡出稠密以補中益氣湯保元湯調理愈

一慎姓子于乙亥孟夏卒然發熱腰疼甚即見痘稠密其色紫黑咸云毒乘腎經而  
發不治招余視痘已四日審兒胃氣強盛色雖紫黑而有神乃謂主人曰其症固逆  
喜元氣壯實尚有生意乃以四分散一服又化毒湯送下地黃丸二服次日痘俱腫  
脹但色如故以黃連解毒湯加牛蒡紫草歸芍地黃治之而愈故治者不可執一而  
輕棄之余驗此有感而錄也

一兒痘不易出目胞預浮腫而光亮壯熱煩悶余謂曰痘之初發主於心漸傳之於  
皮膚之上被風寒客閉皮膚不能發越於外毒留肌肉之間脾主肌肉目胞屬脾經  
曰毒乘於中則熱熾於外故目預腫也宜疎解之以升麻葛根湯加荆芥蟬蛻連翹  
主之痘透解毒自開豁至五六日痘盡起脹目應閉而復閉愈

一兒痘已出齊兩目赤腫色見乾紅大小便祕睡卧不寧余視為血熱毒盛不解而  
上攻於目以犀角地黃湯加連翹牛蒡荆芥治之中病即止而愈

一兒痘四日形色俱白咸曰血虛不附凶也余謂形色雖白尖綻有神種名水白痘

順也以補中益氣湯調養始終無紅盤而愈

一兒痘五日形色少神腹脹喘急腸鳴四肢厥冷或擬內傷者或論伏陷者余視曰內傷者按必痛陷伏者必煩悶今兒便利安寧而虛鳴者乃陰陽二氣不和此傷冷之症也詢其渴飲生冷而兼涼藥內經曰中氣不足則腹滿腸鳴以理中湯加木香陳皮官桂等疏逐冷氣諸症悉平又補中益氣湯調理愈

一兒痘三四日雖齊淡白神疲不易長大少用升發药并桑蛭虫服之亦不起召余視之見兒安靜便溏曰痘毒俱已外出不長大者乃正氣微弱耳以補中益氣湯加蟬蛻官桂連進二服又保元湯調理愈亦有不從余治執以升發不能行幾痒瘍九日而卒

一兒痘已盡出形色無神二便自利四肢厥冷腹脹發噦余視為裏氣虛弱宜用理中湯稍遲則胃氣脫絕連進二服而內氣一緩痘即發光北紅活四肢溫熱又以補中益氣湯加丁桂治之噦止愈

一兒痘四日吐血二三碗痘陷淡白煩躁譫妄肢冷身涼睡卧不寧余審其痘原血熱毒壅未盡出而清涼之其毒乘寒凝滯不能伸越故上逆而吐衄也今毒雖解而氣血虛脫東垣曰血脫者益氣以保元湯加黑姜附子芩歸芍蟬蛻粘米治之痘復鼎峻前症悉平而愈

一兒痘出面半已上稠密灰滯已下俱勻朗紅澤余謂此名雲掩天庭漿不能滿倒醫喘脹而卒

一兒痘齊出面半已下稠密灰白面半已上勻朗紅潤余謂此名落花滿地以補中益氣湯破損復腫灌而愈

一兒痘五日左半身稠密紅澤右半身間有數點余謂左屬陽痘發於陽以補中益氣湯調理愈

一兒痘四日右半身稠密灰滯平塌左半身間有幾顆余謂右屬陰毒發於陰逆也漿雖行不能收斂九日而逝

一兒痘齊出諸處俱勻朗紅潤而腰圍轉稠密灰滯腰痛坐立不能余謂毒乘腎經名纏腰痘不能成漿九日而卒○又一兒痘諸處勻朗紅澤而腰間攢簇如盞許灰滯八朝痒破成坑十一日而卒

一兒痘出中身稠密紅活綻凸頭面四肢全無漿充結疤愈余謂古人曰氣之所至毒亦至焉何中身氣至而頭面四肢氣不至也未詳其理俟高明教之

一兒痘已齊出遍身稠密頭面全無皆云頭面無為吉余謂陽氣不足不能上升於頭面逆也又一兒痘似前以補中益氣湯加川芎官桂頭面雖見數點不能起脹而卒一甲戌有一老夜半叩言孫兒痘出二三粒五朝而復煩躁發熱睡卧不寧余往視

見點報於左右目胞頂平潤大根紅有神此痘隊中之碩痘一名母痘又名報痘時發痘之時而有是痘也

痘疹傳心錄卷之七

西吳朱惠明 著

松江李林馥啟賢氏重校

起脹口訣

三四日已來痘出須齊點至足心勢方安宜有隱隱皮膚不見不起若非風寒壅遏必是氣虛陷裏故毒已盡出安靜為貴能食為強安靜則毒邪外解能食則胃氣純良痘齊起脹氣尊血分身表溫涼涼則氣血和平痘色必然潤澤溫則腠理疏通其毒易於成漿故至此而身宜微熱若然冰伏痘瘡勿長五六日來血泡已成候當肥綻而粗頂宜發光而瑩故根紅而頂白者已具行漿之勢若過頭而色赤者則毒妄參陽位雖起而空殼虛名內含清水皮薄而光亮如燈頂尖而根脚不紅者氣血虛而不勝其毒此候難望功成毒壅而不起者為陷伏候氣弱而不振者為乾灰形或有肉雖腫硬而痘反不起者漿則滯而不行面已虛浮而痘反退伏者毒則遏而不伸故身不熱而痘不起已成冰硬之形赤色若還不變溫之可起氣血虛而不振補之可生紫色乾枯切忌溫中帶補只宜活血鬆肌毒因壅滯疏解更為活法透肌還是良醫溏瀉惟以溫補泄其佐以升提此是先賢之秘訣以為後學之良規

一痘瘡出齊後計時當起脹必是先出先起脹後出後起脹根窠紅活頂峻肥白腳斂圓淨堅實礙指此氣尊於中血附於外順也若灰滯黑陷形匾色枯皮薄脚軟斜

視若無根血不附此毒參陽位逆也若形雖平而血附色雖滯而有神形色逆而內症平和此險之可治也虛宜補益寔宜清解斯無失矣

一華佗曰氣尊血分者生毒參陽位者死○氣尊血分之候痘鼎峻而白根紅而不散譬如一顆玲珠在胸脂上○毒參陽位之候陽位者氣位也痘起脹頂色乾紫灰滯根血散漫地界不分譬如酥血猪肝色也○亦有正氣足而毒盛者痘起脹而頂色紫滯根血紅澤而斂乃險症也宜涼血解毒為主可謂達真元之本履生死之門執施治之鑰者也蓋痘者二氣之毒起於血而統於氣氣足以領血則氣升而血附君令臣從此順道也故曰氣尊血分者生也氣失其政則毒火亢盛妄行游布毒參氣位○氣位之上也氣位即痘粒之上也乃臣奸君象此逆道也故曰毒參陽位者死也此本之魏氏論氣血盈虧交會圖說所以濟華佗之不及可為不朽名言矣

一痘起脹時頂平脚塌根窠散而不附頭面皮肉紅腫如瓜狀者頭面浮腫如錫餅形者皆為不治若未發而先腫及已發而皮肉平檯者亦皆不治

一或問痘起脹有目閉者有目不閉者何也曰痘稀毒輕者目自不閉痘密毒盛者目自應閉若當閉而不閉者氣虛也宜補中益氣湯治之閉則吉否則凶當不閉而閉者毒盛也宜清解散治之然目閉之症必待收疎而漸開者吉也痘未蒼老或漿行未滿而漸生痒塌腫消目閉者凶也愚按腫消目閉之症補托而復得腫灌目閉為吉

一痘起脹時而吐蛻蟲者何曰乃熱毒怫鬱於胃因不能食其蟲為熱所逼但聞食氣即上湧吐出治以安蟲湯亦有不治者

附治驗

一兒痘出勻朗光澤惟清飲不食聞氣即吐蛻蟲漿半足眼扎不止脾木乘腫消目

肝木乘脾也

開倒麝而逝

一兒痘紫色而不起脹余視謂毒盛壅遏以紫草紅花蟬蛻煎湯調獨聖散服之又以犀角地黃湯治之紅潤起脹而愈

一痘起脹而其中有先起虛大色如黃金者名曰賊痘宜剔破以天水散敷之涼血解毒散加人中黃服之大而黑者名曰痘疔急用銀針挑破口含冷水吮去惡血將四聖散點入痘內服解毒湯救焚散治之若疔少而根窠紅活者可治疗多根血不活腰背胸前多者不治也

一兒痘五日紅紫而不光澤余謂氣弱而毒滯不化先以神攻散發起後以保元湯治之愈

一兒痘六七日不能肥脹寒戰咬牙腹脹氣急余以奇攻散服之痘即光壯諸症悉平又補中益氣湯治之愈

一痘分珠起脹綻凸根血少神余謂血虧氣弱以十全大補湯治之愈

痘癆便川錄  
一痘起脹乾紅焦紫煩渴便結根窠堅硬余以人復解毒湯治之而愈

一痘六日而不起脹灰白平塌泄瀉昏睡余以四分散發起以木香散數劑而愈  
一痘六日起脹形色俱順不食引飲余謂胃主納受不食者胃弱也以調脾內托散  
治之而愈有毒壅脾胃而亦不能食不可不知也

一痘六七日不易起脹反加痰喘嗽甚飲食入口即噦而吐出余謂毒氣壅塞肺胃  
以清解散治之而愈

一痘六日不易肥綻頂陷不起余謂正氣有虧不能逐邪盡外出以攻毒湯獨聖散  
又大保元湯治之愈

一痘雖起脹紫色焦枯妄言澹語余謂血熱亢盛以退火回生丹又無比散治之  
一痘雖順而利下黃赤膿血壯熱煩渴余謂毒入大腸以三黃丸解利其毒又補中  
益氣湯治之而愈

一季夏一兒患痘六日起脹而利下膿血壯熱煩渴余謂暑熱不解而兼毒入大腸  
先以十味香薷飲清其暑次以補中益氣湯調理愈又一兒仲夏發痘其症類前但  
初勿藥而暑毒不解利行無度漸倒陷而二七而逝故經曰險者治之吉不治者凶  
蓋可見矣

一兒痘七朝四肢厥冷減食召余視詢謂血熱而服冷藥太過以致肌表冰伏不易

成漿以保元湯加丁香官桂炮姜治之而愈○又一兒痘症如前余以附子理中湯治之而愈

一兒痘勻朗不易肥大而色淡白煩躁不寧余視謂頭瘡肥盛耗洩真氣故有前症以綿紙揉軟用白芨膏糊貼患處又保元湯助之痘豁然光壯而愈

一兒痘出勻朗紅澤但日夜啼哭不止余謂肺主哭尤肝木勝而反侮之又曰木勝則火熾而刑金以瀉青丸料合導赤散加黃連治之愈

一兒痘六朝而未起脹煩渴便閉咸以保元湯助之而愈煩渴余謂曰毒未盡外解而溫補則毒蘊畜而不能化漿以清解之劑而肥脹又保元湯治之愈

一兒痘六朝稠密形色平塌黑滯有言雲掩天庭不治有擬鎖項鎖胸鎖背不治召余視曰形色固逆而四肢紅活綻凸唇舌紅潤審其起止安寧飲食如常二便清調雖毒盛氣血不足幸脾胃強健譬樹之枝葉雖枯而根本猶活宜以補養氣血而兼固脾胃之劑可保無虞即以補中益氣湯加紫草蟬蛻牛蒡之藥其逆痘俱半漿而破漏結痂發疔癰數處愈

一兒痘七朝勻朗粗凸亢熱便秘狂煩余視兒舌胎黑有芒刺痘空處隱見黑點初感疫癘而發失于解散故有是症詢之果然當用大承氣湯利之使熱毒得洩次理氣血可也渠恐下耗其元不從而逝○又一兒患痘半出視之為疫癘所感與前症

彷彿投以十神解毒湯解散其邪次以升發其痘豁然生長而愈以二証參攷之益信毒邪之貴解散也

一痘起脹喘急渴瀉余視痘雖稀朗而色嫩少神皆由洩瀉以致元氣下陷此乃氣虛發喘也以補中益氣湯加肉果主之愈

一兒痘六日而不肥綻勻朗乾紅煩燥不寔余曰毒壅而氣血不宣通故也宜升發而兼清解或曰痘必藉氣血乃發而解不肥綻氣不足也色不潤血不禁也煩渴者津液竭也宜補中益氣為主解散則耗其元不可即用保元湯一劑而兒反煩劇悶亂色見焦紫復叩予曰兒痘比前增重試如先生升發兼清解可乎予往乃以枳殼湯先解其悶服復著之滯次以犀角地黃湯加蟬蛻牛蒡紫草等二劑頓清其壅滯之熱七朝前症悉平方以保元湯調理而愈信乎毒未盡外解而遽行溫補黨邪之害可畏也

一富貴家兒痘症易出而不易胞大馴至自汗微渴平塌灰白皆陰惡症也召余視之詢知為過服疎散之劑因致表虛故有是症古人曰治痘當審兒家貧富何如不可概投疎散等药蓋緣貧賤家兒愛護不周風日暴露拖泥就濕滋味淡泊表裡堅固施以疏散猶之可也尚當中病即止不可太過若富貴家兒煖衣厚味少見風日手抱不着地氣臟腑嬌脆腠理不密一或疏散則虛者愈虛前症悉見勢所必至經曰

疎表則易寢表則難治以固元實表之劑保元湯倍加黃芪連進數劑而痘否則寢為痒癟泄瀉危亡可待乃曰天之所命非人所為吾不信也

一兒患痘雖稠而根窠堅凸正起脹時忽爾泄瀉一醫擬曰痘最忌瀉耗其元神執用荳蔻丸瀉之余適至視其色赤詢其初發登圓便結已六日矣血熱毒壅正宜瀉其火毒治宜清解為上苦瀉之劑非也若毒火壅滯後必損目發癰者有矣主人曰瀉則耗其元不從即以豆蔻丸又保元湯加肉果官桂等治之痘雖結痂而目腫赤四肢發癰身熱不已主人悔之復來謁余求治曰毒滯諸經病根固矣復以清涼解毒等劑命雖獲全竟害一目一肢苦瀉之害詎不信歟○又一兒患痘類前余謂熱瀉以犀角地黃湯加木通桔梗川芎投之二劑色紅潤瀉止余再視曰內外症平不須過服藥矣

一兒五歲患痘五朝勻朗綻凸醫咸曰順召余視曰痘雖順但嫌嬌紅嫩焰者乃脾胃氣弱也主漿滿而不能蒼老猶防泄瀉癰痒倒屬之變治宜以黃土水煎保元湯送下參苓白朮散得脾土固而無下陷之患可保無虞主人曰期正發漿之始何芩木燥濕而滲泄耶不從治以保元湯至八朝溏泄四五次漿滿而縮倒屬煩躁二六而逝余每驗數兒犯此候二十四日而卒○又一兒痘症類前余以前方治之九朝漿清而膚結如皴幸能食便調發毒愈

一兒患痘五朝嬌紅嫩爛咸曰晃痘不能蒼老結痘召余視痘之形色果矣觀其肌白嫩經曰肌色白嫩則皮薄嬌紅可保無虞以保元湯加官桂白朮調理而愈

一兒六歲患痘六朝召余視余曰正面勻朗綻凸少神身肢僵滯色黯其故因四肢肥瘡腫潰泄其真氣故也此症主漿雖滿恐不能蒼老結痘當以保元固脾之劑人參黃芪甘草陳皮防風白朮官桂芍藥川芎治之若元氣實脾土固方可議其生主人以為然從此調理而愈○又一兒患痘類前但以人參黃芪甘草糯米官桂川芎保元而不固脾土九朝漿雖滿而不能蒼老結痘飲食不進泄瀉外剝而逝此不固脾土之明鑒也

一兒痘六日勻朗綻凸但色黯黑滯咸謂血熱毒壅治以清涼活血解毒之藥主人以為然召余審得人事安寧二便清調原兒肌體粗黑之故經曰人黑皮粗痘色必然慘黯擬血熱症非也以保元湯調理愈凡臨症當審察詳辨診切視聽此乃醫家之要術不可不知也

一兒痘初報點于下頰脣屬足也兩腿作痛三陰不脾足也形平陷氣不而色少神血不足也便溏土脾弱也六脈沉弱五朝尚色黯不起有血凝氣滯之象余謂氣虛脾弱之症治宜大補中益氣為主以補中益氣湯加蟬蛻羌活肉桂二劑而起張繼以保元湯加白朮肉桂陳皮調理八朝漿泄不已加木香訶蔻治愈

一兒痘正起發時而便血倦怠少食作渴四肢逆冷召余視曰倦怠便血者脾虛不能攝血也少食作渴者脾虛而精液衰少也肢冷者亦脾虛弱也以四君子湯加陳皮升麻丁香炮姜治之愈

一兒痘稠密未起發而唇先黃熟目先虛閉喉咽腫痛飲食不能召余視偏身俱平蹠幸正額勻朗紅潤唇雖腫而紅活審其欲食而不能以甘桔湯加牛蒡連翹荆芥山楂陳皮人中黃等清利咽喉膈間而解脾毒愈

一兒痘遍處皆起脹惟四肢不起發余謂四肢主乎脾乃脾虛也用五味異攻散加防風白芍藥治之愈

一兒痘已起脹醫擬氣血不足用保元芎歸治之而加飧泄填脹余謂氣不能上升以補中益氣湯加附子二片升麻柴胡酒炒以助上行服之二劑愈或問其理何也清氣在下則生飧泄濁氣在上則生填脹是以清氣一升則濁氣隨降而症悉平矣參芪等補劑皆味厚而氣滯者若不以升柴藥提之何以得行于經絡肌表而滋補哉一兒痘勻朗縱凸紅潤但胸前攢簇如盞許灰色召余視曰鎖胸症不治何也按兩乳中間者膻之位經曰膻中為氣海氣海受傷不能分佈陰陽經所謂陰陽離決精氣乃絕此之謂也後雖漿滿而不蒼老胸前痒癩潰爛諸痘俱倒屬喘脹二六而卒一兒痘起脹而不易行漿肢冷腹痛余曰原其血熱症而投涼藥太過以理中湯加

炮姜官桂木香一劑而愈

一兒痘起脹紅澤綻凸能食便調召余視曰順不須服藥自以保元湯益之而反增煩渴齦潰爛難收復求余治余曰此表裡俱寢而藥又寢之所謂寢寢也經曰脾移熱于肝則為驚衄皆補之過也人但知妄下則脾虛不知妄補則脾寢反增潰爛也以四順飲下之又清解之劑愈

一兒痘雖起脹淡白少神溏泄口渴作痒不已召余視曰此乃脾胃氣虛也內經云夫胃者水穀之海六腑之大原也五味入口藏於胃以養五臟胃氣既虛則水穀不化津液內竭不能輸精於皮毛氣失其衛血失其榮不能釀毒成功毒灼于皮膚故痒也以補中益氣湯去當歸加桂附糯米愈

一痘六日綻凸焦紫煩渴悶亂喘促厥逆余謂陽毒內陷熱氣逆伏經曰熱深厥亦深大極似水之義以四順飲利行二次諸症悉平又清解之而愈

一痘六朝勻朗頂陷皆云頂陷而為氣不足欲投保元湯余審其生長有序光澤明淨內症和平乃不虛不實之症若悞用藥餌反傷胃氣經曰諸病皆以胃氣為本若胃氣有傷無以滋養心肺而為倒醫者有矣今不虛不實但保其中和使脾氣流暢則肺經藉母之助易于灌漿成疣而脫痂矣不宜服藥主人從之果愈亦有內外和平妄以補托之劑而加煩熱便秘或目疾癰腫者有矣

一兒痘出勻朗綻凸但枯燥而不肥澤皮膚皴揭譙妄便結余謂血虛也經曰諸濕枯涸乾勁皴揭皆屬於燥又曰燥勝則乾治以養血解毒清金潤燥之劑以保元湯合四物湯加麥冬治之愈

一兒痘稠密綻凸但色紫黯壯熱譙語狂煩目赤便秘余謂毒火亢劇以四順清涼飲加大黃六錢微利二度其勢稍減再以前劑服之又利二度病去其半再以前劑加人參三錢前症悉平色見淡白精神疲倦余謂邪雖去而正氣不足宜大補之劑以保元湯加歸芍芎朮治之愈

一兒夏月痘起脹而乾紅壯熱舌燥煩渴不眠渴赤余謂內外極熱以黃連解毒湯合化斑湯治之愈

一兒痘起脹勻朗紅澤但眉心五六攢簇灰色平塌無根余謂眉心命門所屬痘既無根相火受傷不能收拾痘雖漿足結死而眉心痳塌不痂二八而卒

一兒痘六日稠密紫滯平陷不起脹煩燥悶亂余謂毒盛壅遏但分珠脚皴可治以人中黃每服三分酒漿調連進二服色漸紅活又犀角地黃湯加牛蒡蟬蛻痘綻凸起脹愈

一凡痘易起脹者慎不可與毒物發之恐中氣虛痘難成功也不易起脹者即微發之發之不起宜重藥攻之中病即起又有毒壅滯而不易起脹者升解為主有正氣痘疹傳心錄

虛不能起脹者溫補為主有脾虛泄瀉元氣下陷而痘不易起脹者補兼升提為主  
一兒痘起脹煩渴飲冷水不已余謂陽盛者飲冰雪而不知寒又曰大熱而甚寒之  
不寒是無水也治宜壯水之主以鎮陽光以六味地黃丸料加麥門五味煎與恣飲  
熱渴頓止愈

一痘盡起脹頂平而色淡白渴瀉肢冷喜熱飲余謂陰盛者飲沸湯而不知熱又曰  
大寒而甚熱之不熱是無火也治宜益火之源以消陰翳用陳氏異攻散又八味地  
黃丸治之愈

一痘五朝紅澤勻朗頂平陷瘍微連聲不續謂傷風失於表散邪客肺經治先清肺  
否則氣道不清養漿時難以補托用前胡甘桔黃芩花粉桑皮杏仁陳皮痰嗽稍緩  
但漿不易充用保元湯加貝母陳皮桔梗漿足收斂愈

一兒痘八朝患症似前初失清解臨危難治用清補兼行不效聲啞喰水飲食不能  
倒嚥喘脹十二日而卒

痘疹傳心錄卷之八

松江李林馥啟賢氏重校

西吳朱惠明 著

養漿口訣

七日之期順痘漿行半足危瘡纔發微光毒壅則頂滯乾紅氣盛而充肥光澤頭面行漿而四肢未起切弗慌張身肢虛泡而臉額焦枯且休歡悅氣虛而淡白少神根紅猶為善治毒盛而紫黑乾焦脚亦亦屬難醫色嫩而兼塌濶漿汁必虧皮薄更見嬌紅清稀不免黑陷乾枯急宜攻發更紋平塌當用溫補飲食減少而便溏本從虛論熱盛秘堅而煩渴還作實看火侮肺金痰涎喘嗽木乘脾土目劄無休肝絕則淚流不已胃敗則藏惡頻來腹脹氣急毒遏內攻錯喉音啞火壅咽喉漿清作痒皆由肺氣虛寒驚悸譴言只為心經不足漿行已半未宜收斂膿厚色黃纔應結痂若爾一齊收斂名曰倒曆莫認為如再宜攻發得宜此症猶堪再活復腫行漿危症也當善治

漿原

痘初出一點血化為水水化為漿漿漸厚為膿成結痂自然之序也漿始而色白者天一生水之義也膿厚而色黃者陽明脾土之正色也蓋漿之原腎水以始之肝血以榮之肺氣以資之心火以運之脾土以收之可見一物一五行之謂也

痘瘡傳心金  
一痘養漿乃成實之令肺金用事然必藉母之助以充實其膿漿蓋脾土為母若脾胃強能食便則氣血充實而中滿者盡起頂平者盡峻飽滿者光榮先長者先作漿次長者次作漿循循有序順也脾胃弱癱眇便則氣血衰微不能助痘成漿險也宜保元湯加白朮肉果陳皮官桂川芎治之脾胃損飲食不進則氣血澆漓痘無漿汁必喘脹悶亂痒塌倒蹙噦惡泄利等症逆也

一痘養漿而內却無水乾涸空虛此氣虛伏陷也若得人事清爽飲食如常痘無損處宜補中益氣湯歸草主之若喘脹噦瀉煩悶外剥者不治也

一養漿而瘡頭有孔膿水漏出堆聚乾結其色灰白如天泡此名漏瘡乃不治之症一有清水非膿無事自破水出而乾黑不成痂者凶也

一痘調密白色正養漿時而昏睡不醒妄言譖語余謂心主血血者心之神心血虛神無所依然而以保元湯加當歸麥冬棗仁茯神生地等治之仍不醒凶

### 附治驗

一養漿時大便下血或下黑糞或昏睡不醒或多睡者蓋心主血血虛邪因而入心神昏亂之故也宜犀角地黃湯安神丸若毒盡外出當以補中益氣湯加門冬生棗仁主之予驗徐氏女犯此症十二日而卒

一養漿時驚搐不止余以養血安神丸治之愈每有服藥不醒反加昏亂者不治

一痘八日空殼不成漿余謂氣血不足不能振作以制其毒用補中益氣湯治之發疔四五而愈經曰發疔發癰者生此之謂也

一兒九歲仲秋患痘八朝頂陷漿滯不行色見焦紫余視為外感風寒壅塞腠理氣血凝滯之故宜升提發散之劑紫蘇飲恐藥難頓達於面手足服藥之後宜用水楊湯浴之其藥氣藉此升提斯毒氣藉緩氣而發主人從之用水邊楊柳五觔以長流水一大金入楊柳在內煎六七沸先取三分之一置浴盆內候湯溫和先服前藥然後浴洗但兒力弱只浴頭面手足良久漸有起勢痘即光澤遂以補中益氣湯調理愈或有浴後不起反加煩悶氣急者不治凡用此湯必其氣血充足的為風寒壅閉者則可不然反臻虛虛宜覽臨症不可不察也

一兒痘漿不易充而色淡白余謂脾胃氣虛以大保元湯主之又以歸草湯益之愈一痘八日漿半足而煩渴熱甚飲引不已一醫治之以保元湯而愈加煩渴余曰此藥治稍渴則可今已渴劇當倍加人參為妙主人曰乳下嬰兒重補恐作喘脹曰譬之一杯水能救輿薪之火哉今兒煩渴已甚藥力輕微何能中病從此數劑繼以人參二兩麥冬兩半煎湯頻進漿滿渴止愈

一兒痘養漿時而嘔穢不止漿不充滿余謂胃氣不足也夫人以胃氣為本胃者土也土敗則木來侮之今木挾相火之勢上乘于胃其氣自臍下直犯清道上出於胃

門也故嘔噦者土敗之象也內經曰絃絕者其聲嘶木陳者其葉落病深者其聲噦不治之症也

一兜五歲患痘七朝微熱口渴自利醫擬木香散服之余視其利下皆臭滯陳積因腸胃熱蒸而下也此但虛而無寒只宜保元固中之劑治之自愈且陳氏立木香異攻之時必挾寒而虛者用燥熱補之若不挾寒而用寧不過於熱乎若或悞投禍不旋踵從治之而愈

一兒痘正養漿而喜笑不止余謂心火主笑經曰神有餘者笑不休以保元湯加人中黃黃連治之愈

一痘養漿時壯熱煩渴舌乾唇燥咸謂津液不足以保元麥冬而愈煩渴痘色乾紫余謂重膵厚被煖炕紅爐況痘原血熱而反助其熱可即撤去紅爐令其清涼以黃連解毒湯加牛蒡治之而愈

一兒痘已成漿痒破不已余謂衛氣暴洩津液不榮譬諸草木剥削其皮枯萎而死但得能食便調腫灌結疣方可無虞用四君子湯加川芎芍藥陳皮主之果復腫灌間有成瘡愈

一痘八日倒齶而色灰白泄瀉煩渴咬牙寒戰余謂氣血虛寒以異攻散治之愈間有醫之不止反加昏悶者死

一痘妄言卓立日夜不能眠坐至七朝尚不安寧余曰形色俱順而妄言卓立者心

肝二經火熾也

以犀角地黃湯加柴胡龍膽草棗仁治之愈

一凡痘黑陷倒蹙疎畔而瘀也腹脹悶亂若熱症宜奪命丹或五毒丹治之虛症宜保童

丸補中益氣湯治之

一或問養漿而脹痛者何曰氣滯也宜行滯氣以行滯散主之一有漿滿足而脹痛者勿藥自愈如表實過用溫補而痘脹痛者枳殼湯主之

一痘漿滿足而身痛不已余謂諸痛為實以芍藥白芷陳皮甘草牛蒡連翹山楂治之愈

一兌六歲痘七日根窠赤痛便祕渴赤煩躁飲冷或用清涼解毒之劑未應余謂熱毒內蘊以大黃當歸赤芍甘草一劑又用犀角地黃湯治之而愈

一痘八日根窠赤腫脹痛煩渴飲冷便下黑血余謂熱毒蓄內迫血下行以犀角地黃湯治之而愈

一痘八朝漿滿而身熱煩渴咳有痰涎余謂毒火盛而津液涸也以白虎湯治之而愈

一痘漿足痰喘急便實余謂肺氣實熱而過於補益故也以枳殼湯加牛蒡子連翹花粉腹皮治之愈

一或問漿滿忽爾泄瀉漸而漿縮者何曰皆由脾土有虧漿雖滿足因泄瀉以致元氣下陷故也當以肉豆蔻丸澀之以黃土一塊放碗內以百沸湯泡取水少加沙糖調參苓白朮散益之使脾土固自然漿復充足成疣而愈

一痘漿足膿俱紫黑熱盛便祕余謂血熱毒壅以黃連解毒湯加牛蒡子連翹治之

一凡漿足而不易蒼臘色者脾主結疣脾弱之故也宜保元湯加白朮芍藥陳皮官桂蓮肉收厚膚者吉膚如數薄者參苓白朮散主之

一痘漿足不易醫腹脹發熱而赤午後甚按其腹不痛余謂脾虛血少用歸芍六君子湯加陳皮姜棗數劑而愈

一兒五歲痘七朝勻朗綻凸紅澤而有行漿勢能食便調但兩臂脇腫痛如爪之狀余謂手三陽虛則毒凝滯不散也經曰虛之所在邪必轉之補其陽氣腫硬自消矣用人參黃耆甘草桂枝當歸山藥陳皮白芷羌活防風人中黃治之其漿足腫漸消而愈又一兒患症如前不以前法治之痘雖漿滿結疣其腫不退成膿損一肢而愈

一痘七八日痘痛不已醫咸以痛為邪氣之實也欲疏解之余視曰痘發于皮膚肌肉之間氣以喞之血以濡之毒氣變化而未成鬱而作痛此其常也乃不虛不實不

宜服藥若與疏解恐耗正氣經曰良將用兵善攻不如善守又曰悞服湯丸不如勿藥主人從守之愈

一痘成漿作痒爬搔潰爛余謂火濕併作也脾屬土而惡濕濕熱浸淫故痒而潰爛也譬猶禾稻將收宜燥其田以流濕調脾收斂之劑復加腫灌成疣愈  
一兌痘九日痘色灰白溏泄厥逆余謂元氣虛憊陰陽不相交接而四肢為之厥冷也以陳氏異攻散治之愈

一兌痘九日無漿倒陷余視根窠欲束以保元湯加穿山甲川芎官桂服之又以水楊湯浴洗頭面手足良久而復起成膿愈

一痘漿充滿忽爾一齊結疣乾紫能食便調余謂火迫而收之太急乃倒醫也以補兼攻發之劑十四日四肢腫痛成癰膿成毒化而愈 又一兌痘似前不食便溏噦噯余謂內虛倒醫毒歸于內喘脹而卒

一兌痘漿充滿腹痛泄濁咸謂脾虛以保元湯加白朮肉果陳皮木香芍藥治之而加裏急後重余謂飲食凝滯為積作痛宜用靖寇安民之法以厚朴陳皮甘草麥芽山楂神曲枳殼砂仁治之二劑痛止便利余謂食滯已盡宜補托之以前方調理愈一男子痘漿充滿根血淡紅瘀涎壅盛日晡潮熱皆謂氣血不足以保元湯加芍藥貝母陳皮治之不効余謂陰虛火動生痰以六味地黃丸料加參附肉桂治之而疾

絕熱去又補中益氣湯而愈

一兎痘漿充滿痰盛少食便溏余謂脾胃虛弱不能運化精微津液凝滯所致以六君子湯加炮姜治之而愈

一兎痘漿足忽泄瀉身冷自汗余謂脾胃氣虛以保元湯合附子理中湯加肉果治之愈

一痘漿正充足寢中汗出如浴覺來則息余謂盜汗也屬陰虛治宜補陰則火自降以保元湯合四物湯加浮小麥治之愈

一女十四歲痘漿正充足忽腰痛不能轉側余謂痘順審其經血去多之故以六味地黃湯加歸芍續斷杜仲治之愈

一痘倒屬黑色能食便下膿血余謂脾胃強盛毒雖倒入而能食可治也經曰脾病則五臟危今脾土既盛調理無虞以補中益氣湯加人中黃牛蒡子治之愈 又一兎痘症似前便行完谷雜下余謂脾虛以理中湯治之亦有不應藥而卒

一痘漿足漸而蒼老余謂中病即止不可盡剝宜靜守之不從謂曰脾主結痂治宜調脾助其結痂用小異攻散加芍藥山藥而喘渴身熱復求余治余謂內外皆實而妄用實補之藥正所謂盛盛也內經曰陽盛則外熱陰虛則內熱內外皆熱故喘渴也以寬中湯治之又口齦瘡發以清胃解毒湯治之愈

一痘養漿時昏睡不甦便溏能食余謂曰脾主氣因便而脾虛倦怠而昏睡也以歸脾湯加山藥芍藥米仁蓮肉治之愈亦有不應藥者二七而逝

一痘養漿時而便溏不已能食聲清余謂曰能食而便者可治不能食而便者難醫今兒能食而便知有胃氣經曰有胃氣而生以保元健脾之劑服之而愈

一兇痘九日正面平塌無漿自口以下俱紅綻能食便溏余謂元氣不足不能升於上以大劑保元湯白朮芍藥附子官桂肉果升麻十一朝空地補出贈痘諸痘俱行漿又小異功散調理愈

一痘正面漿足結疖能食便溏完穀身肢無漿余謂脾陰不足不能以統灌以參苓白朮散加附子菟絲子肉果又河車散愈

一痘九朝漿清作痒用大補氣血之劑其痒不止余用花椒一兩為末滑石末二兩和勻用生絹囊之摩按痒處愈

一痘養漿時根窠紅艷下午愈甚潮熱便溏天明而紅稍淡身涼下午復然余謂脾胃氣虛虛火盛而紅乃虛紅也治以保元調脾之劑愈亦有悞謂血熱用涼血藥灰白芷竭外剝而逝

# 千頃堂書局出版廣告

書

道

著

亭

東

汪

新安汪東亭先生道學巨子也自弱冠勵志研究六十餘載卒因至誠至誠感格幸獲真傳即著書進工續德累行竟至功成。凡生平著輯不啻道學南針較前代丹經尤為清顯透徹本局所專營經史丹書茲遇今代大家著作哲嗣汪甄青先生將故特託至友商請其宏道宗幸蒙先生允可公諸海內同志以家藏著輯各種秘本由本局印刷發行俾許已擇要者先行出板茲將書名列于下：

編合命性  
二元定價  
二角每部

一貫三教  
一元定價  
四角每部

合仙佛  
二元定價  
二元每部

統道大成  
五元定價  
十冊每部

因子莊  
四冊每部  
四角定價

雪子莊  
六冊每部  
六角定價

求仙學佛之書應來不可勝而直指真詮不為譬喻惟柳華陽禪師金仙證論慧命真經二書最為切當學者能於此兩編研究精深貫通會要庶于仙佛兩度由藩籬為門戶以企至于人室升堂不難矣茲用潘刻重付石印

仙

佛

真

傳

痘瘡傳心錄卷之九

松江李林馥啟賢氏重校

西吳朱惠明著

收醫口訣

痘瘡九日已結痂死如少不順方作膿窠漿成蒼蠍自宜次第收功陽亢陰虛必至停漿不屬痰壅而目直氣促血少而瘀痰驚癇氣虛而倒屬黑焦脾弱而痂粘麁薄一則溫補可興一則攻發而活能殲便結實則無邪泄瀉安寧虛而少毒肺寒利下膿粘溫補為上臟毒必然便血解利為先前發太過必爾潰爛難痂喘脹膨脹皆因半漿收屬錯悞音啞漿行飽滿無妨塌痒咬牙便實聲清可治屬來蓋硬變症終無痂結如麁須愁餘毒胃氣絕則口唇硬腫肝熱甚則目睛障白喘急發于瀉後總是氣虛而斷使結繼以渴煩皆由實熱而然泄瀉而煩渴不止理宜補益升提好飲而發渴愈甚經謂須分虛實內虛寒戰痘瘡無痒只溫經漿足難收便結熱蒸須解利進清涼以助結痂慎補法以防過益調氣血而得成功健脾胃而能收拾

一或問曰痘漿充滿候至結痂未知收拾何處也曰痘之膿漿雖是腎浚其源肝澄其流而發達榮養者脾也脾氣足則土來制水而乾于是邪氣散于外元氣歸于內是知痘始管紐在脾而終亦收功于脾此陰以故曰脾土固則痘易收脾土弱則痘難收拾可見土者物之所以成始成終也須從口唇兩傍收醫由胸背收至兩腿然

後脚上與額上一齊結疮乾圓堅厚如螺蜃者乃毒從外解上也頂破膿出堆聚如桃膠者次也破損而復腫灌結疮者又次也清漿收瘡如麩紙之薄而乾枯者險也破無漿汁或清水不成痂或漿汁腥臭或無漿而結疮皆逆也

### 附治驗

一痘漿足渾身臭爛十一二日而尚不收瘡粘衣余謂發之太過而又過補致使潰爛不能加以枳殼湯加芍藥米仁牛蒡防風治之敗草散敷之愈

一凡痘漿滿破損而倒曆者乃正氣不足用補托之劑而復腫灌成漿者吉亦有補托而復出一番贈痘于空處者此乃正氣不虧邪氣不留故復出于外雖過期延日亦不為害若補托不灌不腫贈痘不補安可治哉

一兎未週患痘稠密灰滯九日而尚空殼能食便結余輩謂氣不足倍以補托十一朝復出一番贈痘於空處灌漿而愈

一兎痘過期不易結疮余謂熱毒鬱蒸陽氣太盛無陰以飲之以清涼解毒收斂之劑又滾水調沙糖湯飲一二日結疮而愈又有因泄瀉而元氣外耗陰氣太盛無陽以斂之以木香異攻等治之愈

一兎痘過期不斂便溏安靜四肢少溫余謂脾氣不足以人參附子白朮茯苓陳皮甘草山藥木香肉果芍藥治之俱破損不成痂而愈

一痘收醫時而利下無度余謂水穀不分完谷不化此毒氣反驅脾虛不能制水以參苓白朮散加肉果芍藥為末煎參湯調下愈

一兎仲夏患痘漿足收醫而漏赤短澁外腎膚囊赤腫通明余謂膀胱熱甚毒氣流於小腸而然也以八正車前散又化毒湯治之外消散敷之愈  
一兎漿足收醫大便紫血不已余謂脾弱不能攝血歸經血隨火動妄行而便血也又云陰絡傷血從下行而便出以歸芍六君子湯加炒黑荆芥又獨參湯間服血止愈

一痘收醫乾黑黏着皮肉不脫身熱煩渴睡卧不寧咸云氣血不足大補益之四八日枯槁而卒 又一兎症類如前余謂毒火彌熾經曰火盛則水竭以犀角地黃湯加連翹牛蒡治之火漸少而諸症悉平痂漸脫愈

一痘收厚醫而乾黑黏着不脫身熱煩渴妄言譖語睡卧不寧余謂陰虛火盛以四物湯合生脈散加酸棗仁治之愈

一痘漿足收醫內復潰而生蛆余謂陰陽之氣鬱遏而生所謂氣化而生也川花椒湯拭之又清涼收飲之劑而愈 又一兎夏月出痘生蛆余謂蠅種此形化而生也以青帛蘸磬湯拭淨謹其幃帳愈

一痘痂結如皴薄粘着皮肉不脫昏睡內熱余謂脾虛少血之故以調脾養榮湯治

之愈

一痘清漿結汎如麩余謂正氣不足不能化毒盡解以補中益氣湯加穿山甲治之  
兩曲池發癰膿成而愈

一兌痘漿足收汎淡白如麩減食便溏余謂中氣不足以參苓白朮散加肉果陳倉  
米治之愈

一痘收汎咳嗽咽膈不利余以甘桔湯加牛蒡子陳皮連翹射干玄參治愈  
一痘收膚喘急腹脹皆謂倒膚不治余審其漿足如期厚汎向因能食過傷所致非  
倒膚而逆也以保和丸消之愈

一痘收厚膚而色乾黑身熱喘嗽余謂風寒客肺以麻黃湯得微汗而愈

一兌四歲痘出稠如綴粟平塌嬌紅血散不附唇口腫硬剥落一層又一層皮薄空  
漿破無血汁溏泄煩渴皆為逆候但能食安靜謂曰有胃氣則生用人參芍藥黃連  
各二錢甘草一錢日服三劑十四朝肢厥脉沉痘咸倒膚靜如死狀心胸尚溫次日  
漸甦而愈

一兌痘勻朗紅綻咸曰順九日漿足能食便調恃其順與粘米圍鴨肉熟粟食之腹  
脹痛停漿色滯用消化藥而便行安枕痘漿不長謂曰食物已消正氣受傷治當調  
脾益氣助漿收斂之劑不從同道少屏力主補益又不從十四朝內虛倒陷漿化為

水而復行補益不効喘脹而卒人實使然於天何尤故錄之以為傷食者戒  
何木參公子四歲於萬曆壬子季冬朔日始因外感身熱即報點于左大腿上形如  
饅首此乃元氣不足不能上升於頭面而下體先見也五朝齊出稠密身熱目閉頂  
平脚塌色白少神七朝而目反開張八朝而正面癢破瘻惡寒戰咬牙飲食少進大  
便泄溏上症雖為甚險然一本於元氣不足故用保元湯加桂附二劑而止而俱復  
腫灌堆結狀如桃姿兩目復閉但身肢灰白不行漿而歛大便泄如魚凍謂脾氣虛  
寒以前方加木香炮姜二劑繼用人參白朮甘草肉豆蔻附子木香共為末米湯調  
下十四朝而胃氣漸開小腿復腫灌成漿背上俱發膿瘡此為餘毒未解且下午身  
熱夜半始退為脾陰不足亟宜調脾清解為上故用人參生地芍藥黃連甘草防風  
連翹山藥茯苓知母數劑而前症悉平經曰大毒去病十去其八若此危症苟非參  
附之却何能臻此全功姑記此以為治驗之驗而因信人事之不可不盡也

卷之三

三

痘疹傳心錄卷之十

松江李林馥啟賢氏重校

西吳朱惠明著

醫後餘症口訣

且如痘成痂疣雖云生意已成餘症變遷猶未保全莫喜是故眼合腹脹踏轍危機  
肢體虛浮尚罹凶咎痂或成而反致失聲金為火室腫未消而目先開豁痘成內攻  
毒火盛而狂叫喘呼脾胃衰而痂粘不脫餘邪乘胃則利下膿糜熱滲膀胱則便難  
溺血經絡各留餘毒往來寒熱無時陰血皆由虧損日晡潮熱延綿肌消食減此名  
胃弱何疑能食便溏終患脾遺可慮凸肚擡胸毒乘肺胃張唇弄舌熱蓄心脾肝傷  
風熱目怕日而羞明胃中火邪唇口焦而齦爛咳嗽有標有本喘渴有實有虛數次  
清瘡虛寒客於脾臟若成秘結實熱下注大腸再觀痂落之餘研審瘢痕之色桃花  
光澤榮衛俱安紫色乾枯尚留餘毒粉白為氣血之虛枯悴實脾家不足偏體赤癩  
乃是失于解利渾身乾紫多因客冒風寒本毒未消而癰痘即發餘邪不盡而瘡癥  
隨生前後未及百朝風寒猶當重慎大小總期三月飲食何可苟貪

一凡痘俱收醫全賴脾胃強健氣血充足為上若脾胃強氣血足則醫易脫而疤痕  
紅活者為順若脾胃虛弱醫不易脫雖脫而痕色枯白紫滯者為險若有餘毒亦宜  
詳審故曰醫後當審脾胃氣血虛實而為之損益也

附治驗

一兒痘俱收，醫後身熱咳嗽聲啞，血痰而衄。余謂毒火乘金，越出上竅，以黃連解毒湯加門冬、犀角丹皮牛蒡知母四劑而愈。

一痘脫醫未盡，余審其內外無邪，不可與藥治之。治則恐傷其正，而變壞只宜避風寒，節飲食而已。主人從守而愈。一兒症亦如前，貪天功妄以補藥，調理反身熱煩渴，偏體發瘡，亦有妄補致肺胃邪熱，發為癰疹。

一兒醫後癰疹紫色，余謂餘毒熾甚，宜清解之。以犀角地黃湯加荆防翹，旁人中黃及調脾之劑，愈亦有不應藥而反加溏泄者，不治。又一兒症亦似前，或謂正氣不足，補益之即喘脹而死，又有失于解利，變為膿瘡，久久不愈。

一兒痘痂脫盡，正額一痘潰而不斂，四九日作痒，破出臭膿，即聲啞悶亂而死。

一兒痘痂盡脫，頭上一痘不斂，廿八朝忽痒甚，出蛆一盞許，亦聲啞悶亂而死。

一兒痘後，午餘潮熱，兩臉赤色譖妄，狂煩。余謂痘毒已解，而氣血兩虛，所謂火從虛發之義，以保元湯加歸芍黃連治之，愈。

一痘脫醫後，咳血不已，余謂餘毒鬱肺，以清金降火，開鬱解毒之劑，愈。

一醫後自汗不止，痕色淡白，余謂陰陽俱虛，以十全大補湯調敗，蒲散外用溫粉，撲法而愈。

一痘脫痂後身熱手足自汗不止余謂胃熱以人參白虎湯加黃連治之愈  
一兌痘痂脫盡能食便祕身熱口渴余謂胃中有蘊熱也經曰胃熱則消穀治宜利  
去胃中積熱否則鬱為口瘡等症以三黃丸清胃湯愈

一痘痂未脫偏身黃腫腹飽壯熱渴亦余謂脾胃有濕熱素積而兼餘毒不盡也宜  
消積滲濕解毒以丑補散又米仁連翹牛蒡淡竹葉山梔防風白朮茯苓陳皮蒼朮  
厚朴愈

### 痕色

夫痘之自生發至成漿結膿乃氣血拘毒生化自然之次序也要知痘後氣血之盈  
虧必觀疤痕之色可驗矣若疤痕紅潤如桃花色者此氣血之充足也若疤痕凸起  
紫色作痛者餘毒不解也疤痕凹陷乾枯色白潮熱作痒者正氣虛也經曰虛則補  
實則瀉中病則止不可逡巡失治以致變異

### 附治驗

一兌痘痕赤色咸謂餘毒不解以清解之劑不應余原其順期而愈此必乳母有蘊  
熱也以逍遙散加丹皮山梔木通等子母俱服愈  
一兌痘痕白色作痒渴飲便溏余謂脾弱而氣血俱虛以小異攻散加當歸黃芪防  
風治之愈

一痘疤紫色發班余謂過於補益以解毒化斑

湯治之愈

一痘痕白色肌肉削而溏泄余謂氣血俱虛而脾胃不足若失治日內猶防滯下之患當大補中氣使痕色紅澤二便清調後無虞矣不從百日內卒

一兇痘痕赤色身熱煩渴余謂餘毒不解以清解之劑而愈

### 痘癰

痘癰者即痘之餘毒也方其初出無論疎密必以漸而盡其發必以漸而肥漿必以漸而滿收必以期而盡毒已化盡無復他患矣若或出不能盡發不能峻漿不能足及至斂痂如皴薄粘着乾枯則其毒猶未盡若胃氣一弱不能為之保障則必內攻臟腑竟無可生之理必脾胃堅固使毒內無可容之地然後奔走手足曲池委中之處而為癰治以補氣血而兼解毒為主未成膿者內托而解之成膿者決而去之潰爛者益而斂之自無不愈若七日前後見者不可專治結痂後見者不拘何處辨虛實療之若偏身流注清水奔流延綿不已者不治之症也

### 附治驗

一兇痘五朝兩臂膀腫痛用解散之劑漿不能充毒亦不退反寒戰作痒勢在危急余謂心鑑曰痘之為症前後以十四日之限治者無得急治其標而緩治其本也經曰自人身而言氣血者本也痘疹者標也以痘疹而言痘疹者本也雜症者標也故

治雜症一寸則痘症落後一丈雜症未痊症已先斃矣內經曰標本不得亡神失國標本已得邪氣乃服治宜補托為主得漿足收症標本兼治可也乃以保元湯加丁香官桂白朮陳皮治之漿足而痂又以托解之劑其毒成膿而愈

一痘兩足脛痛甚不能伸曲亦不紅腫余謂氣血不足不能榮養於筋骨致使不能伸屈也治以歸芍四君子湯加肉桂牛膝獨活米仁連翹等十數劑而愈

一兒患痘紅綻而稠密漿雖滿而不能蒼老四肢清水痂雖成而少神氣亢如麩薄十二日兩肩臂腫痛咸謂餘毒不盡用養血解毒藥而增倦怠神疲毒不起亦不退余謂陰虛而毒凝滯不化也故曰虛之所在邪必湊之宜大補氣血而兼解毒得氣血調暢則毒遂歸一處得膿成毒化遂用四君子加黃芪陳皮當歸芍藥白芷羌活連翹金銀花重劑補托加減調理成膿愈

一兒患病類前專以解毒之劑致傷脾胃而藏濁無度四肢厥冷余視謂濁耗真元用附子理中湯加肉果木香日進二劑肢熱疼痛而腫再以四君子湯加黃芪金銀花白芷調理成膿愈又一兒症亦如前但以解毒而不固元氣毒不腫痛清水奔流元氣脫絕而死又一兒症亦如前醫內解毒而外圍敷腫退攻內腹脹喘急而卒又一兒患症似前只以圍藥塗敷腫雖退而毒不化凝滯筋骨不能伸屈損一手一足而愈

一兒患痘雖稠密而裏實過以補益而生癰腫余曰裏實而補則生癰毒今口渴煩躁二便祕結以三黃丸利之再以清解之劑調理腫消毒散而愈

一或問曰兒患痘癰發於兩小腿下歲餘尚潰腐不能解毒口收何也曰蓋膝以下至陰之分經曰足為純陰無陽氣以充托况久膿血淋漓氣寒血弱而所以毒不易化肌肉不長也治宜補脾胃助元氣得陰陽和協毒自運化而解矣以千金托裏散加牛膝檳榔何首烏土茯苓之類漬出嫩骨漸收口而愈或問生多骨者何也曰毒久不散則陰陽交錯凝結成質而為之也與地四生金之義同

一兒患痘毒流注四五千兩肩臂痘死如皴薄而少神粘着不脫余謂氣血不足故也以十宣托裏散服之又玉龍膏塗腿兩曲池又鐵箍散圍肩毒留孔成膿以針刺穿以吸筒吸出膿血調理而愈

一兒患痘毒出清水脇診微弱面色枯白余謂元氣虛寒以保元湯加桂附白朮治之膿漸濃厚正氣復而愈

### 疗

夫疔者釘也蓋氣位弱血分不密其毒性不能自散故聚結而成其形也若氣固血盛則毒受制歸附豈有是耶若疔結於四肢不近臟腑雖抵穿筋骨無害也若結於背腹恐穿臟腑慎宜治之斯症必潰出釘根以生肌散敷之長肉膏貼之內服調氣

養血解毒之劑

附治驗

一痘清漿結疣四肢發疔數處能食便調余謂脾胃堅固無虞以內托解毒散治之  
潰出疔根以生肌散敷之愈

一痘漿清結死便瘡減食發疔二十餘處皆謂發疔發癰者生余謂此餘毒聚結藉  
正氣足潰出釘根而愈今見脾胃氣虛不能當其毒毒反勝正以內托解毒不効其  
疔乾陷十四日死

一兜漿足厚瞼發疔數處壯熱煩渴能食便祕余謂有餘之毒不盡以四順清涼飲  
治之愈

目論見前卷

痘瘡害眼不在于初而在于收瞼之後皆由頭面痘密膿水膠固或破爛而復腫灌  
毒火鬱蒸內攻于目又或痘出太盛或就遲緩或過服辛熱或失於清解或啖辛辣  
或逼受火氣或厚衣衾蓋或客冒風寒或恣食諸卵皆能害目治當活血解毒是為  
良法也

附治驗

一兇痘後目胞紅腫不開瞼內復灌難收余視謂血熱毒壅不解以當歸生地赤芍

連翹牛蒡甘草荆芥防風黃連花粉等治之愈

一痘後目赤腫痛疤痕紫色身熱煩躁余視為毒鬱心肝也蓋毒火盛而刑肺經金  
衰不能制木木勝則心火炎上肝開竅于目心熱則上衝於目矣以犀角地黃加龍  
胆草連翹草決明牛蒡治之愈

一兜痘後目胞紅腫不開余謂過服辛熱之劑而口舌生瘡咽喉疼痛以黃連解毒  
湯又犀角地黃湯治之愈

一痘後目患羞明而不紅赤余謂腎水不足血少神勞也以益陰地黃丸治之愈此  
壯水之主以鎮陽光也

一余每驗數兜患痘後目赤醫以眼藥點之雖愈而毒鬱不散後復赤腫瞳神突陷  
不治

### 口齒

蓋痘後口脾開竅舌齶之生瘡或牙齦上齦屬足陽明胃經下潰爛者皆由餘毒不  
齦屬手陽明大腸經

解乘于陽明薰逼上焦而然也宜清胃化毒湯犀角解毒丸主之又人中白散敷之  
桑根滋抹之若醫之不止唇腫面虛昏睡聲啞飲食不進穿頤潰齒者凶也

### 附治驗

一兜痘後口中糜爛生瘡余謂膀胱移熱於小腸隔腸不便上為口糜大承氣湯利

之又用柴胡地骨皮煎服愈

一痘後口內生瘡以涼藥不應余謂中氣不足虛火泛上無制用附子理中湯反治冷服而愈

一兌痘後唇口蠕動余謂唇者脾之華口乃脾之竅又陽明之脈環唇口而交人中陽明胃也是以脾胃虛者多有此症以六君子湯補中益氣湯愈

### 咽喉腫痛

蓋痘後咽喉腫痛者皆由毒留于管籥仍或過用辛溫補劑以致毒火刑金不能清肅而成內鬱積熱相搏而化為火火性上炎而咽喉為出納之門戶故使腫痛耳經曰鬱火可發又曰實火可瀉必先解散而清利之又有脾胃虛衰則元氣不足坎離不濟不能使水升火降故火炎無制得以乘其土位其勢上騰結于會厭故為痺而腫痛也經曰一陰一陽內結謂之喉痺又曰虛火可補宜補益而兼清潤之藥臨病宜審虛實補瀉而治勿溷一途也

### 附治驗

一兌痘後咽喉腫痛窒塞不通余謂餘毒蓄于心肺致生風痰壅盛邪熱不泄以桐油用鴛飼蘸吐之馳源散服之又甘桔湯加牛蒡連翹射干等治之愈

一兌痘後咽喉腫痛余謂客受風熱蘊積上焦以甘桔湯加牛蒡荆芥升麻防風羌

活治之愈

一兜咽喉腫痛余謂真陰不足相火挾君火之勢上行而然也治宜壯水為主以制陽光不信以寒涼藥治之愈而復腫反覆數次不愈復迎余治原其正治火為寒鬱先以附子理中湯二劑駁其寒又六味地黃丸料加知母麥冬元參又以葛槿散吹之愈

一兜痘後咽喉腫痛余謂脾胃不足陰火上炎以內經從治之法用四君子湯加桔半旁子黃連知母治之愈

一兜痘後咽喉黑陷余謂喉疔以紫葛地蜈蚣等分犀角另磨右前二味或煎汁或搗汁和服而愈

瘡瘍

凡痘後生瘡皆緣痘時失於發解或失於補托過於溫補致毒蘊于陽明賴正氣不虧內不容邪故發于肌表而為膿疥瘡瘍宜辨虛實治之若疤痕紫凸身熱煩渴便祕溺赤者乃餘邪壅盛宜四順清涼飲犀角解毒湯主之若疤痕淡白凹陷瘡潰不欲潮熱便溏者乃脾虛不能收斂宜健脾收斂之劑四君子湯加芍藥米仁防風木香黃芪黃連連翹主之以綿繭散敷之如瘡瘍而二便清調者此餘毒在表宜托裏解毒之劑黃芪甘草當歸芍藥米仁金銀花防風牛蒡主之若瘡久而肌肉羸瘦潮

熱煩渴者乃氣血虧損津液枯涸治宜固正氣之劑十全大補湯補中益氣湯主之又有痘後客冒風寒鬱於肌表而為瘡痍者治宜解散為主又有厚衣溫緩坐卧火坑過食煎燙發毒等物而為瘡痍者治宜清解為主若四肢瘡盛者四肢屬乎脾胃乃毒滯於脾也宜三黃丸利之

一兒痘後瘡痍過投清解藥致毒鬱不解或隱或見余謂毒為寒鬱用百解散得汗而瘡再作又調脾解毒愈

### 痘毒流注

痘後流注皆由餘毒盛而元氣不足不能逐邪併歸一處而成癰故流散數處漫腫結塊作痛或微痛治法只留一二成膿其毒得泄餘當以王龍膏圍退藥宜固元氣為主用十宣托裏散若毒不赤不腫不痛或成膿不潰者皆元氣虛也宜用人參托裏散先補而針之庶使毒氣不致內攻氣血不致脫陷若膿出濃厚而痛二便堅閉者毒未解也先以四順清涼飲又托裏化毒湯若膿出清稀而反痛者氣血虧也用八珍湯加金銀花膿出而內熱晡熱者陰血虛也用四物加參芪白朮黃連其膿濃厚乃元氣不脫尚可治若不赤腫而清水奔流者此元氣不足不能成功也宜大補元氣或有生者用十全大補湯若煩渴壯熱左脈浮而無力乃血燥火熾也宜用六味地黃丸料加當歸麥冬人參主之凡治痘毒當審陰陽虛實毒之微盛中氣強弱

而治不可概行敗毒以傷胃氣若胃氣有傷多不能成功慎之無忽

痘毒禁敷寒涼藥

癰腫用敷藥當分陰陽虛實而兼用內治之法不可概敷涼藥若紅腫焮痛熱渴脈數而有力痘痕赤色者此毒盛而正氣足乃陽毒也用活命飲又清涼解毒湯若能食便祕用四順清涼飲下之外敷抑陽散則毒自消瘀滯自散若堅硬微痛或不痛肉色如故痘痕白色不潰不欬少食便溏者此脾胃氣虛乃陰毒也宜用托裏回陽湯外敷玉龍膏則寒氣自解陽氣自復若其勢欲潰者以鉄箍散圍其焮腫以俟出膿若元氣虛寒不能消散或潰腐而腫不消口不欬者必用溫補庶可保全若陰毒而外敷涼藥則腠理窒塞氣血凝滯毒氣益深良肉反死如內服寒涼敗毒之藥非惟有傷胃氣慮成虛虛之禍蓋曰胃氣得寒不能運行瘀血得寒不能消散死肉得寒不能潰腐新肉得寒不能化生其害可勝道哉

癰腫無頭用刀針法

癰腫已成當分邪之在表在裏可攻可補膿之作與未作膿成者當分膿之淺深高漫已潰者當分膿之濃厚清稀痛之止與不止又當審經絡表裏虛實若焮腫而軟者發于血脉也腫硬而堅者發于肌肉也肉色不變者發於骨也治法毒將成者解散以消其毒已成者托裏以速其膿膿已成者當驗其生熟淺深而必針之以指輕

按便痛者膿淺也重按方痛者膿深也按之不起者膿未成也按之即起者膿已成也若膿未成而即針則泄其氣血而膿反難成若膿已熟而不針則腐潰益深而難收斂若膿深而針淺則內潰不出外血反傷若膿淺而針深則膿難出而良肉被傷凡針後以紙撲蘸香油納入針口以膏藥貼之庶口不閉再放膿亦可也

# 千項堂書局出版廣告



唐書寫信必讀 二角 六本	定價四角 詩法入門 每部二本	宋元明 每部二本	對類引端 一角 每冊
商學界尺牘新編 二角 二本	三百首 二本 二角 每部二角	賦學入門 四角 每冊	正草千字文 二角 每本
西湖佳話 二角 四冊	略論一 五角 二部	楹聯編 三角 八部	正草習字帖 三角 每本

西湖佳話  
二角  
四冊

略論一  
五角  
二部

楹聯編  
三角  
八部