

午42

49

張氏痘科案

鄧崇德藏

張氏痘科案

壹本

附痧疹門

張氏痘科案

號對揚琴川人

看痘要論

凡痘一身之中。以頭面為要。而頭面又以天庭為要。  
書云。頭面行漿。四肢未起。見之切勿慌。張信然。看法  
以形色為要。而形與色尤以色為要。色者神也。而尤  
以神氣為切要也。如紅為險矣。而紅必鮮澤。雖紅何  
害。白為重矣。而白不灰滯。雖白何妨。書云。珠不在大。  
在乎体之明。漿不在足。在乎色之正。曰明曰正。是即  
神氣之謂也。得之于心。明之于目。則痘之千變萬化。  
吉凶定于心目之間矣。或曰。看痘只看一點眼光。此  
言深合其意。神而明之。思過半矣。

出与不出辨

凡小兒感冒風溫。身熱氣羸。病家每云阿出痘。初學遇此。只好含糊難決。不知熱肺病。喉中水鷄聲者。一不出也。連声咳嗽者。二不出也。黃膿鼻涕。眼眵模糊者。三不出也。并有見其頤腮腫脹。舌碎苔瘡者。決不出也。身熱晝輕夜重。或晝靜夜作。亦無出痘之理。如此可定其不出痘矣。若果出痘。熱必壯甚。面紅乍嚏。鼻氣出粗。睡中驚惕。目中含淚。至切者。診脈之際。手指微掣。燈照之時。恍惚畏火。皮膚內必有一二處點粒。隱約可定其必出痘矣。若前風熱。決無此等見症。細心審視。形症兩途。是否可定。不被其惑矣。

看痘要法

看痘之难，在見點出皮之際。決定其是痘，是癆。是  
癆，赤痘。不致差悞。取信于人。以後勢如破竹。緣此時  
看法。全在心悟神會。難矣。不可言語形容也。出痘之  
見症。已略言之。今再畧言看法。燈宜斜照。不可正視。  
所謂欲視其左。火移于右。欲視其右。火移于左。欲視  
其上。火移于下。則皮膚毫毛、洞悉其中。點粒之透。如  
筍未出土。根在土中而有地點露于外而不浮。初見數  
點。再以見症參之。可決矣。若見點已多。但可得其通  
體神情。不可逐一泥視。反生疑惑。愈看愈精。此時要  
着。馳其點之畧大都。其頂必有紫紅紋起。湏尋至嘴。

角及手指頭處必有一二點起癩者。決痘無差。  
可將週身之疑惑盡徹。所謂菜蔓紋者。頂平如螺蛳  
齷也。若痧疹水赤。決不如此。痘瘡形如惡痘。赤痘  
初萌。宛若狀元。但赤痘不能遍。或身有而頭面四肢  
不見。必有一二處歪斜不正。大點水泡者。痘瘡則  
盛行時氣。殼屑繁紅。與痘之菜蔓紋點迥別。此言其  
大意耳。神而明之。存乎其人。

吉凶論

夫看痘第一原在乎稀密。及体质之大小強弱。以諒  
其吉凶生死。蓋稀疎明潤者。十不失一。繁密黯枯者。  
十無一二。其稀疎而不治者。形色並惡。內症無善。毒

火燔毒氣。血被囚之症。雖能久耐。不治者多有痘。雖密而体大質強者。灌漿時飲食倍進。內症安和。漿色蒼老。最易收功。所怕者歲內幼小而佈痘繁稠。形色雖無大惡。所謂小艇重載。每多傾覆之虞。此等氣虛毒盛。調治雖工。又怕其灰漿自滯平塌。不能充。倘能延至圓癟。尚多風險。大極痘多質弱。氣血不能充。灌漿色必灰。但頭面胸背必充滿有神。黃色有正方保無虞。若純乎灰白無神者。惡症自然漸增。變端亦可預。夫痘雖以形色辨其吉凶。然內症尤為緊要。參合而覽。相機而斷可也。

見点痘症

凡痘初見點時。而神氣昏昧。煩悶不寧。天庭平塌。形如疹塊。隱以色黯無神。有若煙迷霧罩。細看週身。必現紫班藍點。此等毒重壅遏。元氣被陷。將有出而復入凶危反掌。即或發出。總無佳兆。書云。天庭為看痘把柄。信然。

### 緊細寬濶

凡痘最喜者。緊細。頂蓋緊細。則易于純熟。純鑿。則易于回膚。痘雖稠密。內症平安。自一路順行佳境矣。最忌者。粗寬。平塌。蓋元氣不足。不能充拓。漿行仄滯。血不歸依。痘雖稀疏。內症不寧。眼開鼻通。泄瀉不食。搔痒不安。咬牙寒戰。毒不能化。諸症由是而來也。

一見頂陷漿灰。扶持到十三朝。忽然兩目模糊如霧。  
神氣如喪失守。此精氣神交脫也。

寬緊為要

凡看痘所長在看。不在乎治。看法精明。有可以前知  
之巧妙。吉凶順逆。書載明悉。稀者為吉。密者為凶。此  
言其常耳。其大要全在乎寬緊兩字。寬者。頂平脚潤。  
萎軟無力。如漬糊漿之狀。雖稀少而未足稱吉。緊者。  
頂滿滾圓。形聳脚附。如見露珠之形。雖稠密而未必  
云凶。寬必潤大。雖少見多。緊則細小。雖密反稀。寬者  
先善後惡。緊者先凶後吉。所謂雖甚密。變拘恒少。雖  
稀疏。交拘恒多。此其故在乎元氣之旺。与不旺。氣血

之足与不足耳。又有稀少之痘。而遇壮盛之体。点必粗大。漿行飽滿。回虧反遲。稠密之痘。尖細漿清。回虧迅速。如樹木之花朶。稠密稀少。肥瘦迥別。亦在乎元氣之充足。毒火之輕淺耳。

寬症

凡遇寬痘。初起三四朝甚。覺平常。至五六朝起脹之期。但見平塌不振。根脚不榮。毒不化漿。變端漸起。泄瀉咬牙。不食。梟瘡之症作矣。質小者。每多如芝。有体質稍大之體。原可行漿濃厚。頂陷漸起。但根窠不敵。色白不榮。漿雖濃而未能充。頂雖起而未能滿。如此。都閑竅在乎收虧。每多潤塌。難收。而不能滿。如此。

結浸淫潰爛。膿水淋漓。甚至兩腿腫脹。濕熱淫于下部。陰液日傷。淹瘦削。食少微熱。症成不救。此其故。小兒癥氣素虛。見點以後。飲食總不能充旺。元氣虛而不振。毒火滿而不化也。

繫症

所謂繫者。週身稠密無隙。界地不清。初看甚為險重。至三四朝時。邪退解起。勢尖聳。界地分明。周身自朗。漿行迅速。一脹成功。名曰火裡漿。此易回易虧易落。痘後亦無交症。有月內之孩。遇稠密之痘。尖聳細小。淡薄清漿。即時回虧。即時痂落。飲食如常。此極順之痘也。

脚红

有等痘粒分窠。根脚纯红。至六七朝。红脚不化。如珠红圈附平极。不熟。窠囊微老。见之切勿慌张。八九朝。自能腐熟成浆。圈红渐化。治之惟凉血清托而已。勿进归芪温补。此与根脚红而散漫不归附者不同。

娇嫩

痘喜鲜泽。理固然矣。有一種油光之色。薄嫩娇红。多见于月内之孩。痒塌最易。勿悞为喜。

綢紋

行浆之际。而起絳纹者。甚非吉兆。此必薄嫩。無浆泉。痒之基也。

不治症

痘後音啞無聲者必有瘡。逆毒歸于肺。喉瘻猝發可危。或穢臭異常。痘形乾剝。或流水太多。浸淫濕爛。毒滯皮膚也。多不治。又灰漿而乾萎不振。當屬期而不屬拈。玄如脫者。氣虛不攝。毒不肯化也。亦難治。屬破成窟。凹而如眼者。多不治。

傳變不治

凡惡痘後、穢臭不堪聞者不治。尸臭者死。二十朝期。兩目犹不能開者。或開而但見白不見黑者。不治。惡痘糾纏。將欲傳變。必作戰慄。戰慄則毒陷矣。凡見痘後、惡症畢集。而聲音反清亮者。勿以為喜。多有喉瘻。

猝交之膚。

辨色凶兆

凡小兒肌膚白嫩者。痘必鮮明。蒼黑皮龐者。必多晦黯。但鮮明者。每見嬌紅薄嫩。晦黯者。反得蒼老濃紫。又有素患疥瘡。或膿窠瘡癧。血液恒傷。皮膚瘦黑。于此見點。安能鮮艷。兼之瘡點初萌。與痘無異。黑黯之中間雜。臨症最难体認。夾瘡攢聚。痘多險重者。以有瘡之併行漿。最易梟痒。况痘必乘隙而攢簇也。有一鄉童。肌膚卒黑。兼患疥瘡。見點三朝。天庭平闊。週身昏黯無神。点粒雖勻。氣血兩虛之象。行漿有阻。至七朝柔軟而圓。諸症平和。似屬可生。九朝診視。微

覺氣息常促。目光少神。明日而去。可見天庭平潤。陰  
症之魁。色黯少神。無漿之徵。無漿無彩。欲望其生。本  
屬難矣。雖諸症平和之中。略見氣促即交隔之機。所  
以每論氣促者。凶危之兆。而痧痘尤關急務。臨症其  
可忽乎。

起脹盤頂膿色論

痘之根透。則為起。囊綻。則為脹。起居先而脹繼之也。  
起脹之後。必曰盤頂。何謂項。聳透而起項者是也。何  
謂盤。外圈而紅者是也。項者。氣所主也。盤者。血所屬  
也。頂白根紅。氣專血附。而膿始成焉。無項者。寬塌不  
聳也。無盤者。根無紅暉也。訣曰。有盤有項。終須貴。有

項無盤却不宜。是尤以盤暈為要也。蓋根窠者。血之暈。膿者。血之腐。故曰六日以前。專看根窠。無根窠。必不灌膿。六日以後。專看膿色。無膿色。必難收腐。無項。無盤。氣血並病。如瘡疽之漫散。無拘成漿。毒化不甚。難乎見此痘者。勿以為毒火尚輕。不甚稠密而忽之。

辨悉真假

痘与痧疹水痘九焦。初見点时。每多芝似而非。有一種点子分裸。燈照有根聳起。宛像痘形。俗名硬癟芝也。曾見一児面部數点極肖痘形。周身確是痧疹。又見一児背部數点酷肖。餘皆癰瘍。但形雖肖。而神氣呆。雖有根而色仍浮。今日甚。明日反呆。後日

便小欲退。不若真痘之朝夕起換形色也。蓋真痘見  
形。斷不獨在一處。即數點之花。亦必四散佈。且痘  
出之發熱。如果狀元。亦必壯熱二三日而始發。此則  
似痘之見。不覺其熱。或微熱。即發。熱勢迥別也。况痧  
疹以見。確切大局已定。數點之相像。不足取凭。即水  
痘。疫痧。疑似之間。必尋其一二處確實者。定之為準。  
此初學之呈式。神明在乎得心應目。熟悉其情。自能  
無悞。又非筆墨所能盡道也。

### 重險之機

凡痘見點焦渴乾紅。神昏煩痛。點雖不密。不問而知  
其險矣。有見点至三日。甚覺稀勻。神情安頓。四朝煩

熟而後倍加六七五六朝而續發漸密此毒火蘊藏可謂深而不露更屬險矣須知此等症見點稀身神情安頓之時其点粒必呆鈍平潤其色必自淡不榮有一種煙雲霧罩之象呆常不靈之情如呆補也花已三朝將見項白根紅如春花之在露日漸向榮如白滯為虛矣苟非瘡癆失血損憊之處斷無見點而驟虛之理故學者見此齷白不舒之假象細心參視勿便許以為稀決斬先机更可無疑而取信如此則神明可博高手可称矣

氣血拘囚

有窠粒雖分周身稠密雖不濶大細小拘緊而色黯

無神乾枯無光四五朝期似欲死而項不充似欲脹而根不放如花朵之萎悴不榮必至乾焦退落成漿之望蓋亦難矣此非繁細可比乃氣血拘因之症毒火燔炙根窠不放氣枯血涸成望何期此細密中之凶惡症也

毒從漿化論

古云痘症在乎看不在乎治看法精明吉凶可判吉者自吉凶者自凶若順症而誤棄犯禁雖悞無方逆症而極力挽回變端難禦故曰不在乎治確然即視血熱毒甚紫滯繁紅之痘貧家無力用涼至成漿而毒化矣即或用藥犀羚黑連紫艸大黃多進人何曾

見其清徹如應耶。總俟成漿之後。根紅淨斂。毒泛漿化信矣夫。不過初起至于三朝時。邪与毒火渾清之際。清解攻逐。挫其銳氣。分泄其威。俾得可以起脹。即可以具行漿。既行而毒不化者。未之有也。

### 惡症辨運速

凡見点天庭蒙黯。固屬險象。有週身勻朗數点。但見白沫不榮。形呆平潤。点立稍大者。頂焦紫滯。此毒火奇伏之見端。其淡白黯滯為假像也。頓見紫黑藍班。大如菜豆。并有青胖腫塊。痘交焦枯。此毒火衝突。氣血傷殘。去生甚遠。然要看其神情之靜躁。体质之大小。靜而大者。犹可延挨。若躁而努氣。神亂如慌。危期大

最速不出三日緩則五日至七日總難遇矣。

輕重善惡論

痘之吉凶在乎点之輕重善惡固矣而尤凭体质之大小以斷如肺經低痘質小為險而稍大則能任若係少壯則險可為順矣何者全在乎元氣之充盈耳故看者要看元氣內五行之工夫有等期歲之孩佈痘稠密即有小舟重載之險但要看其形色如鮮紅潤澤無小頂尖者火氣一清其色即轉行漿回虧迅速成功有紫滯形平無彩無神潤大雖拘所謂紅私約白不似有火若無火煙霧漫漫油光閃閃清之不徹攻之不起惟見櫛潤扁大薄嫩綿綿而已此元

氣之不充。氣血之有限。而不繼領。逐負載耳。一鬼見此神情。四五朝似若可觀。此外象搭架子。其實行漿甚難。一醫許其可治。直至八九朝始得漿來。十朝漿貫。甚為有功。至十一朝而喘促幾逝。耐過平復。未回續貫。自疹透發。愈見其功。至十三朝又喘。兩目試之無光。此元神大傷。外雖榮貫。內寢耗空。难免無虞。医者犹謂必湏白疹遍倅。臭汗通身乃妙。十五朝果然。主賓狂喜。十六朝而猝變。此元氣盡洩于外也。安可置之不問哉。

血熱毒甚論

凡血熱毒甚之痘。紫滯焦紅而得以生全者。全在乎

倅大稀疎。氣血充盈。自能開落化漿。紫紅之紫附者。  
以化。大忌其乾枯晦黯。全無光彩。氣血被囚。毒火燔  
炎氣血。幾于死矣。安望其領逐負載而行漿耳。再加  
之稠密質小。去生甚遠。蓋痘賴血氣以成漿。毒假膿  
成而始化。氣血無主。則毒大任其肆虐。不至焦頭爛  
額。不止耳。有痘至三朝。尚屬疎朗。惟見項焦呆滯。至  
四五朝而漸發漸盛。紫滿乾紅。此毒火之深藏固密。  
晚發來遲。最為凶惡。反覺神清氣平。寢食相安。此犹  
猛虎未威。轟炮未經引線也。漸至面如橘皮。色若胭  
脂。成望何期。有紫沸焦紅之痘。雖不至乾枯晦黯。重  
用涼血清火逐毒透肌之藥。至五六朝繁紅不減。火

不清徹。脣腫而硬。疾多喚嘔。肺胃如焚。最為凶象。痘雖有起脹之形。但見薄嫩油黃。雖而不密。發則不能勝之勢。可見清逐而火毒不退者。皆為虛症。不能駕馭。或毒火固密之而為也。此等症在體質之稍大者。或可十全三四。質小之軀。安能耐風險之數重哉。

順險逆論

凡痘之發熱也。和緩神清。固屬佳景。有晝輕夜重。日則神清氣爽。飲食如故。夜則熱甚神煩。語中帶訶。汗洩嘔吐。必然順候。蓋有汗則邪達。嘔吐則毒氣鬆發。雖極順之痘。必有此兩三日發越之徵。若不嘔不汗。悠悠而來。或灼熱昏煩。腹疼腰痛。每多重候。此起伏伏

必然之理也。又如順症之來。與逆症之見。自有見症  
神情可以平斷。何待三日而方稱高列。惟症之險者。  
可進可出。介乎生死之間。則當以体质之大小。與元  
氣之強弱。參酌體裁。權衡而量度之。然犹必至五六  
朝期。而吉凶始判。若三四日方張邪正渾淆之際。進  
出恐難預擬。何者。專看元氣之用。加与不加。耳。元  
氣用加。則頂白根紅。氣血分也。磊落起勢。可以駕馳。  
其火毒也。所謂四五日間。不加。則後必有變。旨哉斯  
言。然有五六日起勢搭架。至七朝而癟塌遂形。此必  
形寬。不振薄。嫩絳之輩。元氣之不能用。力也。如是。

治法辨論

乙卯年痘行甚久。自春夏甚多。酷暑暫停。秋冬尤盛。  
火毒之症多。而溫補者百無一二。予少年時。尤聞有  
用參茸香桂收功者。今也則無。殆天地之大運使然。  
並非今時之體氣偏強也。然溫燥難接。血熱血燥故  
也。而補氣補血之藥。豈可概置。蓋痘至。起脹行漿。氣  
血外行。氣血用事。則氣血無有不虛者。況伍寒涼攻  
逐之後。再兼燔蒸數日。氣血烏有不被其傷者乎。當  
此用事。外行之際。豈可不少助氣血。以成漿緣。據假  
化。此時之補氣養血。既應動外行之機。毒火自赫解  
之。不宜而參茸。割之並棄乎。今有家門一概屏

序。香芷嫌燥不用。紅花嫌溫不用。若香芷嫌燥。以有  
防風。天蠶在內。情有可原。然可用熟地。則香芷亦可  
用。至于紅花。初用則活血破滯。涼血清火。藥中用之。  
不至寒凝冰伏。起後藥中少用。則養血活血。俾血熱  
甚者。可代引帰之辛溫香竄。安可以溫字嫌之。此不  
學偏執。擅奇獨創。遂使良法見疑于世。古人之成績  
幾泯。殊為可嘆。并見其生地用至數兩。天蠶用至兩  
許。殊不知痘之起。脹行漿。全賴胃開能食。未有不能  
食而能起脹行漿者。陰柔膩隔之藥。豈宜越界多投。  
天蠶攻漿。用于起脹行漿之際。以助歸黃之勢。多投  
其勢。來者五六錢已。殼其用。其勢不來。即用數兩亦

何益耶。總之氣血充旺者。起脹有自然之勢。行漿有不假之機。藉此二物之多用。以為血可。乃至漿能。獨致揠苗之患。果何謂歟。故當毒火方張。攻毒寒涼之劑。切不可率意任情。用無盡限。以存元氣之後用。須要明其毒。難盡逐火。無盡解。必使毒從漿化而後已。不見夫窮鄉之輩。僻巷之兒。不服素者甚多。然人能起脹行漿。始終無事。即有伏火伏毒。痘犯險逆者。亦非大黃犀角黑連之儘用所能挽救也。明乎此。則一切險毒之藥。如峰房全蠍地龍桑虫地蠶虫穿山甲等。何嘗有益于用哉。可以置之勿論。若參葛茅葛。行漿切用之藥也。有元氣不振者。痘雖脹而項不起。橫

潤大而漿不滯。皮老色蒼。攻托可起。用保元引帰加  
天玄香芷查肉角針炒元米鷄頭效如響應。然必音  
清麻食。睡卧安寧。不癢不躁者。雖八九日尚呆。投之  
可望。凡一切漿清色嫩。元氣薄弱者。皆可助其起。當  
因勢補托。俾得毒從漿化。若無起發之勢。則毒重壅  
遏氣血。渾一決非補托所宜也。大忌者。皮薄色嫩。寬  
塌絳紋。療塌之變在邇。雖用補托。亦難望其有為。此  
同一潤大。同一項平。而在皮老之老嫩。色氣之嫩蒼。  
大不相同。惟血分瘀熱之症。根脚純紅。緊圈如線。痘  
形板滯不鬆者。宜滋化清托。如天玄生地丹皮丹參  
元參查肉。紅花角針。防風甘草犀連。荆筍之類。又有

油紅光亮赤色滿頂氣血似分而尚渾神色遠望若  
煙雲此血熱血盡氣被其蒙蔽伏不化之症最易庠  
塌。宜涼化清托。均非保元。芎歸等補托之所宜也。  
略述大端以準方法。

### 金木要處

凡金木二處最為緊要。陰逆之痘。金木無有不模糊者。故模糊成片。裸粒不分。平塌不聳。或像橘皮。損傷先至。塌陷可必矣。一見見此。天庭甚覺踈朗。但踈朗之中。色黯之兒無神無彩。形呆萎溼不聳。此非踈朗可比。又見下体稠密空泡之中。有如紫勃桃者三立。此伏毒太重。難望有成。九朝告安。又見一女

頭面稠密。金木更甚。尤為焦渴枯色。便利膿血。七朝乾縮。此等伏毒逆痘。勿以体大質強。身無躁熱。飲食尚進。而徒為希冀也。

小舟易覆

有質小之條。見点毒白平樣。陡佈稠密。灑殊斑點。神煩大渴引飲者。此毒火稟烈。發威透遠。正氣不能駕馭。小舟每易傾覆。見識不到者。聞言不實。重劑妄投。熱心而招怨者有矣。

毒火衝激

凡見平塌黯淡。固屬陰。有粗壯神強。有如兩三朝模樣。亦非善狀。何者。毒火衝激也。一見此。神氣慌

張鼻氣甚龐。連吹滅紙燈三次。其氣湧急可知。非平  
常之鼻息龐。而見点龐塊者之可比。一夜神情煩亂。  
至明日所發者。項脣黯滯。所見龐大者。反乾枯退縮。  
鼻氣更龐。逾時而發。此即悶縮痘也。

頭面行漿辨

書云。頭面行漿。四肢未起。見之切勿慌張。誠然。但所謂行漿者。頭面脹大。分裸分粒。頂滿滾圓。根脚暈附。皮老色黃者。方為純正。此陰陽合德。氣血充盈。有自然之勢也。若薄嫩繩紋。平闊聯併。成片而無裸粒。或板黃而無神彩。或灰滯而如冷粥。似有漿而實無漿。此雖頭面脹脹。眼合鼻封。但肉腫瘦平而已。此為空

成衆子勿誤認行裝。因時毒隔。勢所必然。

痧痘辨

有時痧暴發。酷肖痘形。何者。發熱方張。時邪氣旺。故二三日而暴發遍体。紅赤面腫。成粒高聳。宛然似痘。眼力不到者。無不疑惑。但看其酷肖之中。無一處有的確痘形之據。如天庭地角四肢等處。有項如螺鈿點也。而宛像之中。頭面周身四肢總有一處的確痧癆之形。如雲片繁平點也。或兩手絕無。或身面不應。或見咳嗆連聲。涕淚交流。即可決其是痧而非痘矣。總之形雖粗大。浮而不實。神情意氣。都有分途。况暴發一二日。時邪毒火熾甚。若果真痘。必有壅遏不舒。

之象安能如此。之遍達麤大乎。須知此等症。纔見一小原像痘。至第二音勢旺之際。方開是竈。若第三日即化而平漫模糊。又不像痘矣。

血热可生

有血热重痘。根窠紅艷。口渴神煩。清解難徹。漿行遲鈍。至八九朝頭面始有半漿。周身平頂如墓。若見皮懿蒼老。漿得行而紅艷自赫斂化。到此時胃氣漸開。神情安閑。化熟自然。不比薄嫩寬塌。或嬌紅油亮之易生庠塲也。又不比紫沸乾紅。血瘀毒滯之易于稽癰也。

漿行有交

有氣虛毒甚。昏煩重痘。至六七朝而起脹行漿。迅速  
飽滿。越大越寬。平塌不振。氣難收屬。每見不食昏煩。  
毒浸內陷。或闊大不圓。浸淫腐爛。膿水淋漓。食退而  
變。可知痘之起發。恢成始終。心後天元氣為主。有其  
先而不能繼。其後如癰疽之潰而不斂者。元氣不能  
主持也。何以異哉。

假脹假漿

凡痘見元庭紫黯平塌。毒火毒伏。元氣受困。之大端  
也。而周身繫紅寬大。氣血被傷。血熱毒甚之顯著也。  
初則解逐。緩用清涼。一定之法。至四五日痘目增長。  
神氣安和。似有行漿之势。七朝呆鈍。變端漸起。不知

此痘雖長。面有微黃。必平潤而起極緻。紅色雖減。必  
繡紅而根不斂。氣血無權。火毒不化。假漿也。此毒險  
症。若質小而加之稠密。險中之逆。不待言矣。若倅大  
而不甚繁密。或可延望。又起脹至六朝而空壳如燈。  
周身驟脹。氣被衝激。血被毒錮。假脹也。其實面部之  
項。總不起。胸背之紅。總繡漫。瘡塌必至。

無盤項不治

有一種天庭寬軟柔綿。平塌不振。漿白不榮。根脚不  
現。所謂無項無盤是也。此毒痘是氣血無權。毒頑不  
化。雖耐糾纏。終防傳變。一児回後至二十朝外。厭  
厭不振。卧床不能轉側。一不沾飲食。勉強大便常溏。

二不治。穢臭異常。三不治。痂黑而薄。貼肉不脫。四不治。有此四端。中氣懨矣。疾氣猝逆而變。

寬大流連不治

有寬大之痘。最防痘後流連。勿以漿足而便為喜。輕則浸淫潰爛。濶漫難收。濕毒不化。全在胃氣。補納藥方有效。如清涼之中。必加白朮。茯苓。苡仁。草薢。豆川連之類。蓋寬大原因脾氣素虛。而緣灌漿充沛。氣血大耗。脾愈傷矣。有一兒。漿甚濃厚。痘甚營壯。而面屬呆遲。頭面之痂反薄。不能堆厚。滌濕不乾。四肢亦然。此脾氣虛而無加收成也。濕毒散漫。身體發熱。遂致翻瘍。翻瘍不已。遂成泄瀉。服涼罔效。念四朝卒。

變。

血熱不化

有火毒重險之痘。紫滯乾紅。至六七朝。頭面雖有薄嫩清漿。其形必痏而氣血周身不匀。紫滯乾紅之色不化。血被毒瘀。清活不應。傳交巨測。即倅大能耐風波。痘後糾纏。決然難免。

形如象棋

有痘至六七朝。周身生板不熟。根暈純紅。形如象棋。式比老皮殼痘。比之嬌嫩皮薄者。懸如天壤。全賴便食安和。神情清頓。頭面先來。周身必熟。漸至四肢根赤自化。并能漿厚頂充。至十朝外而始貰。勿以生板

漿遲而棄之。質小犹能如是。

失血痘

有痘發二三朝。口鼻暴出紫黑血甚多。醫者以為毒火傷血甚重。大劑寒涼攻逐。醉以不治。余見其痘點稀朗。神情安頓。但面白消不勦失血之故也。然尤幸其毒隨血泄。暴虛之際。豈宜大劑攻逐。只用犀角地黃湯之類。加丹參元查肉葛金連翹菊根調治應手。

陰毒

有一種發熱見痘。仍能起居飲食。不覺所苦。至二三朝。仍復如是。見者以為人情如此。必是好痘。孰知漸發稠密。險象尤不自覺。并有斑點如藍。微覺夜卧不

安此所謂陰毒也更重。想其初見亦不遇色黯少神形不鬆泛耳。由心于此。不被其惑。即為高秀一女。腹痛甚劇。身無寒熱。見点萎溼不榮。似屬悶象。迨至發出之後。甚覺稀疎。腹痛亦止。似屬可為。但乾姜軟塌。潤無漿。八朝氣促遂變。交後平塌如無痘一般。此猶花朶之萎軟。不開直至乾枯退落。此氣血被困之最凶最惡也。

### 陽毒

有發熱神昏。煩詰不寧。見点深紅瑣屑。其勢必然嚴重。孰知發出之後。神氣即清。点不甚密。清解逐毒起。發應期。不勞餘力者甚多。此所謂陽毒也。易治。

一童子發熱見点。胸背元庭三處碎屑如痧。神昏至  
憤。不声不動。医者以為旦夕可危。不敢用大黃。余謂  
痘固危險。但既服藥。宜用大黃七錢。犀角錢半。一服  
之後。連泻數行。神即清明。所發者惟三處稠密。餘還  
不甚。幸得倅大質強。起脹行漿。應期而來。胸背如脫殼  
收功。一男年歲。見點至于稠密。神即昏迷。詔謁重  
用清逐。至五六朝歲。血外行之際。神氣轉清。有起脹  
行漿之勢。但嫌薄嫩。綿黃。元庭不振。下倅根紅不化。  
九朝回屬。神氣必留。毒陷而不救矣。

冷粥面

凡痘見天庭如冷粥結面者。此元神不振。氣血無權。

決無生理。痘必平塌無漿。周身紫黑如化。雖能延挨時日。倅大故也。終須防變。有至十六朝者。有月餘而猝變者。

紫斑遲速

凡痘紫班疊見。有大如菜豆。有青藍如傷者。固屬凶惡難醫。然必看其神氣之靜躁。為死候之遲速。如神氣安靜。舌色反不甚紅。陰毒內伏。犹可延挨。但一發威。則崩潰不可支。一童子見點甚屬可觀。丙朝午未。神氣尤竈。至夜煩擾不寧。欲便不通。有時刻難更之勢。三朝發此斑点無數。至夜上下見血而絕。可知。徵齊定局之一譜。為有此。尋陰伏症也。

嬌紅蒼老

看痘大要。嬌嫩之與蒼老。生死攸關。吉凶懸殊。猶紅色嫩者。皮薄油光而亮。頂有紅綻。舖紅不斂。此氣血虛而不能駕馭。毒火成漿。易痒易破。則易塌。蒼老者。色如老鶴。如薰苔。形如蠅蠅。摸撲碍舌。有板實之象。此項雖平。而漿行遲緩耳。一見見此頭面周身尚勻。而犯攢背。七朝夜大瀉。而漿即呆。八九朝亦瀉甚。慮孰知安即能食。至十一朝而充滿純熟。無非漿帶灰色。回靨成功。並無別慮。此蒼老之可慶也如此。

痘後傳驚

有一小兒漿行飽滿。一夜之間回盡。一日之間落盡。

太覺迅速。至十一朝。身熱氣促。兩目無神。試之。目睛不轉。此神氣已失。慢驚之變。緣倅質幼小。漿雖灌而陰液大耗。肺風驟起矣。

痘後發熱論

痘後毒火未清。身倅發熱者。全賴倅強能食。自然發疹。數遍。餘毒盡化。若發熱不止。又不發癆。深慮其以病發毒。亦賴胃強能食。絕可無妨。但身倅一發熱。最易蒸疵。遍倅重翻。膿血淋漓。雖為毒氣外泄之路。有延至日久。而發熱不止。晝輕夜甚。汗出不解。清火涼血。毫無一效。意謂痘卒多矣。由起脹至子。貪漿成痂。身中之陰氣大傷。再經蒸疵。遍身之膿血如初。一身。

之。脂液大耗。其陰氣告匱。可知用六味地黃去芍。加大劑滋陰。如鱉甲。元武。炒參。麥冬。青蒿。地骨皮。除玄。一切清涼。效如桴鼓。此症之得生者。全賴胃強善食。得以支持。往云。安穀則昌。絕穀則亡。諸病皆然。而況此痘後尤當急要也。

痘後發熱蒸疤

附蒸疤痕

薰疤痕之故。總發熱而來。熱氣一蒸。新疤痕翻。其發熱之故。或因餘毒未盡。或有六氣偶觸。或由陰氣耗傷。大抵極重之痘。每有薰疤痕。毒氣得再洩之路也。迨至熱蒸不已。遍体俱翻。周身膿腫。熱氣難消。求一白疹而不可得。愈薰愈熱。陰氣重傷。舌反白口甚渴。糲

日久而热何由止。余用一方甚效。生蟹甲元武版原  
生地丹皮荆防引歸川連連青蒿夏枯橘紅蒺藜  
地骨皮甘艸一劑知二劑已。蒸疮凡火毒重痘後身  
热無汗必然之势。蓋瀉藥之後脂液大傷。毒面不化  
汗不出。則熱不解。毒不化。則瘡。皮膚。薰。疮。則身熱  
愈。不。解。全賴。胃。氣。納。大。便。不。瀉。体。虛。更。大。藥。方。有  
效。如。犀。角。地。黃。湯。或。涼。清。解。毒。之。中。加。川。連。引。歸。荆  
力。是。也。

目患蒸疮

痘後毒火不清。眼目紅赤。易生胬肉。余每用羚羊夏  
枯草決明。望月功等。佐以涼血解毒。早治。掌小立效。

痘後蒸疤濕爛。甚于下部者。宜健脾滲濕清熱。外治  
惟煮牛糞尖煅存性。加冰片少許。摻之妙甚。  
痘後患目。用輕粉東丹各等分為末。患左目吹左耳。  
患右目吹右耳。去翳神效。

齒變

一兜四歲。痘多自淨。惟天庭禱密平塌。自起脹灌漿。  
以至成瘍。諸症平安。不過漿色青灰。因腐之後。聲音  
反唾。一逆也。飲食漸減。二逆也。十三朝門牙忽落。三  
逆也。腹鳴而鴟蛔兼吐。四逆也。痂乾黑燥。五逆也。極  
用清涼解毒。至二十朝而喉疾忽變。是知天庭平塌  
之痘。漿色灰而不正。總有後變。犯此數端。亦預變之。

先機也。

上下倒置

一期歲小見。頭面隱約。点粒未顯。周身下倅以佈大  
點。如有兩朝模樣。此下而及上。倒置之痘。險症之先  
機也。至明日。頭面始見。天庭平潤。色黯無神。身花變  
為焦渴。伏毒伏火之重險症也。三朝尚未發癤。已見  
稠密。所謂痘出蹭蹬。壅遏不宣。所致也。三錢錦紋  
只行一次。小舟重載。難望收港。至七朝。但見橫濶放  
大。項平不鬻。漿汁全無。十一朝而去。可見痘不嫌多。  
惟嫌壅滯不散。色不紅紫。而怕白滯不榮。毒火之發現于外。與鬱伏殊途。平濶與尖聳迥異。發如之。

透爽。与蹭蹬难齊者。有別。再視其体質。有大小肥瘠之分。稟氣有虛實。強弱之別。學者辨悉機宜。參合輕重。則吉凶在乎指掌之間矣。

### 危急症

一児六七歲。發熱迷悶。腹痛腰疼。醫不知其出痘。至第二日。煩擾昏詫。叫喊不寧。天花遂見。但天庭紫黯。平塌不翹。其色与肉色無異。餘皆紫紅晦澁。腰見藍癬。如菜豆。氣促煩悶。三朝告殂。此毒火轟烈。燎原莫禦。倅雖壯而交甚速。外症之當恭也。如是。

### 重陰辨症

一女七歲。天花見點。即見神昏煩譖。徹夜不安。比及

一兩朝昏詫更甚。叫喊聲張。所見点立乾焦拘緊似  
欹退縮之象。時邪與毒火燔灼。凡與氣血拘囚相倣。  
但細參有別。点粒焦紅而不甚密。一也。天庭無蒙黯。  
平齧之象。二也。疵点不見。三也。雖見昏煩。不見氣促。  
四也。尤賴其倅大廣強。身熱外顯。唇舌掀紅。叫喊聲  
張。邪火之發揚于外。興努氣悶。鬱閉昏沉者。大相  
不同。至四朝透達。起張磊落。竟成順境。此先凶後吉  
之痘也。又兒十六歲。紫滯焦紅而天庭尤見平塌。  
有如胭脂鋪上。血熱重陰。亦賴其倅大不密。疵点不  
究。與天庭蒙黯。平塌。白不榮者有別。又有痘甚。

稠密紫紅晦溆。肌麤膚黑之俗。或素有疥癬如癩之  
膚。每見晦蒙不正之色。成漿甚易。回屬甚速。痂燥如  
灰。毋為駢異。此与瘻瘍之如癩麻。大約相同也。

### 伏毒逆痘

一塊發熱。即頭倦腰軟。足不任地。若見天花。決無  
輕象。視之果然。可預卜其險矣。直至三朝。神情安卧。  
能食。自以為可喜。但觀其形如蚕種。色黯無神。蚕種  
者。稠密黯淡而細碎如蚕子也。合之神安卧食。毒尚  
未減。伏毒逆痘之真象也。六朝告變。所謂陽毒易瘳。  
活。亦与时病之邪火發揚於外者可治。陰伏而神迷。

和他者邪陷可危。然見有紫滯乾紅如胭水珠。平潤不分如斑如刺。神情昏躁。唇口腫裂。血吐紫黑。房中穢臭。此毒火之氣烈。燎原莫禦。尚可謂之發揚可治乎。

險症變端論

一童十六歲。紫班大點甚多。佈痘雖密。尚屬勻淨。起鬱以為体大而痘不逆。或有可圖。儘力用藥。漿勢可觀。惟天庭灰滯不榮。如冷粥結面。至十一朝下体紫滯之色。變為淡白無神。是知其陷機已露。頓見面腫。收為瘦小。氣息微帶短促。穢臭甚重者。反覺減可此傳陷之確徵也。至十三朝。大喘不食而去。豈知痘至。

垂危無有不見喘促面腫無有不恢反覺不臭者。毒氣內歸也。其將變之時。總有紫溝乾紅之色。無不交為點白無神。非毒化可比。至漿如冷粥面者。元神已失。勿作灰漿。是認紫癰。疊見者。血已傷殘。大休尚不能全。况小者乎。

齶白伏毒

一小兒發熱兩日。並不嘔吐。遂見三四點。如有三朝模樣。形平寬大。色鈍少神。此標痘也。安有一見而驟長如是。決非正痘可知。再視其瓊屑隱約。蘊藏非淺。漸發漸多。形色淡白。齶白也。漸變紫紅。脣腫如突。伏毒也。脹不應期。漿不能化。平塌不穀。色無神彩。咬牙。

氣促。九日閏津難度也。凡齶白之症。多因伏毒。氣血  
被其凝滯。自有形症可覈。勿誤認血虛。臨危之變。必  
見咬牙躁癢。毒不化漿。氣促漸緊。危期速矣。

昏詰神煩

一女十歲。見点綻凸如順候。但面赤如裝。是屬火發。  
至第二日。神昏語譖。舌赤唇焦。火毒發燔。點齶滯而  
發不暢。至第四日。昏詰不減。煩熱不寧。點紫滯而不  
甚密。若得神清。痘還不逆。然此乃時邪毒火發揚之  
症。陽毒可治。較之不昏。不躁不熱。而痘見險惡者。屢  
毒難醫。用錦紋兩許。生磨犀各二錢。石羔二兩。猪  
尾膏。大劑投之。便行甚快。神氣頓清。倅大而佈疎。

勻之痘可棄其起脹行漿用涼血滌陰清攻之無其勢勃然此在不密不平不寬不黯不見斑硃故得應手取效也。

肺經險痘

一兒痘至七朝面腫眼合周身圓起似若可觀但察其薄嫩浮紅至斜寬軟天庭平綱顧角油光身雖圓而根脚紫此氣血兩虛火毒尚濃努力半漿癰期必至塌陷至九朝而一夜煩擾丙顧帶凹一片焦皮光薄微見氣促胸前暈散氣血失守毒內攻矣凡見此

苛痘架子空搭終歸敗類所謂秀而不寔者也。

小舟重載難任風波

凡週歲之孩而遇稠密之痘。活者固有。而猝變者恒多。不可不慎而鄭重之。有一兒痘密。身無他症。惟背部未敷。隨帶粘腫。至十朝。腫盡。而痂落甚多。餘無別恙。十一朝便瀉數行。而猝變。是知漿不能充佈。痂落太早。毒火燥也。蓋背部雖然常卧床褥。易平易扁。然漿充則攻起。反不覺其平。惟血漿而附。則塌如平地。軟如腐衣。背部者。諸陽之會。要地也。不可不貫。勿以頭面胸肢有漿而忽恃無虞。况小舟重載。不耐風波。痘變者必先泄瀉。毒陷之機。医者識之。

虛痘宜補托論

一兒期歲有餘。見痘稠密。惟喜勻遍。但起脹。至于行

漿。其勢雖未。日見平潤不瘡。便溏不寢。所謂小舟重載。难免魚虞。肺經低痘。九日陰鬱。孰知至期平穩。頭面之漿汁稍厚。便雖溏而乳食並進。乳半欠少。而權人儘吃。未回者漸濃漸厚。已回者漸堆漸落。紅疹得發。風險悉屏。此項平脚潤之痘。無不由于氣虛。不能充極。血虛不能負載化熟也。參芪引歸之補拓氣血。固不可少。而尤在初時之不可儘用清逐寒涼。尅削元氣。今見有大黃用至一兩以外。犀連芍寒涼肆多無忌。全不顧茅兒柔脆。敗胃冰毒。無足慮。雖曰毒火重。必應重手。何曾見陰逆之痘。而得此重劑。即能轉否為泰乎。毒從漿化。何遽忘之。諒倅用宗上工也。

即不當此元神以為行滿地步。試觀窮鄉無藥。体質充厚者。痘後胃開解約。由毒竟化。所謂正旺邪自除。轉凶為吉者甚多。此痘之重險而得生者。人乳之力也。蓋以人補人。益氣養血。同類相從。性來迅速。非比歸地之呆滞。又不比桑虫角針之硬攻。故有效如此。

先凶後吉

附先吉後凶

一児見点竇白無神。平潤不振。痘色与肉色無異。宛似氣血兩虛。但舌腫而夜不安。背部大點。間有焦乾之色。此伏火伏毒之痘也。三朝服藥致吐。吐見紫黑血塊。此瘀傷血分。血不能榮于外之驗也。惟攻涼解破重進。據此形症。危險何疑。所恃者。体質六歲。点不

先告後面

甚密。或可轉凶為吉。且血去則毒火亦泄。至五朝稍起。六朝驟脹。胃開而漿勢勃然。此倅大不密之有望也。無轉机之勢。亦必在五七朝而始定。切勿見凶便棄。一痘密中分裸。勻滌起脹行漿。依期而來。八朝頭面漿足帶圓。忽然泄瀉發熱。身花呆滯。彼以為漿足而圓。竟不服藥。十一朝猝變。此因質小痘多灌滌之後。元氣大虛。寒乘則泄瀉發熱。未貫之痘。因而乘隙塌陷也。况心九日痘閑緊要。內症尤宜安穩。見此泄瀉發熱。形色呆滯。傳交之禍已見。勿以滌足而便恃無虞。此幼小之最多變拗也。

盤項俱無

一兒發痘至三四朝。還不甚密。惟神情困倦如寐。氣血被囚。五六朝起脹應期。不甚密之故。漿期形萎。而神氣不精。氣血無秘。不能馭毒。頓起咬牙便泄。根窠不飲。盤頂俱無。雖有半漿。全無氣力。凡看脈必有神。有氣。前加充灌。飽滿其勢。勃然為純正。至九朝大半已圓。惟嫌太速。風波至十三朝。忽見其舌尖上一点如墨。蒙荳大。此痘疔也。不治當夜而發。

破損漿呆

一女四歲。性躁不肯服藥。痘至四五朝。起勢勃然。宛然順候。至七朝。兩頤搔破。餘痘頓呆。八九朝漿汁全無。惟見平闊呆鈍。幸胃納仍固。睡卧如昨。平闊者漸

至化熱。田痂堆聚。臉如虎面。寢食仍如故。蒸肥發熱。  
毒尋出路。面脫如殼。紅赤淋漓。重新堆結。兩腿至足。  
腫脹出水。濕毒下注。無如糾纏。至廿四朝。堆結週身。  
如雞矢不脫。身前惟薄。少竹膜者稍落。以致痛楚不  
能轉側。磨難多日。舌碎如坑。胃口漸減。停藥而殘。

痧痘並發

有病痘並發之症。痘雖稀朗。不可忽視。有一兒痘平  
稀少順症。至四五朝。身乍壯熱。咳嗽氣促。發現痧疹。  
痘即呆滯。漿不能來。痧邪阻隔。氣血不通。毒不能化。  
不食喘促。陷閉而危。當此痧痘並行之秋。每見如此。  
慎毋以痘少而忽之。

真伏毒

有一期歲小兒見痘天庭蒙黯如烟神情困倦如迷雖有磊落之点亦必枯滯無神此毒火壽伏元氣被困之時未經發威一至三朝風波驟起猝變甚多小舟不能駕馭也勿以安靜點稀而忽之

悶痘下血

一家出過一痘其弟週歲兩旬不動但神倦厭不熱迷悶但欲寐應出痘而身不發熱如此神情恐有悶而不達之虞明日神氣得舒見其身發痘点可喜誰知至夜而下血數次厥陷不支矣所以落陰之見症最宜小心

痧科

張氏

痧疹始終總論

癸卯春，盛行痧疹。沿門闔境，大小傳染相似者，謂之疫痧。原因天時不正，疫癟之氣而作也。其中病情不一，傳變頗多。蓋疫癟之氣觸自口鼻，先傷肺胃，以及傷衛。傷營氣分，血分傳佈三焦，與溫熱時邪病情相類。先傷肺衛者，頭痛咳嗽，涕唾稠粘，惡寒發熱，脉浮數，宜投辛散。則寒透疹達，點色鮮明，形粒聳透，其愈易耳。有身熱淹淹，面色黯晦，神情萎頓，至數日而始見点滴，面白無神，形粒不振，此素虛之体，邪氣沉鬱，達之非易。必有糾縕內陷之虞。或傳下痢，或見喘促，或

發熱無休。口渴遺毒。此邪傷肺衛之重者也。有一發  
熱。即神情煩躁。壯熱如火。目赤口渴。汗出如雨。而病  
疹隨現。深紅瘰塊。此邪在陽明。營衛並傷。顯揚遠達。  
清解。還屬易愈。有發熱數日。從無汗洩。腹痛神煩。見  
點深紅紫滯。有若肝絃。痘象連投解散。汗滴全無。舌  
色乾紅有刺。如猪肝色。氣促煩悶。症象險惡。若因無  
汗而但用升提發散。必至喘急火炎。宜速用犀角石  
黑。佐以荆蕡。薊蓼紫草。赤芍。金枳桔之屬。火燄頓  
息。神色轉潤。然後鬆解化達。轉咳發疹。汗出而愈。蓋  
蒸熱煩燎。欲其喉嚨涕吐。不可得也。治之不善。陰傷  
此症。邪熱久毒。先傷營分。衛氣被窒。所以汗無由化。

液涸。邪火燎原莫救矣。知其要者。專辨邪之在肺。在  
胃。傷衛。傷營。以及化火与否。未化火者。痧未透達。不  
宜驟進寒涼。恐致痧邪凝遏。傳變糾纏。已化火者。邪  
火燔灼。肺胃之陰易涸。若不急清。必至痧焦。邪陷。喘  
急。告危矣。大忌者。痧瘳方後。明日便退。影迹全無。即  
無暴變之危。多有糾纏之患。有痧縮而面白無神。氣  
促脉小者。多不可救。蓋痧乃時症。宜乎面白浮紅腫。脉  
浮數大為順。若色白脉小者。正氣先虧。邪伏易陷耳。  
至于發生之際。暴而速者。亦多易縮。邪火劫燥故也。  
体質幼小者。邪重發咸。氣促汗蒸。正不勝邪也。所以  
猝變之症。幼小居多。体大犹能任耐。有痧發漸退。諸

症平初惟鼻搧氣促微熱不解治之不減必有反覆。  
邪伏內隔也。故初發時氣促喘咳猶可發之而解。若  
鼻搧擗脇正因邪伏而一一生痧疹之第一犯欬也。若  
曾見痧後鼻搧氣促雖微神困觀赤調治至久而仍  
變。豈可忽忘。痧後身熱不退。邪火未清或陰傷液耗。  
無汗灼熱久而不解必兼育陰滋化穀氣內充精生  
汗達然後自瘳甚發連身而愈非徒發散清火所能  
了事也。

看痧痘法

有一種病疹初發。宛如痘形。在乎体大廣壯。肌膚緻  
密。津氣充實。是以暴感時邪。一發熱而即見頭面胸

背成粒兀滯。宛如惡痘現形。但究係惡痘見形。自有  
見症可凭。或連熱昏沉。或腹痛煩擾。未有無病而一  
夜寒熱即發者。此一端也。明日診視。頭面純紅紫滯。  
目赤帶腫。充勇之勢。尚類痘形。如果痘也。總兩目總  
有蘊遏不舒之象。未有如此之顯明暢達者。又一端  
也。再看其胸背必有如雲成朵。痧疹之確據也。再看  
到兩腿手臂。稍見而不能暢達。蓋痧達四肢。必頭面  
而身透徹。總發及也。不比痘反先顯于四肢。此又  
一確據也。再兼診視之際。唉喎連作聲音。帶啞亦確  
據也。又參其點達之後。脈氣神情安撫。決非惡痘可  
知。此辨甚明。可為疑似之鑑。又見痧疹行時。頭面

一看是痧。看及身腹腿膚成粒串串。宛似痘形。最易疑惑。如此當以頭面兼症為準。明日再診。確知病矣。

爛喉痧

附

經喉痧

最惡者。邪勢方萌。咽喉即痛。点粒便見。糜腐已形。俗名爛喉病。如雲霞成片。如丹壯熱無汗。臭穢噴人。煩躁擾喘促。喰逆。脉象反見濶數。面色面白。神情難堪。此邪陷不達。凶反掌一候之。交閑津。難度。每見傳染觸發。深為可畏。凡風火急病。總以一候為閑。若過此。雖重。猶屬緩矣。然非絕不可治也。輕重後急。自有分途。若輕而緩者。痧形透達。喉患漸寬。汗出津溌。此症之最要者也。然又看其傳自凶者。善症。

少見傳自善者。雖重可圖。似乎有種。惟初小之。児尤當慎重。蓋咽喉要地也。一息之機。性命所繫。嬰兒氣弱。路隘。腫腐。則易于窒塞。而易閉。而易厥。傳變  
凶危尤速也。

經喉

又有疫痧喉痛。腫繞于外。脹連腮頸。雖屬時毒外現。然近咽之際。空隙之所。易于內陷。非比陽部之易犯。易愈也。一兒体大患此。穿潰腐爛。不收。內陷而斃。一兒体小。脹勢方張。喉疾喘而氣促。頓絕。目擊非輕。幸勿忽諸。

咽喉

凡咽喉為患。不過曰火。一言可以槩之。但有寢火。有虛火。有溫邪火熾。有寒來風毒。十居八九。務宜解散。

辛涼如牛蒡。薄荷、荷連、杏仁、桔梗、甘草、荆防、葛根、天蠶、馬勃、橘紅、象貝、蘆根、芍藥、寒寄佐以辛溫。如麻杏、紫蘿、姜皮、芍藥、火礬者急宜清解。如犀角、石、黑夢、蘆桑皮、滑石、山梔、射干、茅根、芍藥。初起重者余即用牛蒡五錢。天蠶三錢有效。蓋二味攻風散結消腫利喉之要藥也。痧癆之喉亦宜倣此。

喘促

凡痧見喘促均為危險。初起痧邪蘊遏發洩不如間用麻黃杏仁開發其邪。痧出而愈者然見此已非輕淺。若痧出之後復見喘促定是痧毒縮陷邪火蘊遏。邪火內壅可。於痘見喘促尤為篤候。初起者。問痘可。

中途者。毒火氣熱。痘後而見者。毒歸于肺。皆屬傾危。  
反掌藥力難施。最危最惡之候也。

邪傷肺胃氣血辨

痧疹之發。不出乎肺胃兩經。傷肺病輕。傷胃病重。固矣。但傷肺有淺深之別。傷胃有氣血之分。喘促鼻煽。神呆氣鈍。色淡不能暢達。或暫發而即隱退。犹得謂之輕。若傷氣者。大點成辦。周身湧密。有進鋒退速之虞。傷營者。紫溌乾紅。舌焦舌赤。雖重猶為可治。每見此症必兼腹痛裏急。神迷煩倦。邪滯不宣。營衛之氣阻遏。疏達之中。佐以紫胡赤芍。葛金每獲奇效。雖非正治。如即倣時感之。邪滞在裏。蒙蔽而不解者。速之三十

法也。又見神迷倦睡，目閉無動，連日不甦，深為可駭。  
第觀其脉動微弱，靜中忽躁，声壯力強，都正雖受困，  
還可無妨。至于病後陰傷邪戀，熱久不退者，清化之  
功，加以鼈甲、元武、生地、沙參、滑石、清有效。自瘳透發而  
愈。

邪傷營症

附論

一兒四歲，病退後，但見神迷如寐，目閉氣促，舌赤苔  
焦，脈平帶數。病影尚見紫黑乾紅，頭面有如瘋麻之  
氣。此症血熱內熾，游漫氣機，鬱蒸肺胃，非內陷發喘  
之比。若內陷發喘，而目反張，神氣反清也，許以可治。  
用犀角鮮沙參、丹皮、荆芥大力、杏仁栗皮、橘紅茅根。

兩劑稍可。再加羚羊生地、神氣煩清。目閉噦頰氣機  
開達。邪蘊得舒。身當發熱果然。仍用輕清解散。後加  
白虎。胃納得汗而愈。論大凡病癥之發固以速達  
被傷者。發遲。肌膚納得汗而愈。但發宜遲。緩不  
速。肌膚色蒼退。必遲。不速則多。如火急也。以舒徐。急  
則多。如火急也。其舒徐。肌膚色急躁。色要蒼。之發固以速達。論大凡病癥之發固以速達  
之壅。除之為要。而發無汗。而內燔也。故病者病也。而退。而退。而退。論大凡病癥之發固以速達  
之壅。除之為要。而發無汗。而內燔也。故病者病也。而退。而退。而退。論大凡病癥之發固以速達  
發之。必勇猛。雖重無妨。質小而虛弱者。邪不重感。則不  
發。爵伏厭。而恒多變拗。此輕重必然之勢也。凡頭

面亦凹。下倅正發。周身已退。四肢犹紅順也。與痘之  
先見先起。先貫先麪。自上而下。必以透達為期。所謂  
点至芝心。勢方安定。痧疹亦然。每見痧退之後。頭面  
如風。肌若大麻。痴屑如麸者。此血熱生風。凡毒運皮  
之候。佳兆也。又有色如雪霞。項若瘡漿。名曰丹疹。舌  
赤無汙。風毒傷于營分。清解易愈。毋足駭也。

癰毒辨治  
凡病。療之發。必後熱三日。而後見點。見點三日。而後  
退。退。則氣爽。邪去。則氣爽。每多重症。再發出之際。形、宜。  
聳透。色要蒼紅。最忌者。淡白。不榮。現而即退。痘科之。

所謂齎臼是也。一見此氣喘神呆寒邪齎溼初用  
三拗湯加荆芥大力奇金芫荽等溫散開達一日即  
退。遂見神迷氣促舌碎唇焦便泄寒熱雖然化火燔  
灼陷機已著幸而正氣能支邪沒泄解犀羚黑等清  
化連投神清食進似屬轉机孰知蘊熱又燃口糜喉  
腐音啞不食再進不灵此痧毒上甚肺胃耗傷寒涼  
起宜常進用珠黃散加牛蒡為末分二服。桑葉甜梨  
湯調下甚效此症之可治者神迷倦也而見此糜喉之  
時並無徽臭噴人且邪氣已裏之後而見此糜喉之  
者病在標也故可治

清散論

凡時病甚發之際。大點掀突。  
之或有所碍。不敢遽進。散之亦不可竣。當去葛根。何  
者邪。發正盛火化最速。恐過投升散助火劫津。有喘  
急之虞。總之氣平不喘者火雖盛尤可清發。雖遲尤  
可達。喘促渴病上下交征。邪陷尤速也。

火甚灼津兼腮脹

一兒四歲感冬溫時毒。頤腮脹腫發熱神煩即見癆  
疹純紅。惡心嘔吐下利無度。不喘嗽。陽明之痧症也。  
但診其四肢冰冷。神倦如迷。身不壯熱。汗滴全無。症

屬險矣。用達邪透疹藥二日。幸喜痧點顯現。顏色紅活。腫脹愈掀。氣無喘促。有此四端。俱屬佳景。利雖不止。陽明之邪熱漸解。所謂疹家不忌濁也。汗不能出者。因下利亡津火燥。汗無由化也。滿口糜腐。舌焦舌乾。下利粘積。脉大洪數。邪之化火甚速。內燔甚熾。重用犀角荆刃。連進而火勢稍解。下利漸止。惟口糜不能納穀。進乳。用竹葉石羔湯而效。直至腫潰出膿。蘊熱解而邪氣鬆。自能化津汗達也。已逾兩候。此症若一加喘促。正氣難支。邪火即陷。大事玄矣。又賴其稟質尚強。耐此磨折耳。

探痧項腫

一兒童發熱項腫。身見瘀癆。頭面下倅不達。明日滿項皆腫而硬。痧亦不過。胸背色黯不揚。餘不透達。舌紅帶乾。邪陷傷陽。驚厥而交。此項腫痧不達。不治。

### 痧毒項脹

一童子。痧疹似輕。不服涼。隨即退。痧邪未經暢達。奇遇陽明。不咳嗽。頸項強。始延余診。見其項強如失枕之狀。邪閉經絡。持數腫塊。明日果然左邊腫脹。但既腫于左。必脹于右。果左右皆然。此痧毒鬱結。陽明未經。咳嗽其病糾纏。連進荆防大力。天竺互卷等藥。幸得身熱外露。紅疹透發。化火燔炙。見于否。以蒙于耳。竊犀羚大進。日漸減可。未幾又叢如瘡者。獨在上部。

而小便渾濁。疫痛如淋。下焦之濕熱尋出路也。又用青麟丸。黃連。玄柏。生地之類。調治一月有餘。而始安此瘳邪。壽結糾纏之明驗也。

### 疫痧論治

所謂疫痧者。疫癘之氣。天行時毒也。故病來迅速。化火甚急。發越之際。犀角。礪。嫌。蚤。宜加製軍。于解達。藥中。最為有益。用此者。將來化火必輕。不致蔓延莫救。但死生有命。大黃亦非必可救之宗。余于此症。用之。郤當者多活。若毒氣延傷太甚。雖用亦無益。并有不可治之症。應用大劑。拒而不納。奈之何哉。况悶痧危急之症。不可嘗試。如為可救。甚覺平常。如不可救。則受

謗良深矣。又葛根不可多用。已見點之後。但可用荆  
刃卷頭之類。恐引時毒泛濫於上。為頤毒項腫之傳  
變也。

疫痧喉症宜下解毒

一家疫痧喉痛傳染滿門。痧毒之氣烈形極險重。清  
之不應。加製軍甘中黃瀉熱解毒。俱得無事而愈。後  
傳兩三人。喉痛極重。滴水銀入有煩悶閉塞不安之  
象。痧疹不現。亦重用製軍中黃。毒泄而痧竟不發。痛  
止安然而化。此等症若必待痧疹發出。遇投辛散。則  
毒乘泛濫。元氣難支。若但用寒涼。所謂揚湯止沸。不  
如釜底抽薪。然雖如此。宜諒體而行。真切而用。尤要。

察病家之呻吟。不負熱腸之苦心矣。

喉症吹茶

硃砂 三平 雄黃 三平 丹石 四分 朴硝 三分 水浮半  
射干 朱 共為細末吹喉

喉症噙茶

薄荷叶二錢 元參 可 山豆根 可 桔梗 可 甘草 可

共為細末蜜丸梧子大每將一丸噙化二方李市傳

不忌鴻食論

痧疹不忌瀉。謂痧疹從外而發。方張之際。得泄邪威。  
挫其銳氣。不獨外發之勢衰。即化火亦不甚熾。肺胃之邪得解也。汗出溱溱。痧形易化。知餓思食。即可與。

之時俗有餓病飽痘之說不可執泥。緣痘疹之邪本屬淺近。既達之後。胃即空虛。飢而不興。液耗氣傷。何自苦之。即時病發疹。卒屬忌瀉。恐其正虛邪陷。亦有因瀉而衰其勢者。初萌之際。正氣未傷。邪從暗魄。將來化火燔熾之象。亦可幸免。因邪氣已泛瀉。而分消也。其理相同。

癥後糾纏險症

一女十餘歲。癥後咳嗽日甚。夜劇。但坐不能卧。倦極不能寐。欲寐氣衝。嗰咳頻作。喉癢燥渴。火升頭汗。瘡珠黃散。進用養陰清潤湯化下。凡初投甚效。再進漠

如余曰。治肺不應。當以介類潛陽。血屬填陰。鎮撫自效。孰知愈法愈劇。經延弥月。氣衝散訟之狀。慌張如飢脫之機。喉癰燥渴。有杯水輒薪之勢。甚至椎背不靈。咳嗽連頻。痰血上噴。勢壅極矣。似屬肺脹。奈病久如何。仍擬治上之法。用補肺阿膠散。加葶苈石。焦紫苑。甜梨。桃杞。兼投之。稍效一醫用石羔。刃射干。而萎霜。不尋常。連進而氣逆大減。又用芩苓。百合皮。不咬緩。勢平。以後尚不能安卧。咳嗽不止。久而調和。終弗病根。逾年成癆。

癥後犯症

凡癥後厭食。神倦頭汗。脈虛似熱而却不然。稍納而

却。不貪。喫。氣促。鼻管。攣動。神呆。色白。欹卧。不起。此  
素虛之体。福愆不揚。正元受困。外雖平淡。其寢至險。  
臨症未患者。每被其惑。見此神情者。十難一活。不特  
痴疹為然。即風溫感冒。陷伏不解。喘咳鼻攣。神呆色  
滯。正虛不勝。傳受甚多。不可以其平靜而忽之。

又犯症

一兒病後。舌焦舌赤。身熱無汗。不遇邪伏。傷薦火邪。  
未清。用犀羚寺清解。火勢漸退。飲食稍進。似屬無妨。  
但熱不退。而汗終無。腹痛不止。而傳痢。雖屬蘊邪出  
路。然痛結不解。痢無休止。用青麟丸之後。溺如血汁。  
痢亦漸可。孰知犯症頻作。痛仍不止。一也。熱仍不解。

二也。大孔如筒三也。鼻頭時冷四也。蛔蟲上出五也。  
腹按壘塊不和六也。喉痛止而復作糜爛七也。忽然  
寒戰大熱仍無汗疹蘊邪燔灼喉舌腐敗穢臭逼人  
脉數營神氣促不食正不勝矣。可見病之糾纏不解  
者邪伏深藏變端百出必至正氣難支竭厥而變。

火昧流連

凡病發不暢或見而即退總因形色淡白不榮之故。  
或因体虛或因着寒或因下泄太多以致濡滑不揚  
邪乘弱伏最有流連頃見神倦如瀉目閉不張聲息  
全無脉小不急此屬火昧肺熱令人昏也但見其唇  
焦口膩舌有碎点擾動則憚咳嗆音嘶病情合也用

犀羚。奇力寺清化上中火解而神自甦。胃漸開可以無妨。若再有糾纏。發熱夜甚。汗出但頭腹熱更熾。眾不思納。熱伏至深。必用刺連。始克有效。口瘡發見。熱邪向外之机也。所以凡見口舌糜碎。反屬佳兆。須用石黑必靈。若初發熱而即見口舌糜碎。或頤頰腫脹。並不發痧也。有先見瘡而後發病。退邪解而痢自止。有癆後而痢者。肺熱下移邪尋出路也。亦易止。

浮腫腹脹

一童子時痧喉痛。陽明經血熱重症。舌燥而裂。舌赤口燥難甚。用黃連汁潤之稍適。以後不避風寒。不慎飲食。又發寒熱兩次。身即浮腫。肚腹脹大。陰囊少晶。

此病上加病也。若係痧後腹脹。病毒入腹。不治之例。  
但觀其神情意氣。飲食還納。或不至此。治腫症中重  
用解退熱毒。旬日不見邀視。知鄉医而變。是知痧後  
腹脹。即係痧毒之為患也。

邪蘊色淡

一兒六七歲。風溫似瘡。數作之後。寒戰大發。瘡症顯  
矣。異邪可達。孰知痧疹遍倚。甚為喜異。以為認瘡之  
誤也。但嫌白滯不榮。從無汗洩。余曰。此即病疹之邪。  
齶伏成瘡。成瘡可安。發病則慮。何者。以知蓄之邪。現  
而不透。最防縮陷。淡白無汗。尤易退也。明日果縮舉。  
家驚惶。以為言之有驗。觀其病果縮矣。而氣息平和。

歎声連作。神清舌潤。脉緩無熱。余曰。不妨。尚能化之。  
此邪因連日。似瘧。其勢已衰。寒戰之後。其邪大泄。非  
比和感盛時之氣也。且疝縮必見喘促煩亂。豈有如  
此之平和脈症乎。

喘急腹痛重症

病子而見喘急。固屬邪陷于肺。凶危反掌。若見腹疼。  
亦屬邪閉于膀胱。金之氣壅遏于大腸之間。症非輕  
淺。所以凡見腹痛者。糲纏難愈。每多傳痢。即肺移熱  
於大腸。臟病傳腑。痧邪之出路也。还有無妨。然見一  
瘕後下痢。上則喘促。中則不食。脉按全無。立下交征。  
危期速矣。又不可以下痢無妨論之。曾治一痧退後。

喘。舌焦舌赤。化火甚急。用犀角重剂。喘急太缓。调理漸屬有望。惟厭食不復。腹疼腿痛。下痢身熱。喉腫無汗。口瘡。頭脹欠納。終至不起。尚虧体虧元大。能耐糾纏。發喘之險重也如是。

火逼縮陷

一兒癲瘇四日。頭面無暎。周身尚見。氣促鼻燥。舌乾焦赤。逼汗而隨發。此時邪火內燔。燥津壅氣。尚堪薰逼。乎然則如此症亦有可生者。病雖退而必有形跡。舌雖紅而未至乾焦。反得神迷安靜。其勢悠游。方能有望。不若此目張氣壅之為急也。凡見癲陷。喘促舌色焦乾者。陰傷火燥也。必死不救。

久  
一  
病後疾臭常喘

一病後。病形黑如痘疤。身熱氣喘頭暉。證在重險。用理肺清化之後。通身得汗。熱喘俱平。飲食進而可似無虞。惟咳嗽痰帶臭。因熱未清。一夕忽然齶齒唇牽。熱喘復來。痰臭更甚。棄食俱不能進。雖連用珠黃而不見效。此病毒傷肺之變端也。

白泡有輕重

一女笄年。病症紫滿成片。並發白泡如喜窠。以致兩手掌腐爛。舌苔焦紅。身熱脉大。此陽明氣血並傷。重用滋清。犀角鮮地芍連。進大便不通。咽喉反痛。腫脹阻塞。湯浸鼻孔涎膿上湧。如蛇氣塞。咽喉欲厥。病後

見此。熱毒可謂甚極矣。將青鱗丸研細調服。取釜底  
抽薪之法。通洩而瘍延日愈。孰知頸項腫硬。似乎毒  
從外露。但空虛要地。脹硬日增。一候未能成膿。正氣  
傷而毒不化。偶然粥厚而覺脹回。連日不納。毒陷而  
變。是知此症之得以支持者。全賴倅質壯大。反覆而  
交幻百出者。正為不治先機。又一兇病後身熱白疹  
連發。大如水泡。通轍週身。成片粘去泡皮。內肉粉紅  
無水。不致腐爛。胃氣能御。土強能抑。清化而漸干漸  
癟。皮蛻數層而愈。

傷血緩症

凡見病形稀少。勿便以為真。痧色淡白。勿遽以為輕。

雖身熱和緩。神清能食。漸發漸威。數日方張。致見紫滯乾紅。繁密如痕。肌膚甲錯。瘀屑如赴。此邪傷營血。齧伏非輕。故發見維遲。退則化解。就在皮膚。無縮陷之虞。非比火急驟發之症。燔灼傷陰。喘縮立至。知凡痧疹見此形色。本屬無汗者多。脈腠乾澀也。雖盛暑炎蒸之際。亦無汗滴。散之漠如。必用清之化之。介屬以滋養之。數十劑而漸解。病勢如此。勿謂棄之。難效也。

大痧重險

一人冬溫時氣。發紅痧如丹霞。舌苔厚膩。而中心燥赤。此陽明經邪傷營血之重痧也。五十二歲而發痧。

亦屬罕見。發威之際。下痢急迫。陽明之火急使。雖屬邪淫下泄。但下利數十次。口中大渴。引火邪太急。恐其縮陷。刲津非瘳。不忌瀉之。可此二日。舌苔頃化紅赤而乾。即用犀角。舌愈乾焦。火邪之燔灼而陰傷也。用犀角地黃湯加玄連。薄翹。大力茅根。苦參而回其險重。另請兩候而斂。此邪陷刲津。下痢之過于急數也。

### 重險之機

凡病疹形色淡白。退而影無。或見而即縮。邪陷不達。最多厭食。發熱有汗。不解。舌焦紅。清之不徹。咳瀉鼻吸。呻吟神困。此等症邪陷肺胃。正虛受困。傳變為

多体大犹耐支持。質小深為可慮。無被其惑。

凶惡症

癥疹昏迷煩詫最為凶惡。一児十歲病如丹霞。不喫不啜。陽明傷營血之重症已。任遍體疊發。煩詫三日不減。頓見舌腐苔糜。瘻壅氣羸。邪火猖狂。燎原莫馭。惟用重清化解。鞭長不及矣。又二十歲發病。如前昏擾一夜。病退神即清明。并見盞癬數點。清火備噬。及製軍苛解毒。三候而始愈。此賴其介質大而神即轉。不然。亦難矣。

惡痧急症

近有一種惡痧。驟起一兩日即壞者。反泛吐瀉而起。

脉即蔚數模糊。按之似空。神情困倦。漸見昏迷。此邪  
陷于裏。凶危可卜。所謂疹家不忌瀉者。指咳嗽噦唾。  
點紅成粒之肺胃陽症也。或喉痛。或米痛。或瀉或不  
瀉。或舌赤如珠。或有不紅。搃見脈氣漸空漸小。神情  
昏憒如迷。便泄不止。痧形隱黓。邪陷內縮。迅雷難掩。  
此臨症之不可忽也。

痧夾瘀血

一處女見病。紅而不艷。并見一塔紅。一塔白。總不透  
徹。如有根絆于內。腹中常痛。舌強不清。或因喉痛之  
故。至第六日。腹大痛。甚至昏厥。連下瘀血半桶。始明。  
痛不能達。根絆于中之。所心凹。但面青痛縮脉絕。深

為危險。惟熱退。神清不喘。一綫之生機。幸得一夜安穩。不厥。不下。脉漸出而澁化霍然。此熱毒隨瘀血而下泄也。症尤奇矣。

病毒不暢

有病色淡白。發而不暢。神情迷悶。嘔惡腹痛不熱者。邪毒氣閉。症屬悶癟。用豆豉杏仁荆芥大黃金芽蔓苔溫通化氣。日久不達。內熱蒸毒。唇舌焦燥而煩者。此時清恐嫌早。散又不宜。用紫雪丹。餘宜有效。轉紅透達。以後腹脹微熱。便泄厭。濕熱不化。用真建鴉湯。再發白疹而愈。大抵病疹最喜鮮紅撤起。惟嫌淡白。平邪泄毒。伏氣機不化。總謂之不達。以致病後發

熱咳喉腹膨之症。糾經最多。若病後體能御穀。則陽明無碍。氣化有權。不貪食者必有齒忘。然從看發病之透。與不透耳。

悶痧

辛酉歲時痘盛行。并疫痧甚重。見者總以透達鮮明。頂起癰瘡。有汗為貴。一候之爻。乃死生之閑也。最惡悶痧一症。刻不待時。大抵紅而不艷。淡白黯淡。無神。呆氣悶努。氣脉壅。見此者昏沉暴躁喘促。雖不現。然須防猝變。此悶痧之神色也。

陽明陽旺

一痧發而不暢。神煩夜語。連日不寧。不咳嗽。身無汗。

陽明血熱重癆。喜得逐日透發。色鮮紅赤。汗漸疎泄。  
化火亦不甚旺。此陽症見陽之易愈也。

毒伏後變

一女五歲。病未遲鈍。至七八日而始見。黯沛不榮。神  
迷腹痛。用麻黃羌荳之發。瘳得透徹。舌焦紅如柿  
而耳臭水淋漓。清化之宗無不啞。及用製軍而便始  
通。諸症漸平。從未汗洩。飲食大進之後。亦未見津氣  
充溢。營衛之氣未諧。只此一端未詳。停滯之後。或飲  
食過進。忽生腹脹氣促而逝。所以一場疑竇之症。說  
明勿解。以証不虞。

猝變論

疫癆。即丹病。其症变陷莫測。悶痛固為最急。有一發  
热壯盛。即紅亮如爪。色如丹霞。目赤氣盛。汗便泄。  
舌苔厚膩。此邪毒重感。發之過暴。有進鋒退速之機。  
勿謂病喜透達。疹不忌瀉。執此致悞。此症之吉凶。關  
竅全在乎脉。曾見一男子。病發如此。其旺脉反羸。伏糗  
糊。第三日有昏詫神拗之象。舌紅罩白。脉尚模糊。交  
澑而陷。最凶。最急。若脉氣超。不伏。汗出津多。病起隨  
舌見紅刺。正氣能支。清化自解。即有傷營之重。

症。不過糾纏時日。多進犀連。久之自效。此丹病猝交  
之。不可不辨也。

驟變症

一壯年疫癆。喉反不甚痛。已在暑月。但見惡寒。腹痛。  
便泄。病色不艷。邪蘊非輕。踈解至五日。舌苔不化。火  
象反增。呃感脉變模糊。邪陷不達。內隔之稅以著。不  
遇一候。彼時神雖不昏。病雖淺現。而脈症以交矣。  
又一童子上門者云。昨夜腹痛便泄。而常血數次。未  
知何故。余曰。向有便血否。曰。無。昨夜驟起的。但驟起  
而即傷血。勿得泛視。明日聞知已發。第觀此症。即申  
惡之類。臨證不可忽也。

治法論用西河柳

書云。癥疹熱壅于肺。逆傳心胞絡。喘咳煩悶。躁亂狂越者。非西河柳不能解。仲淳間。嘗獨用西河柳葉。風干為細末。水調服之。喘躁立定。水不入口者。灌之可生。力贊其為神祕之方。又云。慎勿用定喘。宗惟應大劑竹葉石。薰湯。加西河柳兩許。另出心裁。立一湯方。表裏施治。蓋以客邪犯心肺。二經營衛並傷。非獨主於表也。大凡灼熱無汗表固。而見諸症者。則用竹葉石。薰之。辛涼解肌發汗。熱毒蘊裏而見諸症者。則用西河柳之鹹溫潤燥。開結和營。以解天行時熱。至于十味佐使之景。不外乎潤肺解肌。清營透毒。毋容議。

據此則西河柳乃治癆瘍之要矣。今云溫燥不用悞矣。仲淳之疎叶石羔湯用竹葉石膏西河柳牛蒡子荆芥薄荷葛根知母干葛連翹元參甘竹冬米愚謂此方當以犀角換石羔鮮沙參換麥冬荆芥根換冬米為穩妥。火熱極甚者始加石羔為宜。