



内科新説

中

ヤ 4
1450
2





肺病證論

心與肺交相爲用、二而一也、蓋心之功用、主偏血運行週身、肺之功用、主呼出炭氣、吸入養氣、心之舒縮、肺經呼吸爲之也、心不得肺呼吸、則不能久長舒縮、偏血運行、且不能改換毒血、故曰心與肺交相爲用也、凡無病之人、大概心跳四次、肺經呼吸一次、若太遲太速、不合此數、即知其人有病矣、心跳太急、偏血之力、速過常度、則肺經呼吸、亦速過常度、然有時呼吸太急、未必由於心跳太速、蓋肺中氣管、分佈細密如網、肺氣多少、適合一身運血之用、若肺病、氣管塞住、氣不足用、則呼吸因此而速、肺左右工力相當、若一邊有病、則無病一邊、工力倍勞、若兩肺

內科新說

卷上

三



皆病其人卽死有因外傷風氣自外而入者卽時累呼吸蓋因
外入風氣或自左入或自右入束縮肺體不得舒展令肺變小
所以呼吸難若肺左右俱傷其人卽時死有肺位病患生膿水
者呼吸必不利亦此理也肺之本體右大於左左長於右右肺
部位前占脇骨凡六後占脇骨凡八左肺部位前占脇骨凡七
後占脇骨凡八前長後短故也胃脇間有膈肉分開上下心肺
在膈肉之上肝胃脾在膈肉之下左右肺亦係膈肉所分右膈
之下爲肝位左膈之下爲胃位脾在胃後肺有本體之病有功
用之病本體之病如炎證膿瘡之類是也功用之病或在總氣
管或在小管有一處病者有幾處病者有時病在胞膜蓋肺之

胞膜翻轉與脇骨相連如炎證漸致有水是胞膜病也肺無病
者自覺胃肋舒張呼吸便利蓋肺之呼吸與心之舒縮皆非人
能自主試觀人欲強閉呼吸歷一二晷呢卽不能自禁可知呼
吸舒縮皆造化主所爲也試以左手中指按平人胃脘而以右
手三指擊之其聲輕清而響亮呼吸合度紆徐不迫附耳靜聽
如微風張翕有病之人擊之聲重而啞呼吸遲速不合常度欬
嗽不安氣出人每痛此其驗也肺病證狀不一有累鼻內皮者
俗稱傷風是也其原多因天時寒熱驟變或因倦時被冷風吹
襲或衣露雨溼或足蹈溼地先時鼻中無津液乾塞多嚏一二
日後流清涕多淚此是鼻內皮生炎初時無水漸見水多所望

清涕變稠則爲欲愈之徵矣其證大概困倦無精神頭痛發熱或不思食或欬嗽每有二三日自愈者亦有累氣管而喉痛或累肺而成勞病大有關係者蓋傷風本非重證但經久不愈身弱累及內部亦能致死耳治法夜晚臨臥時熱水浸腳周圍用被圍護令水中熱氣上騰於身多飲熱茶擁被溫覆安臥得周身微汗出最妙內服呖格散法用呖格一鴉片一朴硝八共研爲散每次十四釐水和服如無呖格用發表微利藥面紅者宜引血下行可略用瀉法次早得微利卽愈有時喉嚨痛此病在總氣管之口喉皮周圍有炎氣管食管左右腫或有粒難吞嚥治法宜發表熱水浸腳如前法或白礬水或兒茶水或

冷水漱喉貯熱茶於壺內以口銜壺口呼之吸之令壺中熱氣蒸騰於喉使喉嚨之口得熱氣而溫潤外用布巾入熱水內浸絞按喉或用熱油搓擦車撥油松漆油貼芥末或斑蝥膏並宜用綿壇之類纏裹於頸令外面常溫暖意皆主於引病外出內服呖格散及瀉藥有時總氣管生炎當氣喉內發聲之處有肉絲塞住辛苦不安喉中水雞聲身熱面紅脈數欬嗽呼吸難小兒患此者時欲以手壓喉此證有忽然而起者有初因傷風欬嚏由漸而致者肉絲及痰塞住氣管之口最爲危險有二三日卽死者此證小兒二歲至十歲有患者北方冷溼之地尤多中土南方不多見冬春多過他時海濱多過別處治法同炎證

應先放蜚吮，更用熱水貯大澡盆，下身滿浸其內，擁被溫覆，令得微汗，內服用水銀散，每時服三四釐，能散肉絲。番名費皮連或用嘔藥，嘔去結痰，更服瀉潤之藥，外用芥末貼喉下，更用斑蝥膏貼小腿肚，或貼芥末亦可，意在引病下行也。凡病在氣管之口，必難吞嚥，在氣管之裏，不定難吞，然氣管有病，即時累肺，危險者多。○總氣管病，有真有假，假者但效嗽，喉中痰鳴，不似水雞聲，不發熱，無炎證，忽作忽止，小兒出牙時，每多此證。治法用牙刀割開牙肉，令牙易出。法詳西醫略論外用醋水頻洗，身虛弱者，食雞哪時，令出外散步，有小兒但效嗽，身不發熱，每一次連效，急促不止，面紅口渴，痰鳴嘔出，效即止，飲食如常人，夜晚發作尤數。

此是喉嚨腦氣筋病，或因行動頑硬過度，或忽被冷風所吹，或哭泣太過，大概小兒一歲至四五歲患者更多。治法避冷風，避溼地，多著衣，令身暖，內服暖氣藥及樟腦鴉片水之類，每服三十滴至六十滴，發作時即服，夜服兩三次，身熱面紅者，食微利藥，惡寒應食，噤哪幾次，此證歷久不愈，即防喘促，累肺宜遷徙他處，改變水土。

肺病有在本體者，有在氣管者，有在胞膜者，效嗽而喘，呼吸不利，是肺病證據，蓋總氣管分佈左右處，乾癢欲搔，不得人即效嗽，此與大小腸病，鼻癢肛門癢之理相同，輕者用熱油在外，中醫書名，搓擦，亦能止癢免效，此處因何而癢，則非余所知矣，缺盆穴效。

嗽分別有痰無痰，炎證先多乾欬，久後必有多痰，痰是氣管內所生津液，平人不多不少，不濃不薄，略如蟹膏，若有風氣則滿溢而出，亦如蟹膏攪之撓之，則生泡沫也。氣管中痰多，肺即不安，必欲偪之使出，膈肉向上挺住，翕而不張，氣偪而出，此喘欬之原也。必俟痰已欬出，氣管始能自主，或吐出或嚥下而欬亦暫息矣。有久病虛弱者，痰不得出，因膈肉雖已挺翕而痰之膠結於氣管者無力偪送使出也。凡欬嗽因炎證或傷風證所致，但治其炎服表散藥，炎退傷風止，欬嗽自愈。若欲專療欬嗽不能也。有大小腸生蟲，肝胃不安，因而累肺，喉癢乾欬者，但用殺蟲法，欬嗽自止。有身虛弱肺不安，不必有病而欬嗽者，婦人

尤多，每有因血少經停，黃病心跳，呼吸不利，喉癢而欬者，此應補虛而欬自止。有老人久欬，因痰塞氣管無力送出而欬者，亦虛證也。凡肺病必有痰，與大小腸病必有膠血同理。若痰稠結有血色，知肺經本體之肉生炎，若膿血交流，防已潰爛，但膿與痰有時不易分別，蓋無病之人痰色青而不結，有病則稠結或變綠或變黃或變紅，不定是膿。法應用水驗試，痰浮水面而膿則沈於水底，因痰質輕清，膿汁重濁故也。凡舊欬經累年月，肺經不必有大病，但因身虛習慣欬嗽，或氣管略有炎發作不休，有經久愈虛而死者，治法常令身暖，四支胸前用布巾浸熱水洗按，避冷風吹襲，服樟腦鴉片酒及呷格散。呷格散一鴉片或

白礬五七釐、鴉片一二釐、痰多者用化痰藥、食潤物、如胡麻子、甘草之類、老人久欬、身虛者、每日服硫磺末一分、能補火去痰、止欬、或服人參亦妙。

肺經炎證、或在本體、或在氣管、或在胞膜、證見身熱脈數、附耳切聽、如以兩指捻髮之聲、大概炎在本體、不必痛、但紅熱者有之、若炎在氣管、附耳切聽、其聲如鴿鳴、如鼓琴、似老絃重濁之聲、痰結塞住、呼吸之用不靈、然中國此證頗多、不定危險、炎在胞膜、痛如刀割、摸按更痛、大有關係、恐胞膜間生肉絲、兩片相粘連、久而不愈、漸生膿水、偪束肺體、不能舒張、因而肺體變小、妨礙呼吸也、若肺經本體生炎、最為危險、不必全體、但有一處受病、即

覺身大不安、呼吸大難、痰色紅紫如鐵末而稠結、置孟中膠黏、傾倒不出、氣管全塞、肺體或變堅硬、或變為膿、皆能速死、肺經炎證、大概北方多過南方、治法、痛劇者、放血、蜚吮、外貼芥末、或斑蝥膏藥、內服水銀散、翹腫止勿服、及鴉片、更妙、用叮叮伊密的、醫肺經病證之藥去痰最佳、二釐、配水一兩、每服一錢、每時服一次、有初服嘔者、不必慮、再服嘔自止、炎在氣管、不必放血、蜚吮、但服叱哩格散、樟腦鴉片水、食粥水、甘草胡麻子水、以潤之、外貼斑蝥膏藥、或酸醋水、松漆油擦、胃膈、如無松漆油、用草麻油及華撥胡椒搓擦、亦可。

喘病、因肺中小氣管痰結塞住、忽然收縮、氣不通行、呼吸短促、

得痰出乃減有日日發作者有數日或因辛苦寒冷而發作者亦有因父母患此病傳延者發作時苦劇不安醫治無良法應用紙人硝水內浸溼曬乾置盆內燃點乘煙欲薰騰時以口吸養氣入肺或用醉仙桃葉曬乾如曬煙葉法置煙筒內燃點吸入其氣亦可但醉仙桃有毒頭昏欲嘔者不可服內服樟腦鴉片酒一二錢更服薑末一分半白礬七釐共為散水和服頻用熱油搓擦胃膈多吸熟菸雖未必即時除斷病根或免反覆發作可望漸止

勞病

勞證因肺體生堅粒如沙番名啣此啣叻或在左肺或在右肺或左右俱有右多過左上多過下先生多小粒在肺經本體內

漸合為一大粒久而潰爛成穴穴有大有小有肺體全壞者此證各國俱有冷地尤多英米二國百人死者勞證居三十焉病原或因父母延累性質易患此證或因身虛居處溼地衣服單薄冷風吹襲或天時寒熱驟變或熱地人遷居冷地或食物不足或屋內臭濁不通風氣或辛苦勞倦或房勞手淫婦人或血崩或乳哺嬰兒太久男女患此證者每在十五歲以上至三十歲以下病狀先乾欬有血噎出漸至氣短促行動呼吸更促因倦無精神手足疲軟羸瘦頸變細長胃膈變窄操作辛苦則汗出瀉泄食物不消化夜臥不安脈微細而數心跳多痰或欬血胃膈時痛聲音不清久則啞手指末節生大甲彎曲醫者以手

按壓胃肺擊試聲低而啞以問病筋聽試覺有聲從潰穴泄出
 夜晩顴色鮮紅早起多冷汗舌苔先白後紅有數年有半年一
 年而死者間有三四年死者將死時多瀉多汗更羸瘦髮脫脚
 腫牙肉爛生白泡發熱痰更稠與膿相雜手足熱脈更細數是
 爲死徵割視肺體周圍俱有啞吡啞叻多粒或合爲一大粒變
 黃色者肺經潰爛成穴與潰瘡同狀有總氣管出聲之處潰爛
 不能出聲者有累大小腸潰爛色白過常度者有因此肝血不
 得入肺肝體大過常度者時時見肺與脇骨相連因累及胞膜
 之故蓋啞吡啞叻不但肺有之也如小兒疳積肚腹大四支瘦
 是因大小腸皮膜生啞吡啞叻飲食之津不能吸入液管所致

食雖多不知飽足且非獨人有之也凡禽獸久居濕地不行動
 藏府亦生啞吡啞叻緩猴此證死者最多每見中土婦人習慣纏腳不能
 行動因此虛弱勞病者有之又昔有鋼器埠工匠因鋼塵飛揚
 呼吸入肺多有肺經腐爛者先起於肺體生堅粒也凡勞證病
 已成無良治法惟於未病前見其人羸瘦虛弱噎欬短氣或父
 母曾患此證即應思意防係此證之徵急須審察病由令其改
 變習氣勿居溼地勿過辛勞勿大煩怒勿提舉重物勿房勞手
 淫勿飲酒過度宜散步閒適游玩怡情遷徙他處變易水土所
 居之室開戶牖以通風氣著綿當俗名背心謂無袖之短衣也令胃背常暖
 頻用兩臂前後開合令胃肺舒張呼吸大通更用酸醋水洗頸

前胃膈各處布巾擦之令熱內服之藥大概以出痰止血斂汗止瀉安身為主欬嗽用叱啤略散鴉片酒最宜或先用嘔藥以去其痰汗多宜斂鉛散三四釐白礬四五釐能收斂止汗瀉泄者用膽礬二釐鴉片二三釐配水一兩日服二三錢兩日服畢能止瀉肺痛者貼斑蝥膏藥面與手足熱者頻用溫水浸洗

欬血

欬血一證人每慮其必死其實欬血不是死證因欬血而肺壞則致死耳有時牙肉出血或喉嚨病出血誤認為欬血醫者當須明辨凡欲欬血先覺胃膈不安如有物傾壓呼吸不易脈數口味鹹欬出之血混雜痰中便知此血來自肺經蓋胃血吐出

大小腸血瀉出肺血欬出其理一也欬血之證熱地多過冷地然冷地欬血危險者多熱地則不盡然蓋肺經將壞或已壞而血泄是為危險之證但人多因身虛血薄從小氣管泄出未必肺經損壞故亦不定危險也欬出之血或僅少許或有二三斤者大約一二三兩為多欬血有忽然而起者有一晝夜即止者有每日晨起必欬血一二次日以為常者有欬血已止兩三日後反覆者大約反覆者為尤多患此證者每在十五至三十五之年一二次不必慮若反覆恐累肺而成勞證所當慮耳凡血泄入氣管中塞住氣管呼吸艱難不得不用大力欬出此欬血所由來也大概肺經之血有數證可據一色鮮紅二欬出三血

內科新論 卷上
在痰中四血每出不多間有因欬致喉嚨不安而累胃者亦或
雜飯物吐出所當辨耳有時脈管偏裂或偏裂肺經之肉大有
關係有時心左房有病肺迴血不得返心停留於肺泄入氣管
欬出者大抵欬血是心肺病之證據因病而血出非因血出而
病也惟欬血已久即防成勞漸致肺壞者則有之故欬血或在
肺壞之先或在肺初壞時或在肺壞潰爛成穴時尤以肺壞先
及初壞時為多耳致病之故或因天熱過度勉力操作持重或
言語太多或大聲呼叫或跌打外傷西國人壯健者多欬血多
因血停滯虛而泄出者較少故治宜放血中土則虛而泄出之
證為多治法高枕安臥寡言禁呼叫節辛勞內服鉛散三五釐

鴉片一二釐日服二三次此止血最妙之藥余在中土用此方
療治多人無不應驗或用呷格散十釐與鉛散同服如無鉛
散及呷格格用白礬五七釐鴉片三四釐溫水和服幾次又酸
醋或淡磺強水及鐵酒亦能止血並宜服冷茶冷水勿食熱物

胃經有本體之病、有功用之病、本體之病、炎證潰爛癰類是也、功用之病、食物不消化是也、胃經新炎、多因食大毒之物而起、痛劇拒按、內熱、飲食即時吐出、惟冰塊吞全身發熱、大渴、呃逆、面白、脈細小無力、舌邊周紅赤、光亮而乾、身大不安、割視、死人見胃、內皮紅極、或潰爛、此服毒如信石暴生之炎也、若不因服毒自生之炎、由漸而起、是為舊炎、所見證亦同、但勢俱輕緩、舊炎之故、或因食不消化、或因大便秘結、或因食物不合、或因天熱多汗、大渴、遠行勞苦、身熱困倦、時急飲冷水、皆能致此、治法、胃骨盡處、左為胃位、放蟻吮血三四次、後用芥末、熱水和貼、或

胃病證論

胃經有本體之病、有功用之病、本體之病、炎證潰爛癰類是也、功用之病、食物不消化是也、胃經新炎、多因食大毒之物而起、痛劇拒按、內熱、飲食即時吐出、惟冰塊吞全身發熱、大渴、呃逆、面白、脈細小無力、舌邊周紅赤、光亮而乾、身大不安、割視、死人見胃、內皮紅極、或潰爛、此服毒如信石暴生之炎也、若不因服毒自生之炎、由漸而起、是為舊炎、所見證亦同、但勢俱輕緩、舊炎之故、或因食不消化、或因大便秘結、或因食物不合、或因天熱多汗、大渴、遠行勞苦、身熱困倦、時急飲冷水、皆能致此、治法、胃骨盡處、左為胃位、放蟻吮血三四次、後用芥末、熱水和貼、或

貼斑蝥膏或用明伊密的膏搓擦嘔吐者服冰塊腹痛服鴉片水便秘服葶麻油大黃凡胃炎宜食潤物如粥湯牛乳藕蓮粉西穀米之類若因食物不合而起者務宜戒口爲要有時因胃炎食則痛不欲食者不食則死宜用牛乳少飲多次昔一小兒患此病人不能治後有良醫教以每半時飲牛乳十次漸加至一兩再加至一兩半後遂愈此最妙法也外用麻油及鴉片頻擦或用布巾入滾水浸絞按壓胃位胃癱不多見四十歲以上間有之男多過女其痛甚劇而熱如咬如焚多生於胃之上下兩口食時則痛食後痛止是癱在上口也食時不痛食後則痛者是癱在下口也初時所見之證與

炎證食不消化證相同無從辨別久治不愈身瘦面晦暗如鉛色按之更痛而堅吐出瘀血色黑卽是此證確據無醫法止能食潤物如牛乳牛肉湯之類不宜食蔬肉堅硬之物服鴉片略止其痛割視胃口或上或下變窄甚厚或潰爛胃經功用之病多過本體自病蓋胃之功用最大病亦最易故食物不消化之證各證中爲多華人患者尤多凡食物入口齒牙咀嚼由喉入胃胃中漸生津液以消化之此胃之功用一也舒縮攢動勻轉食物使就津液而便消化此胃之功用二也所飲茶水別有微絲血管吸攝入迴血管歸心運行周身爲汽爲汗爲溺其食物經胃中津液消化之後過胃下口入小腸與肝

汁甜肉汁融合分精粗兩種精者如乳汁吸入細微液管漸入
 吸液總管作血粗者為渣滓傳入大腸變屎若食物過多則胃
 中津液不足供消化之用若食物不合或咀嚼未細消化必遲
 胃之下口不容速出有停滯致病者有由大便完全出者獸類
 之胃或但能消化肉或但能消化草人則不論何物俱能消化
 但消化有難易若專食一物久則生病此人與獸類之分也
 胃不消化即不思食或食後隨時又飢有時專食一物久則生
 厭此是胃自覺不合告語人知也即應調理戒口大抵不消化
 之故亦非一端或因食物太多或因食物不合性質或因專食
 一物或因食難消之物如鹽醃魚肉及醃雞鴨蟹蔬菜一切肥膩糖餅等物俱難消化詳見西醫略論

或因咀嚼未細或因殮飯不按時或因讀書過多勞傷腦神累
 胃或因思想謀慮或因驚駭恐懼或因鬱怒悲哀或因月經不
 調或因胎孕子宮累胃或因血少或因煙酒過度或因吸食鴉
 片或因舟車勞動腦體累胃或因身病發熱惡寒或因便秘過
 服瀉藥有時不因別故但因胃虛弱所食之物化為風氣在胃
 中、有時因腦心肝各處有病累胃或別處炎證累胃凡胃不消
 化證據不欲食或時欲食時不欲食或食至則厭惡或思食非
 常有之物或食後隨時又飢無止足此證舌苔或厚白或黃或
溼或滑或食後或欲嘔或略吐或所食之物即時吐出或吐酸
澀不定水或吐鹹水或吐淡水或吐痰涎有時吐多味苦者是膽汁由

胃出也有時胃滿有聲是胃中有風氣上出則為呃為噦下出則為大腸失氣有時胃膈內熱懊懣煩悶褊急易怒懶惰困倦無精神不欲言語行動四肢冷睡臥不安驚駭多夢不能寐自覺胃重不安口氣臭或腰左與胃位相對之處痛或左肩臂痛此胃病累或頭痛有偏左痛者有偏右痛者有左右俱痛者有腦氣筋此胃病累昏眩者此胃病累心跳脈亂此胃病累溺中有粉或紅或白澄於溺器之底大便或秘或泄此胃病累糞質異於平日色白氣臭或成粒肚腹有痛者有不痛者有忽痛者有漸痛者痛分四種一未食胃空則痛食即不痛或按之痛即稍減此痛在腦氣筋蓋因思慮太過或飲酒太多或飲熱茶太多致令腦筋不安也二

食時痛按之更痛吐出即不痛此胃口有炎也三食後漸痛此因胃弱不能舒縮勻轉食物故也四忽然暴痛不關飲食此亦胃體腦氣筋不安之故

凡不消化之證須病者自知謹節方可醫治先審致病之由如因食物太多者應減少其食因食物不合或專食一物者應禁絕勿食大抵人之性質各有不同惟蔬果穀肉人人宜食陳醢魚肉及一切肥膩糖餅之類人人皆不宜食至生酸瓜果亦不宜多食瀉痢霍亂此外各物則或宜或不宜醫應體察因食何物致病即令戒食何物至每日餐飯早遲務宜按時多少貴乎有度每日不宜多次每次不宜多食每食不宜多品食物必須

細嚼老年無齒者應用湯水助令物易化飯時不宜多飲茶病者飯後宜少休息不可操作思慮亦有安逸過度致病者飯前宜散步又有因久不沐浴污垢塞閉汗孔亦能令胃不消化宜常洗濯潔淨肚腹有風氣者大概因多食果蔬所致宜戒果蔬若因煙酒鴉片所致者即宜屏絕勿食

凡因食不合之物忽然痛劇者應先用吐藥吐出宿物吐藥用散一二分或芥末五六錢或瓜蒂或膽礬一二分滾水和服痛拒按者大概有炎應以去炎為主或用蟻吮或貼斑蝥膏藥痛不拒按者胃弱也胃弱者餐飯宜按時每日向食二餐者可勻為三餐每餐減食少許使胃中易於消化所服之藥以暖氣補胃止痛為主暖氣如葶撥樟

腦胡椒木香白芷蔻薄荷丁香八角芥末皆是補胃如雞哪金雞哪黃連青礬鐵末人參黃耆白朮皆是痛時服樟腦鴉片水止痛外用滾水和芥末二三兩愈濃愈佳紙二層或合住約厚一二分貼痛處手巾綁護勿令脫俟二三刻外皮紅熱略痛然後揭去一次不愈不妨更貼二次吐酸鹹水者服灰水或桂皮散加牡蠣兒茶末一分或鴉片二釐或嘸喇大黃散食時有風氣從喉出者用大黃胡椒阿魏薄荷八角薑末水因大小腸病便秘累胃者宜啞囉大黃丸便利胃自愈一法夜服大黃丸次早服元明粉三四錢不應者巴豆油一二滴和大黃末一錢分作十二粒每服一二粒微利勿令大瀉大瀉則病反增劇一法

大黃末、生薑末、胡椒末各三分、薄荷油或八角油數滴、和作十二粒、飯前服二粒、日二服、頭痛吐膽汁者、宜水銀散、大黃丸、瀉肝、凡胃不消化、最宜戒口、便秘者、用微利藥、或少食蔬菜、蕉梨、連皮麥粉、牛胃皮入牛乳內、及雞湯粥水之類、俱能潤胃。

吐血

吐血之原由於胃、蓋胃中血管甚多、有時潰裂一二處而血出、其故或因胃本體生炎證、及膿瘡乳癰等證、爛壞血管、或因跌打外傷、胃中血管斷裂一二處、其血棕黑而臭穢、驟吐出者其臭穢若少歷時刻則無有不棕黑臭穢者矣危險難治、但此類甚少、常見之證、大概血管不曾潰裂、血自管中泄出、有時多至一斤或半斤者、其色

黑而結、蓋胃中迴管多過脈管、迴管之血色黑、此一故也、管中之血泄出在胃、胃之酸汁能令血色變黑、此二故也、病原或因胃自病、或因身虛弱、血質稀薄、皆能泄出、有時胃自不病、血自別經傳入於胃、如婦人倒經、是子宮之血傳入於胃也、又如肝脾生大血、不易通行、迴血管滿溢入胃、則吐出入大小腸、則便出、便與吐出路不同、其理一也、胃血與肺血有別、肺血欬出、胃血吐出、肺血色紅、胃血色黑、肺血有痰、胃血則或與所食飯物齊出、且肺血少、胃血多、肺血偶有�者但色必鮮紅俱易辨識也、至胃血自大便出者、又與大小腸痢證及直腸痔瘡之血有別、直腸痔瘡及痢證、血色俱紅、胃血色黑、痢證血與膠雜、肚腹必痛、胃血無

膠且無腹痛證尤易辨識也將吐血時先覺胃重不安欲嘔頭昏面色黃白或胃不消化或胃痛中土患此證者頗多大概少壯人多過老人貪嗜煙酒鴉片人尤多胃中血管不曾潰裂一二次即自止未必大患若吐至幾次應思意血管潰裂恐防危險

治法吐血一二次即止者大概無妨但令戒口安息食涼潤物飲冷茶忌飲熱茶及熱物血多者吞冰塊最佳有暴吐多血頭昏者應令平臥冷水澆面久吐身虛弱者宜服收斂補藥白礬兒茶酸醋俱可取用番人用松漆油番藥二十滴至三十滴日服三四次如無松漆油用鉛散二釐合鴉片二釐共作一丸每半時服一

粒以血止為度若因肝脾有病血從胃出胃自不病者吐血後即覺鬆適此以病醫病之法也肝脾病者服水銀散五七釐置舌上水吞送入血瀉肝膽後用元明粉一二錢大黃末一二分水吞服一二次外貼斑蝥膏藥參用治肝脾病法婦人月經不行累胃倒出者另詳婦人病證篇

肝膽病證論

肝之功用主生膽汁、膽乃貯汁之囊、其汁係脾胃大小腸迴血入肝所化、流入小腸之內、以消化食物而利傳渣滓、肝之體比較各臟最大最重、其位居膈肉右方、前當第六脇骨之下、後當第七脇骨之下、左右兩葉、左小右大、上圓凸貼承膈肉、下銳、其界抵胷骨、脇骨盡處、略出少許、其質不堅不軟、有本體之病、肝體變大、或變堅硬、或生顆粒、或炎證、膿瘡之類是也、有功用之病、所生膽汁過度、或太多、或太少、是也、肝病夏月多過餘月、熱地尤多過冷地、歐羅巴人至中土及印度去冷地就熱地、所患病證最多者有三、一熱證、二大腸瀉痢、三肝病也、華人食牛羊

內及燥熱之物不多，故肝經炎證較少。有人食肉飲酒過度者，每致肝體堅大，或生炎證膿瘡，或生膽汁太多，病狀不一。更有因跌打外傷而肝裂者，有因大腸瀉痢而累肝者，有因肺經勞瘵而累肝者。剖視肝軟有肥膩之物在內今分別論之。膽汁太少，小腸之物精粗不分，尿色白，或祕結，因肝之功力懈弛，所生汁液不足，用宜服開胃補胃及水銀散之類，助生膽汁。若肝生汁液太速太多，由大腸瀉出，或黃或綠，綠卽膽汁本色，有時自小腸溢入胃中，嘔出色綠，味苦，頭痛，不思食，此肝病累及腸胃者也。有時肝之功力妄用，膽汁太多，滲入血中，則爲黃疸病，周身皮色全黃，眼白殼尤黃，更有汗黃者，有口中之水略苦而黃者，有所見之。

物略黃者，大概平素色白，病則黃，平素色黑，病則綠，亦有皮色變黑者，則因膽汁素病變黑之故，難治。黃病小便或黃或紅黑，蓋膽汁泄入血管而至，內腎自膀胱出，少則黃，多則紅，更多則黑紅，黑卽黃之深者，試以清水攪和，則紅黑亦變而黃矣。黃病之原，多由怒喜驚恐，或因膽管被壓，膽汁不得入小腸，壓膽管者，或大小腸，因大小腸內有燥屎之故，或子宮，婦人懷胎足月，每見此證，或腹內生肉瘤，或嘔吐鬱身，或肝體生炎，生火皆能壓住膽管，阻礙通行之路。又有膽淋一證，亦能塞住膽管，膽淋在膽囊內，成粒小者如粟，大者如龍眼，更大者如核桃，謂之膽淋者，與膀胱之石淋略似也。其色黃黑參雜，其質不甚堅，凡患此者，左脇骨下忽然大痛。

內科新說 卷一
難忍如婦人產子之狀嘔吐酸水脈如常無淡歷數時過膽管入小腸痛即止後從大便解出試以清水攪試膽淋浮於水面蓋膽管細如鶯翎所以初次淋出管時管被漲逼必甚痛苦後來漸成熟徑再有小者雖出亦不甚痛矣然有膽淋藏貯囊內經年不出西醫剖視死人有時見膽囊內有淋多至二十粒或膽管內有淋三四粒塞住一半婦人肥壯人尤多大抵安逸過度或久臥及大便常秘結者易生此病昔有人剖牛試驗屋內豢養之牛有此病耕作勤苦之牛無此病益悟此病由於過逸也一切黃病皮乾而癢大便或秘或瀉嘔吐脈緩右臥則不安困倦無精神不欲食輕者一二十日黃色漸減而愈治法水

銀散五七釐或迦路米三四釐或蜜或白糖和服大黃末二三分滾水和服次早服元明粉三四錢朴硝一二分或連服三四日或間日一服病減後服開胃補胃藥如黃連雞哪之類膽淋服鴉片止痛痛劇者不妨多服三四釐服二三次外用鴉片丸塞入肛門布巾入罌粟殼水浸絞隔腹按壓凡肝病宜戒口勿食肥膩酸甜及一切難消化之物
肝本體生炎分別新舊新者忽起舊者由漸而起其證肝痛以手摸按右膈肉下更痛呼吸不利欬嗽更痛左臥更痛右肩痛或眼白殼略黃疸黃則黃甚全身發熱嘔吐溺紅或便秘或瀉泄有數日自愈者有變舊者有生膿瘡者受病之故或因天氣

內科新說 卷二
暴冷暴熱或因跌打外傷或因飲酒過多大概華人多肺病番
人在熱地者多肝病此則關乎性質矣肝炎與肺炎易辨肝炎
有時黃肺炎不黃肝炎累便溺肺炎不累便溺肝炎欬嗽無痰
血肺炎有痰血肺炎左著牀臥則痛劇肺炎或在左或在右炎
在左者右臥則痛劇炎在右者左臥則痛劇且肝炎按摸則更
痛易於分別也數日後熱減瀉出膽汁或黃或綠汗出小便有
粉或白或紅肛門內有黑血出是爲欲愈之候若發熱更重惡
寒戰慄手足冷便秘噎膈痛在一處不移卽防生膿瘡治法西
國用放血法中土可用蟻吮法當肝位及肛門周圍引血外出
不愈者再吮內服水銀散或迦路米五釐鴉片一二釐日服二

次次早用元明粉三四錢大黃朴硝各二三分更服大黃葶麻
油日一二次總以瀉藥及發表藥爲主外貼斑蝥膏或以吶吶
伊密的膏或水銀黑膏隔腹摸擦安臥勿起立戒口勿食熱物
舊炎中土尤多見證略與新炎同痛勢少緩發熱輕重不定自
覺肝體重墜按壓則痛食不消化困倦無精神大便色白祕結
肝漸大而堅摸試易覺壓住迴管血不通行如常擠偏血水滲
溢肚腹腋膜之裏遂生臃脹舊炎治與新炎同但身多虛弱勿
過瀉應用水銀黑膏隔腹搓擦更用斑蝥膏藥貼住胃不消化
者內服黃連水開胃或人參白朮之類補胃有寒熱者服雞哪
外用挨阿顛膏或挨阿顛酒擦番人在中土患此者應航海他

往、改變水土、肝生膿瘡、或一處、或幾處、痛不移動、外見兩腮略紅、手心紅熱、寒熱往來、戰栗、肝痛、或略跳、有因腸胃病所累、有因肝炎所致、其膿有穿破皮肉外出者、外見腫凸、有時內傳肺胃、大腸入肺則欬出、入胃則吐、出入大腸則瀉出、多至二三斤、有時傳入肚腹包膜必死、出膿後身瘦弱、大不安、因此臃脹者、極危險、此證應割開助、令膿流出、若自穿破者、用潤物如粥渣之類貼住、宜食補胃之物、美酒飯肉俱不忌。

脾病證論

脾經功用、人未盡知、大約收聚往來餘剩之血、以寬開動脈而保護臟腑者也、其質軟、接血多時則大、接血少時則小、此其常也、若久瘡多冷、血不行於外、多聚於脾、脾漸脹大、摸試脾位、居左之堅硬而滑、脹至胃下、覺有邊廉、推之能移動、即是此證、平睡腿略卷起、更有時略痛、或略欬、或胃不消化、無精神、或不能睡臥、易摸試身右著牀則更痛、有經歲月或經年不愈者、久後恐成臃脹而死、此證歐羅巴甚少、中國印度、則男女小兒、每有患者、治法不能速效、止可緩圖、夜晚服水銀散、五釐至一分、次早服元明粉三四錢、朴硝一二分、大黃一二分、服兩三次後、但服元明粉朴

確大黃輕瀉、不思食、服開胃補胃藥、如噠哪黃連人參鐵酒之類、及適口養人飲食、外用挨阿顛酒、或挨阿顛膏、或水銀黑膏、熱手搓擦脾位、凡瘡證後多有見此證者、宜用噠哪信石酒鐵酒鐵末、大有功力。

小腸病腹痛論

小腸病腹痛、分別二種、輕者腹暴痛無炎、其痛如絞、忽作忽止、有時痛劇、有時稍安、有全腹皆痛者、有痛偏一處、或左或右、或左右移動、喜按脈如常、身無熱、大便必祕、腹內有風氣、或欲嘔、或吐出、此證不拘男女、四時皆有、夏月更多、有易醫者、但令戒口、服去風瀉藥、即愈、亦有初起輕、漸變重者、大概一二日不甚辛苦、不至危險、若用各種治法不應、大便更祕、腹痛更甚、先時按之不痛、後來按之更痛、先時痛處、改變移易、後來痛有定處、嘔吐更甚、或吐膽汁、或吐出小腸之屎、此是變成炎證、危險難治、漸至呃逆、無精神、冷汗、面白、而瘦軟、弱無力、妄語、若痛忽止、

內科新說 卷上
必死因小腸有炎一處死壞割視死處黑周圍紅小腸變窄塞住蓋此證本因小腸肉力亂用縮短塞住路不通行所以大便祕結小腸中多風氣輕者服去風瀉藥後大便出小腸風氣從肛門泄出即知塞處復通為欲愈所慮大便風氣不出是危險之徵耳致病之原有數端或因天熱暴冷或感受雨溼汗管驟閉汗氣即時止住不生身體困倦時風寒不慎最易患此或因食酸果生瓜之類肚腹寒冷或因膽汁生多味辣觸小腸或因大便久祕令小腸不安或因痢瀉不應收驗誤服收斂藥皆能致此治法先服迦路米或水銀散四五釐鴉片一二釐每一時服三四次後服蓖麻油八錢如無蓖麻油用大黃二分元明粉三四錢外用

鴉片水貯水節內射入肛門若仍無大便知內未通再服蓖麻油元明粉或巴豆油一二滴外用罌粟殼沸湯沖布巾浸絞合按肚腹痛處一二刻或數刻能止痛若痛未止用酸醋和芥末略加滾水熬濃攤厚紙或布塊上貼住一二刻小腸炎證痛劇有定處不移動按之更痛痛處漸大喜仰臥舒足痛稍鬆減有時累胞膜痛更劇衣不可觸大便祕結已極大嘔後即吐先吐痰後見膽汁溺紅發熱脈數而緊自覺軟弱無力最為危險若見大呃逆脈亂不定四支冷面白瘦無精神忽然痛止是為死徵割視小腸黑周圍紅有肉絲黃水泄出此證初起依法醫治有時痛漸減諸證略減可望愈若病不應藥痛

內科新說 卷上
證更劇更多，為危險病原，俱與前證同。治法：西人宜放血，中土可用蜚吮痛處，罌粟殼水洗芥末貼住，不應更貼斑蝥膏。兩三次內服之藥亦與前證同。水銀散四五釐，鴉片一二釐，連合服一二次。後服蓖麻油，或大黃二三分，元明粉四五錢，不應再服水銀散二三釐，鴉片一釐。其作一粒，每一時服一粒。俟牙齦腫為度，大便秘結，數日不出者，服巴豆油一二滴，一次不應者，服二三次，務以大便通利為度。

痢證論

痢證中土古書名腸澼，又名滯下，俗分紅白二種，總名痢疾。此證亞細亞多過歐羅巴，印度多過中國。大概地熱則多，故南省多過北省。天熱則多，故夏月多過餘月。有時一方通行，與霍亂出痘相似，但受患者或多或少，或十人中僅一二人，不似霍亂出痘傳染幾於周徧也。間有多人聚居一處，或船艙，或監獄，或醫館，或工作戰鬪之區，人人皆患此證者，大概因臭穢薰蒸，或屋密不通風氣，或寢處污溼，受病之由相同，非此病本能傳染也。痢證因於大腸內皮生炎，或一處，或二三處，小腸偶亦有之，但甚少耳。此證多由瀉泄而起，與霍亂同，辨別之法，霍亂暴

起瀉而兼吐所瀉者水痢證之瀉大概由緩而數不吐所瀉水中
有膠血及各物混雜略似洗牛肉之水為不同也有新有舊
初起為新久延為舊新者身壯健病勢有力證見大便難急欲
出不得出努掙苦劇肛門內熱痛身熱脈數便後無精神懶倦
似虛弱隔腹摸試大腸拒按而痛一二日後發熱致病之由或
因天時寒熱驟變或暴落大雨感冒受患更多衣服被雨灑溼
或坐臥溼地或食生酸瓜果尤易患此蓋人之性質不同有易
病肺者有易病肝胃者有易病大小腸者其故不能強解也夏
月瀉泄或大便秘結皆能致病須早醫治凡痢疾初起發熱惡
寒或但發熱不惡寒或無寒熱腹痛如絞其始大便日十餘次

水與糞相雜或略見膠血漸而水多糞少證見口渴欲嘔脈數
苔白膀胱不安溺管痛熱時欲小便不得出溺色紅二十餘日
可止若不止則為舊痢裏急更甚膠血更多自覺大腸欲全偏
出四肢冷因血不通行如平日之故口更乾渴舌苔棕黑色或呃逆或譫語
或身瘦腹如空囊或肛門鬆弛大便如遺皆危險痢證所瀉之
物有糞與膠血雜者有糞色淡黃與綠者有全見白膠或全見
血者或有燥屎成粒者有時膠血愈多則病愈重痢證安危以
此定之病在直腸則裏急時欲努掙不得出愈近肛門裏愈急
有時不裏急不發熱者此直腸無病病在直腸之上也更以手
隔腹摸試大腸由右膀胱倒上分上中下三迴上迴橫接小腸

內科新說 卷上
中迴在肝下、橫過胃底、下迴至脾下、從左軟脇斜落至肛門、是為直腸、小腸居腹之中、何處按之更痛、卽知病在何處也。舊者身虛弱、病勢無力、其故或因食爛壞瓜果、敗魚腐肉之類、或寢處污穢之地、脈細數、身不熱、軟弱而瘦、面白、肢冷、惡寒、不欲食、時欲吐、抽搐、周身皮乾、熱渴少、舌乾或黑色、或棕色、或黃色、膠血更多、或血中有粒、所瀉之水極臭、漸成膿、腹內有風、滿緊、或空虛如囊、或呃逆、譫語、皆危險。痢久有膿水、是大腸內皮潰爛也。潰爛少者可治、若潰爛多、或爛穿成穴、尿水流於腹內、必速死、有時略按肚腹、或衣略觸壓、卽痛不可忍者、是累及肚腹胞膜也、最危險、有時大腸因痢證

所累、斂縮變窄、風屎水不得出、割視周圍色黑、血不通行之故、有時大小腸內皮裂壞、成細片而出、雜入膿水中、有時累及肝經、生膿瘡、皆危險、難治之證也。

欲愈之候、痛漸減、裏急漸緩、脈漸平、舌苔漸退、皮有微汗、神清爽、身安適、更喜糞色見黃、是膽汁漸生、尤爲佳兆。

治法分別新舊、有力無力、病新體壯健、應用治法、不可妄用收斂止瀉法、若病舊無力、又須收斂止瀉爲主。

新痢體壯健者、按試肚腹痛處、用蜆十數條、杯覆蓋、吮噬、落後用罌粟殼、野菊花、沸湯沖、布巾絞溼、按患處一二刻、更用芥末和入斑蝥酒、滿擦肚腹、令暖、若慮有燥屎在直腸、應用潤瀉法。

內科新說 卷三
蓖麻油七八錢服二次或用大黃末一二分服二三次或先用鴉片膏三四釐水銀散七釐至十釐蜜和服次早更服大黃蓖麻油裏急痛苦者用鴉片水及麥漿溫水貯水節內射入肛門日二次如無水節用鴉片丸塞入肚門亦可又用熱水滿貯大盆坐盆中薰洗日二三次甚妙小便不利亦用此法或用朴硝一分樟腦七釐鴉片三四釐日服三次又法用呷啞番藥名三四釐或五六釐配以朴硝鴉片末呷啞一配鴉片末一朴硝八以此為準可也或樟腦鴉片酒和呷啞日服三四次大有功力凡痢疾初起多因大小腸內積聚阻塞令腸不安必應瀉去有時膽不生汁小腸之物精粗不分有臭氣者亦應瀉出或大便只有水膠血而無糞知所食

之物停聚亦應瀉出但止可潤瀉不宜大瀉並宜戒口後見舊痢身虛弱者應用收斂補藥鴉片二三釐或四五釐同雞哪二三釐水和服日三次如無雞哪黃連水鐵酒兒茶水沒石子水石榴水並可用有寒熱者雞哪尤宜因雞哪能並治寒熱故也若用鐵酒不可與鴉片同食早晚服鴉片水午刻飲鐵酒可也雞牛羊肉湯粥飯鮮魚俱可食鹽魚火腿一切牛乳尤佳能收斂口渴者飲粥水牛乳胡麻子水甘草水大麥水食豬蹄筋海參西穀米藕粉蓮粉之類並取滋潤腸胃之物但食物不可太多多則恐難消化也無論新舊痢最忌坐立行動辛苦並宜安臥溫覆用絲棉瓊絨之類纏裹肚腹令身漸暖血即通行小便可

用溺壺大便或將牀板分開或用有柄便盆總以不出被爲妥
諸法用過不應服水銀散三四釐鴉片一釐共作一粒日服三
次齟腫爲度若慮大腸潰爛用膽礬二三釐鴉片二釐身虛不
宜用蜚吮法者用斑蝥膏藥及芥末貼痛處以代之不愈者不
妨多貼大概痢疾醫治雖善亦不能望速止但新者不至變舊
舊者不至潰爛日漸減輕卽屬可喜但略愈醫治未能速痊仍
反覆最妙遷居他處改變水土

小兒患此者治法與大人同但蜚宜減少藥宜減輕可也牡蠣散一
二分鴉片一釐能止小兒痢疾
但未滿一歲者不可服鴉片

瀉泄論

瀉泄有在病將起之先者如霍亂痢疾是也有在病欲愈之候
者如熱證麻痘是也有因久病虛弱所致者如勞證之類是也
俱已分見各篇有時不關他病自爲一證者另於此篇詳之瀉
泄之原不一有因外感寒冷如行路忽遇驟雨溼衣著身不脫
換或行步水地履襪溼濡不脫換俱能致瀉有因於飲食內傷
或酸冷果物或腐魚敗肉或將壞蜃蚌之類有時物本不壞但
與其人性質不相宜或遠適他處飲食不慣亦能致瀉或驚恐
鬱悶亦能致瀉又肝生膽汁太多能令大小腸不安而瀉暑月
此證最多又有因食瀉藥過度因而瀉不止者又有因於蟲者

此皆瀉泄之原也。因無寒熱證，無炎證，裏不急，無膠血，故知非痢疾。此證脈如常，舌苔白，或無口中有氣味，腹內略痛，有風氣大腸轉失氣。俗名放屁。凡人臟腑惟肺經有氣呼，所瀉之水或黃或白或綠甚臭，蓋膽汁太少則白，太多則黃甚。小兒則綠俱失其正，有時所食之物完全瀉出，由於胃不消化，小兒尤多。凡瀉泄不止，令人身軟弱無精神，務宜早治。

治法：瀉泄由於感冒寒冷而起者，宜熱手心搓擦肚腹，令暖，更以西絨或獸皮裹腹，外用數尺長布巾包束，勿令脫，安臥勿勞，身溫暖自易愈。因於飲食不合而起者，宜禁戒勿食，初起腸胃有物停滯，須令瀉出，宜用大黃一二三分，鴉片膏三四五釐，草

麻油七八錢，薄荷油二三滴，腹痛者，桂皮散薑末，或兒茶、荳蔻、白礬酌用，膽汁太多尿色綠，或太少尿色白者，服水銀散四五釐，大黃末四五釐，鴉片膏一二釐，蜜和服二三次。一法：吃嗶啞散。吃嗶啞略一鴉片，一朴硝八為度。又法：桂皮散、牡蠣散各一二分，薄荷油二三滴，或八角水和服。小兒未滿一年，勿服鴉片，可用大黃末三四釐，桂皮散五釐，牡蠣末一二分，薄荷油二三滴。以上初起治法也。若久瀉不止，色黑宜收斂，膽礬二釐，鴉片二三釐，八角水一兩，作四分，每服一分，日三服。又如兒茶、木耳、白礬、沒石子、石榴之類，俱可取用。鉛散、鴉片皆能收斂止瀉，可與吃嗶啞略或朴硝並用。虛弱宜補，雞哪鐵酒、鐵散、黃連、水人參、黃耆、白朮俱可用。

陳葡萄酒番酒紅者佳收斂補精神可飲阿膠牛乳雞湯胡麻子水
潤腸可食一切果菜均須戒食

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

大便秘結論

大便秘結其故有二一因病後或大腸或小腸變窄尿不易出
一因大小腸功用不如常或膽汁少或所食之物能令便秘又
凡人大便以每日一次為得中且須按定時刻過疏過數忽早
忽遲皆為非宜欲便時不可強忍強忍則秘與胃中忍飢不食
過時即不思食同理便秘能令身不安精神困倦治法不宜大
瀉只可微利蕉梨蔬菜新果宜常食數日不太便服葶麻油八
錢至一兩元明粉朴硝大黃俱可用麥粉連皮亦能微利大便
略白可用輕瀉丸三四粒或啞囉丸或啞囉大黃丸一二分後見
方藥外用冷水貯水節內射入肛門最妙大便堅硬半出痛劇

不利者用熱水貯大盆薰洗肛門亦妙患此證者宜常出外散步
步日可散神氣火三四味其藥丸如迎神火黃丸一二包
至一兩天開味休前大黃丸可服藥裏衣前避味大頭
高只可幾味蒸藥菜湯果宜常食雖日不大噴氣其氣前入
酸甜酸不思食同應時藥命良不交熱懶困命去不宜大
忌酸青酸非宜冷野甜不可酸及惡惡眼與胃中惡酸不食
凡人入野以時日一丸散中且其藥丸如迎神火黃丸一二包
一因大小濕也服不吸常如酸甘少短便食之碎命野藥又
大頭藥其藥有二一因神氣丸大頭丸小頭丸穿氣不長出
大頭藥藥

霍亂證論

霍亂俗名絞腸痧又名抽筋證一方之中同時傳染與痘證傳
染相似忽然而來有時十死七八有時十死四五傳染之故不
盡可知大概風傳人傳人之衣服氣汗便溺所傳人傳尤多過
風隔海猶能傳染受染之人大概虛弱人中年人尤多受染之
時大概困倦時飢餓時瀉泄時尤多以地言之熱國尤多所以
印度土耳其等國多過歐羅巴各國以節序言之暑月尤多所以
長夏多過餘月其證不必年年皆有傳染輕重亦年年不同歐
羅巴昔無此證數十年前自亞細亞傳來由東遞傳至西初次
傳染時死者尤多漸退漸減其狀嘔吐瀉泄不止筋肉亂用或

手足抽絞、或腹內抽絞、痛劇、大不安、夜晚尤多、病在肚腹大小腸初起、多由於瀉、下暴注、上傾出、略如淘米之水、係因多血流入腸胃、血中之水吐瀉而出、所以血太濃、微絲血管、不易通行也、各處津液俱少、證見面白而瘦、眼凹喉乾、口中氣冷、皮冷脈細、或隱伏不見、冷汗、無溺、無屎、聲低、不欲語、或譫語、有忽然周身軟弱、無精神而死者、有累肺喘促而死者、有累腦鈍滯譫語而死者、有脈細不見而死者、有吐瀉略止、內部生炎、發熱而死者、有因平素虛弱、死者、有時瀉出水色如醬、係和大小腸中之血齊出、亦為危候、死時速或一時、至三四時、遲或一日、更多夜發出、次早死、愈候、脈出吐瀉止、水色漸黃、或漸綠、冷汗止、皮漸

暖、小便及各處津液漸回、皆為欲愈之徵、過九時十時、勢漸減者、可愈、西醫剖割死人、視之腸胃中多白水、內皮白過平日、而縐似浸入水中之狀、迴管中之血滿而濃黑、大腸縮小、膀胱短縮、有時腦內黑血多過平日、意者其源或由於血、但此證性質暴速之故、醫者尙未確知、所以治法亦無定論、今略舉一二、凡遇時行霍亂之際、偶然瀉泄、即防受染、此證不可外出、宜食牛羊乳及收斂止瀉藥、牡蠣末一錢、阿膠一錢、鴉片一二釐、薑水或桂皮散調和、每二時服一次、一法、鴉片一二釐、和鉛散三四釐、一時服一次、一法、樟腦鴉片酒、或薄荷水、及兒茶水、俱能止瀉、詳前瀉世篇若病已作、見脈小、冷汗、面白、或鉛色、皮冷等證、此時

服藥緩不濟事、急用熱手搓擦周身外皮、令熱濃芥末略用麪粉滾水攪和、貼肚腹、飲美酒、多著衣服、更用熱水貯玻璃甌內、或布包裹熱磚、兩足踢之、以傳溫熱、蓋此時周身本熱頓減、以寒暑針試之、僅七十七度、較平人少二十度、治法務令病者周身溫暖、溫暖則血通行、方可望救、所用各法、總以急速溫暖為主、但用物熱傳接、不如人熱傳接更善、應用十餘歲小兒二人、前後摟抱病者、歷一二時、小兒倦怠、更易二兒、如是傳接溫暖、最有功力、內服好樟腦一錢、最濃酒六錢、浸每半時服六次、約一時服盡、中土習用桂附薑椒之類、大概亦以溫暖為主、病勢漸減、方可專倚藥力、藥以斂補為主、噍哪二三釐、樟腦五七釐、熱水攪和、服二三次、病

後身必虛弱、宜安臥勿勞動、飲牛乳雞湯之類、忌處污濁穢溼之地、此證當時行傳染時、一方之人、須豫為謹慎、勿食酸冷瓜果、勿令肚腹瀉泄、勿令精神困倦、勿飢餓遠行、以防延染。

蛔蟲生於大小腸小兒少壯人虛弱人或寢處溼地或食物不
 合每生此證中土小兒尤多其種類有三曰圓曰細曰扁圓者
 長六七寸略似蚓但蚓頭大尾鈍口略下而長如縫蛔則首尾
 俱銳其口正當銳端此蟲生於小腸或一二條或幾條有多至
 數十條或數百條者一二條無妨多則有害其口雖銳不能穿
 腸而出多入大腸與大便同出間有入胃吐出者一二條無證
 據可憑多則頭痛腹痛略覺吮噬之狀肚腹大大便膠多尿少
 或瀉泄或消食無饜足或乾欬無痰或微發熱或抽搐臥不安
 咬牙有聲肛門內及鼻孔內癢皆小腸蟲證之據也治法夜晚

蛔蟲論

蛔蟲生於大小腸小兒少壯人虛弱人或寢處溼地或食物不
 合每生此證中土小兒尤多其種類有三曰圓曰細曰扁圓者
 長六七寸略似蚓但蚓頭大尾鈍口略下而長如縫蛔則首尾
 俱銳其口正當銳端此蟲生於小腸或一二條或幾條有多至
 數十條或數百條者一二條無妨多則有害其口雖銳不能穿
 腸而出多入大腸與大便同出間有入胃吐出者一二條無證
 據可憑多則頭痛腹痛略覺吮噬之狀肚腹大大便膠多尿少
 或瀉泄或消食無饜足或乾欬無痰或微發熱或抽搐臥不安
 咬牙有聲肛門內及鼻孔內癢皆小腸蟲證之據也治法夜晚

用迦路米七釐置舌上溫水吞服次早服渣臘番藥名能瀉二分至二分半小兒一分間一二日服一次後服鐵酒或鐵末如無迦路米用水銀散一分大黃二三分次早服元明粉一二錢一法石榴根皮每一時服五分服瀉藥後蟲隨膠糞瀉出或吐出凡蟲證宜多食鹽每早用鹽一錢水一兩攪服大有功力所食牛乳及一切牛羊肉內並多著鹽為宜一二分細者如截線長僅一二分或三四分生於大腸直腸尤多肛門內多膠多癢鼻孔癢或欬嗽或食不消化不欲食此蟲盈千累百不可勝計中土小兒最多自大便出或瀉出易見治法先服瀉藥迦路米五釐渣臘大人二三分小兒一分或水銀散大黃亦可此證多

因虛弱所致服瀉藥後應更服開胃補胃之藥如大黃水黃連水之類令身體壯健更宜戒口勿食甜餅宜食新鮮肉多著鹽為佳外用冷水洗肛門更用油貯水節射入直腸或用水三四兩配鹽二三兩愈濃愈佳貯水節內射入直腸亦可或用醋一兩配水二三兩或用朴硝元明如無水節用猪膀胱一具另以圓端光滑銅錫管或粉水俱可取其滑利自猪膀胱頸內插入用線綁紮接續另用繩竹木管膏以脂油一端繫木塞塞住管口一端出於猪膀胱底外入藥水於膀胱之中將管插入病者肛門抽去其繩用手擠逼使藥水射入肛門可代水節之用也肛門內癢女子患此有時盡自肛門傳入陰道而癢者冷水洗淨用油搽潤此證醫治後蟲雖出未必盡服藥及水節等法不

可遠較以防反覆

扁蟲形略如水蛭俗名馬黃自首至尾俱有節長二三尺至十尺不

等或生於小腸或生於大腸雖無多條但人食物精液被其吸

奪因此虛弱瘦瘠更多關係外無確據可憑大概腹痛大小腸

不安肛門鼻孔癢消食無屢足頭昏困倦有時瀉出一二節但

頭不瀉出仍能接續為患治法松漆油三四錢小兒一二錢草

麻油和服殺蟲大有功力或石榴根皮一兩五錢乾者更佳配水二

十四兩煮至十六兩每一時服二兩日服四次一法石榴根末

五分每半時服一次頭昏者止勿服

腎病證論

內腎生炎或因勞力過度或因天時暴冷寒風吹腰或因跌打

外傷或因膀胱溺管有病累腎其證腰痛牽引大腿腎囊陽莖

強舉不倒大腿皮肉不仁以手按壓腰腎更痛坐立欬嗽伸腳

更痛仰面睡臥卷兩腳則痛少減有時右著牀卷右腳痛少減

者是炎在右腎也有時左著牀卷左腳痛少減者是炎在左腎

也或欲嘔或吐出或身發熱面愁苦時欲小便溺短少先紅有血

在溺中故紅後清有時無溺有時昏迷如中風狀死後割視內腎堅

硬而大裏面或有膿若痛減脈平熱退汗出溺生色不紅為欲

愈若冷顫呃逆譫語腳冷者危險

治法壯健炎重者應於臂凹放血或用蟬十數條使吮腰腎痛處並用玻璃罩抽去氣或燒酒覆蓋引血外出法詳西醫略論炎證篇後用罌粟殼野菊花沸湯沖布巾絞按患處或但用熱水絞按亦可內服發表藥瀉藥食潤物如粥水大麥水胡麻子水之類欲止痛者服鴉片二三釐朴硝一分半或鴉片三四釐作一粒納入肛門內或用滾水和濃芥末或紙或布二層夾合貼腰腎痛處二三刻揭去一法用樟腦油或麻油或鴉片酒擦痛處以上諸法一次不應者俱可再用有時溺出則痛驗試之法將溺置器中俟溺冷澄視溺中有粉沙或紅或白防漸成砂石淋粉色紅者應食鹹水或牡蠣水灰水之類粉色白者應食酸醋之類若已成沙

石淋或一粒或多粒隨溺出則愈若粒大不得出或在膀胱或在尿管俱應用割取之法凡患內腎炎證者應平臥安養不宜起立勞動內服瀉藥及通利小便之藥朴硝元明粉之類外貼斑蝥膏藥

有時內腎本體無炎但因失去司溺功用漸成臃脹全身不安面白而瘦食不消化無精神試以溺盆置火上熬視見溺凝結略似蛋白死後剖視內腎或大過平日或小過平日中有肥膩此證男女俱有大概貧苦人更多無醫治良法
多溺內腎專司生溺有時溺偶多過常度無妨若多極歷久不愈大有關係驗試溺質重過平日其色黃如枯葉其味甜證見

口渴便秘身體黃瘦軟弱皮乾無精神多憂慮易志怒時欲食
 不消化愈久愈虛弱則死此證病原不可知倘未有醫治良法
 大概戒口勿食甜物勿多飲茶宜開胃補胃宜多食肉發表得汗令
 血外行為佳

此證多由血虛而起或因勞傷過度或因憂思過度以致血氣不
 足而致此症其初起時或覺頭暈眼花或覺心跳不寧或覺手足
 麻木或覺腰酸背痛或覺食慾不振或覺大便燥結或覺小便
 頻數或覺夜夢遺精或覺白帶過多或覺經水不調或覺胎前
 產後諸症皆由此而起也

