



東醫寶鑑

津言 夢血

内景

痰飲

9
773
4





東醫寶鑑內景篇卷之二



御醫忠勤貞亮扈聖功臣宗祿大夫陽平君臣許汝奉教撰

血

陰血生於水穀 靈樞曰中焦受氣變化而赤是謂血又

行水入於經其血乃成○內經曰穀入於胃脈道乃氣也和調於五藏應陳於六府乃能入於脈也故

循絡六府也

血為榮 而能經曰血為榮榮於力目得血而能視是得血

厚曰榮者水穀之精也生於脾總統於心藏受於肝宣布於肺施之於腎灌一身體之而能

視耳得之而能聽之得之而能攝掌得之而能握足得之而能步藏得之而能實常以飲食日盛則形盛血

陰長取汁變化而赤為血也是故血盛則形盛血

東醫寶鑑內景篇卷之二

治衄血伏龍肝半
外新汲水一大盃
搗取汁和蜜頓服

衄血

鼻衄通於腦血上溢於腦所以衄血出於肺宜以
熱藥通之則口鼻俱出也又腦所以衄血出於肺宜以
三黃散補血湯蘇散陶氏生地黃連黃芩連地黃香附子黃芩
黃散補血湯蘇散陶氏生地黃連黃芩連地黃香附子黃芩
東垣曰衄血為主犀角地黃湯入鬱金加片芩升麻
肝則為驚衄又曰膠之類主之○內經曰脾移熱於
衄不止以麝香散及諸藥塞鼻又用止血法○衄
傷寒當汗不汗熱凡鼻流血為衄宜麻黃升麻湯
麻黃挂枝湯滑石凡鼻流血為衄宜麻黃升麻湯

三黃補血湯

治衄血香調下不以四兩○丹溪心法芎附散同
通香附開鬱行氣使邪火歸於散經絡川芎和血
三黃補血湯治六脈虛黃一錢當歸川芎各七分半

蘇散

生地黃柴胡黃芩牡丹皮
五分右剉作一貼水煎
蘇散治衄血不止乃肺金受相火所制然也雞蘇
冬苦黃蒲黃炒貝母炒桑白皮甘草各五分
到作一貼薑三片水煎服無以黃丹吹入鼻中

陶氏生地芩連湯

黃芩黃連連子川芎赤芍藥柴胡苦荬犀角鎊甘
草各一錢右剉作一貼大棗一枚同煎服以蘆
汁磨墨汁調服

清衄湯

子衄血當歸赤芍藥連地黃香附子黃芩
五分生甘草三分藕節五箇右
剉作一貼水煎入童便調服
犀角地黃湯治衄血吐衄不止及上焦瘀血面黃大便
犀角地黃湯治衄血吐衄不止及上焦瘀血面黃大便

一升是也傷胃者因飲食之物飽之後胃冷不能消
 化便煩悶強嘔吐使所食之物與氣共上衝臟因
 傷裂胃口吐血鮮赤腹亦絞痛自汗其脈緊而數
 者為難治○傷胃吐血宜黃芩黃連內芩湯實者
 葛加生地黃虛者黃芩黃連內芩湯實者三黃瀉心
 湯加酒客咳者必致吐血此因極飲過度所傷即
 景曰酒客咳者必致吐血此因極飲過度所傷即
 肺疽之屬○咳者必致吐血此因極飲過度所傷即
 痰於中吐血為好四物湯合黃連解毒湯因熱傷血
 之○又曰吐血覺胃中氣塞桃仁承氣湯因熱傷血
 叩○火載血上錯經妄行四物湯加山梔重便薑
 汁薑汁童便止血要藥也○吐血加山梔重便薑
 痰只治火傷寒失汗則熱毒入心液熱則變紅而逆
 出上竅傷寒失汗則熱毒入心液熱則變紅而逆
 皆血證○易明凡見日月紅黃湯熱神昏狂譫曾腹急滿
 宜大劑者挑仁承氣湯抵當湯九散○天門冬湯口鼻
 俱出宜四生丸解毒湯花散神散五神湯狗膽丸
 七生湯清熱解毒湯花散神散五神湯狗膽丸

葛黃丸

一名葛連丸治酒多積熱以乾吐衄血垂
 死者黃連四兩葛花二兩無則葛根代之右

三黃瀉心湯

治吐血大黃黃芩各一斤熟地黃二錢右到
 黃連黃芩各一斤熟地黃二錢右到

茯苓補心湯

治勞心吐血全義也
 半當歸一錢三分芍藥二錢熟地黃一錢

人參救肺散

治肺熱吐血
 人參黃芪白

大薊散

治肺熱吐血
 大薊散治肺熱吐血

分右到作一貼水煎服

分右到作一貼水煎服

蓮心散 治勞心吐血 煎服 一錢

是齋白朮散 治飲食過度 傷胃吐血 白朮

天門冬湯 治思慮傷心 吐血 黃芪 阿膠 珠珀 沒藥 當歸 生地

四生丸 治血衄 崩漏 黃芪 熟地 芍藥 當歸 生薑 艾葉

蚌霜散 治傷損 吐血 妄行 口鼻俱出 此散

黑神散 治傷損 吐血 妄行 口鼻俱出 此散

側柏散 治內損 吐血 妄行 口鼻俱出 此散

藕汁散 治吐血 衄血 不止 生藕 汁

七生湯 治血出 口鼻 生藕 汁

清熱解毒湯 治赤白 痢疾 生藕 汁

花藥石散 治虛勞 吐血 生藕 汁

童尿 和服 使痰 血化 為黃 水

冷水調下

治咯血荷葉不以多
少培乾為末調二
錢六七次

五神湯

治婦人吐血生藕汁刺薊汁生地黄汁白蜜
小盞調炒白
麩一錢服

狗膽丸

治連日吐血不止五靈脂為末狗膽汁和丸
太粥不可

一方

治吐血不止將本人血取來用磁鍋焙乾為末每
服一錢或將本人吐的血取來用磁鍋焙乾為末每

薄厥證

八門曰一人素無病忽吐血半斗脉弦急陳
奔併用六鬱湯

咳血

嗽血唾血各血
蘇兄難薛散功見玄霜膏○嗽血
者痰嗽帶血本於脾六君子湯加桑白皮片苓枳
殼五味子有穴者如味道透散於○痰飲○唾血

者無血臨唾而出本於腎滋陰降火湯
有紅絲乃是肺痿難治○咯血者紫山血眉或咯
而不出甚略則出或帶紅絲如線此皆血竭也
四物湯加竹瀝薑汁或便青黛或滋陰降火湯保
命生地黃散下聖斷子○先見紅後見痰多
是陰虛火動痰下降四物湯加貝母天花粉以
化痰山施仁麥門冬降痰火為急宜山施地黃湯
痰嗽痰帶血出此胃後熱血蒸而出重者山施輕
者藍實○先吐痰後見熱血是積熱宜清肺湯先
吐血後見龍腦雞蘇丸陰虛宜滋陰降火湯
咯血宜龍腦雞蘇丸河間生地黃散清火滋陰湯
清咳湯見玄霜雪煎膏思袍散
龍腦雞蘇丸治咳痰喘各血薄荷一斤麥門冬四兩
各一兩右為末別以柴胡木通各一兩對用湯
半碗浸二宿取汁用蜜二斤煉一湯八生草後
黃末六兩攪勻入柴胡木通六熟水下二十九
將煎藥末同攪和為丸

玄霜膏 治咯血吐血虛勞嗽神效烏梅汁梨汁神霜
茯苓末八兩用乳汁浸晒九次款冬花紫苑各
二兩共入砂鍋內熬成膏九如彈子大每丸臨
服下門

加味道遙散 治瘦中見血牡丹皮白朮各一錢半當
歸赤芍藥桃仁貝母各一錢山拖黃芥
各八分苦蕒七分青皮五分
草三分右剉作一貼水煎服

聖餅子 治咯血杏仁四錢去尖研細同黃蠟炒
入青魚一錢捏餅子用時以乾柿一良破
開以餅置其中合定濕紙
包煨研爛米飲調服

山拖地黃湯 治先吐血後見血宜以降痰火為急山
拖地黃湯 治先吐血後見血宜以降痰火為急山
母瓜蒌仁各一錢天花粉牡蛎皮麥
門冬各五分右剉作一貼水煎服

清肺湯 治痰後血是積熱也赤茯苓陳皮當歸生地
黃赤芍藥天門冬麥門冬黃芩磁石紫苑阿

膠珠桑白皮各七分甘草三分右剉
作一貼桑葉二枚烏梅一箇水煎服
河間生地黃散 治鬱熱二咯唾血拘攣子樂胡黃
生地黃熟地黃甘草各一錢
分右剉作一貼水煎服

清火滋陰湯 治嘔吐咳嗽咯血天門冬麥門冬
山藥蔓澤瀉赤茯苓各一錢
右剉作一貼水煎服

清咳湯 治咳血當歸白芍藥桃仁貝母炒各一錢白
朮杜丹皮黃芩各一錢
各五分甘草三分右剉作一貼水煎服

清咯湯 治咯血陳皮半錢夏茯苓知母貝母生地黃各
一錢苦蕒一錢半炒黑各七分杏仁阿膠珠各
五分桑白皮一錢半甘草五分薄桂
二分右剉作一貼水煎服

清嘔湯 治嘔血知母貝母苦蕒黃柏益水炒
地黃玄參遠志天門冬麥門冬各一錢乾薑
熟地黃玄參遠志天門冬麥門冬各一錢乾薑熟

東醫圖書集成卷之二

治溺血生地黃汁
一升生薑汁一合
相合頓服

玄霜雪梨膏

一妙貼黑五煎分右對作
酸者不用生藕汁十鐘生地黃汁十鐘麥門冬汁十鐘
取汁五鍾生藕汁十鐘生地黃汁十鐘麥門冬汁十鐘
和重濾去渣火上煎煉入再熬如一稀糊則成膏矣
每服八兩五匙半酒盞火上再熬如一稀糊則成膏矣
三服不拘時服

恩袍散

治喉痛血吐血真生蒲黃薄荷各一
內經曰脈移熱於膀胱則血出成淋作痛或難尿而
下焦則尿血○凡小膀胱血出成淋作痛或難尿而
腸從精囊中出也如血出痛乃不移熱於小
物非淋也施滑之精囊心來乃心移熱於小
麥門冬煎服鐵○尿伏熱在清腸湯清熱滋陰湯小

尿血

傷筋子薑蜜或四物湯合五苓散方煎服酒
兒立效散○有味地黃丸歸氣湯下之防見
髮灰散治尿血調服或燒存性為末每得○髮灰丸
和九梧子大白湯吞下五十九衛
琥珀散治尿血調二為細末燈心
清腸湯治尿血當歸生地黃通篇蓄子少黃連赤芍藥黃
分廿草五分右到作一煎服春
心一團烏梅一箇水煎服春

清熱滋陰湯

治尿血各一錢及便血生地黃麥門冬各八分當歸川
芎赤芍藥各五分知母黃柏並酒炒白朮
陳皮甘草各三分右對作一煎服春

小菊飲子

治下焦結熱尿血竊節二錢當歸一錢山
拒仁八分小菊生地黃滑石通草蒲黃各

東醫圖書集成卷一百一十一

十一

治下鮮血梔子仁燒
 灰為末水和一錢七
 次
 使前有血面色黃者
 石榴皮為末煎茹
 子枝湯調一錢七次
 葉後下血不止艾
 葉不以多小生薑汁
 三合和服

便血

內經曰結陰者便血一升再結二升三升釋
 曰結陰之病陰氣內結不得外行血無所稟
 腸間故便血也其脈虛澀者是也
 五藏則三陰脈不和而脈不聚則血因留之蓋邪犯五
 藏則三陰脈不和而脈不聚則血因留之蓋邪犯五
 腸間而為便血先血後便者近血也便後血者遠血也
 黃土湯主之先血後便者近血也便後血者遠血也
 主之○便血宜四物湯後便者近血也便後血者遠血也
 散連殼丸加減四物湯後便者近血也便後血者遠血也
 氣湯日久便血者平胃散內者厚朴煎殼槐花當歸湯
 內傷飲食者平胃散內者厚朴煎殼槐花當歸湯
 烏梅酒毒便血者平胃散內者厚朴煎殼槐花當歸湯
 酒蒸黃連丸

平胃地榆湯

治結陰便血蒼厚不升麻附子炮各一錢
 地榆七分葛根厚朴白朮陳皮赤茯苓
 各五分乾薑當歸神麴炒白芍藥益智仁
 草灸各三分右剉碎依一貼薑三棗二水煎服

結陰丹

治結陰便血積聚各五錢右為末酒糊和丸
 皮何首烏荊芥穗各五錢右為末酒糊和丸

薑蜜湯

治小兒便血一握右水煎服
 貼五分甘草七分同煎服

茯苓調血湯

治酒麴過度房勞後小便出血半赤
 前胡柴胡青皮枳殼苦荬桑白皮白茅根燈心
 草各五分右剉碎依一貼薑五片蜜二匙水煎服

鹿角膠丸

治房室勞傷小兒便血六錢右為末取白茅根
 汁打糊和丸梧子大罇空
 心益湯吞下七十九丸

當歸散

治婦人尿血生地黃二錢半小薊葉二錢當
 歸藥各一錢半右剉碎一貼
 水煎服

立效散

治小兒尿血蒲黃生地黃赤茯苓甘草各一
 錢右剉碎水煎服
 元散服之
 妙法

梧子大每服五七十九

黃土湯 治先大便後下血竈中黃土三錢熟地黃白

煎服一貼水

赤小豆當歸散 治先下血後大便赤小豆五兩浸令

調服二錢

清臍湯 治大便下血生地黃一錢當歸酒洗地榆各

黃連側柏葉阿膠珠各六分川芎

榆砂湯 治結陰便血地榆四兩縮砂七枚研生甘

地榆散 治遠年下血地榆卷柏各五錢

連殼丸 治內傷下血用此以解絡之結黃連枳殼

末蒸餅和丸每服五錢

知減四物湯 治便血亦治風側柏葉生地黃當歸

各五分右剉作一筒煎服

槐花散 治腸胃有濕脹滿下血槐花炒二錢蒼朮厚

五分右剉作一貼水煎服

當歸承氣湯 治實熱便血當歸七分厚朴枳實大

厚朴煎 治便血及諸下血厚朴生薑各五兩同搗爛

右為末炒黃白木神麴麥芽五味子各一兩同炒黃

酒蒸黃連丸 治酒毒積熱便血肛門作熱黃連四兩

血自不消多有奇效

胃麥芽消酒食白木

血自不消多有奇效

血自不消多有奇效

血自不消多有奇效

梧子大熟水
三五十九

勝游證後詳

齒

齒入門曰血從齒出謂之齒
齒屬腎如陽明傳入少陰二齒
如吐者人多不覺其為牙血
少頃又來者是外周綠袍散內
犀角地黃湯或生地芩連湯防
齒宜黃芩荆槐散金散小齒散
見

綠袍散

荆槐散

鬱金散

小薊散

又方

治齒縫出血末入龍腦少許
治牙宣出血以竹葉金白芷細
治牙齦出血以薊散小薊散
治牙痛以荆槐散
治牙疳以鬱金散
治牙疔以小薊散
治牙疔以又方
治牙疔以又方

舌

舌

舌

血汗

蚊蛤散

定命散

葶草汁方

葶草汁方

入門曰血從舌出謂之舌
黃炒為末即止又槐花炒宜
豆一升搗碎和水取汁服之
方髮灰二錢醋二合調服且
蚊蛤散治舌上出血如泉未
內經曰少陰所至為衄衄血
曰膿受熱血妄行為衄衄血
因曰無病者汗出為衄衄血
紅汗由大喜傷心喜則氣散
建中湯方煎湯調下香散
麥門冬煎湯調下香散
定命散治衄血每半錢新水
葶草汁方治產婦因大喜汗
葶草汁方治產婦因大喜汗

九竅出血

皮煮服亦可... 九竅出血... 熟逼血... 未或吹... 屠猪羊... 間出血... 水服日... 須服乾... 其面勿... 出皮不... 自血不... 乃血在... 宜服十... 六補湯... 心出... 勢不止... 揚花以... 手血

傷損失血

失血眩暈

傷損失血... 諸詳傷... 見... 崩中... 去血... 一切... 去血... 多技... 牙齒... 去血... 多金... 瘡去... 血... 產

後去血... 之○吐... 使驚之... 救之則... 去血過... 地黃三... 津塞鼻... 汁飲之... 仍神效... 好鼻中... 濃磨

生地芩連湯

各一錢... 湯手擲... 二錢右... 此危證... 加味四... 物湯

加味四物湯

地黃熟... 穗甘草... 熟地黃... 七分右... 劉棗二... 枚烏梅... 一箇煎... 服

黑藥止血

色綱目曰燒灰諸黑藥皆能止血也。見黑即止。

五灰散

治一切血崩及血虛之症。或與九米飲下。每三錢加黃縮子亂髮百草。

十灰散

治嘔吐咯血及血崩等症。或與九米飲下。每三錢加黃縮子亂髮百草。

十灰丸

治血崩及一切血虛之症。或與九米飲下。每三錢加黃縮子亂髮百草。

禁忌

凡血虛之人，行血過多，皆為禁忌。

治血藥法

丹溪曰：凡血藥不可單行。如用涼藥，則酒不可。凡血虛之人，宜用溫藥。如用熱藥，則酒不可。凡血虛之人，宜用溫藥。如用熱藥，則酒不可。

通治血病藥餌一切失血諸病通用四物湯防見坎高湯保

固榮散血餘散

四物湯 二分半 右剉作一黃白芍藥川芎當歸各一錢

川芎 夏倍芍藥 秋加藥 冬倍當歸 春加防風

夏加黃芩 秋加天門冬 冬加桂枝 春加熟地黃補

歸經芍藥 川芎則行血通肝地黃生血 芎生血 芎生血

藥其四物之謂乎夫川芎血中藥也通肝經性

味辛散能行血滯於氣也地黃血中藥也通腎

經性味甘寒能生真陰之虛者用能活血各歸其

中主藥也通肝經性味辛溫全用能活血各歸其

經也芍藥陰分藥也過脾經性味酸寒能涼血又

治血虛腹痛若忘陰藥之屬必於此而取則焉

補榮湯 茯苓 地黃 芍藥 川芎 當歸 各一錢 熟地 黃芩 甘草

各五分 右剉作一貼 水煎服 二

枝烏梅 一箇 水煎服 二

保命生地黄散 治驚熱 劬吐 便尿 諸失血 無寒 證者

冬白芍藥 黃芩 柴胡 各一錢 煎服 脈微身涼 加桂皮 各

五分 右剉作一貼 水煎服 脈微身涼 加桂皮 各

次膏 治陰虛 火動 驚悸 咳嗽 咯血 黃柏 知母 各二

兩 杏仁 七錢 胡桃 仁 各一錢 皮 寧 四兩 白 麥 門 冬 各二

將黃柏 知母 剉入 童便 三 椀 側 柏 葉 一 把 煎 至 四

椀 夫渣 又將 天麥 門冬 搗 爛 如 泥 另 用 水 一 二 椀 熬

熟絞 汁 入 前 汁 將 麥 門 冬 搗 爛 如 泥 另 用 水 一 二 椀 熬

前汁 內 煎 成 膏 磁 罐 收 貯 封 口 沉 水 中 一 日 去 火

毒每服 三五匙 拍鐵器 調 封 口 沉 水 中 一 日 去 火

固榮散 治吐 衄 便 尿 一 切 失 血 真 蒲 黃 地 榆 各 一 兩

酒調 服 白 芷 五 錢 甘 草 二 錢 半 右 為 末 每 服 四 錢 溫

血餘散 治 衄 吐 便 尿 一 切 失 血 為 末 每 二 錢 白 茅 根 煎

血餘散 治 衄 吐 便 尿 一 切 失 血 為 末 每 二 錢 白 茅 根 煎

血餘散 治 衄 吐 便 尿 一 切 失 血 為 末 每 二 錢 白 茅 根 煎

湯調下或醋湯調下研
○作丸名髮灰尤見
側柏湯 乾煎湯代茶吃止血滋陰一名柏湯一名柏

童子尿 諸虛吐衄咯血藥中每入童便一合其效甚
滋陰又能消痰血止吐衄諸血先賢有言凡諸失
血服寒涼藥十無一生服童尿者百無一死斯言
信矣用童便一鍾入薑汁二三匙攪
勻徐徐服之日進二三匙為佳

單方九種
百草霜 深村鍋底者佳刮取細末用之入血見黑則
散冷服水調服或
井華水 卒然嘔面勿令病人先知之

生地黄 治吐衄便尿一切六血取汁飲半升日
或和薄荷汁或和生薑汁皆效

車前草葉及根 止衄血即生用補血
汁服五合

蒲黃 即沙用治衄血即生用補血
服三錢

芎藭 能行血治衄血即生用補血
服三錢

當歸 治一切衄血即生用補血
服三錢

萬根 治衄血即生用補血
服三錢

白茅根 治衄血即生用補血
服三錢

艾葉 治衄血即生用補血
服三錢

地榆 治衄血即生用補血
服三錢

大小薊 治衄血即生用補血
服三錢

寧志膏

治虛煩不得睡或夢洩危險睡不安寧

酸棗仁湯

治不睡及多酸棗仁湯

高枕無憂散

治心膽虛怯晝夜不睡百方不效服此

真珠母丸

治神不安驚悸不得睡真珠母丸

獨活湯

治同上獨活湯

魂離不睡

魂離不睡覺身在床而神氣不寧每卧則魂離飛揚

思結不睡

思結不睡一婦人因思慮過傷二年不得寐戴人日

鎮心藥

鎮心藥殊不知龍齒安魂虎睛定魄龍能變化故

揚者宜用

揚者宜用龍齒虎睛龍齒虎睛

梅一箇

梅一箇貼薑三片烏梅一箇

寐更醫不效

寐更醫不效許學士診之曰以脉言之肝神受邪

去其夫議

去其夫議大怒汗出是夜困卧如數日不處一方而

反音實監司景高二

二二二

五

自是食進其脉得平此因膽虛不能制脾之思
慮而不寐今激之以怒人膽復制脾故得寐也
老少之睡不同黃帝問曰老人之不夜瞑少壯之不晝

而夜其肌肉滑氣道通榮衛之行不枯氣道其常故晝精
氣相搏其榮氣衰少而衛氣
內代故晝不精而夜不眠

睡辨陰陽虛實傷寒及雜病多睡者陽虛陰盛也無睡
喜暗者屬陰元氣虛也屬陽元氣實也

卧不安而不得卧也歸於肝也黃帝問曰人有卧而有所不
安者何也岐伯對曰不安者有所倚心肝

虛能知其病則卧不安者有所倚心肝
其能偃卧下作行陽明逆不得從其道故不得卧也

身重嗜卧黃帝曰人之多卧者何氣使然岐伯曰此人
經曰胃不和則卧不安夫不得

行於陽夜行於陰故陽氣盡則寐陰氣盡則寤故
留於陰也久其氣行不精則日暝故多卧矣

于畏而體重皆令人體勝之而體重又曰脾病者
身重又曰足太陰之脉脾病之體皆重也

惡人欲獨處欲獨處者謂之惡人與火
則惡人釋曰陽明厥而喘而燥也

寢睡法散蓋舒卧則招魔引魅子寢不舒則精神不
口開即失氣且邪惡從口入成病又曰屈膝側卧

身重嗜卧黃帝曰人之多卧者何氣使然岐伯曰此人

口開即失氣且邪惡從口入成病又曰屈膝側卧

益氣力勝正偃仰按孔子不尸卧故曰睡不厭取
 覺不厭舒凡人尸睡則有鬼疰魔邪又曰人卧一
 夜常作五度反覆逐更轉孔或薄而寒即加之睡
 壅故也當急去之仍拭汗少飽而睡不安則宜
 自穩也飢而睡不安則宜少食飽而睡不安則宜
 啜茶少行坐睡○睡留燈燭令人神不安○宜
 九人常卧不宜仰卧以手覆心上則必驚不得寤
 若暗中着魔不得以火照之亦不得近前急呼但
 捨下心上夏末吹入鼻中即醒
 寐或半夏末吹入鼻中即醒

辟惡夢

夜夢惡不須說且以水而東持刀巽之呪曰惡
 夢着草木好夢成珠玉即無咎矣又夢之善惡
 並勿說為吉○藥香久之服不夢寤○蘇合香
 齋一劑安枕○中枕之除邪辟惡夢○蘇合香
 令人無夢寤或服或帶之除邪辟惡夢○蘇合香
 惡夢除魔寐○犀角除魔寐或服或帶之除邪辟惡夢
 麝羊角安氣驚夢令
 魔寐除邪氣驚夢令

用藥法

虛而多夢紛紜人參龍骨加煎湯調服○驚虛
 不眠寒也酸棗仁炒末竹葉煎湯調服○驚虛

睡熱也酸棗仁生為末以薑汁炒臘茶煎湯調服
 轉○一人因恐得病如人汗捕睡不安飲食不
 知味以人參白朮當歸身女君陳皮為佐加益炒
 黃柏灸玄參各少許為使君服月餘而安此因恐
 傷腎故以益炒黃柏灸玄
 參引參歸等藥入腎也切

單方八種

鹿頭肉

治煩悶多夢及在夢見
 鬼物煮汗飲食其肉

安息香

治婦人夜夢鬼交以雄黃
 合為丸燒熏丹穴永斷

苦竹葉

治虛煩不睡
 煮服之

小麥

治煩熱少睡
 煮服之

酸棗仁

睡多則生用不得
 睡則炒熟用之

揄白皮

治不睡以作糜羹服之令人多睡
 揄白皮以作糜羹服之令人多睡

林檎 治不睡多食

木槿 煮作飲服之

葸 多食令人

沙參 治多睡常欲眠煮

通草 療脾症常飲

烏梅 治不眠

茶 令人少睡

苦菜及苦苣 食之不睡

伏翼 取血滿目

馬頭學 主喜眠作枕

草决明子 取之

鍼灸法 膽寒得睡

聲音

聲音出於腎 心為聲音之主

肺者病在上腕隨諸氣以邪氣散則天籟鳴矣若
夫腎虛為病不能納諸氣以歸元故氣逆而上咳
嗽痰壅或喘或脹曾腹百散俱為之牽掣其救愈
重其氣愈乏其聲愈乾矣○俱為之牽掣其救愈
與瓜蒌湯方親得愈其兒又益黃散○此因涼藥利
利之變身冷不飲食錢氏用益黃散○此因涼藥利
身溫而能飲食其兒又不語錢氏曰此因涼藥利
小便致脾腎俱虛今脾已實腎尚虛用六味地黃

元方觀一月而痊後失音宜服虛聲不出宜服人

人參平補湯

治腎虛聲不出人參川芎當歸熟地黃

乾橘紅半夏麴各六分牛膝白朮破故紙胡蘆巴
益智甘草灸各三分石菖蒲二分右到作一貼薑
三片棗二枚水煎於五更初腎氣開時不許喫
唾言語默默服之肺回春名滋腎湯與此同

聽聲音辨病證

中氣之濕也○靈樞曰病入語聲寂然善驚

是呼者骨節間病語聲喑暗然不徹者心膈間病語

聲嗽嗽然細而長者頭中病○又曰聞而別其病

也假如肝病則聲悲肺病則聲促心則聲雄脾

病則聲慢腎病則聲速○聲短則聲疾○聲長則聲

長○聲短則聲疾○聲長則聲長○聲濁則聲微○聲

卒然無音

塞何氣出行使音不彰願聞其方少師答曰

咽候者水穀之道也喉嚨者氣之所以上下者也

會厭者聲音之戶也唇舌音之所出也

音之機也懸雍垂者聲音之關也

所泄也橫骨者神氣所使主發舌者也

洞涕也其氣不交者頰頰不開分氣易也

薄則發氣疾其開利其出氣易也

開闔難其氣不能發言也

容于厥則厥不能發言也

無空癰○醉周當風使人下至其開闔不致氣

蘇湯○參荊芥散射干湯○失音○卒然無音者寒氣

錢半煎汁○桂心末二錢○半私搗如泥取李核取杏仁七

舍煎汁○五夜二錢○半私搗如泥取李核取杏仁七

皮煎汁○五夜二錢○半私搗如泥取李核取杏仁七

荊蘇湯○木通○橘紅○當歸○蘇荊芥○蘇荊芥

煎服貼水

人參荊芥散 治感冒風寒 言不出咽乾鼻湧 人參 荊芥 甘草 每五錢 煎服 右切作

射干湯 治天行暴熱 喉中如梗 半夏 射干 甘草 各五分 煎服 右切作

因雜病失音 為風人飲 命坐 湯可 附子 加石 菖蒲 一錢 或訶子 清杏仁 煎湯 亦可 附子 加石 菖蒲 一錢 或訶子 清杏仁 煎湯 亦可

人參清肺散 治痰嗽 失音 不出 人參 陳皮 貝母 桑白皮 知母 宜後 麥冬 補心 湯 妨 不出

杏仁煎 治咳嗽 失音 不出 杏仁 泥白蜜 砂糖 屑生 紫菀 五味 子各一 盞 桑白皮 木通 貝母 炒各一 兩 半 五升 煎至 半升 去滓 入杏仁 蜜 糖 薑 再煎 成 稀膏 每

蛤蚧丸 治肺間積血 作痛 失音 及久嗽 失音 蛤蚧 一 知母 款冬 花 尤 效 搗 加

三粉丸 治冬月 寒痰 結塞 語聲 不出 半夏 流薑 製 五 蒸餅 和丸 芡實 大 每 一 丸 各 二 分 半 右 為 末 薑 汁 浸

芎辛散 治熱痰 壅盛 失音 聲不出 是燥熱 所發 芎 辛 散 即 效 川芎 細 辛 防 風 苦 薑 白 芷 羌 活 桑 白 皮

枳殼杏仁 煎服 三片 皮 枳殼 杏仁 各 五 分 五 味 子 二 十 箇 右 剉 分 作 二 點 每

水煎服 三片 皮 枳殼 杏仁 各 五 分 五 味 子 二 十 箇 右 剉 分 作 二 點 每

紫菀 五味 子各一 盞 桑白皮 木通 貝母 炒各一 兩 半 五升 煎至 半升 去滓 入杏仁 蜜 糖 薑 再煎 成 稀膏 每

知母 款冬 花 尤 效 搗 加

如 棗 大 每 一 丸 各 二 分 半 右 為 末 薑 汁 浸

至 蒸餅 和丸 芡實 大 每 一 丸 各 二 分 半 右 為 末 薑 汁 浸

芎辛散 即 效 川芎 細 辛 防 風 苦 薑 白 芷 羌 活 桑 白 皮

各一錢 甘草五分 右對作一貼
入薑二片 薄荷三分 藥水煎服
響聲破笛丸 草各二兩 羊百藥煎
清和九 彈子大 每九臨卧 兩右為末 雜子

聚氣為瘖

清和九 彈子大 每九臨卧 兩右為末 雜子
少陰又曰 人卒然無音 刺之 奈何 伯曰 足
脈濁氣乃辟 會厭之 絡上 絡任 脈取之 天突 飲其
厚乃發 經曰 一男子 久病 痰 忽感 風寒 食酒 肉
遂厥氣 走喉 病暴瘖 灸 豐隆 二穴 各三壯 照海 二
穴 各一壯 其聲 立出 仍用 黃芩 降火 為君 杏仁 陳
皮 苦黃 瀉 厥氣 為臣 訶子 泄逆 氣甘 草和 元氣 為

瘖症有二

瘖者邪入陰分也 內經曰 邪搏陰則為瘖 瘖又
乃風邪不入於陰 搏則為瘖 然有二瘖 一曰舌瘖 又
音之類 是也 蓋舌運之類 是也 二曰喉瘖 又

聲嘶

五藏久咳 則聲嘶 乃氣虛 衄冷 甚也 門○咳 嗽 聲
嘶者 血虛 受熱 也 用 青黛 蛤粉 蜜 調 作 丸 含
化 明○聲 嘶 宜 柴 胡 子 麻 湯 潤 肺 丸 蜜 脂 煎

柴胡升麻湯

夏治傷寒 乾咳 聲嘶 或咽痛 柴胡 黃芩 半
桑白皮 升麻 甘草 七分 煎服 聖藥
潤肺丸 治久咳 聲嘶 語音不出 訶子 皮 五倍子 五味

蜜脂煎

治暴失音 聲嘶 常服 潤肺 猪肚 二斤 熬去渣
膏不拘時 挑 服一匙 叩

腎怯與失音相似

又能進藥 此非失音 乃腎怯 不能上

接於陽故也當補腎地黃元陽

息有音

陽明逆不得行今逆而上行故息有音也陽明者胃脈也

息起居如故而此肺之絡脉逆也絡脉之病入也微故

不治證內傷虛損不明瘡失音者無治法門人陰陽俱絕

傷寒孤感聲症

小兒疳痢聲症並見本門

通治聲音藥尋常聲音不清宜加味同本丸加味上清

加味固本丸

治男女聲音不清或失音生乾地黃熟

人參冬鹽炒麥門冬五錢取肉人乳牛乳膠珠各五錢

加味上清丸清聲潤肺止咳嗽痰氣寧神白砂糖

寒水石烏梅肉冬五錢片腦五分右為末甘草

水熬成膏和丸每丸一錢化茶湯下

喉嚨丸治久失音聲症香椿芽汁四兩如無用淡香

發聲散治語聲不出黃瓜萋一箇剉焙苦黃七錢半

訶子散治咳嗽聲不出訶子皮三錢半生半炒木通

或薑湯調下

入生地黃汁一小盞臨卧煎下

三錢右剉分二貼每貼煎水煎去滓

入生地黃汁一小盞臨卧煎下

入生地黃汁一小盞臨卧煎下

入生地黃汁一小盞臨卧煎下

入生地黃汁一小盞臨卧煎下

入生地黃汁一小盞臨卧煎下

入生地黃汁一小盞臨卧煎下

入生地黃汁一小盞臨卧煎下

入生地黃汁一小盞臨卧煎下

入生地黃汁一小盞臨卧煎下

入生地黃汁一小盞臨卧煎下

清音散 治聲音不清與上訶子散同但

訶子清音湯 治諸風失音不語訶子四十九箇去核

錢半生羊炙右為鹿末每服七錢水煎

一方治一人患乾咳喉聲瘕用白朮二錢人參橘紅

各七分甘草半錢夏薤一錢白茯苓桑白皮天門冬

夏加黃芩五分仍與四物湯入童便竹瀝薑汁

單方 九種

石菖蒲 出音聲煎服或

燕覆子 續三藏斷絕氣使語

通草 出音聲可煎

杏仁 可和酪作湯 一兩蜜少許 欲好聲杏仁一升去

五九或二

挂心 治感寒失音 取杏仁末舍之 燕汁 咽喉痺痛失

裏含化

苦竹葉 治卒失聲 噎不

橘皮 治卒失聲 不出 搗

梨 主中風失音 不語 生搗

乾柿 潤聲喉可水

胡麻油 主瘡痂能潤肺 故也可和

童子尿 主久嗽失音 由其能降火 故也

雞子煮多食令人有聲以水

鍼灸法卒然無音取天突靈取豐隆樞氣走喉不能言取照

突廉泉極靈喉痺卒瘕取神門支溝涌泉網泉

言語

肺主聲為言難經曰肺主聲入肝為呼入心為言入脾

心為謔言妄語

言語謔妄自言曰言答人曰語得○內經註曰謔亂語

人所未見事或獨語或睡中呢喃或呻吟不已甚則狂言罵詈俱謂之謔語皆因胃熱乘心故也詳

則傷寒始自皮毛入是從肺中來肺主聲入于心則為言也又曰今日自語言所日用常見常行之事即

為狂言也疎○謔語者口出無倫邪氣勝也○

瘖不得語內經曰邪入於陰搏則為瘖有舌瘖喉瘖之

昏不語口噤不語舌縱語澁舌麻語澁其間治痰治風安神養氣血各從活法治之○有氣血虛損者有腎虛及老人忽言不出者宜於十全大補湯

痰塞亡血亦為瘖舌足少陰之脈挾舌本足太陰之脈連

脈虛則痰涎乘虛閉塞其脈道而舌不能轉運言語也若此三脈亡血則舌無血榮養而瘖內經曰刺足少陰脈重虛出血為瘖治當補血又云刺舌下熱中之則舌脈弛縱而瘖風寒容之則舌脈縮急而瘖隨治之○痰塞不語宜導痰湯

曾蒲竹茹人參或苓連亡血不語宜四物湯

一方治一男子因傷寒發熱忽神昏而瘡作體虛有痰

煎湯入竹瀝薑汁飲之十三日始能言一男子嗜酒多

舌轉運能言語熱除而瘡愈○一男子嗜酒多

吐血後舌不能語但渴飲水脈畧數與當歸芍藥

脉法

才口脉微而澁則能言此血不足其形逆榮氣無餘衛

鄭聲

別而虛則不能言○中繫
鄭者重也詳語重復不己聲者語不接續持氣脫

言微

出於喉中言而微終日乃復言者氣也○靈樞曰

呼

真氣虛弱脉微懶語宜入參
呼者怒之聲為呼○瓜甲青惡罵不休為臆絕夫

笑

神靈
有餘則笑不則悲實則笑不休○內經曰心外證面

治法

此易治也滄益成塊者二下餘火熾今戴人曰
出熱痰四升大益同煎溫解毒湯不數日探喉吐
而始故笑之神有餘則笑不休神者心火是也火得風
加笑不休口流涎以黃連解毒湯笑止矣

東醫寶鑑

三十一

歌欲內經曰脾在聲為歌○靈樞曰足陽明之脈病則

哭外內經曰肺在聲為哭哭者肺之本聲也○難經曰肺

呻內經曰腎在聲為呻○脈訣曰呻吟者困重

欠內經曰腎為欠○難經曰腎病面黑善恐數欠○黃

嚏黃帝曰人之嚏者何氣使然岐伯曰太陽之氣外陽

面白二定○嚏者鼻中因痺而氣噴作于聲也鼻

為肺竅津為火化是火乘金為病也○膝理不

噫氣與噯氣同吐傷飽

太息黃帝問曰人之心太息者何氣使然岐伯曰人憂

大驚不語不能言宜密則敗血頑痰填塞心竅故瘖

密陀僧散治驚氣入心密陀僧散治驚氣入心密陀僧散

遠志丸治因驚言語顛錯遠志薑製南星牛膽製人

錢水飛麝香一錢金箔五片右為末蜜丸梧

子大朱砂為衣薄荷湯下三十九日再服

錢水飛麝香一錢金箔五片右為末蜜丸梧

茯神散

治同上茯神生乾地黃白芍藥川芎當歸
黃白茯苓遠志薑製玄為末每二錢水二盞
登心下錢大棗二枚同煎至七分服之有婦
年七十四歲因戎亂為驚疾服二分得效婦

中風不語詳見風門

語澁皆屬風宜考風門

婦人產前不語產後不語並見婦人

小兒語遲詳見小兒

言語法

初人後勿言誦讀常待平朝也
語而食者常息留背痛古人食不語
笑寢不語○卧勿大語損人氣力亦
發聲也○得言語者五藏如錘然不
語行語也○則令人失氣○若欲語
不治證絕掣衣撮空妄言者死○治
絕掣衣撮空妄言者死○治

鍼灸法

不能語者不治熱病
及狂者不在此例
少陰之別脈名曰通里虛則不能言取
津液

身中津液

靈樞曰腠理發泄汗出溼是謂津
屬屈伸澤補益腦髓皮膚消腫耳聾
骨屬屈伸不刺色天腦髓皮膚消腫
穀入乎口輸于腸胃其液別為五液
行則氣水○氣內逆則氣為之閉塞而
小腸主氣大腸留而小腸不行者為
不足大腸小腸無所稟受故津液竭
馬

身中津液

三

沙方... 傷寒... 汗有九證... 附

黃芪湯... 治陰陽偏虛... 黃芪... 附

調衛湯... 治濕熱... 黃芪... 附

玉屏風散... 治表虛... 黃芪... 附

二甘湯... 治胃熱... 甘草... 附

黃芪湯... 治陰陽偏虛... 黃芪... 附

參歸腰子... 治心氣虛損... 參... 附

壯蠟散... 治諸虛不足... 蠟... 附

小建中湯... 治表虛... 黃芪... 附

參芪湯... 治自汗... 參... 附

參芪湯... 治自汗... 參... 附

參芪湯... 治自汗... 參... 附

參芪湯... 治自汗... 參... 附

參芪湯... 治自汗... 參... 附

參芪湯... 治自汗... 參... 附

參芪湯... 治自汗... 參... 附

參芪湯... 治自汗... 參... 附

參芪湯... 治自汗... 參... 附

參芪湯... 治自汗... 參... 附

參芪湯... 治自汗... 參... 附

參芪湯... 治自汗... 參... 附

參芪湯... 治自汗... 參... 附

參芪湯... 治自汗... 參... 附

參芪湯... 治自汗... 參... 附

參芪湯... 治自汗... 參... 附

參芪湯... 治自汗... 參... 附

參芪湯... 治自汗... 參... 附

陳皮七分甘草二分烏梅一分同煎一貼藥二
木苓湯 治虛汗黃芪防風白朮茯苓白朮黃芪各五錢
甘草二錢半右劉每服七錢浮小麥百

鎮液丹 治自汗黃芪麥冬防風白朮附子二兩煨去
皮臍童便浸炒防風白朮附子二兩煨去
中桂各一兩右為末酒糊和丸梧子大
空桂溫酒下五十九加酸棗仁尤妙醫

參附湯 治陽虛自汗入參五錢附子炮
兩右劉作三貼蓋三片水煎服一
芪附湯 治氣虛自汗黃芪蜜炒附子炮
錢半右劉作一貼蓋三片水煎服各二

挂附湯 治自汗漏不止桂枝附子炮
各二錢半右劉如前法服生齊
盜汗 內經曰腎病者寤汗出憎風註曰寤汗者盜汗也
內經曰盜汗者寤汗出憎風註曰寤汗者盜汗也
寐中無已日盜汗者寤汗出憎風註曰寤汗者盜汗也
宜補陰降火如盜汗者寤汗出憎風註曰寤汗者盜汗也

六黃湯 甚妙又四物湯 助陽加知母黃柏無氣虛
加參末黃芪○盜汗 助陽加知母黃柏無氣虛
則者宜○製白朮散 助陽加知母黃柏無氣虛
地黃湯 壯蟬 助陽加知母黃柏無氣虛
散參芪湯 助陽加知母黃柏無氣虛

當歸六黃湯 治盜汗之聖藥也黃芪二錢生地黃熟
地黃湯 壯蟬 助陽加知母黃柏無氣虛
散參芪湯 助陽加知母黃柏無氣虛

正氣湯 降陰火止盜汗黃柏黃連黃芪實表氣當歸生
熟地黃補陰血芩連黃柏黃芪實表氣當歸生

四製白朮散 治盜汗白朮四兩分四包以黃芪石
色只取白朮為末每三錢
粟米飲調下盡服為妙

龍膽散 治肝熱盜汗龍膽草防風各等分
為末每錢一錢米飲調下臨卧時服

當歸地黃湯 治盜汗氣血兩虛者當歸熟地黃芪蜜炒
黃白芍藥酒炒白朮白朮白朮黃芪蜜炒

各一錢黃柏知母並蜜水炒陳皮各八分人參五分
分甘草三分右四作一貼棗一枚浮小麥一撮同
服水煎

牡蠣散

治盜汗及自汗牡蠣煅黃芪麻黃根各等分
右剉每五錢浮小麥百粒同煎服

參芪湯

治虛人盜汗人參黃芪白朮各一錢右剉作
煎服

童子盜汗

一童子自嬰至童盜汗七年諸藥不效用
涼膈散三黃元磁石三日月病已蓋腎主五
液化為五濕用火上而一腎水上行乘心之虛而入
手少陰心火炎上而一肺欺其不勝已也皮毛以
是而開玄府不閉而汗先以助陰分則腎水還本相
火次以三黃丸瀉心而助陰分則腎水還本相
矣自止

頭汗

頭者諸陽之會邪搏諸陽津液上湊則汗見於頭
也○頭者三陽之會虛故曰汗出為陽微是偏多
有汗也○頭者三陽之會虛故曰汗出為陽微是偏多
蓋首者六陽之所會故熱氣熏蒸而汗出也○偏多
分言之則頤屬腎額屬心三焦之火潤其腎水溝
渠之餘也○頤屬腎額屬心三焦之火潤其腎水溝
偏多也○頤屬腎額屬心三焦之火潤其腎水溝
明胃實亦頭汗出也○頤屬腎額屬心三焦之火潤其腎水溝
水結胃實亦頭汗出也○頤屬腎額屬心三焦之火潤其腎水溝

心汗

心者汗之府也○心者汗之府也○心者汗之府也○心者汗之府也
汗出於心宜陳艾湯又法青桑第二番葉帶露揉陰乾
培為末每二錢湯又法青桑第二番葉帶露揉陰乾
心驚得之有人患心脈盜汗久不止用參歸腰子
上方見以收斂心補心愈效得

陳艾湯

治汗自出者名曰心汗亦治心脈盜汗
白茯苓二兩右為末每二錢以濃煎陳艾湯

茯苓補心湯

治心汗者心孔有汗別無也因

生地黄酸棗仁炒五分別為末右劉依一貼棗二

錢甘草一分朱砂五分別為末右劉依一貼棗二

手足

汗有熱聚胃府逼而手足者此陽明證也宜大柴

胡功後以八物湯加半夏茯苓為君白附子川烏

不效後以八物湯加半夏茯苓為君白附子川烏

各五錢使服之其汗即無○治脚汗方白纏乾

陰汗

陰汗宜小安腎元也宜局以乾薑煎酒浸炒白礬陳

香煎水淋洗患處○又治陰囊汗密陀僧鳥未極

細和給粉攪傳汗○錢二分半右為末先以露

大蒜元

治陰汗濕痺大蒜不拘多少煨熟去皮爛研

心煎湯空吞

血汗

詳見

黃汗

詳見

漏風

此為帝問曰有病身熱懈墮汗出如浴惡風漏氣

白朮散

治飲酒中風汗多不能勞事細白朮散三之

錢杜仲三錢溫水調下

每二錢溫水調下

亡陽證 凡汗多不止謂之亡陽 又汗不得出亦謂之亡陽 證者如心痞胃煩面青 則真陽脫亡 故謂之亡陽 者其可治也 凡汗漏不止 則真陽脫亡 故謂之亡陽 者其可治也 凡汗漏不止 則真陽脫亡 故謂之亡陽 者其可治也

附子湯 治陽虛亡陽 不得汗 宜用附子湯 以助陽氣 凡陽虛者 宜用附子湯 以助陽氣 凡陽虛者 宜用附子湯 以助陽氣

桂枝附子湯 治陽虛 汗出不止 宜用桂枝附子湯 以助陽氣 凡陽虛者 宜用桂枝附子湯 以助陽氣 凡陽虛者 宜用桂枝附子湯 以助陽氣

止汗法 獨勝散 治汗出不止 宜用獨勝散 以助陽氣 凡汗出不止者 宜用獨勝散 以助陽氣 凡汗出不止者 宜用獨勝散 以助陽氣

溫粉 治汗出不止 宜用溫粉 以助陽氣 凡汗出不止者 宜用溫粉 以助陽氣 凡汗出不止者 宜用溫粉 以助陽氣

紅粉 治骨節痛 宜用紅粉 以助陽氣 凡骨節痛者 宜用紅粉 以助陽氣 凡骨節痛者 宜用紅粉 以助陽氣

獨勝散 治汗出不止 宜用獨勝散 以助陽氣 凡汗出不止者 宜用獨勝散 以助陽氣 凡汗出不止者 宜用獨勝散 以助陽氣

無汗 汗者血之異名 宜用無汗 以助陽氣 凡無汗者 宜用無汗 以助陽氣 凡無汗者 宜用無汗 以助陽氣

絕汗 謂出絕如珠 宜用絕汗 以助陽氣 凡絕汗者 宜用絕汗 以助陽氣 凡絕汗者 宜用絕汗 以助陽氣

柔汗 為陰柔汗 宜用柔汗 以助陽氣 凡柔汗者 宜用柔汗 以助陽氣 凡柔汗者 宜用柔汗 以助陽氣

汗出 宜用汗出 以助陽氣 凡汗出者 宜用汗出 以助陽氣 凡汗出者 宜用汗出 以助陽氣

汗出 宜用汗出 以助陽氣 凡汗出者 宜用汗出 以助陽氣 凡汗出者 宜用汗出 以助陽氣

頭汗如珠不流者陽脫即死○傷寒汗出髮潤
與其出如油或大如貫珠者身出而不流皆為不
治之證○傷寒浮汗自出如油髮潤喘不休
為命絕不理○傷寒陽病自汗有九證皆不治
者法陰不不得有汗惟陰盛亡陽而將脫也其死必
矣

禁忌

冬月天地閉血氣藏縱有病亦不宜多出汗○
自汗心辛

積氣生液

尚虛其形猶未定次生水火木金則確然有定形矣水
日陽變陰合初生水火木金則確然有定形矣水
火初是生也○程子曰坎水一始於中有生
之最先是生也○程子曰坎水一始於中有生
者萬物之一原也或問曰天一生水亦有可驗乎
曰人之身可驗矣貪心動則津生哀心動則淚

泣

難出者何氣使然岐伯曰為泣者○黃帝曰人之衣而泣者
宗悲之聚也○心動則道也○五歲者氣之門戶也
故悲之聚也○心動則道也○五歲者氣之門戶也

涕

內經曰入肺為涕者腦者肺之液也○腦滲為涕○難經曰
有淚火盛水虧也故膽熱者亦流淚○則

文選注

卷之二

單方九種二十

石膏 解肌出汗 宜

葛根 解肌出汗 宜

麻黃 去節則發表出汗 宜

生薑及乾薑 皆發表出汗 宜

浮萍 發汗最捷 宜

荊芥 發表出汗 宜

薄荷 發毒汗解勞乏清 宜

葱白 散風邪水煎服 宜

紫蘇葉 散表氣出汗 宜

忍冬藤 散久積陳鬱之氣 宜

細辛 散風出汗 宜

杏仁 解肌發汗 宜

豆豉 升滿三日 宜

白朮 升發汗 宜

桂枝 升發汗 宜

酸棗仁 止汗 宜

桑葉 止汗 宜

牡蠣粉 止汗 宜

身醫百病金...

四十三

身醫百病金...

四十四

浮小麥實表止自汗煎水飲常服

防風煎服之止盜汗

黃芪實表虛止自汗煎水飲

麻黃根止自汗煎水飲

椒目止盜汗煎水飲

烏梅止好唾煎水飲

白茯苓止自汗煎水飲

鍼灸法盜汗取陰取百勞肺俞

痰飲

痰涎飲三者不同痰者津液之異名

痰飲分清濁濁痰者津液因熱而成

王隱君痰論痰證古今未詳

風眩暈目昏耳鳴或口眼歪斜
四肢遊風腫硬似痛非痛或酸
腫而痛痒不一或噫之不下色如
利咯之不出嚙之不下色如

現肉之類或心下如停水
或如雪心頭冷痛時作或
寐竒怪鬼魅之狀或足腕
骨節煩疼一並無常所乃
脊中每有一掌如冰凍之
或遠行或結核似瘰癧非
或塞項間有癰瘻或為上
狂或為中風癱瘓或為勞
及脚氣吐或嘔冷或心下
學跛其疑為內外疾非水
津液既疑為疑為疑為疑
而經下不通小兒則驚癇
則然後看虛實調也故劉
痰三焦痰飲之劑也故劉
論四飲之諸疾無擇叙於
君論人之諸疾無擇叙於
深識痰之情狀而得之仲
治斯疾固為簡便較之仲

分下溫利之法則疎濶矣况
又有虛實寒熱之不同者哉
飲病有八等留飲者水停心
留飲者水停心下背冷如手
留飲者水停心下背冷如手
留飲者水停心下背冷如手
留飲者水停心下背冷如手

留飲

癰飲

痰飲

神木丸
治痰飲成瘰癧乾一
斤為細末白脂麻五錢水

苓桂朮甘湯
治痰飲成瘰癧乾一
斤為細末白脂麻五錢水

東醫書卷之四十一

四十一

二蓋研瀝取汁大成稀膏搜和末未爛煮研去皮核子大
以麻汁調和成汁大成稀膏搜和末未爛煮研去皮核子大
時必購微燥進山九散至一二服不躁
山梔子散未沸湯點一乾之為服

溢飲謂之溢飲小歸於四肢當汗出而不汗出身體重痛
四重痛身重

懸飲飲後水瀦在脇下咳唾引痛謂之懸飲十棗湯
飲主之瀦在脇下咳唾引痛謂之懸飲十棗湯

支飲咳逆倚息短氣不得臥其形如腫謂之支飲小青
龍湯逆倚息短氣不得臥其形如腫謂之支飲小青

飲亦常而中破也茯苓五苓散
飲亦常而中破也茯苓五苓散

茯苓五味子湯治支飲
錢桂心芒草各一錢五分
作一貼以煎之支飲法當胃胃者必嘔嘔者復滿

伏飲出其人振振身熱必伏寒熱背脊痛目淚自
身滿嘔吐喘咳身熱必伏寒熱背脊痛目淚自

痰病有十驚痰痰之寒濕痰熱痰鬱痰食痰酒痰
生者有因食而成者有因暑而生者有因傷冷而成者

風痰搖擗動宜青州白圓子
風痰搖擗動宜青州白圓子

青州白圓子治風痰壅盛
治風痰壅盛

望右生為細末清水浸春五夏三秋七冬十日朝
及換水候日盡度澄清去水晒乾又為末以糯
研藥過以盡度澄清去水晒乾又為末以糯
米粥清和丸兼豆大蓋湯吞下三五丸為末以糯
導痰湯 茯苓甘草各一錢右到作一貼薑五片水煎

寒痰 寒痰即冷痰也骨痺四肢不舉氣刺痛無煩熱疑
結清冷宜溫中化痰丸溫胃化痰丸新法半夏湯

溫中化痰丸 治冷痰嘔噎惡心青皮陳皮良薑乾薑
各等分右為末甜糊和丸梧子大末飲
下五十丸

溫胃化痰丸 治胸膈有寒飲冷痰半夏製三兩乾薑
和丸梧子大薑湯
吞下二三十丸

新法半夏湯 治脾胃有冷痰嘔逆惡心不思飲食大
甘草炙二兩橘紅縮砂炒草果各一兩丁香
白豆蔻各五錢薑湯煎服末

濕痰 身重而軟急用弱宜神木九坊見山
精九 皮陰乾二斤黑桑椹一斗取汁去渣將蒼朮
一斤右晒乾如此九次擣為細末每百九溫湯吞下
浸汁晒乾為末每百九溫湯吞下

山精丸 皮陰乾二斤黑桑椹一斗取汁去渣將蒼朮
一斤右晒乾如此九次擣為細末每百九溫湯吞下

三仙丸 治濕痰中積夏南星各一斤為末薑汁調作片
收之須五月間做麴每麴四兩入香附末
二兩薑汁糊和丸梧子大薑湯吞下

熱痰 喉閉癰狂大痰也多煩熱燥結頭面烘熱或為眼爛
下丸小調中湯大調中湯黃芩利膈丸理中
痰湯清熱導痰湯心○熱痰黃芩利膈丸理中

清氣化痰丸

治熱痰半夏製二兩陳皮赤茯苓各一兩
薄荷荆芥各五錢石為末薑汁糊和丸梧子大
薑湯下五十九此方乃二陳湯合涼膈散也

加味潤下丸

善降痰火橘紅二兩半夏乾烘入南星
黃芩黃連甘草各一兩湯下五七十九
蒸餅和九菜豆大白湯下五七十九

小調中湯

治一切痰火及百般怪病善調脾胃神效
仁煎水浸半夏半煎水浸瓜蒌仁各炒水乾為
度各等分右到五錢薑三片煎服又四味為末煮
良薑取汁位糊和丸梧子

大調中湯

治虛而有痰火最佳即前方加入參白朮
黃芩利膈丸除胃中熱利膈生地黃白芍藥也
枳殼陳皮各三錢白朮二錢白礬一錢今加薤白

理中豁痰湯

治膈上胃中熱痰早妙白朮白芍藥各
天門冬麥芽炒各七分黃芩酒炒香附子益水炒
黃連薑汁炒善黃各五分枳實甘草各三分右到

湯下五十九傳

清熱導痰湯

治憎寒壯熱頭昏沉氣上喘急口出
不守舍神出則舍空則傷七情以致痰迷心竅神
小萋仁南星炮半夏製陳皮赤茯苓黃白朮人
參各七分枳實甘草各五分右到

鬱痰

胃膈稠粘痰同即火痰鬱於心肺之間久則凝滯
咳嗽喘促宜加減二陳湯瓜蒌積實湯

節齋化痰丸

治鬱痰老痰膠固稠粘難於咯唾一天
清火豁痰丸加減二陳湯瓜蒌積實湯

兩芒硝香附子鹽水炒善連翹各五錢青黛二錢右為末煉蜜入薑汁少許和九櫻桃大細嚼一淡薑湯送下或如黍米大

抑痰丸 治燥痰鬱積乾嗽瓜蒌仁一兩貝母炒五錢半夏製二錢右為末蒸餅和九葉豆大薑湯

九下

霞天膏 治虛痰老痰稠粘膠固於胃臆依附盤泊於腸胃當用此膏吐瀉不至虛損如癩癆鼓宣

於補虛藥中加之痰積可收萬全服此比之

倒倉更穩九治實痰新痰用南星半夏燥之橘紅

清火豁痰丸 治上焦鬱火痰涎壅盛胃膈不利咽

巴豆殼附子流通之竹瀝瓜蒌潤下之

黃酒拌九蒸九晒二兩半白朮炒枳實炒陳皮

鹽水炒一兩黃芩酒炒黃連酒炒枳實炒陳皮

兩半貝母炒以白礬皂角生薑各一兩白茯苓神麴

炒心芥子炒金一兩玄明粉七錢青礬不以煨硝

一兩同煨知色青黛甘草各五錢沉香二錢右

加減二陳湯 治老痰燥熱痰紅以鹽水浸焙

炒便香附各五分甘草三分天花粉一貼水煎服

瓜蒌枳實湯 治痰結胸膈氣急或痰迷心竅不能轉側

瓜蒌仁一錢當歸六分縮砂木香各五分陳皮片三分

到作一貼水煎入竹瀝

氣痰 七情鬱結痰滯咽喉形如敗絮或如梅核咯不出

七湯潤下九二賢散前胡

玉粉丸 治氣痰以三仙九一劑去

半夏湯加味二陳湯

加味四七湯 治痰氣鬱結 寤時於咽喉之間 咯之不

厚朴紫蘇各一錢 神麴炒 枳實南星炮 各七分 青皮

薑五分 右剉作一貼 入

潤下丸 治痰積氣滯 及痰嗽降痰甚妙 陳皮一斤 去

石為末 湯浸蒸餅 和水化同煮 爛焙 甘草二兩 灸

二賢散 清肺消痰 下氣解酒 毒橘紅一斤 甘草四兩

○早晚各二匙 淡薑湯 或白湯 調下

前胡半夏湯 治氣痰壅盛 前胡半斤 赤茯苓各一錢

五分 右剉作一貼 薑下

加味二陳湯 治氣痰壅盛 四味成梅核氣 半夏陳皮

食痰 各七分 紫蘇子 白豆蔻 仁甘草 各五分

青礞石丸 治濕熱痰去 食積痰青礞石二兩 同煨

取出水 浸二日 片茶薑汁 炒赤茯苓 枳實 麴炒 各

三兩 風乾 取五錢 右為末 薑汁 煮神麴 為糊 入牛

黃瓜羹丸 治食積痰 瓜羹仁 半夏 麴 山查 肉神 麴炒

湯行 瀝下 三

正傳加味二陳湯 治食積痰 導痰 補脾胃 消食 行氣 山

五十九丸

東醫寶鑑卷之三

川芎白朮蒼朮各八分
縮砂研麥芽炒各五分
薑三片棗二枚
煎服

酒痰
因飲酒不消或酒後多飲
飲食不美嘔吐酸水宜
飲茶化得酒次日又吐

瑞竹堂化痰丸
治酒痰消食快脾順氣
半夏南星生

乾葛以南星無白點為度
去皂角不用入砂鍋內水
煮一兩右為末薑汁浸蒸餅和丸
香附瓜蒌青黛丸
治痰癖酒痰上三味為末
每五七丸食後臨臥時

香附瓜蒌青黛丸
治痰癖酒痰上三味為末
每五七丸食後臨臥時

驚痰
或因驚風結成塊在胃腹發則跳動痛不可忍
或戒癩痢婦人多有之
妙應丹滾痰丸

妙應丹
治一身癱瘓或痛不可忍
非此乃痰涎伏在

脈法
如心失防見此痰但服此藥其疾
如失防見此痰但服此藥其疾

中者傷氣○脈沉而弦者懸飲內痛○肺飲不弦曰苦
皆弦微○沉○久得瀉脈必費調理蓋痰膠固脈道阻
病也○醫○久得瀉脈必費調理蓋痰膠固脈道阻

痰飲外證
色鮮明者有留飲如枯魚之鱗者水溢飲也
欲飲○水在肝膈下支滿噎飲心下堅築短氣惡水不
重○水在肝膈下支滿噎飲心下堅築短氣惡水不

不效○眼○及○脈○伏○而○大○者○痰○也○用○控○涎○丹○方○現○下○百○藥
眼○及○脈○伏○而○大○者○痰○也○用○控○涎○丹○方○現○下○百○藥

一切痰證 脇食少 肌色如故 一

痰飲諸病 痰之為患 新而黃濁 稠粘色清 白稀薄氣 味亦

惡味酸熱 腥外感 表甚久則 潮咳夜重 類內傷 陰

火又痰飲 流注肢節 不勻疼痛 不定為異 耳

恙為喘為 嗽或吐為 嘔為眩暈 或腫脹或 寒熱或痰 為

痛痰實主 之酸或短 氣或痞滿 或腫脹或 寒熱或痰 為

痰入骨也 又動不得 俗云骨節 遍身疼痛 或

四肢痠痺 屈伸不便 骨節疼痛 或

促者驚風 痰不嗽者 是痰結也 又

辨痰色 黑熱痰黃老痰白膠火痰

痰飲流注 證筋人忽患 胃坐脚不寧 時痛不可忍 連

疑風毒不曉 謂之志注 便用藥及 針灸皆無益 又

或神意在心 膈上多睡 或變為食 疾或令人 頭痛不可舉

為如找錐聲 多流此疾 手只服控 涎氣丹其 不通如失

或左濕痰流 注上行攻 九主之不能 舉

控涎丹 一名妙應丹 治痰飲流注 手不能舉

胃蓋湯或溫水 下七九至十 九糊九神效 驚痰加木蠶子 挂

心驚痰成鬼 加穿山甲 痰加雄黃 神效驚痰 加木蠶子 挂

痰病有似邪祟 血氣者人之神也 血氣兩虛 痰之邪因 而

動皆升降不得 運邪治之 致二人必死 其先宜多飲

痰病有似邪祟 血氣者人之神也 血氣兩虛 痰之邪因 而

薑鹽湯探吐之或竹瀝香油
多灌之次服陶氏導痰湯

陶氏導痰湯

治痰迷心竅或似鬼祟半夏一錢赤茯苓

白朮瓜蒌仁各五分
分右劉作一貼入薑三片棗四分人參三分甘草二

痰厥

去痰汁調服先吐
痰厥者皆因內虛受寒痰氣阻塞手足厥冷麻痺

加味二陳湯

治痰厥半夏製陳皮白朮當歸枳實
香桂皮甘草各三分煎服

清火化痰湯

治熱痰結在胃膈咯吐不出滿悶作痛
桑白皮杏仁芒硝各五分黃連黃芩各三分右劉

鶴頂丹

治痰熱壅咽喉聲如拽錢橫丹右為末每取
一匙入磁器內溶化下門○直指方控痰良方白礬黃

丹各一兩火煨為末麩糊和丸麻子大冷諸頑痰
迷塞關竅不通聲音不出取三十九研末入全竭

少許薑湯調灌
之吐痰立愈

痰塊

八身上中下有塊如腫毒多在皮裏膜外此因濕
痰流注作核不散問其平日好食何物用藥吐下

後方用消痰散核之藥二陳湯加大黃連翹柴胡
苦薑白芥子黃連薑汁炒煎水入竹瀝多服自消
腫○痰飲流注於背脊項脰腰腿手足聚結
薄不熱堅如石破之無膿或有薄血或清水或如
紫汁又有壞肉如敗絮或如瘰癧在皮肉之間如
雞卵可移動軟活不硬惟覺咽痰在皮肉之間如
宜返魂湯煎服加南星半夏覺咽痰在皮肉之間如

東醫寶鑑

五十四

痰注宜加味小胃丹竹瀝達痰丸附○痰鬼宜開
氣消痰湯又天南星草烏等分為未薑汁調如膏
敷核上立消○○○○○○○○○○○○
濕痰流注經絡也通
用二陳湯加減和也

加味小胃丹

星半夏並用米泔白礬皂角薑汁水煮一宿
半蒼朮用米泔白礬皂角水浸一宿炒二兩挑仁
杏仁並用白礬水泡半日炒白朮白芥子炒各一兩
實並用白礬水泡半日炒白朮白芥子炒各一兩
右為末薑汁竹瀝煮神麴為糊和九葉豆大每服
二三十九薑湯下○醫鑑一名導痰小胃丹○
回春一名竹瀝化痰丸

竹瀝達痰丸

薑製陳皮去白朮微炒白茯苓各一兩半青礬
乾黃芩酒炒各二兩人參甘草灸各一兩半青礬

石神二兩煨一兩同火煨如金色沉香五錢右
為末以竹瀝一大碗薑汁和○小豆大每百丸臨卧
時以米飲或薑湯吞下○一名竹瀝運痰丸

開氣消痰湯

白僵蚕炒各一錢陳皮片胡挑者善黃如線痰痛及
夏枳實羌活荊芥檳榔射干威靈仙各七分前胡半
甘草各三分右剉作一貼薑三片水煎服

喜唾痰

味元治脾胃兩虛多唾者立服○脾虛不能剋又制腎水
唾痰者此胃冷也宜理中湯而方咳○大病人後多
唾宜半夏溫肺湯上停寒也加益智仁研○喜唾

半夏溫肺湯

赤茯苓甘草各一錢右剉作一貼薑五片煎服
遷半夏陳皮旋覆花人參細辛桂心苦蕒白芍藥

補中益氣湯如米夏竹瀝薑汁三法○張子常愈然
 無補法必當去水故用汗吐下三法治人常愈然
 亦有挾寒挾虛之證又有血虧於子之和之三法也
 去痰滯又當補接無行又難拘於子之和之三法也
 宜○順氣為先分導胃次之法又宜實脾燥濕又隨氣而升
 火○難經曰脾主五液又氣升屬火順氣在於於降
 者因咳兩動脾之濕也半夏能泄五濕之標不能痰
 痰之本神佑九是也也門
 湯三花神佑九是也也門
 熱痰則清之用石膏青黛扼子黃芩黃連
 寒痰則潤之用瓜蒌仁杏仁五味子天花粉
 燥痰則燥之用蒼朮白厚朴茯苓
 風痰則散之用南星皂角白附子竹瀝
 老痰則軟之月海石芒硝瓜蒌仁枳殼便香附
 食積痰則消之川山查子神麴麥芽
 大要人參甘草以補脾白朮半夏以燥濕陳皮青
 澤瀉以利滲水心

順氣導痰湯

北夏南星瓜蒌仁杏仁五味子竹瀝便香附子烏藥

一貼薑
 片煎服

六君子湯

治氣虛痰盛半夏白朮各一錢五分右到作一

貼薑三方六味各一枚煎服

痰飲通治藥

實九千金指迷丸敵痰丸小胃丹痰飲枳
 證宜五飲湯破痰消飲宜清氣化痰丸虛人老人痰
 香和竹瀝枳朮
 飲宜竹瀝枳朮
 丸霞天膏現

二陳湯

治痰飲諸疾或嘔吐心或頭眩心悸或
 發寒熱或流注作痛半夏製二錢橘皮赤茯苓
 苓各一錢甘草五分右到作一
 服○方氏曰半夏豁痰燥濕橘紅消痰利氣茯苓
 苓降氣參濕甘草補脾和中蓋補脾則不生痰
 濕滲濕則不生痰利氣降氣則痰消解可謂痰用

痰用

燕該標本兩盡之藥
用者隨證加減

茯苓半夏湯 通治停痰 留飲 發中 諸病 半夏製三錢 赤茯苓七片煎服

大半夏湯 治同上 半夏製陳皮赤茯苓各二錢

芎夏湯 逐水利飲 通用川芎五分 半夏製赤茯苓各一錢 陳皮青皮枳殼各五分 甘草炙各二分

蠲飲枳實丸 逐飲消痰 導氣清痰 無牽牛子取頭末

千金指迷丸 治一切痰飲 為患 半夏製 二兩白茯苓 去縮砂又生地黃汁 煎服 右為末 薑汁糊和 九梧子大

痰酒糊丸 治一切痰飲 為患 半夏製 二兩白茯苓 去縮砂又生地黃汁 煎服 右為末 薑汁糊和 九梧子大

敵痰丸 治痰飲 通用黑牽牛子取頭末 三兩皂角酥 為末 水九梧子大 薑汁下 四九

神仙墜痰元 通治痰飲 諸病 黑牽牛子取頭末 三兩 皂角酥 為末 水九梧子大 薑汁下 四九

小胃丹 取膈上濕痰 熱積 上可取胃膈之痰 下可利 腸胃之痰 惟胃虛少食者 忌用 又云 治風痰 濕痰 食積 痰乾 花醋浸一宿 炒黑 甘遂 麩 煨熟 水浸半日 晒乾 大戟 長流 水炒 黑 乾 各五錢 大黃 濕紙裹 煨 再用酒浸炒熟 一兩 黃連 炒 二兩 右為末 粥丸 麻子大 每十九臨 附 津 煎 下 心 炒 二 兩

每服三五丸 薑湯下 二日 以大便澀 定 港 痰酒糊丸 治一切痰飲 為患 半夏製 二兩白茯苓 去縮砂又生地黃汁 煎服 右為末 薑汁糊和 九梧子大

痰病深痼 牛膏和 九多服 可以汗之 下如何 倉法 取頭末 三兩 皂角酥 為末 水九梧子大 薑汁下 四九

敵痰丸 治痰飲 通用黑牽牛子取頭末 三兩 皂角酥 為末 水九梧子大 薑汁下 四九

神仙墜痰元 通治痰飲 諸病 黑牽牛子取頭末 三兩 皂角酥 為末 水九梧子大 薑汁下 四九

小胃丹 取膈上濕痰 熱積 上可取胃膈之痰 下可利 腸胃之痰 惟胃虛少食者 忌用 又云 治風痰 濕痰 食積 痰乾 花醋浸一宿 炒黑 甘遂 麩 煨熟 水浸半日 晒乾 大戟 長流 水炒 黑 乾 各五錢 大黃 濕紙裹 煨 再用酒浸炒熟 一兩 黃連 炒 二兩 右為末 粥丸 麻子大 每十九臨 附 津 煎 下 心 炒 二 兩

煨熟 水浸半日 晒乾 大戟 長流 水炒 黑 乾 各五錢 大黃 濕紙裹 煨 再用酒浸炒熟 一兩 黃連 炒 二兩 右為末 粥丸 麻子大 每十九臨 附 津 煎 下 心 炒 二 兩

大黃 濕紙裹 煨 再用酒浸炒熟 一兩 黃連 炒 二兩 右為末 粥丸 麻子大 每十九臨 附 津 煎 下 心 炒 二 兩

右為末 粥丸 麻子大 每十九臨 附 津 煎 下 心 炒 二 兩

右為末 粥丸 麻子大 每十九臨 附 津 煎 下 心 炒 二 兩

右為末 粥丸 麻子大 每十九臨 附 津 煎 下 心 炒 二 兩

右為末 粥丸 麻子大 每十九臨 附 津 煎 下 心 炒 二 兩

右為末 粥丸 麻子大 每十九臨 附 津 煎 下 心 炒 二 兩

浸一宿並對作片同煮至兩半
 兩神麩炒麥芽炒各一兩半
 各一兩青皮乾葛黃連各五錢
 錢右為末以竹瀝薑汁泡蒸餅和
 梧子大薑湯或茶清下五七丸

竹瀝枳朮丸

治老人虛人痰感不思飲食
 化痰清火去眩暈半夏南星以白礬皂
 角生薑同煮半日去皂薑焙乾枳實條芩陳皮蒼
 朮泔浸鹽水炒山查肉白薑焙乾枳實條芩陳皮蒼
 黃連薑汁炒當歸酒洗各一盞煮糊和九梧子大淡薑
 作末以薑汁竹瀝各一盞煮糊和九梧子大淡薑
 湯或白湯下百丸

單方九二十

白礬

蒼朮

治胃中痰飲即吐未吐則當飲以少熱湯
 治痰水能治痰飲成窠囊極乾
 治痰水能治痰飲成窠囊極乾

貝母

消痰又治胃膈痰氣最妙
 童便浸三日洗淨為末糖霜調和貝母丸取貝母

前胡

治熱痰又治痰滿胃痞
 剉取三錢水煎服之

乾薑

治寒痰又消痰下氣
 九服煎服可乾下氣

生薑

去痰下氣又去痰調胃氣
 生薑四錢附子生二錢右到水煎服乾痰癖

半夏

治寒痰能勝脾胃之濕所以化痰
 治寒痰能勝脾胃之濕所以化痰

九梧子

治痰喘心痛加南星油炒為末
 九梧子大薑湯下三五丸

半夏麩

痰分病半夏為主然必造而為麩
 痰分病半夏為主然必造而為麩

病者自能使腐敗隨大小便出或散而為痰積沉
 夏麩之妙也○佐以南星治風痰○佐以薑汁酒
 浸炒芩連及瓜蒌仁香油拌麩類治老痰○佐以
 以麩炒芩連及瓜蒌仁香油拌麩類治老痰○佐以

蒼白米俱米汁薑汁浸炒甚見雞方研
烏頭背治濕痰○製法詳見雞方研

法製半夏

露七日撈出并華水洗淨三兩皮硝一斤漆水七
水三次撈起控乾用白礬八兩皮硝一斤漆水七
洗三入盆內攪三日每日換水三次取出控乾入甘
草薄荷各四兩丁香枳實木香白薑陳皮青皮枳
殼五味子縮砂各五錢白豆蔻肉桂各三錢沉香
一錢右切片曬夜露攪之日足取出藥與半夏用
泡二錢七日片日曬夜露攪之日足取出藥與半夏用
白布包往放半夏乾枝用有痰火者服之一日大便
半似魚膠一宿盡除痰根永不生也此藥化痰如
神若不信將半夏除痰根永不生也此藥化痰如
痰疾中風一語研七八粒非水送
瓜蒌仁治熱痰酒痰老痰燥痰潤肺化痰降氣
痰疾中風一語研七八粒非水送

葶藶子

除胃中痰飲能逐肺經

旋覆花

消胃上痰結噎或九膠除心

枳實

除胸膈痰積水煎服或作丸服

枳殼

消痰散胃肺痰可

天南星

治風痰或薑汁糊丸服七片

青礞石

治食積痰同焙作丸服或末服能利痰積

木瓜

消痰取肉研碎○木瓜煎治痰蓋汁竹瀝攪和

烏梅

去痰止渴可

白芥子

芥子不能達夫服煎尿晉佳味

