

欽定四庫全書

普濟方卷一百六十五

痰飲門

一切痰飲

桔梗湯

一名半夏湯

除痰下氣治胸膈脹滿寒熱嘔噦心

下堅痞短氣煩悶痰逆惡心或吐涎沫飲食不下亦治  
順陰陽消痞滿消酒化痰

明 周王朱橚 撰



撰

桔梗細碎半夏洗七次陳皮去白各十兩枳實麸炒赤黃五兩

右為細末每服三錢水一盞生薑五片煎至七分去

滓溫服無因一方用烏梅一箇煎出危氏方

桂苓甘露散出衛生家寶方治痰涎止咳嗽調臟腹寒熱嘔吐

流濕潤燥令人遍氣溢宣平及療水腫泄利不止

桂兩半人參兩半茯苓 白朮 甘草 葛根 石膏

寒水石 澤瀉各一兩藿香葉兩半木香二錢半滑石兩半

右為細末每服三錢白湯調下或新水生薑湯亦可

飛礬丹出百一選方化痰神效

飛過枯礬二兩北礬絳礬尤佳白僵蠶一兩半一兩生半兩

熟米醋浸一宿天南星切作片子用皂角柳水浸一宿來日就銚子熬看以水盡為度一兩

右同為細末薑汁糊為如梧桐子大亦得每服十五

丸至二十五丸生薑湯下亦治喉閉用薄荷二葉新

汲水浸少時嚼薄荷吞藥以水送下如咽不得即以

十五粒搗細用皂角水調灌下即開又治小兒急慢

驚風牙關緊閉不可開者亦用皂角水調塗牙齦上

入喉即活

神仙化痰丸

出百一選方

亦治風秘甚效

天南星

四兩

丁香

一兩

橘紅

二兩

半夏

四兩同南星二味生薑皂角各四兩水五升同煮水盡去薑及皂角不用

右為細末白水麩糊和丸如梧桐子大每服三十九

生薑湯下食後服

下痰丸

出百一選方

橘紅

四兩

白朮

一兩

半夏

一兩薑製

天南星

二兩炮

右為細末薑汁煮麩糊為丸如梧桐子大每服四十

丸薑湯下不拘時

快活丸

出氏危方常服消食化痰養生之家不可缺韓侂子

髮方

枳殼

一兩半炒

桂

一兩

桔梗

二兩

半夏

右為末薑汁糊丸如梧桐子大每服二十九薑食後

下日進一二服此藥消痰塊寬胸膈美飲食

滾金丸

出百一選方

治痰積中腕眩暝吐嘔頭疼惡心時吐

酸水

乾薑不真橘皮 天南星生用 半夏不湯洗

右先用生薑一兩不去皮搗爛製半夏南星末作麵却用餘藥共一處以生薑自然汁為丸如梧桐子大又以雄黃少許為衣不拘時候薑湯下三五十九臨卧服尤佳一方無半夏

滌痰丸出瑞竹堂 治男子婦人遠年日久積聚痰涎或飲酒食後吐唾日久面黃饑瘦皮膚枯澁眼無神光又治偏

正頭風如一月服三五服至老無風癱之疾

猪牙皂角一兩依皂角製法 枳殼二兩五錢一兩半火炒一兩生用 黑牽

牛末二兩 好皂角不蟲蛀老損一十兩水浸一宿去皮弦火炙黃色取淨末二兩五錢

右件用朴硝五錢并花水泡開不用滓末澄清硝水為丸如梧桐子每服五十九臨卧并花水下量人虛實加減丸數服之

治痰涎氣急

杏仁 知母 貝母 甘草各等分

右劉每服三錢水一盞糯米一撮煎至八分去滓温服

四七湯出危氏方治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉間咯不出嚥不下並治中脘痞滿痰涎壅盛上氣喘急

半夏五兩茯苓四兩紫蘇葉二兩厚朴兩

右劉散每服四錢水一盞薑七片棗一枚煎八分不拘時候若因思慮過度陰陽不清濁相干心氣不

足小便白濁用此藥清青白丸子最效婦人惡阻尤宜服之一名厚朴半夏湯一方又用半夏五兩人參官桂甘草各一兩生薑煎服名七氣湯大治七氣并心腹絞痛然藥味太甜恐未必能止疼順氣一方治七情所傷中脘不快氣不升降腹脇脹滿用香附子炒半斤橘紅六兩甘草一兩煎服无快好事者謂其耗氣則不然蓋有是病服是藥

茯苓丸一名指迷茯苓丸出危氏方本治臂痛其指迷方中云有人

臂痛不能舉手足或左右時復轉移由伏痰在內中腕  
停滯脾氣不流行上與氣搏四肢屬脾脾滯而氣不下  
故上行政臂其脉沈細者是也後人為以此臂痛乃痰證  
也但治痰而臂痛自止如婦人產後發喘四肢浮腫遂  
用此藥而愈

半夏

二兩

茯苓

一兩

殼

去穰

風化朴硝

一分

炒半兩

右為末薑汁糊丸如梧桐子每服三十九生薑湯下  
風化朴硝時未易成但以朴硝撒在竹藍中少時成

水置當風處即如芒硝括取用亦可 昔有人為痰

所苦夜間兩臂覺有人抽牽兩手戰抖至於盞茶亦  
不能舉隨服隨愈痰藥方多立見功效者未有如此  
神效 人之氣脉常欲周流以衛護榮養其身也凡  
一日一夜呼吸出入計一萬三千五百息血行於身  
八百一十又營周不息五十而復大會如環無端焉  
是以習禪者趺坐究竟意觀想學仙者吐納引導按摩  
其知道者不為血氣所使所反所以運其血也其或

喜怒哀樂不中節起居飲食失其常皆令營衛否齟  
 氣血敗濁為痰為涎為飲諸證生焉結狀於胸膈則  
 眩暈忪忡悸懣癢閉痞膈喘嗽氣急停滯於關節則  
 筋脈攣急肢節疼痛手足躡曳寒熱往來三者同原  
 而異知痰則伏於包絡隨氣上浮客於肺經因喘發  
 涎則伏於脾原隨氣上嗑口角流出惟飲則生胃腑  
 為嘔為吐宜詳甄別也

治痰飲冷氣上衝胸膈滿悶吐逆不下飲食

出聖惠方

甘草一兩炙桂心二兩半夏一兩  
微赤剉  
七次去滑

右為散每服三錢水一中盞入薑半分煎至六分去  
 滓不拘時候溫服

治心下有水不散胸中痰飲不能下食宜服此方

出聖惠方

白朮一兩澤瀉二兩半夏一兩  
七次去滑

右為散每服三錢水一中盞薑半分煎六分去滓不

拘時溫服

治痰飲胸膈不利宜服此方

一名天南星丸出聖惠方

半夏三兩天南星二兩白礬灰一兩

右先以半夏天南星二味醋漿水煮一日晒乾搗羅為末研入白礬灰令勻以蒸餅和丸如梧桐子大每服不計時以生薑湯下二十九日三服

倍术丸指出直指方治五飲酒癖一曰留飲停在心下二曰癖飲水在兩脇下三曰痰飲水在胸中四曰溢飲水溢在膈上五臟間五曰流飲水在腸間動搖瀝瀝有聲皆因飲酒冒寒或飲水過多所致及痰飲膈間虛滿留滯痰

飲食即惡心常欲吐逆腹中時鳴脇下多悸轉側有聲小便不利水漬胃中大便溇泄肢體煩倦不思飲食

乾薑炮肉桂去皮各半斤白术一斤

右為末煉密為丸如梧桐子每服二十九溫米湯下加至三十九空心日二服一方加附子除乾薑肉桂玉塵散出百一選方治大人小兒痰實咳嗽氣促喘滿咽膈不利

天南星去皮半夏各用湯洗七次切片焙桑白皮自揀土下者桔梗



各等分

右為麤末每服三錢水一盞半生薑如錢大七片煎至八分去滓溫服不拘時候一方加五味子各等分

人參枳殼湯出御藥院方治宿痰利膈下氣潤腸胃消導一切氣

切氣

人參一兩去蘆頭枳殼炒去穰一兩陳皮去白三兩半夏湯洗七

半

右以咀作一劑每用藥二兩半一服水二大盞半先

揚水二百一十遍生薑一錢匕熬至六分去滓食後

溫服如大便秘加白密少半匙再熬密消服之

茯苓湯一名甘草湯出三因方治心疼不行鬱而生涎胃脇支滿

目眩胸中有痰氣也

茯苓四兩桂心兩白朮各三兩甘草炙二兩

右為散每服四大錢水一盞半煎至七分去滓溫空

心小便利則愈或嘔痞眩悸以半夏五兩茯苓三兩

每服四大錢薑七片煎或半夏一味薑十片煎亦良

病人臍下有悸涎盛而眩與五苓散痰迷心孔如癩  
癩狀與紅丸子辰砂衣煎橘葉湯濃煎下一名小鎮

心丹

大半夏湯出御藥院方治痰飲及脾胃不和

半夏 陳皮 白茯苓去皮各二錢半

右以咀生薑二錢半細切水二鍾半煎一盞去滓臨  
卧温服如熱痰加甘草少許胃不和去甘草加陳皮  
白礬丸出仁存方治停痰宿飲風氣上攻胸膈不利

半夏一斤 白礬半兩 香附皂角米浸透一兩

右為末生薑自然汁糊丸如桐子大每服三四十丸

薑湯下

葉氏清壺丸出簡易方治痰飲

半夏一斤 天南星 神麴各半斤

右為末生薑自然汁和餅焙乾每服麴四兩入白朮

枳實四兩丸如梧桐子大每服五十九薑湯

枳實半夏湯出澹滌方治痰飲停積頭目昏重嘔噦惡心胸

膈痞悶欬嗽氣塞頂背拘急

半夏 橘紅各一兩 枳實半兩

右咬咀加生薑煎服一方每服四錢生薑十片水一

盞煎七分溫服

橘皮二兩 天南星 草蓂子炮去皮各四兩

右咬咀每服四錢薑二十片水二盞煎一盞去滓食

前空心服

玉液散出御藥院方 治胃虛有痰咳嗽嘔逆不思飲食煩燥

惡心

半夏十兩湯洗七次 生薑去皮細切一兩 陳粟米揀淨一兩

每同研焙乾為末每服二錢水二盞薑三片同煎六分溫服不計時候一方無生薑煎

空涎丹存出方 治凡人忽患胸背手脚頸項腰胯隱痛不可忍連筋骨牽引鉤痛坐卧不寧痰飲停積胸腹結為塊喘滿不安痛連胸脇時時走易不定俗醫不曉謂之走注便用風藥及灸針皆然無益又疑是風毒結聚欲

為癰疽亂以藥貼亦非也此乃是痰涎伏在心膈上下  
變為此疾或令人頭痛不可舉或神意昏倦多睡或飲  
食無味痰唾稠粘夜間喉中如鋸聲多流睡涎手脚重  
搥冷氣脾脈不通誤認癰疽亦非也凡有此疾但以是  
藥不過數服其疾如失

甘遂

紫大戟

去皮

白芥子

真者各等分

右為末煮糊為丸如梧桐子大晒乾食後臨卧淡薑  
湯或熱水下五七丸至十九丸如痰猛氣實加丸數不

妨其效如神以下利去痰飲為愈

天香飲子

出百一選方

宿砂仁

三兩天南星

湯洗

香附子

擦淨各淨兩

右吹咀每服四錢生薑十五片水二盞煎至八分食

前服或用薑糊丸亦得

神仙墜痰丸

出瑞竹堂

治痰壅胸痞氣膝此藥下痰

黑牽牛

一斤取頭末兩兩

皂角

無蟲蛀者去皮弦酥炒黃色去子淨一兩六分

生

白礬

一兩二錢

右為細末清水為丸如梧桐子大每服三五十九漸加至一百丸空心調酒下看病輕重五日十日一服病輕者半月一月一服永無癰瘡之疾

神聖餅子出瑞竹堂治痰及一切頭風

猪牙皂角炮存性淨末一錢 玄胡索一錢淨末 青黛研半錢

右為細末滴水為丸如梧桐子大捏作餅子晒乾每服用一餅新水化開男左女右仰面用竹筒鼻內灌之口咬銅錢一十五文待涎出便頭風更不再發

神朮丸出直指方治痰飲妙

茅山蒼朮一斤米泔浸一宿去皮切作片焙乾為末 大棗十五枚煮取肉研旋入麻

漿拌和藥 生麻油半兩水二盞研細去漿

右為末丸如梧桐子大每服五七十九日乾空心溫湯下

三倍丸出御藥院方治溫中下氣胸膈痞悶止痰逆嘔吐腹

脇脹痛

半夏三兩生薑製 青皮去白二兩 木香一兩

右為末生薑汁麩糊為丸如梧桐子大每服三十九不拘時生薑湯下

小半夏湯出千金方治病心腹虛冷遊痰氣上胸膈脇滿不

下食逆者

半夏一斤生薑一斤橘皮四兩

右咬咀以水一斗煮三升分三服若心中急及心痛內桂心四兩若腹滿痛內當歸三兩羸瘦者及老人尤宜服之一方用人參二兩仲景無橘皮人參

三仙丸出醫方直成治中脘氣滯胸膈煩滿痰涎不利頭目不利

天南星皮生去半夏沸湯泡七次與天南星各五兩碾為細末用生薑汁和不可太

軟但手捏得聚為度灘在篩內用楮葉蓋之令黃色晒乾收之須是五六月內做麩如醬黃法香

附子畧炒于磚上磨去毛五兩

右用南星半夏麩餅子二兩淨香附子一兩同為細末水煮熟糊和丸如梧桐子大每服二十九食後臨卧生薑湯送下

人參化痰丸傳信適用方 治痰

右以半夏大者切四塊先以湯浸七遍却以蘿蔔切作大片拌勻用水慢火煮直候嘗其味不襲人方止焙乾去蘿蔔不用入人參等分為末水浸蒸飲丸如梧桐子大生薑湯下食後服

玉粉丸出技粹方 治氣痰欬嗽脈澁面白氣上喘促洒浙寒

熱悲愁不樂

南星湯洗焙 半夏湯洗各一兩 橘皮去白二兩

右為細末湯飪餅和丸如梧桐子大每服三十九人參生薑湯食後下局方中桔梗湯亦可

橘皮茯苓丸出經効濟世方 降氣消痰寬膈和胃進美飲食去

濕和水

橘皮半斤去穢候乾秤四兩為末 白茯苓三兩 枳實三兩

半兩 微炒

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服五六十丸温熟水食後下

白朮丸 出按 粹方 治痰食致嗽脈緩面黃肢體沈重嗜卧不收腹脹而食不消局方中防已丸亦可

南星 湯洗各一兩 半夏 湯洗各一兩 白朮 一兩

右為細末湯浸餗餅和丸如梧桐子大每服五七十丸薑湯食後下

吳仙丹 一名茱萸 治痰飲上氣不思飲食小便不利頭重

昏眩

白茯苓 赤者可 吳茱萸 湯炮去末 各等分

右為末煉密和丸如梧桐子大每服三十九不拘時候熟水下酒飲亦可常子正中丞苦痰飲每啖食飽或晴陰變率同十日一發頭痛背寒嘔吐酸汁即數日伏枕不食如千金大五飲丸之類皆不效宣和初為順昌司祿於太守蔡公安持達道席上得此方服之遂不再見每遇飲啖過多腹滿服五七十九三兩時便旋已作茱萸氣酒飲隨小水而去前後痰藥甚衆無及此者梅揚卿方只將茱萸酒浸三宿以茯苓



茯苓細末拌之乾每服百餘粒湯酒任下  
療痰飲頭痛往來寒熱方

恒山一兩雲母粉二兩

右為散熟湯服方寸匕吐之止若吐不盡更服生蔥  
生菜深師雲用雲母半兩用之

橘皮半夏湯出仁存方治脾胃弱好食酸冷寒痰停

惡心涎惡稠粘或積吐粥藥不下手足逆冷目眩身重  
又治傷寒時氣欲惡欲嘔欲吐不吐昏憤悶亂或飲酒

過多中寒停飲喉口涎聲乾嘔不止痰壅涎嗽久不已  
者常服養液潤燥解饑熱止嗽

陳皮去白半夏煮各七兩

右剉散每服三錢生薑十片水二盞煎至一盞半去  
滓溫服不拘時候兩滓併煎

大人參半夏丸出宣論治化痰墜涎止嗽定喘或風痰酒

痰茶痰食痰一切痰逆嘔吐痰厥頭痛或風氣壅頭目  
昏眩或耳鳴鼻塞咽膈不利心腹痞悶筋脈拘倦體麻

痺冷疼痛常服宣通氣血清利頭目調和臟腑美進飲

食方見咳嗽  
門痰嗽類

川芎丸 治膈上有痰

川芎二兩細碎  
慢火熬熟 川大黃二兩蒸  
令極熟

右為末用不蛀皂角五七挺溫水揉盡絹濾去滓丸

器內熬成膏和丸如菜豆大每服十五丸生薑湯下

小兒三丸

化痰涎方

明礬一兩  
枯過 白僵蠶半兩去  
頭脚絲

右為末研生薄荷令爛為丸如菜豆大每服二十九

薄荷湯下日三服

一方治風氣膈上痰飲

右用不開口苦瓠湯煮三五沸以物裹熨心上膈

法製白半夏 治觸胃感寒咳嗽消飲化痰壯脾順氣

右用上好半夏湯洗七遍去臍輕焙乾再洗如此七

遍用濃米泔浸一日夜取出控乾每半夏一兩用白

礬一兩半研細溫水化浸半夏上淹水兩指許頻攪  
冬月放煖處頻於五日取出輕焙用鉛白霜一錢溫  
化又浸一日夜通七日盡取出再用漿水於慢火煮  
勿令滾候漿水極熟取出空乾於銀石或磁器内存  
貯每服一兩粒細嚼溫生薑湯下食後服又一法依  
前製成半夏每一兩用白礬水少許浸半夏細飛硃  
砂末淹一宿飲乾焙用依前法可用生薑汁清焙用  
搜飲丸

右用木瓜一箇切下頂作罐兒去穰用生白礬半夏  
麩等分為細末填在木瓜內却用元頂蓋定用麻縷  
剉縛於飲甑上炊兩次爛研以宿餗餅為丸不拘多  
少但和得聚即止如梧桐子大每服三五十九生薑  
湯下不拘時候

一方治積聚痰飲不下食嘔逆及腹內諸疾

右以續隨子研碎酒服之不過三顆當下惡物

赤石脂散 治痰飲盛吐水無時節為源為冷飲過度

遂令固冷脾胃氣羸不能消食飲食飲入胃皆變成冷水反吐不停者

赤白脂三斤

右擣下篩服方寸匕日三酒飲並可稍稍加至三四服盡三斤則終身不吐水又不下利補五臟令肥健有人一名痰飲諸藥不瘥惟服此一斤則愈或薑湯調服亦可

天南星丸 治痰飲

右以天南星不拘多少洗燒一地坑令通紅以酸醋潑之置南星於內物覆其上又以泥土泥合勿令泄氣經一夕取出去赤皮為末再以半夏末以薑汁為糊丸南星如梧桐子大每服三四十九食後生薑湯下

製半夏法

右用齊半夏二斤河水洗七遍白礬二斤為末用醋漿水三碗同入甕甕中浸用退皮濕柳棒折二錢粗

長二尺一根攪一十遍候四十日嘗試如不戟候方成取出用布袋盛沈至井底十日取出曝乾每服一兩粒生薑湯嚼下或細細嚼服亦得

二賢湯 治痰以橘皮為主須用真洞庭陳者溫水浸去其內穢白取紅一斤甘草鹽各四兩水五碗慢火煮焙乾搗為細末點服又古方用陳橘紅四兩炙甘草一兩為末湯點服以治痰極有驗世醫但知用半夏南星枳實茯苓之類何足語王璆使君外舅莫強中服之腹

痛利下物數塊如鐵彈子臭不可聞舊時食後胸滿之疾豁然頓愈

弔痰膏

右用皂角二斤水五碗煎至一碗去滓淨一碗內再熬成一鍾於塘灰上用紙到膏在紙上用半醋煮過成膏子入皂角膏內和勻明礬三兩末同和入松楊柿搗為丸如彈子大噙化

一方治痰壅嘔逆心胸滿悶不下飲食

右用厚朴一兩塗生薑汁炙令黃為丸非時粥飲調下二錢

一方 治主胸中伏熱下氣清痰下食

右陳皮半兩熬作末如茶法煎呷之

一方 治胸膈壅滯去痰開胃

右用半夏淨洗焙乾擣羅為丸以生薑自然汁和為餅子用濕紙裹於慢火煨令香熟水兩盞用餅子一塊如彈子大丸入鹽半錢煎取一盞溫服能去胸膈

壅逆大壓痰毒及治酒食所傷其效神驗

治痰潤心肺

右用貝母為末沙糖為丸含之嗽自止

半星丸 出經效濟世方

右以南星半夏各四兩為末爛薑半斤研搗剉半星為丸以楮葉裹縛却於草中罨之麴法候乾入去皮香附子四兩為末薑汁麴糊為丸如梧桐子大每服三四十丸食後生薑湯下

生犀丸出用後方治痰清目進飲食

右以川芎十兩緊小者粟米泔浸三日取出切片子日乾為末作兩料每料入麝香香腦各二錢一方生犀半兩重湯煮密搗為丸如小彈子大茶酒嚼下一丸痰加硃砂半兩膈壅加牛黃一兩水飛鉄粉一分頭目昏眩加細辛一分口眼歪斜加炮天南星一分烏巴丸出經驗良方治胸膈間久年頑痰為害積成痰氣面目青白色無時浮腫全不進食遍身疼痛夜間上壅不

時睡卧往來寒熱手足疼痛不能轉側前後用南星半夏黑錫靈砂不計服數墜之則不下取之則不出此是痰母堅滯宜用此藥須臾利下頑痰如魚凍如未利再服此藥洞利可下終身無痰疾矣

大烏梅肉三兩巴豆五粒去皮殼膜

右用水二碗於瓦石器內將烏梅慢火煮爛候水稍乾入巴豆在內將竹篦攪直候如乾糊方住火攤冷研爛就丸如菉豆大每服七丸九丸二十一丸或十

五九薑湯下

治膈壅風痰

用半夏不拘多少酸漿配勻浸磁瓶中一日夜勿出  
氣日中晒乾搗為末漿水搜作餅子日乾再為末入  
生腦子一錢研勻以漿水濃脚丸如鷄頭大紗袋盛  
通風處陰乾每服一九煎好茶或薄荷湯下

祛風丸 出衛生家寶方 有人味喜醎酸飲酒過多色慾無戒作

成痰飲聚於胸膈滿則嘔逆惡心涎流一臂麻木升則

頭面昏眩降則腰脚疼痛深則左癱右瘓淺則蹶然倒

地此藥寬中祛痰搜風理氣和血駐顏延年益壽

半夏 四兩生薑四兩一處拌作餅陰乾 白礬 一兩生用荆芥去土 槐角

子 一兩炒黃 陳皮 一兩去白 硃砂 一兩入葉半為衣

右為細末用四兩生薑汁麩糊為丸如梧桐子大每

服三十九生薑湯或皂角子仁湯送下早服臨卧一

服

韻薑餅子 出楊氏家藏方 温中降氣破飲逐痰療酒食過傷肢



體怠惰除口氣爽心神如病酒尤宜服之

半夏四兩為末再用薑汁和焙如此三遍為度檀香一兩

半生薑一斤切作片子以青鹽二兩研細同淹一宿于日中晒乾如無青鹽只用食鹽杏

仁湯洗去皮研去膏二兩

右為細末用白麩二兩密水煮糊入杏仁在內搜和

以印子脫諸花樣如錢大每服一二錢細嚼沸湯送

下

參橘丸出朱氏集驗方壯脾進食消飲下痰

人參 神麩 半夏炮七次 縮砂仁 麥蘖各二兩 白

茯苓去皮四兩 橘紅一斤去白用生薑一斤同搗晒乾

右為細末薑汁打糊為丸每服五十九薑湯下熟水

亦得

平胃丸出朱氏集驗方平胃消痰

平胃散四兩 半夏四兩薑製 好棗一百枚 燈心草一小把

右水一大碗煮候棗爛去灯心草用棗去皮核取肉

為丸如梧桐子大每服五十九薑湯下

安脾散 出朱氏集驗方

白朮 白苳蔻仁 炒 香附子 炒 人參 甘草

右等分白湯點服

平肺散 出楊氏家藏方

用積猪肉四兩起薄作三片以皂角三寸將水浸後  
擦去水用膩粉二錢擦入肉內以濕紙裏煨至五更  
時爛嚼以淡薑湯或桑白皮煎湯下至日午瀉下痰  
涎是病根也

白朮湯 出保命集方 治痰潮上如湧水久不可治者

白朮 白茯苓 半夏 各等分

右為末每服半兩病大者水二盞生薑煎至一盞取  
清調神麩末二錢頃服之病甚者下玉壺丸一百丸  
大效永除根

枳殼湯 出保命集方 治久痰胸膈不利者多上集發熱

枳殼 麩炒去穰三兩 桔梗 三兩 黃芩 一兩半

右同剉每日早用二兩半水三盞煎至二盞勻作三

服午時一服申時一服臨卧時一服三日七兩半藥  
盡服生半夏湯

半夏丸出保命集方 治因傷風而痰作喘逆兀兀欲吐惡心

欲倒已吐加檳榔三錢

半夏一兩湯洗切 雄黃研三錢

右同為末生薑汁浸餗餅為丸桐子大生薑湯下小

兒丸如黍米大

天麻丸出保命集方

天麻兩 半夏兩 南星 雄黃許少

右以白麩二兩滴水為丸如桐子大每服五十九至  
百丸煎淡水令沸下藥煮十餘沸漉出食前薑湯下

玉粉丸出保命集方 治痰結咽喉不利語音不出

半夏錢洗五 草烏一字少 桂一字多

右用為末生薑汁浸餗餅為丸如鷄頭大每服一九  
至夜含化多歲不愈者亦效

加減黃連解毒丸出海大居土秘方 治氣痿壅熱下寒氣胸膈

不利痰涎食飲不欲脛酸腿困行步艱難膈痛咽乾便溺赤黃陰痿足膝困倦常服愈效

黃連兩半當歸二錢半芍藥二錢大黃兩一黃芩兩一滑石兩二

黑牽牛兩頭末一兩微炒

右為細末水丸如豆大每服四十九百沸湯送下食

遠臨卧忌酒乾薑胡椒等物

人參前胡散出御藥院方治痰氣客於上焦嘔吐胸中痞悶

不欲飲食頭目昏眩並皆治之

前胡去苗人參 紫蘇葉 赤茯苓各二兩 陳皮不去白

半夏湯洗切甘草 木香 枳殼麩炒去穰各半兩

右為麤末每服三錢水一大盞半生薑七片同煎至

一盞去滓溫服不拘時候病愈即止服

濟生導痰湯出醫方集成治一切痰涎壅盛或胸膈留飲痞

塞不通

半夏湯洗七次去滑四兩天南星炮去皮枳實去穰麩炒赤茯苓去皮

橘紅去白各一兩甘草炙半兩

右為吐咀每服四錢水一盞薑十片煎至八分食後  
温服

半夏利膈丸 出德生堂 化痰墜涎定喘止嗽除嘔逆痰厥頭  
疼風氣之証

白朮 人參 白茯苓 白礬 滑石 貝母 各

兩 天南星 生一兩半 白附子 生二兩 半夏 炮洗三兩 木香 一兩

右為細末水糊為丸如梧桐子每服三五十九生薑  
湯無時下

四倍丸 出德生堂 治諸痰証多驗兼療手臂背疼痛

木香 一兩 陳皮 二兩 茯苓 四兩 半夏 八兩 洗炮

右為末生薑汁打糊為丸如梧桐子大每服五七十

丸温酒無時下

辰砂化痰丸 出德生堂 治風氣上攻頭目昏眩痰涎壅盛心

神不定此藥主之

白礬 飛過 辰砂 各半兩 南星 炮一兩 半夏 三兩 洗炮用生薑汁和作

餅子晒乾為末

右為末生薑汁打糊為丸如梧桐子大以硃砂為衣

每服二十五丸生薑湯食後服小兒三二丸生薑薄

荷湯下

消痰丸出德生堂治痰壅為患

牽牛取頭末四兩一半生槐角子 青皮各半半夏湯洗

七次焙乾一兩皂角肥不蛀者去皮子炒黃色一兩

右為末生薑麩糊丸如小豆大每服二十九加至三

十五丸卧後生薑湯下

三生丸出德生堂治氣痰壅上不升降胸膈悶塞不通

皂角去皮子一斤牽牛頭末二斤白礬半斤蘿蔔子炒半斤青木

香半斤

右為末煮蘿蔔水麩糊為丸如梧桐子大每服三五

十九丸溫水食後臨卧服大便下痰方見効

半夏利膈丸出德生堂治風痰酒痰茶痰氣痰食痰諸痰為

苦致令手臂肩背胸膈俱痰吐出痰如結核黑色腥臭

者此藥主之

牽牛取頭末四兩 皂角不蛀肥者去皮 檳榔一兩

齊州半夏製一兩 青皮去皮二兩 槐角子炒半兩

右細末生薑打麵糊為丸如梧桐子大每服三十九

至五十九生薑湯或溫水食後服

醉鄉寶屑傳言適 能寬中化痰治嘔吐惡心醒酒醉後

雅宜隨意服之

陳皮四兩 縮砂四兩 紅豆一兩 甘草二兩 生薑一斤已

咀鹽一兩 丁香一錢 白荳蔻仁一兩 巴豆八粒不去

串定

右九味同用水煮焙乾去巴豆不用

消飲丸 利膈下痰散飲去滯

半夏一兩湯洗七次 陳皮焙 青皮焙 枳實去穢炒 乾葛焙生

薑炒各半兩

右為細末薑糊為丸如梧桐子大每服五七十九茶

酒任下親戚沈開祖方余今常服之

小黃丸 化痰止涎除濕和胃氣胸中不利

黃芩兩一錢 乾薑半一錢 白朮錢五 半夏五錢湯洗 澤瀉兩二

黃耆錢三 陳皮去白三錢 青皮去白三錢

右為細末湯浸餗餅為丸如棗豆大每服三五十九  
食遠溫水送下一方無青陳皮

黃芩利膈丸 除胸中熱利膈止痰

生黃芩 炒黃芩各一兩 南星錢三 半夏錢半 黃連錢五 枳

殼分三 白朮分二 陳皮分三 澤瀉錢五 白礬錢半

右件為細末湯浸餗餅為丸如梧桐子大每服三五

十溫水水食遠送下忌酒濕麵

半夏湯 治痰飲不利胸膈痞悶不思飲食

半夏兩一 神麩一兩 麥蘖半兩 甘草兩二 生薑六兩

濕紙裏慢火煨熟切片子 杏仁半一兩 丁香半兩

陳皮 鹽炒四兩

右為細末每服一二錢沸湯點之

消飲丸

茯苓 乾薑炮各三兩 白朮八兩 枳實炒半兩



右為末煉蜜丸如梧子大每服十五丸米飲下

溫肺丸 治肺胃不和胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噫醋

心腹痞滿咳嗽不止頭目昏痛

白朮兩一丁香分一乾薑炮一兩半夏二兩湯浸七遍生薑汁浸一夜焙乾

右件同搗羅為末生薑汁煮麵糊和丸如棗豆大每

服二十九生薑湯下腹痛食前嘔吐逆食後

生犀半夏丸 治心肺疼熱盛氣促咳嗽

生犀屑半兩入磁臼中搗為細末白茯苓去皮一兩半夏一兩用生薑四兩去

皮細切同搗桂心七分  
令爛製作餅

右件為細末以生薑自然汁煮麵糊為丸如棗豆大

每服三十九生薑人參湯下食後

生薑橘皮丸 升降滯氣消飲去痰溫中散寒快膈美

食

陳橘皮去白一斤生薑洗一斤薄切片神麴微炒二兩

右件同為細末麵糊為丸如梧桐子大每服五七十

丸至百丸米飲熱水送下食後無問長幼皆可服

聖金丸 治停痰宿飲上喘咳嗽嘔逆頭痛全不入食

半夏用生薑自然汁浸兩宿取出切成片子新丸上焙乾威靈仙淨洗去根土焙乾秤

右件各三兩為細末用不蛀皂角五七定河水一椀

揉皂角為汁濾去滓用銀石器內熬成膏和上件藥

丸如棗豆大每服七丸至十九生薑湯下空心日午

臨卧各一服至一月飲食增進為驗忌茶

梅膏丸 化痰止咳嗽定喘消停飲

烏梅十四枚去殼用水三椀同烏梅一處煮水盡留巴豆七粒同烏梅肉研膏

膏 白礬一兩半夏二兩湯洗七次焙乾葶藶子炒款冬花不

皂角炒黃去黑皮秤馬兜鈴 人參去蘆頭各一分

右件為細末入膏子內圓如棗豆大每服五七丸用

生薑湯送下食後服如喘促痰欬煎桑白皮蘿蔔湯

下

生半夏丸 化痰利膈尤治嘔

半夏湯洗七次一兩檳榔錢一丁香錢一

右為細末生薑自然汁煮薄糊為丸每服三十九食

後薑湯吞下一法小匙內漂令熱傾入盞內小匙挑服仍啜其汁嚥之

壞痰丸 治痰涎壅盛服藥未退頭重心煩飲食不下

硃砂二分 寒水石半兩 猛火燒透赤好定粉一分

水銀二分 將定粉於盞內與水銀同研令似乳汁用蜜陀僧一分

分半夏半兩 熬酒湯一度龍骨一分 宿用

右件七味為末生薑自然汁煮麵糊為丸如菜豆大研好硃砂度過每服一九至二九生薑龍腦水下不

嚼

人參半夏丸 墜痰化涎

半夏一兩 生薑四兩 取汁先以湯洗半夏七遍浸三日 後于日內煎乾切作片子焙乾用北

礬研 赤茯苓去皮各一兩 天南星生用半兩 人參二錢

右件五味同杵為細末篩羅以蒸餅水浸過却用紙裹煨熟為丸如菜豆大每日空心夜卧用淡生薑湯下十五丸開胃口薑棗湯下風涎皂角一寸薑錢三片蘿蔔三片同煎湯下

開胃九子出護命方

人參一兩半夏半兩  
薑汁製煮

右為末以京棗肉丸如梧桐子大非時熟水下十五丸

丁香半夏丸出十便良方温益肺胃思進飲食治咳嗽嘔吐

胸膈痞滿消痰飲癖止心嘈煩

半夏二兩白朮一兩丁香一分

右搗羅為細末以薑汁煮麵糊為丸如桐子大每服

二十九丸用薑湯下一名温白丸

服蒼朮法出十便良方

北方常服化痰消堅殺蟲予患癖飲三十年多嘈雜痰飲上潮即吐有時急飲酒半杯即止蓋合此証也因讀巢氏病源論酒痲云飲酒多而食穀少積久漸瘦其病嘗思酒不得酒則吐多睡不復能食胃中有蟲使然名為酒痲此藥治之要之須禁酒即易治不禁無益也予生平有二疾一則臟腑下血二則膈中

停飲下血有時而停飲則無時始因年少時有坐為  
文左向伏几是以飲食多墜向左邊中夜以後稍困  
乏必飲兩三盃既卧就枕又向左邊側睡氣壯盛時  
殊不覺三五年後覺酒止從左邊下漉漉有聲脇痛  
飲食殊減十數日必嘔數升酸水暑月止是右邊身  
有汗微微常潤左邊病處絕燥遍訪名醫及海上方  
服之少有驗間或中病止得月餘復作其補則如天  
雄附子礬石其利則如牽牛甘遂大戟備嘗之矣予

後拂度之已成癰囊如潦水之有科月不盈科不行  
水盈科而行也清者可行濁者依前停滯蓋下無路  
以決之也是以積之五七日必嘔而去少寬數日復  
作脾土惡濕而水則流濕莫若燥脾以勝濕培土以  
填科白則疾當去矣於是悉屏諸藥一味服蒼朮三  
月而疾除自此一向服數年不吐不嘔胸膈寬快飲  
食如故暑月汗周體而身涼飲亦當中下前此飲漬  
其汗目亦多昏眩其後燈下能書細字皆蒼朮之力

也其法蒼朮一片去皮切為末用生香麻油半兩水  
 二盞研濾取汁大棗十五枚爛煮去皮核研以麻汁  
 勻研成稀膏搜和入臼熟杵丸如梧桐子大乾之每  
 日空腸用溫湯吞之五十九增至一百丸二百丸忌  
 桃李雀肉初服時必膈微燥但以茅朮制之覺燥其  
 進山梔極有力亦自然不燥也山梔數用山梔子一  
 味乾之為末沸湯點服故和多坐不可伏同一邊時  
 或行動亦消息之法

參蘇飲

出如  
宜方

治陰陽痞膈氣結凝痰為熱

木香

枳殼

桔梗

甘草

炙

陳皮

製各  
半兩

蘇葉

乾葛

半夏

製

前胡

人參

茯苓

各七  
兩

右咬咀薑七片棗六枚煎熱多痰稠鼻塞宜金沸草  
 散

金沸草散

出鮑  
氏方

治有熱多頭目昏重痰涎壅塞大便堅

而渴

荆芥

四兩

旋覆花

前胡

麻黃

各三  
兩

甘草

半夏

赤芍藥 細辛 五味子 杏仁各一兩半

右為散每服三錢薑三片棗一枚煎

大半夏湯出如宜方治氣鬱生痰取結不散腸間漉漉有聲

及反胃嘔吐

半夏製人參錢四

右咬咀薑七片一方入蜜煎亦治膈間支飲

蘇子降氣湯出如宜方治虛陽上攻痰涎壅盛氣不升降上

盛下虛方見喘門喘類

青靈丸出如宜方治老人元氣衰弱痰氣上攻睡卧不安

靈砂 青州白丸子

右薑汁糊為丸薑湯下又以靈砂一兩丁香胡椒各半錢為末共杵丸如棗豆大每服六十九丸薑湯下藥

靈砂丹

八味丸出如宜方治腎虛不能自養邪水溢上吐多痰

牡丹皮 茯苓 澤瀉各三兩 山茱萸 山藥各四兩

附子製桂各三兩 熟地黃八兩

右末蜜丸如梧桐子大每服十五至二十五丸温酒空心日二服

四磨湯出如宜方治七情鬱滯痰氣上壅喘急聲促

人參 檳榔 沈香 烏藥

各用水磨濃共煎三五沸服

蜜煎主寒熱出千金方

蜜五合 恒山 甘草各二兩

右三味取二味咬咀以水一斗煮取二升去滓內蜜

五合温服七合吐即止不吐更服七合勿與冷水一

方用甘草半兩

又方出千金方

蜜二合醋八合

右二味調和平旦頓服須臾猥然擿之若意中不盡明更服無不大嘔安穩

星砂丸出永類令方温中化痰兼化宿滯生冷果實夏月可

配消暑丸



南星洗焙良薑焙各四兩砂仁一兩

右細末薑自然汁煮麵糊丸如梧桐子大薑湯下又方只用南星砂仁二味

玉壺丸出朱氏集驗方治一切痰疾

大半夏二十兩雪白南星一十五兩

右二件用野外地上清潔水滿浸逐日換水浸五日將半夏切作兩片南星大者切作六片中者切作四片再逐日換水浸五日足每五兩研細末生白礬一

兩添半夏南星則亦添礬却用井水浸須令水滿只此水浸一月日取半夏或南星嘗看以不麻為度如尚麻更浸候不麻漉起晒乾用和腳下水浸礬碾細收之每服七兩入全蝎七箇炒白附子二錢半為末炒甘草二錢和勻用飲餅乾末二兩半用生薑半斤研取自然汁煮炊餅末和為丸如梧桐子大或乾添些白湯為丸每服二三十丸隨意嚥下亦可此藥不問是何證候痰涎作壅或有異證風証小兒驚癇之

類應手而愈多服之無妨勿拘二三十丸之說以薑白湯將藥嚥下皆可無病人嚥服二三十丸再加永無痰症

半夏湯出朱氏集驗方痰飲

南星 半夏各四兩生薑半斤皂角二兩定

右以白水淹過藥一寸許同煮乾仍用溫水浴過剉片日乾為末入丁香縮砂各半兩甘草一兩半入熟粟米半斤空心沸湯點服

煮浮丸出朱氏集驗方治痰壅眩暈

南星生半夏生防風 天麻 麩生

右等分滴水為丸如梧桐子大先煮湯令沸滾方下藥四五十丸煮一二滾藥浮取漉出用薑湯吞下不拘時候

玉液湯出朱氏集驗方治痰疾

半夏用揀好者不拘多少湯洗白淨切作片如紙薄用

右每服半兩水二盞薑三十片慢火煎至七分濃磨

沈香水一盞脚傾入藥內再煎兩沸食後臨卧服

玉浮丸出朱氏集驗方治痰吐頭痛極妙

天南星削去皮半夏各一錢半陳皮去白白朮 茯苓 附

子去皮臍各一錢

右件各生為末用生麵隨多少拌勻生薑自然汁丸

如梧桐子大用滾湯煮熟次用藥現成湯加生薑自

然汁下二十九丸不拘時候

白朮丸出朱氏集驗方治痰飲以久服多服而後效

白朮八兩半夏湯炮七次赤茯苓去皮乾薑 肉桂去皮枳殼

麸炒各二兩

右為細末生薑自然汁煮麵糊為丸如梧桐子大服

多至二百丸三服

赤茯苓湯出朱氏集驗方治停飲於胸胃怔冲不已

赤茯苓去皮半夏泡茯神去皮陳皮 麥子各一兩沈香

甘草 檳榔各兩半

右咬咀每服三錢水一盞薑五片煎七分空心服效

神效白朮丸 出衛生家寶方 治壅喘嗽不下飲食

半夏 八兩湯泡洗七次去滑 神麩 六兩

右為細末生薑自然汁和作餅子以紙裏當風處候乾用麵一兩白朮一兩同為末生薑自然汁丸如梧桐子大每服三十九薑湯下無時

四金丹 出衛生家寶方 治風痰壅咳嗽不已

桔梗 炒 防風 白礬 枯各一兩雄黃半兩研

右為末水浸蒸餅丸如鷄頭子大每服一粒綿裏含化

硝礬丸 出衛生家寶方 治痰涎壅結咳嗽咽痛

白礬 焰硝 各等分

右為細末每鍋子內按實以生茶葉數斤蓋之火煨通紅伏火為度茶葉旋添直待伏火却連鍋子入地坑一宿取出為細末糯米粥為丸如梧桐子大硃砂為衣每服三九薑湯送下食後臨卧服

化痰丸 出衛生家寶方 治痰凉膈止嗽治頭眩

天南星 生用 半夏 生用 薄荷葉 人參 茯苓 白礬

右等分為細末生薑汁麩糊為丸如梧桐子大每服  
三十九生薑湯下食後服

煮朴丸 出衛生家寶方 治諸痰疾和中止咳

厚朴 十二兩去 天南星 六兩九大 大棗 六兩 半夏

六兩九細者搥碎

右四味用生薑一片切作薄片貯銀石器內水高藥  
三寸許慢火煮一日旋添水煮熟焙乾燥再入

白朮 六兩 人參 三兩 大香附子 六兩 青橘皮 六兩

並為細末用神麩煮糊為丸如梧桐子大食空臨睡  
生薑湯送下吞四十粒

鐵刷丸 出衛生家寶方 化痰實寬利胸膈清頭目降氣止咳去

停飲

圓淨半夏 四兩湯浸洗七次焙乾秤 緊實檳榔 四顆

右為細末生薑自然汁煮麩為稀糊丸如菉豆大每  
服三十九淡薑湯吞下食後臨卧服小兒服七丸或  
別小丸亦得

導氣丸 出衛生家寶方 治痰涎壅盛降氣逐風

半夏 二兩用皂角五定按汁浸一宿控乾切作片子 南木香 半兩 赤茯苓 一分

紫蘇葉 半兩 白附子 一分

右為細末水煮熟糊為丸如梧桐子大食後每服三

十九生薑湯下不拘時

生胃丹 出朱氏集驗方 生胃氣消痰沫開結間膈進食

粟米 四兩溫水浸透炊作飯火焙氣垂熟用生薑自然汁和濕再乾如是製七次 人參

粉天南星 二兩薑汁浸一宿次日再用生薑汁和紙拌黃土泥裹南星晒乾黃泥用

慢火煨半日泥焦乾為度候冷取出南星入藥 白朮 茯苓 各三兩 陳皮

白苳蔻仁 宿砂仁 麥蘖 炒 半夏 麩 青皮

萹澄茄 石蓮肉 各一兩 南木香 三錢

右件精揀製同為細末米粉糊為丸如菉苳大每服

五六十丸薑湯下食前服

妙應丸 出永類鈴方 治老人一切虛寒痰癖積塊攻脹疼痛

附子 一箇七錢重去皮臍剉作罐子 硃砂 三錢 木 錢用水一盞在泥

香 七錢 破故紙 炒 萹撥 各一兩

右以飛過礪砂末分在附子罐內却用所剉附子末蓋口以水和白麵裹約半指厚慢火煨令黃熟去麩同木香等為末將煨過熟黃麩醋調煮糊為丸如菜豆大每服二十九食後薑湯下

如神湯

出朱氏集驗方

治痰症嘔吐連最效

半夏子

炒

神麩

不拘多少炒黃色去半夏留神麩

丁香

右用三味水一盞半煎至八分其藥自然成濃汁不妨通日服其疾即止用此藥下養正丹甚效

治痰飲下水腫及痰癘

出本草

以接骨木根皮煮汁服之當利下及吐不可多服

治攝痰涎

出本草

以益智仁含之佳

除痰止渴令人不睡

出本草

以決明葉火炙作飲甚香

下痰

出本草

以風痰母煎炙之

治嘔心逆膈痰唾

用蓮子乾者六枚炒令黃色為末以熟水半盞調服

即止

又方

用糟笏節中水而和乳并牛乳飲之


治胸心痰飲傷寒熱病瘡瘡須吐者

以鹽末一大匙和暖湯送下須即吐不快明旦更服甚良法也

導引法 養生方云左右側卧不息十二通療痰飲不

消又有餘病右側卧有飲病左側又有不消氣排之左

右各十二息療痰飲





普濟方卷一百六十五

總校官候補知府 臣葉佩蓀

校對官編修 臣朱紱

謄錄監生 臣韋洪勳