

作者不詳

急救仙方

中國醫學大成續集

急救仙方提要

是書在宋志及諸家書目中均不載。惟焦竑國史經籍志。載有救急仙方十一卷。註見道藏亦不言作者爲誰。考白雲齋道藏目錄。太玄部側字一至十一號。即救急仙方。其卷一至卷五。論婦科調經胎前產後附雜症小兒方。首有金川徐守真序。其卷六七。乃仙授理傷續斷秘方。其序云。此方在唐會昌間。有一頭陀結草庵於宜春之檢村。貌甚古。年一百四五十歲。買畝墾倉種粟以自給。既有彭叟者。常往來其廬。願情甚稔。或助之耕。一日彭之子升木伐條墜於地。折脛挫脈。呻吟不絕。彭訴於道人。道人訪視之。命買數品藥。視製以餌。俄而病定。數日已如平時。始知道人能醫。求者益衆。道人苦之。乃取方授彭。使自製以應求者。且誓之以無苟取。毋輕售。毋傳非人。由是四方求

治者日衆。率能藥到病除。據云彭叟初識道人年僅三十許。今老矣。然風采無異平時。問其姓名。曰蘭道。問其氏。曰長安人也。彭傳其治損諸方。因易其村曰掌道人。有書數篇。所授者爲最後一卷云。卷八、即疔瘡治法。卷九、爲秘傳五痔品。卷十、上清紫庭追勞仙方論法。卷十一、上清紫庭追勞仙方品。備列追勞湯丸針灸各法。各章俱詳證狀。與得病之原因。療治之方法。條分縷析。爲自來瘍科所未及。如疔瘡門內所立追疔奪命湯一方。又備詳加減之法。非精於是術者不易作也。學者苟能觸類旁通。是足以資博濟之用。雖雜瘡雜證諸門。稍有闕佚。然綱要具在。不足爲病也。

上海涵芬樓影印正統道藏本

急救仙方序

醫之療疾。莫難於婦人。婦人之疾。莫重於胎產。胎產之重者何。蓋以一身之疾。否繫乎母子之存亡。故千金方。部居獨以婦人廁其首。此思邈孫真人之用心不苟矣。世之胎產諸方。不為不富。然其間多犯冗僻貴。冗則倉卒之際難備。僻則窮鄉下邑難得。貴則貧窶之家難求。是三者雖非君子用心之不周。而人之蒙其惠者。往往求什一於千百。今此方之編分為三類。末附以雜病。雖不能如諸方之

廣載博該。要之不犯冗僻貴。而凡胎產危急之證。大略亦盡之矣。俾倉卒之際。窮鄉下邑。貧窶之家。皆得易而求之。雖一草一木。足以收效。豈若前三者之難爲功哉。苟有用者。始信其爲閨門之重寶云。金川徐守貞序。

急救僊方卷之一

圖五

急救僊方卷之二

圖四

急救僊方卷之三

圖五

急救僊方卷之四

圖四

急救僊方卷之五

圖五

急救仙方卷之一

妊娠諸疾品

术苓湯。治婦人胎孕不安。

白术

黄苓

各等分

右爲粗末。每服三錢。水二盞。當歸一根。同煎至一盞。稍溫服。

立效散。治胎動不安。如重物所墜。冷如冰。

川芎

當歸

各等分

右爲粗末。每服五錢。水煎。食前溫服。或下血。心腹痛。酒水相半煎服。

保安散。治妊娠因有所傷胎動。疼不可忍。及血崩不止。

連皮縮砂

不以多少。炒黑。去皮。

右爲細末。溫酒調下。覺腹中熱則胎已安矣。

治妊娠胎動不安。或腰痛。胞轉捨心。下血不止。

石菖蒲根

搗汁三升。飲之。

又方。艾葉如雞子大。以酒四升煮。取二升。分二服。良。

又方。檳榔一兩爲末。葱白湯調下。一錢七。佳。
二黃散。治有孕胎漏下血。

生地黃

熟地黃

各等分

右爲細末。每服三錢。煎白朮。枳殼調下。
立聖散。治妊娠下血不止。

雞肝二具。用好酒一升煮熟。共酒食之。大效。

枳芩散。治胎漏下血。或因事下血。

枳殼

去穢半兩。麩炒

黃芩

半兩

白朮

二兩

右爲粗末。每服五七錢。水煎。去滓。食前服。

治妊娠誤有失墜。或推築著。疼痛難忍。

當歸

兩一

新青竹茹

兩二合

右以好酒二升煮。十數沸。分三服。

又方。以川芎爲末。每服二錢。溫酒調下。

治妊娠因頓跌。胎動不安。腰痛腹滿。或有所下。或胎上搶心。

熟地黄

兩二

白芍藥

艾葉

當歸

甘草

阿膠

珠炒

黃耆

川芎

各一兩

右以咀。每服半兩。姜三片。棗一枚。水煎服。

火龍散。治妊娠心氣痛。

艾葉

半兩。益炒一半。

茴香

半兩。炒。

川練子

半兩。炒。

右為細末。水煎。食前服。

通氣散。治妊娠腰痛。狀不可忍。此藥神妙。

破故紙。不以多少。瓦上炒香熟為末。嚼。

胡桃肉一箇。空心。溫酒調下。三錢。

芎歸湯。治妊娠胎動。子死或不死。

川芎

當歸 各等分

右㗎咀。每服三五錢。加紫蘇數葉。酒水合煎服。死者即下。未死者即安。

黃連湯。治妊娠兒在腹中啼。

黃連

二錢

生甘草

一錢

右濃煎汁。令母呷之。

又方。以多年空屋下鼠穴中土一塊。令母噉之。即止。

豬苓散。治妊娠從腳上腫至腹小。便微利。微渴。引飲。

豬苓

五兩

右為末。以熟水服。方寸匕。日三。

葶藶散。治妊娠遍身洪腫。

葶藶

二兩

白朮

五兩

白茯苓

桑白皮

郁李仁

各二兩

右為粗末。水六升。煮取二升。分三服。小便利。即差。

又方。澤瀉

二兩

葶藶

二兩

茯苓

枳殼

炒

白朮

各六兩

右為細切。以水六升。煮取二升。分二服。防已湯。治妊娠脾虛。遍身浮腫。心腹脹滿。喘促。小便不利。

防已

七錢半

桑白皮

赤茯苓

紫蘇葉各一兩

木香二錢半

大便不通加枳殼攢榔。

右粗末。每服四錢。姜四片。水同煎。食前服。
當歸芍藥散。治妊娠腹中絞痛。心下急痛。

白芍藥四兩 當歸

茯苓各一兩

澤瀉二兩

川芎二兩

甘草炙一兩

右為細末。每服三錢。食前溫酒調服。以蜜丸亦可。

人參散。治妊娠霍亂吐瀉。心煩腹痛。

人參一兩

厚朴一兩
姜一兩

陳皮一兩

當歸炒

甘草

半兩

乾生姜

一兩

嘔逆不止。加益智仁。煨草豆寇。

右㕮咀。每服四錢。東三箇。水煎服。

茯苓半夏湯。治妊娠惡阻。心中憤悶。頭目眩

暈。四肢怠惰。百節煩疼。胃膈痰逆。嘔吐惡心。

嫌聞食氣。好噉酸醎。多卧少起。全不進食。先

服茯苓半夏湯。次服茯苓丸。

半夏一兩二錢。湯洗七次。炒

熟地黄各七錢半 陳皮

旋覆花

芍藥

赤茯苓

人參

川芎

桔梗各半兩

甘草半兩

右爲粗末。每服五錢。姜三片。同煎。食前熱服。

茯苓丸

赤茯苓

人參

桂炒

半夏湯洗

陳皮

乾姜炮各五錢

白朮

葛根各一兩

甘草炙一兩

枳實二兩

右爲細末。鍊蜜丸。桐子大。米飲下三五十丸。食前。

竹瀝湯。治妊娠恒若煩悶。心膽怯。此名子煩。

茯苓

三兩

竹瀝

一升

右以水四升。煎取二升。分三服。不差再服。

又方。茯苓

四兩

防風

麥門冬

去心

黃芩

各三兩

人參

一兩五錢

右以咀。每服四錢。淡竹葉數片同煎。服不

得眠。加酸棗仁。

紫蘇飲。治妊娠胎上逼。脹滿疼痛。謂之子懸。兼治臨產驚悸。氣結。連日不下。

紫蘇

一兩

當歸

甘草

各二錢半

人參

川芎

大腹皮

陳皮

白芍藥

各半兩

右咬咀。每服半兩。水一盞半。姜四片。葱白

七寸。去滓。空心溫服。

知母散。治妊娠煩躁悶亂。口乾及胎藏熱。

知母

甘草

麥門冬

去心。各半兩。

黃耆

黃芩

赤茯苓

各七錢

右咬咀。每服四錢。竹茹一塊。水煎服。四肢

壯熱。加葛根柴胡。

治妊娠忽下黃汁如膠。或如小豆汁。

苧根切。二升。

右水四升煎。取二升。分二服。每服入酒半升。再煎服。

厚朴散。治妊娠下利黃水不止。

厚朴

三兩。姜汁炙。

黃連二兩。

肉豆寇

五箇。連皮。

右㕮咀。用水二升煮。取一升服。

治妊娠無故卒下血。

阿膠

二兩。重。以蚌粉同炒。珠。搗爲末。

生地黄

半斤。搗取汁。

右以清酒三升。將二味攪勻。溫過。分三服。治妊娠無故尿血。

龍骨

一兩。爲末。

蒲黃

五錢。研勻。

右以酒調。方寸匕。日三服。

治妊娠藏氣本虛。脾胃久弱。臍腹疼痛。滑泄無度。產後同。

厚朴

二兩。姜汁浸。炒黃。

草豆寇

一箇。煨。

肉豆寇

一箇。麩裏煨。

右咬咀。每服三錢。姜三片。煎服。

大寧散。治妊娠下利。赤白。及泄瀉。疼痛。垂死者。

黑豆

三十粒。

甘草

二寸半。半生半熟。

嬰烏粟殼

二十一
生炒一

右爲粗末。都作一服。生姜三片。同煎。食前服。神效。

治妊娠挾熱下痢。

黃連

兩一

黃栢

兩一

梔子仁

十枚

右㕮咀。每服五錢。水二盞。浸三時久。煮十沸。去滓。頓服。嘔加生姜。橘皮。

治妊娠下痢。腹痛。小便澀。

糯米

合一

當歸

炒一兩

黃耆

兩一

右細切。和勻。水二盞。煮。取一盞二分。去滓。

分四服。

黃連散治妊娠下痢赤白膿血久不止。

黃連

八錢

厚朴

姜製

阿膠

蚌粉炒

當歸

各六錢

艾葉

黃栢

各四錢

乾姜

炮四錢

右為細末空心米飲調下方寸七日三服。
治妊娠小便不禁。

桑螵蛸

十二箇炙

右為細末每服二錢空心米飲調下。
白薇散治妊娠遺尿不禁。

白薇

白芍藥

炒各等分

右為末。每服二錢。食前溫酒調下。

茯苓散

治妊娠小便不通。

赤茯苓

黃葵子

各等分

右㕮咀。每服五錢。水二盞。煎一盞。溫服。如

不通。恐是轉胞。加髮灰少許。調服。極妙。

治妊

娠患淋。小便澁。水道熱不通。

車前子

一兩

葵根

五錢切

右二味以水升半。煎至一半。空心溫服。

大腹皮散。治妊娠大小便赤澁。

大腹皮

枳殼

去白。麩炒。

甘草

黃芩

各一錢。

赤茯苓

去皮。二錢。

右咬咀。加葱白。水一盞。煎七分。空心溫服。

斬邪丹。治婦人鬼胎。如抱一甕。

吳茱萸

川烏

秦艽

柴胡

白僵蚕

洗。

巴戟

生用。

巴豆

去殼。不去油。

莞花

醋煮。各一兩。

右為末。鍊蜜為丸。如梧桐子大。每服七丸。

蜜酒吞下。取出惡物。即愈。

桔梗散。治妊娠肺壅。及外傷風寒。咳嗽喘急。

天門冬去心 貝母

人參

甘草

桑白皮

桔梗

紫蘇各半

赤茯苓一兩

麻黃去節

右咬咀。每服四錢。姜三片。水煎服。服藥忌食鯉魚。

紫苑湯。治妊娠咳嗽不止。胎不安。

紫苑

天門冬各一兩 桔梗半兩

甘草

桑白皮 杏仁各二錢半

防風半兩

右咬咀。每服三錢。竹茹一塊。水煎。去滓。入

蜜半匙。再煎二沸。溫服。服藥忌食鯉魚。
人參橘皮湯。治妊娠嘔吐。痰水多是惡阻。

人參

橘紅

白朮

麥門冬

去心。各一兩

甘草

三錢

厚朴

製

白茯苓

各半兩

右爲粗末。每服四錢。入淡竹葉彈子大。生
姜三片。水煎。空心。食前服。
加味四物湯。治妊娠傷寒諸證。

熟地黃

當歸

川芎

芍藥

各等分

右咬咀。每服四五錢水煎服。

若妊娠傷寒。頭痛。身熱無汗。脉浮緊。加麻黃。細辛。

若妊娠傷寒。中風表裏自汗。頭痛。項強。身熱惡寒。脉浮而弱。加黃耆。地骨皮。

若妊娠傷寒。中風濕之氣。肢節煩疼。脉浮而熱。頭痛。加防風。蒼朮。製。

若妊娠傷寒。胃脇滿痛。而脉弦。加柴胡。黃芩。

若妊娠傷寒。大便硬。小便赤。氣滿而脉沈

數。加大黃。生桃仁。去皮尖。

若妊娠傷寒。小便不利。加茯苓。澤瀉。

若妊娠傷寒。小便赤如血狀者。加琥珀。茯苓。

若妊娠傷寒。四肢拘急。身涼微汗。腹中痛。

脉沈而遲。加附子。炮去桂。少

若妊娠傷寒。畜血證。加生地黄。酒浸。大黃。

若妊娠傷寒。身熱大渴。蒸又而熱。脉長而

大者。加石膏。知母。

若妊娠傷寒。下後過解而不愈。溫毒發斑

如錦紋。加升麻。連翹。

若妊娠傷寒下後。咳嗽不止者。加入參。五味子。

若妊娠傷寒下後。虛痞腹滿。加厚朴。姜枳實。炒

若妊娠傷寒下後。不得眠者。加梔子。黃芩。
若妊娠傷寒汗後。血漏不止。胎氣損者。加阿膠。炙甘草。黃耆。

若妊娠脉浮。頭腫自利。腹中疼痛。去地黃。加桂枝。炒

若妊娠傷寒自利。腹中痛。飲食不下。脉沉者。去地黄。川芎。加白朮。炙甘草。茯苓。加黃耆。

護胎法。治妊娠傷寒。

白藥子不拘多少。爲末。用雞子清調。攤於紙花上。可椀來大。貼在臍下。胎存處。乾則以溫水調之。

又方。以竈心土水調。塗臍下。乾又塗之。又調服彈子大。佳。

又方。壯熱甚。則以井底泥敷心下。令胎不傷。

白朮散。治妊娠傷寒。煩熱。頭痛。胎氣不安。或時吐逆。不下食。

白朮

橘紅

人參

前胡

川芎

麥門冬去心

赤茯苓

各一兩

半夏

湯洗炒

甘草

各半兩

右每服四錢。姜四片。竹茹二錢半。水煎服。

升麻散。治妊娠傷寒。頭痛。身體壯熱。

升麻

蒼朮炒

麥門冬去心

麻黃去節

石膏各一兩

黃芩

知母

各五錢

右每服四錢。姜四片。淡竹葉十四片。水煎服。

柴胡散治妊娠傷寒。頭痛。項強。身熱。口乾。胃腸疼。

柴胡

前胡

川芎

當歸

人參

芍藥

甘草

生地黃

各等分

右為細末。每服四錢。姜三片。棗三枚。葱白三根。水煎出汗。

秦芫散治妊娠傷寒。五六日不得汗。口乾多

喫水。狂語。嘔逆。

秦艽

柴胡

各一兩

石膏

二兩

前胡

赤茯苓

甘節

葛根

犀角屑

升麻

黃芩

各半兩

右每服四錢。姜四片。竹茹三錢。水煎。防風葛根湯。治妊娠中風。腰背強直。時復反張。

防風

葛根

川芎

生地黃

各二兩

杏仁

製一兩半

麻黃

去節一兩半

桂心炒

獨活

甘草

防己

各一兩

右咬咀。每服四錢。水煎。

治妊娠中風。角弓反張。口噤語澁。謂之風痙。亦名子癇。

麻黃

去節

防風

獨活

各一兩

桂心

炒

升麻

甘草

羚羊角犀

酸棗仁

秦芎

各半兩

川芎

當歸

杏仁

製各七錢

右咬咀。每服四錢。姜四片。竹瀝一合。水煎。

服。

治妊娠臨月。因發風瘕。忽悶憤不識人。吐逆。眩倒。名子癰。

葛根

貝母

去心

牡丹皮

防已

防風

當歸

川芎

甘草

澤瀉

白茯苓

桂心

炒各二兩

獨活

石膏

人參

各三兩

右咬咀。以水九升。煮取三升。分二服。貝母令人易產。若未臨月。以升麻代之。

柴胡散。治妊娠瘡疾。

柴胡

生大黃

各二錢

黃芩

一錢

甘草

一錢

右咬咀。作一服。水煎。臨發日五更溫服。必取利爲愈。如胎上逼心。可服枳殼散。忌油麵。辛熱等物。

又方。大黃

二兩

柴胡

一兩

黃芩

芍藥

各一兩

右爲細末。清水糊爲丸。如桐子大。每服百丸。臨發日五更冷湯吞下。隔兩時再服。五

十九以利爲度。

治妊娠癰疾發熱口乾渴飲無度者。

生地黃

半兩

黃芩

麥門冬

去心

人參

知母

各一兩

石膏

二兩

甘草

半兩

乾葛

一兩

右咬咀。每服五錢。入烏梅半箇。煎服。
治妊娠癰疾得効方。

常山

石膏

各一兩

甘草

炙

黃芩

各半兩

烏梅

七箇

右細切。以酒水各一椀。浸一宿。平旦煎至

一椀。去滓。分二服。臨發日。

驗胎方。治婦人經脉不行已經三月者。

川芎不見

右為細末。空心濃煎艾湯調下。方寸匕。覺腹內微動。則有胎也。

急救仙方卷之一

急救仙方卷之二

產難諸疾品

枳殼散。治婦人臨月。服即合。胎瘦易產。

枳殼

四兩。各月麩炒。

甘草

二兩。生。

右為細末。每服一二錢。白湯調服。

治孕婦日月未足。疼痛而欲產者。

菖蒲根搗汁。灌喉中。

又方。蒲黃。如棗許大。井花水調下。

又方。知母三兩為末。蜜丸桐子大。每服二十丸。米飲下。

如聖散治產難。

紫蘇葉

當歸

各等分

右每服三五錢。長流水煎服。如無流水。以水順攪動煎服。

又方。以黃葵子百粒。研爛。酒湯任服。立產。

例二

又方。以好墨一寸末之。水調服。立產。

又方。取夫裊帶五寸。燒末。存性。酒調服。

又方。草麻子二枚。令婦兩手各把一枚。即下。

又方。取槐樹東枝。令孕婦把之。易產。

又方。取阜角子二枚。吞之。立產。

又方。取槐子七粒。新汲水吞之。即產。

又方。取皂角少許。末。吹鼻中。令嚏。子便生。

又方。紫蘇煎湯。調益元散。服。即產。

治婦人臨產累日。氣盡不能生。兼惡露出盡。胞乾終不產者。

右用赤小豆一斗。水九升。煮令熟。去豆滓。將阿膠三兩入豆汁中溶化。每服止半盞。未產再服。即出。

治婦人生產五七日不下。及矮石女子交骨不開者。

右取自死龜殼或占卜瘡殼。酥炙或醋浸炙。及用生男女多者。婦人頭髮一握。燒存性。以當歸。川芎同煎。服屢效。約人行五里。生死胎俱下。

烏蛇散。治婦人逆產。

烏蛇蛻

條一

蟬蛻

合十四

血餘

一箇。中胎髮

右三味燒為灰。分作二服。溫酒調下。併進二服。仰臥。霎時兒即順生。

又方。用小絹針於小兒脚心。刺三五下。急用鹽少許塗刺處。即順生。用穀尖刺尤好。

又方。以鹽塗兒足底。又可爪甲搔之。并以鹽
摩母腹上。

又方。以手中指取鍋底墨。交畫兒足下。即順
生。

又方。取其父名書兒足下。即順生。

治婦人橫生不可出。

右車前子為末。酒服二錢七。

又方。兔絲子為末。酒調服一錢七。米飲調亦
可。

治婦人橫逆生得效方

百草霜

香白芷

各等分。不見火。

右用童子小便與好醋各一合。調成膏。沸湯浸服。甚者二服即生。

治婦人逆橫難產。子死腹中。

先用黑豆一合。炒熟。水與童便合煎服。神

效。

例二

三

又方。艾葉半斤。酒四升。煮取一升服之。

又方。當歸為末。酒服。方寸匕。紫蘇湯。調服亦可。

奪命散。治婦人產死。腹中胎不下。

桂

二錢

麝香當門子

一粒

右件用爲末。研酒服。須臾即下。

又方。用鹿角屑三。三方寸七。煎葱豉湯和服之。立出。

又方。用朱砂一兩。水煮數沸。末之。酒調服。效。

又方。榆白皮煮汁。服二升。即出。

又方。取竈心土爲末。以水調三錢。七服之。其土。見當戴出。

又方。用瞿麥二兩。剉水八盞。煮三盞。服一盞。未出。再服。

又方。朴硝二錢。溫童子小便調服。亦治胞衣不出。立效。

又方。用草麻子一百粒。去殼。雄黃末二錢。一處研成膏。攤紙上。貼母右腳心。先置冷水一椀。才下急洗去。亦治胞衣不下。

治婦人產難已死。子不出者。

用水銀。如彈子大。斡開口灌之。扶令坐少頃。又扶令倚立。子即出。

祕方。治婦人胎衣不下。

取本婦視覆井口。立下。

又方。米。麥。赤小豆。三味同煮。濃汁。服之。即效。
又方。阜角刺。不以多少。燒灰存性。為末。每服
一大錢。溫酒下。

又方。取竈下土一寸。研碎。用好醋調。納於臍
中。取甘草湯服之。

又方。牛膝半斤。以水九升煎。取三升。分三服。

治婦人墮胎。胞衣不下。腹中疼痛。牽引腰脊。
用好墨細研。每服二錢七。溫酒下。無時。

治婦人落胎下血不止方

又。生地黃汁。調代赭末一錢。日三服。

取桑木中蠋蟲燒末存性。酒服方寸七日三服。

治婦人落胎身下有血方

丹參十二兩。以酒五升煎取三升。分三服。治婦人小產下血。子死增寒。唇口爪甲皆青。面色白黃黑。或胎上搶心。則悶絕欲死。冷汗自出。或食毒物傷動胎氣。下血不止。胎尚未損。服之可安。已死者服之可下。

牡丹皮

白茯苓

桂心

桃仁

去皮尖。麩炒。

赤芍藥

右各等分。爲細末。鍊蜜丸。如彈子大。每服
一丸。細嚼。淡醋湯下。連進兩丸。若胎腐爛。
腹中危甚者。立可取出。

治婦人推腸生。又名盤腸產。蓋臨產則子腸
先出。既產其腸不收。

右以半夏爲末。劑二搗鼻中。又以草麻子研膏。
貼頂心。腸上。即拭去。

產後諸疾品

治婦人產後血暈。不知人。狂語顛倒。健忘失
志。

紫礦

一兩

右細研。溫酒調。二錢七服。

又方。用蘇合香丸童子小便煎一二沸。調下。治產後血暈。昏迷。心氣絕。

夏枯草絞汁。服一盞。妙。

又方。五靈脂二兩。半生半炒。爲細末。每服一錢。溫酒調下。口禁者。斡開灌之。加荊芥等分。爲末。溫童便調下。更妙。

又方。紅花一兩。分爲兩服。酒童便各一盞。煎取一盞服。

又方。半夏一兩。為末。冷水和丸。如豆大。納鼻中。即愈。

又方。醋磨京墨。服之。良。

治產後血暈。連心頭硬。悶亂氣絕。手脚煩熱。及寒熱不禁。

延胡索炒為末。酒服一錢匕。亦治穢汗不盡。胃腹脹滿。

又方。續斷皮二兩。剉。以水三升煎。取一升。分作三服。溫服。如人行二三里。再服。無忌。雖垂死者亦愈。

又方。生地黄

汁一盞

當歸。

赤芍藥

各二錢半

右水煎三五沸。溫服。如覺煩熱。去當歸。入童便半盞服之。

治產後敗血。衝心發熱。狂言奔走。脉虛大者。

乾荷葉

生地黄

牡丹皮

右等分。煎湯。

劑二

調蒲黃二錢七。

六

一服即定。

治產後惡血衝心。胞衣不下。腹中血塊。

錦紋。大黃一兩。研為細末。用醱醋半升熬成膏丸。如桐子大。用醋七分盞。化五丸至七丸服之。須臾即下。

治產後血上心已死。或胎不下。

鬱金燒存性爲末。每服二錢。醞醋一合。調灌之。立活。

治產後敗血衝心。胃滿上喘。命在須臾。

真血碣

如無紫
礪代

沒藥

右等分。輕手研細。每服二錢。用童便合酒半大盞。煎一沸。溫調下。才產下服之。上牀良久。再服。

治產後氣喘。爲孤陽絕陰不治者。

人參

蘇木

各一兩

右每服五錢水二盞煎七分頻頻呷之。

又方用胡桃肉不去皮同人參等分每服五錢水一盞半煎七分頻頻呷之屢效。

倉公散治產後鬱冒血厥閉目昏默先以倉公散取嚏後服白薇湯。

甜瓜蒂

樹二

藜蘆

雄黃^七

明凡

分煨等

右爲細末吹入鼻中。

白薇湯

白薇

當歸

各一兩

人參

半兩

甘草二錢

半

每服四錢。水煎。溫服。

孤鳳散。治產後閉目不語。

白礬一錢

右爲細末。熱水調下。

治產後血不下。

夏枯草絞汁。每服一小盞。入酒一合。溫攪

勻服。

又方。蒲黃三兩。水三升。煎取一升。頓服。

治婦人產後敗血未盡。心腹脹滿。

生姜

切五兩

右以水五升。煮三升。分三服。立效。

治產後血癖痛。

大黃

一兩

當歸

半兩

官桂

二錢

右以酒三升。煮十沸。頓服。

治產後惡物不盡。腹內疼痛。

生乾地黃

一兩。微炒。

當歸

一兩。微炒。

生姜

半兩。瓦上炒焦黑。

右以爲細末。每服二錢。姜酒調服。神效。

治產後心腹痛欲死。

五靈脂

蒲黃

各等分

右爲末。先用醪醋調二錢。熬膏。入水半盞。童便半盞。煎七分。食前熱服。神效。

治產後腹中絞痛不可忍。

延胡索

當歸

芍藥

側二

入

川芎

乾姜

各等分

右爲細末。每服三錢。溫酒調下。

治產後惡露不盡。腰腹痛。見枕痛。並皆治之。

延胡索

桂心

當歸

各等分

右爲細末。每服三錢。熱酒調服。

治產後內虛。寒氣入腹。腹中絞痛。及兩脇當
臍急痛。名曰寒疝。

肥羊肉斤一

當歸

甘草

芍藥炒

人參各一兩

右咬咀。以水一斗。先煮。取七升。入藥更煮。
再二升。去滓。分二服。

治產後血瘀痛。臍下脹。不下食。

當歸二兩

桂心

芍藥各半兩

蒲黃各一兩半

血竭

延胡索各一兩

脇肋脹。去血竭。加檳榔。柴胡。青木香。

右爲細末。每服二錢。溫酒調下。

治產後血入於肺。面黑發喘。欲死者。

人參

一兩。另
爲末。

蘇合香

二兩

右以水二椀。煮蘇合香至一椀。去滓。調參末。隨多少。如神效。

治產後惡露不下三四日。嘔逆壯熱。

芍藥

二兩
半

知母

生姜

當歸

蒲黃

各二兩

紅花

五錢

生地黄

汁一
盞

荷葉中心蒂

七箇

右以水二升。煎至一升。去滓。下蒲黃煎四

沸空心。分作三服。

治產後嘔吐不止。

陳皮

兩一

半夏曲

甘草

各半兩

藿香

兩二

右為細末。每服三錢。姜三片。煎熱服。

趁痛散。治產後氣弱血滯。身熱頭疼。及遍身疼痛。

牛膝

當歸

桂心

白朮

黃耆

獨活

生姜

各半兩

甘草

炙

薤白

各二錢半

右咬咀。每服半兩。水三盞。煎至盞半。去滓。
食前熱服。

治產後頭痛。

川芎

當歸

荆芥穗各等分

右咬咀。每服五錢。水煎熱服。

治產後下血不止。

炙桑白皮。煮水飲之。良。

又方。菖蒲二兩。以酒二升煮。分作兩服。止。
治產後下血。虛羸殆死。

蒲黃二兩。水二升煮。取八合。頓服。

治產後子宮不收。

荆芥穗

藿香葉

樛椿樹皮各

分

右煎湯熏之。子宮即入。

又方。五倍子白凡為末。溫湯泡洗。

又方。葶麻子搗餅二塗頂心。吸入即洗去藥。十

治產後生腸不收。

枳殼煎湯。溫浸良久。即入。

治產後陰下脫。

蛇床子絹袋盛。蒸熨之。亦治陰戶痛。

又方。順火草一斤。陰乾。水五升。煮。取汁。分溫服。

又方。以鐵爐中。紫塵。羊脂。二味攪。令稠。布裹炙熱。慰推納之。差。

治產後陰道開不閉。

以石灰一斗。炒黃。水三斗。投灰中。放冷。澄清。取一斗二升。煖洗。又治陰腸脫出。

治產後中風寒。遍身冷直。口噤。不識人。

白朮

三兩

川芎

當歸

生姜

各一兩

右以酒三升煎。取一升。頓服。

治產後中風語澁。四肢拘急。

羌活

三兩

當歸

一兩

官桂

半兩

杏仁

半兩。去皮尖。炒。

右爲末。每服五錢。酒水各半。盞煎。去滓。溫

服。

治產後中風煩渴。

紅花五合。微炒。水一升煎。取七合。徐徐呷之。

治產後中風。不省人事。口吐涎沫。手足瘳癱。

當歸

荆芥穗各等分

右爲細末。每服三錢。水一盞。入酒煎七分。灌之。口噤者。斡開灌。

小續命湯。治產後中風。腰強直。時時反張。或半身不遂。口眼喎斜。手足戰掉。語言蹇澁。

防已

肉桂去皮

黃芩

芍藥

杏仁去皮

甘草

川芎

麻黃去節

人參各一兩

防風一兩

附子去皮臍

右咬咀。每服五錢。水一盞。姜五片。棗一枚。

煎七分。熱服。若藏寒下利者。去防已。黃芩。
加白朮。附子一倍。若自汗者。去麻黃。杏仁。
加白朮。黃耆。若失音者。加杏仁一倍。
治產後中風。手足不遂。語言蹇澁。恍惚多忘。
精神不定。

獨活

當歸

芍藥

防風

川芎

玄參

天麻各五錢

桂心三錢

若作丸。已上皆加分兩。

右咀咀。以水八升煮。取二升半。分爲三服。

亦可蜜丸服。若有氣證。加生姜一兩半。若有熱。加葛根五兩。冷。加白朮五兩。若手足不穩。加牛膝一兩二錢。草薢三兩。黃耆四兩。

治產後血渴不止。

一方。用黃芩劑二。麥門冬。去心。等分。十二煎服。

延胡索

蔚金

乾葛

桂心

青皮

枳殼

麩炒。各等分。

右並以好醋浸一宿。焙乾為細末。每服二錢。冷橘皮湯調下。

又方。生地黃汁和蜜微鍊過。熱水溫調服即止。

竹葉湯。治產後虛渴少氣。

竹葉

三升

甘草

人參

茯苓

各一兩

小麥

五合

生姜

半夏

各三兩

麥門冬

去心五兩

大棗

十五枚

右㕮咀。以水九升先煮竹葉。小麥。生姜。棗。

取七升。去滓。納藥再煎。取三升。去滓。一服。

五合。日三服。夜一服。

益元散。治產後虛渴。煎人參。五味子。麥門冬。

去心湯調服良。

治產後小便數及遺尿。

桑螵蛸

半兩

龍骨

一兩

右為細末。米飲調下二錢。空心服。

又方。以雞矢燒灰。空心酒服方寸匕。

治產後大小便不通或下血。

制二

十三

車前子

黃芩

蒲黃

牡蠣

生地黄

芍藥

各一兩

右為細末。空心米飲服。方寸匕。忌麵蒜。

治產後虛煩不得眠。

芍藥

當歸

梔子

各五錢

香豉

半合

右㕮咀。每服一兩。水煎服。

治產後往來寒熱。

柴胡

二兩

黃芩

七錢

人參

五錢

半夏

一兩半
湯洗

甘草

七錢半

大棗

三枚

生地黃

梔子

枳殼

剉炒。各五錢

右㕮咀。每服一兩。姜五片煎。熱服。

柴胡散。治產後虛羸。發寒熱。飲食少。腹脹增

損。

柴胡

人參

甘草

半夏

湯洗

陳皮

川芎

白芍藥

各等分

右咬咀。每服五錢。姜五片。棗二枚。水煎。食後服。咳嗽加桑白皮。地骨皮。

治產後血不止。

以雞子三枚。醋半升。好酒二升煎。取一升。分四服。如行二三里。微溫進之。

治產後瀉白不止。

艾葉

半兩炙熱

老生姜

兩

右水煎服之即止。

治產後諸痢神效方。

蒼耳葉搗絞汁入蜜。溫服半盞。日三。

黃芩丸。治產後赤白痢。腹中絞痛不可忍。

阿膠

蒲黃

十四
梔子仁

各兩

黃連

四兩
二

當歸

一兩
半

十四
黃栢

三兩

黃芩

芍藥

各二兩

右為細末。鍊蜜為丸。桐子大。每服六十九。

米飲下。日三夜一。

又方。芍藥

阿膠

艾葉

熟地黄

甘草

當歸各四兩

右咬咀。每服一兩。水煎服。危急者。已上分兩。只作一服。水三升。煮取一升。分二服。空心。名救急散。

又方。芍藥

三錢

黃芩

二錢半

當歸

二錢

甘草

一錢半

右咬咀。水一升。煎七分。溫服。食前。裏急後重。加枳殼。檳榔。治產後虛汗不止。

當歸

黃耆

麻黃根

牡蠣煨為粉

人參

粉草各等分

右咬咀。每服五錢水一盞煎溫服。

又方。牡蠣煨

小麥麩炒黃

右等分。為細末。煮生豬汁調下二錢。無時候。

治產後吃意。劉二

十五

丁香

白豆蔻各半

伏龍肝一兩

右為細末。煎桃仁。吳茱萸湯。調下一錢。如人行五里再服。

治產後咳逆。三日不止。欲死者。

桂心兩半

生姜三合

右同煎。取二合。以火先炙背。摩令熱。塗藥盡妙。

治產後經脉不調。四肢煩疼。飲食全少。日漸羸瘦。

琥珀

牛膝

生地黄

當歸各一兩

桃仁

赤芍藥各半兩

右粗末。每服三五錢。水一盞。姜三片。煎去滓。溫服。

治產後心膈迷悶。腹藏撮痛。氣急。月信不通。

烏藥

二兩

當歸

莪朮

各一兩

右爲細末。每服二錢。溫酒調下。服後以食壓之。大忌生冷油膩等物。

急救仙方卷之二

急救仙方卷之三

側三

婦女雜病品

四物湯

熟地黄

川芎

芍藥

當歸

各等分

右為粗末。水煎服。

若女蒸勞熱。加地骨皮。牡丹皮。知母。柴胡。

黃芩。

若妊娠胎動不安。下血不止者。加艾十葉。

阿膠。黃耆。葱。

若血藏虛冷崩中去血過多亦加膠艾。

若血崩者加生地黃蒲黃黃芩一加阿大

艾黃芩。

若血虛而腹痛微汗而惡風加莪木官桂。

若風虛眩暈加秦芫羌活。

若氣虛弱起則無力^{則五}。眩然而倒^一加厚朴陳

皮。

若發熱而煩不得睡卧加黃連梔子。

若虛寒脉微自汗氣難布息清便自調加

乾姜附子_炮。

若中濕身沈重無力。身涼微汗。加白朮。茯苓。

若筋骨枝節痛及頭痛增寒。加羌活。防風。藁本。細辛。

若臍下虛冷。腹痛及腰脊間悶痛。加玄胡。

索苦練。

各炒

若經水過多。別無餘證。加黃芩。白朮。

若經水澁少。加葵花。紅花。

若虛勞氣弱。咳嗽喘滿。加姜製厚朴。麩炒
枳實。

若經水暴下。加黃芩。

若血積塊痛。加莪朮。三稜。桂。乾漆炒。

若赤白帶下。加香附子。桂炒。

若血痢。加膠艾。黃連。

若產後血痢。腹痛。加槐花。黃連。御米殼。

若血熱相搏。例三舌乾口渴。加桔葉。二麥門冬。

若大渴引飲。加石膏。知母。

若藏府祕澁。加大黃。桃仁。

若嘔吐者。加白朮。人參。藿香。生姜。

若虛寒滑泄者。加官桂。附子。炮

若虛煩不得睡。加竹葉。人參。酸棗仁。
若目赤暴發。作雲翳。疼痛不可忍。加防風。
羌活。防已。酒浸。草龍膽。酒浸。

芎歸湯

川芎

當歸 各等分

右以咀水煎。熱服。

若產後眩暈。加芍藥。甘菊花。

若產後腹痛。加官桂。酒。童便合煎。

若妊娠子死。或不死。胎動。加紫蘇。酒水合煎。死者。即下。未死者。即安。

若臨月服之。則縮胎易產。

若倒橫難生。或子死腹中。加黑豆一合。先炒熟。水童便合煎。

若腸風藏毒。加槐花末半錢。三日取下血塊即愈。

若吐血。加生地黄三。黃芩。枳殼三。

若血氣上喘。下脹腫。加艾煎湯。空心調散服。

若產後血悶。心迷。喘急。腹痛。加炒黑豆一合。入姜汁同煎服。

若崩中漏下。失血不止。加香附子炒。每兩入甘草一錢。湯點服。

若白帶。加芍藥半兩。乾姜二錢半。同為末。米飲調下。

若赤白帶下。加香附子。棕櫚燒灰。同為末。米飲調下。

苦練丸。治赤白帶。

苦練

碎酒炒

茴香

炒

當歸

各五錢

右為細末。酒糊為丸。每服五十九丸。空心。溫酒送下。

又方。雲母爲粉。溫水和服三方寸匕。立見神效。

又方。夏枯草。花開時採。搗爲末。每服二錢。食前溫飲調下。能飲者酒服。

又方。用酸漿草陰乾爲末。空心酒下三錢匕。治月候湛濁。赤白帶下。多年不差者。

石燕一枚。於堅硬甕器內。以溫水磨服之。丁香膠艾湯。治白帶。白崩之物雖多。間有如屋漏水下。時有鮮血。

當歸身一錢 熟地黄 白芍藥

川芎各半錢

阿膠六分炒珠

丁香四分

生艾葉一錢

右當歸酒洗剉艾亦剉川芎丁香地黃爲細末都作一服水五盞先煎作一盞半去滓入阿膠再煎至一盞帶熱空心服之。三兩服愈。

例三

補經固真丸治心胞尺脉極微白帶流而不止。

甘草炙

柴胡各一錢

黃芩一錢令剉

乾姜末三錢

橘皮半錢

人參二錢

白葵花十六箇
去萼剪

尖。另研
如泥

郁李仁一隻
去皮

右件除苓外。以水三盞。煎至盞七分。再入黃苓同煎至一盞。去滓。空心熱服。少時以早膳壓之。

萬金散。治婦人血崩不止。

香附子

四兩
炒

當歸尾

一兩
二錢

五靈脂

一兩
炒

右為細末。每服五錢。醋調空心服。立愈。

當歸散。治血崩。

當歸

一兩

龍骨

一兩

香附子

三錢
炒

棕毛灰半兩

右為細末。空心。米飲調下四錢。忌油膩等物。

蓮殼散。治血崩。

乾蓮蓬燒存性 棕皮及毛燒灰。各半兩

香附子三錢。炒

右為細末。每服四錢。空心。米飲調下。

小薊湯。治崩漏不止。

小薊莖葉研汁。一盞

生地黄汁一盞

白朮半兩。剉

右三件。入水一盞。煎至一半。去滓。溫服。
槐花散。治血崩。

陳槐花

兩一

百草霜

兩半

右爲末。每服三四錢。溫酒調下。若昏憤不
省人事。則燒紅秤錘。淬酒下。

芎藭酒。治崩中晝夜不止。

芎藭

兩一

生地黄

汁一盞

右先用酒五盞煮。芎藭一盞。去滓。下地黄
汁。再煎三二沸。分爲三服。

槐灰散。治崩中。或下赤白。不問年月遠近。並

皆治之。

槐枝

不以多
少燒反

右以溫酒調下。方寸匕。食前。

鰾蛸散。治漏下。臍腹痛久不止者。

烏賊魚骨

燒存
性

右研爲細末。每服二錢。煎木賊湯下。

紅花散。治婦人產後血昏。血崩。月事不調。遠年乾血氣。

乾荷葉

牡丹皮

當歸

紅花

蒲黃

炒各
等分

右爲細末。每服半兩。酒煎。和滓溫服。如胞衣不下。調榆白皮末半兩。服之立下。

萬病丸。治女人月經瘀閉。月候不來。繞臍痛。

乾漆

杵碎炒令一時久。大煙出。煙頭青白爲度。

牛膝

酒浸一宿。焙各一兩。

樹三

右爲末。以生地黃汁一升。入二味藥末。瓦石器內。慢火熬可丸。即丸如桐子大。每服二丸。空心米飲調下。

牛膝散。治婦人月水不利。臍腹疔痛。

牛膝

一兩

桂心

赤芍藥

桃仁

玄胡索

當歸

牡丹皮

川芎

木香

各七錢

右爲細末。每服方寸匕。溫酒調下。食前。催經散。治婦人經脉不行。

凌霄花

不以多少。搗羅爲末。

右每服二錢。溫酒調下。食前服。

衛生湯。治婦人女子虛弱。月事不來。

白芍藥

當歸

各二兩

黃耆

三兩

甘草

人參

各一兩

右爲粗末。每服五錢。水煎。空心服。

二神丸。治室女血氣相搏。腹中刺痛。經候不調。

橘紅二兩

玄胡索

去皮。醋煮。

當歸

剉。酒浸。炒。各一兩。

右爲末。酒煮米糊丸。如桐子大。每服一百丸。艾醋湯下。

蓮蓬散。療經血不止。

例三

七

蓮蓬

燒灰存性

右爲細末。每服二錢。熱酒調下。

徹清膏。治婦人頭痛。

川芎

三錢

蔓荊子

細辛

薄荷

葉本各一錢

生甘草半錢

甘草半錢

當歸半錢

右為細末。食後茶清調下。二錢。

石膏散治頭痛不可忍。

石膏

麻黃去根節。各一兩 乾葛七錢半

何首烏半兩。忌鐵

右為細末。每服三錢。生薑三片。水煎熱服。

川芎散治婦人偏頭疼。

川芎

甘菊花 石膏各三錢

白殭蠶六錢。生用

右爲極細末。每服三錢。茶清調下。
清寧散。治婦人偏頭痛連睛痛者。

石膏

黍粘子炒

川芎各等分

菊花

細辛煨

右爲末。茶清調下。食前。

湧泉散。治婦人妳汁因氣絕少。

瞿麥穗

麥門冬去心

龍骨

川山甲炮

王不留行

右爲細末。每服一錢。熱酒調下。後喫猪蹄羹少許。又用木梳左右乳上。梳三二十下。

日三服。

苧萋散治乳汁少。

苧萋根

薄荷幹等分爲末。酒調服。

右先喫羊骨汁一椀。次服藥。後再喫葱絲羊羹少時。微汗出效。

制三

八

下乳散

粳米

糯米各半

生甘草兩

藜蘆子一合。並淘淨。

右煎汁一升。研藥令極細。去滓。分作三服。立下。

乳香散治吹妳。

乳香一錢

括萋根末一兩

右研勻。每服二錢。溫酒調下。

又用天南星末。溫湯調塗之。

橘皮散治乳癰初發神效。

橘皮

湯浸去白。晒乾。麩炒微黃。

右為末。每服二錢。麝香研。酒調服。

芫萋散治乳癰妳勞屢效。

芫萋

一箇。去皮。焙為末。

生甘草一錢

乳香一錢

另研

沒藥

二錢。末。另研

當歸

酒浸焙。各半兩。

右用無灰酒三升。銀石器內慢火熬。取一
升。清汁。分三服。
連喬散。治妬乳。

連喬

升麻

砒硝

各一兩

玄參

芍藥

白欬

防已

射干

大黃

二錢

甘草

六錢

杏仁

四十箇
去皮尖

右以咀水五升。煮二升。後下大黃。數沸却
下硝。分三服。

陰蝕齋方

當歸

芍藥

甘草

地榆

芎藭

各三兩

右細切。以水五升煮。取二升。去滓。熏洗。日三夜一。

又方。蒲黃一升

水銀

一兩。二味。均。以。粉。上。研。

又方。蝦蟇

兔屎

等分。為末。麝香。上。良。

治婦人夢與鬼交。妄有所見聞。言語錯亂。

伏神一兩半

茯苓

人參

石菖蒲各一兩

赤小豆

半兩

右咬咀。每服四錢水一盞煎。食前溫服。

辟邪丹。治婦人與鬼魅交通。

虎頭骨

二兩

朱砂

雄黃

雌黃

鬼臼

皂莢

鬼箭

黎蘆

蕪夷仁

各一兩

右件生為末。鍊蜜丸如彈子大。囊盛一九。男左女右繫臂上。及用一九當病人戶前燒之。一切邪鬼不敢近。

菖蒲散。治婦人月水澁滯。陰間腫痛。

菖蒲

當歸

各一兩炒

秦艽

七錢干

吳茱萸

半兩製

右爲粗末。每服三錢。水一盞。葱白五寸煎。空心溫服。

又方。艾葉

五兩

防風

三兩

大戟

二兩

右剉細。以水一斗煮取五升。熱洗日三。切宜避風冷。

治婦人陰腫或瘡爛者。

+

麻黃

黃連

蛇床

各二兩

艾葉

一兩半

烏梅

十箇

右剉細。以水一斗煮取五升。去滓。熱洗。避風冷。

大黃散。治陰痒。

大黃

微炒

黃芩

黃耆

各一兩

赤芍藥

玄參

丹參

山茱萸

蛇床子

各半兩

右爲細末。食前溫酒調二錢服。

又方。杏仁燒灰。乘熱綿裹納陰中。日二易之。
又方。蒜煮湯洗之。一方用枸杞根煎湯洗之。
又方。取雞肝乘熱納陰中。如有蟲。當盡下。
治陰痒脫方

礬石爲末。空心酒服。方寸匕。日三。

治陰挺下脫方

當歸炒

黃芩各二兩

牡蠣二兩

蝟皮一兩

赤芍藥一兩

右為細末。每服二錢。食前煖酒調下。米飲亦可。

治陰中生瘡方調三

杏仁炒存性

雄黃

礬石各半

麝香一分

右為末。敷陰中。

內補丸。治婦女五勞七傷。子息斷緒。服一月。

當妊娠百病皆愈。

草解

兩四

牛膝

五加皮

白朮

兩各二

川烏炮

枳實

炒

丹參

兩各一

右為細末。鍊蜜丸如桐子大。溫酒下二十

丸。空心。日午晡後各進一服。有娠住服。

辨證詩括

紫色紅傷寒。青驚白色疳。黑時因中惡。黃色

困脾端。

觀兒顏色及男左女右手。二指節文如經。過三節上者難治。自下而上看。

全嬰紫圓。治小兒變蒸發熱不解。并挾傷寒。

温壯后熱不歇。腹中有痰癖。哺乳不進。乳則吐。噎食。癩先寒後熱。此方無所不治。雖下不虛人。

代赭石

赤石脂

各一兩

大杏仁

五十粒。去皮尖。

巴豆

三十粒。去殼。用厚紙連去油。

或加青蒙石

一錢重。另為末。入和

右石二味為末。別研。巴杏為膏。相和更搗一二千杵。當自相得。若硬。入鍊熟蜜少許。同杵收密器中。若生纔三十日。兒服。止如麻子大。一粒與少乳汁令下。食頃又與坐。

乳勿令多。至日中當小下。則熱除。若未全除。明日更與一粒。如百日兒圓如小豆一粒。以此準定加減。

蓋小兒初生。骨骼未成。筋骨未就。臟腑未充。精神未全。氣血虛浮。肌膚軟脆。資乳以

養。積漸增長。故有變蒸之候。十一三十二日爲

一變。變者。變其形容。容再變爲一蒸。蒸者。蒸長肌肉。十變而五小蒸。又四大蒸。積五百七十六日。大小蒸俱畢。乃得成人。故當變蒸之時。輕者體熱而微驚。耳冷。尻冷。上唇

頭有白泡起。如魚目珠子。微汗時出。其重者。體壯熱而脉亂。或汗或不汗。不欲乳食。食輒吐。喎目白微赤。黑睛微白。變蒸畢則目明矣。此乃氣血周流。肌膚充溢所致。謹無他治。但少與紫圓微下。其熱即退。若二次下後。身有熱而耳熱尻熱。乃爲他病。宜別治焉。

保嬰桃紅散。亦可用水煮麵糊爲丸。如龍眼大。臨用各依湯使磨化服。如用吞服。則丸如菘豆大。每服十五丸。

川烏

白附子

各五錢
生用

大南星

陳半夏

各二錢
生用

右剉碎。以新汲井花水拌濕。瓦器中浸之。
春五夏三。秋七。冬十。日晒夜露。一日一換。
新水日足。晒乾為末。以好大粒朱砂五錢。

重另研為細末。

和如桃紅色為度。

治急驚
風。薄奇。

澄心。金銀環同煎。
湯下。重則灸百會。
○ 嘔瀉。姜葱煎湯下。
○ 胎驚。醋一呷下。
○ 夜啼。及覺腹中
有蟲。用
○ 未飲。和酸醋一呷下。
○ 瘡。亦姜葱湯下。
○ 傷風。咳嗽。姜
煎湯下。
○ 蔥煎湯下。

保命丹。治小兒急慢驚風。痰涎壅盛。牙關緊急。角弓反張。睡中驚跳。哭泣叫喚。偏搐斜目。面青臉赤。兩眼直視。手足搐搦。天吊客忤。搖頭上竄。一切風痰並皆治之。

大箇無油南星二兩

朋砂淨六錢

白僵蠶二兩 姜汁浸炒

茯神去皮六錢

蟬退淨一兩 翅

白礬大兩 枯

天龍四條 酒煮

麝香一錢

全蝎去尾 毒淨 用二兩 糖末炒 黃為度 去米

遠志去骨 用淨肉 一兩 甘草一節 同煮過 去草

大粒朱砂

五錢。另研為衣。

猪牙皂角

二兩。打碎煎濃汁。

右先將南星煨以皂角汁淬十數次。餘皂汁留煮米糊。以前藥俱為末。丸如龍眼大。以朱砂為衣。陰乾。每用一丸。以薄荷燈草。金銀環子同煎。湯浸磨化。臨時於火上頓溫與服。

保童丹。治小兒急慢驚風。痰涎咳喘。喘滿。不進乳食。蟲疳積熱。膨脹等證。

陳枳殼

五對。大者去根。用已豆七粒。去殼入內。以線十字縛定。好醋反

覆者軟。去巴。切片。

三稜

莪朮

五錢

金箔

十箇

朱砂

二錢
另研

右為末。以前醋煮麵糊為丸。菘豆大。朱砂為衣。未及周歲。一九。周歲已上。三九。三歲已下。五九。已上。七九。用薄荷。燈心。金銀環同煎湯下。不能吞。磨化與服。

急救仙方卷之三

急救仙方卷之四

懶四

濟陰品

序論。醫經云。香附子。婦人仙藥。常用導血調氣。佐以烏藥。使陽不至強。陰不至弱。自女子而至婦人。由有生以來。雖曰稟賦衆陰所集。以血爲主。得病之因。其源皆未有不先因氣所觸作。然後血氣相搏。結成大病。蓋以血本屬陰。性柔軟。易於成病。感熱。即血溢。冒寒。即血凝。勞傷之過。血失常。經喜怒不常。血結氣聚。憂思不伸。血不歸

絡。又巢氏云。血得涼而生。醫治之間。輕重失審。冷熱有差。未免轉成他疾。而有傷生之危。可不慎哉。今此前後用方。性味溫平。乃出神仙之旨要。不涼不僭。順榮衛之疎通。胎前產後。無不備矣。若老若少。皆獲全生。切恐用方之士。疑此藥品之不精良。妄意淺近而輕忽之。却不知此方為女人養生去疾之寶。可不依而行之。諸方逐一。故具于後。

異香四神散。

又名四神湯

專調理婦人室女血氣

不調。及胎前產後諸疾皆主之。蓋女人以氣血為主。殊不知因氣先不調。然後血脈不順。即生諸證。此方大有奧理。

香附子

去毛炒。

烏藥

炒。四兩。

甘草

炙。一兩。

右咬咀。每服五錢重。水一盞。生薑三片。棗一箇。煎至七分。去滓。空心溫服。或用葱白三寸同煎。如治諸證。依後加減用之。立見功效。

婦人氣血不順。心胃。○驚。憂。悶。氣。喜。怒。傷。瘡。滿。加紫蘇葉同煎。○神。心。滿。腹。疼。而。目。

問不快。噎氣。食臭。心腹緊滿。○懷胎臨月。更加南木香。蘇合。用○產後諸疾。不。明。血。脈。名。日。子。懸。依。舊。用。○去。留。不。辨。虛。實。冷。熱。姜。片。紫。蘇。同。煎。○去。留。不。辨。虛。實。冷。熱。且。宜。此。藥。通。順。血。氣。不。○產。後。寒。氣。入。腹。致。差。誤。然。後。隨。證。調。理。○硬。聚。臍。下。刺。痛。名。日。寒。疝。如。○產。後。因。產。中。用。力。太。過。于。炒。吳。茱。萸。煎。○宮。脫。下。俗。名。類。病。先。用。此。願。氣。安。腸。兼。以。檗。樹。根。或。枝。梗。同。煎。白。以。花。椒。煎。湯。熏。洗。子。腸。自。定。及。平。居。女。人。志。

然。此。亦。

烏犀圓。調治血脉。治風補虛。及血海一切疾。

證。應血風血冷血滯血氣悉宜服之。

馬鳴肝

即晚蠶砂。五月收者良。揀淨。炒。至。理。起。用。半。斤。

大草烏

二兩重。入灰火內。通。裂。取。出。以。布。袋。子。包。之。

右二味為細末。酸醋煮作糊為丸。如梧桐

子大。每服三十九丸。常服以淡醋湯。溫酒隨

下。如別有證候。依後湯使。○丸血氣不順。

過期不來。或月內再。○丸血弱陰虛。經水

至。淡醋燒。溫酒吞下。○丸血弱。數月不得。痿

黃瘦。麻。腰腹疼痛。脈脈不巳。及脚膝掣急。

走以黑豆炒。浸酒吞下。久服血間自通。

○丸經脈。以土牛膝根。浸酒吞下。腰重。脈痛。數月

○丸婦人。年未五十。住。常。茶。清。或。酒。任

下。○丸。氣。運。上。血。上。冲。肺。喉。間。作。酒。任

下。○丸。感。路。風。冷。血。白。或。花。桑。葉。煎。湯。吞

酒。炒。沒。○丸。提。燒。紅。滓。酒。下。或。伏。龍。肝。荷。碎

赤白帶下。兼生黃水。名曰漏下。

蒲黃黑神散。調理室女婦人風虛勞冷。一切血氣之疾。及胎前產後血滯血暈。惡露不快。敗血爲疾。並皆服之。九生產之後。首先進烏金散。壓血暈。逐惡血。第二日即便常進此藥。逐敗血。安新血。自然百病不生。此方常用。百發百中。悉得効驗。若將調理女人諸疾。用鍊蜜爲劑。每一兩三錢重。分作十九。或用酒煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每服三五十九。隨證用湯使。各以其病立名。稱之名益陰丹。又名通真丸。又名勝金丹。又名金釵煎。又名保生。

九又名四順理中丸。

黑豆

一升炒熟去皮

香附子

末四兩

乾姜

炮

生乾地黄

各一兩

右為末。每服二錢。食前溫酒調下。或以酒煮麵糊為丸。如梧桐子大。每服三十九。溫

酒米湯任下。

○新產敗血不散。見花塊。臨產胎死腹中。或死胎不下。以黑豆一合。

醋煮。豆熟為度。調藥七分。盡服。暖其胎。即下。自臨產之時。胞衣不下。以產後惡露。沖心。童子小便同煎。酒調下。○不快。血暈。溫酒調下。若稍重。可用秤銚。酒服。○新產五。如梧桐子大。名四順理中丸。

酒或米○若補理血虛。血漿。血氣。土風等
飲下。○若病名。益陰丹。以溫酒米湯下。
○若女人血冷。面白。脫色。○若調理經候
青筋。進露。以酒服。良驗。○滋養少女。名
全釵煎。凡是一血弱。陰虛。經脈不勻。至依前酒
痛。及室女。血弱。陰虛。經脈不勻。至依前酒
飲。送○又一等少女。經脈不勻。至依前酒
下。○至一二年。又女經脈不勻。至依前酒
或有三五。至一二年。又女經脈不勻。至依前酒
或行脈。斷續。宜以此藥調氣。潤血。血旺。自
通。不必攻之。不爾。成血癥。積塊。變成血。刻
勞氣。傳為骨蒸。勞瘵。兼百。○一方沈香。勝。全
丹。滋血。湯佐之。若婦人。時。○治諸中風。口
行。雜病。用大。聖。通。真。丸。時。○治諸中風。口
手。足。痺。曳。並。以。羌。活。同。黑。豆。炒。酒。○又。婦
下。兼。以。小。續。命。湯。烏。荊。丸。之。類。○及。產。後
下。五。色。及。治。血。少。氣。寒。面。色。青。白。及。產。後
百。日。內。常。服。能。除。宿。血。生。養。新。血。兼。益。氣
補。虛。調。和。衝。任。不。生。諸
疾。皆。以。溫。酒。米。飲。下。

前蒲黃黑神散。其中萬品佐助。溫和。看不
上眼。而自有妙理。與大局方法不同。臨產
對證。且如妊娠一節。至精纔媾。一氣方凝。
經云。秘法潮養胞源。稍著寒濕。即致損墜。
故經云。舉寒爲痛。傷熱而驚。峻借湯劑。勿
可妄用。怒傷胎氣。及其生產之後。百節開
張。去血過多。津液燥少。陰陽俱虛。臟腑怯
弱。偶有疾傷。即成危殆。故經云。犯時微。若
秋毫。感病重於嵩嶽。故涼冷之劑。剛燥之
藥。尤戒輕用。轉生他病。若委有冒風感熱。

之疾亦是和解。隨證調理。縱有虛寒極冷之候。亦宜用性溫平和之藥救療。漸次加進大溫藥調治。切戒粗疎。若依此說。則產後胎前百無一失。不可取目前之急。亂投湯劑。反致其禍。罪福非輕。切須記之。

大當歸湯。治臨產腹雖赴痛。生理未順。破水已行。血道凝滯。經一二月。皆因驚動稍早。與催生藥急。以致如此。且須順調產母。多進此藥。自然安泰。

川當歸

地黃

川芎

白茯苓

甘草

赤芍藥

熟枳殼

各半兩

桂心

二錢半

右每服三錢。水一盞。煎七分。入滴乳香末一字。煎一沸。溫服。不拘時候。或兒身已下而胎衣未即來。且須斷帶以物繫之。進黑神散及奪命丹并此藥。如兒已下。六腹尚滿。仍服小黑神散。打醋炭調和胃氣。無令粥食缺少。如能飲者。少與酒。亦加不可過多。乳香湯亦可。

托珠丹。治催生。要認得是正產時腰腹墜痛。

不可勝任。方可進此。但要進得一兩丸。產理自然順快。無憂疑。然亦須不會輕進此藥。則功效可必矣。

車前子

四兩。淘洗。略炒。碾碎為末。

兔絲子

淘洗。酒蒸焙。碾為末。四兩。

右二味。擇逐月上七日。晴明良吉。用鴉酸。俗名婆婆酸草。搗自然汁少許。添醋酸炒。麵糊為丸。雞頭子大。用辰砂為衣。陰乾。每服半丸。或一丸。用老鴉酸葉搗自然汁。磨化。添入百沸醋湯調服。

乳香湯。通明滴乳不問多少。爲末。如覺腰腹
痛急。且先用此。每服一匕。或半盞。沸湯點服。
偶遲滯。則是坐草早致。令有不順。亦宜服之。
能酒人以酒調服。亦可取其通經絡。去滯。定
痛。止疼。於產母甚有益。然亦不可過多。恐傷
兒骨力也。附四

治難產第一方。金箔三片。兔毫筆頭三箇。燒
灰。

右爲末。用黃蠟爲丸。如梧桐子大。此料爲
一服丸。酒下。如又經日不生。用雲母粉半

兩。澄過研細。取一團。如雞子大。臨時以無灰酒下。此方已活三五千入矣。
神應散。療橫生逆生甚者。每服即分晚。

百草霜研

白芷等分

右爲末。每服二錢。童便好醋各一茶腳許。調。更以沸湯浸起服。

治死胎不出。朴硝二錢爲末。童便調下。又死胎不下。其證指甲青。舌青。脹悶甚者。口如屎臭。先以平胃散一貼。作二服。每服水酒各一盞。同煎至一盞。却投朴硝末。再煎三五

沸傾出。候微溫服。盡其胎即化爲血水而下。探胎湯。治驗婦人三箇月經不行。以此認之。是否妊娠。

川芎爲末

右用艾湯空心調服。覺微動則是胎。若臍下動及不動。此皆血癥也。可用行血藥治之。宜早。

萬方散

蒼木米泔浸

陳皮去白

青皮去白

軍姜剉

良姜剉

粉草剉

各半斤

砂仁

去膜炒

草果

剉炒。各六兩

益智

炒

丁香

不見火。各五兩

香附子

洗炒

杜烏藥

炒

紫蘇

炒

厚朴

去粗皮。姜製炒。已上各一斤

大腹皮

四兩。淨洗。剉姜汁炒。

桂枝

不見火

右每服水一盞半。生姜五片。同煎七分。去

滓。空心服。要溫。切忌生冷毒物。

腹疼。加小茴香一撮。四肢浮腫。加陳蘿蔔

子炒。入冷氣。加吳茱萸炒。入腰脚疼。加川

牛膝酒洗。不見火。木瓜剉。頭疼風證者。加

防風去蘆北。細辛去葉。或加川烏。湯炮。去

皮尖。生用焙。姜汁煎。四肢骨節痛。加小茴香炒。感風惡寒者。加葱白煎。潮熱。加葱白。熱退則止。心氣不通。喘急。加麥門冬。去心。每三粒。或加燈心三寸。作渴。加烏梅。每半箇。或加粉葛。咳嗽。加桑白皮。向東。取去粗皮。剉蜜炒乾。再入蜜炒。傷肺者。加北五味子。或桑葉一皮。向東。取。五心煩熱。小便赤。加車前草。茆根。蔗。或燈心。經脉來不已。加燒棕灰。存性。泄瀉。加炒糯米一撮。或肉豆蔻。催生。用苧根三莖。經脉敗。正膠艾湯。經

脉不勻。加北艾葉浸洗。炒乾用醋。

真料濟陰丹。治胎前產後百疾。

淨香附子八兩。二兩吹咀。好醋浸二兩。
無灰酒浸二兩。鹽湯浸二兩。用二三歲
童便浸一日。夕長流水洗。如無童便。用

姜汁艾煎汁浸亦可。已上共炒乾。以

烏藥 當歸 澤蘭 赤芍 百草霜

陳皮 川芎 五靈脂 熟蒼朮

兩半

右件共十一味。爲末。醋煮麩糊爲丸。每服
三十九。諸疾各湯使。無孕。加三稜。莪木。白

芷各一兩。桂半兩。四味爲末。醋糊丸服。產後加百草霜或添益母草。蜜浸炒乾爲末。入前藥內用。

急救仙方卷之四

急救仙方卷之五

慟五

濟陰品

四十一注
歌括月錄

調經

婦人經血有七七。七七通行病難識。非寒非熱及頭疼。次第調經不須失。

正胃湯

半夏

一兩

川芎

四錢

旋覆花

四錢

陳皮

三錢

丁香

一錢

白茯苓

半錢

右用姜煎。空心服。

平胃湯

人參

草果

白朮

宿砂

白茯苓

紅棗肉

煨過
焙乾

右爲末。空心。白湯調下。

漏胎腹痛

漏胎下血不須醫。乾熬孩兒悔莫追。方內有

湯名縮住。皆因妊母受災危。

劑上

丸。婦人三兩月或五七月時下血塊多。不治。曰漏胎。

縮住湯

宿砂仁一兩

益智仁

半兩

右為末。每服三錢。空心白湯下。
安胎飲

香附子

一兩。去毛炒。

右為末。白湯下。

手足疼痛

百節酸疼。時復痛。皆因勞役損精神。梅煎散子加漆味。溫酒時須活絡靈。

凡婦人四肢痛。皆因先前坐草時及經絡勞役受風入體。

梅煎散

當歸

北柴胡

黃耆

各半兩

鼈甲

天仙藤

甘草

各一兩

右爲末。熟酒調下。

活絡丸

川烏

草烏

各半兩

二 赤小豆

地龍

各一兩

大蒜

一首煨

右爲末。酒煮糊丸。熟酒下。

腰痛

水觸經時經不行。因而脚痛致腰疼。但用流經調血藥。治療違時別病生。

凡婦人脚疼。腰痛。皆因氣血凝滯。多因經行之際。水濕所觸。住而不行。流入脚經。故成疾。甚不轉側。日夜呻吟不止。或有發熱。流經散。

當歸

肉桂

川芎

威靈仙

黑牽牛

各三錢

烏豆

烏藥

地黃

各中錢

京芍藥

四錢

牡丹皮

二錢

右咬咀。半酒半水煎服。

頭疼

太陽頭疼血虛風漸漸疼加兩眼中先須補
取陽經候須用麩風最有功。
一字散

南星生

全蝎三

川芎

白芷

荆芥穗各二

三

右為末茶調下。
例五

頭暈

肝臟虛時眼暈花心中欲吐是痰邪早上起
來痰暈轉須知臟腑受寒邪。

凡婦人頭暈眼花不得起止心中欲吐是

肝虛受痰飲所致。宜補肝行風化痰。
婁金丹

茴香

香附子

各半錢

草烏

一箇

半夏曲

一兩

白茯苓

細辛

各半兩

右酒麵糊爲丸。每服二十九。食後酒下。仍
以三五七散補之。

腹常痛

經年積血在關元。日夜呻吟不得眠。青皮烏
藥。姜香附。莪朮。三稜。方得痊。

丸。婦人腹中常痛。上下不足。經年積血也。

立效散

青皮

陳皮

烏藥

乾姜

香附子

莪朮

三稜

右用醋煮。焙乾爲末。空心。陳皮湯下。

消痛丸

乾漆

三稜

各半兩

良姜

一兩

斑猫

三箇炒

右醋一升煮。乾焙爲末。醋糊丸。每服三十丸。醋湯下。姜湯亦可。

又方。三稜

莪朮

青皮

麥芽

半夏

各四兩

右醋六升煮乾。焙爲末。醋糊丸。每服二十丸。醋湯或姜湯下。

脇下刺痛

例五

兩旁脇痛。氣不通。或時冲下。氣連胃。烏沈香附玄胡索。七氣湯中加減功。

九婦人兩脇痛。小腹疼。至胷背。乃氣不順也。

加減七氣湯

人參

桂各三錢

甘草

玄胡索

香附子

沉香各二錢

烏藥

五錢

半夏四錢

右用姜煎。不拘時煎服。

小腸滿痛

血在三焦滿腹間。或時淋瀝小便難。萬靈散子通神用。熱酒調加三兩食。

凡婦人小腹痛。是血也。熱也。氣也。注於三焦之內。流於膀胱之中。小便淋也。或大小產後是遺經敗血所致。

萬靈散

桂兩半

當歸兩

莪朮兩半

木香錢三

地黃錢六

右為末。熱酒調下。又以小建中湯補之。小便淋瀝。八正散本事方。桃仁煎。

手足心熱

例五

五

經血行時受其濕。致令心中熱來侵。白朮柴胡滋血後。手足煩熱自然清。

凡婦人經行時。手足受水觸血風所致。手足心時時有煩熱。先服磁石湯加柴胡。

磁石湯

芍藥

地黃各二錢

白朮

甘草

地骨皮各三錢

北柴胡五錢

右㕮咀。水煎。空心服。

往來寒熱

陰陽相勝致傷寒。或是胎前雜病得。但服柴胡加減湯。一似燒湯去潑雪。

凡婦人寒熱往來。此陰陽相勝。陰勝則寒。陽勝則熱。所受如是受胎雜病。但服柴胡散。

柴胡散

北柴胡

黃芩

甘草各三錢

荊芥

桂各三錢

地骨皮一錢

右吹咀。水煎。仍服小柴胡湯三五貼。

虛熱

虛熱來時。日夜般。兩手脈來微細。看逍遙散。內加香附。竹葉煎時始得安。

凡婦人體熱。脈微。乃虛熱。此妄。血太過。

逍遙散

內加地骨皮

甘草各三錢

北柴胡錢五

黃芩

川芎各三錢

右咬咀。用水煎。空心服。

背心疼痛

心生血者。資脾養。或因怒。炁在於心。就使背
心相對痛。烏頭妙劑。最為靈。

則五

允婦人心能生血。脾能養血。或因怒氣冲
犯於心。致使氣血相搏。在於胸膈。故背心
相對痛。烏頭丸主之。

烏頭丸

川烏一箇

川椒一兩

桂一兩

赤石脂半兩

附子一箇

狼毒半兩

良薑半兩

右爲末。蜜丸。每服十九。空心。溫酒。米湯下。

腹內脹痛

腹脹因緣氣血虛。因而食積損於脾。硃砂丸子頻頻服。不得消時。蠱有餘。

凡婦人心生脹。或腹內脹。虛劣血氣。因食生冷傷於脾。或月候不行。血注於脾。致使然也。若不甦脾順氣。終成蠱疾。難治。

硃砂丸

硃砂三兩研

三稜

青皮

川椒

乾漆

各三錢

厚朴二錢

右為末。醋糊為丸。每服三十九丸。姜湯下。

四肢腫毒

四肢腫毒便如水。庸醫不識用藥餌。米飲調

下當歸丸附五自然經脉化為水。

丸婦人四肢腫痛。乃經血不行。流徧四肢。

或腫而痛。此因水濕所傷。觸經而然。

當歸丸

當歸兩半

桂三錢

苦苧二錢

人參錢一

大黃錢三

赤芍藥錢二

白茯苓

錢半

甘遂

錢半

右用蜜丸。彈子大。米飲化下。

皮肉如針刺

皮肉之中似針刺。或時自吐嘔頻頻。此是月經傷冷得。血痛元來自有因。

凡婦人肌肉如針刺。或時吐嘔者。因月經傷冷血痛。但補胃熱。方用止痛。先服加乾散。次服立效散。方見前
腹痛內

加乾散

沒藥

當歸

北芍藥 各三錢

桂 二錢

射香 一分

川烏 三錢

茴香 三錢

右爲末。酒調下。

月候不乾

月經太過不乾時。乃是氣虛之所爲。內補丸中加使用。鹿茸附子補三虛。歸茸丸

當歸 兩一

牡丹皮

鹿茸 各三錢

附子 一錢

地黃 三錢

人參 三錢

右為末。糊丸。阿膠湯下。

自痢下血

下痢之病有兩般。赤是熱證。白是寒。腹痛時時頻下痢。八寶湯中服立安。

凡婦人下痢赤白。腹痛皆因受寒熱之邪。積於臟腑。例五故有此證。當先去熱。然後調脾胃。

八寶湯

當歸

兩一

赤芍藥

大黃

兩半

木香

錢各三

枳殼

右水煎服。

調胃養中湯

人參

白朮

陳皮

荳蔻

各三錢

訶子

一箇

白茯苓

三錢

右為末。米飲調下。

喘嗽

皆因肺藏受風寒。咳嗽痰涎喘不安。但要安胎調胃氣。紫蘇湯點伏龍湯。

凡婦人肺臟感寒邪而成嗽。漸次傳脾。吐痰涎也。治療之遲。成血塊。血勞也。經喘不

通失音也。

伏龍湯

杏仁七

訶子五

陳皮

枳殼各三

阿膠七

麻黃二

青黛一

劑五

右為末。蘇湯調。食後再用調經散。見三方

產後血不乾

產後因何血不乾。皆因傷損子宮。寒日久漸加形體瘦。却成帶下不能安。

凡婦人產後血不乾。或一月之後其血黃

如灰汁者。日久成帶。

玉神散

毛頭紙

十張
燒灰

楮皮紙

一大張
燒灰

荊芥穗

握一

半夏

半錢

右用水酒同煎。若有咳嗽。金沸草散。姜棗煎服。

小便赤澁

臍中有撮小便攻。或在產前產後中。葵子丸中三五服。葱熨臍中立便通。

凡婦人小便赤澁。腹中有熱。如小便澁赤。

兩津液血出多。所以小便不尋常也。

葵子散

木通兩半

當歸三錢

葵子二錢

通草兩一

梔子三錢

右用水煎。產後蔥熨臍中。小便即通也。

大便閉結

肺臟虛熱大便結。此乃脾虛臟中竭。薄苛湯點三四服。自然通利熱須撤。

凡婦人大便結。肺臟受熱風血虛也。

三黃散

防風

兩半

枳殼

兩半

大黃

兩

右為末。薄苛湯下。

空腸丸

麻仁

厚朴

枳殼

大黃

杏仁

川烏

各等分

右為末。

例五

煉密丸。米飲下。

牙疼腫痛

牙疼腫痛是脾虛。兩脰腫時風熱俱。赴筵散子頻頻漱。續使補肝湯即除。

凡婦人牙疼。脰腫。脾虛血弱。氣不升降。受

暴風熱。但以祛風赴筵散灌漱。

赴筵散

細辛

萆薢

附子皮

川烏皮

右煎湯。噙漱口。滿吐之。

補肝湯

肉苳菹生

陳皮兩半

白朮兩半

荊芥三錢

旋覆花三錢

良薑

茯苓三錢

右為末。米湯調下。

腸風

大便之後血相隨。名曰腸風。氣有餘。荆芥川
烏爲丸。子黃著酒下。便令除。
凡婦人此證。因房太過。血不足。氣有餘。致
有肛門澀痛。

宣腸丸

雙

十二

川烏生

荆芥穗一兩

枳殼一兩

右用米糊丸。黃著酒下。

吐血上行

經血行時反上行。肺經有病熱冲然。但要順

經調肺氣。紅花散子善能痊。

凡婦人吐血有三。一經不行反上行。便傷氣也。二傷冲。三肺經受熱隨上冲。故便吐血。

調脾散

三稜

胡椒

錢二

茴香

錢二

陳皮

錢三

右爲末。米飲調下。

莪朮

各兩

宿砂

錢三

甘草

錢三

麥芽

兩半

川芎

錢二

青皮

錢三

通經丸

當歸一錢半

桂不見

青皮去白

大黃炮

乾漆炒令烟盡

乾薑炮

川烏炮

桃仁炒去皮

莢木炒

川椒各錢

右十味。每味各同椒微炒。放地上出汗。爲末。一半用醋熬成膏。後入一半。更入雞子清。同爲丸。陰乾。醋湯下三十九。

胎前腹痛

胎氣有餘。腫脚經。三陰受濕。未能分。治療先

須調去濕。方可安胎治脚經。

九婦人孕七八月。脚腫。此胎氣流於三陰。脚經。至將月時。經血大過。氣隨血散。先為去濕。次與分氣飲。

分氣飲

附五

陳皮

甘草

十一

赤茯苓

各三錢

蒼朮

木瓜

白朮

各五錢

右以姜棗煎服。

筋掣發搐

風入肝經發為搐。虛之太極。又掣拳。參附湯。

中加減服。要行氣脉自然痊。

凡婦人氣虛太極。肝經受風。肝主筋。受風則搖急不舒。先散風。

參附湯

人參

附子生

甘草

細辛

白朮

乾姜各二錢

右爲末。熱酒調服。

徧身黃

面目徧身似橘黃。其人經脉不尋常。皆因房事中其血。若不醫之。定不祥。

凡婦人徧身黃疸。名經水不調。房事觸犯。
寸金散

黃臘

錢五

白凡

錢五

陳皮

錢三

右以黃蠟丸。滋血湯。調經湯。吞下。大全方上

語音不出

附五

十五

或時嗽後語音咽。脫着傷風是亦然。但用鹽湯乾與嚼。血勞之病斷琴絃。

凡婦人氣虛。肺感風邪而失音。有因嗽絕。宜用脚經丸。鹽煨姜過一宿。早晨服之。久失音者。尤宜助桂湯。

助桂湯

好真蘇子_二

_兩

杏仁_{三十}

訶子_三

百藥煎_二

_兩

右用熱酒調下。

塞噎

氣不調和上膈寒。致令塞噎吐痰涎。丁香柿
蒂枇杷葉。自然塞去得安痊。

凡婦人氣不順。上膈受寒致塞。噎不住。傷
風者有此。

丁香散

丁香

柿蒂

枇杷葉

陳皮

各等分

右為末。細嚼服。

形容瘦瘵

氣不充時血不榮。肌肉不長瘦其身。谷靈丸

子服兩月。頰紅肥大長精神。

凡婦人血弱血虛。肌肉不長。血海虛竭。大

要調血氣。

谷靈丸

黃芪

人參

牛膝

當歸各一

附子一枚

地黃兩半

杜仲

蒼朮

白朮

桂

枸杞各三錢

茯苓五錢

右以酒糊丸。人參湯下。

數月懷胎經行如故

例五

十四

懷胎數月不能分。飲食無妨。經又行。蘇合香丸化水下。鬼胎客忤不能逆。

凡婦人懷胎三四月。飲食無妨。月經如常。此鬼忤怪氣在於臟腑。是以滿腹。宜服蘇合香丸。井花水早晨服。

玉戶生瘡

玉戶生瘡時痛痒。皆因房色損其元。黃蔥水
洗兩三次。杏仁燒灰油調塗。

凡婦人玉戶生瘡。皆因月事受風。房事太
過致生瘡。名陰蝕。宜黃蔥煎水。洗次用。

杏仁散

杏仁兩一

右燒灰。清油調塗。

身痛

右邊身痛爲血逆。左邊身痛氣所煎。思慮風

寒於兩及。此痛元來通一邊。

凡婦人身痛。右是血。左是氣。皆因受風濕。思慮交會。氣血不調。是氣。勻氣湯。是血。勻血湯。

勻血湯

衛王

茴香

厚朴

乳香

十五

桂

甘草

黑牽牛

地黃

羌活

右等分。木香湯下。

勻血湯

當歸

細辛

白芷

沒藥

澤蘭

甘草

天仙藤

右等分。為末。熱酒調下。

寒戰

身戰慄慄似鬼魔。血寒之證實無他。但信子規靈有驗。熱酒調和不用多。

丸。婦人戰慄者。血寒也。皆因傷風冷。氣血弱。所以戰慄也。

子規丸

荊芥

牡丹皮

桂

白芍藥

右為末。熱酒調下。

心酸

酸心病是脾宿寒。胃中痰積致心酸。陳皮麥
藥能除積。蒼朮茱萸病日安。

凡婦人有積飲痰證在脾胃間。時時酸心
或吐水。

茱萸丸

吳茱萸

鹽湯洗

蒼朮

各一兩

陳皮

白去

麥芽

桂

神麴各五錢

右水煮麴糊為丸。米飲下。

耳聾

末後三旬耳怎聾。皆因妄血受其風。巴戟丸中加附子。更添腦麴取全功。

九婦人風虛上攻如此。但服巴戟丸十六加附

子溫酒下。更服黃耆湯。巴戟丸局方上載

偏身麻痺

因虛受濕偏身麻。不知癢痛眼生花。氣血一時風毒感。五補祛風大有加。

凡婦人徧身麻痺。謂之不仁。皆因血風。血虛。受風濕所致。

五補丸

黃耆兩一

人參錢五

附子枚一

當歸錢三

白芍藥錢五

右煉蜜丸。祛風散下。

祛風散

生川烏

白朮

白芷

甘草各三錢

右溫酒調。吞下五補丸。

秦桂丸

增添別本得効

治婦人無子。昔知金州范羅言乞以此方試。令婦人服之四十九日。如無子。請罰臣一家。以令天下。何德易云。雖其言自誇。然實有異驗。臣妻年廿七無子。服此藥二十日。便有孕。殘藥以與石門縣令妻。年三十四。斷產已十六年。服此便有娠。又將殘藥與太子中守文季妻。年四十。無子。服此遂有娠。其效如神。不可具述。乃仙方也。

秦荒

桂心

杜仲

防風

厚朴各三分

附子生一兩半

茯苓兩半

白薇

乾薑

沙參

牛膝

半夏各五錢

人參兩一

細辛一分

右十四味。並生礮為末。煉蜜丸。如菉豆大。每服三十九。空心。米飲任下。未效。更加數丸。已覺有孕。便不可服。

急救仙方卷之五

急救僊方卷之六

測十

急救僊方卷之七

測十

急救僊方卷之八

測十

急救僊方卷之九

測十

急救僊方卷之十

測十

急救仙方卷之十一



上海涵芬樓影印正統道藏本

急救仙方卷之六

側六

仙授理傷續斷秘方序

此方唐會昌間。有一頭陀結草庵于宜春之鍾村。貌甚古。年百四五十歲。買數畝墾畬種粟以自給。村氓有彭叟者。常常往來其廬。顏情甚稔。或助之耕。一日彭之子升木伐條。誤墜于地。折頸挫肱。呻吟不絕。彭訴于道人。道人請視之。命買數品藥。親製以餌。俄而痛定。數日已如平時。始知道人能醫。求者益眾。道人亦厭之。乃取方授彭。

使自製以應求者。且誓之以無苟取。毋輕售。毋傳非人。由是言治損者宗彭氏。彭叟之初識道人三十許。今老矣。然風采無異。前時問其姓名。曰。蘭道者。問其氏。曰。長安人也。始道人閉門不通人事。人亦少至。惟一鄧先生。例六每春暗秋爽。攜稚過之。必載酒。敬從焉。道人縣一柳瓢壁間。鄧至。則取瓢。更酌。彭或遇之。亦酌。二人皆談笑竟晷。醉則高歌。其詞曰。經世學。經世學。成無用。著山中樂。山中樂。土堪耕。鑿。癭瓢有酒同君。

酌。醉卧草廬。誰喚覺。松陰忽聽雙鳴鶴。起
來日出穿林薄。彭蹠朴不知所言爲何。惟
熟聽其歌。亦得其腔。每歸對人歌之。人亦
不省。居久。鄧先生不至。彭問道人道。人云
已仙去。彭卒不悟。後江西觀察使行部至
袁州。聞彭所歌。異之。詰其詞。得道人姓氏。
遂遣人同彭叟。至其廬。邀之。至則行矣。惟
瓢存焉。廉大以爲恨。謂彭傳其治損諸方。
因易其村曰。輩道人。有書數篇。所授者特
其最後一卷云。

理傷續斷方

醫治整理補接次第口訣

一煎水洗。二相度損處。三拔伸。四或用力收入骨。五捺正。六用黑龍散通。七用風流散填瘡。八夾縛。九服藥。十再洗。十一再用黑龍散通。十二或再用捌六風流散填瘡口。十三再夾縛。十四仍用前服藥治之。

凡腦骨傷碎。輕輕用手撐令平正。若皮不破。用黑龍散敷貼。若破。用風流散填瘡口。絹片包之。不可見風著水。恐成破傷。

風若水與風入腦成破傷風。則必發頭疼。不復可治。在髮內者。須剪去髮。傅之。凡腦骨傷碎在頭骨上。則可治。在太陽穴。乃是命處。斷然不可治矣。

凡肩甲骨出。相度如何整。用椅當圍住脇。仍以軟衣被盛罩。使一人捉定。兩人拔伸。却墜下手腕。又著曲著手腕。絹片縛之。

凡金井骨在脇之下。有損不可夾縛。只是捺平。令安貼平正。用黑龍散貼。絹片縛。

兩脇骨亦如此。

凡跨骨從臀上出者。可用三兩人捉定腿拔伸。乃用脚踏入。如跨骨從檔內出。不可整矣。

凡手骨出者。看如何出。若骨出向左則向
右邊拔入。例六骨向右出則向左拔入。三

凡手脚骨皆有兩脛。若一脛斷則可治。兩脛俱斷決不可治矣。凡手脚骨傷甚者。不可治。

凡傷損重者。大槩要拔伸捺正。或取開捺

正。然後傳貼填塗。夾縛拔伸當相近本骨損處。不可別去一節骨上。

凡拔伸。且要相度左右骨如何出。有正拔伸者。有斜拔伸者。

凡認損處。只須揣摸骨頭平正不平正。便可見。

凡左右損處。只相度骨縫。子細撚捺忖度。便見大槩。要骨頭歸舊。要樽捺皮相就入骨。

凡拔伸。或用一人。或用兩人三人。看難易。

如何。

凡皮破骨出。差及拔伸不入。撐捺相近爭一二分。用快刀割些捺入骨。不須割肉。肉自爛碎了。可以入骨。骨入之後。用黑龍散貼瘡之四圍腫處。留瘡口。別用風流散填。所用刀最要快。剗刀。雕刀皆可。凡捺正。要時時轉動使活。

凡骨碎斷。須要本處平正如何。大抵骨低是骨不曾損。左右看骨方是。損處要拔伸捺正。用藥貼夾縛。要平正方是。

凡腫是血作。用熱藥水泡洗。却用黑龍散
傳貼。

凡傷重。必用藥水泡洗。然後塗藥。如傷輕。
不必洗。便塗藥。

凡夾縛。夏三兩日。冬五三日。解開夾縛處。

捌六

用熱藥水泡洗。去舊藥。洗時四切不可驚

動損處了。仍用黑龍散傳夾縛。蓋傷重
者方如此。

凡皮破。用風流散填更塗。未破。用黑龍散
貼。須用杉木及夾縛之。

凡拔伸捺正。要軟物。如絹片之類。奠之。

凡皮裏有碎骨。只用黑龍散傳貼。後來皮肉自爛。其碎骨必然自出來。然後方愈。凡骨破打斷。或筋斷有破處。用風流散填塗。却用針線縫合其皮。又四圍用黑龍散傳貼。

凡夾縛。用杉木皮數片。周回緊夾縛。留開皆一縫。夾縛必三度。縛必要緊。

凡平處骨碎。皮不破。用藥貼。用密夾縛。大槩看曲轉處。脚凹之類。不可夾縛。恐後

伸不得。止用黑龍散貼。帛片包縛。庶可
曲轉屈伸。有數處。如指骨斷。止用苧麻
夾縛。腿上用苧麻繩夾縛。繩如錢繩許
大。

凡貼藥。用版子一片。將皮紙或油紙以水

調黑龍散攤勻在上。然後卷之貼損處。

凡用杉皮浸約如指大。片疎排。令周匝用
小繩三度緊縛。三日一次。如前淋洗。換
塗貼藥。

凡曲縛。如手腕。脚凹。手指之類。要轉動。用

藥貼。將絹片包之後。時時運動。蓋曲則得伸。得伸則不得屈。或屈或伸。時時為之方可。

凡傷損。其初痺而不痛。應拔伸捺正。復用刀取開皮。皆不痛。三二日方痛。

凡損。一月尚可整理。久則不可。

凡損。不可喫草藥。喫則所出骨不能如舊。凡跌損。腸肚中汙血。且服散血藥。如四物湯之類。

凡損。大小便不通。未可使服損藥。蓋損藥

用酒必熱。且服四物湯。更看如何。又服大成湯。加木通。如大小便尚未通。又加朴硝。待大小便通後。却服損藥。

凡傷重者。未服損藥。先服氣藥。如勻氣散之類。

凡渾身無故損痛。是風損。當服風損藥。如排風湯之類。

凡服損藥。不可喫冷物。魚牛肉極冷。尤不可喫。若喫牛肉痛。不可治。

凡損藥必熱。便生血氣。以接骨耳。

凡服藥不拘在紅酒。無灰酒。生酒皆可。

凡藥三四月鍊。不可多合。五月尤甚。存散藥隨時旋丸。

凡收藥丸子末子。並用罐子收入廚子內。以火培之。

凡損用大炎剛六則醫不得。服藥不效矣。六

諸藥惟小紅丸。大活血丹最貴。蓋其間用乳香沒藥。楓香可代乳香三之一。血碣難得合。大活血丹欠此亦可。若有更佳。合藥斷不可無乳香沒藥。若無沒藥以畚

降真代血竭無亦用此代。

凡所用藥材。有外道者。有當土者。如當歸。土與川不同。丸子可用土當歸。土藥材。末子須用外道者。

凡傷重者。用此方煎湯洗之。然後傳藥。

生蔥

切斷一本
用生薑一本

荆芥剉

土當歸

右三味煎湯。溫熱淋洗。

黑龍散用貼治跌撲傷損。筋骨碎斷。差又出舊。先煎葱湯。或藥汁淋洗。拔伸整捺。令骨相續。

平正。後却用生姜汁或生地黄汁和水調稀。却將熟帛或皮紙量損處大小。薄攤於上。貼之。次以木皮約如指大片。踈排。令周匝。將小繩三度縛之。要緊。三日一次。再如前淋洗。換藥貼裏。不可去夾。須護。毋令搖動。候骨生牢穩。方去夾。則復如故。若被刀箭傷。蟲獸傷。噉成瘡。穰爛。肌肉不生。跌磕腫痛。並用姜汁和水調貼。有破則留口。以風涼散填塗。

川山甲

六兩。炒黃。或燒存性。

丁香皮

六兩

枇杷葉根

去毛。入半兩。云山枇杷根。

土當歸

二兩

百草霜韋入

右焙碾為細末。姜汁水調。或研地黃汁調用。

大活血丹。治撲損傷折骨碎。筋傷疼痛。浮腫。腹有瘀血。灌注四肢。煩滿不安。癰疽發背。筋肉壞爛。諸般風疾。左癱右瘓。手足頑麻。婦人血風諸疾。產後敗血不行。流入四肢。頭面浮腫。血氣疼痛。渾身疼痺。經脉湛濁。風勞發動。百節酸疼。並宜服之。每服半丸。用無灰酒磨化。微煎三五沸。溫服。不拘時。不限多少。此藥

將紗葛袋收掛淨處。經久不壞。可備急用。孕婦莫服。損在上。食後服。在下。空心服。傷重不拘。餘倣此。

天南星

浸一斤。薑汁一宿。培。

骨碎補。一斤。生者。培。石。

大栗間

去一斤。皮。培。老。者。

自然銅。一斤。存性。火。煨。取。半。酸。醋。

細辛。葉。十。兩。去。苗。

木鼈。楚。斤。去。殼。細。切。

川牛膝。浸。一斤。去。蘆。酒。

芍藥。白。一斤。可。

黑豆。煮。一斤。培。乾。酒。

川烏。炮。一斤。

血竭。別。研。

白芷。斤。

沒藥四兩。真香別研。和無代。

乳香以三斤。別研。如無代。

青桑炭十斤。青桑木。取如臂大者。去皮。

炭為

右桑栗豆補星藥六味。為末。和餘藥研為

細末。用米醋捌六煮糯糊拌入。日搗千杵。方聚

衆人急下手丸。下手稍緩則折。陰乾半月。

然後用火焙。或晒一日。大丸重六文。濕中

丸重三文。濕乾則以漆抹在手上。取兩三

丸。椰漆為衣。每服半丸。合此藥。勿令四眼

見之。更忌雞犬婦人。見之則折矣。

小紅丸。治踈折傷損。皮破骨出。手足碎斷。筋肉壞爛。疼痛甚。甚至晝夜叫呼。百治不止。手足久損。筋骨差。又舉動不得。損後傷風濕。又節攣縮。遂成偏廢。勞傷筋骨。肩背疼痛。四肢疲乏。動用無力。常服壯筋骨。治經絡。生氣血。每服三十丸。用生姜煎酒。或鹽湯吞下。不拘時候。孕婦莫服。

土當歸

培六兩。

川烏

培六兩。

白楊皮

培六兩。

肉桂

培四兩。不

莪木

培二兩。

丁香

培二兩。

乾姜焙二兩

川芎兩一

細辛焙四兩

沒藥別研錢

附子煨三兩去皮半乳香三錢別

芍藥焙六兩

骨碎補培六兩取六兩姜製

右補藥歸楊四味。用當土者。餘八味研為

細末。乳沒別製。和醋糊為丸。如菘豆大。信

朱為衣。每服測六三十九丸。溫酒下。傳用九生姜自

然汁煎酒或鹽湯皆可。不拘時候。

大紅丸。治撲損傷折。骨碎筋斷。疼痛痺冷。內
外俱損。瘀血留滯。外腫內痛。肢節痛倦。應諸
損痛。不問年深日近。並宜服之。常服補損。堅

筋固骨滋血生力。神驗不可具述。每服三十丸。溫酒醋湯任下。不拘時候。孕婦莫服。

天南星

一斤。

芍藥

一斤。

土當歸

十兩。

牛膝

十兩。

酒細辛

八兩。

去葉

赤小豆

一斤。

赤斂

首一斤。

即何。

川烏

一斤。

煨

兩。

青桑皮

五斤。

俱要

製

此方

亦可。

自然銅

四兩。

煨

骨碎

補

一斤。

姜

右斂星芍藥歸補膝辛七味。並用當土者。

同。餘藥羅為末。醋煮麵糊為丸。如梧桐子

大。朱為衣。每服三十丸。溫酒下。醋湯亦可。

損在上。食後服。在下。空心服。傷重不俱時服。或與小紅丸互用亦可。

黑丸子。治打撲傷損。驢馬跌墜。骨斷筋碎。百節疼痛。瘀血不散。浮腫結毒。一切風疾。四肢疼痺。筋疲力乏。渾身倦怠。手足緩弱。行步不前。婦人諸般血風勞損。並宜服之。每服二十丸。三十九丸。用濃蔥酒或茶任下。孕婦莫服。

白斂培斤。

白芨培兩。

南星培兩。

芍藥培兩。

土當歸培兩。

骨碎補培兩。

川烏培兩。

牛膝培兩。

百草霜培兩。

赤小豆斤

右除星芍歸補膝豆用土產者草霜釜上
取同爲末醋糊爲丸如梧子大每服三三
十丸。

當歸散治打撲傷損皮肉破碎筋骨寸斷瘀
壅滯結腫不散或作癰疽疼痛至甚因損後
中風手足痿痺不能舉動筋骨縫縱攣縮不
舒及勞役所損肩背四肢疼痛並宜服之此
藥大能續筋接骨尅日取效。

澤蘭

川當歸

牛膝

川續斷各十兩芍藥

白芷

川芎

肉桂各五兩川烏

川椒三兩各結梗

甘草各四兩

白楊皮

亦不用細辛俱五兩已上好者。

右為極細末。每服二錢。熱酒調下。不拘時。

乳香散治跌撲傷損。皮肉破綻。筋骨寸斷。敗血壅滯。結腫爛壞。疼痛至甚。或勞役所損。背肩四肢疼痛。損後中風。手足痿痺。不能舉動。筋骨乖縱。攣縮不舒。大能續筋接骨。卓有奇驗。常服結血止痛生力。每服二錢。溫湯調下。

不拘時候。

肉桂

乾姜各三

牛膝

羌活

川芎

細辛

姜黃

芍藥

草烏

川烏各四兩

白芷二兩

碎補

當歸側六

蒼朮

木鼈十二兩 去殼麩炒

沒藥五兩

何首烏四兩

赤小豆升

乳香半

桔梗兩

乳香沒藥別研加一方去木麩

右焙碾為末。續入乳沒末。和湯使調服如

前。

鼈甲散治五勞七傷。四時傷寒。渾身增寒壯熱。骨節煩疼。嗽咳痰涎。酒色傷德。四肢倦怠。及治山嵐瘴癘。一切積氣。心腹膨脹。嘔吐泄瀉。應是風疾。並宜服之。

肉桂

川芎

白芷

秦艽

鼈甲

醋炙三次。

紫苑

淨洗。

麻黃

節不去。

羌活

獨活。

當歸

尾去。

乾姜

紫蘇

大過。

橘皮

四兩。

上各。

天台烏藥

烏藥

柴胡

五味子 各七 蒼朮

桔梗 三 斫

川烏 煨 隻

右焙碾爲細末。每服二錢。水一盞。姜三片。烏梅一箇。同煎至七分。熱服。傷寒加葱白煎。勞損入鹽。熱酒調下。

小紅丸

烏頭 箇

何首烏

蒼朮

蛇床子

五靈脂

牛膝

赤小豆

白膠香

當歸 各一

乳香 錢

右為末。好酒煮糊為丸。如菘豆大。每服三十丸。溫酒下。

小黑丸

白欒

白芨

南星

芍藥

各十兩

當歸

五兩

細辛

三兩

赤小豆

升川六

百草霜

六兩

右為末。醋糊為丸。如梧子大。每服三十丸。

溫酒下。

搜風丸。治風損腰痛。頭疼。治子効與

何首烏

南星

骨碎補

川烏 各半

土牛膝

芍藥 各二兩

細辛 三兩

當歸 耐

白鮮皮

右為末。醋糊為丸。如梧子大。每服三十丸。

溫酒鹽湯。不拘時吞下。

驅風丸 治效同

骨碎補 兩

川烏

川芎 各一兩

草烏

川當歸

牛膝

木鱉 酪二

何首烏 兩

烏金 百兩。草。柳。霜。

一云京墨

右為末。醋糊丸。如梧子大。每服三十丸。空

心。鹽湯下。或荊芥茶湯。食後下。

黑虎丹。治男子婦人手足麻痺。

川烏

木鼈各一

地龍兩

黑豆半

五靈脂兩

松墨醋炒兩

右四味為末。五靈脂醋研碎。煮麵糊為丸。

龍眼大劑六每服一丸。或二丸。細嚼十三酒下。薄芎

茶亦可。不拘時。

首烏丸。治風損寬筋。

何首烏斤同蒸熟黑豆半

牽牛子汁兩

牛膝

薄芎各兩

川烏兩

青木香兩

皂角性一斤

一斤燒存
一斤蜜炙用

右為末。酒糊丸。如梧子大。每服三十丸。葱

湯或薄荷湯。不拘時下。

勻氣散。凡傷重。先下。此藥調氣。然後服損藥。

茴香

青皮

厚朴製

白芷

烏藥

杏仁

去皮尖
各半兩

陳皮

麥蘖

前胡

桔梗

蒼朮

粉草

略一

右為末。每服二錢。水一盞。姜棗煎至八分。空心服。

四物湯。凡傷重。腸內有瘀血者。用此。

白芍藥

川當歸

熟地黃

川芎

右等分。每服三錢。水一盞半。煎至七分。空心熱服。一方只用當歸。大黃二味。

七氣湯

半夏

兩五

人參

肉桂

甘草

炙各兩

右每服三錢。水一盞。姜三片。煎至七分。食前熱服。

五積散。治五勞七傷。凡被傷頭痛。傷風發寒。姜煎二錢。仍入葱白。食後熱服。

蒼朮

桔梗

各二兩

枳殼

陳皮

麻黃

去根節。各六兩

芍藥

白芷

川芎

川歸

甘草

肉桂

茯苓

半夏

湯泡。各三兩

厚朴

乾姜

各四兩

右除枳殼桂兩件外。餘細剉。用慢火炒。令色變。攤冷。入枳桂。令勻。每服三錢。水一盞。姜三片。煎至中盞。熱服。

大成湯

一名大承氣湯

應傷損極重。大小便不通者。方服此。可加木通煎。如未通。加朴硝俟。大小便通。方可服損藥。損藥不可用酒煎。愈不通矣。然亦須量人肥弱用。如孕婦。小兒莫服。

大黃

枳殼各四兩

川芒硝

甘草

陳皮

紅花

當歸

蘇木

木通各二兩

厚朴許

右件咬咀。每服二錢。水一盞半。煎至一沸。

去相溫服。不拘時。此乃專治男子傷重。瘀血不散。腹肛膨脹。大小便不通。上攻心腹。悶亂至死者。急將此藥通下。血瘀後。方可服損藥。

小承氣湯

大黃四兩

別六

芒硝

二錢。煎

十五枳實二兩

厚朴八兩

右治效同大成湯。比較力輕。不拘婦人女子小兒。皆可服。

排風湯。治諸風疾損。

白蘚皮

白朮

芍藥

肉桂

去粗皮

川芎

杏仁

去皮尖

川當歸

去蘆

防風

甘草

各二兩

獨活

麻黃

各三兩

白茯苓三兩

右每服二錢。水一盞半。姜四片。煎至八分。

不拘時服。更宜續命湯消風散。

接骨藥。下窟烏。一名鸚。用骨燒存性。用古銅錢一箇。煨醋淬七次。爲末。等分。骨斷夾縛。訖。用藥一錢。酒調下。不可過多。病在下。空心服。在上。食後服。此方極驗。

常用整骨藥。用大草烏刮去皮。為細末。每服
逐半錢。溫酒調下。如未覺。再添二分藥。酒下。
又方。用乳香沒藥各二兩。別研。次用血竭。自
然銅無名異。醋煮黃木鼈子各一兩。地龍二
兩。並為末。蜜丸。如龍眼大。嚼爛。熱酒嚥下。俟
了。用生蔥嚼解。別云

至真散。治打破傷損。破腦傷風。頭痛。角弓反
張。命一名奪

天南星炮

防風

去蘆

右等分為末。凡破傷風病。以藥傅貼瘡口。

即以溫酒調一錢服。如牙關緊急。以童便調二錢服。垂死。心頭微溫。童便調二錢。并進三服。

急救仙方卷之六

急
救
仙
方
卷
六

急救仙方卷之七

捌七

治傷損方論

如傷重者。第一。用大承氣湯。或小承氣湯。或四物湯。通大小便。去瘀血也。惟婦人別有陰紅湯。通下。第二。用黃末藥。溫酒調。不拘時。病在上。食後服。在下。空心服。遍身痛。臨卧時服。第三。服白末藥。熱酒調。其法同。黃末服。婦人產後諸血疾。並皆治之。第四。服烏丸子。第五。服紅丸子。第六。服麻丸子。用溫酒吞下。婦人艾醋湯下。孕婦不可服。

第七。服活血丹。當歸散。乳香散。二散方見前方內。並用酒調。不拘時。與黃末。白末服法同。惟乳香散。參之山泉方。則又加六味。白楊皮一斤。生芥子十箇。澤蘭一斤。檀香六兩。沉香二兩。川芎一斤。餘方條具如後。

大承氣

刪文

小承氣。四物湯。並見前方內。

黃末藥。治跌撲傷損。皮肉破綻。筋肉寸斷。敗血壅滯。結癰爛壞。疼痛至甚。或勞役所損。肩背四肢疼痛。損後中風。手足痿痺。不能舉動。筋骨乖張。攣縮不伸。續筋接骨。卓有奇功。常

服活血止腫生力。

川烏炮

草烏煮醋

楓香別研各

當歸

去蘆頭酒浸一宿陰乾

赤芍藥各半

川獨活

去蘆

川芎

湯泡七次

細辛淨去苗

香白芷

山桂皮去粗

白姜麵裹

黃姜

濕紙裹煨

五加皮

淨洗去骨

桔梗蘆

碎補

去毛

蒼朮

醋煮七次

何首烏

用黑豆煮七次酒

牛膝酒浸七日培乾各二斤

知母

拌

沒藥

拌

右件爲細末。每服二錢。鹽酒調。病在上。食

後下。空心服。遍身損。臨卧服。孕婦莫服。

白藥末。治打破傷損。皮肉破碎。筋骨寸斷。瘀血壅滯。結腫不散。或作癰疽。疼痛至甚。或因損後中風。手足痿痺。不能舉動。筋骨偏縱。攣縮不伸。及勞傷破損。肩背四肢疼痛。並宜服之。此藥大宜續筋接骨。刻日取效。婦人產後諸血疾並治之。

桔梗

苗去

白芷

甘草

炙。各兩

川芎

湯泡。七次

山桂

皮去粗

細辛

去苗。各半斤

川烏

炮

斷續

宋汁浸

牛膝

去苗。酒浸一宿

當歸

香附子炒。六兩。各花椒五兩。去子

赤芍藥

酒浸一宿。澤蘭葉去叉枝。各九兩。

白楊皮

汁浸一宿。

右為細末。每服二錢。酒調下。服法同前。婦人諸血風氣皆治之。

烏丸子。治打撲傷損。骨碎筋斷。瘀血不散。及一切風疾。筋痿力乏。左癱右瘓。手足緩弱。諸般風損。婦人血疾。產後敗血不散。灌入四肢。面目浮腫。並宜服之。惟孕婦勿服。

赤小豆炒

白欬

細辛去苗

赤芍藥

何首烏醋煮

白芨煨

草烏

醋煮七次

山桂

皮去粗

川芎

南星

麩裏

當歸

酒浸一宿

川牛膝

去草酒浸一宿

百草霜

骨碎補炒去毛

天台烏藥烏

酒煮後焙乾已上各一兩半

右為細末。

用七

用煮豆酒煮麵糊為丸。如梧子

大。每服五十丸。用煨葱酒或煨葱茶任下。

紅凡子。治打撲傷損。骨碎筋斷。疼痛痺冷。內外俱損。瘀血留滯。外腫內痛。肢節疼痛。應諸傷損。不問年月日久。並宜服之。常服補損堅

筋固骨。滋血生力。神効不可具述。孕婦勿服。

牛膝酒浸一宿

川烏炮

南星醋煮三次

細辛去苗淨洗

何首烏煮熱水 桔梗蘆去

山桂去粗皮

當歸 白斂

赤芍藥

沒藥研別 骨碎補去毛

羌活蘆去

赤小豆不見大 自然銅煨醋

研別

右除研藥外。餘並打和炒乾為末。酒煮麵糊為丸。每服五十丸。隨病上下服之。

麻丸子。治踈折傷損。皮破骨出。手足碎斷。肌

肉壤爛疼。痛至甚。日夜叫呼。百治不止。手足久損。筋骨差支。舉動不能。損後傷風濕。肢節攣縮。遂成偏癱。勞傷筋骨。肩背疼痛。四肢癱乏。動作無力。常服壯筋骨。活經絡。生氣血。及治婦人血氣。惟孕婦勿服。

川當歸

桔梗名布羅旬

牛膝不用酒浸。各半兩。

骨碎補二兩。去毛。川芎

百草霜

草烏周山各一。浸。各一斤。礬灰汁。

木鼈子去油。煎。

赤芍藥各半斤。金毛狗脊去尾。烏豆一升。并酒。煮。焙。乾。

川烏不見火。煮。醋。切。

右為末。酒煮麴糊為丸。如梧子大。每服五
十丸。溫酒下。婦人艾醋湯下。

活血丹。治跌撲傷損。折骨斷筋。疼痛浮腫。腹
有瘀血。灌注四肢。煩悶不安。癰疽發背。肌肉
壞爛。諸般風疾。左癱右瘓。手足頑麻。婦人血
風發動。並宜服之。每服半丸。用無灰酒磨化。
微煎三五沸。溫服。不拘時候。不以多少。此藥
常將紗葛袋收掛靜處。經久不壞。可備急用。
惟孕婦勿服。

荊芥仁 兩

草烏 煮酒

川烏 炮 兩
二 兩

楓香研別

檀香不見

降真節

乳香研別

沒藥一別研。各

山桂去粗

當歸一酒時浸

川羌活蘆去

白芨晒麩裏煨。

地龍去土

射香研別

碎補去毛。

川牛膝一酒時浸

細辛去苗

花桑木成燒灰

白芷不蛀

赤芍藥酒浸

川牽牛石灰

天栗間

烏豆炒以糯末

川芎三熱湯洗

南星以石灰炒

自然銅研酒淬。

蒼朮末汁浸。春五。夏三。秋七。

滴青一錢半。

五靈脂一兩半。用燈心別研。

白楊皮

生葱

何首烏

土當歸

荊芥

藁本

芍藥

右不拘多少。煎湯。候溫將洗損處令淨。用絹溲乾瘡口。

烏龍角藥貼。治跌撲傷損。筋骨碎斷。差支出白。其用法詳見前方。黑龍散同。先洗擦整理。後調貼。夾縛亦可。用此乾糝瘡口。

白僵蠶去絲

炒

赤小豆

各六兩

川牛膝

去蘆

六兩

山桂枝

桔梗

白芨生乾

乾

山枇杷葉生剉陰乾

百草霜

當歸尾

碎補各去耗北細辛去苗

白芷

南星煨

赤芍藥

何首烏

白斂各十

知母

草烏用姜汁煮

右為細末。如藥潤亦可培乾碾之。每用以

姜汁或冷水茶水調攤紙上。於痛腫處貼

之。三日一洗一換貼。骨碎須夾。

桃紅散治積年不効。朽爛瘡口。金瘡箭射打
碎。皮破血出不止。可將此藥乾搗。次日別用

藥水洗淨。再搥。大能散血結口。

白礬飛過

龍骨二兩研 各 血竭別一兩

松糖研別

五倍子 粉霜

黃丹飛過 石膏一斤 黃泥飛過

右研為極細末。罐子收用。

紫金散。整骨續筋。生肌止痛。內傷肝肺。嘔血不止。或在心。腹脹痛。四肢無力。左右半身風瘕。並宜服之。

紫金藤皮 降真 骨碎補去毛

琥珀 當歸去尾 桃仁去皮 各

蒲黃

大黃煨。各兩。

續斷細者。要

無名異

燒紅。酒七次。

牛膝

去苗。酒浸一宿。各三兩。

朴硝

半兩。熱湯泡化。用紙濾過七次。

右件為末。用蘇木煎酒調。日進三服。即効。

七寶散。治冷水風脚。濕氣下注。脚膝生瘡。左癱右瘓。筋脉拘急。脚下隱痛。不得伸屈。不能踏地。並皆治之。

晚蠶沙炒

蛇床子炒。各一升。肉桂去皮

乾荷葉

川烏炒。各二兩。荊芥穗

藁木去土。配。

薏苡仁三兩。

右件哎咀。約二兩重。用水五升。加花椒連須。葱同煎至七分。去粗。於痛處熱斟淋洗。定痛丸。治腰痛不可忍。不問男子婦人。室女老幼。並皆治之。

威靈仙

半去土兩

金鈴子

炒去核

川烏炮

八角茴香

各一兩

右為細末。酒煮麵糊為丸。如梧子大。每五十丸。鹽湯酒隨上下服之。

七氣湯。治積年久損入經絡。服藥無效。腰背拘急。咳嗽痰涎。風勞發動。日漸羸瘦。每到秋

來損病復作。不問男子婦人。並皆治之。

青皮炒去白

陳皮白

三稜濕紙裹煨

北梗去蘆

肉桂去粗

藿香枝去

益智炒去殼

香附子炒

甘草炙

半夏炮湯

赤芍藥

烏藥

獨活去蘆

羌活去蘆

降真香各一兩

右咬咀。每服五錢。水一大盞半。姜三片。棗

一枚。煎至七分。去滓。隨病上下服。

仙正散洗。治男子婦人骨斷。用此煎水洗。後

整骨。却用烏龍角貼之。如破留口。當夾縛。即

依前方爲之。

肉桂二錢去皮。

當歸三錢去尾。

荆芥兩

蒼朮

防風各一兩

玄胡索

白芷

赤芍藥各五錢

右咬咀。每服五錢。水五升。乾荷葉兩皮煎至七分。去滓。於損處斷處及冷水風脚筋脉拘急。不得屈伸。行步艱苦。可用此藥熱蒸。用被蓋覆。俟溫淋洗。

慘瘡口方。但遇傷損。皮肉血出。或破腦傷風。血出不止。急用此藥。搗之。

血竭

別研

錢半

降真節

錢四

燈心

把一

龍骨

別研

花者

紅花

要馬頭者

培乾

各二錢

乾

乳香

心同研

沒藥

別研

各五錢

桔梗

許

當歸

錢三

蘇木

同降真

碾

許

雞一隻

連毛尾

用醋煮

後碎之

用黃泥

封固

文武火煨

乾後培為末

用黃泥

封固

煨乾

培為末

用黃泥

右為細末

每用少許

乾撒

瘡口上

如血流

湧出不止

多撒之

候血藥將乾

又用清油

調塗於瘡上

以可制急料

接骨散

治飛禽骨斷

從高墜下

驢馬跌折

筋斷

骨碎

痛不可忍

此乃接骨續筋

止痛活血

斷骨碎

痛不可忍

此乃接骨續筋

止痛活血

斷骨碎

痛不可忍

此乃接骨續筋

止痛活血

朋砂半錢

水粉

當歸錢一

右爲末。每服二錢。煎蘇木湯服訖。時時但飲蘇木湯。立効。

除痕。治欲傷後瘡愈無痕。用此。

蔓青子

隨風子

俗隨子

黃荊子

右件各等分。爲細末。飯上蒸九遍。用童便浸一宿。後炒乾爲度。以花葉紙包在絹巾內。搯之。可以除痕。

陰紅湯。專治婦人傷損。瘀血不散。腹肚膨脹。

大小便不通。上攻心腹。悶亂至死者。急將此藥通下瘀血。却依前次第服藥。

產婦油髮燒鹿角膠錢各一沒藥錢三

右用酒一大盞調服。

膠艾湯。專治婦人尋常經脉不通。宜先服此。側七

後服鼈甲散。

乾地黄錢三 阿膠 川芎

艾藥錢各二

右咬咀。每服二錢。水一大盞。酒半盞。同煎至八分。溫服。不拘時。

洗藥。治男子婦人骨斷。用此煎水洗。後整骨了。却用烏龍角貼。

杜仲兩五

五加皮兩六

葱根把一

右三味。水五升。煎至七分。去滓。淋洗。每服二兩半。重傷破。留口用藥糝。骨斷當夾縛。

詳見前論。

急救仙方卷之七

急救仙方卷之八

捌八

疔瘡治法

夫疔瘡之初生也。人多不覺。生於頭面手足。肚脇腰腿間。亦無定處。一二日必作。寒熱如瘧。頭疼體痛不可忍。其痛稍異於尋常之證。須去徧身尋認其瘡。如有小瘡。與常患之瘡稍異。即是疔也。此瘡得患各有所因。而其形狀亦各不同。猪疔形圓而小。瘡口內有油。○羊疔形長色白。○牛疔形圓而小。瘡口內無油。○狗疔形長或帶尖。

色赤□。驢馬疔其狀三角。頂上有黑點。根赤△或○。

要知此瘡非持猪。牛。狗。羊。驢。馬。之毒所致。宿水不潔。飲之亦生水疔。豆腐中有人汗。食之亦生豆腐疔。又有氣疔。鬼疔。形狀雖不一。然其治之之法則一也。

瘡色緩。第一日瘡頂胞色小白。第二日色大白。第三日色微紫。第四日色真紫。

瘡色急。第五日色微青。小緊。第六日色深青。大緊。第七日色黑。其狀有如魚臍。又

如灸瘡之狀。乃最緊急之候也。

瘡證言。有應。如生一疔之外。別處肉上再生一小瘡。即是有應。可用針挑破。護場。瘡四圍有赤腫。生多瘡多者。謂之滿天星。飲食如常。頭痛。身熱。手足溫。

瘡證凶。無應。別處肉上無瘡。不護場。疔四圍無赤腫。內疔盛。渴欲飲水。飲食不進。頭眩眼花。護床不動。卧不起也。眼白。睛癡。不轉唇舌青。腹痛甚者。有內疔。五心腫。手足冷。氣麤。無脉。

桃紅散。治諸疔瘡。雖有凶證。迭見。六脉俱絕。死者。此藥悉能主之。

蟾酥

信石

各少許

蟬蛻

去足翅

斑猫

去足翅。各三箇。

蜈蚣頭

一箇

國丹

五錢

風化石灰

一兩。沙礪成。无片蓋。炭火煨。二時。又取出。

四八

二

右各製。同研為末。令極細。指爪甲刮葱白皮。內涎調藥。先以木葉針針破瘡口。可深半寸。凡疔瘡必有紅線路。可隨紅線斜下針。如瘡在背以上。可斜向下。如在胸月下。可針斜向上。蓋瘡毒喜趨心。故下針亦隨毒。

氣行也。出針後。瘡口有惡血。須令出盡。別將蟾酥一粒如麥粒大。入在瘡口中。用針送令深入。却以前葱涎所謂藥敷瘡口。莫敷在好肉上。用冷水浸濕紙二三十重。貼在藥上。封固瘡上。如清早封固。至晚覺瘡口熱。即去紙。水洗去令淨。用玉紅散摻瘡口。瘡口必有數日。覺作疼痛。只用玉紅散摻瘡。仍日用葱湯洗。然疔瘡之證雖危惡。但能用針破瘡口。入蟾酥在內。以桃紅散封固瘡後。即可保其回生也。至如瘡口覺

作疼痛不可忍。可不必憂。此非疔毒爲害。乃是蟾酥在覺作腐爛疔毒。故爾痛也。可採芙蓉葉。桑葉亦可。搗敷瘡四圍。散其血。勿令血潮。日夜各換一藥。須洗瘡後上藥。其瘡安好不日也。

若疔瘡初發時。則八必發寒熱身疼。三此乃毒氣在表。當汗而解。自沸湯主之。老人虛人孕婦不宜汗下。止用桃紅散拔毒。

自沸湯

白礬錢五

青黛錢三

塚間貼背乾石灰

三錢

右件同爲細末。研至無聲爲度。打和令勻。每服三錢。井花水半椀調。柳條攪千百下令勻。頓服之。厚衣蓋覆良久。用葱豉湯入醋少許。極熱服。少助藥力。得汗而解。

若始不覺是疥瘡。不曾以前法出汗。過數日方覺。則寒熱體痛皆罷。毒氣入裏矣。須用利藥。使內中毒氣下泄。雄黃丸主之。

雄黃丸

雄黃

鬱金

各五錢

巴豆

半錢。去心粉。暴

油去

一方加信石

一字許。不可多用。清油煮半日取出。晒乾入藥。

一方加斑猫

七箇。去斑。去變色。去米用。

以治療瘰癧。

一方加玄明粉

三錢。以治咽喉腫痛。喉閉等證。

右各研為細末。麵糊為丸。如菉豆大。每服

七丸。冷茶清吞下。取利為度。如未利。再服。

玉紅散

寒水石

一兩。輕粉

國丹

各少許

右件研為細末。摻瘡口。日夜二洗二換。蓋
蟾酥膏。桃紅散皆為毒藥。故今瘡疼痛。用

玉紅散解二藥之毒。用二藥散其血。則當自然安矣。

若一時未能辨前項蟾酥。桃紅散等藥。可用李世安一宗治法主之。功效尤速。

李世安治法

當歸散

明八

四

當歸尾

兩二

川芎

乾葛

荆芥穗

烏藥

白芷

川獨活

赤芍藥

升麻

各一兩

羌活

甘草

防風

去蘆

枳殼

各半兩

紅花

蘇木

各二錢半

瘡疼痛者。加乳香。沒藥。白芷。

各五錢

瘡熱不退。加篔竹青。山梔仁。

各少許

大便閉。加枳殼。

一兩

燥煩。加燈心。

十莖 竹茹。一塊

渴者。加天花粉。

一兩

腫者。加甘草節。降真節。

各半兩

眼暈。加川芎。白芷。荆芥。防風。

渴而小便閉者。加滑石。

一兩

右件。吹咀。每服五錢。燈草十數莖。烏豆十

粒。水一鍾半煎至八分。病在上。食後服。病在下。食前服。連進取効。

若患疔瘡。始初不覺。不曾用前法出汗過。數日外證皆罷。或在腹脇之間。或在胃脘之下。腫起。此乃毒氣入裏所致。宜用霹靂火治之。若服當歸散外證不解者。亦急用霹靂火發散。

霹靂火法

鵝卵石炭火煨通赤。用澱桶一隻。先置竹椅一隻於桶內。又用一杓置竹椅下。令病

人裸體坐於椅上。用荆芥爲末。調下酸米醋一器。却置煨石於杓內。即用荆芥醋淋沃石上。火力不可大。煨灼人恐病人難禁。若火力已微。汗尚未透。可再加火力。再沃之。沃時桶口用衾覆蓋。別用一衾蓋病人頭上。止留口鼻在外。令徧身汗出。須要頭面皆有汗。病即除矣。此法絕妙。老人虛人孕婦不宜汗下。可針破瘡口。用海馬拔毒散點瘡。酒煎蒼耳服。至如毒入裏。用霹靂火時。病人不須入桶。止用一小水桶。依前

法以杓盛煨石。在桶中用醋淋沃。令病人側身。以腫處覆在桶上。四圍用衾被遮護。勿令氣泄。良久腫處出汗。如汗未透。可再加火力。再沃之。須令腫處汗透。却不必徧身汗也。

若瘡在兩脇間。毒氣欲奔心。乃危急之證也。可急於患處尖上用艾炷灸三五壯。仍於灸穴前後針出少血。灸瘡四圍有炮起。吉。無炮凶。若瘡生於虛軟不便處。不可用針灸者。可用松針截法。針斷紅絲路。如瘡

生於兩胯間。毒氣欲奔腎者。用松針於兩
胯紅線路盡處。針斷出血。如瘡生頭面上
者。可於項間線路盡出針斷出血。或各處
紅線路亦有不見者。亦可以意消詳。用松
針針之。

九用松針者。蓋因紅線路不現。無可下手
處。故用此法。於頷下兩腋間。兩胯間虛軟
處。下手針斷毒氣。毋令攻心攻腎而已。

松針法

取向北松枝上葉極硬者。頻齊作一束。扎

令極緊。緩緩以意消詳。毒氣所經行虛軟處。針之。須令出血。針時。先用酒潤下針處。針必小痛。令病人稍忍。仍用雄黃麝香爲末。溫酒調一二服與之。服之方下針。

若表證皆罷。毒氣入裏者。用前雄黃丸主之。

若手足厥冷。六脉俱絕者。此乃毒氣已深。氣血爲毒氣所併。不能流通。是以體冷而不現。必須用木香。流氣飲。連進數服。氣血流通。則脉自回矣。然後依法治之。萬無一

失。

海馬拔毒散。治疔瘡大効。兼治諸惡瘡發背。

海馬

一雙

穿山甲

黃土炒

水銀

硃砂

各二錢

雄黃

三錢

輕粉

腦子

麝香

各少許

右件除水銀外各研爲末。打合入水銀。再

研至無星。針破瘡口。點藥入內。一日一點。

神効。

夫內疔之證與外疔之證並同。亦發寒熱。頭。疼。體痛。但瘡形不現。過數日。胃背。腹脇。頭面。

手足間或有一處腫起。即內疔所發之處。急用霹靂火。如前不護場汗法。於腫處出汗。若身體寒熱。雖未有腫起。但腹痛甚者。便須作內疔證。用後法治之。不可緩也。

用蟾酥一粒。病勢重者。用二粒。置病人舌上。嚙化。化後良久。用井花水灌漱。却用雄黃丸七丸。冷茶清吞下。得臟腑利數行。其病應手而愈。

凡治內疔。蟾酥可於取時。用桑葉小錢大。入蟾酥揉和。得所丸如念珠大。陰乾。

急救仙方卷八

急救仙方卷之八

急救仙方卷之九

捌九

秘傳五痔品

原痔者。貧富男女皆有之。富者酒色財氣。貧者擔輕負重。飢露早行。皆心肝二血。喜則傷心。怒則傷肝。喜怒無常。風血侵於大腸。到穀道無出路。結積成塊。出血生乳。各有形相。婦人因經後傷冷。月事傷風。餘血在心。經血乃流入於大腸。小兒因利後。或母腹中受熱也。治方于後。

水澄膏

護肉

鬱金

白芨

各一兩。一黃連。

右二味爲細末。候內痔登廁翻出在外。用溫湯洗淨。不須坐入。即側卧床沿上。用新水和蜜調令稀稠。用篋挑藥輕手塗穀道四邊好肉上。側丸只留痔頭在外。用薄紙圓轉蓋藥上。仍用筆蘸溫水塗紙上。紙以護水澄膏不令四散耳。才覺藥乾。又用溫水潤之。後用枯藥。

好白礬

四兩

生信石

半錢

硃砂

一錢。生研十分。

妙細爲

右各研爲細末。先用砒在建盞中。次用白礬末蓋之。用火煨令煙斷。其砒盡隨煙去。止借砒氣於礬中耳。用礬爲細末。十分細可也。看痔頭大小。用礬末在掌上。入生硃砂少許。以唾調稀。用筯頭塗痔上周徧。一日三上。須子細看痔頭顏色。焦黑爲妙。至夜有黃水出。切勿他疑。水盡爲妙。至中夜上藥一徧。來日依然上藥三次。有小痛不妨。換藥時。以椀盛新水或溫湯。在痔邊用筆一管。輕洗刷痔上。去舊藥上新藥。仍用

護藥。此藥只是借砒信。又有硃砂少解砒毒。次用荆芥湯洗之。三兩日之後黃水出。將盡却於藥中增硃砂。減白礬。則藥邊緩矣。三兩日方可增減。漸漸取之。庶不驚人。全在用藥人。看痔頭轉色增減厚薄傳藥。方是治法。

側九

二

荆芥湯

右用荆芥剉。水三椀煎。常常煎下。如洗痔了。依然傾入瓶內火煨之。可用三五次。

潤腸丸

大黃濕紙包

針包

枳殼穰去

當歸蜜鍊

右三味等分爲末。蜜丸。每服二十九。或三十丸。湯下。量臟腑虛實多寡服之。緣爲已用枯藥後。痔頭將欲焦枯。糞門迫急。恐大便堅難下。所以預服此。令臟腑稀滑耳。

龍石散

龍骨煨去

大毒去

香白芷

好黃丹

軟石膏煨去

大毒去

右等分爲極細末。候痔頭落盡。以此藥摻。收斂瘡口。預先備好血竭末。止血或斂瘡。

口。倉卒要用耳。

導赤散

生地黃

二兩

黃芩

三兩

右剉每服三錢水一盞煎六七分溫服用藥之後小便恐赤澁即服之加滑石甘草

燈心。

側九

三

雙金散

黃連

鬱金

右二味等分爲末極細用蜜水調傳痔頭上虛人已用枯藥上忽有此疼痛用此其

止。一方只用腦子末傳亦可。

內補散。此藥調理氣血。排膿生肌。候痔瘡將欲收斂。即服此。所謂腸頭直候瘡口安好。血氣中和。自然收入。

人參

黃耆

當歸各二兩

桔梗

芎藭

厚朴

官桂

防風

白芷

甘草各一兩

右十味各等分。為細末。木香湯。溫酒亦可。日二三服。

國老湯。甘草煎湯。常常要煎下薰洗痔瘡。蓋甘草自是痔藥。又解砒毒。若瘡收斂。其痒異常。尤要此藥澆洗。溫熱隨意。

催痔。治痔雖硬。只是不脫。用此藥催自落。

百草霜錢二 白姜末錢一 川烏頭

右為細末。以井水調稀。以筆點痔上。良久立脫。

熨法

凡醫痔。用枯痔藥後。急大小便。間好肉疼。如針刺及痛上腎根。令人將衣物火上烘。

之。令熱熨痛處三五次。其痛立止。

水澄膏。蓋慮痔根毒水流汗。好肉生瘡。故用藥塗油單紙。護內周徧。不用連紙貼定可也。喚痔

真磁石

研另

白姜各別研錢。白礬半錢。

草烏尖三筒。

用

右為末。却以葱涎調傅腸頭上。其乳出。用枯藥。

又方。磁石煨。醋淬。水飛。

白礬枯

大草烏

川山甲

朋砂

右末如前。出用洗藥。

痔二十四證歌。

此疾酒色氣風
食五事過度。

痔證分三八。憑君子細看。莫教年日久。見者
膽心寒。菱角看形慳。蓮花不可觀。穿腸并鼠
妳。酒色兩相干。莫領翻花怨。蜂窠亦不寬。雌
雄同氣血。子母及腸盤。玄珠由可慳。勾腸痛
若鑽。核桃與漆炆。見者便心酸。嚙子於中大。
雞心在外安。珊瑚形可惡。那更脫肛難。內痔
紅不出。搭腸裏內盤。垂珠更難治。日久有難
冠。切莫輕刀火。令君性命殘。用上無半了。去

病更除根。

用喚藥用此

紅肉膏治痔

辰砂

黃丹各一錢

乳香半錢研

白礬兩一

砒半兩用白礬鋪底火煨七分

巴豆三箇

則九

右為末。每用二錢。斑猫三箇。香油一兩。同一處煎。斑猫。巴豆赤為度。去二味。只用油調藥末成膏子。看大小貼之。一二日一次換藥。至六七日看焦黑。不用塗用搥藥末。

破已破。用紙撻子任藥入瘡為妙。

金花散洗痔

無名異錢半

黃蘗兩

黃連半兩

烏黑豆半

右為末。溫洗了。用海蛤散傅。

龍骨海蛤散

蕪荑兩

龍骨

海蛤錢各一

蜜陀僧錢半

右為末先摻。次用貼痔膏。日一次貼。

乳香膏貼痔

茱萸

白芨

白斂

黃連

黃蘗

當歸各等

右用香油四兩。入柳枝三尺四寸長同煎。柳枝黑爲度。入前藥末同煎紫色。用絹濾去滓。再煎數沸。次入黃丹。乳香一二錢。熬成膏。以瓦瓶盛藏。用少許貼瘡上立効。凡下痔。先服通血積藥。一日二次。方用喚痔藥。

當歸飲。通血積。

黃連

大麻子

當歸各半

右爲末。用一錢。嚼溫酒下。又將通真丸一粒臨卧再服。

通真煨姜丸

良姜炮

柯子炮

肉桂皮

木香

肉豆蔻

破故紙

制丸

茴香

葫蘆巴

末六硃一

右研勻醋糊丸。如梧桐子大。用一錢重木瓜生姜藥一處濕紙裏煨香熟。溫酒下。

下高散

飲不思食

苦參一兩

蓬莪朮炮

益智皮

荊芥穗炒各

右為末。每服一錢。水一盞。姜蜜同煎八分。
入鹽。虛心服。

洗腸犀角散

骨碎補

川山甲蛤粉炒

甘草根

玄胡索生用

右為細末。茶調半錢。空心服。

止痛麥煎散

滑石錢三

鼈甲錢肆

川烏去皮

秦芫錢肆

前胡肆

右為末。每二錢。小麥三十五粒同煎至七分。通口服。不拘時。三四服見效。

黑神黃耆散

京墨兩

黃牛角隻

蛇蛻一條

檳榔三箇

川山甲

蔓荊子

黑狗脊毛去

枳殼各去皮兩黃京子七蚌

猪牙皂角針

右為末。以瓜棗五箇。去子入藥在內。用新瓦瓶盛之。後用黃泥固濟火煨。烟盡。末入沒藥青木香各一錢。

白蕪美碎

荆芥兩

右爲末。同煎藥一處服二錢。胡桃酒下。日
三服。茶亦可。

宣風散

巴豆泔

大黃炮

朴硝

枳殼

陳皮瀝去

右各等分。每服二錢。水一盞煎至七分。溫
服。如服藥後大便結澀。二三日可服。

木通散

人參錢

斑猫炒。足。去殼。

鶴虱

大黃

牡蠣煨

枳殼各等

萹澄茄餅

丁香炒

右為末。糯米糊為丸。如梧桐子大。每服五丸。煎沙糖湯下。此藥恐不可用。

收膿膏

海金砂

乳香

白芨

雄黃各等

右為末。入瘡口。次以乳香膏貼之。

車前散

食茱萸

車前子

雄黃

乳香

赤石脂

龍骨各一錢。

右為末。摻瘡口。以乳香膏壓之。一日二次。
如瘡口乾。只用乳香膏貼。有清水出。用後
藥注青膏。

注青膏

五倍子

樹九

生三箇玄胡索

白礬

各一錢

右為末。服少許。如清水出。以紙貼膏。藥入
瘡口內。

金花散

鬱金

甘草炙

白姜炮

槐花炒各兩

右為末。每服二錢。空心。陳米飲下。
山甲散

五倍子生

川山甲焙各兩

右為末。瀉血水者。服二錢。空心。陳米飲下。
解腸散。治藏毒瀉血。

葳靈仙

莖生絡

貫眾兩

右為末。每服二錢。麝香酒調服。

凡內痔用葱涎膏。次用洗腸當歸丸。次用
取血當歸散。次用取血黃連丸。次日上紅

肉膏。凡服藥。忌猪血毒食。及去風。不可摩
動藥。有惡水出汗好肉生瘡。以和風膏。妨
出入。以藥塗綿子掩痔上。綿托帛縛。日二
次上。重十日。輕八日。若有痔。曰連腸。若惡
滯腰間疼者。用肉桂膏貼。腰煩痛。以通心
散逐日服。次下丁高散。煨姜丸。枳殼散。落
洗用海蛤散。附之乳香膏貼。退痔勻腸散。
收腸貼頂散。

治痔久不差變漏。不戒酒色服藥耳。治則
先用紙摵子。細看大小淺深。即服通真丸。

黃耆散。以紙撚貼紅肉膏入瘡。一日五六次。用乳香膏入作撚子貼瘡口。日一次。三五次進藥入瘡內。凡取爛肉。有血水出。方不進藥。須用收膿膏。三日後用藥洗三日。用龍骨海蛤散摻。以車前散摻口內。一日兩次。服藥至三服。至取深効。後有水出。即効也。

又神驗治痔方

信

沒藥

乳香各半錢

白礬

朴硝

綠礬各一兩

麝少

右用鐵銅鍋。先以信在鍋底。以白礬覆之。又以綠礬覆之。又以硝覆之。候成水。投乳香。末攪勻。候乾如石。方出地上。出火毒一宿。末方入麝同研。加片腦少許。用唾調塗附瘡口上四邊。一日三次。其痔自然焦落。又枳殼水浸。去穰。每二片去皮用巴豆一粒。在內。線縛。入銀石器內。米醋高一指煮乾。去豆。焙爲末。醋糊丸。每服十五丸。空心茶清下。或隨津下亦可。

腸風下血。平胃散加續斷煎服。

又方。加小麥四十九粒。去續斷。治痔上瘡。腸
蓮蓬等分。鍋內慢火微煙熏之。

治腸風下血

五倍子末服二錢麝香酒下。

剛丸

十

治痔

白礬兩

綠礬分

信兩

朴硝兩

右礬硝作一處。以少半許入建盞內。以信
成塊入中。以餘藥塗上。以炭大約二斤許。

燒四圍下。候沸。將乾。却覆細末。用砂合收。此藥經年火熟。黃色則效。而不疼。赤色則不可用。如傳外痔。可以白礬減半。如速效。可將津液調傳。不疼。甘草湯調傳。此藥久留不損。且能不疼。次用茅根湯熱洗。然後附藥。日夜三五易。凡疼發必大腸秘結。服寬腸丸。併通大便。不可燒煙。熏入腸。反爲害。暑月加百草霜黃丹調附。如痔落了。肛門腫痛。用槐皮煎湯洗。用津洗。瓦上磨枳殼附。如肛門不收。木賊朴硝煎湯附。各以

一次二次即効。未落已前。黃皮薄荷煎湯。

洗藥

初用此洗

木通

黃芩

黃柏

黑豆

劑九

右熟煎。即洗三次。

十一

急救仙方卷之九

急救仙方卷之十

例十

上清紫庭追癆仙方論法

老叟自序

傳世已久。同知姓名。惟存此文。不敢妄加其字。以俟。

者知

吾自處世以來。精研藥術。急救濟危。鍼灸明堂。無不詳覽。尋文檢籍。洞視五臟之盛衰。緬懷古人。世莫能究。至如晉景公何為而死。魏太子何為而生。吾思刮骨續筋。開腸取病。惟有傳屍之病。最為難測。雖是患起一身。變動萬種矣。為醫者。能明脉候。察

病根本。如此治療。固不為難。若差毫釐。則失千里。夫傳屍癆者。皆因三屍鬼。疰九蟲。傳災具。載其原。以開未悟。

總論傳癆

傳屍癆瘵。皆心受病。氣結血凝。故有成蟲者。蓋由飲食酒色。附十憂思喪真。遂至於此。九蟲為蠱。以血凝而氣養之。氣血在胞。即為正氣。氣中即為癆塊。凝在心部。即為蟲。悉由不正其心。憂思業緣所致。三屍九蟲之為害。治者不可不知其詳。九蟲之內而六

蟲傳於六代。三蟲不傳者。蝟。蚘。寸白也。六蟲之內。或藏種毒而生。或親屬習染而傳。疾之初覺。精神恍惚。氣候不調。切在戒忌。酒色。調節飲食。如或不然。五心煩燥。心腎夜汗。心乃忪悸。如此十日。頓成骨瘦面黃。光潤。此其證也。妄信邪師。祈禳求福。庸醫用藥。延蔓歲時。方知病重。苟非警戒。禍福反掌。此人死後。兄弟子孫。骨肉親屬。綿綿相傳。以至滅族。大抵六蟲一旬之中。遍行四穴。周而復始。病經遇木氣而生。立春一

日後方食起。三日一食。五日一退。方其作苦。百體有痛。蟲之食也。退即還穴醉睡。一醉五日。其病乍靜。俟其退醉之時。方可投符用藥。不然。蟲熟於符藥之後。不能治也。一蟲在身中遊十二穴。六蟲共占七十二穴。一月之中。例十上十日。蟲頭向上。二從心至頭遊四穴。中十日。蟲頭向內。從心至臍遊四穴。下十日。蟲頭向下。從臍至足遊四穴。若投符用藥可知。如紫蠶苗在汗中。蓋蟲性已通靈。切在精審。其或取蟲不補。即學淺妄。

行。徒費貲財。終無去病之理。可不悲哉。師曰。治傳屍癆者。先須知正氣與毒氣並行。故臟腑有礙。即成蟲狀。遇陽日長雄。陰日長雌。其食先臟腑脂膏。故其色白。五臟六腑一經食損。即皮聚毛脫。婦人即月信不行。血脈皆損。不能榮五臟六腑也。七十日後。食人血肉盡。故其蟲黃赤。損於肌肉。故變瘦劣。飲食不能。爲膚筋緩。不能收持。一百二十日外。肉食盡。故其蟲紫。即食精髓。傳於腎中食精。故其蟲色黑。食髓。即骨

痿不能起於床枕。諸蟲久即生毛。毛色雜花。鍾孕五臟五行之氣。傳之三人。即自能飛。其狀如禽。亦多品類。傳入腎經不可救。治法之所載者能利後。其蟲色白。可三十日服藥補。其蟲黃赤。可六十日服藥補。其蟲紫黑。此疾已極。可百二十日服藥補。又云。蟲頭赤者。食患人肉。可治。頭口白者。食患人髓。其病難治。只宜斷後。故經曰。六十日者。十得七八。八十日內治者。十得三四。過此以往。未知生全。但可爲子孫除害耳。

今以六代所傳蟲狀病證。詳著于後。

第一代

蟲狀病證遊
食日治法

爲初癆病。謂初受其疾。不測病源。酒食加飡。漸覺羸瘦。治療蹉跎。乃成重病。醫人不詳其故。誤藥多死。



此蟲形如嬰
兒。背上毛長
三寸。在人身
中。



此蟲形如
鬼狀。變動。
在人臟腑
中。



此蟲如蝦蟇
變動。在人臟
腑中。

已上諸蟲。在人身中榮著之後。或大或小。令人夢寐顛倒。魂魄飛揚。精神離散。飲食不減。形容漸羸。四肢酸疼。百節勞倦。增寒壯熱。背膊拘急。頭腦疼痛。口苦舌乾。面無顏色。鼻流清涕。虛汗常多。行步艱辛。眼睛多痛。其蟲遇丙丁日。食起。醉歸心俞穴中。四穴輪轉。周而復始。俟蟲太醉。方可醫灸。取出蟲後。用藥補心。守靈散

第二代


爲覺癆病。謂傳受此病已覺。病者患人乃自

知夜夢不祥。與亡人爲伴侶。醒後全無情思。昏沉似醉。神識不安。所食味輒成患害。或氣痰發動。風毒所加。四體不和。心胃滿悶。日漸羸瘦。骨節枯乾。或嘔酸水。或是醋心。唇焦口苦。鼻塞。胃痛。背膊酸疼。虛汗常出。腰膝刺痛。如此疾狀。早須醫治。過時難療。致傷性命。

例十



此蟲形如鼠
尾長三寸許。
在人臟腑中。



此蟲形如
蝦蟇。在人
臟腑中。



此蟲形如蜈
蚣。或似手弓。
在人臟腑中。

已上諸蟲在人身中。令人氣喘。唇口多乾。咳嗽增寒。心煩壅滿。毛髮焦落。氣脹吞酸。津液漸衰。次多虛渴。鼻流清水。四肢將虛。臉赤面黃。皮膚枯瘦。腰膝無力。背脊酸疼。吐血唾膿。語言不利。鼻塞頭痛。胃膈多痰。重者心悶吐血。僵仆在地。不能自知。其蟲遇庚辛日食起。醉歸肺俞穴中。四穴輪轉。周而復始。俟蟲大醉。方可治醫。取出其蟲。補肺則差。虛成

第三代

為傳屍癆病。謂傳受病人。自尋得知之。日漸

消瘦頓改顏容。日日恓惶。夜夜憂死。不過良醫。孰死伊邇。

此蟲形如蚊蠓。俱遊臟腑中。



此蟲形如蟻。鄉大如碎血片。在五臟中。



此蟲形如刺蝟。在人腹中。

已上諸蟲。在人身中。令人三焦多昏。日常思睡。嘔吐苦汁。或吐清水。或甘或苦。粘涎常壅。腹脹虛鳴。卧後多驚。口鼻生瘡。唇黑面青。日漸消瘦。精神恍惚。魂魄飛揚。飲食不消。氣咽。

聲。乾目多昏淡。其蟲遇庚寅日。食起醉。歸厥陰穴中。四穴輪轉。周而復始。俟蟲大醉。方可治。取蟲後補氣多差。

第四代



此蟲形如
亂絲。在人
腹臟中。



此蟲形如
猪膀胱。在人
腹中。



此蟲形如
蛇虺。在人
五臟中。

已上諸蟲。在人身中。令人臟腑虛鳴。嘔逆傷

中。痲癬氣塊。增寒壯熱。肚大筋生。腰背疼痛。或虛或瘦。瀉利無時。行履困重。四肢憔悴。上急氣喘。口苦舌乾。飲食及水過多。要喫酸醎之物。其蟲遇戊己日食起。醉歸脾俞穴中。四肢輪轉。周而復始。俟蟲大醉方可治。取出蟲後。補脾為瘥。瘥停

第五代



此蟲形如鼠。似小瓶。渾無表裏背面。



此蟲形如。有頭無足。有足無頭。



此蟲變動形
如精血片。在
於腸官。

已上諸蟲入肝經而歸腎。得血而變更也。今人多怒氣逆。筋骨拳攣。四肢解散。唇黑面青。增寒壯熱。腰背疼痛。起坐無力。頭如斧斫。眼睛時痛。腎膜多淚。背膊刺痛。力乏虛羸。手足乾枯。卧著床枕不能起止。有似風中肢體。頑麻。腹內多痛。眼見黑花。忽然倒地。不省人事。夢寐不祥。覺來遍體虛汗。或有面色紅潤。如平時者。或有通靈而言未來事者。其蟲遇癸未日食起。醉歸肝俞穴中。四穴輪轉。周而復

始。俟蟲大醉。方可醫救。取蟲出後。捕肝乃得。
瘥。金明。

第六代

此代蟲有翅。足全者。千里傳。此蟲形如馬。尾有兩條。一雌一雄。



此蟲形如馬。尾有兩條。一雌一雄。



此蟲形如鬼。營在人五臟中。



此蟲形如爛面。或長或短。或如飛禽。

已上諸蟲在人身中。居於腎臟。透連脊骨。令人思食。百物要喫。身體尪羸。腰膝無力。髓寒骨熱。四體乾枯。眼見火生。或多黑暗。耳內虛。

鳴陰汗燥痒。冷汗如油。夢多鬼交。小便黃赤。醒後昏沉。臍下結硬。或奔心胃。看物如艷。心腹悶亂。骨節疼痛。食物進退。有時喘嗽。其蟲遇丑亥日。食起醉歸。腎俞穴中。四穴輪轉。周而復始。俟蟲大醉。可醫治。取蟲後。補腎填精。

瘥。

育嬰散

獨十

七

蘇遊論

論曰。大抵傳屍之候。在心胃膈滿悶。背膊煩痛。兩目不明。四肢無力。雖欲寢卧。睡常不寐。脊膂急痛。腰膝酸疼。多卧少起。狀如

佯病。每至早旦。精神尚存。有如無病。日午之後。四體微熱。面無顏色。喜見人過。常懷忿怒。纔不稱意。即多嗔恚。行立脚弱。夜卧盜汗。夢與鬼交。或見先亡。或多驚怖。有時氣息。有時咳嗽。雖思飲食。不能多食。死在須臾。精神尚好。或時微利。兩脇虛脹。口燥鼻乾。常多粘唾。有時唇赤。有時欲睡。漸就沉羸。猶如涸魚。不覺死也。又曰。傳屍之候。老少男女。皆有此疾。大抵五行相克而生。穴內傳。毒氣。周遍五臟。漸熱羸瘦。以至于死。死訖。又傳家親一人。以其劫傳。卒于故日。傳屍。亦名傳症。○卒起。號曰殭屍。

○氣息嗽者。名

○骨體身中熱。

○內傳五

復連。不肺痿疾。

○緝為骨蒸。

○藏名曰

者。乃至淋門。

○假如男女虛損。

○吳楚乃

其源先從腎起。初受之氣。兩脛酸疼。腰背

拘急。行立脚弱。飲食咸少。兩耳颼颼。真似

風聲。夜卧遺泄。陰汗痿弱。腎既受訖。次傳

於心。心初受氣。夜卧心驚。或多恐悸。心懸

之氣。吸吸欲盡。夢見傳於先亡。有時盜汗。

飲食無味。口内生瘡。心氣煩熱。惟欲眠卧。

朝輕夕重。兩頰口唇悉皆紋赤。如傳臙脂。

又時手足五心煩熱。心受已。次傳於肺。肺初受氣。咳嗽。氣力微痛。有時喘氣。卧即便甚。鼻口乾燥。不聞香臭。如或忽聞。惟覺枯腐物氣。有時惡心。憤憤欲吐。肌膚枯燥。時或疼痛。或似蟲行。乾皮細起。狀若麩片。肺既受已。次傳於肝。肝初受氣。兩目眈眈。面無血色。尚欲顰眉。眼視不遠。目常乾澀。又時赤痛。或復睛黃。朝昏憎羞。常欲合眼。及時睡卧。常睡不著。肝既受已。次傳於脾。脾初受氣。兩肋虛脹。食不消化。又時瀉利水。

第十

穀生蟲。有時肚痛腹脹雷鳴。唇口焦乾。或生瘡腫。毛髮乾聳。無有光潤。或時上氣。撐肩喘息。痢赤黑汁。見此證者。乃不治也。

夫骨蒸 殮殍 復連 屍症 癆症

蟲症 毒症 熱症 冷症 食症 鬼

症等。皆曰傳屍者。以症者。注也。病自上注也。與人相似。故曰症。其變有二十二種。或三十六種。或九十九種。大略令人寒熱盜汗。夢與鬼交。遺精白濁。髮乾而聳。或腹內有塊。或腦後兩邊有小結。復連數箇。或聚

或散沈沈默默。咳嗽痰涎。或咯膿血。如肺痿。肺癰狀。或復下痢羸瘦。困乏。不自勝持。積月累年。以至於死。死復傳症。易傳親人。乃至滅門者是也。更有蜚蟲遺屍。寒屍。喪屍。屍症等。謂之五屍。及大小附症等證。不的知其所苦。無處不惡。乃挾諸鬼邪而害人。其證多端。傳變推遷。難以推測。故自古及今。愈此病者十不一得。所謂狸骨獺肝。天靈蓋銅鎖鼻。徒有其說。未嘗取効。惟膏肓俞崔氏穴法。若聞早灸之。可否幾半。晚

亦不濟也。

癆瘵諸證

病者。增寒壯熱。自汗面白。目眩口苦。○
精神不守。恐畏不能獨卧。其傳在肝。○
寒熱面黑。鼻燥。忽喜忘大。便在肝。○
苦難。或復清溺。口瘡。其傳在心。○
面青唇黃。舌舉。強不能飲食。無味。○
四肢羸瘦。口吐涎沫。其傳在脾。○
發熱。面赤鼻乾。口燥毛折。略嗽喘。○
急時吐白涎。或有血。其傳在肺。○
增熱。面黃耳輪焦枯。斷骨。○
痛。小便血。濁遠溼。其傳在腎。○
種。隨證皆可。考若眉毛折。○
髮焦。肌膚甲錯。其莖在脾。○
爛。剝其肉。○髮焦鼻切。或復。○
萎在肉。○尿血。其莖在血。○
在脉。瓜。甲焦枯。日昏。兩膝痛。其莖在骨。○
版。扞齒黑。癢燥。大杆。醉痛。其莖在骨。○
背脊

香草乃三屍九蟲所憎之物。煮湯沐浴。其蟲必死。今之人病莫重於癘。癘天下名醫多不能療。蓋由一人得病傳染子孫親姻族屬。故曰傳屍癘。乃至滅門盡族。故人皆畏之。或焚屍山林。殞棄江湖。不入墳墓。族屬無骨肉之親。夫婦棄義。合之禮有。此傷慟深可憫憐。凡覺得此病。不先焚滅三屍九蟲。服藥無效。十少一生。凡人多秘此法。不傳於世。人以疾呼。為宿業甘心受病。至死無憾。嗟乎。誤矣。今述上聖之方。以救世人。三月。四月。取香草葉五

片。熟擣解衣坐之。令氣入下部。散入腹中。從旦至暮。其屍蟲盡去。蓋三屍九蟲常居人身。貪煞每至庚申。將人罪奏上天。令人夭死。故老君三屍經纂云。夫人生也。皆寄形於父母。抱五穀之精。是以腹中盡皆屍蟲。爲人之害。至庚申夜告。

天帝記人罪過。落人生籍。令人速死。魂升于天。魄沈於淵。惟有屍蟲獨在。名曰鬼。若不依時祭祀。輒爲人祟。損人性命也。

守庚申法

夫人生於世。上至國王。次至大臣。下至僧道。庶人。多少不定也。惟有女人。此疾尤甚。學道之士。若不去三屍九蟲以求長生者。終不可得也。每值庚申日。其夜不睡。守之至曉。覺見體瘦倦。方可投睡。令人數覺。此蟲不得去。奏事也。

第十一

十一

大帝玄科云。六月八日及庚申日。北帝開諸生門。聽諸法。詞訟既作。過滿五百者。其人必死也。宜守庚申鎮伏三屍九蟲。守庚申。三屍長絕。使人精神爽利。五神恬靜。搔擾每夜之時。

叩齒三十六通。以左手捧心呼三屍名。上屍彭瑤出。中屍彭瓊出。下屍彭璿出。輒不得爲害。常以庚申去手甲。丑日去足甲。每年七月十六日將所去手足甲燒灰和水服之。三屍九蟲皆滅。名曰斬三屍。

修合藥法

凡修合藥時。先須齋戒。志心焚香。淨掃一室。不得令雞犬貓兒仔子婦人一切穢濁之物來見。然後驗。

醫傳屍方越王文

湖南長老法名清。於南嶽天福二年八月十二日。收得越王時古方。前越王說文後有方及符法。自後醫救萬餘人。於淳化九年。傳授於丁相公。後至祥符七年。雷使得此方。後救百餘人。越王留文曰。駙馬劉志家三百餘口。因買一婢。姓馮名捧書。一日忽患寒熱不定。服藥無効。約得一百餘日。甚瘦弱。忽然而死。不經五日。有子劉祥。年二十歲。忽然而得疾如前婢。服藥醫救。又百餘日。忽然而死。自後如此病者。死百餘人。

皆爲此疾。又駙馬忽然有此寒熱。服藥無效。越王遂大張於朝門。詔名醫。十日。茅山道士。姓李名同。因入越王城。問天使。天使曰。並未有識此證。先生莫能治此疾。先生曰。此疾多證。或死不明。或夢中得物。夢中見蟲。夢中同行。樹十或同酒食。語話出入。惡風。又有令人寒熱。有嗽者。有或傳染前患者。衣服家事皆受此患也。其傳氣出。屍蟲多飛入衣服。具化卵。若得人氣血。立化爲蟲。自髮尾毛孔先食血脈。次食五臟。令人

瘦弱。如食心臟後。其蟲即化為鬼。其藥不能醫治。若未食心臟。下藥投符取蟲。蟲瀉下皆治疾。共八九傳。只有屍氣無蟲。藥下取惡物青黃如膠。亦安也。立去身上衣服。如前死人等物。三日不得在家使用。患人收掌。如不信。立依前受疾。劉志乃煎鬼哭飲子

取傳屍癆蟲鬼哭飲子

天靈蓋

酥炙

鼈甲

酥炙

柴胡

去蘆

阿魏

安息香

貫衆

桃仁

二十一箇。去反天。

木香

十分

鼓心

半合

青蒿

半握

甘草

二寸生對

檳榔

各一分

辰砂

半分別研

麝

一錢別研

赤脚蜈蚣

以竹筒盛薑汁浸乾取一分用

烏雞糞

一分先令雞於五日後方取其糞用

右件自檳榔起五味爲末研勻分爲三貼

於六甲建日或除日貼此藥先以童子小

便二升隔夜浸煎藥十一味於星斗露天

之下至四更時煎至八分瀝去渣分爲三

服每服用散子藥一貼五更初溫溫頓服

即穩睡卧至二三點時又喫一服至日出

時覺腹中欲利。如未覺。又進一服。是第三服。如利。即不用進此第三服也。取下惡物。并蟲。以盆盛之。其蟲或似蜣螂。蛇虺。或如蜈蚣。蜘蛛。蚯蚓狀。急以油火并穢物。併燒殺之。其身上所著衣服。薦褥。盡易燒之。食葱粥。將近不佳。服後主療。數日後。夜夢人哭泣。相別。是其驗也。如取下得蟲。看其背。或青赤黃色。可療。如黑色與白色。乃是食人精髓。即不可療也。雖不可療。亦絕後患。又合此藥時。却不得令患人聞其氣息。恐

蟲聞其氣後難取下。并煎時亦不得令聞知。合藥亦不得在病家。

治癆取蟲經驗天靈蓋散

天靈蓋

兩指大。以檀香煎湯洗過。用漆塗灸。呪七過云。雷公神電。毋聖

逢傳癆便須令急急如律令

阿魏

二分。細研。

麝香

三分。別研。

辰砂

一分。別研。

安息香

三分。銅刀

子切。入鉢內研。同諸藥拌和。

檳榔

如雞心者。五箇。

末

連珠甘遂

二分。為末。一本不用此味。

右六味研極細。和令勻。每服三大錢。同後湯使下。

薤白

葱白

各二
七莖

青蒿

二
握

甘草

二莖
五
寸許

桃枝

以下莖
用向
東南
嫩者

柳枝

各二握
七寸許

桑白皮

一云
桑枝

酸石榴根

一
云

右八味。須選淨潔處。採用童子小便四升。

於銀石器內。

例十

文武火煎至一升。

十四

濾去渣。分

作三盞。將前藥末調下。五更初服。男患女煎。女患男煎。服藥後如覺欲吐。即用白梅肉止之。五更盡。覺臟腑鳴。須轉下蟲及惡物。黃水異糞異物。若一服未下。如人行五

七里。又進一服。至天明更進一服。並溫喫。如瀉不止。用龍骨黃連等分為末。熱水調下五錢。次喫白梅粥補之。

論已試功效

出叟自老叟處得此神方。應驗非一。今連一二事。書于篇後。庶使來者知用藥之功效焉。

一職方郎中游烈者。邵武寧人也。其子之婦年十六。得病。渾身壯熱。咳嗽。痰涎。月候不通。飲食減少。不歲餘。衆醫不救。用天靈蓋散服之。取下蟲一枚。如蜈蚣之狀。當時

針入沸油鼎中煎之。投於江。遂瘥。

一有一男子三十歲餘。患病慳慳。飲食倍多。而不生肌肉。每日常須肉食。如或稍飢。腹內疼痛。倦怠。遂以天靈蓋散服之。取下赤小蟲。其數有十。內有一蟲。其色微紫。大於衆蟲。頭有細毛。自後用藥補理。十五遂安。兼進真蘇合香丸。一有男子一人。年五十。每日須酒數升。空心未飲。則兩手與脚並皆振動。得酒一升。飲之少減。若至醉。則手足不動。俗謂酒疾。醫議之。是振風。累日針

炎服藥無效。疑其蟲。遂服天靈蓋散。取下一物如烏梅之狀。撥之有足。正類蜘蛛。其疾頓愈。不復飲酒。前効如此。問病之士。宜加審焉。

急救仙方卷之十

急教仙方卷一

急救仙方卷之十一

捌十一

上清紫庭追癆仙方品

麝香散。治男子婦人傳屍骨蒸食熱五癆。

天靈蓋

麝香

各一分

柴胡

兩一

犀角屑

兩半

阿膠

東引桃枝

青蒿

東引柳枝

石榴皮

四味各一兩

甘草

三寸。患人中指長。男左女右

薤白

葱白

各七寸

右件爲末。用童便二升半。浸藥一宿。明日早晚煎至升半。去渣服之。若男子病。女人

煎女病男煎。忌貓雞犬驢馬。僧尼孕婦。生人孝子。並不令見之。煎成飲後。分爲三服。入檳榔末三錢。溫服。初服約人行三五里。遠便再進一服。慮有惡心。以白梅與他含止之。服三五服。病止。即瀉出異物。若蟲如頭髮。馬尾身。赤口黑。身上如蠟行。不可名狀。瀉後。葱粥飲補之。同時藥煎補五臟伏神散。忌風一月。忌食油膩濕麵。鹹味。并牛豬雞鴨犬等物。服此藥無不當。日差。凡天下治勞。服之亦須累日及年。猶未全去。

病源者。不似此方。至遠年。重病。不過兩劑。如病未多。即一劑。飲子。便當服此。伏神散。不問遠年。近日。取效。下蟲。紅色。便可治。肚下黑。差成否。肚下白色。是食髓也。萬不一。麩。補方。服伏神散。

白伏神

茯苓

人參

遠志

龍骨

肉桂

甘草

陳皮炒各

當歸

五味子

各一兩半

黃耆

二兩

大棗

五十箇

右件爲散。分作八服。細末。每服入棗七箇。

生姜二錢。用水一升半煎至一升。趁前藥後喫。亦空心服。神效。此是神人所授靈妙秘方。此方前後活數百人也。

神效散。治諸傳屍癘氣殺蟲。此方得之于河源郡王府。濟世極多。功不可量。

川椒

二斤。制十一口者。擇去子合炒出汗。

二

右爲末。每服二錢。空心。米湯調下。或酒糊丸如梧桐子大。每服三五十粒。神仙秘方。取癘蟲。

青桑皮

楊柳枝

梅枝

石榴枝

一方無此味

桃枝

正東引者各七莖。四寸許

葱白

七莖

阿魏

一錢。別研

安息香

真者一分。

并去石

青蒿

一握。如無以子代之

右八味除魏香外。餘用童子便一升半煮。藥煎及一半去滓。將藥汁化魏香再煎十數沸。去滓。候溫。分作二次調服。

辰砂

研末

檳榔

研末。各半錢

麝香

少許。另研

右研極細末。分爲二服。五更初一服。三點時一服。至已暖必取下蟲。紅者可救。青者不治。但有所下。即用熱油煎殺。即進飲粥。

飯溫暖相息。不用性及食生冷毒物。仍先服紙丸子。法見後。合此藥時。須擇良日。焚香祝告天地。令病人設榻於福德方。服即有神效。不可令病人先知氣味。亦不得令猫犬孝服。穢惡婦人等見之。

金明散補肝臟勞極

樹上一

三

人參

知母

茯苓

丁香

秦芫

去蘆

甘草

炙

石膏

煨各等分

右件爲細末。每服二錢。水一盞。葱白三寸。

同煎至八分。通口服。

守靈散。補心臟勞極。

白茯苓

丁香

訶子

各一兩

桔梗

芍藥

羌活

甘草

各一分

右件爲細末。每服二錢。水一盞。入銀耳環一隻。葱白三寸。同煎至八分。通口服。
菟停散。補脾臟勞極。

白藥子

桔梗

人參

訶子皮

茯苓

甘草

各一分

丁香

各一錢

右件爲細末。每服二錢。水一盞。入蜜一匙。同煎至八分。通口服。虛成散。補肺臟勞極。

枳實

去穢皮心

秦艽

去皮

白茯苓

芍藥

麻黃

去節

玄胡索

當歸

洗淨

茴香

炒各半兩

甘草

炙一分

右件爲極細末。每服二錢。水一盞。銀耳環一對。蜜五點。同煎至八分。通口服。育嬰散。補腎臟虛勞。

香附子

炒

附子

炮一

木香

白茯苓

去角各一分

白茯苓

半兩

甘草

炙一分

右件為細末。每服二錢。水一盞。姜七片。葱

白同煎至七分。空心服。

龍胆丸。治積熱癆瘦。不食。壓熱壅。消瘡腫。解

肌骨。散解毒滯。

草龍胆

柴胡

地骨皮

黃芩

一方不用此味。如挾芩

鼈甲

醋炙。各一兩

桃仁

去皮尖

山梔子

陳皮

當歸

大黃

甘草

炙。各
半兩

右為細末。鍊蜜為丸。梧桐子大。每服二十丸。空心。用溫熱水吞下。如小兒。加減丸數。無比丸。治傳屍癆。服至一月。愈。其餘勞瘦之疾。數服取效。

紫河車

二兩。煮醋浸一宿。焙乾為末。

芍藥

鼈甲

半兩。醋炙。

桔梗

胡黃連

大黃

炮

甘草

炙

草龍胆

苦參

黃藥子

知母

貝母

去心

秋石

研

豉心

炙

莪朮

云無此味

礞石

犀角屑各二分

右件爲細末。鍊蜜爲丸如梧桐子大。每服二十九。溫酒吞下。如腸蟲熱。食前服。膈上熱。食後服。

劑十一

五

奪命散

鼈甲醋炙

天靈蓋醋浸一宿。酥塗炙黃。

柴胡去蘆

青蒿

知母各兩

甘草

人參各半兩

阿魏四棗子大

葱白一握

桃仁二十一箇。皮尖。麩炒。

右以天靈蓋。鼈甲爲末。次下人參。知母。柴胡。甘草。又同搗。次下葱白。青蒿。桃仁。阿魏。杵成餅子。慢火焙乾爲末。稱二錢。用童子小便二盞。煎至一盞。去滓。露星。丰。下一宿。至五更三點。暖服半盞。服了。衣被蓋卧。天明又煖半盞。扶行病人服。强行五七步。三日更不得洗手面指頭。候生毛爲驗。每日早晨先喫白湯投之。

天竺黃飲子

天竺黃

麥門冬

去心。各
一兩

人參

茯苓

甘草

茯神

生地黃

乾

遠志

去心

防風

龍骨

各半兩

玄胡索

七枚

大腹子

十一箇

犀角

另

右咬咀。爲末。用水二升半煎至一升。分作

三服。溫服。忌一切毒物。如治久卧床枕。此

藥先看十指毛色如藕白者可治。紫黑色

者難治。

麝香散。治婦人室女一切蓄熱。腹內悶著。骨

蒸。室女經脉不行。瘦勞肌熱。

威靈仙

四兩。細末。

雄黃

麝香

各一分。二味另研。

乾漆

一兩。碎。炒令煙盡。

右件為末再研。每服一大錢。水八分盞煎。至六分。空心。和渣溫服。當有惡穢毒物下。並是病根。此藥頗難服。可以蒸餅糊為丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十九丸。茶湯任下。次服桃仁散。

桃仁散

桃仁

湯泡去皮。元。麩炒令黃。

赤茯苓

各一兩。去皮。

芍藥

人參

各三錢。

檳榔

四錢。

陳皮三分
去白

犀角

安息香各一
分

麝香二錢

右爲細末。研勻。每服二錢。姜五片。水一盞。煎至六分。早晚食前服。若取下其蟲頭赤。便服天竺黃飲子。補護心臟。未取下蟲。亦須先服之。護心。

柴胡散。治童稚骨蒸熱。葱解傷寒後肌熱。

柴胡

川大黃

乾漆炒

秦艽

甘草

常山各一
兩

鼈甲三兩
燒炙

右咬咀。每服一錢。用水一盞。入小麥一撮。同煎七分。冷服。

取蟲藥。取啄木禽一隻。朱砂四兩。精猪肉四兩。餵木禽一晝夜。飢甚。將朱砂作菘豆大。相和在切碎肉片子肉。若無啄木禽。晝將繫禽

用鹽泥固濟入禽在內。用剛火煨一夜。來日

不見太陽取出。不得打破。同固濟鹽泥入地埋二尺許。一晝夜取出。銀器內研作細末。以無灰酒作一服調下。入麝少許在藥內同調。置病人在帳中。四下緊閉。用鐵鉗候病人口

中。蟲出即鉗之。於沸油中煎殺。可預置烈火
沸油。於病人左右。如蟲出後。便令煎嘉禾散
與病人服。進粥。又煎藥。悉如前夜服。呪云。
唵摩鳴飛吽吽吒。
釣蟲丸

磁石

一兩半。有墻者。緊研為末。

龍骨

半兩

硃砂

一兩。研。

麝香

錢一

膩粉

半兩。另研。

右用蠟為丸。如小嬰桃大。每服一丸。以藥
上針穿一小竅子。以青紅線貫之。梢頭繫
一大古錢。早晨令病人向破方正坐。用溫

水吞下。候藥下咽喉中合口。以牙咬定古錢等候惡心便吐出。其蟲狀不一。急以熱油煎殺。如不吐出蟲。只吐得血絲子。或涎一二合。皆是安證。更服尋常和氣理中諸藥。三兩日決取痊瘥。其治過藥。可用溫水浴過。更可醫一二人。若是傳屍癆。一丸可活兩人。

釣蟲神幼奪命散

母丁香

一錢半

酒蠟

兩半

鼈甲

一帖和殼

水磨硫黃

二錢

石燕

一箇。火煨醋拌七次

右為細末。用蠟為丸如菽豆大。每用一九。
裝鈎子上繫緋線一條。長一丈二尺。用雪
膏少許。圓藥丸。以蠶蠶一截穿於線上。蓋
之。令病人先喫膏。後一口同藥吞下。良久。
線動用力拽出。有蟲用沸油煎殺。此藥於
端午日日未出時修合。先服紙丸。次同神
仙秘法服。

服紙丸子法

凡醫傳屍。先當齋戒志心。對聖焚香。服紙
丸子。用雞子清塗紙上。令乾。剪作錢樣大。

丸服之。然後服前件丸散。

通神散。治屍癆。

附子

箇一

大黃

兩一

牛黃

字二

右件為末。加桃柳枝青蒿各七握。剉碎。用童子小便半碗浸一宿。來日五更初煎數十沸。瀝滓。調散子一半。喫服了。以衣被蓋便睡。取下惡物。自住不用。利下時用盆子盛。看何物在其中。蟲類有四。一頭如馬尾。二似亂髮。三似蜈蚣。四如雞子。或破綿絮。後要有一人來別此。忌硬物茶炙博鳴蟹。

血生冷油膩醃藏等物。後服藥。

甘草

黃連

當歸

木香

各半兩

右將酒二升。薹器內煎取五合。傾出。煎四
味熬看軟硬。和丸如梧桐子大。空心。晚後
酒或鹽湯下三十九丸。

第十一

九

紫河車丹。治飛屍鬼症。虛勞羸瘦。喘嗽氣。

其法。取男子首經兒。先以皂水洗淨。次以
銚子內用米醋堞洗控乾。將一小小焙籠。
以低周圍密糊。不令失火氣。或無小焙籠。

只用小籃子去繫。蜜糊安紫河車於上。用烈火焙。更將參子蓋之。焙令極乾。約只有十二三文重。候極乾至乾了。更入後藥。

人參一兩半

木香兩半

白朮炒

白茯苓

伏神

當歸

熟地黄各一兩

乳香別研

沒藥各四錢

朱砂二錢別研

麝香二錢

右件為細末。用諸藥和勻。紅酒糊為丸。如梧子大。每服五十九。煎人參湯下。空心。日午四服。鍊蜜丸亦得。

明目丹。又傳追下屍蟲。治傳屍癆。

白兔糞

中秋夜取四十丸。生野中者佳。

硃砂

右研為細末。鍊蜜丸。梧子大。每服七丸。用甘草半兩。生槌碎。以水一盞。採取濃汁。若患人瘦弱。即炙過甘草。五更空心服。預戒患人不得心燥。冷服不妨。小瘡兩日再服。下蟲為准。須上旬服。

青蒿飲。治癆疾。

青蒿

赤根者。取子一升。葉五兩。陰乾。

桃枝

三兩。嫩者。

柴胡

甘草

各一兩。

柳枝

三兩。嫩者。

地骨皮

二兩

梔子仁

一兩

量惠
人虛費月

右咬咀。每服三錢。水一盞。烏梅兩箇煎至七分。溫服。不拘時。

柴胡散補虛勞。

柴胡

人參

白茯苓

側十一

十

桔梗

芍藥

青皮

去白

川當歸

酒浸
一宿

麥門冬

去心

川芎

升麻

桑白皮

白朮

米泔浸
一宿

甘草

各一兩

右件為細末。每服二錢。水一盞煎至七分。

通口服。

鼈甲煎補虛勞。

鼈甲一枚。醋炙令黃。柴胡去

甘草炙桔梗

人參名一兩麝香半錢

胡黃連 地骨皮

木香半兩真酥

官桂半兩。去粗皮。不見火。

右件為細末。用青蒿一斤。童便五升。熬青蒿汁約二升。瀉去滓。入酥蜜再熬成膏。疾

川當歸

赤芍

杏仁去皮炒

宣連各一錢

白沙蜜各三兩

冷入藥末。搜和爲丸。如梧子大。每服十五丸。溫酒下。米飲亦可。日進三服。如秋冬時。更入桃柳心七箇。與前柴胡散同煎服。貫衆丸。去三屍五虫。

貫衆

五分。殺伏屍。

白蔞蘆

三分。殺虫。

蜀漆

三分。殺白虫。

厚朴

三分。殺肺虫。

狼牙子

四分。殺腸虫。

僵蚕

四分。殺腸虫。

雷丸

六分。殺赤虫。

雄黃

三分。殺屍虫。

蕪荑

五分。殺差虫。

右揀淨焙乾。炒令黃色。搗爲細末。鍊蜜爲丸。如梧子大。川水下五丸。三服。可漸加至。

十九。二十九。服之二十日。百病皆愈。三屍九蟲自滅。服者須齋戒恭敬。婦人絕孕。服之有子。

桂心丸。神仙去三屍九蟲。

熟地黄

三兩

乾漆

半兩

桂心

一兩

右爲細末。鍊蜜爲丸。如梧子大。每服七丸。米飲送下。

雄黃丸。又去三屍九蟲。

雄黃

所

松脂

各一兩

右溶脂爲丸。如蓮子大。平旦吞一丸。服七

日。三屍盡去。
輕骨散。治勞嗽。

烏梅

龍胆草

胡黃連

貝母

知母

鼈甲醋炙

桔梗

秦艽

柴胡

甘草炙

山梔子去皮

人參

青蒿酒煮

阿膠炒

杏仁去皮尖

右件晒乾為末。用好京墨一寸。以井花水磨調前藥末。作餅子如大指頭大。透風處。窞乾二七日方用。每服一餅。井水磨化。又

用沒藥五十磨成一盞。於五更。又用黃皮末二錢。同煎數沸。却入盞內。頻頻打轉。通口於五更時。輕輕起吃。纔服了。便睡。令病人仰卧。甚者不過三服。

蛤蚧散。又治勞瘦。

白茯苓

劉十一一兩。去烏皮。入銚內。十二

桑白皮

二兩。用酥醋制炙。五吹。令黃色紫色。

杏仁

六兩。湯泡去皮尖雙仁者。以紙罩皮。無角出。

油盡為度。

知母

用酥醋制炒令黃熟。蛤蚧。海。榨一。入酥醋內。沒透。慢火炙乾。弄。用。

酥醋刷炙五七次。令黃

熟不得燒損無力。

貝母

二兩。用酥醋刷炙。

今黃色。三五次。

甘草

三兩。捉碎。用醋酥須

人參

一兩。大者用酥醋

熟乳酥

真好者。四十文。切作骰子大塊。入銚內。落成汁。入陳米醋。極酸

者。非亦已下和勻。同刷炙前藥。醋不宜多用。只以四合多為的。庶好利用。否則稀矣。

右件為末。每服二大錢。水一盞煎七分服。忌油膩冷毒物。如久患嗽者。初服此藥。必服鬪嗽加甚。須勤服久。則可安。須自保惜。

為妙。

治勞熱。止損止嗽。

蛤蚧

一對。洗淨。酒醃。浸炙。

胡黃連

秦艽

生地黃

熟地黃

人參

炒

側十一

柴胡

麻黃

十三

知母

貝母

杏仁

去皮尖。雙仁。取。

梢各半兩

鼈甲

一兩。酒醋炙。

桔梗

龍胆草

木香

各一錢

右件為細末。用烏梅姜棗煎服。

治虛勞方

杏仁斤

右用生姜六兩。剉碎。軟者。加人參四兩。剉碎。同置於新沙鍋內。用無根河水一斗。燒木炭文武火熬水盡為度。去生姜參滓。放冷。每服五七箇杏仁。頻頻服之。

治傳屍勞瘵方

右童子便一盞。無灰酒一盞。以新甕瓶貯之。取全豬腰子一對。於內密封泥。日晚時以慢火養熟。至中夜止。待五更初。更以火

温之發瓶。飲酒食腰子。病篤者只一月效。平日瘦怯者亦可服此。盖以血養血。絕勝金石草木之藥也。

又方。以獺肝一具。陰乾。杵末方寸匕。日三服。有效。

又方。以赤抱兒俗名王瓜焙乾為末。温酒調服。即有效。

黃帝灸二十一種癆圖并序

夫人含靈受氣。稟於五常。攝之乖理。降之大疾至。若岐黃廣記。抑有六舊經法。單行。

顯靈斯術。骨蒸病者。亦名傳屍。亦名殄殢。亦名伏連。亦名無辜。丈夫以元氣爲根本。婦人以血海爲根源。其病狀也。髮乾而短。或聚或分。或腹中有塊。或腦門結核。或卧盜汗。夢見鬼交。雖目視分明。而四肢無力。

上氣食少。

第十一

漸至沈羸。

十四

終延歲月。

遂至殞滅。餘昔忝任洛州司馬。三十日灸活一十三人。前後差者數通二百里。至於狸骨獺肝。徒聞曩說。金牙銅鼻。罕見其能。未如此方扶危救急。非止單攻骨蒸。兼亦療風。或瘴。

或勞。或邪。或僻。患狀既廣。灸愈亦多。不可具錄。聊述大槩。又恐傳說訛謬。以誤將來。今具圖形。庶令覽者易於悉。使所在流傳。頗用家藏。未暇明醫。旁求立業。返魂還魄。何難之有。遇斯疾者。可不謹歟。



肺俞二穴。在第三椎下兩傍相去一寸半。是穴理顛癩。嬰氣上。氣吐逆。返滿。脊強寒熱。不食。內痛。皮痒。傳屍。骨蒸。肺嗽。針三分。留七分。呼。得氣。即灸三壯。厥陰二穴。在第四椎下兩傍相去一寸半。是穴理遂氣吐。嘔。心痛。攣結。胃中煩悶。針入三分。留七分。得氣。可灸三壯。心俞穴。在第五椎下兩傍各一寸半。是穴理心中風。狂癩。氣亂。語悲。啼。心腹坎滿。汗不出。結積寒。疝。嘔逆。不食。食物即吐。效。腫目痛。不灸。通針三分。留七分。呼。得氣。即瀉。灸三

壯。肝俞穴在第九椎下兩傍各一寸。是穴理口乾。中風。肢滿。短氣。不食。食物不消。吐血。目不明。關塞。胃痛。肩疼。寒疝。針入三分留七分。呼。得氣。灸三壯。脾俞二穴在第十一椎下兩傍各一寸半。是穴理腰身脹滿。腹肚泄瀉。痢。身重。四肢不收。黃疸。邪氣積聚。腹痛。寒熱。針入三分留七分。呼氣。灸三壯。腎俞二穴去第十四椎下兩傍各一寸半。上一膈對。是穴理虛勞。耳聾。腎虛。水狀脹。攣急。腰痛。小便便濁。陰中疼。溺血。精出。五勞七傷。冷嘔。脚膝。

酸疼拘急。好獨卧。身腫如水。針入三分留七分。呼氣可灸三壯。大杼二穴在第一椎。膈俞二穴在第七椎。膽俞二穴在十一椎。三焦二俞二穴在十三椎。胃俞二穴在十三椎。旋俞二穴在第二十椎。仍列灸四花膏。盲為妙。師令患人平身。正直立。以細繩子一條。令脚底豎踏。男左女右。其頭上大姆指端高順。脚踵引直。上至曲脈中大橫文處截斷。患人取穴去處。一依銅人。又令患人平坐。解髮分開。兩邊從髮路沿項直下至

脊。繩子頭椎骨上。以骨點記之。患人亦依銅
 人坐也。又取繩子中鈎起至鼻住按定截口
 吻兩頭了。却將此量

取穴法。



口繩子於點記處平摺拖。兩頭勿令少有偏邪。直要端正。兩頭記處是穴中心。於點處非穴莫灸。又法令患者平身正坐。稍縮膊。取小繩子一條。拖其兩垂向前。繩兩頭高至鳩尾穴。穴在心上。頗骨下也。便截斷。却翻繩子向背拖。繩停心於喉結骨上。其繩兩頭十一雙垂。當脊上中繩子頭便點記。又法取一繩令患者人平坐。合口橫量。准前取繩子兩頭是灸穴。此通前四穴。各灸七壯至二十一壯。須加至百五十壯。乃停。候瘡欲發。又將先量口繩子

於前脊椎上垂繩子點處停心豎量以繩子
兩頭是穴點記灸之。如前法。此名四花穴。須
是離日灸之。用三月三日採艾極妙。灸疾若
了。於百日內却慎飲食。房室。且安心靜眠。如
一月覺未全安常。如初法於舊穴上再灸之。
永除害也。灸後仍服藥。製方在後。餘切讀老
叟自序論傳屍之候已詳。如灸心俞穴中取
蟲。據銅人經云。則不可用。正如此高高嗣照。
世稱良醫。雖取穴針灸。上古治法不同。豈神
聖之功。殆不可云。

一法。當於癸亥日夜二更時。六神皆聚之時。解去下體衣服。直身平立。用筆於其腰上兩傍微陷處點定。鍼家謂之腰眼。然後上床合面而卧。每灼小艾炷七壯。兩腰眼共一十四壯。勞蟲或吐出或瀉下。即可平安斷根。更不傳染。

灸後服藥

生地黄汁

青蒿汁

薄荷汁

童便

好酒

右各二升。同煎成膏入。

柴胡去蘆

鼈甲炙

秦艽各一兩

麝研

硃砂各半

右五味爲細末。入前膏爲丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。溫酒下。忌生冷毒物。

又取蟲方

凡取癆蟲。可於三節骨上一穴。膏肓二穴。每穴灸七壯。然後喫飲食調理。方下藥取蟲。其蟲或如亂絲。或如紅線者是也。

春用雄黃 硫黃 巴豆一粒 豆豉七粒

右同前藥。共和研爲丸。如梧子大。次用童

子不喫飯的小便一合。酒一盞下。

夏用蘆伏子

鶴虱

硫黃

巴豆

去一粒油

豆豉

七粒

右同前藥。丸如前。湯使下。

秋用錫灰

雄雌二黃

菘豆粉

豆豉

七粒

巴豆

一粒。去油。

右同藥爲丸。用前湯使下。

冬用雄雌二黃

錫灰

巴豆

油

豆豉

七粒

右爲丸。同前湯使下。

淨明法中治勞瘵方

度師玉真先生傳。其方須先鍊度如法。次以南木香五錢重。切碎。用新潔瓦器。慢火煎出濃汁。分作二處。留出木香渣。將在一處調朱砂書符用。一處調青蒿。用青蒿九斤重。切碎。用新潔鐵鍋水煎一日。去渣。取濃汁入前木香渣再煎。去渣。以前木香濃汁一處。慢火熬成膏。朱砂五錢重。爲細末。用前一處木香汁調。書五炁符及鍊度中。五炁符燒化入木香汁內。就用此化開青蒿膏子。與患人服。切戒勿令患者知。

之。務在志誠而為也。仍忌一切外人畜類
等見之。無不神效。此方行是法者。用之尤
為妙也。

急教仙方卷之十一

附十一

十九

後記

《急救仙方》十一卷，作者及具體成書年代不詳。是書在宋志及諸家書目中均不載。惟焦竑《國經籍志》載有《救急仙方》十一卷。注見《道藏》，亦不言作者爲誰。考白雲齋道藏目錄太元部懶字號中有《急救仙方》。全書收載婦科、外科、痔科、傷科等諸科。每卷首論診法，其後詳列治方。

卷一至卷五，備述婦科調經、胎前產后的病因、病機、診法、治療及預后。卷六、卷七，乃《仙授理傷續斷方》，收載大量傷科、外科中常見的單方、驗方；詳述傷損部位，循體位類列方藥，視病選方，或外用，或內服。卷八，專論疔瘡的診法、辨論緩急吉凶及諸種內外治法。在疔瘡診斷上，書中敘述疔瘡的各種名稱、形狀，並根據疔

瘡色澤、數量的多少來判斷吉凶，尤其強調疔瘡與全身証狀的關係。治療上注重內外並治。書中收集的方劑，多為後世醫家習用。卷九專述痔症的診法、鑒別診斷及各種治法、驗案。卷十為上清紫庭追勞仙方論法。卷十一上清紫庭追勞仙方品，備列追勞湯丸、針灸各法，各章俱詳證狀，並根據不同見證，圖文兼備，並示後學者以內科諸證的理法、方、藥，使人開卷瞭然。

《急救仙方》一書，論證詳略有致，總論弘闊，個論精深。每証之下，首言病證，次要性狀，再言病機，終論治則，而後立方，介紹功效，使讀者遵循有據，實為初學問津之著。

本次點校據上海涵芬樓影印正統道藏本為底本。