



聖濟總錄纂要

喘咳嗽

可吐可溫過經中凡傷寒濕溫時氣疫癘結胸謔語潮熱煩渴煩燥厥逆頭痛

血痺脉痺筋痺骨痺腸痺周痺痺氣熱痺傷寒

可下可汗

大風癩病烏癩白癩諸痺統論著痺行痺皮痺肌痺

瘰癧風白駁白殿風紫癩風惡風大風眉髮墮落

風頸痛偏頭痛漏風勞風風頸旋風疾胃風風和

虫血風肌肉瞤動風癩風疔風狂腦風風

共十

中武  
123  
2



門中武  
編 123  
卷 2

周氏  
杏庭

同書  
同書  
同書

聖濟總錄纂要 卷之二

世治  
聖濟  
總錄

程 林雲來 纂

汪朔周曼思 較

黃家珣藍孕

江 湘郢上 閱

諸風門

蠱風 肌肉稠動

蠱風

論曰蠱風之狀在皮膚間一身盡痛若割若刺淫淫躍躍

聖濟總錄纂要

卷之二

蠱風

身

二

聖濟總錄卷之二十一  
如中蠱毒故名蠱風皆由體虛受風侵傷正氣也

天麻丸方 治蠱風如皮膚刺割

天麻 躑躅花 獨活 附子 白附子 原蠶蛾炒

防風 蒼耳 蒺藜子 烏頭去皮臍 各一兩 麻黃去根 節

烏蛇肉 麝香 除研者外搗羅為末入麝香再研勻

鍊蜜和搗三二百下丸如梧桐子大每服二十九溫

酒下不拘時候如有汗出即宜避風

石南湯方 治六十四種風注走皮膚中如蟲行痛如刺

割狀似蠱毒及卒風面目腫起手不及頭口噤不能

言

石南 乾薑 黃芩 細辛 人參各一兩 桂 麻黃

去根 當歸 芍藥各一兩 乾地黄三分 甘草炙二兩

食茱萸一兩一分

咬咀如麻大每服六錢水酒同煎溫服得汗為度

何首烏散方 治蠱風

何首烏 威靈仙各一兩 苦參半兩 麒麟竭一分

並生搗為散入乳鉢內研三五百遍每服一錢用荆

芥湯調下每日三服酒服尤妙

薄荷丸方 治蠱風皮膚苦盡痛若刀割狀及頭目不利  
風痰等疾

薄荷葉一兩 天麻四兩 威靈仙三兩 羌活四兩 山梔子

仁二兩 蔓荊實三兩 白芷 桔梗炒 防風各一兩

大黃溼紙裹煨令紙乾一兩 人參 赤茯苓各三兩 龍腦研半兩

搗研為末并和勻鍊蜜丸如鷄頭實大每服一九食  
後細嚼茶酒任下

肌肉瞶動

論曰肌肉瞶動命曰微風蓋邪搏分肉衛氣不通陽氣內

鼓故肌肉瞶動然風之入脉善行數變亦為口眼瞶動偏  
喎之病也

虎骨丸方 治風虛肌肉瞶動手足顛掉

虎脛骨酥炙 松節剉酒炒 天麻 牛膝酒浸 赤箭 海

桐皮 獨活 石斛去根 防風 烏蛇酒浸去皮骨 酸棗

仁 當歸 仙靈脾 甜瓜子洗焙 乳香研 五加皮

各一兩

一十六味先以十五味搗羅為細末入研者乳香再  
和勻酒煮麩糊丸如梧桐子大每服十五丸至二十

九荆芥酒或茶酒任下不拘時候

天麻九方 治循經絡肌肉瞶動頭目昏眩手足麻痺

天麻 芎藭 各一兩 荆芥穗 雞蘓葉 各三兩 白附子

甘草 各二兩

右六味為末鍊蜜丸如櫻桃大每服一丸茶酒任下

荆芥湯方 治風氣肌肉瞶動頭目昏眩四肢煩疼

荆芥穗 旋復花 各四兩 前胡 甘草 炙 麻黃 去根節

芍藥 芎藭 半夏 洗七遍各一兩

每服三錢葱白三寸雞蘓二葉同煎溫服

風癩 風癩 風狂 腦風

風癩

論曰風癩之狀發無常時每發則仆地吐涎沫無所覺知蓋由血氣皆虛精神離散魂魄失守風邪入于陰經故也又以胞胎之初其母卒大驚精氣併居能令子發癩其證與風癩大率相似

丹砂煎方 治風癩疾時發時省涉歷年月

丹砂 細研水飛濾過後 石膏 五兩研細 黃連 去鬚搗篩一觔

生地黃 研取自然汁二升

共四味以清水一斗先煮石膏黃連取五升淨去滓  
次下生地黃汁又煎之如稠餈始下火取丹砂粉投  
入勺攪百餘徧貯於不津器中更攪待冷即任手每  
日兩度以溫水調服約如半彈丸大服藥後只吃淡  
飯蔓菁菜等

雄黃丸方 治五癩各有聲牛癩若牛鳴馬癩若馬鳴狗  
癩若狗鳴羊癩若羊鳴鷄癩若鷄鳴凡此五癩皆宜  
服之

雄黃 丹砂 雌黃 三味各二兩碎同用生絹袋貯之  
入十兩蜜內重湯煮待蜜赤色滴

如珠引若線為度取藥囊出河水洗滌淘漉出  
珠乾入乳鉢中研如粉為度其蜜即丸藥用  
二兩大火化用錢匙掩掠去塵垢者用精者一兩將無  
油淨器中下水銀及鉛同銷鎔攪令勻瀉于熱鐵器內  
待冷先將前三味石藥乳  
鉢內研次入鉛同研取勻 水銀 一兩

共五味各如前修製畢便將前煮丹砂雄黃雌黃餘  
蜜再重湯煮散少少點入藥中漸漸和勻為丸如大  
麻粒每用桃柳栢桑木嫩條各長七寸寸剉以水一  
升煎至六合去滓分溫下丸藥空心午時臨臥下三  
丸至五丸小兒一丸至二丸

羚羊角丸方 治風癩癩

羚羊角 犀角 遠志 人參 山藥 茯苓 各一兩半

防風 一兩三分 生地黄 三分 金箔 研 銀箔 研各一百片

麥冬 鐵粉 研 天冬 各三兩 龍齒 研二兩 水銀 一分

銀箔龍齒鐵粉五件同研水銀無星子為度

共十五味先將十味搗羅為末入別研者相拌令勻  
鍊蜜和丸如棗豆大用桃柳枝湯下二十九日二夜  
一或人參茯苓湯亦可

風癇

論曰風癇病者由心氣不足胸中蓄熱而又風邪乘之病

間作也其候多驚目童子大手足顛掉夢中叫呼身熱癩  
搖頭口噤多吐涎沫無所覺知是也然病發於陽者易差  
發於陰者難治故經曰臟病難治腑病易治又曰大人曰  
癲小兒曰癇

靈烏散方 治風癇多驚手足顛掉口吐涎沫

烏鴉 一隻臘月取于瓷瓶內盛以鹽泥固濟令乾用炭火煨存性候冷取出去肚腸研 丹砂

研一分 細辛 二兩 乾蠍 全者十枚炒

共四味將二味研末與別研二味同羅每服半錢七  
午前溫酒調下

安息香丸方 治男婦暗風癩病

安息香通明無砂石者 鉛丹 二味為細末入白羊心中血

研勻丸如梧桐子大每服十九空心溫水下

神聖丸方 治風癩涎潮等疾

雌黃 鉛丹各一兩 細研以醋一筋熬稠丸如梧桐子

大與惡實末同收每服十九臨臥煎惡實末湯下

丹砂丸方 治風邪諸癩狂言妄走精神恍惚思慮迷亂

乍歌乍哭飲食失常疾發仆地口吐白沫口噤戴眼

魂魄不守年歲深遠者

丹砂光明者研一兩 酸棗仁微炒研 乳香光瑩者研各半兩

合研令勻先令病人盡量飲酒沉醉次取藥五錢匕

酒一盞調下於靜室中安睡勿令驚動候其自覺則愈

鐵粉烏鴉散方 治風癩

烏鴉一隻去腸肚及嘴足 鉛丹 黑鉛 鐵粉研各二兩 丹砂一兩

研先將鐵粉并鉛丹入鐵器內熟炒次入黑鉛一處結成砂子入在烏鴉腹內縫合以罐子盛用物蓋定鹽泥固濟放乾用熱火一秤煨令同赤取出 天麻 羌活

搗為末次入丹砂更研如粉入後七味 獨活 防風 芎藭 乾蠖 天南星各二兩

共研為細末入麝香少許再研令勻每服半錢匕臨



臥冷酒調下

五生丸方 治癩疾

乾薑不炮

烏頭生去皮臍

半夏生用

附子生去皮臍各一兩

大豆末生用

其五味除大豆末外細剉為末以豆末煮

糊為丸如梧桐子大每服三丸冷酒下

半夏丸方 治風癩痰盛癩瘰口吐涎沫

半夏

湯浸去滑生為末五兩

白礬生為末二兩

丹砂研

鉛丹研

一兩 同研勻以粟飯為丸如梧桐子大每服食後生薑

湯下二十九

五枝煎方 治風癩多驚手足顛掉身熱癩瘰

桃枝

柳枝

桑枝

夜合枝

槐枝

並剉如豆大各一斗

大豆一升淘過

其六味用水一石慢慢火煎候豆爛及嚼

諸枝無味即濾汁於銀石器內煎令得所不可熬過

以瓷器盛每服一匙頭許入盧會末少許溫酒化破

空心徐徐服

治風癩瘰癧不省方

虎糞燥乾

野猪骨并蹄

炙各不拘多少

共研為散每日空心

以酒調下二錢忌一切有足之物

水銀丸方 治風癇

水銀兩半 雄黃研 龍腦研 牛黃研各一分 丹砂研一錢

再同研勻用糯米飲和丸如菉豆大每服五丸至七丸熟水下空心臨臥日再服

風狂

論曰風狂之狀始發則少卧不飢自高自賢自辨自貴蓋人之榮衛周身循環晝夜不窮一失其平則有血并於陰而氣并於陽者有血并於陽而氣并於陰者陰陽二氣虛實不調風邪乘虛而入并於陽則謂之重陽故其病妄笑

好樂妄行不休甚則棄衣而走登高而歌或至數日不食故曰狂也又肝藏魂魂則隨神往來悲哀動中有傷於魂則為狂妄是亦血氣俱虛風邪乘之陰陽相并也  
真珠散方 治風狂妄語心熱狂走不知人

真珠研 牛黃研 丹砂研各半兩 金箔研 銀箔研各五十片  
麝香研一錢 鐵粉研 天竺黃 人參 龍腦研各  
黃芩一兩 防風 犀角鎊各半兩 茯神三錢 麥門冬  
遠志 白鮮皮 羚羊角鎊各半兩 甘草炙  
胡黃連 甘菊花 白附子各三分

除研外搗羅為末入研藥拌勻每服一錢加至二錢薄荷溫水或梨汁調下

茯神湯方 治風狂失神少臥不飢笑樂無節棄衣登高

茯神去木 杏仁湯去皮尖雙仁各三兩 龍齒六兩 凝水石一斤

升麻二兩 石膏碎二兩 沙參 白茯苓 白鮮皮各二兩

生麥門冬四兩 剉如麻豆每服五錢水煎溫服如病甚

煎成入竹瀝半合再煎服

腦風

論曰內經謂風氣循風府而上則為腦寒夫風生高遠始

自腸經然督脉陽維之會自風府而上至腦戶腦戶者督脉足太陽之會也又太陽之脉起於目內眥上額交巔上入絡腦今風邪客搏其經稽而不行則腦髓內弱故項背怯寒而腦戶多風冷也

石膏散方 治腦風邪氣留連頭痛不已

石膏火煨研 天南星炮 白殭蠶炒

三味等分搗研為散每服二錢匕葱白二寸臘茶一

錢同連鬚葱煎湯頓服良久再服

殺精草散方 治腦風頭痛吹鼻

穀精草末

銅綠研各一錢

硝石半錢

共研和勻每用

一匙吹入鼻內或偏頭疼隨病左右吹鼻中

通關散方 治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清涕多

嚏肩項拘急頭目昏痛風府怯寒

原蠶蛾

瓦上炒令黃

白附子

炮

苦參

益智去皮

蒺藜

子

炒去角

乾薄荷

各一兩

共為散每服一錢匕溫酒調下日三服

點頭散方 治腦風頭痛吹鼻

細辛 高良薑

瓜蒂各一分

硝石半兩

共研為細散

用新水滿含一口搐藥半匙入鼻中良久即定

遠志散方 治腦風頭痛不可忍

遠志

去心不拘多少

為細散每用半匙先含水滿口即搐藥

入鼻中仍揉痛處

羌活丸方 治腦風氣鼓或膈痰氣逆上冲於頭令頭旋運

羌活

去蘆頭米泔浸一宿切焙乾二兩半

白蒺藜

炒去角

芎藭

乾鷄

蘇

各二兩 白僵蠶

去頭角炒一兩

共為細末鍊蜜和丸如彈

子大荆芥茶嚼下一粒不拘時候入龍腦麝香尤妙

何首烏丸方 治腦風鼻息不通清涕流出及諸風疾

何首烏去黑皮 芍藥一兩 桂去粗皮 烏頭 芎藭

甘草炙 藁本 甘松 羌活 天麻 陳橘皮湯浸去白

縮沙蜜去皮各二兩 墨煨存性一分 右一十三味共為末鍊

蜜和丸如櫻桃大每服一丸薄荷葱酒嚼下不計時

芎藭湯方 治腦風鼻息不通或流清涕多嚏

芎藭二兩 細辛去苗葉 黃芩去黑心各一兩 荊芥穗二兩

甘草炙判半兩 每服三錢水一盞入薄荷七葉同煎至七

分去滓溫服

吹鼻散方 治腦壅頭痛

盧會研 龍腦研 瓜蒂搗 硝石研

四味等分為末每用一豆許吹之

勝金散方 治腦風頭痛鼻塞不通或流清涕多嚏不已

荊芥穗 薄荷葉各四兩 木賊去節二兩 蛇蛻二條炙

四味搗羅為散每服二錢清茶調下食後日三服

風頭眩 風頭痛 徧頭痛

風頭眩

論曰風頭眩之狀頭與目俱運是也五臟六腑之精華皆見於目上注於頭風邪鼓於上腦轉而目系急使真氣不

聖濟總錄卷之十一  
能上達故虛則眩而心悶甚則眩而倒仆也

枳實湯方 治風頭運倒眼旋腦項急痛

枳實

去瓢 麩炒

防風

麻黃

去根節先煎 掠去沫焙乾

芎藭

各一兩

杏仁

去皮尖雙 仁炒一兩

半夏

為末生薑汁 和作餅曝乾

細辛

各二兩

麤搗篩每服五錢七以水一盞半煎至一盞去滓入

竹瀝半合更煎沸早晚食前溫服

人參湯方 治頭風眩但覺地屋俱轉目閉不開

人參

防風

白朮

當歸

酒灑 切焙

麥門冬

去心焙 各一兩

獨活

去蘆 頭

黃芪

桂

去粗 皮

芍藥

各一兩 半

麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食前溫

服日再夜一

獨活湯方 治風頭眩仆地屋轉嘔吐痰涎惡聞人聲

獨活

去蘆 頭

茯神

去木各 半兩

甘草

炙

當歸

酒洗 焙切

牡蠣

煨

白朮

附子

肉蓯蓉

酒浸切焙 各一兩

黃芪

兩 半

防風

遠志

去心 三分

人參

二兩 半

劉如麻豆每服五錢七水一盞半生薑三片棗一枚

去核煎至一盞去滓溫服不拘時

菊花湯方 治風頭眩悶起即欲倒頭痛眼疼視屋轉動

甘菊花 細辛去苗葉 各半兩 防風 前胡 茯苓 白朮

麻黃去根節 各一兩 芎藭 杏仁湯浸去皮尖 雙仁各三分

每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入竹瀝半合更

煎沸食前溫服

山藥散方 治風頭目眩眼痛耳聾

山藥 甘草 五味子 甘菊花擇各半兩 細辛

山茱萸 升麻 蔓荊實各三分 防風一兩

為細散每服三錢匕空心溫酒下

附子膏方 治風頭眩摩頭

附子去皮臍 鹽花各半兩 為細末以麻油和如稀湯洗

頭摩之日三

守中丸方 治風頭眩腦轉目系急忽然倒仆

白茯苓去黑皮 十兩 麥門冬去心 三兩 白朮 人參

甘菊花擇去梗 山藥 枸杞子各二兩 生地黄二十斤 取汁

共八味將七味擣羅為末先用生地汁於銀器內入

酥三兩白蜜三兩同煎逐旋掠取汁上金花令盡得

五升許於銀器內拌炒前七味藥漸漸令盡候乾入

白蜜同搗數千杵丸如梧桐子大每日空心或食後

清酒下五十九丸服百日後五臟充滿肌膚潤滑修合  
須擇四季旺相日或甲子日此藥亦名五之地倦金  
髓丸

風頭痛

論曰風頭痛之病由風邪客於陽經循風府而上至於頭  
腦令人頭重疼痛心膈煩熱上焦壅滯頭面虛汗診其脉  
左手寸口浮緊者是也

石膏散方 治風壅頭痛眉骨疼

- 石膏 研
- 芎藭
- 旋復花 各一兩
- 白附子 炮
- 細辛 去前

葉  
甘草 炙各一兩 其持羅為散每服半錢七臘茶調下  
不拘時候

清氣香芎湯方 治頭痛

- 芎藭 五兩
- 細辛 去前葉二兩半
- 人參 一兩半
- 半夏麴 一分用生薑和
- 半夏末 作麴用
- 甘草 炙三分
- 右五味咬咀如麻豆每服三錢
- 七水一盞入生薑三片薄荷五葉同煎七分溫服不  
拘時候

芎藭散方 治風頭痛

- 芎藭
- 莎草根 炒去毛一兩
- 藿香葉
- 荆芥穗 各一兩

風頭痛



石膏

碎一兩半

其為散每服三錢七荆芥湯調下食後服

丹砂丸方

治諸風頭痛不可忍者

丹砂

別研水飛

石膏

燒通赤地上出火毒

白附子

炮為末各一兩

龍腦

少許研

共同研令勻粟米飯丸如菘豆大更以丹砂為

衣每服五丸食後薄荷茶嚼下

六神散方

治頭痛眼睛痛

鷄蘇

芎藭

馬牙硝

研各二錢

石膏

研

乳香

研各一錢

龍腦

研一匙

共研為細末每用一匙含水搐於鼻中

吹鼻麝香散方

治頭痛不可忍

藜蘆

和州者一莖

一味暴乾研為散入麝香麻子許研勻

吹鼻中

通頂散方

治鼻塞及頭痛

馬牙硝

研細半兩

地黃汁

合一

二味相和於銅器內用慢

火煎乾取出研細每挑少許入鼻搐上吐痰即差

偏頭痛

論曰偏頭痛之狀由風邪客於陽經其經偏虛者邪氣乘於一邊痛連額角故謂之偏頭痛也

至靈散方

治偏頭痛

雄黃研 細辛去苗葉為末等分 二味再同研每用一匙

邊痛搐入右邊鼻右邊痛亦然

乳香散方 治偏頭痛不可忍

乳香如皂子大 高良薑如指頭大 二味於火上燒迎烟熏鼻

隨痛左右用之

天南星散方 治偏頭痛

天南星酸漿水煮透心硬切曝乾一兩 菊花三分 自然銅燒赤醋淬一兩

防風半兩用水一挑同菊花自然銅防風三味煮水盡為度去防風自然銅不用只單用菊花

芍藥一兩 五味除二味不用外搗羅為細散每服半錢

七臘茶清少許調只作一口呷盡分作三嚥每嚥點

頭一點

葦撥散方 治偏頭痛

葦撥 一味為細末每用一匙先令病人含滿口溫水

隨病左右搐入鼻中

漏風 勞風

漏風

論曰內經曰飲酒中風則為漏風漏風之狀或多汗不可單衣食則汗出甚則身寒喘息惡風衣裳濡口乾善渴不

能勞事又曰身熱解情汗出如浴惡風少氣亦名漏風夫酒以養陽酒入於胃與穀氣相薄熱盛於中其氣慄情與陽氣俱泄使人腠理虛而中風故其證多汗惡風不可單衣其喘息而少氣者熱薰於肺風客於皮毛也其口乾善渴者汗出多而亡津液也其解情而不能勞事者精氣耗不能營其四肢也謂之漏風以汗出不止若器之漏久而不治轉為消渴

澤瀉散方 治漏風身熱解情汗出如浴惡風少氣

澤瀉

白朮

各二兩半

麋銜

一兩

為散每服二錢沸湯調食後服

黃耆湯方 治風虛多汗夜臥尤甚牀席衣被並溼

黃耆

人參

各二兩

麻黃根

牡蠣

服赤各三兩

地骨皮

二兩半

龍骨

四兩

每服三錢大棗二枚同煎空心服二

防風散方 治風虛多汗惡風

防風

一兩一分

澤瀉

牡蠣

服赤

桂

各三分

為細散每服二錢溫酒調下空心服日再

杜仲散方 治風虛多汗夜臥尤甚

杜仲

炙炒二兩

黃芪

牡蠣

服赤各三兩

麻黃根

五兩

漏風

為細散每服二錢煎敗扇湯調下食後服日二  
勞風

論曰內經曰勞風發在肺下其為病也使人強上冥視唾  
出若涕惡風振寒夫勞風之病腎勞則根勞於下經所謂  
根弱則莖葉枯矣故日視不明而背反強腎之脉入肺中  
故因皮毛感風而振慄也腎主唾故津液凝結唾如涎涕  
治之以救其俛仰者戒其勞動也  
麻黃湯方 治勞風胸膈不利涕唾稠黏上焦壅滯喉中  
不快

麻黃去根節 荊芥穗 杏仁去皮尖雙仁 木香 當歸

黃芩去黑心 羌活 芍藥 芫胡 大黃炮熟各一分

半夏湯洗七遍去滑一錢 牽牛子半兩

每服二錢生薑一片同煎食後溫服

芎藭圓方 治勞風強上冥視

芎藭一兩 枳殼去瓢麩炒 為末鍊蜜丸如梧桐子大每服

十丸食後溫水下

萎蕤飲方 治勞風項強急痛四肢煩熱

萎蕤三兩 人參 羚羊角鎊各二兩 每半兩入豆豉三合

葱白一握以水煎分溫空腹二服

風頭旋 風痰 胃風 風秘

風頭旋

論曰風頭旋者以氣虛怯所稟不克陽氣不能上至於腦

風邪易入與氣相鼓致頭運而旋也又有腦胸之上痰水

結聚復犯大寒陰氣逆上風痰相結上衝於頭亦令頭旋

松香散方 治風頭旋

松實去殼 白芷 當歸 芎藭 甘草炙各三兩 甜瓜子

洗一升 同擣羅為細散每服二錢食後以荆芥薄荷清

茶調下

荆芥丸方 治風頭旋目痛眩肢體拘急手足少力

荆芥穗四兩 細辛 芎藭 白僵蠶炒各一兩 天麻一兩

羌活 防風 蒺藜子炒去角各一兩 同為末煉蜜丸如鷄

頭大每服一丸食後細嚼荆芥湯下茶酒亦得

人參丸方 治風頭旋目眩痰逆惡心胸膈痞滯欬嗽痰

涎喘滿嘔逆不欲飲食

人參 甘草 白朮 旋復花炒各一兩 麥門冬 前胡

枳殼各二兩 木香半兩 同擣羅為細末以湯浸炊餅和

九如梧桐子大每服二十九食後生薑湯下

祛痰丸方 治風頭旋痰逆惡心咽膈不利

天南星 生

半夏 生

赤茯苓

乾薑 炮

陳橘皮

湯浸

去白焙各等分

稀麪糊丸如梧桐子大每服二十九加至四

十九溫米飲下

羚羊角湯方 治熱毒風上攻頭面目旋運耳內虛鳴身

體癢疹麻痺

羚羊角

二兩

菊花

三兩

防風

去

羌活

前胡

藁本

玄參

黃芩

杏仁

去皮尖雙仁

菖蒲

甘草

炙各一兩

每服五錢水煎食後溫服

治頭旋腦悶鼻塞眼運貼膏頂方

蓖麻子

去殼研

杏仁

去皮研

食鹽

芎藭

搗末

松脂

各研

等分

先擣食鹽次下四味杵勻即塗於蠟紙上有病者

先灸百會三壯訖將蠟紙藥於灸處貼之日一易得

膿血出效

風痰

論曰風痰之病得於氣脉閉塞水飲積聚其狀雖有冷熱之異至於心胸痞隔飲食不化則一也蓋風壅氣滯三焦

不和則水飲易至停積風能生熱壅亦成痰是故有頭目不利神思昏濁之候其或嘔逆不納飲食者則因於胃冷而得之其治固不可一槩也

半夏飲方 治風痰心腹煩滿嘔逆不欲飲食

半夏湯浸去滑 大腹皮 麥冬 赤茯苓 白朮 桔梗

前胡各三分 青橘皮去白 厚朴薑汁炙一兩 防風 枇杷

葉拭去毛炙各半兩 每服三錢入生薑一棗大同煎稍熱服

澤瀉湯方 治風痰壅滯胸膈不利頭目昏眩不思飲食

澤瀉 前胡 白朮 赤茯苓 甘草 人參 半夏

湯洗七度切作片以生薑汁浸焙乾炒各一兩

檳榔 陳橘皮湯洗七遍去焙冬一兩

枳殼去瓢麩炒半兩

每服二錢半生薑半分同煎溫服不拘時候

鐵刷湯方 治風痰胃中有寒嘔吐痰涎胸滿氣逆

附子五枚炮令微折地上以蓋子覆冷取去皮臍 半夏湯洗七遍去滑麩炒一兩

木香半兩 剉如麻豆每服二錢入生薑一棗大大棗三

枚同煎空心食前溫服

天南星丸方 治風痰胸膈煩滿頭目昏眩

天南星一觔每枚重一兩者 用湯浸洗刮去心皮并虛軟處令

浮用法酒浸一宿以桑柴蒸不住添熱湯令釜滿既  
內氣旺更不住灑酒常令藥潤七角時滿取出用銅  
刀切開揀大者微嚼看不麻人口卽是熟未熟卽便  
蒸候熟用銅刀子細切入石臼內木杵爛擣如泥入  
丹砂一兩水飛過者麝香一兩細研羅過丁香末一  
兩龍腦一兩同擣令勻丸如鷄頭大又用丹砂末一  
兩爲衣每服一丸嚼破用薄荷茶或酒任下小兒驚  
風半丸合時忌鷄犬婦人見

前胡丸方 治風癱不散食逆嘔吐

前胡 白朮 枳殼去瓢 麩炒 半夏湯洗七遍去滑 赤茯苓

人參各三分 白礬半兩 枯 丁香一分 爲末棗肉和丸如

梧桐子大每服二十九煎生薑竹茹湯下食後服

遂痰丸方 治風痰壅盛每日早時多喜嘔吐

人參 赤茯苓 乾薑 半夏湯洗七遍去滑 各一兩

爲末以粟米飯和丸如梧桐子大每服二十九空心

生薑湯下日午再服

胃風

論曰胃風之狀頸多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿



失衣則臙脹食寒則泄注形瘦而腹大蓋胃者水穀之海五臟六腑之大源因而食寒失衣則風邪入易感故證頸多汗惡風者以人迎胃脉之所動也食飲不下膈塞不通腹善滿者其經循腹裏其病在中焦也失衣則臙脹者重感於風邪傷肌肉也食寒則泄者風寒交傷於胃故泄注也形瘦者精不營也腹大者氣不通也

豆蔻丸方

治胃風頸項多汗惡風飲食不下膈塞不通

腹善滿失衣則臙脹食寒則泄形瘦而腹大

肉豆蔻

去殼半兩

羌活

防風

桔梗

炒各一分

陳橘皮

湯浸

去白

獨活

去蘆頭

薏苡仁

人參

草豆蔻

去皮

芎藭

各半兩

甘草

木香

各等分

為細末煉蜜丸如梧桐子

大每服三十九至四十九米飲下日三夜一

厚朴煮散方

治胃風冷氣攻心腹脹滿疼痛飲食不消

四肢羸瘦

厚朴

薑汁炙

訶梨勒

煨去核各一兩

木香

蒼朮

米泔浸一宿切焙

枳殼

當歸

桔梗

炒各一兩

陳橘皮

湯浸去白二兩

為散每服三錢棗一枚同煎溫服

風秘

論曰風秘之病以大腸秘澀不通大腸者肺之腑通行水穀傳導所出若三焦不和風熱所搏則腸胃乾燥津液虛少糟粕結聚傳導不行令人心煩腹滿便秘不通也

前胡丸方 治風氣潤利腸胃

前胡二兩 大黃 黃芩 木通 麻子仁 芍藥各一兩

分 共為末鍊蜜為丸如豌豆大每服十五丸溫水食

前下

調中丸方 治大腸風熱秘澀不通

大黃 鼈甲醋炙黃去裙爛 朴硝 桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒各四兩

皂莢五挺去皮椎碎用水一升投取汁濾過 菜菔一筋椎碎絞取汁

共六味將前四味為末以陳醋一升半同菜菔皂莢煎五七沸後入藥末同熬得所丸如梧桐子大每服二十丸米飲下

木香丸方 治腸胃風熱津液燥少大便秘澀

木香半兩 檳榔剉 大黃煨 麻子仁各二兩 牽牛子末

郁李仁湯浸去皮 枳殼去瓢麩炒各一兩 為末鍊蜜丸如

梧桐子大每服二十九溫米飲下食前

威靈仙散方 治老人風氣壅盛大腸秘澀五六日方大

便一次頭旋目暗發作無時

威靈仙

一兩酒浸焙乾

羌活

去蘆頭

芎藭

各半兩

為散每服二錢空心葱湯調下

香枳散方 治大腸秘祛風順氣

枳殼

去瓢麩炒

防風

各一兩

甘草

炙半兩

三味搗羅為散每服二錢沸湯點服

引飲導秘丸方 治風熱大腸秘澀不通心煩腹滿體熱

檳榔

木香

芎藭

羌活

桂

各二兩

大黃

濕紙裹煨

郁李仁

浸去皮尖各四兩

為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服

二十九漿水下茶湯亦可

癩瘍風

白駁

白癩風

紫癩風

惡風

大風眉鬚墮落

大風出蟲

大風癩病

烏癩

白癩

癩瘍風

論曰癩瘍風之病其狀斑駁點點相連而大圓概似白駁而稍微也皆由風邪熱氣搏於脾肺二經流散肌肉使然也

烏蛇散方

治癩瘍風頸面斑駁

癩瘍風

三

烏蛇酒浸去皮  
骨炙二兩

秦艽

芎藭各一兩半

桂 羌活

人參 山梔子

枳殼

丹參

沙參

玄參

犀角

鎊各一兩

升麻

防風

木通

白鮮皮

黃芩

蒺藜

子炒去角  
一兩

苦參二兩

共為散每日溫酒調下三錢食後臨臥服

雄黃散塗方

治癰瘍風面頰頸忽生斑駁其狀如癰

雄黃 硫黃

白礬

並研如粉  
各一分

三味合研勻以鍊成豬脂調和塗上

附子散塗方

治癰瘍風身體斑駁

附子

一枚大者  
去皮生用

硫黃

研半兩

蒼耳苗

一握  
乾者

三味搗研為末以米醋調先以布巾揩瘍上即以藥塗之乾再塗

巴豆塗方

治癰瘍風面頰頸項忽生斑駁如癰

巴豆

去皮生用一分

醃醋一合

先以新布揩令赤於故沙盆內用醋磨巴豆如稀膏塗於患上

白駮

論曰白駮之病其狀駮斑如癰過於癰瘍但不成瘡爾皆由風熱搏於膚腠脾肺二經不和也

治白駮傳方

雌黃

石硫黃

各一兩  
研如粉

蛇蛻皮

一條大  
者燒灰

同研細用醋調成膏先以巴豆一粒中截以平處磨  
令皮起然後傳藥三兩徧即瘥

治頭項及面上白駮漸長如癬但不成瘡宜用此傳方

桂

去粗皮  
一兩

研為末每用半錢或一錢以津唾和傳於

白駮上日三

治面項身體白駮傳方

鮎魚

一頭約重半斤去腸肚淨洗後一依鮎法用鹽椒  
葱梗米飯勻拌即用青荷葉裹作三包各用蒲片

擊

更用荷葉裏裹令大臭爛先以布拭白駮令赤次

炙鮎包熱慰令汗出以綿衣包無令風冷所傷

蛇蛻皮方

治周身白駮漸長似癬但不成瘡

蛇蛻皮

一條  
大者

炒熱按摩白駮時時嚙唾數百徧弃之

田野草中

鰻鱺魚塗方

治頸項及面上白駮浸淫漸長如癬狀但

不成瘡

鰻鱺魚

一條  
肥者

炙令脂出先將白駮用物揩拭之令小

痛然後用魚脂塗

大蛇皮塗方 治面項身體白駁風

蛇蛻皮 大者燒作灰

石硫黃 研

槲皮 燒作灰二錢

三味令研極細以清熟漆調和勿令稠鞭薄塗白駁處欲塗藥時先以巴豆中截用平處摩令皮微起然後傳藥

白癩風

論曰白癩風之狀皮膚皴起生白斑點是也由肺臟壅熱風邪乘之風熱相并傳流榮衛壅滯肌肉久不消散故成此疾也

烏蛇散方 治白癩風身體癢麻

烏蛇 酒浸去皮骨炙三兩

白僵蠶 炒

胡麻子 獨活 天麻

各二兩 烏頭 去皮臍

細辛 防風 去

桂 枳實

蟬蛻 白附子 炮各半兩

天南星 一分

為散每服溫酒調二錢不計時候

治白癩風方

杏仁 去雙仁不去皮尖生用

每日早晨爛嚼二七粒於白點處

揩夜臥再用

治白癩風方

鷄子二枚和殼以米醋三升浸七日取白

石硫黃研半兩

附子去皮臍生用一

枚重半兩者

粟米二錢

共四味將後三味搗羅為末以前

鷄子白調如稀糊臨用藥先以葛布揩患處令赤塗之

苦參膏方 治白癩風

苦參

鹽

各一分

研為末先以酒一升煎至四合入藥

二味攪勻慢火再煎成膏每用先以生布揩患處令

赤塗之

紫癩風

論曰紫癩風之狀皮膚生紫點搔之皮起而不痒痛是也

此由風邪挾溼客在腠理榮衛壅滯不得宣流蘊瘀皮膚致令色紫故名紫癩風

烏蛇散方 治癩麻紫癩風

烏蛇酒浸去皮骨炙

防風

羌活

人參

玄參

沙參

苦參

丹參

白附子

蒺藜子

炒去角各一兩

為散每服一錢溫酒調下

附子硫黃散方 治紫癩風斑點

附子

生用去皮臍一枚

石硫黃

別研半兩

共研為細散人胡粉一分膩粉少許同繁柳汁和勻

臨臥搯三五遍早晨溫漿水洗不三五夜瘡

牡蠣散方 治紫癩風

牡蠣

膽礬

各半兩

二味生用為散釀醋調摩患處

胡桃塗方

治紫癩風并白癩風

初結青胡桃

一顆取外皮用

石硫黃

一皂子研如粉

二味先取胡桃皮切研如膏入硫黃末和勻塗之

羊蹄根塗方

治紫癩風

羊蹄根

絞自然汁半合

生薑

絞自然汁半合

石硫黃

四錢研如粉

三味將二汁與硫黃末同研令粘塗患處一日不得

洗不過兩上瘡

惡風

論曰惡風者皆五風厲氣所致也風有青白赤黑黃之異其毒中人五臟則生蟲亦有五種蟲生息滋蔓入於骨髓五臟內傷形貌外應故食肝則眉睫墮落食肺則鼻柱倒塌食脾則語聲變散食腎則耳鳴如雷鼓之聲心不受食食心則為不可治是故謂之惡風

五參散方

治惡風

人參

沙參

丹參

玄參

苦參

木通

蒺藜子



烏蛇 浸去皮 骨炙

乾蝎

天麻

赤箭

何首烏

陳橘

皮 各一兩

黃芩 半兩

原蠶蛾 一分

盆生用為散每服三錢熱茶調下服及半料即減服  
二錢初服三日後先覺頭項脊脊身上疼痛乃藥力  
與病相擊也當安臥兩復時許即無事如或身上有  
瘡腫服藥一日後便覺漸減

何首烏丸方

治脾肺風并惡風等疾

何首烏

石菖蒲

荆芥穗

蒼耳

胡麻

炒各一兩

玄參

沙參

苦參

白花蛇

酒浸去皮骨

烏蛇

酒浸去皮骨各

半兩

共搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十九茶  
酒任下如要作散每服二錢溫酒調下不計時候

威靈仙散方

治惡風

威靈仙 二兩

丹參 六兩

羌活 一兩

獨活 一兩

蒼耳 四兩

仙靈脾

玄參

人參

沙參 各二兩

紫參 兩

甘草

一兩 生用

黃芩 各二兩

為散食後臨臥溫水調下一錢若  
身體無瘡眼瞳人不斷鼻梁不塌服之一料可差

蔓荆實方

治肺臟風毒發作如癩變成惡風瘡

蔓荆實

去白皮生用四兩

胡麻

研為末炒熟半兩

天麻 兩

菊花

惡風

三

未開者良  
生用四兩

天南星

枸杞

生用  
四兩

苦參

研取粉  
四兩

為散每服溫酒調下二錢日三夜一每服宜去食稍  
遠恐藥食相犯

大風眉鬚墮落

論曰大風眉鬚墮落者蓋癩病也皆由惡風染著榮衛不  
清風溼毒氣浸漬肌肉致淫邪散溢痒癢成瘡皮膚瘍潰  
鼻柱倒塌鬚眉墮落

枳殼散方

治大風癩病眉鬚墮落熱毒風入五臟身體

頭面生瘡

枳殼

去瓢  
麩炒

黃耆

蒼耳

白朮

蒴藿

白蒺藜

炒

防風

生用

升麻

生用

梔子仁

研三分

漏蘆

黃連

人參

天門冬

防已

乾薑

芎藭

丹參

麻黃

去根節  
煮去沫

白芷

甘草

葛根

各半兩

玄參

堅者  
三兩

烏蛇

酒浸去皮  
骨炙一兩

共為末散每服溫酒調下二錢至三錢空心夜臥服

梔子散方

治大風癩疾眉鬚墮落偏身癢麻手攣縮

山梔子

二兩  
半

芎藭

一兩  
半

藁本

三分

當歸

蔓荊實

各一兩

桔梗

一兩  
三分

羌活

白蒺藜

白茯苓

防風

各一兩  
三分

側子

天麻

各半兩

每日空心温酒調下二

錢加至三錢夜臥時再服服至一料眉鬚再生

羚羊角飲方

治大風癩身上生瘡并面部浮腫眉鬚墮

落四肢癢痺

羚羊角

鎊

甘草

炙各三分

獨活

山梔子仁

各一兩半

防風

一兩

枳殼

黃耆

蒺藜子

丹參

去苗少炒

玄參

木通

各一兩一分

每服五錢水煎温服每日早食後及夜

臥各一服

大風出蟲

論曰蟲動物也皆風之所化風入五臟化生五蟲則成五癩入肝其蟲青入心其蟲赤入脾其蟲黃入肺其蟲白入腎其蟲黑四蟲皆可治惟黑蟲為難瘥或所傷未深專意治之亦差者

熟艾方 治大風癩熏出蟲

艾葉

別揉令熟

砒霜

研

水銀

與雄黃同研

膩粉

硫黃

丹砂

研

阿魏

酒化去沙石麩和作餅炙

附子

雄黃

研細入水銀點醋再

研令星子盡始入膩粉砒霜硫黃丹砂同研各一兩

麝香

研半兩

豬牙皂角

一斤

去皮研為末

其十一味除艾葉皂角別搗為末外並合細

研用紙四張先布次艾糝皂莢末次糝諸藥末卷刀切如餅餠著椀內燒以小木甌子籠椀以衣襯四邊坐於上熏以衣被遮壅定不令透出氣熱悶即俯伏獨活散方 治大風癩出五蟲

獨活三分 雄黃研半兩 青黛研一分 麻黃去根節煮去沫半兩

水銀一分與丹砂雄黃點醋同研以水銀星子盡為度 阿魏生研一兩 雷丸

丹砂 滑石研各半兩 石膽 牛黃 紫石英研各分 斑

貓四十枚與糯米同炒去翅足米不用 芫青四十枚與糯米同炒去翅足米不用

共一十四味研為散每服一錢空心溫酒調下不得

飽食晚更服當有蟲從小便中出或當日或三四日至十日方出若瀉出赤蟲如爛櫻桃或如豆麥或瀉出黃蟲似黃涕青蟲似青涕菜汁白蟲似馬尾蟲遇藥氣即死或隨大便下唯黑蟲如豆豉汁此為難治

大風癩病

論曰癩者內經為癘癘者榮氣熱其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰其證不同其始則乍寒乍熱腠理壅塞血氣精髓耗竭久而不治令人痛痺汗不流泄手足痠疼面目習習奕奕胸頸間狀如蟲行身體徧痒搔之成瘡或

身體錐刺不痛青赤黃黑如腐木形或痛無常處流移非一或似繩縛拘急不可俛仰眼目浮腫小便黃赤餘瀝心神恍惚而善噫也日月浸久其風化生毒蟲蟲既變動外先食氣血膚革不澤其內則食五臟食肝則眉睫墮落食肺則鼻柱損壞食脾則語聲散亂食腎則耳聞雷鼓之音食心則死推是癩病率皆風與蟲之為害也

羚羊角散方 治大風癩疾

羚羊角 鎊

犀角 鎊

吳茱萸 湯洗焙炒 各一分

羌活

獨活 各半 兩

麻黃 去根 節炙

烏蛇 酒浸去 皮骨

蔓荊實 去白 皮

當歸 黃耆 防風 附子 杏仁 去皮 蒺藜子 炒

角各 半兩

為散每服一錢空心服食前溫酒調下

烏蛇丸方 治大風癩疾若眼脉斷指節冷落脚下有瘡

語聲啞為不可治如未有此證宜服

烏蛇 一條酒浸去皮 骨首尾三兩

檀香 丁香 茜根 紫葛

防風 苦參 獨活 沙參 梔子仁 酸棗仁 用

槐子 白芷 附子 藁本 防已 羚羊角 蒼朮

醋炒 犀角 鎊

草薺

秦艽 桃膠 生 用

蕪荑仁 炒

括樓根 烏藥 各三 分

桑根白皮 剉三 兩

木通 一兩 半

大風癩病

三

共搗羅爲末鍊蜜如赤小豆大每服空心溫酒下十丸至十五丸日二如不飲酒薄荷槐白皮湯下如要速差宜用後湯藥下

桑枝湯方 治大風癩疾下藥

桑枝 柳枝 槐枝 枸杞根 黃荆根 羚羊角各一兩

六味並生用剉如麻豆大每服用藥五錢以水一盞半煎七分下前丸藥服一月必覺四體皮膚痒痛不可忍但宜飲酒不得搔抓仍頻飲食避外風如有汗必腥臭及有蟲從皮膚中出如麩塵或馬尾頭髮

尖或如線絲尖或如麩皮片頭黑身白形色不定但痒之後仔細看之或從小便中出或從泄瀉中出者大效此疾稍退終身禁房室又忌動風物時以苦參湯洗浴須換新衣其舊衣并牀薦等並焚之

艾蒿醞酒方 治大風癩病身體面目俱有瘡痍惡汗出自

白艾蒿十束每束如升許大淨擇水洗細剉 一味煮取濃汁拌麩米一

如常醞法酒熟去糟取清稍溫飲之令常醺醺然

天門冬丸方 治大風癩病

天門冬去心生用五分研絞取汁 一味內瓷器中密蓋口以蠟封

勿失藥氣於淨室中經一年取開其色赤如沙糖卽入苦沙參粉及乾地黃末爲丸如梧桐子大每服十丸溫水下食後服

百花煎方 治大風癩疾

白蜜 二十兩 石榴 七顆 砵者 并皮用 生薑 去皮細切 八兩

三味先研生薑石榴絞取自然汁更濾令淨入蜜盛於瓷瓶以蠟紙封口勿令通氣垂繫於釜中勿到底以重湯煎一復時成煎空心酒調二錢加至三錢日二夜一旬日內有惡物隨便而出是病根散矣

黃精丸煎方 治大風癩疾面赤疹起手足攣急身發瘡

瘰指節落

黃精 生者十斤 白蜜 五斤 生地黃 肥者五斤

三味先將黃精生地黃洗淨細剉以木石杵柏搗熟復研爛入水三斗絞取汁置銀銅器中和蜜攪勻煎之成稠煎爲度每用溫酒調化二錢至三錢日三夜一久服風癩痊平面如童子延年不老

婁金丸方 治大風癩病

金箔 五十片 牛黃 研 麝香 研 龍腦 研 白附子 炮

天竺黃各半兩 人參 白芷 細辛 芎藭 天南星

生用各三分 天麻 白花蛇酒浸肉炙 防風各一兩半 黃芪

藁本 白僵蠶 羌活 麻黃 白茯苓 犀角鎊

羚羊角 芍藥 甘草炙各一兩 甘菊三兩

其研為細末別用生地黄汁二升蜜半觔酒一觔酥三分慢火同煎成放冷和藥末勻丸如鷄頭大每服三九細嚼茶酒任下

黃芪丸方 治大風癩疾

黃芪 防風 丹參 白朮 白茯苓 芎藭 山梔

子 赤芍藥 枳殼 細辛各一兩半 大腹皮一兩三分

升麻 秦艽各二兩 蒺藜子 獨活 苦參各二兩

共為末鍊蜜和丸如梧桐子大空腹煎枳殼湯下二十九日再服

烏癩

論曰烏癩初覺皮膚變異肌腠之間澀澀躍躍如蟲行動眼前有物如糸懸布時發驚恐言語錯亂皮肉癢疹如桃李實或赤或黑手足癢痺不知痛所或脚下痛不可踐地身體生瘡兩肘如縛此名黑癩皆由惡風日漸傷損血氣



不榮所致也

馬先蒿散方 治烏癩

馬先蒿

不計多少一名馬禾蒿各爛石草細切焙乾用

搗羅為散每服一錢

荆芥薄荷湯下

治烏癩浸酒方

苦參根白皮

五斤

細剉如麻豆生絹袋貯好酒三斗冬

浸七日夏浸四日每溫飲二合至三合

日二夜一漸加五七合

露蜂房酒方 治烏癩

露蜂房

五兩

苦參

四斤

二味剉細用水三斗煮取一斗

五升去滓浸麴四觔半炊黍米二斗如常醞法酒熟每服三合至五合日二夜一稍增無妨

雌黃散塗方 治烏癩

雌黃

半兩

以米醋和鷄子清如膏塗瘡上乾即便塗

白癩

論曰白癩之狀語聲嘶啞日視不明四肢癢痺關節熱痛如火燔灼脊脊拘急肉如刀劈手足緩弱身體癢疹鼻生息肉目生白珠肉色斑白故謂之白癩也

烏蛇散方 治白癩語聲嘶敗四肢癢痺瘙痒生瘡

烏蛇 酒浸去皮骨炙

葛根 各一兩一分

苦參

紫參

沙參

人參

芎藭

天麻

黃芩

木通

地骨皮

防風

防已

白朮

蒺藜

黃連

莽草葉

木蘭皮

附

子 炮去皮臍

烏頭 炮去皮臍

牛膝

萎蕤

檳榔 煨

熟乾

地黃

芍藥

桂

玄參

龍骨 研

石膏 研

升麻

菊花 未開者炒

蒺藜子 炒去角

秦艽

細辛 去苗葉

天雄

當歸 切焙

甘草 炙

遠志

巴戟天

蒼

耳花 炒乾各三分

吳茱萸 湯洗

麝香 研各半兩

右四十二味

搗研細羅為散每服二錢空心溫酒調下加至三錢時服

白花蛇散方

治白癩語聲嘶啞目視不明四肢瘡痺關節熱痛身體癢疹鼻生息肉

白花蛇 酒浸去皮骨

天麻

槐子

羌活

防風

晚蠶

沙 炒 蔓荆實

白鮮皮

威靈仙

枳殼 各一兩

甘

草 炙十兩

搗羅為散每服一錢溫酒調下不拘時候

諸痺門

痛痺

著痺

行痺

皮痺

肌痺

血痺

脉痺

諸痺統論

論曰飲天和食地德皆陰陽也然陽為氣陰為血氣為衛血為榮氣衛血榮通貫一身週而復會如環無端豈鬱閉而不流哉夫惟動靜居處失其常邪氣乘間曾不知覺此風寒溼三氣所以雜至合而為痺淺則客於肌膚深則留於骨髓陽多者行流散徙而靡常陰多者凝泣滯礙而有著雖異狀殊態然即三氣以客之則所謂痺者可得而察矣且痺害於身其為疾也初若無足治至其蔓而難圖則偏廢弗舉四體不隨皆自詒伊戚者也可不慎哉

痛痺

論曰寒氣勝者為痛痺夫宜通而塞則為痛痺之有痛以寒氣入經而稽遲泣而不行也痛本于寒氣偏勝則陽氣少陰氣多與病相益治宜通引榮衛溫潤經絡血氣得溫則宣流自無壅闕矣

茯苓湯方 治風溼痺四肢痛痺拘攣浮腫

赤茯苓 桑根白皮 各二兩 防己 桂 芍藥 芍藥

麻黃 去根節各一兩半 甘草 炙一兩 每服五錢棗一枚去核

水煎溫服連三服後以薑粥投之汗出為度

天雄丸方 治風濕痺皮肉不仁骨髓疼痛不可忍者

天雄去皮臍

附子去皮臍炙

桂一兩

乾薑炮三兩

防風三錢

為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九溫

酒下日三夜一

當歸摩膏方

治諸風寒濕骨肉痺痛

當歸細辛一兩

桂一兩

生地黄一斤切研

天雄

十枚去皮臍生用

芎藭半兩

白芷三分

丹砂研一兩

乾薑二分

烏頭生用一分

松脂四兩

豬脂四兩別煉去滓

共十二味先將八味剉如大豆粒以生地汁浸一宿

與豬脂松脂同慢火煎候煎白芷黃色以厚綿濾去

滓瓷盒盛入丹砂末不住攪至凝即止每用藥用火

炙手摩病處千徧

著痺

論曰內經謂溼氣勝者為著痺地之溼氣感則害人皮肉筋脉蓋溼土也土性重緩榮衛之與溼俱留并以溼勝則著而不移也其證多汗而濡者以陰氣勝也治宜除寒溼通行經絡即差

天雄酒方 治寒溼著痺皮肉不仁至骨髓疼痛

天雄 附子去皮臍 防風 獨活 當歸 白朮

五加皮 芎藭 桂 乾薑二兩

剉如麻豆以夾絹囊盛用無灰清酒一斗浸春夏五日秋冬七日溫飲任性加減以醉為度

茯苓湯方 治風溼痺自著不去四肢癢麻拘攣浮腫

赤茯苓 桑根白皮各二兩 防已 桂 芎藭各一兩半

甘草三兩 芍藥 當歸 麻黃去根節煮各一兩半

每服六錢棗三枚劈破同水煎溫服如欲出汗以生薑熱粥投之汗出慎外風

治風溼著痺服藥雖多肌肉猶癢痺摩風膏摩之方

防風 羌活 芎藭 細辛 蜀椒去目并閉口 當歸

白欬 躑躅花各半兩 白芨 丹參 黑參 桂

附子 烏頭 皂莢 莽草各一分 杏仁半兩 苦參

細剉如麻豆以米二升拌勻浸三宿熬乾同臘月豬脂二勛以文武火煎一日綿濾去滓瓷餅貯每用少許點摩癢痺處兼治一切風毒其膏年歲深久者尤佳

龍虎膏方 治風溼著痺肌肉癢厚不知痛痒

龍骨二兩 虎骨三兩酥塗灸 當歸 桂各一兩 皂莢半斤肥者

去子 共為末先別用好肥皂莢十挺以苦酒三升接取

汁去滓入鍋中煎減半即入前藥同煎如稀餵入瓷  
盒盛每用少許揩摩癢痺處

行痺

論曰內經謂風寒溼三氣雜至合而為痺其風氣勝者為  
行痺夫氣之在人本自流通所以痺者風寒溼三氣合而  
為病然三氣之中各有陰陽風為氣善行數變故風氣勝  
則為行痺其證上下左右無所留止隨其所至氣血不通  
是也治法雖通行血氣宜多以治風之劑

防風湯方 治行痺行走無定

防風

甘草

各一兩

黃芩

三分

當歸

赤茯苓

各一兩

秦艽

葛根

三分

桂

去粗皮

杏仁

炒各一兩

麻黃

去根節煎去沫

半兩

每服五錢棗二枚生薑五片酒一鍾水一鍾同煎

溫服

山茱萸丸方

治風痺遊走無常處亦治血痺

山茱萸

炒一兩一分

生乾地黄

二兩

山藥

牛膝

澤瀉

草薢

各一分

天雄

蟾蜍

車前子

乾漆

狗脊

去毛

白朮

地膚子

各三分

茵芋

半兩

共為細末鍊蜜丸如

梧桐子大每服溫酒下二十九加至三十丸

皮痺

論曰風寒溼三氣雜至合而為痺以秋遇此者為皮痺蓋肺主皮毛於五行為金於四時為秋當秋之時感於三氣遂為皮痺蓋正言其時之所感者爾固有非秋時而得之者皮膚不營而為不仁則其證然也

防風湯方

治肺中風寒溼項強頭昏胸滿短氣噓吸顫

掉言語聲嘶四肢緩弱皮膚癢痺

防風

芍藥

麻黃

獨活

桂

前胡

五味

子

附子

杏仁

人參

茯神

甘菊花

黃芪

甘草

各半兩

每服四錢生薑五片水煎溫服

蔓荊實丸方

治皮痺不仁

蔓荊實

去浮皮三錢

防風

羌活

桔梗

白附子

枳殼

蒺藜子

炒去角各半兩

皂莢

半斤新水浸一宿絹濾去滓入麩少許同煎成

膏

七味為末入膏中和搗丸梧桐子大每服二十九

食後熱水下

天麻丸方

治皮膚癢痺

天麻

二兩

立參

沒藥

地榆

烏頭

各一兩

麝香

研一

分

四味為末與二味研者和勻鍊蜜丸如梧桐子大

每服二十九空食前溫酒下

肌痺

論曰風寒溼三氣雜至合而為痺以至陰遇此者則為肌痺其狀皮膚弗營肌肉痛痺而不仁是也

西州續命湯方

治肌痺津液開泄時復不仁或四肢痛

麻黃

去根節煎去沫焙乾

當歸

切焙

石膏

研各二兩

芎藭

桂

甘草

黃芩

防風

芍藥

各二兩

杏仁

湯浸去皮尖炒四十枚

每服四錢生薑一片棗二枚水煎溫服不計時候

細辛湯方

治肌痺淫淫如蟲行或腠理開疎汗出皮膚

肉色不澤唇鼻黃

細辛

防風

白朮

附子

桂

各一兩

石膏

研

黃芪

麻黃

去根節煎掠去沫焙乾各二兩

枳實

去白麩炒

甘草

各半兩

當歸

一兩

每服四錢生薑五片水煎溫服

血痺

論曰血痺之狀形體肌膚如彼微風所吹者是也蓋血為陰邪入於血而痺故謂之血痺宜先鍼引陽氣後以藥之芍藥湯方 治風血痺身體不仁肉冷

赤芍

側子

桂

麻黃

萆薢

當歸

丹參

各一兩



細辛

甘草

各半兩

每服三錢生薑五片水煎溫服

黃芪湯方

治風血痺陰陽俱微寸口關上微或尺中小

緊其狀身體不仁如賊風所中

黃芪

芍藥

各一兩

桂

三分

每服五錢棗二枚生薑三

片水煎早晨日午晚每各一服

草薺丸方

治風邪遊走無定處名曰血痺

草薺

山藥

牛膝

澤瀉

各一兩

白朮

三分

地膚子

半兩

山萸

炒一兩

狗脊

三分

茵芋

一分

熟乾地黃

三兩半

共為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十丸溫酒下不

拘時稍加至五十丸

脉痺

論曰血性得溫則宣流得寒則凝澀凝澀不行則皮毛萎悴肌肉癢痺內經謂風寒溼三氣雜至合而為痺又曰夏遇此者為脉痺痺則血凝不流可知也

人參丸方

治脉痺通行血脉

人參

麥門冬

茯神

龍齒

遠志

黃芪

菖蒲

赤石脂

各一兩

熟乾地黃

二兩

為末鍊蜜丸如梧桐子

大每服食後良久以清粥飲下三十丸

防風湯方 治脉痺

防風 當歸 秦艽 赤茯苓 茵芋去莖 甘草炙

桂去粗皮 杏仁去皮尖雙仁麩炒 獨活各一兩

每服五錢以酒水各半生薑半分同煎服

筋痺 骨痺 腸痺 周痺 痺氣

熱痺

筋痺

論曰經曰風寒溼三氣雜至合而為痺又曰以春遇此者為筋痺其狀拘急屈而不伸是也筋痺不已復感於邪內

舍於肝是為肝痺其狀夜臥則驚飲多數小便上為引如懷蓋溼氣乏竭痺聚在肝治法以筋痺為先筋痺既平則邪弗入於肝矣

天麻丸方 治筋風四肢攣痺

天麻 細辛 菖蒲 赤箭 地榆 人參各二兩

附子 芎藭 木香各一兩 桂半兩 苦參三兩 牛膝

酒浸二兩 陳橘皮湯浸去白焙乾一兩 當歸切焙 赤芍 酸棗仁

威靈仙去土 藁本 防風 獨活各二兩

其為細末鍊蜜和杵為丸如梧桐子大每服溫酒下

二十九至三十九

牛膝湯方 治筋痺以筋虛為風所傷故筋攣縮腰背不

伸強直時痛

牛膝酒浸 防風 丹參 前胡各二兩 石斛二兩 桂

塗酥 秦艽去苗 續斷各一兩半 陳橘皮去白 大麻

仁各一合 除大麻仁外擣篩每服五錢煎熟別下麻仁末

一錢再煎空心服日二

防風湯方 治肝痺頭目昏塞四肢不利胸腹虛煩

防風一兩 芎藭 黃芪 五味子 人參 茯神

獨活 羚羊角鎊 前胡各三分 細辛 酸棗仁

甘草各半兩 每服三錢大棗三枚水煎溫服

骨痺

論曰經謂人有身寒湯火不能熱厚衣不能溫然不凍慄  
是人者素腎氣勝以水為事太陽氣衰腎脂枯不長一水  
不能勝兩火腎者水也而生於骨腎不榮則髓不能滿故  
寒甚至骨也所以不能凍慄肝一陽也心二陽也腎孤藏  
也一水不能勝二火故不能凍慄病名曰骨痺是人當學

節也夫骨者腎之餘髓者精之所克也腎水流行則髓滿而骨強迨夫天癸虧凝澀則腎脂不長腎脂不長則髓涸而氣不行骨乃痺而其證內寒也雖寒不為凍慄則以肝心二氣為陽火一水不能勝之特為骨寒而已外證當攣節則以髓少而筋燥故攣縮而急也

白斛丸方 治腎虛骨痺肌體羸瘦腰脚痠疼飲食無味

小便滑數

- 石斛去根 牛膝酒浸 續斷各三分 兔絲子酒浸別研 石龍
- 肉蓯蓉酒浸三分 鹿茸去毛酥炙一兩 杜仲
- 肉蓯蓉酒浸三分 鹿茸去毛酥炙一兩 杜仲

白茯苓 熟乾地黄各三分 附子一分 巴戟天一分

防風三分 桑螵蛸炙 芎藭各半兩 山茱萸三分 覆盆

子半兩 補骨脂 葶澄茄各三分 五味子半兩 澤瀉一分

沉香 藁香子各三分 薏苡仁一分

共為末鍊蜜和杵數百下丸如梧桐子大每服空心以溫酒下三十九日二服

熟乾地黄丸方 治腎虛骨痺面色萎黑足冷耳鳴四肢

羸瘦脚膝緩弱小便滑數補腎

熟乾地黄 肉蓯蓉酒浸 磁石煨醋淬二兩 山茱萸三分

桂去粗皮 附子各半兩 山藥三分 牛膝酒浸切焙一兩 石南

白茯苓 澤瀉 黃芪各三分 鹿茸去毛酥炙二兩 五味子

三分 石斛一兩 覆盆子 遠志三分 補骨脂炒一兩

草薺 巴戟天各三分 杜仲一兩 兔絲子二兩酒浸別研

白龍骨一兩 共為末鍊蜜和杵數百下丸如梧桐子大

每服空心以溫酒下三十九日三服

腸痺

論曰內經曰腸痺者數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄夫大腸者傳導之官其所以傳導者皆冲和之氣今風寒

溼三氣乘虛客於腸間則邪留而和氣閉矣故其證數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄大小腸氣痺水道不通故雖多飲而不得洩便并氣於大腸使糟粕不化故中氣喘爭時發飧泄也

草豆蔻散方 治腸虛寒溼內攻腹痛飧泄

草豆蔻 陳橘皮湯浸去白各一兩 桂 木香 白朮

當歸切焙 白豆蔻仁 丁香 肉豆蔻仁 良薑各半兩

為散每服一錢生薑棗湯調下食前服

訶梨勒丸方 治腸痺飧泄腹脇脹滿

腸痺

三

訶梨勒

煨用皮 一兩

乾薑

三分

當歸

炒一兩

黃連

去鬚 一兩

白朮

一兩

木香

三分

厚朴

生薑汁 炙一兩

為末鍊蜜和杵二

三百下丸如梧桐子大每服三十九丸粥飲下不拘時

周痺

論曰黃帝鍼經謂周痺者在於血脉之中隨脉以上隨脉以下不能左右各當其所夫風溼寒之為痺本痺而不通今乃能周身上下者以其邪中於血脉之間與脉流通隨氣上下升降無礙也

黃芩湯方 治周痺身體不仁

黃芩

甘草

防風

各半 兩

秦艽

葛根

杏仁

麩炒 各一

分

桂

當歸

赤茯苓

各半 兩

為散每服六錢水酒

各半棗二枚生薑一片同煎溫服日二夜一

續命湯方

治八風十二痺

羌活

茯苓

薏苡仁

炒各 一兩

每服六錢別入竹瀝一匙更煎數沸溫服日二夜一

醍醐方

治寒濕周痺

醍醐

一兩 每日空心以溫酒五合和一匙服之

大豆蘗方

治周痺除五臟留滯胸中結聚益氣止毒潤

皮毛補腎

大豆藥

一升炒  
令香熟

為末每空心溫酒調下一匙再加

野驪脂方

治周痺

野驪脂

鍊了濾  
過一斤

別入好酥四兩同鍊攪勻每服半匙

以熱酒半盞和化服之加至一匙空心食前各一服

痺氣

論曰內經謂人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中生者何是人多痺氣也陽氣少陰氣多故寒如從水中出夫陽虛生外寒陰盛生內寒人身陰陽偏勝則自然生寒熱不

必外傷於邪氣也痺氣內寒者以氣痺而血不能運陽虛而陰自勝也血凝泣而脉不通故其證身寒如從水中出也

溫補鹿茸丸方

治陽氣虛陰氣盛痺氣內寒如從水

出中

鹿茸

酥炙  
四兩

人參

天雄

五加皮

五味子

牛膝

酒浸

防風

遠志

石斛

山藥

狗脊

各一兩

肉蓯

蓉

酒浸  
切焙

熟乾地黄

各三兩

草薺

石南

蛇牀子

白朮

各三分

巴戟天

天門冬

杜仲

各一兩半

乾薑

吳茱萸

炒

桂

附子

去皮  
臍

細辛

蜀椒

去目并合  
者各三分

白茯苓 兔絲子 酒浸別搗各一兩一分 覆盆子 石龍芮 各二兩

除兔絲子別搗外搗羅為末再拌勻鍊蜜丸如梧桐子大每服溫酒下二十九加至三十九空心食前三

補益黃芪丸方 治陰盛陽虛痺氣身寒如水中出

黃芪 鹿茸 酥炙 白茯苓 烏頭 去皮臍 乾薑 各三分

桂 芎藭 當歸 熟乾地黄 各一兩 白朮 鬼絲子

酒浸一宿別搗 五味子 栝子仁 枸杞根 各一兩半 大棗 去核

其十五味除兔絲子別搗外同搗羅再拌勻鍊蜜丸如梧桐子大每服空心溫酒下十五丸日三

熱痺

論曰內經於痺論有云其熱者陽氣多陰氣少陽遭陰故為熱痺蓋腑臟壅熱復遇風寒溼之雜至客搏經絡留而不行陽遭其陰故痛痺熿熱而悶也

升麻湯 治熱痺

升麻 射干 甘草 芎藭 人參 各二兩

赤小豆 炒三合 麥門冬 生薑 萎蕤 各三兩

每服四錢生地黃汁半合青竹葉十五片水同煎溫服不拘時候



犀角升麻湯 治熱痺

升麻二兩 茯苓 人參 防風 犀角鎊

羚羊角 羌活去蘆頭 各二兩 桂半兩 每服四錢生薑一塊

竹瀝少許水同煎溫服

聖濟總錄纂要卷二終

聖濟總錄纂要 卷之三

程 林雲來 纂

閔世璋象南 較

新安

吳慈蔭蓮士

江 湘郢上 閱

傷寒門

傷寒可汗 可下 可吐 可溫 傷寒過經不解

傷寒統論

論曰風寒暑溼飲食勞倦皆能為病是謂五邪冬傷於寒

者春必病溫春傷於風者夏必飧泄夏傷於暑者秋必咳  
瘧秋傷於溼者冬必欬嗽是乃四時之氣也然五邪所中  
雖不同本皆外邪大率同類唯多冬時嚴寒其毒厲尤甚  
人或中之病在冬時則正名傷寒若邪毒藏於肌膚至春  
之時乘溫而發者溫病若留連日久至夏之時乘盛暑而  
發者爲暑病所謂先夏至一日爲病溫後夏至日爲病暑  
是也其病之傳次先客於太陽其病令人頭項痛腰脊強  
其脈尺寸皆浮太陽不已傳於陽明其病體熱目疼鼻乾  
不得臥其脈尺寸皆大陽明不已傳於少陽其病胸脇痛

而耳聾其脈尺寸皆弦少陽不已太陰受之其病腹滿體  
重其脈尺寸俱微太陰不已少陰受之其病口燥舌乾而  
渴或背微惡寒其脈尺寸俱沉少陰不已厥陰受之其病  
煩滿舌卷囊縮其脈寸尺俱緩病之所傳不過三陰三陽  
而已其未滿三日者邪在陽經未入於裏其病在表宜汗  
之而愈若經四日者邪入陰經其病在裏宜下之而愈特  
其大畧爾蓋有一日而傳之數經者亦有數日而尚在太  
陽者陽病雖宜發汗陽明之病反宜下之陰病雖宜下少  
陰之病或宜溫之由人之稟受虛盛其傳有遲速又有不

聖濟總錄卷之三十三  
傳經者當審其脉證凡此六經受病五邪脉證各不同傷風必惡風其浮緩傷寒者必惡寒其脉浮緊以至傷暑脉虛傷溼脉濡人迎緊盛爲傷寒氣口緊盛爲傷食診得五邪知其本也診得六經知其標也有病雖在表而不可汗者或裏而不可下也或若汗之太多則津液燥竭遂致凶陽下之太早則邪氣動膈乃成結胸清濁相干則變爲霍亂熱毒內瘀則變爲瘀血又或爲發黃者溼熱相蒸也或爲發斑者陽毒太盛也陽盛之人得之於熱乃爲陽毒陰盛之人得之於寒乃爲陰毒蟲動則爲狐惑壞病之甚則

爲百合若勞復陰陽易之類雖差後猶宜節慎變態多端不可備舉當以類求之皆以適當爲良唯兩感之病表裏皆受邪爲難治其他或陰證似陽陽證似陰或陰盛隔陽陽盛隔陰者在診病者以意詳之

### 傷寒可汗

論曰傷寒病汗之而愈者以初得病一日至三日陽經受邪未傳諸陰其邪在表故當發汗此大約也然病數日脉浮太陽證不罷者亦可汗之當以脉證爲準凡頭痛發熱惡風振寒是爲可汗之證其脉浮者是爲可汗之脉陽虛

則惡寒脉浮為在表或浮而弱或浮而緊或浮大而數皆宜汗之

麻黃湯方 治傷寒太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風發熱無汗而喘者

麻黃

去根節 三兩

桂

去粗皮 三兩

甘草

炙一兩

杏仁

去粗皮 雙仁七

十枚

咬咀如麻豆大每服五錢水煎溫服覆取微汗不須啜粥餘如桂枝法將息

大青龍湯方 治傷寒太陽中風脉緊發熱惡寒身痛不汗出而煩躁

麻黃

去根節 六兩

桂

去粗皮

甘草

各二兩

杏仁

去皮尖雙仁四十枚

生薑

三兩

棗

大者十枚

石膏

一雞子大碎

咬咀如麻豆大每

服五錢水煎溫服脉微汗出惡風者不可服

桂枝麻黃各半湯方 治傷寒太陽病得之八九日如瘧

狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便一日二三度發脉微緩者為欲愈也脉微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必痒

桂

去粗皮 一兩半

芍藥

生薑

甘草

麻黃

去根節 各一兩

大棗四枚

杏仁

三十四枚湯浸去皮尖雙仁

咬咀如麻豆大每服五錢水煎溫服

桂枝湯方

治傷寒太陽病外證未解脉浮弱者當以汗

解

桂皮去粗

芍藥

生薑

各三兩

甘草

二兩

大棗

十二枚

咬咀如麻豆大每服五錢水煎溫服須臾啜熱稀粥

助藥力取微汗

麻黃附子甘草湯方

治傷寒少陰病得之二三日宜微

發汗以二三日無裏證故微發汗

麻黃

去根節

甘草

各二兩

附子

一枚炮製去皮臍

咬咀如麻

豆大每服五錢水煎溫服

葱豉湯方

治傷寒初覺一二日頭項腰痛惡寒

葱白

十四莖

豉

半合

乾薑

一分

麻黃

去根節

去粗皮

芍藥

各半兩

咬咀如麻豆大每服五錢水煎溫服良久

投葱豉熱粥蓋覆出汗

葱粥方

治傷寒服葱豉湯後未得汗再服

葱白

十莖并頭切

豉

三合炒

生薑

半兩

水五盞煎至二

盞半去滓入白米依常法煮粥入少鹽攪勻任意食

之衣覆出汗未汗再服

麻黃葛根湯方 治傷寒初得一二日出汗

麻黃去根節 一兩 葛根 柴胡去苗各 一兩 芍藥三分

每服五錢水一盞豉一百粒開口椒七粒連鬚葱白三寸薄荷二十葉同煎熱服服後葱豉湯一盞投之衣覆取汗未快再服

葛根湯方 治傷寒初覺頭痛惡寒壯熱腹內熱脈洪大

一二日宜服

葛根 黃芩 芫胡去苗各 半兩 葱白五莖 豉一分

咬咀每服五錢生薑一棗大拍碎同煎溫服良久再服得汗即止

麻黃解肌湯方 治傷寒初患一二日體熱頭痛

麻黃去根節 一兩 石膏碎 葛根各一兩半 甘草一分

芍藥 杏仁去皮尖雙仁 炒各一兩 桂去粗皮 三分

每服五錢生薑五片水煎溫服

葛根湯方 治傷寒一二日頭痛壯熱遍身疼痛其脈洪

數

葛根 白朮 芍藥 乾薑各半兩 麻黃去根節 桂

去粗皮 各三分 甘草 灸一分半

每服五錢水煎熱服如脉微即

加附子半兩

石膏人參解肌湯方

治傷寒初得一二日頭疼壯熱惡

寒脉浮緊

石膏

碎

麻黃

各一兩

芫胡

去苗

人參

各半兩

桂

去粗皮

甘草

各一分灸

葛根

二兩

每服三錢入葱豉生薑同煎熱服

十味人參湯方

治傷寒頭痛體疼寒熱不解

人參

厚朴

生薑汁灸

桂

甘草

杏仁

去皮尖雙仁炒

白朮

乾薑

白茯苓

陳橘皮

湯浸去白各一兩

麻黃

去根節湯煮去沫二

兩

每服三錢生薑二片棗一枚同煎熱服纔覺傷風

併三兩服汗出立差

羌活湯方

治傷寒表不解頭痛體疼發汗

羌活

獨活

芫胡

前胡

人參

白茯苓

桔梗

芎藭

甘草

灸各二兩

枳殼

去瓢麩炒二兩

每服三錢生薑二

片薄荷少許同煎溫服不拘時

葱豉湯方

治傷寒一日至三日以前身熱脉大肢體疼

痛汗不出

蒼朮

米泔浸去皮麩炒黃

麻黃

去根節湯煮去沫各二兩

甘草

桂

各一兩

每服三錢葱白三寸鹽豉二十粒同煎熱服不拘時傷寒可下

論曰凡傷寒邪入於陰其病在裏法當下之諸腹滿不大便或口燥舌乾而渴或潮熱譫語皆為可下之證諸診得脈沈而實即為可下之脈但脈證已具不必拘以日數急宜攻裏若病雖過經而裏證未備者未可下也故經曰陽盛陰虛下之則愈其法謂此

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者可與調胃承氣湯傷寒吐後腹脹滿

者可與調胃承氣湯

調胃承氣湯方

甘草炙二兩

大黃以清酒洗四兩

芒硝一兩

錢更煎一二沸溫服

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然汗出者此大便秘也與大承氣湯若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令至大泄下大承氣湯



大承氣湯方

大黃 酒洗 四兩

厚朴 炙半斤

枳實 麩炒 五枚

咬咀每服五錢

入芒硝一錢同煎溫服

陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞭鞭則讞語小承氣湯主之若一服讞語止者勿再服

小承氣湯方

大黃 四兩

厚朴 二兩

枳實 麩炒 大者

咬咀每服五錢水煎

溫服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服

芫胡湯方

治傷寒四日以後煩熱不解大小腸澀

芫胡 去苗

黃芩 一兩

犀角 鎊

芍藥 各三兩

山梔子仁

半兩 大黃 炒 一兩半

木通 三分

朴硝 一分

每服五錢入

竹葉三片同煎空腹服大小腸通為度如未效再服

大芫胡湯方

治傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者

芫胡 去苗 半斤

枳實 麩炒 四兩

黃芩

芍藥 各三兩

半夏 二兩

半湯洗 七遍

大黃 二兩

咬咀每服五錢入生薑十片棗三

枚同煎溫服

調胃承氣加橘皮湯方

治傷寒發汗不解蒸蒸發熱

陳橘皮 浸去白 半兩

大黃 麩炒 一兩

甘草 炙 半兩

傷寒可下

每服四錢入芒硝一錢同煎溫服

大青散方 治陽盛發狂有斑大小便閉澀

大青 知母 黃芩 大黃煨 山梔子仁 升麻

黃連各一兩 甘草炙半兩 共為散每服三錢入朴硝一

錢蜜水調下

承氣丸方 治傷寒時氣溫熱病大便不通

大黃炒三分 郁李仁湯浸去皮研 枳實麩炒 朴硝研各一兩

共研為末和勻煉蜜丸如梧桐子大每服二十九生

薑湯下未利再服不計時候

傷寒可吐

論曰諸病吐之而愈者邪在胸中也傷寒大法謂四日以  
上若入陰經其傳未深邪氣高而裏實客於胸膈下之則  
動胃汗之則吐陽惟宜吐而出之然亦不必拘此凡寒邪  
熱毒痰實在胸中及有宿食在胃脘者皆當吐之但診其  
脉寸口或浮或滑或數或緊與諸部不同者其證心胸痞  
滿鬱鬱而痛不能息多涎唾飲食入則吐欲吐復不能出  
或手足厥冷及心下滿而煩饑不能食吐下後心中愜懌  
者是也內經所謂其高者因而越之即其法也

瓜蒂散方 治胸有寒病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胸中痞鞭氣上衝喉咽不得息當吐之

瓜蒂熬 赤小豆各一分 擣篩再和勻每服一錢豉一

合湯七合先漬之須臾煮作稀糜取汁調散放温頓服不吐少加之快吐為度亡血虛家不可與

捺膈湯方 治傷寒三四日胸中痰壅憎寒壯熱頭痛

桃枝一握東引者取稍 桺枝一握取稍 甘草一分生用 烏梅去核二枚

山梔子仁一分 各細剉同用漿水一大盞半煎至一盞空心分為二服相次再服取吐為度

三物湯方 服前捺膈湯吐後頭痛壯熱未退即服此三

物湯

薄荷一握 人參半兩 生薑一分 水煎空心温服晚再服

苦參散吐方

苦參 為細散每服三錢温酒五合調服之即吐

人參湯吐方 治傷寒出汗後心胸妨悶煩熱未退

人參半兩 燈心一束 枳殼麩炒一分 大腹皮一枚 茶末

生甘草 除茶末外各細剉用淡漿水二大盞煎

至一盞下茶末攪勻分温二服以紙撚于於咽喉中

傷寒可吐 七

取吐為度

傷寒可溫

論曰傷寒病雖有三陰三陽然在陽則太陽病多在陰則少陰病多以二經為表裏故也至於陽明太陰病頗稀少而少陽厥陰病又少也然究觀古人治陽明則多下於少陰則多溫蓋陽明者胃也胃受病則不惡寒反惡熱濇濇汗出大便秘澹語潮熱須下之乃愈若乃氣弱本虛人初中病腠理寒邪氣更不經三陽而便見少陰証蓋少陰者腎也腎受病則身冷惡寒四肢厥逆脈微細心煩但欲寐

或自利而渴須溫之乃愈雖然三陰病大約可溫而古人特於少陰詳言之者則少陰病尤宜溫故也

附子湯方 治傷寒少陰病得之一二日口中和其背惡

寒者當灸之

附子去皮臍 人參一兩 白朮四兩 芍藥 白茯苓三兩

每服五錢水煎溫服日二

四逆湯方 治傷寒少陰病脈沉者急溫之

甘草二兩 乾薑半兩 附子一枚生用 剉如麻豆每服五錢

水煎溫服強壯之人可倍加薑附

傷寒可溫

上

四逆湯方 治傷寒少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥

冷脉微欲絕身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾

嘔或咽痛或利止脉不出者通脉加減四逆湯

甘草各二兩 附子大者一枚 乾薑二兩 各剉如麻豆大每

服五錢水煎溫服其脉即出者愈面色赤者加葱九

莖腹中痛者去葱加芍藥二兩嘔者加生薑二兩咽

痛者去芍藥加桔梗一兩利止脉不出者去桔梗加

人參二兩病皆與方相應者乃服之

生薑湯方 治傷寒手足厥冷脉細欲絕其人內有久寒

者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯

當歸 芍藥 桂去粗皮 細辛各二兩 吳茱萸湯洗炒

甘草炙 木通各二兩 剉如麻豆每服五錢入生薑半

分棗三枚水酒同煎溫服

通關飲方 治厥陰傷寒脉弦長者生沉細不足者死

附子一兩 乾薑 羌活 桔梗 甘草炙 五加皮各

兩 桂三分 黃芪一分 防風一分 剉如麻豆每服五

錢水煎食前溫服

迴陽湯方 治傷寒陰盛手足厥冷體寒脉微

延胡索炒 半夏切生薑汁炒黃 甘遂麩炒各一兩 陳橘皮湯浸

去白附子去皮 桂去粗皮 麻黃去根節湯煮去沫各半兩 檳榔

一枚 天南星一枚 剉如麻豆每服二錢酒煎溫服服後

一次頃患人頭面渾身覺熱時便與衣服蓋覆令汗出

溫白丸方 治傷寒面青心下堅鞭開口出氣身體不熱

頭面多汗四肢厥冷

半夏湯浸去滑 白附子炮 硫黃研各一兩 共研為末用粳

米飯搗和為丸如梧桐子大每服二十九溫酒下吐

逆炒薑鹽酒下或艾醋湯下陰毒併弊二三服不計

時候

白木飲方 治傷寒伏陰胸膈妨悶吐逆不定手足厥冷

白木 附子去皮 高良薑炮 桂去粗皮 人參

乾薑炮各一兩 藿香去根一分 剉如麻豆每服三錢水煎溫服

吳茱萸散方 治傷寒渾身手足厥冷面青唇口無色心

中寒慄

吳茱萸湯浸焙炒 硫黃研 桂去粗皮 附子去皮 芫薺

各一分 搗羅為散煎艾葉湯調下三錢陰盛者兼灸氣

海數十壯

黑龍湯方 治傷寒陰盛隔陽身冷煩躁脉細沉緊

附子

一枚及半兩者燒存性用冷灰焙去火毒

搗研細入臘茶一錢和勻

分作二服每服以水一盞密半匙同放冷服須臾躁

止得睡汗出為效

返陰丸方 治傷寒陰盛手足多冷脉沉細助陽消陰

硫黃 消石 陽起石 太陰玄精石 白礬 石膏

各半 研為末同入銚子內熬成汁為度放冷細研用

水浸炊餅為丸如梧桐子大煎艾湯下十五丸

傷寒過經不解

論曰傷寒為病六經受邪始傳於三陽病在表者可汗其  
滿三日傳於三陰病入裏者可下其不兩感於寒更不傳  
經不加異氣者至七日太陽病衰頭痛少愈八日陽明病  
衰身熱少微九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹  
滿減如故十一日少陰病衰渴止舌乾已而噦十二日厥  
陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病人精神爽慧也故傷  
寒愈者皆在十二日若過此經病猶不解者為邪熱結于  
裏其或譫言妄語或鬱鬱微煩或腹滿吐下皆緣治之失  
宜邪氣稽留故病過經不能解也當隨其證以治若更感

異氣變為他疾者當依壞病法療之

犀角湯方 治傷寒過經不解熱結在裏往來寒熱煩渴

躁悶

犀角

屑一兩

芫胡

去苗

吳藍

各三分

大青

升麻

各一兩

烏梅

去核

黃芩

各三分

甘草

半兩

每服五錢入竹葉三十片同煎食後溫服

木通湯方 治傷寒十三日過經不解臍腹脹滿小便淋

澀煩悶燥渴

木通

葛根

青橘皮

湯浸去白鹽炒

檳榔

滑石

瞿麥穗

各一兩

每服五錢入葱白二寸同煎溫服不計時候

芫胡湯方 治傷寒發汗下之後過經不解胸脇滿結渴

而不嘔但頭汗出往來寒熱小便不通宜服芫胡湯

芫胡

二兩

桂

黃芩

各一兩

牡蠣

生用

甘草

各半兩

括樓根

一兩半

木通

一兩

每服五錢生薑半分葱白五寸同煎食後溫服

中風傷寒

傷寒溼溫

傷寒時氣

傷寒疫癘

傷寒結胸



中風傷寒

論曰中風傷寒三陽三陰候各不同太陽中風其脉陽浮陰弱其證發熱自汗蓋陽浮熱自發陰弱汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風熿熿發熱鼻鳴乾嘔又曰太陽病發熱汗出脉緩者名為中風不可燔灸若以火發其汗邪風為火熱所劫血氣流溢榮衛失常兩陽熏灼其身發黃陽盛即衄陰虛即小便難陰陽俱虛竭其身體枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾循衣摸牀其小便利者可治陽明中風即陽明

病能食為中風其證口苦咽乾腹滿微熱惡寒脉浮而緊下之則腹滿小便難少陽中風兩耳無聞目赤胸中滿而煩不可吐吐之則悸而驚太陰中風四肢煩疼其脉陽微陰澀而長為欲愈少陰中風其脉陽微陰浮為欲愈厥陰中風其脉微浮為欲愈不浮為未愈凡此六經之病其狀雖異大抵其脉皆浮經所謂浮為風是也

大青龍湯方 治傷寒太陽中風脉浮緊發熱惡寒身痛

不汗出躁煩

麻黃

去根節煮去沫六兩

桂

去粗皮

甘草

炙各二兩

杏仁

去皮尖雙仁四

中風傷寒

七

石膏如雞子大碎 咬咀如麻豆服五錢入生薑一棗

大棗二枚同煎溫服取微汗汗多者以溫粉粉之

桂枝湯方 治中風傷寒陽浮陰弱陽浮者熱自發陰弱

者汗自出惡寒發熱鼻鳴乾嘔等疾

桂去粗皮 芍藥各三分 甘草炙半兩 每服五錢入生薑

一棗大棗二枚同煎溫服以汗為度未汗更服仍作

生薑稀粥投之以助藥力

石膏湯方 治中風傷寒頭痛四肢痠痛身體沉重

石膏 甘草炙 麻黃去根節煎去沫 桂 芍藥各二兩

每服五錢入生薑一塊同煎空心溫服

麻黃桂心湯方 治中風傷寒脈浮緊發熱惡寒身體疼

痛汗不出而煩

麻黃去根節煎掠去沫二兩 桂去粗皮 甘草 乾薑炮各一兩

石膏 乾薄荷葉 杏仁去皮尖雙仁各半兩

每服五錢入棗二枚同煎食前溫服

桂枝湯方 治中風傷寒初得其外證頭項疼腰背強壯

熱語澀恍惚唾涕稠黏遍身拘急

桂去粗皮三分 芍藥 半夏湯洗七遍生薑等分同搗 附子 菖蒲

麻黃

去根節煎去沫

羌活

細辛

各半兩

白芷

一分

劉如麻

豆每服三錢入生薑一塊同煎食前溫服蓋覆取汗

麻黃細辛丸方

治中風傷寒頭痛惡寒四肢煩疼心躁

悶

麻黃

去根節一兩

細辛

人參

白茯苓

甘草

白朮

各半兩

括樓根

三分

共研為末鍊蜜和搗丸如雞

頭大每服一丸薄荷蜜湯研下

傷寒溼溫

論曰傷寒有五其一為中溼蓋風溼之氣中人為病發熱

與寒病相類故曰溼溫也此因汗出當風或因取冷過度

致陰溼氣襲入肌膚流傳經絡其證喜汗出關節疼痛發

熱而煩小便不利大便反快是謂中溼若風溼相搏則一

身盡疼日晡所劇微熱相蒸則身必熏黃凡治風溼者欲

其微汗即風氣解而溼自去溼甚者當利其小便不可大

發汗大汗則風去溼在其病不去亦不可下之下之早則

噦下之而利不止即死診其脉當沉而細難經曰溼溫之

脉陽濡而弱陰小而急是也

麻黃杏仁薏苡仁甘草湯方

治溼溫病一身盡疼發熱

一 日晡即劇此病傷於汗出當風或久傷取冷所致

麻黃 去根節 三兩

杏仁 去皮尖雙仁 三十枚炒

薏苡仁 一兩

甘草 炙一兩

咬咀每服五錢水煎溫服

桂枝附子湯

治傷寒八九日風溼相搏身體疼痛不能

自轉側不嘔不渴脉浮虛而嗇者桂枝附子湯主之

若其人大便堅小便自利者木附子湯主之

桂 去粗皮 四兩

附子 三枚

甘草 炙二兩

咬咀每服五錢入生薑五片棗二枚同煎熱服

木附子湯方

附子

炮製去皮 臍三枚

白朮

四兩

甘草

炙二兩

劉如麻豆每

服五錢入生薑五片棗二枚同煎溫服初一服其人

身如痺半日許復之三服後其人如冒狀勿怪此以

附子未併走皮中逐水氣未得除故使之然耳法當

加桂四兩此本一方二法以大便堅小便自利故去

桂也以大便不堅小便不利當加桂附子三枚恐多

也虛弱家及產婦宜減服之

甘草附子湯方

治風溼相搏骨節疼煩掣痛不得伸屈

近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或

身微腫者

甘草炙二兩

附子二枚

白朮三兩

桂四兩

咬咀如麻豆

每服五錢水煎溫服初服得微汗則解能食汗止復煩者少減服之千金方去身腫者加防風四兩悸氣小便不利者加茯苓三兩既有附子今加生薑三兩治溼家身煩疼麻黃湯加朮四兩發其汗為宜慎不可以火攻之方

麻黃三兩

桂二兩

甘草炙一兩

杏仁去皮尖雙仁七十枚

白朮

四兩

咬咀如麻豆大每服五錢水煎溫服取微汗則解

防風黃芪湯方主之

治風溼脉浮身腫汗出惡風者

防風四兩

黃芪五兩

甘草炙二兩

白朮三兩

咬咀如麻

豆大每服五錢入生薑半兩大棗二枚同煎溫服日三喘者加麻黃胃中不和者加芍藥氣上衝者加桂下有陳寒者加細辛服後當如蟲行皮中腰以下如冰後坐被上又以一被遶腰下溫令微汗差

杏仁湯方 治風溼身體疼痛惡風微腫

杏仁去皮尖雙仁炒二十五枚

桂去粗皮

麻黃去根節先煮一兩焙乾

芍藥

天門冬去心焙各一兩

咬咀如麻豆大每服五錢入

聖濟總錄卷之三  
生薑半分同煎溫服  
傷寒時氣

論曰春溫夏熱秋涼冬寒是為四時正氣非其時有其氣人或感之病無分少長率相似者謂之時氣如春應溫而反寒夏應熱而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反溫是也其候與傷寒瘟疫病相類但可汗可下之証比傷寒瘟疫病療之宜輕爾

葛根湯方

治時氣二三日不解頭痛壯熱惡寒

葛根一兩

麻黃去根節 炙二兩

陳橘皮湯浸 去白

甘草炙

黃芩

知母

杏仁

去皮尖雙仁各一兩

每服三錢入生薑二片同煎溫服

七聖湯方

治時氣頭痛壯熱肢體煩痛

麻黃

去根節 炙三兩

蒼朮

炒二兩

橘皮

湯浸 去白

木通

各一兩

桔梗

一兩 半

山茵陳

一兩

甘草

炙二兩

每服三錢生薑三片同煎溫服

八神湯方

治時氣一二日頭痛壯熱心神煩悶

麻黃

一兩 炙

大黃

當歸

甘草

白朮

山梔子仁

芍藥

各半兩

荆芥穗

各一分

每服三錢入薄荷三葉

葱白一寸生薑二片同煎熱服

人參乾葛湯方 治時行表不解壯熱惡寒

人參 乾葛 白芍藥 桔梗炒各一兩 赤茯苓三分

甘草炙 木香各半兩 麻黃依前炙三分

每服三錢水煎熱服併三兩服溫覆出汗

五苓散方 治時氣解表出汗

赤茯苓 桂 澤瀉 白朮各一分 豬苓去黑皮半兩

為散每服五錢以新汲水調頓服訖以葱豉粥投之衣蓋取汗

葱白湯方 治時氣傷寒發汗

葱白研二兩 生薑二兩 豉合一 細茶末二錢 先以水二

盞煎葱并薑至一盞半次下豉煎少時即入茶末去

滓頓服厚衣蓋取汗

解表湯方 治初得傷寒時氣壯熱頭痛

甘草炙二兩 生薑二兩半 黑豆二合 豉咀每服五錢煎

頓服厚衣蓋覆取汗

附桂散方 治傷寒時氣

附子去皮臍 桂各半兩 為散每服三錢熱酒調頓服厚

傷寒疫癘

衣蓋汗出為度

萬靈湯方 和養三焦調順陰陽升降痞滯祛遣寒邪濕

中散寒煖胃和脾滋助氣血思美飲食虛寒痼冷痰

癖動氣心膈疼痛噎悶嘔逆一切氣疾不日全愈

前胡 芫胡 秦艽 甘草炙各半斤 藿香子炒 木香

桂去粗皮各一斤 檳榔十枚 白豆蔻去殼半斤 芍藥半斤 青橘

皮半斤 芎藭半斤 甜葶藶半斤 桔梗四兩

每服三錢大棗二枚同煎食前溫服

傷寒疫癘

論曰人居天地間稟氣於陰陽氣和則安氣鑿則病故一歲之內節氣不和寒暑乖候皆為疫癘之氣感而為病故名疫癘其狀無問長少率皆相似俗又名天行其病與時氣溫熱等病相類各隨其證以方制之

前胡湯方 治時行疫癘壯熱欬嗽頭痛心悶

前胡 升麻 麥門冬 貝母去心 紫苑去苗土 杏仁

去皮尖雙仁研各半兩 甘草炙一分 石膏一分 每服三錢竹

葉二七片同煎溫服不拘時

葛根湯方 治時行疫癘兼風熱目疼心中妨悶



葛根一兩

芍藥三分

葱白三莖

豉半合

水煎溫服再服

石膏湯方

治時行疫癘病壯熱頭痛唇乾

石膏一兩

葛根三分

芍藥

貝母

百合

升麻

各半兩

梔子仁

甘草炙各一分

每服三錢豆豉五十粒葱白三寸同煎服

此胡湯方

治時行疫癘一二日頭痛壯熱

芫胡二兩

芍藥一兩

梔子仁

黃芩

各半兩

石膏

葛根

各一兩

每服五錢葱白三寸豉三十粒同煎溫服

不計時候

傷寒結胸

論曰傷寒病發於陽下之早邪毒之氣結聚於胸膈故名結胸其證心下堅鞭按之則痛項強如柔痙狀或從心下至少腹堅滿而痛其痛不可近其脉寸口浮關上自沈是其候也若正在心下按之即痛而脉浮滑亦名結胸凡此本太陽病脉浮而動數醫反下之胃中空虛客氣動膈令人短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下堅滿則為結胸又或因得病三二日不能卧但欲起者心下必結若脉微弱者此素有積寒而反下之利止作結胸但下之而脉浮者

必結胸皆當下之脉促者不為結胸也脉若浮即不可下  
下之則死結胸證悉具煩躁者亦死又有水結在胸脇者  
又有臟結者結胸無大熱為水結似結胸狀飲食如故時  
時下利陽脉浮關脉小細沉緊者為臟結舌上白胎滑者  
為難治若心下痞堅按之不痛者非結胸乃痞也宜審察  
而各依其法治之

陷胸丸方

治傷寒結胸心下堅實大便不利

大黃

醋炒

葶藶子

隔紙炒

杏仁

炙各二兩

朴硝

一兩研細與杏仁同

研令如膏

共為末再同研勻入少鍊蜜和更杵三五百下

丸如彈子大每服一九別入甘遂末半錢蜜一合水  
煎溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為效

大陷胸湯方

治傷寒結胸頭項強心下痛按之實鞭

大黃

醋炒二兩

甘遂

溼紙裹煨一錢

朴硝

另研二兩

各搗研為末

每服用水一鍾入大黃末二錢次下朴硝末一錢同  
煎一二沸次下甘遂末一匙攪勻溫服取快利為度

小陷胸湯方

治傷寒小結胸病正在心下按之則痛脉

浮滑者

黃連

去鬚一兩

半夏

湯洗七遍焙二兩半

栝樓實

大者一枚

各細剉

傷寒結胸

先以水五盞煎括樓實取三盞去滓入黃連半夏各一半煎取一盞分溫三服

治傷寒寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯用前方白

散亦可服之

桔梗炒三分

巴豆

去皮心熬黑研如脂一分

貝母

去心三分

除巴豆

外擣羅為散入巴豆合勻每服強人半錢弱羸之人減之並溫熱水調服病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利不止進冷粥一杯身熱皮粟不解欲引衣自覆若以水溼之洗之益令熱却不得出當

汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如

上法

葶藶湯方

治傷寒結胸心下痛如石堅鞭小便不利

葶藶子

隔紙炒三分

欖榔

半兩

桑根白皮

三分

杏仁

去皮尖雙

仁

大黃

醋炒各半兩

朴硝

三分

每服五錢水煎食前服

增損理中丸

治傷寒下後虛氣不理毒復上攻毒氣相

搏結於胸中縱不下者毒已入胸胃中不通毒還攻上心中結滿厥逆欲絕心起高胸手不可近當先理

其氣

人參 白朮

甘草

括樓根

枳實

麩炒

赤茯苓

去黑皮

牡蠣

煨各二兩

乾薑

一兩半

搗羅為末鍊

蜜丸如彈子大每服一丸熟水化下不歇再服不過

五六丸胸中豁然

陷胸青龍湯方 治傷寒結胸毒氣內盛手足逆冷腹脹

喘急大便不通

牽牛子

微炒一兩半

人參

三分

陳橘皮

浸去白半兩

桂

檳榔

各一兩

大黃

醋炒半兩

朴硝

一兩

每服五錢人生薑半分同煎食前溫服

傷寒譫語

傷寒潮熱

傷寒煩渴

傷寒煩躁

傷寒厥逆

傷寒譫語

論曰傷寒不應發汗而汗之遂至亡陽津液內竭胃中燥實則令譫語此病或由津液不和內有燥屎或三陽合病或瘀熱蓄血在裏或婦人熱入血室皆使譫語也然譫語屬胃胃者足陽明經也陽明為病主身熱故譫言妄語則身當有熱脈當洪大洪大亦陽脈也故其病為煩滿譫語若手足厥脈反沉細而微者為逆也然又有鄭聲者取其

鄭重之意與譫語相類蓋古人以此分虛實醫者當以脉  
症參合別之不可不慎故謂虛則鄭聲實則譫語

小承氣湯 治傷寒陽明病人多汗津液外出胃中燥大  
便秘硬則譫語宜此湯

大黃四兩 紫朴二兩 枳實三枚 水煎五錢空心溫服日二

大承氣湯 治傷寒陽明下血譫語此為熱入血室但頭  
汗出者刺期門隨其實而瀉之澱然汗出則愈汗出  
譫語以有燥屎在胃中此為風也須下者過經乃可  
下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之愈

大黃四兩 紫朴半斤 枳實五枚 水煎五錢去渣入芒硝

末一錢再沸溫服日二

白虎湯 治傷寒三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁  
而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上汗出手  
足厥冷若自汗出者宜此湯

知母六兩 石膏一斤 甘草二兩 粳米六合 水煎五錢溫服

柴胡湯 治傷寒熱實得汗不解腹滿脹痛煩躁譫語

柴胡一斤 大黃炒 片苓 白芍 半夏三分 枳殼五錢

薑水煎五錢溫服

犀角湯 治傷寒邪熱在胃譫語妄言身體壯熱

犀角 大青 人參三兩 遠志 升麻兩半 片苓

柴胡兩一 甘草錢五 薑水煎五錢入蘆根茅根各五寸

溫服

人參柴胡湯 治傷寒經六七日不解默默而煩心腹乾

燥大腸結澀譫語妄言

人參三分 柴胡兩一 白芍 知母 片苓 萎蕤

大黃炒 半夏 甘草錢五 薑水煎五錢服日二

白愈方 治傷寒病汗多亡陽譫言妄語不可下與柴胡

桂枝湯以和榮衛以通其津液

柴胡兩四 白芍 人參 桂心 片苓 半夏

甘草兩一 薑棗水煎五錢空心溫服日二

傷寒潮熱

論曰傷寒潮熱者謂潮作有時由邪氣入裏故病日晡發潮熱已而微利者有微發潮熱而大便溏者有潮熱而咳逆者有結胸而潮熱者大凡潮熱皆以邪氣內實制方宜酌其輕重

小柴胡湯 詳語

柴胡加芒硝湯 治傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡

潮熱已而微利此大柴胡症下之而不得利今反利

者知醫以丸藥下之非其治也夫潮熱者實也先宜

服小柴胡以解外後與此湯

柴胡 半夏 芒硝二兩 人參 片苓 甘草二兩

薑棗水煎五錢去渣入芒硝一錢沸服

大小承氣湯 詳論

柴胡石膏湯 治傷寒十日以上潮熱不退

柴胡 石膏 白朮 赤茯苓 山梔 萎蕤

桑白皮三分 水煎五錢溫服日二

鼈甲湯 治傷寒過經潮熱不解或作寒如瘧狀

鼈甲 柴胡 赤茯苓兩 片苓 甘草 知母五錢

桑白皮三分 薑棗水煎五錢服

秦芫湯 治潮熱不退發作無時

秦芫 鼈甲一兩 甘草五錢 生薑水煎五錢入豆百粒

葱白三寸空心溫服日二

傷寒煩渴

論曰腎者水藏膀胱者津液之腑二經相為表裏傷寒熱

入于臟流于少陰之經則腎受病矣腎水惡燥熱盛則燥故渴而引飲又傷寒邪氣非發汗吐下則不能除若發汗吐下過甚則亡津液耗少熱氣內生亦令病人煩渴也

白虎加人參湯 治傷寒用桂枝湯大汗出大煩渴不解

脉洪大者

知母三兩 人參兩半 石膏八兩 甘草一兩 粳米二合

水煎五錢至米熟溫服日二

五苓散 治發熱六七日不解煩渴引飲水入則吐此為

水逆

猪苓 赤茯苓 白朮 桂心 澤瀉一兩

共末熟水下二錢日二汗出乃愈

猪苓湯 治傷寒脉浮發熱渴欲飲水小便不利水入則吐

猪苓 赤茯苓 阿膠 滑石 澤瀉一兩

水煎五錢空心溫服以差為度

八味知母湯 治傷寒病數日不解心躁煩亂小腹脹急

臍下疼痛大渴喘乏

知母 白芍 麥冬 柴胡 澤瀉三分 片苓



甘草五錢 石羔兩半 薑棗竹葉水煎五錢服

葛根散 治傷寒躁渴頭痛不得眠四肢痛

葛根 片苓 大青 石羔 人參一兩 甘草五錢

水煎三錢溫服日二

人參湯 治傷寒下後除熱止煩渴

人參 麥冬 五味 石羔一兩 甘草五錢

水煎五錢服日二

黃芩蘆根湯 治傷寒吐下後內外有熱煩渴

片苓 蘆根 人參 赤茯一兩 桂心五錢

薑棗水煎五錢服

竹茹湯 治傷寒吐下後煩渴不止

竹茹九 人參五錢 烏梅肉炒二枚 水煎三錢服日二

茯苓地黃湯 治傷寒胃熱引飲煩渴不止

赤茯 生地 括攬一兩 知母五錢 麥冬兩半

水煎五錢入小麥百粒竹葉二七片棗二枚煎服

知母犀角湯 治傷寒煩渴飲水無度日漸消瘦

知母 犀角 升麻五錢 石羔三分 水煎五錢入竹葉

三七片小麥五十粒土瓜根汁括攬汁各半合服

傷寒煩躁

論曰傷寒陽氣多陰氣少病發于陽經者故令煩躁其候身熱而煩渴引水漿若胃中乾燥者必譫語亦有少陰經煩躁者當辨之

大青龍湯

治傷寒太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆

麻黃

去根節  
六兩

甘草

桂心二兩

杏仁

去皮尖炒  
四十枚

石膏

三兩  
研

薑棗水煎五錢溫服出汗止後服

五苓散煩躁不得眠

白虎加入參湯大渴舌乾燥欲飲水數升二方俱詳煩渴茯苓四逆湯治汗下後病仍不解煩躁

白茯苓

四兩

人參

附子

一兩

甘草

乾薑

二兩

水煎五錢服

吳茱萸湯

治少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者

吳茱萸

洗炒  
一升

人參

二兩

大棗生薑水煎五錢服日二

蘆根湯

治陽毒五六日以上胸中煩熱乾嘔躁悶

蘆根

一兩

甘草

知母

柴胡

括樓根

兩半

片苓

兩半

生薑 水煎三錢溫服

梔子豉湯 治陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘汗

出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤而反譫

語若加溫針必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空

虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者

山梔 肥大者 四枚 豉 五錢 水煎空心溫服得吐便止

桂甘龍牡湯 治火逆汗下之因燒針煩躁

桂枝 一兩 甘草 龍骨 二兩 牡蠣 二兩 水煎五錢溫服 二日

傷寒厥逆

論曰傷寒病手足厥逆其名曰厥此因陽氣衰陰氣盛陰勝則陽脉逆而不通于四肢所以逆冷其症令人惡寒不飲水下利清穀或清便自調或小便數外症默靜是其候也宜溫之灸之若灸而手足不溫者為難治然厥亦有熱者先發熱而後厥熱深厥亦深熱微厥亦微脉雖沉伏按之當滑若或畏熱飲水或揚手擲足煩躁不得眠大便秘小便赤外症昏憤者雖厥不可溫也宜下之通脉四逆湯 治手足厥冷微喘脉不出

附子 五錢 人參 甘草 一兩 乾薑 半兩

水煎五錢溫服日二

當歸四逆湯 治傷寒手足厥冷脉細欲絕

川歸 白芍 桂心一兩 細辛一兩 甘草 木通七錢

大棗水煎五錢溫服日二

芍藥湯 治下利清穀內寒外熱汗出而厥腹痛兼嘔

白芍 附子一兩 人參 甘草五錢

薑水煎五錢溫服日二

吳茱萸湯 治手足厥冷脉細欲絕

吳茱 白芍 川歸 桂心一兩 甘草 細辛三分

乾薑五錢 棗水煎五錢服日二

葱熨法 治傷寒病後氣虛陽脫體冷無脉氣息欲絕不

省人事及陰厥服百法不效者

葱一斤水 洗淨 以麻縷扎如盞許大切去根及葉惟存白

二寸許如大餅燄先以火熳一面令通熱乃以熱處

放在病人臍中連臍下其葱上以熨斗滿貯火熨之

令葱餅中熱氣透入肌肉中須預作三四箇餅子一

餅壞不可熨又易一餅良久病人漸醒手足俱溫有

汗出更服四逆湯以溫其內其病即差

傷寒頭痛

傷寒喘

傷寒上氣

傷寒咳嗽

傷寒頭痛

論曰傷寒頭痛者邪氣循陽脉上攻于頭也是以傷寒傷風溫病熱病風溫病皆有頭痛病者蓋頭痛乃陽症也故太陽頭痛必發熱惡寒陽明頭痛不惡寒反惡熱少陽頭痛脉弦細而發熱至于三陰脉從足至胸皆不至頭惟厥陰脉挾胃屬肝絡膽循喉嚨上頰額連目系上出額故仲景止有厥陰頭痛一症治以吳茱萸湯是也

桂枝湯

治太陽病頭痛發熱汗出惡風

桂枝

白芍

三兩

甘草

炙二兩

生薑大棗水煎五錢空

心溫服投以熱粥助藥力

小承氣湯

治傷寒六七日不大便頭痛有熱

大黃

四兩

紫朴

薑汁炒二兩

枳實

三枚

水煎五錢溫服

麻黃湯

治傷寒太陽頭痛發熱身疼腰痛一身骨節俱

痛惡風無汗而喘者

麻黃

三兩

桂枝

二兩

甘草

杏仁

去皮尖炒一兩

水煎五錢稍熱服取汗

連鬚葱白湯 治傷寒已發汗或未發汗頭痛如破

葱白連鬚三莖 生薑二兩 分三服水煎通口熱服服不差

用葛根葱白湯

葛根葱白湯 治頭痛不止

葛根 白芍 知母錢五 川芎三分 薑葱水煎五錢溫服

小柴胡湯 治脉弦細頭疼發熱屬少陽少陽不可汗

柴胡二兩 片苓 人參 甘草三分 半夏六錢

薑棗水煎五錢空心溫服日二

吳茱萸湯 治傷寒厥陰乾嘔吐涎沫頭痛

吳茱萸洗炒三兩 人參兩半 薑棗水煎五錢空心溫服

茶調散 治頭痛不止

石膏研二兩 羌活 茵陳蒿 蒼朮 甘草 荆芥穗

川芎一兩 桂心錢五 共末用臘茶末一錢同葱煎湯下

一錢

石膏湯 治頭痛不可忍

石膏 麻黃一兩 葛根三分 何首烏錢五

水煎三錢溫服日二

瓜蒂散 治頭痛胸滿發熱惡寒脉緊而不大是膈上有涎

瓜蒂一兩 為末熱水下一錢吐痰涎愈

前胡湯 治頭痛壯熱

前胡 半夏 桂心 玄參 甘草 桔梗炒 旋復花

片苓 生地一兩 薑水煎五錢服

四白散 治頭痛身熱百節疼痛

白芷 白附子 白殭蠶炒 白蒺藜炒各等分

共末茶酒任下二錢

傷寒喘

論曰傷寒喘其症不一有邪氣在表表未解無汗而喘者

有邪氣在裏汗出不惡寒腹滿而喘者有潮熱者有心下有水氣而喘者古人各亦求其本故在表者當汗在裏者宜下至于心下有水而喘又當利其小便若乃陰症發喘是為無陽非灸之不可

小青龍加杏仁去麻黃湯 治心下有水氣咳而發喘

白芍 甘草 桂心 杏仁 五味 細辛 乾薑三兩

半夏二兩半 水煎五錢服

麻杏草膏湯 治下後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱

麻黃去根節四兩 石膏八兩 甘草二兩 杏仁去尖五兩

傷寒喘

水煎五錢服

麻黃湯 治太陽與陽明合病喘而胸滿不可下

麻黃<sup>三兩</sup> 桂心<sup>二兩</sup> 甘草<sup>一兩</sup> 杏仁<sup>七十枚</sup>

水煎五錢溫服取微汗

大承氣湯 治傷寒陽明病脈遲雖汗出不惡寒其身必

重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然汗出者此大便已硬也大承氣主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令至

大泄下

大承氣湯方詳謔語

傷寒上氣

論曰傷寒上氣者肺主氣手太陰是其經也病人肺氣凡有不調又遇寒熱邪氣傷于其經則脹而氣逆不下故令上氣

竹茹湯 治上氣喘滿客氣在臆乾嘔口生瘡不得飲食

竹茹 葛根<sup>一兩</sup> 半夏 麥冬<sup>三分</sup> 甘草 陳皮<sup>去白炒</sup>

錢 薑水煎五錢溫服日二



天門冬丸 治心肺熱上氣喘逆

天冬 白茯苓 杏仁一兩 生地 貝母 甘草

烏梅肉炒 人參五錢 共末蜜丸彈子大含化一九二

可三五

葶藶湯 治上氣喘粗身面腫小便澀

葶藶紙隔微炒五錢 大棗五枚 水煎溫服日二

貝母丸 治心肺有熱咳嗽上氣喉中作聲痰涕口乾

川貝母二兩 杏仁去皮尖炒四兩 天門冬一兩 旋復花五錢

炙甘草三分 共末蜜丸彈子大食後含化一九

傷寒咳嗽

論曰傷寒咳嗽者寒氣客于肺也肺受虛寒微則咳嗽然又有邪熱客于上焦其人必欲飲水水停心下水氣乘肺而咳嗽者當熟察之

麻黃湯 治咳嗽日夜不止

麻黃去根節 赤茯苓 桑白皮一兩 葛根 五味子

紫蘇葉 炙甘草 紫苑五錢 石膏研兩半 桂心一兩

葶藶炒一分 薑棗水煎五錢空心溫服日二

小青龍湯 治心下有水氣咳而微喘發熱或利或噎

麻黃去根節一兩

白芍

半夏薑汁製

桂心

細辛

炒乾薑

五味子炒

甘草五錢

水煎五錢服日二

五味子飲

治傷寒咳嗽

五味子炒

麻黃去根節

阿膠

陳皮炒一兩

甘草

杏仁去皮尖炒五錢

薑水煎三錢服

加減小柴胡湯

治五六月往來寒熱或微熱咳嗽

柴胡二兩

片苓

半夏

甘草三分

黑乾薑五錢

五味子炒一合

薑水煎五錢服

地黃飲

治毒氣攻肺咳嗽咽喉生瘡

生地二兩

大黃

升麻

貝母

麥冬

甘草一兩

水煎三錢入蜜少許服

射干湯

治春冬月傷寒夏秋月中冷咳嗽喉鳴聲啞乾

噦咽喉不利

射干

杏仁

麻黃

桑皮一兩

半夏

甘草

桔梗

炒二兩

陳皮

紫苑五錢

薑棗水煎五錢服

前胡飲

治肺盛寒痰嗽不止心膈煩滿不能飲食常多

嘔逆

前胡

桔梗

玄參

人參

生地

甘草

旋復花

桂心

兩一

半夏

紫朴

兩二

薑水煎五錢服

聖濟總錄纂要卷三終

