

參芍藥 打損吐血黑神散童便調服 有時
或吐血两口隨即無事過數日又發經年累月
不愈者宜黑神散吐血發渴名為血渴也或四
物湯十全大補湯量胃氣虛實用之

統旨云吐血先哲皆以為熱其因于寒者理亦有
之何則寒邪屬陰人之榮血亦屬陰古人云風
傷衛寒傷榮各從其類人果身受寒邪口受寒
物邪入血分血得冷而凝則被寒矣在上則從
口而出在下則從便而出若此者實病機之所

有焉得為盡無也但其血色之黑與吐血因熱
極而反兼水化者相似茲則宜于脉証間求之
脉微遲而身又清涼者寒也脉洪數而身又煩
熱者熱也寒則溫之熱則清之治法大不同矣
嘔吐血

生生子曰吐血成碗吐出者甚至有出而盈盆者
丹溪云多是陽盛陰虛故血不得下行因火炎
上之勢而上出脉必大而芤大者發熱芤者血
滯與失血也

又曰有氣虛中寒陰陽不相守血乃妄行而吐出者經所謂陽虛陰必走者是也當用四物理中湯加乾姜甘草煎服中溫則血自歸經矣切不可投苦寒之劑

丹溪云山梔子最能清胃脘之血先吐紅後見痰嗽多是陰虛火動痰不下降四物湯加痰藥火藥先痰嗽後見紅多是痰積熱降痰火為急痰嗽涎帶血出此是胃口清血熱蒸而出重者梔子輕者藍實或暴吐紫血一碗者無事

吐出為好此熱傷血死于中用四物湯解毒湯之類吐血挾痰積吐一二碗者亦只補陰降火四物湯加火劑之類挾痰若用血藥則泥而不行只治火自止吐血乃火病也大吐血不止以乾姜炮黑為末童便調從治喉脘痰血荊芥散妙又云嘔吐血出于胃也實者犀角地黄湯主之虛者小建中湯加黃連主之千金方云吐血有三種有內衄有肺疽有傷胃內衄者出血如鼻衄不從鼻孔出是近在心肺

間津液出還流入胃中或如荳羹汁或如切齧
血凝停胃中因即滿悶便吐或出數斗至一石
者是也得之于勞倦飲食過常也按韻書齧音
肺疽者或飲酒後熱毒滿悶吐之時血從吐後
出或一合半合半升一升是也

傷胃者因飲食大飽之後胃中冷不能消化便
煩悶強嘔吐使所食之物與氣共上衝臍因傷
裂胃今吐血色鮮正赤腹亦絞痛自汗出其脉
緊而數者為難治也

劉宗厚曰凡治血必血屬之藥欲求血屬之藥其
四物之謂乎河間謂隨証輔佐謂之六合湯者
詳言之矣余故陳其氣味專司之要不可不察
夫川芎血中氣藥也通肝經性味辛散能行血
滯于氣也地黃血中血藥也通腎經性味甘寒
能補真陰之虛也當歸分三治血中主藥也通
肝經性辛溫全用能活血各歸其經也芍藥陰
分藥也通脾經味酸寒能涼血治血虛腹痛也
若求陰藥之屬必于此而取則焉脾胃論有云

若善治者隨經損益摘其一二味之所宜為主
治可也以特論治血病而求血藥之屬者也若
氣虛血弱又當從仲景血虛以人參補之陽旺
則生陰血也若四物湯者獨能主血分受傷為
氣不虛也輔佐之屬若桃仁紅花蘇木血竭丹
皮者血滯所宜蒲黃阿膠地榆百草霜棕櫚灰
者血崩所宜乳香沒藥五靈脂凌霄花者血痛
所宜從容瑣陽牛膝枸杞子益母草夏枯草敗
龜板者血虛所宜乳酪血液之物血燥所宜乾

姜桂者血寒所宜生地苦參血熱所宜特取其
証治大畧耳若能觸類而長可謂應無窮之變矣
脉訣舉要曰諸症失血皆見芤脉隨其上下以驗
所出大凡失血脉貴沉細設見浮大後必難治
治火之劑

大薊散 治辛熱傷肺嘔吐血或一碗或半升名
曰肺疽

大薊根 犀角屑 升麻 桑白皮 蒲黃
杏仁去皮 桔梗各二錢 甘草炙五分

右分作二服每服姜三片水煎服

四生丸 治吐血衄血熱妄行

生荷葉 生艾葉 側柏葉 生地黄各等分

搗爛為丸如鷄子大每服一丸用水二鍾煎

至一中去渣服

犀角地黄湯 治血積胸中吐血衄血

犀角鎊 赤芍藥 牡丹皮 生地黄各一錢

水煎服此方若有痰者及氣逆不降者服之皆不効予每用加枳壳棗仁滑石効

茜根湯 治吐血咯血嘔血等症

四物湯加童便浸香附一錢五分 茜草根二錢半 忌鉄

水煎服二三服立愈

治吐血

大黃末一錢 生地黄汁一合

水半鍾煎四五沸服即愈

又方 好墨煨去膠氣 為細末每服二錢以白湯化服

治吐血暴甚昏運不止

人參一兩 為末用鷄子清調如稀糊以匙挑服

盡効五更服之尤妙

治吐血

生地黄

五斤搗汁

生蜜

二斤半

共以瓦器盛貯鍋內重

湯桑柴文武火熬三日夜取出入人參末

四兩

茯苓末

六兩

攪勻不拘時服此即瓊玉膏也

又方加入青蒿汁熬膏再加檳榔末一兩以降

其氣使下行也

奇方

治飲酒過多蘊熱胸膈以致吐血衄血

葛花

二兩

黃連

四兩

右為末以大黄末熬膏為丸如梧桐子大每

枇杷散

治暑毒攻心嘔吐鮮血

方在暑門

龍肝膏

治吐血不止

伏龍肝

一兩

生地汁

麥冬汁

小蘗汁

藕汁

各三合

姜汁一合

入蜜半匙慢火熬成膏每服一匙

帶補之劑

奇方 治肺損嗽血吐血

生地 取四兩鹿角膠一兩炒為末

右以地黄汁拌和每服三錢童便加姜汁少許調下

側柏散 治內損吐血下血或用酒太過勞傷于

內其血妄行如湧泉口鼻皆流須臾不救則

側柏葉 一兩半 人參 荊芥穗 燒灰存性各一兩

為末每服二錢麩一錢新汲水調如糊啜服

服百丸溫湯下或煎服亦可

辰膠散 治大人小兒吐血

阿膠 炒 蛤粉 各一兩 辰砂 少許

右為末藕節搗汁和蜜調下食後服

龍腦鷄蘇丸 治膈熱咳嗽或吐血衄血

方在火熱門

茯苓補心湯 治心虛為邪氣所傷吐血

方在心痛門

藕節散 治吐衄不止

藕汁 生地黄汁

生蜜五大薊汁各三

右和勻每服一小鍾不拘時服

拔萃犀角地黄湯 治熱甚而血積胸中

生地黄兩二黃芩 黃連各一大黃錢五

每服一兩水二鍾煎一鍾食後服

雙荷散 治卒暴吐血

藕節七荷葉頂七

搗碎入蜜用水二鍾煎八分去渣溫服或研末蜜調下

麥冬飲子 治吐血久不愈者

五味子十粒麥門冬 黃芪各一當歸 人參

生地黄各五水煎服

白朮散 治飲食過度負重傷胃吐血

白朮 人參 黃芪各二白茯苓錢一炙甘草錢一

山藥 百合 柴胡 前胡各六

分作三帖每服加姜棗水煎

又方 治同上

理中湯加葛根

鷄蘇散 治勞傷肺經吐紅咽喉不利

紫蘇葉 白茅花 黃芪 生地 阿膠 各二錢

麥門冬 桑白皮 桔梗 貝母 蒲黃 炒

甘草 加姜棗煎服

天門冬湯 治思慮傷心吐血不止

天門冬 白芍藥 麥門冬 生地黃 遠志

藕節 黃芪 阿膠 沒藥 當歸

甘草 各一錢五分 人參 一錢

分作二服 姜三片水煎服

蓮心散 治同上

蓮子心 粳米 各五錢 為末空心溫酒調服

歸脾湯 治思慮傷脾心多健忘其血妄行或吐或下

白朮 茯神 黃芪 炙人參 酸棗仁 炒各二錢五分

木香 炙甘草 各五分 負眼肉 五枚

姜一片棗一枚水煎服

赤茯苓湯 治大怒傷肝氣逆于胸吐血衄血

赤茯苓 人參 桔梗 陳皮 各三錢 麥門冬

芍藥 檳榔 各一錢五分 分二服 姜三片水煎

丹溪方 治見血後脾胃弱精神少血不止者

人參錢一 黃芪錢二 五味子錢十三 芍藥 甘草

當歸 麥門冬各五分 加鬱金尤妙水煎服

又方 治同上

人參 白朮 茯苓 陳皮各一錢 甘草 川芎

半夏曲各五分 神曲 青皮各三分 水煎服

如胃不和加藿香 渴者加葛根五分

痰結塊者加貝母錢一 黃芩 橘紅各五分

小便赤加黃柏五分 大便燥結加當歸七分

心煩加酒晒黃連五分 小便滑加牡蠣

若見血多去半夏恐燥加生地錢一 牡丹皮五分

棗仁三分 若胃中不足飲食少進加炒山梔

仁五分 若血溢入濁道留叙膈間滿則吐

紅蘇子降氣湯加人參阿膠各五分

上膈熱壅吐血者以四物湯加荆芥阿膠各五分

分 更不止于本方中加大黃滑石各五分

胃傷吐血宜理中湯加川芎乾葛各五分 以是

飲酒傷胃也 吐血不止茜根為末用二錢

待冷食後服良

必勝散 治男婦血妄流溢或吐或咳或衄

小薊 人參 蒲黃 當歸 熟地 川芎

烏梅去核各一兩 每服六錢水煎服

大阿膠丸 治肺虛客熱咳嗽咽乾多唾涎沫或

有鮮血勞傷脾胃吐血嘔血並皆治之

方在後咳血門

止血之劑

白芨散 治吐血

白芨末并花水調服每服二錢

地黃飲 治衄血吐血

新生地搗煮日服數升三日愈

此方治經閉効甚

乾姜散 治吐血不止

姜炭為末童便調服

治諸血上行用韭菜汁姜汁童便磨鬱金飲之其

血自清如無鬱金以山茶花代之

又方 用血餘灰三錢 為末冷水調下

治吐血咯血用藕節搗汁飲之

花蓋石散 治勞証五內崩損湧噴血出成升斗者服之立止

花蓋石煨 為末童便一鍾煎溫調藥末三錢極

甚者五錢食遠服如男子病則和酒一半婦人病則和醋一半與童便和調服之立止其瘀

血化為黃水服以藥後患人必踈解其体却服獨參湯補之

調氣止血之劑

芎附散 治衄吐血不歸經

川芎二兩 香附四兩 為末每服二錢茶湯調下

綱目云治怒氣傷肝氣而嘔血以黃連香附青黛

柴胡甘草平其肝自愈宜服赤茯苓瀉心湯

大七氣湯入川芎煎調蘇合香丸

大子康感人川昔煎醋藕合香式

榮貼甘草平其根自愈宜服赤芥冬感必愈

臨目云欲效藥對根原而聖血以黃魚香柳青

仙膏二香柳四 萬末每服二錢茶送服下

旨潤滑 代血血不亂

暗麻立血之儼

咳血

咳嗽有声而痰内有血者是也或咳出純是血痰

丹溪云乃火升痰盛

身熱多是血虛四物湯加

減用

丹溪云痰帶血絲出童便竹瀝止之

經血逆行

或血腥吐血唾血韭汁服立効 咯血用姜汁

童便青黛入血藥中加四物湯牛膝膏地黃膏

之類

又方用韭汁童便二物加鬱金研細末合和服之

其血自消

脉大發熱喉中痛者是氣虛用參芪蜜炙黃栢荆
芥地黃當歸韭汁童便姜汁磨鬱金飲之其血

自消 以補兼解鬱也

統旨云嗽出痰內有血者名咳血又云嗽血其因
有二熱壅于肺者易治不過涼之而已久嗽損
於肺者難治以已成勞也熱嗽有血宜金沸草
散加阿膠痰盛加瓜蒌仁貝母勞嗽有血宜補
肺湯加阿膠白芨嗽血而氣急者加杏仁痰中
帶血絲者此是陰虛火動勞傷肺臟 宜滋陰保肺湯

入方

香附 童便浸

北杏仁 童便浸去皮尖炒

山梔仁 炒 青黛

海粉

瓜蒌仁

訶子

馬兜鈴

為細末入白礬砂少許煉蜜少加姜汁為丸
噙化一丸白湯下

天一丸 此壯水之主以鎮陽光劑也與前方相

兼服治陰虛火動咳血等症甚効

懷地黃

牡丹皮

黃栢

童便浸晒乾

知母

童便浸晒乾

枸杞子

五味子

麥門冬

牛膝

白茯苓

為末煉蜜為丸梧子大空心白湯吞下八九
十九

天門冬丸 潤肺止嗽治咯血吐血咳血
方在咳嗽門

丹溪鹿黃丸 治酒色過度飢飽失時吐血咳血
痰血神効

枇杷葉 欵冬花 北紫苑 杏仁去皮尖 木通
鹿茸炙 桑白皮各一兩 大黃五錢

為末煉蜜為丸臨睡含化

七傷散 治血汚血鬱血熱勞嗽吐血血痰丹溪方

黃藥子 白藥子各一兩 赤芍藥七錢五分 玄胡索
知母各五錢 鬱金二錢半 當歸五錢 山藥 乳香

沒藥 血竭各二錢 為末每服二錢茶湯下

綱目云肺熱此方極有効本草云白藥子黃藥子治肺熱大有功一方紅花當歸煎湯調下

海藏甘桔加阿膠紫苑湯 治肺痿咳唾膿血
方見綱目傷寒咽痛門

羅太無大阿膠丸 治血虛嗽血吐血

阿膠微炒 卷柏 生地 熟地 大蘊 山藥

雞蘇葉 五味子各一兩 栝子仁另研 麥門冬

茯苓 百部 遠志 人參 防風各五錢

為末煉蜜丸如彈子大煎小麥、門冬湯嚼

下一丸綱目云保養精血純補劑也血虛有潮熱者宜之

劫勞散 治肺痿痰嗽痰中有紅線盜汗發熱過

則冷飲食減少 方在咳嗽門

陳日華云有一女子及笄病症甚危百藥不效偶得此只一料除根

羅太無五味黃芪散 治嗽咯血成勞眼痛四肢

困倦脚膝無力

麥門冬 熟地黄 黃芪 桔梗各五錢 白芍藥

五味子各二分 人參二錢 甘草一分

每服五錢水煎服一日三服

人參黃芪散 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠

五心煩熱咽乾頰赤心冲潮熱盜汗減食咳嗽

臟血

人參一兩 秦艽 茯苓各二兩 知母二錢五分 桔梗乙兩

桑白皮一兩 紫苑 柴胡各二兩 半夏洗一兩

黃芪三兩 鱉甲去裙酥 每服五錢水煎服

五錢

人參蛤蚧散 治二三年間肺氣上喘咳嗽咯吐

膿血滿面生瘡遍身黃腫

蛤蚧一對全者河水浸五宿逐日杏仁去皮尖

甘草換水洗去腥氣酥炙黃色茯苓 貝母 知母各三

桑白皮二為細末每日如茶點服神効

海蔵云蛤蚧補肺勞虛嗽治久嗽不愈肺間積虛

熱久則成瘡故嗽出膿血曉夕不止喉中氣塞

胸膈噎痛用蛤蚧阿膠生犀角鹿角膠羚羊角

各一兩除膠外皆為屑次入膠分四服每服用

河水三升於銀石器內慢火煮至半升去渣臨

卧微温細細呷之其渣候服盡再槌都作一服

以水三升煎至半升如前服病人久虛不喜水

當減水蛤蚧係補中有通

麥門冬湯 治傷寒後傷肺咳唾膿血胸脇脹滿

上氣羸瘦

麥門冬 桑白皮 生地黄各一紫苑 竹茹

半夏洗 桔梗炒 麻黃去根節各 五味子

甘草各五 錢

為粗末每服五七錢加棗三枚姜三片水煎服

羅太無續斷散 治骨蒸勞熱傳屍瘦病潮熱煩

躁喘嗽氣急身疼盜汗兼治咳嗽吐膿血

續斷 紫苑 桔梗 竹茹 五味子各三錢

生地 桑白皮各五兩 甘草炙二兩 赤小豆半斤

每服五七錢入小麥五十粒水煎日三服

海藏紫苑湯 治咳嗽吐血虛勞症肺痿變癰

方在咳嗽門

本事方云治勞瘵吐血損肺及血妄行神傳膏用

剪草一斤婺台州皆有惟婺州者可用狀如茜

草又如細辛每用一斤淨洗為末加入生蜜一

斤和為膏以器盛之不得犯鉄九蒸九晒日一

蒸曝病人五更起面東坐不得語用匙挑藥如

粥服每服四匙良久用稀粟米粥壓之藥冷服

粥飲亦不可太熱或吐或下皆不妨如久病肺

損咯血只一服愈尋常咳嗽血妄行每服一匙

可也神驗

治肺經嘔咳諸血及痰中有血初生用蘿蔔汁半

盞入鹽少許服之立効如無生蘿蔔用蘿蔔子
一錢紫蘇葉一錢同煎服次用鷄蘇散加阿膠
治之本草云蘿蔔大下氣
氣下則血亦下也

經驗方 治咳嗽甚者或有吐血

鮮桑白皮

一斤米泔浸三宿
淨刮去上黃皮

右剉細入粳米四兩焙乾同搗為末每服一
二錢米飲調下

本事方 治久嗽咯血成肺痿及吐白涎胸膈滿
悶不食扁荳散

扁荳

生薑各五錢

批杷葉

去毛

半夏

人參

白朮

各一分

白茅根

二分

右水三升煎一升去渣加檳榔末一錢和勻
分作四服不拘時候

千金方 治上氣咳嗽喘息喉中有物唾血

生薑汁

杏仁各二升

糖

蜜

各一升

猪膏二合

右五味先以猪膏煎杏仁色黃出之以紙拭
令淨搗如膏和姜汁蜜糖等合煎令可丸每
服杏仁一枚日夜服六七次漸次增加

欵花補肺湯

人參 麥門冬 各一分 五味子 十五粒 欵冬花

紫苑 桑白皮 各一分 當歸 一分 芍藥 知母

貝母 茯苓 橘紅 各八分 甘草 五分

水煎服

寧嗽湯

五味子 十五粒 茯苓 桑白皮 一分 陳皮 壹錢

知母 一分 馬兜鈴 一分 川芎 一分 麥門冬 一分

粉草 五分

滋陰保肺湯

黃柏 鹽水炒 知母 天門冬 一分 當歸 一分 芍藥

生地 橘紅 紫苑 桑白皮 各八分 大粉草 五分

阿膠 蛤粉炒 五味子 十五粒 水煎服

咯血唾血痰涎血

咯血者喉中常有血腥一咯血即出或鮮或紫者是也 又如細屑者亦是也治法四物入姜汁童便青黛之類有咯出痰帶血絲者同治但宜加痰火藥

唾血者鮮血隨唾而出者是也二者皆出于腎亦有瘀血內積肺氣壅逼不能下降用天門冬知母貝母桔梗黃柏熟地遠志或加炮姜

生生子曰唾血症曾見二人口中津唾皆是紫黑

九卷
血水如猪血之色晦而不鮮形瘦体熱盜汗為
有怫鬱所致如此者年餘治以清痰降火開鬱
等藥或止或發其一乃姪婦也後因注舡大吐
痰涎數椀其症再不復萌由是觀之唾血亦有
木鬱之症不可不知

痰涎血出于脾以葛根黃芪黃連芍藥當歸甘草
沉香之類主之

丹溪曰咯血痰帶血絲出者用姜汁青黛童便竹
瀝入血藥中用如四物湯加地黃膏牛膝膏類

滑伯仁曰寒涼之溢水乃瀉火也溫熱之助火乃
折水也衄血手陽明循手經上行入清氣道中
咯血乃入于所合也所合肺也

又曰咯血為病最重且難治者以肺手太陰之經
氣多血少又肺者金象為清肅之臟今為火所
制迫而上行以為咯血逆之甚矣上氣見血下
聞病音謂喘而咯血且咳嗽也

唾血責在下焦陽火煎迫而為之也腎主唾為足
少陰少血多氣故其証亦為難治

恩袍散 治咯血吐血唾血及煩躁咳嗽

生蒲黃 乾荷葉 茅根各等分

為末每服三錢濃煎桑白皮湯食後溫服

丹溪方 治咯血

桑白皮一分 半夏一分 炒知母 貝母 茯苓各一分

生地黄 陳皮各一分 阿膠炒 甘草 杏仁炒各五分

山梔子 桔梗各七分 柳桂二分 入此以治上焦

姜葱白水煎服

又方 治咯血衄血

白芍藥兩一 犀角五分 錢

各為末新汲水調服一錢血止為限

又方 治咯血

荷葉焙乾 為末米湯調下二錢

又方 治痰中血

白朮一分 貝母 芍藥 桑白皮 薤仁各一分

甘草三分 山梔炒黑 牡丹皮一分 水煎服

又方 治痰中血

橘紅一分 半夏 茯苓 貝母 牡丹皮

桃仁各一錢 黃連 甘草 大青各五分

姜三片水煎服

又方 治痰中血

橘紅二錢 半夏 茯苓 白朮 枳壳 黃芩

桑白皮各一錢 五味子十五粒 甘草三分 人參五分

或加青黛五分水煎服

地黃散 治一切吐血咯血能解一切毒及諸熱

煩燥

益草根四錢 大荳子 黃藥子 甘草各二兩

右為末每服二錢新汲水調下加人參二兩

治痰嗽有血

又方 治吐血熱渴

茅根一味絞汁飲之一日三服効

治虛勞久嗽咯血

五倍子炒為末 每服一錢温茶調勻米飲送下

白芨散 治咯血

白芨兩一 藕節五錢 為細末每服一錢白湯調下神

効 或云白芨下咽直至血竅為之填而血

止也 醫說云治肺損咳血殊効

四血散 治衄血吐血便血

益元散加當歸并泉石 淋者加梔子莖中痛

加蒲黃 水瀉加車前子 米飲調下

元戎方 治鼻血口血大小便血 服時隨病上下食前後服

丹參 蒲黃 紫蘇 滑石分等 為末調服

鼻衄

陳無擇曰衄者因傷風寒暑濕流傳經絡漏泄于清氣道中而致者皆外所因積怒傷肝積憂傷肺煩思傷脾失志傷腎暴喜傷心皆能動血隨氣上溢而致者皆內所因飲酒過多啖炙燻辛熱或墜墮車馬傷損而致者皆不內外因也
原病式曰衄者陽熱怫鬱于陽明而上熱則血妄行而鼻衄也

丹溪云衄與吐血同涼血行血為主犀角地黄湯

加鬱金

又曰衄血出于肺以犀角升麻梔子黃芩芍藥生

地黃紫苑丹參阿膠之類主之

愚謂言肺者以竅言也言腸明

者以血海言也其治亦多相須

戴元禮曰鼻通於腦血上溢於腦所以從鼻而出

治宜茅花湯調止衄散服之 有頭風自衄頭

風纒發則血不止治頭風兼止衄之劑 有因

虛致衄者此為下虛上熱不宜過用涼劑宜四

物湯加參芪沉香磨服 傷濕而衄腎著湯加

川芎 伏暑而衄茅花湯調五苓散 上膈極

熱而衄犀角地黃湯加黃芩茅花荆芥虛者茯

苓補心湯 飲酒過多而衄茅花湯加川芎乾

葛 病衄愈後血因舊路一月或三四衄又有

洗面而衄日以為常四物湯加阿膠蒲黃仍佐

以蘇子降氣湯使血隨氣下

統旨謂風行水動氣行血流治衄者則知血藥以

治衄而不知氣降則血歸經古人所以血藥中

必加氣藥一二味如上所謂蘇子降氣湯之類

是也前人謂身熱則死寒則生亦是大槩言之耳豈無熱生而寒死者乎必兼詳脉症而後可也

治風寒之劑

桂枝湯

方見傷寒

治熱之劑

犀角地黄湯

方見吐血門

茜根散 治鼻衄不止

茜根

阿膠蛤粉炒

黃芩

側柏葉

生地

各一兩

甘草

五錢

加姜三片水煎服

黃芩芍藥湯

治鼻血不止

黃芩

芍藥

甘草

水煎服

川芎三黃散

直指方

治實熱衄血

大黃

濕紙煨

川芎

黃連

黃芩

各等分

右為末每服二錢井水調下食後服

黃連散

經方

治大人小兒盛熱乘于血、隨熱氣

散溢于鼻謂之鼻衄凡血得寒則凝澁結聚得熱則流散妄行

黃連

黃芩

栝葉

甘草

各等分

豆豉

三十粒

右每服一兩水煎服

治血衄血汗以人中白新瓦上焙乾為末入射香少許酒調下

生地黃湯

治榮中有熱及肺壅鼻衄生瘡一切

丹毒等疾

生地

赤芍

當歸

川芎

各等分

水煎食後溫服

若鼻衄加蒲黃生瘡加黃

芩丹毒加防風

濟生麥冬飲

治衄血不止

麥門冬

生地黃

各等分

每服一兩水煎服

一方 治鼻衄及酒疸黃沙淋

萱草根搗汁一鍾生姜汁相和時、細呷

貫衆散

治鼻衄

貫衆根 為細末水調一錢立止

羅太無寸金散 治鼻衄不止

黃藥子錢五 土馬稔五錢有足者 生甘草一錢

右為末每服二錢新水調下未止再服立差

本草云土馬稔即苔與垣衣之類垣衣生墻垣之側土馬稔生墻垣之上背陰古墻上有

一方 治衄血

蛀竹末米糊調下一錢効

茅花湯 治衄

茅花一大握剉水煎飲之立止

清熱帶補之劑

生地黃散 治咯血衄血吐血諸血証皆治之

枸杞子 柴胡 黃連 地骨皮 天門冬

白芍藥 甘草 黃芩 生地黃 熟地黃

各等分水煎服 治便血加地榆

海藏龍腦雞蘇丸 治上焦熱除煩解勞去肺熱

咳衄血熱驚悸脾胃口疰吐血肝膽熱泣出口

苦腎熱神志不定上而酒毒膈熱消渴下而血

滯五淋血崩等疾

薄荷一斤 麥門冬去心 阿膠炒 黃芪 蒲黃炒

人參已上俱藥 木通 銀柴胡各二兩對同木通浸一宿絞出汁

生地黄六兩 甘草五錢 黃連一兩

右為細末好蜜二斤先煎一二沸然後下生

地黄末不住手攪勻加木通柴胡汁浸熬成

膏勿令火緊焦了然後加前藥末和丸如碗

豆大每服二十九丸白湯下 虛勞虛煩梔子

湯下 肺熱黃芩湯下 心熱驚悸恍惚人

參湯下 咯唾吐血麥門冬湯下 肝熱防

風湯下 腎熱黃柏湯下 治五淋及婦人

漏下車前子湯下 痰嗽者生姜湯吞下

莖中痛蒲黃滑石水一鍾調下 氣逆者橘

皮湯下 室女虛勞寒熱潮作柴胡人參湯

下

地黄飲 治衄血往來久不愈者甚効

生地黄 熟地黄 枸杞子 地骨皮各等分

右為末每服二錢蜜湯調下日三服

補虛之劑

止衄散

黃芪

六錢

赤茯苓

白芍藥

當歸

生地

阿膠

炒各三錢

為末以黃芪湯調下三錢

產後鼻衄

大全云產後口鼻黑氣起及鼻衄者名胃絕以証

不可治遇有此者急取緋線一條并產婦頂心

髮兩條緊繫中指節即止

治產後鼻衄中風以荊芥為末童便調下氣虛者不可用

齒衄又名牙宣

統旨云血從齒縫中或齒根出者謂之齒衄有風

壅有腎虛風壅者消風散外以祛風擦牙散腎

虛者以腎主骨齒者骨之餘虛火上炎服涼藥

而愈甚以屬腎經下虛而上盛宜鹽湯下安腎

丸間服黑錫丹仍用青鹽炒香附黑色為末擦

之亦有胃熱而牙斷出血者宜清其熱清胃散主之

附方

肘後方 治齒血不止

苦竹茹以醋浸一宿含之

千金方 治同

礬石一兩滾湯三升煮取一升先拭齒乃含之
又方 濃煎竹葉湯入鹽少許含之

衍義方 治齒縫出血不止

用紙撚蘸蟾酥少許插入出血處立止

靈苑方 治虛氣攻牙齒痛血出牙齦痒痛

骨碎補二兩細剉炒黑色為末擦之早晨漱久
吐出臨睡擦畢俟津液滿口嚥之

丹溪治陰虛牙出鮮血氣鬱

四物湯加香附牛膝生甘草側柏葉服

羅太無治牙痛腫痒動搖牙斷宣露出血口氣疾等

當歸 藁本 地骨皮 防風 白芷 槐花

川芎 甘草 升麻 北細辛各等分

為末擦痛處甚者取三錢水鍾半黑豆半合
生姜三片煎至一鍾乘熱漱之冷則吐出

本事方 治一切牙疼風熱斷常出鮮血以至崩
落口臭不可近人者宜服之

大黃米泔浸軟切片 生地黄大者薄切

右二味旋切各用一二片合定貼所患牙上
一夜即愈未全可再如前用忌說話恐引風
毒津液漬患處

舌衄

舌上或出血如簪孔者香薷汁服一升日三服
又方 髮灰二錢米醋調敷舌上血出處

文蛤散 治熱壅舌上出血如泉

五倍子洗白膠香 牡蠣粉各等分

右為末每用少許搽患處或燒熱鉄熨孔上

槐花散 治舌上無故出血如線

槐花炒為末摻之仍用麥冬煎湯調下妙香散

妙香散 方在婦人門第二卷夢與
鬼交條下

肌衄 一名血汗

河間定命散 治膽受熱、血妄行鼻中衄、并血汗不止

硃砂 寒水石 麝香 為末每用五分新

汲水調下不拘時候看老幼虛實加減

肌衄者血從毛孔而出前人多主于肺熱

古方以男胎髮燒灰撲之

大金竹茹湯 方見便血條

黃芪建中湯 辰砂妙香散

小便血 尿血不痛者乃血淋也當與淋門參治

經云胞移熱于膀胱則癃溺血

仲景曰熱在下焦則尿血亦令淋闕不通

玄珠經云小便出血是心伏熱在于小腸宜鏡面

竹自然汁加生蜜一匙服之或以八正散加麥

門冬葱煎服如小便澀痛以海金沙細末調治

綱目云胞絡絕則澀血故經曰悲哀太甚則胞絡

絕脆絡絕則陽氣內動發則心下崩數澀血也

凡咳而澀血脫形其脉小勁是逆也

凡淋不可發汗之必便血便血不止用柿一箇
燒存性為末米飲調下

統旨云屬熱屬血虛有因心腎氣結所致或憂勞
房室過度此得之虛寒不可專以血為熱而淖
二者皆致溺血熱用小薊湯四物湯煎服効虛
用四物湯調牛膝膏火動榮血妄行者再加黃
栢知母虛寒者十全大補湯加炒蒲黃

滑伯仁曰小便血足太陽隨經入膀胱也與小腸
血同

附方

治房失勞傷小便出血

山藥一兩鹿角五錢髮灰二錢為末苧根搗汁打糊
為丸梧子大每服五十丸空心食前白湯下吞

治大小便出血不止

劉寄奴為末茶清調服立止

治尿後有乾血 乾柿餅三枚燒灰陳米湯調服

羅太無髮灰散 治小便尿血

髮灰本草云髮灰能消瘀血通關格利水
道破癰疽血衄丹溪云髮補陰甚捷
右一味每用一二錢以米醋二合湯少許服

井花水調亦可

一法茅草根車前子煎湯調下尤妙兼治肺疽心
衄內崩吐血一兩口或舌上出血如針孔若鼻
衄吹內立已

葛氏方 治小便出血

當歸四酒三升煎一升頓服

肘後方 治尿血

苧麻根十根水五升煎取二升一服効

外臺秘要 治尿血

車前草汁五合空心服茅草根汁亦妙或加酒少許沖服

小蘗飲子 治下焦結熱尿血成淋

生地兩四小蘗根 滑石 通草 山梔仁

當歸酒洗淡竹葉 藕節 蒲黃炒甘草各五錢

右每服一兩水煎空心服

丹溪云尿血有實熱者可用當歸承氣湯後以四

物湯加山梔當歸承氣湯即調胃承氣湯加當歸是也

又方 治溺血屬熱 山梔炒 水煎服

或用小蘗琥珀 血虛者四物湯加牛膝膏

又方 治血淋

木通 甘草梢 蘗麥 山梔 水煎服

濟生鹿角膠丸 治房室勞傷小便尿血

鹿角膠錢五 沒藥研另 油頭髮灰錢各三

右為末用茅根湯打糊為丸如梧桐子大每五十丸鹽湯送下

玉屑膏 治氣虛尿血并五淋砂石疼痛不可忍

黃芪 人參各等分 為末用大蘿蔔切一指厚三

四片蜜淹少時蘸蜜炙乾復蘸復炙盡蜜二

兩為度勿令焦至熟蘸黃芪人參末吃不時仍以鹽湯送下

又方 治老人小兒尿血不止

川升麻一兩半作一帖水煎服妙

又方 治虛而尿血

阿膠三兩炙搗為末酒二升和溫服

當歸散 治婦人小便出血或時尿血

當歸 羚羊角 赤芍藥各五錢 生地黄一兩

大蘗葉七錢半 分作三帖水煎食前服

六味地黄丸 治老人尿血及陰虛尿血

玄胡散 治尿血作痛

玄胡索 一兩 朴硝 三分 水煎服

五倍湯 治尿血不止

五倍子煎湯露一宿次早取上面清者溫服

龍骨散 治尿血

龍骨末 一錢五分 水調服日三服 瘥 此二方皆收澁之劑

治溺血血淋方 小蘗根 琥珀

二味為末水煎服蓋二味能治下焦熱結

琥珀散 治五淋澁痛小便膿血

琥珀 海金沙 沒藥 蒲黃 各一兩

為極細末每服二錢食前煎萱草湯調下

治血淋及小便閉方

杜牛膝根 二兩 朴硝 一兩 用雪水二碗煎牛膝至

一碗去渣入朴硝攪勻空心服

治小便出血莖痛不可忍

淡豆豉 一撮 煎湯溫服之甚効

治血淋方

牛膝一兩 黃栢 知母 澤瀉各一兩 麥門冬

天門冬 山梔仁各一兩半 生地黄二兩

為末粥糊丸如梧桐子大每空心白湯吞下
八九十九

又方 治同上

人參 白朮 川歸 熟地 川芎 山查

茯苓各八分 黃芪七分 升麻三分 水煎服

又方 治同上

牡丹皮 當歸 生地 山梔子 白芍

甘草梢 滑石 澤瀉 白茯苓 木通

各等分每服五七錢加生姜皮二分灯心一分水煎食前服

下血

素問云結陰者便血一升再結二升三結三升駱
龍吉云結陰之病陰氣內結不得外行血無所
稟滲入腸間故便血也其脉虛澁因血結不行故下
本事方云如下清血色鮮者腸風也血濁而色黯
者臟毒也肛門射血如線者虫痔也

仲景云下血先便後血者此遠血也黃土湯主之
先血後便者此近血也赤小豆當歸散主之

潔古云 治血下防風為上使黃連為中使地榆

為下使 若血瘀色紫者陳血也加熟地黄

若血鮮色紅者新血也加生地黄 若寒熱者

加柴胡 若肌熱者加地骨皮 若脉洪實痛

甚者加酒浸大黃

生生子曰便血有濕有熱有虛有寒有食積有酒
積有風入大腸治之之法切不可純以寒涼損

壞脾胃脾虛尤不能約束其血也故丹溪戒人

凡用血藥不可單行單止不可純用寒涼必于

寒涼中加辛味為佐久不愈者復用溫藥必兼

升舉藥中加酒炒酒煮涼藥如酒煮黃連之類

丹溪曰腸風獨在胃與大腸出治用黃芩秦艽槐

角升麻青黛 定腸風痛用蒼朮滑石當歸生

地黃芩甘草 下血屬虛者當溫散之四物湯

加乾姜升麻 便血過多者四物湯加蝟皮

有熱者四物湯加山梔升麻秦艽阿膠 有兼

風者蒼朮秦艽芍藥香附 胃清血非藍實不除
玄珠經云大便下血曰腸風切勿止澁究其本末
症狀先清其表後攻其裏其血自止如脉洪大
又當以四物合解毒湯調理

熱則流通虛則下溜故便血屬熱屬虛亦有風傷
肝而下陷及濕盛而傷血者 熱而下血或清
或濁宜四物湯加黃芩山梔炒槐花秦艽膠珠
虛者四物加乾姜升麻涼藥隨虛實加減 風
傷胃獨下清血者宜四物湯加防風升麻荆芥

柴胡升提之 濕入腸胃下如豆汁色者宜四
物加蒼朮白朮黃連黃柏地榆槐花 陰虛下
血無熱者十全大補湯加止血之劑

統旨云便血或清或濁或鮮或黑或在便前或在
便後或與泄物並下此由內外有所感傷凝停
在胃隨氣下通亦是妄行之意便血清者屬榮
虛有熱濁屬熱與濕色鮮者屬火黑者火極先
血後糞為近先糞後血為遠與泄物並下者屬
有積在內或絡脉傷也並宜分治又當別其色

而分寒熱也色鮮多因腸胃蘊熱必是飲酒過多辛熱燻灸之故也宜連蒲散或黃連阿膠湯色瘀或因寒邪凝滯血逐冷氣入客腸胃宜理中湯加膠珠炒黑香附其應甚捷大抵下血後必以胃藥收功胃氣回血自循其經絡矣

伏暑純下鮮血黃連香薷飲治之

方見傷暑門

風熱流入大腸經下血不止敗毒散治之

方見傷風門

風濕乘虛入於腸胃下清血或下瘀血

胃風湯治之

滑伯仁曰大便前後下血便前由手陽明隨經下

行滲入大腸傳于廣腸而下也便後由足陽明隨經入胃滯溢而下者也古人謂近血遠血者是也又有所謂腸風臟毒者腸風則足陽明積熱久而為風以動之也臟毒則足太陰積熱久而生濕從而下流也風則陽受之濕則陰受之

和中去濕之劑

東垣升麻補胃湯 治宿有腸血症因五月大熱

吃杏腸癖下血遠三四尺散漫如篩腰沉沉然

腹中不痛血色紫黑病名濕毒腸澼是陽明少

陽經血症

升麻 柴胡 防風各一錢半 羌活一錢 當歸身

葛根各三分 獨活 白芍 生地 丹皮 熟地

甘草各五分 黃芪一錢 肉桂許少 水煎食前服

和中益胃湯 治太陰陽明腹痛大便常澹泄設

不泄即秘結在後傳為濕熱毒下鮮紅血腹中

微痛脇下急縮脈緩而洪弦中指下得之按之

空虚 熟地三錢 歸身酒洗 甘草炙 益智各三分 升麻

柴胡各五分 蘓木一分 藁本二分 水煎食前服

升陽除濕和血湯 治腸澼下血另作一派其血

澀出有力而遠射四散如篩下春二月中旬日

下二行腹中大作痛乃陽明氣沖熱毒所作也

當升陽去濕熱和血脈不兩服而愈

生地 丹皮 甘草生炙各五分 白芍一錢半 熟地

黃芪各一錢 升麻七分 歸身 蒼朮 秦艽各三分

肉桂 陳皮各二分 水煎食前服

當歸和血散 治腸澼下血濕毒下血

槐花 青皮 荆芥 熟地 白木各六分 當歸

升麻各一錢 川芎四分 為末食前米飲調下

椿皮丸 本事方 臭椿皮十四兩 蒼木 枳殼各二兩

為末醋糊丸梧子大空心食前米飲下三四丸

玉屑丸 治腸風瀉血久不止者

槐根白皮去粗皮 苦練根去皮各三兩 椿根白皮四兩

于九月後二 天南星 半夏各五錢 葳靈仙兩

寒食麵三兩 右末滴水丸梧子大每服三十九

以水一鍾煎沸下丸子煮令浮以匙抄起温

送下不要嚼空心食前服有人下血幾盈盆

頓爾疲萎諸藥不効許學士以此治之良愈

槐花飲 治腸風有濕脹滿下血

蒼朮 厚朴 陳皮 當歸 枳殼各一兩 槐花

二兩 甘草 烏梅各五錢 每服一兩水煎空心服

治下血方

椿根白皮去粗皮 枯白礬一兩 甘草 滑石等分 血竭

五錢 人參三錢 黃連二錢 共為末米飲下

治寒之劑

烏荊丸 治腸風

川烏頭一兩泡去皮尖 荊芥穗二兩 為末醋丸桐子大

每服二十九丸酒送下白湯亦可下病發時日進三服不發時日進一服

黃土湯 治先便後血名遠血

粉草 熟地 白朮 附子炮 阿膠 黃芩上已

各三兩 灶中土半升 右七味以水八升煮取三升

分作三服

赤豆當歸散 治先血後便名近血

赤小豆五兩浸令芽出晒乾 當歸一兩 為末白湯調下二

錢日三服 梅師云治熱毒下血或因食熱

物發動以赤小豆杵末水調下方寸匕

又方 治腸風 赤小豆炒黑為末每服二錢米

飲調下由此觀之赤小豆寒熱皆能治也

益智和中湯 治腸澼下血紅或深紫黑色腹中

疼腹皮惡寒右三部脉中指下得之俱弦按之

無力關脉甚緊肌表陽明分涼腹皮熱而喜熱

物熨之內寒明矣 升麻 甘草 歸身 黃

芫 各一錢 葛根 益智 半夏 丹皮 柴胡

白芍 半錢 桂枝 肉桂 乾姜 少許 水煎食後服

羅太無治真定摠管因免強飲酸酒得腹痛次傳
泄瀉十餘日便後見血或紅或紫腸鳴腹痛醫
以諸見血皆熱治以為藥栢皮湯之類前証如
故仍不欲飲食則嘔酸形体愈瘦面青黃不
澤心下痞惡冷物口乾時有煩躁不得安卧請
予治之診得脉弦細而微遲手足梢冷內經曰
結陰便血一升再結二升三結三升又曰邪至

五臟則陰脉不和陰脉不和則血留之結陰者
病陰氣內結不得外行血無所稟滲入腸間故
便血也以平胃地榆湯主之

蒼朮 一錢 厚朴 陳皮 茯苓 白朮 乾葛

甘草 炙各五分 乾姜 當歸 炒麩 白芍 人參

益智仁 各三分 地榆 七分 升麻 黑附子 炮各一錢

生姜三片棗二枚水煎食前溫服

此藥溫中散寒除濕和胃數服病減大半又
灸中脘二七壯引胃氣上升次灸氣海百壯

生發元氣以還少丹服之以長肌肉至春再
灸三里三七壯治脾壯胃生發元氣次服芳
香之劑慎言語節飲食而安

王海藏云治楊師醉醒發大渴飲水三大盞又飲
冷茶三碗後病便鮮血四次得一盆先與吳茱
萸丸次日又與平胃五苓各半散三大服血止
後自利又與神應丸四服自利乃止或問曰何
不用黃連之類以解毒予曰若用寒藥其疾大
變難治寒飲內傷復用寒藥非其治也况血為

寒所凝入大腸間而便下血溫之乃

所以得熱則自止

楊氏飲冷酒瀉血對金散止之亦是理中脘分別
陰陽安定血脉之意也 唐生病因飲酪水及

食生物下利紫黑血十餘行脾胃受寒濕與六
神平胃散半兩加白朮三錢以利腰臍

間血一服愈

胃風湯 治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀
不化泄瀉注下及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀
血日夜無度 人參 茯苓 川芎 官桂

白朮 當歸 芍藥 各等分 每服五六錢加粟米

百粒同煎稍熱服若加熟地黃芪甘草分等名
 十補湯 若虛勞嗽加五味子 有痰加半
 夏 發熱加柴胡 有汗加牡蠣 虛寒加
 附子 寒甚加乾姜皆依本方等分 骨蒸
 發熱飲食自若者用十補湯加柴胡一兩
 氣弱加人參小便不利加茯苓 脉絃澁加
 川芎 惡風加官桂 脉澁加當歸 腹痛
 加白芍 胃熱濕盛加白朮
 草豆蔻散 治丈夫傷血婦人血崩瀆入大血腸出

草豆蔻 檳榔各炒 蔦栗殼燒灰
 等分為末每服二錢米飲下

濟生剪紅丸 治臟腑虛寒下血不止面色痿黃

日久羸瘦 側柏葉炒黃 鹿茸火去毛 附子炮
 皮川續斷酒浸 黃芪 阿膠蛤粉炒 白礬枯五錢 當歸
 酒浸各一兩 為末醋煮米糊為丸如桐子大每服七
 十九丸空心米飲下

羅太無結陰丹 寒濕下血者為結陰治腸風下
 血臟毒下血諸大血疾

枳壳麸炒 葳靈仙 黃芪 橘紅 椿根白皮

何首烏 荆芥穗各五錢 為末酒糊丸桐子大

每服七十九丸陳米飲入醋少許煎過少冷下

血熱之劑

黃連湯 治大便後下血腹中不疼謂之濕毒下血

黃連 當歸各五錢 甘草炙錢五分 水煎食前服

聚金丸 治腸胃積熱或酒毒大便下血腹中熱

痛煩渴脉弦數

黃連四兩 四製生乙兩 酒炒乙兩 黃芩乙兩

灰火煨乙兩 姜汁炒乙兩

防風乙兩 右為末糊丸桐子大每服五十九丸米泔

浸枳壳水下

保命集芍藥黃連湯 治大便後下血復中痛謂

之熱毒下血

芍藥 黃連 當歸各五錢 淡桂五分 甘草炙二錢

大黃 右每服一兩水煎服 如痛甚者加木

香檳榔末各一錢調下

按葶涼血地黃湯 如飲食不節起居不時陰受

之陰受之則入五臟入五臟則填滿閉塞下為

殮泄久為腸澼水谷與血另作一派唧出也時
令值夏濕熱太盛正當客氣勝而主氣弱也故
腸澼之証甚以此湯主之

熟地 當歸 青皮 槐花炒各五分 知母炒 黃柏

乙錢 水煎服 如臍下悶小便澁或大便後

重調木香檳榔末各五分稍熱空心服如裏

急後重又不去者宜下之如有傳變隨症加減治之

一方 槐花 荊芥穗各等分 為末酒調下一錢半

空心仍食猪血妙

連蒲散

黃連 蒲黃炒各錢二分 黃芩 當歸 生地黃

枳壳炒 槐角 芍藥 川芎各錢一分 甘草五分

如酒毒加青皮乾葛去枳壳 濕毒加蒼朮

白朮 水二鍾煎一鍾食前服

槐角丸 治五種腸風下血痔漏脫肛

槐角三兩 地榆 黃芩 當歸 防風 枳壳

麩炒各二兩 右為末酒糊丸桐子大每服七十九空

心米飲下

大臍丸 治腸風下血及痔疾神効

黃連 半斤去芦為末入肥大腸臍頭一段內前後用線縛定蒸爛為度

搗為丸桐子大每服百丸空心米飲下

秘方栢葉散 治便血甚効

扁栢葉 晒乾為末 糯米 炒黃為末等分 每服五錢空心白湯

調下如未止再加炒黑木耳末一錢

又方 治臟毒不止

當歸 枳壳 側栢葉 槐角 百草霜

芍藥 各一兩 右共一處炒令烟微起為度研末每

服二錢空心温酒調下日午米湯下甚妙

又方 治積血便血

蒼朮 陳皮 各二分 黃栢 黃芩 各七分 連翹

五分 右為末以生地黄膏六兩為丸桐子大空心

及食前白湯下七八十丸

丹溪方 治脉緩大口渴便血及婦人月水紫色

勞挾濕熱

白朮 五錢 地黄 黃栢 炒 白芍藥 各三錢 地榆

香附 各二錢 黃芩 乙錢 為末餛餅為丸