

山查炒四兩 枳殼炒 面香炒 山梔仁炒各二兩 牡丹皮
紫胡炒一兩 桃仁炒各一兩 大茴炒各一兩 吳茱萸五錢
酒糊丸鹽酒吞下五十丸

又方 治疝痛

蒼术益炒 香附益炒 黃柏酒炒為君 青皮玄胡索
益智為臣 桃仁為佐 面香為佐 大附子鹽炒甘草為使
水煎服一痛過更不再作矣
一人有疝腹內有塊每塊痛作疝痛止疝痛作塊
痛止 三稜 茴術醋煮神麪炒 姜黃南星一錢

兩山查炒去茱萸用 木香 沉香 香附各三錢 黃連去茱萸同
淨黃連五錢 桃仁 羅卜子 山梔仁 枳
核炒各五錢 姜汁餌餅糊為丸

治小腸氣及木腎偏墮

黑丑一斤用豬尿胞裝滿以線縫口好酒米醋各一碗於砂鍋內煮乾為度取出黑丑用青紅娘子各十九枚於鐵鍋內炒燥去青紅娘子將黑丑研取頭末四兩另入豬苓澤鴻細末各二兩醋糊為丸梧子大每服三十丸空心鹽酒送

下不可多服多服令人頭眩如頭眩可服黑丹

錫

元戎加味五苓散 治疝氣卒痛小便澀

本方加川練子一分

局方三白散 治膀胱蘊熱濕熱乘陰囊腫痛大
小便不利 方見前陰門

復元通氣散

舶上茴香 川山甲 蛤粉炒各二兩陳皮 玄胡
索 黑丑炒末甘草炒各一兩木香半

為末每一大錢食前熟酒調服

寶鑑控引畢丸 小腸病結上而不下痛引心臆

茴香炒川練子炒食茱萸 陳皮 馬闇花醋炒
各一兩 芫花醋炒 五錢 醋糊為丸梧子大每十丸至

二十丸空心溫酒下

三因大烏頭桂枝湯 治風寒疝氣腹中刺痛手
足不仁身體拘急不得轉側或致陰縮

大烏頭去皮尖根
蜜煎過洗切桂心 白芍各三錢 甘草一錢
每服四錢姜東煎服

局方奪命丹 遠年近日小腸疝氣偏墜搐痛脣

下撮痛悶亂外腎腫硬日漸滋長陰間濕痒搔

成瘡

吳茱萸

淨一斤童便各浸一宿

用酒

醋湯

二兩

酒糊為丸梧子大每五十丸空心鹽湯下

葫蘆巴丸

小腸氣蟠腸氣奔豚疝氣偏墜陰腫

小腹有形如卵上下来去痛不可忍或絞結繞

脅攻刺嘔吐者

葫蘆巴

炒一斤

川烏

炮去皮

茴香

炒二兩

吳茱萸

湯洗七次

酒糊為丸梧子大每二十丸空心酒下

戴人禹功散

黑丑

頭末四兩

茴香炒

一兩

一為末以生姜自然汁調

一二錢臨睡服或加白术一两

茴香練實丸

治陰疝痛不可忍及小腸氣痛

川練子

茴香

炒

青皮

陳皮

芫花

醋炒

山茱萸

食茱萸

吳茱萸

馬闌花

各等分

醋糊丸梧子大溫酒下三十丸

天台烏藥散

治小腸疝氣牽引脅腹疼痛

烏藥

木香

茴香

炒青皮

良姜

炒各五錢

檳榔

放二

川練子

放十

巴豆

七

十

右先以巴豆微打破同川練麸皮炒黑去巴豆麸皮不用外餘藥同為末每用一錢酒調下甚者姜湯下亦可

濟生葵子湯 膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥 赤茯苓 猪苓 葵子 枳實 麴麥

車前子

木通

黃芩

滑石

甘草等分

每五錢入姜煎空心服

局方蟠葱散 治寒疝氣疝衝心疼痛

玄胡索

蒼术

甘草各半斤

茯苓

蓬木

三稜

青皮各六兩

丁皮

砂仁

檳榔各四兩

桂

乾姜

各二兩

每服二錢入連鬚葱一莖水煎食

前服

金櫃當歸生姜羊肉湯

寒疝腹中痛及腸痛裏急

當歸

三兩

生姜

五兩

羊肉

一斤

水八升煮三升溫服七合日三服如寒多加

生姜嘔者加陳皮二兩白朮一兩

鈍珠散

十四枚

肉桂五錢一云五分

為末取八分米飲調服或蜜丸服亦可

王海藏丸用以黑大者去頭足
研如膏入藥中乃効炒黑不炒

東垣丁香練實丸 男子七疝痛不可忍婦人瘕
聚帶下皆任脉所主陰經也乃腎肝受病故治

法同 當歸 附子 炮 川練子 茴香 炒各二兩

好酒三升同煮盡為度焙乾作細末每一兩
入丁香木香玄胡末各五錢全蝎十三枚後
四味末入在前藥末內和勻酒糊丸梧子大
每三十丸加至百丸空心溫酒下

熨法 鹽半斤炒極熟以舊綿包熨臍腹痛處

又方 葱白研碎一握置脐中上用熨斗熨之或
以艾於上灸之尤妙

海藻瀆堅丸 治木腎如斗結硬如石

海藻 昆布 川練肉 吳茱萸 湯泡各一兩 木香
青皮 小茴 荔枝核 炒各一兩 玄胡索 炒去皮一兩 肉桂 各五錢

海帶

橘核 炒

桃仁

麸炒去皮半兩

木通 七錢

酒糊為丸梧子大每六十丸空心鹽酒任下
癩疝大如升斗者是也惟大不痛丹溪謂非痛斲
房事厚味不可用藥惟促其壽若蒼朮神麴白

並半夏山查枳實皆要藥人視其為淺鄙以啓
惕心又不能斷慾以愛護其根者非徒無益而
又被其害者多矣且其藥宜隨時令寒溫更按
君臣佐使加減大抵癩屬濕多

蒼朮 神麴 白芷 散水 山查 川芎 枳實

南星 半夏 神麴糊為丸有熟加山梔一兩

堅硬加朴硝五錢秋冬加吳茱萸二錢半

又方 治癩疝

南星 山查 蒼朮 散水 白芷 半夏 枳核

神麴

兩各

一海藻

昆布

錢各五

玄明粉 吳茱萸

酒糊丸

錢各二

治木腎不痛方 南星 半夏 黃柏

酒洗

蒼朮

鹽炒

枳實

山楂

白芷

神麴

炒滑石

吳茱萸

昆布 酒糊丸空心鹽湯下一方加枸杞子

治偏墜初生

川山甲 茴香 為末酒送下乾物壓之

潔古海蛤丸 治癩疝從小便中利出惡物

海蛤 醋淬三次 海金沙 脣粉 硼砂 川歸

各一錢

海藻

粉霜各五分

水蛭

廿一條炒

青黛

滑石

乳

香

各一錢

硃砂

二錢

地龍

二十條水洗去泥

去泥

鹽

右用鹽煮麵糊為丸小豆大硃砂為衣每十丸燈心湯空心服之小便下冷膿惡物乃効却以黃連紫河車板藍根各二錢煎湯漱口以固牙一方去板籃根加貫衆王海藏地黃膏子男子婦人臍下奔豚氣塊小腹疼痛陰腫控舉而痛上衝心腹不可忍者血竭沉香木香人參廣芪炮玄胡索

蛤蚧

川歸

川芎

續斷

白朮

川練子

炒全蝎

茴香

炒紫胡

沒藥

吳茱萸

已上分兩隨症加減用之氣多者加青皮

血多者加肉桂為末地黃膏子為丸梧子

大空心溫酒下二十丸日加一丸至三十丸

本事方念珠丸膀胱疝氣外腎腫痛不可忍昔

有人貨此藥治疝如神一日貨數千丸一國醫多與金而得之用果良驗

乳香

硃砂

飛各三錢

為末

黃蠟

兩

熔化分作一百單

八丸以線穿之露一宿次日用蛤粉為衣旋
取用乳香湯送下

丹溪治鄭子敬酒後飲水及水菓腎偏大時作蛙
声或作痛炒枳實一兩鹽炒茴香炒梔子各三
錢研煎湯送下保和丸 又一人膀胱氣下墜
如蛙声臭橘核炒十枚桃仁二十枚蘿卜汁下
保和圓七十九

一人年三十左腎核腫痛此飲食中濕墜下成熟
以臭橘核五枚榧仁七枚細研順流水一盞煎

沸湯熟下保和丸

丹溪治木腎以水晶蒲桃葉 野紫蘿葉 蒼耳
葉濃煎湯薰洗

一方治水癩偏大上下不定疼痛不止

牡蠣不拘多少鹽泥固濟炭三斤煅令火盡冷
取出二兩加乾姜一兩焙為細末二味和勻以
冷水調塗病處小便大利而愈

又方 玄胡索鹽炒全蝎 為末每二錢溫酒調下
椎礮散 治陰腫大如斗核痛

雄黃一兩白礬二兩甘草五錢水煎先薰後洗効治偏墜一人挾腫痛甚二子不分大如升偏醫不効以此治除根松江甚神此方

牡丹皮二兩蒼朮米泔浸三日鹽水拌炒六錢荔枝核炒一兩山楂一兩半橘核炒七錢山梔仁去皮以吳茱萸炒三兩

神麵糊丸梧子大空心白湯下五十丸

解鉗丸治小腸氣及膀胱氣橫絃堅絃木腎偏墜下部諸疝氣痛

木鱉子二兩切碎同炒集黑色去木通面香二兩用淨去油用木通二兩面香二兩用班梔二兩

同炒香熟去班梔足黑丑研碎同炒香熟去夢卜子二兩用同炒黃色去薜荔補骨脂研碎同炒黃色去薜荔二兩向陽者補骨脂用猪苓二兩到碎酒糊丸梧子大空心服三十九炒

姜鹽燈心酒下下午後臨睡各一服

五妙丸治一切下部氣速効如神

黑丑補骨脂川練肉各一兩用地龍一兩同三件炒去地龍一兩半夏一兩用猪苓一兩同炒去猪苓不用茴香一兩用班梔十四分同炒去班梔不用土狗十玄胡索一枚同炒去班梔不用丁香一枚同炒去土狗十

酒糊丸梧子大每服十丸加至十五丸空心

鹽酒送下

乳姜湯 治寒疝氣上衝中脘築痛

乳香末二錢 生姜自然汁二錢 水一大盞同煎三五

沸通口服一服効

香木丸 寒濕成疝腎腫疼痛

蒼术

半斤米泔水浸一宿晒乾用生姜半斤葱白四兩搗炒蒼术乾去葱姜不用

茴香

半斤用生姜汁四兩浸一二宿後用鹽炒乾

吳茱萸湯炮炒四兩

右末搗葱白成膏為丸梧子大每五十丸空

心溫酒或鹽湯下

又方 治諸疝痛及心痛臨發時服

海石 香附 為末姜汁調下

一人患疝因服熱藥多以致小便不通後用五苓散分三帖每加連鬚葱一根射香少許鹽五分煎服連進三服其夜下黑汁二升廝下遂寬用硇砂丸數日全愈

赤水玄珠第十六卷目錄

霍亂門 轉筋 中惡客忤

欬逆 噁氣 下氣 漏氣

嘈雜門

眩暈門

瘡門


痘證門

厥門

吐門

赤水玄珠第十六卷

新安生生子孫一奎著輯



霍亂門

霍亂者揮癰撩亂其勢急暴有似鬼祟實非邪也
乃內有所傷外有所感陰陽乖隔而成此前人
格論

內經曰歲土不及風乃大行民病飧泄霍亂體重
腹痛筋骨搖併蓋言木乘土而為病也夫霍亂
者揮霍撩亂也其症心腹卒痛嘔吐下痢發熱

增寒頭痛眩運或吐而不瀉或瀉而不吐或吐瀉並作夫邪在上焦則先心痛而吐邪在中焦則先腹痛而瀉邪客上中二焦則吐瀉俱作甚則轉筋入腹則斃蓋陰陽反戾清濁相干陽氣暴升陰氣頓墜陰陽痞隔上下奔逆治之惟宜溫煖更詳別三因以調之外因諸風則惡風有汗傷寒則惡寒無汗冒濕則重著傷暑則煩熱又有內因九氣所致鬱聚痰飲痞隔不通遂致滿悶隨其勝復必作吐利或諸飽食膾炙恣食

乳駱寒漿旨酒脾胃受傷遂成吐利又有轉筋者蓋陽明胃主養宗筋今暴吐下津液頓忘宗筋失養以致牽轉甚則外縮舌捲為不治之症又有乾霍亂者上不得吐下不得利壅閉正氣關格陰陽躁擾喘脹命在須臾若湿霍亂則所傷之物因吐瀉而出吐瀉盡則止故猶可治大抵熱勝痰鬱則悶亂湿勝飲鬱則利下其治濕霍亂宜藿香正氣散加生姜不惟可以溫散風濕抑亦可以調理吐瀉其若傷暑所致者亦不

可遽用香薷沉冷之劑合先用橘皮半夏生姜之類開散結滯次則以香薷五苓溫服散暑解煩或挾寒而手足厥逆腹中絞痛宜以四逆理中之類溫之亦不可遽用峻補兜澁之劑則邪愈滋而變症百出治乾霍亂急以鹽湯灌之令其大吐庶有可生切不可與穀食恐胃中邪物吐瀉不盡新穀一入脾不能化轉增危殆慎之慎之大槩其脉浮洪者易治若脉微遲加以氣少昏沉不語者皆難治也

丹溪曰內有所積外有所感致成吐瀉仍用二陳湯加減作吐以提其氣切莫與穀食雖米飲一呷入口即死必待吐瀉盡過二三時直至飢甚方可與稀粥其脉多伏欲絕又曰雖已吐瀉不徹還用吐提其氣或用樟木煎湯吐之大法生姜理中湯最好不渴者可用如渴者用五苓散亦可下者乾霍亂最難治死在須臾升降不通邪無從出當吐提其氣極是良法世多用鹽湯為內有食傷外有邪遏故吐之吐中

就有發散之義

轉筋不住男子以手挽其陰女子以手牽其乳近兩邊此千金妙法也 轉筋入腹者死
脉訣舉要曰滑數為嘔代者霍亂微滑者生濇數凶斷又曰滑而不勻必是吐瀉霍亂之候脉代勿訝

內經曰脉伏者霍亂脉微而澁 或代而散 或隱而伏 或大而虛 脉右閏滑為霍亂吐瀉脉結促代皆不可斷以死 脉大者生 脉

洪者為熱 絃者為飲 氣口脉絃滑膈間有宿食留飲

縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止吐瀉宜沉冷

頻服

草果仁四兩

烏梅肉三兩

甘草炙二錢

每服五錢姜十片水煎服

藿香正氣散 中溫霍亂吐瀉

蒼朮

陳皮 半夏

藿香各二錢

甘草炙一錢

姜五片東二枚水煎服

桂苓甘露飲 中暑霍亂吐瀉發渴引飲

暑方見中

不換金正氣散 霍亂轉筋嘔吐泄瀉頭疼方見

五苓散 方見暑門

藿苓湯 外感風寒內傷飲食霍亂轉筋吐瀉

藿香 厚朴 白朮 茯苓各一錢半 甘草一分五

大腹皮 紫蘇 白芷 桔梗 半夏 陳皮

各一錢 肉桂六分 猪苓 澤瀉各一錢半 姜五片水煎服

訶子散 霍亂吐利如神又治心脾冷痛

訶子 甘草 厚朴 乾姜 草果仁 陳皮

良姜 茯苓 神曲 麥芽等分 水煎入鹽服

二香散 暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

藿香 白朮 厚朴 陳皮 茯苓 半夏

白扁豆 紫蘇 桔梗 白芷 香薷 黃連

各一錢 大腹皮 甘草 絳五姜片葱白根水煎服

加味四君子湯 霍亂轉筋吐瀉腹中痛體重沉

而人參 白朮 茯苓各二錢 甘草 炙芍藥

良姜各一錢 三片枣二枚水煎服

通脉四逆湯 霍亂多寒內冷脉絕

吳茱萸炒二兩 附子炮兩 一桂心 木通 白芍藥

細辛

甘草

炙各五錢

當歸

三錢

每服七錢水一鍾

酒半鍾姜七片枣一枚煎七分溫服

七氣湯 七氣鬱五臟之間互相刑克陰陽不和

揮霍變亂吐利交作

半夏

五兩

厚朴

桂心

各三

白芍藥

茯苓

各四

兩紫蘇葉

橘皮

各二

人參

一兩

每七錢水一

盞半酒半盞姜七片枣一枚煎溫服

木瓜湯

霍亂吐瀉轉筋擾悶

酸木爪

兩

茴香

微炒

二錢

甘草

炙二錢

吳茱萸

炒二錢

兩 每服五六錢姜七片紫蘇十葉水煎服一方無
薑附湯 霍亂轉筋手足厥冷多汗嘔逆方見
寒門

加味香薷飲 伏暑吐利不止煩悶多渴

本方加檳榔黃連

每五錢水酒各半煎服

冷香湯 夏秋伏暑引飲過食生冷遂成霍亂

良姜

附子

甘草

檀香

各一錢

乾姜

炒一錢

草

一錢

丁香

三分

分二服

水煎連瓶沉井內待

服冷

人參散

霍亂體痛四肢逆冷服理中四順不

者

効

人參

白芍

川歸

炒

良姜

各一

附子

陳皮

桂心

白术

各三錢

每五錢加紅棗三枚水煎服

活命散

霍亂吐瀉不止面色青黑垂死者

防風

羌活

獨活

乾姜

細辛

各一分

草豆蔻

蔻

肉豆蔻

川芎

各五錢

官桂

半分

吳茱萸

木瓜

各一兩

每三錢濃煎木瓜湯調服

回生散

霍亂不已吐利不止但有一點胃氣存

無不効者

陳皮

藿香葉

各五錢

水煎或為末

熟酒調服

秘方

霍亂吐利轉筋神効

白扁豆葉

根研取汁一碗入米醋同服立瘥

加減理中湯

霍亂嘔吐

白朮

人參

乾姜

各三錢

甘草

一錢

水煎服

若為寒氣濕氣所干者加附子一錢名附子理中湯

若霍亂吐瀉加陳皮青皮

各一錢

治中湯

若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少

許頻服俟吐出令透即進此藥若嘔吐者加丁香半夏各一錢姜十片同煎泄瀉者

加橘紅茯苓各一錢名補中湯塘瀉不已

於補中湯內加附子二錢不喜飲食及米穀
不化再加砂仁一錢 霽亂吐下心腹作痛
手足逆冷于本方內去白朮加熟附子名為
四順湯 傷寒結胃先以桔梗枳殼等分煎
服不效者及諸吐利後胃痞欲絕心膈高起
脹痛手不可近者加枳實茯苓各一錢名枳
實理中湯 若渴者再于枳實理中湯內加
爪萎根一錢 霽亂轉筋者理中湯內加火
煅石膏一錢 若臍上築者乃腎間動氣也

去朮加官桂一錢半腎惡燥去朮恐作奔豚
也故加桂取辛以潤之 若悸者加茯苓一
錢渴欲飲水者加白朮五分 腹滿者去白朮
加附子一錢 若寒者再加乾姜一錢 飲
酒過多及啖炮炙熱物發為鼻衄者加川芎
一錢 傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰
陽安定血脉只用本方

三因白朮散 中暑嘔吐眩運及大病後調理失
宜勞復及脾胃虛損面色青黃飲食不思口吐

澤瀉

葛根

錢各五

右末蜜湯調下二錢

姜鹽飲

霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉

鹽

兩一

生姜

五錢搗碎

同炒令色變以水一碗煎

熱溫服甚者加童便一盞

藜湯

霍亂轉筋不止

藜一大握水煎湯薰洗或以帛蘸湯慰患處一方每遇轉筋時即以蓋揩擦痛處三五十匝即雖皮破亦不妨可以斷根
灸法 霍亂已死腹中尚煖猶未絕氣者

用鹽納臍中令滿大艾炷灸三五七壯甦

麥冬湯 霍亂已愈煩熱多渴小水不利

麥門冬

茯苓

半夏

陳皮

白朮

錢各半

人參 小麥 耳草錢各一 生姜五片烏梅半箇煎服

青金丹

霍亂吐瀉不止及轉筋諸藥不効者

硫黃

兩一

水銀

八錢

右二味銚子內炒柳木籠

子不住手攪勻更以柳枝蘸冷醋頻洒候結如鐵色即成青金丹乃刮下再研如粉留小

半為散餘以粽子尖三箇醋約半盞研稀稠
得所成膏丸如雞豆子大硃砂為衣每服一
丸煎丁香湯磨化下熱服如作散服以丁香
湯調下一錢傷寒陰陽乘伏用龍腦冷水磨
下一日二三服

海蔵云吐瀉轉筋身熱脉長陽明本病也宜和中
四君子湯平胃散建中湯 每一兩姜五片水
煎服如吐瀉轉筋自汗脉浮者四君子湯加桂
五錢 吐瀉轉筋脇下痛脉絃者宜建中加木

瓜柴胡湯平胃散加木瓜五錢亦可也

建中木瓜柴胡湯

桂枝

半

芍藥

二

甘草

三

膠餳糖

半

生姜

一

兩

大棗

六

木瓜

五

錢

柴胡

五

每一兩水煎臨服

加飴糖兩匙

吐瀉後小便不通胸中實痛者

四君子湯加大黃

一

吐瀉腹中痛轉筋體重

脉沉而細者宜四君子加高良姜白芍藥四君
子四味各一兩芍藥良姜各五錢同前煎法服
吐瀉霍亂四肢拘急脉沉而遲者宜四君子湯

加姜附厚朴湯四君子四味各一兩生姜附子

厚朴

炙
三錢

同前煎服

吐鴻轉筋四肢厥冷

服微緩者宜建中加附子當歸湯

桂枝

一兩

當歸

二錢

芍藥

二兩

粉草

五錢

飴糖

半兩

生姜

一兩

附子

一錢

大東

六枚

同前煎服

吐後轉筋木

瓜一味煎服良

轉筋

尋常轉筋四時皆有不因霍亂而發者其發多于
睡中或伸欠而作丹溪謂此多屬血熱以四物

湯加蒼朮紅花酒芩南星水煎服

有筋轉于足大指轉上至大腿近腰結了乃因奉
養過厚飲冷感寒而作寒遏其熱寒主收引勁
急故筋轉而疼也前方加姜汁臨時服之
足太陽之下血氣皆少則善轉筋踵下痛
丹溪曰轉筋偏身入肚不忍者作極酸鹽湯于槽
中暖浸之 磬湯亦妙 蓼湯亦好

仲景云轉筋之為病其臂脚直脉上下行微弦轉
筋入腹者雞屎白散主之

雞屎白

炒為末取方寸七以水六合和溫服

五

程惠方

肝虛轉筋用赤蓼莖葉切作三合水一

盞酒三合煎四合分二服

孫尚藥

脚轉筋疼痛牽急

松節二兩剉如米粒乳香一錢以瓦器內慢火
炒令焦只留一分出火毒為末每一錢至二錢

熟木爪酒調下但是筋病疼痛皆妙不獨轉
筋而已

外臺治轉筋取舊綿以釀醋浸甌中蒸及熱用綿

裹患腳上冷則易勿傷皮以瘥為止

秘方 脚轉筋無時甚好

雄豬陰莖一條全者薄切香油煎熟細嚼鹽酒

送下空心服連進三朝奇驗

中惡客忤門

中惡客忤者無故忽然而病倒者是也多受于道
途及早晚門外忽得之卒受非節之氣令人心
腹絞痛脹滿呴喚氣冲心胃不急治則死磨好
真烟墨一盞熟湯解服之又有鹽湯探吐亦好

卒死鬼擊或先病因睡卧間忽然而絕皆是中
惡之候若脉氣應指心頭仍暖者搗石菖蒲灌
之立甦如口噤須灌從鼻入

中惡暴死 石菖蒲為末每用五分安舌底又吹
入兩耳及鼻中則甦

中惡入心須死

阿魏末益酒調下一錢半連進二服効
中惡吐血 生桔梗取汁每服一鍾日三無生者
以乾者為末仍以桔梗湯調下

中惡客忤 蘇合香丸姜湯調下妙

欬逆門

內經曰歲金太過欬逆金鬱之發欬逆少陰二氣
欬逆古謂之餒逆氣上逆作聲之名也經曰諸
逆衝上皆屬於火是心火刑于肺金也易老曰
欬逆者火熱奔急上行而肺金不納何其當哉
俗以為嘯者非蓋嘯者出聲也嘯出其氣嘯声
盡然後呼也出入呼吸大有不同况嘯者本于
胃欬逆者本于肺又豈可例論哉然是症或由

水漬于肺而心痞或喜笑過多而氣噎或饑飲錯喚而氣噎或急食乾物而氣塞皆令作欬逆之聲連續不絕俗謂吃忒是也人或以紙燃取鼻嚏而止或寃以恣賊因恐而止或鼻熱聞食香調氣而止皆抑之駁之而使氣下也又有胃氣寒而呃元禮戴氏以雜病發呃者皆屬寒惟有傷寒發呃屬熱蓋由陽明內實過經失下清濁不得升降以致氣不宣通而作或又有飲食填塞胷中而氣不得升降者或有痰閉于上火

起于下而氣不得伸越者又有吐利後胃虛膈熱而作呃者又有氣血虛作呃者不可以不辨也傷寒陽症欬逆者蓋由陰消將盡陽火暴甚直冲而上出于胃入於肺而作聲所以東垣用涼藥以瀉熱降火其陰症欬逆者蓋以陰氣先消陽火將竭浮于胷中亦欲散也故反用丁香乾姜之屬以養胃中陽氣胃氣一和陽生則陰長也丹溪云傷寒發呃亦有四症不同有中氣不足脉虛微氣不相續而發呃者宜補中益氣湯加生

脉散加黃柏以降虛火或少加附子服之立愈
○有陽明內實失下而發呃宜大承氣湯下之
陷胃湯或小青龍湯去麻黃加附子治水寒相
搏發呃者妙○有傳經傷寒熱症誤用姜桂熱
藥助起火邪痰火相搏而為呃者宜用黃連解
毒白虎湯及竹瀝之類○大凡食呃便祕者大
承氣下之便軟者渴心湯主之○久病虛者見
此症最危○心法云欬逆有痰有氣虛有陰火

視其有餘不足治之其詳在格致餘論不足者
人參白虎下大補丸○有餘并有痰者吐之人
參蘆之類○痰碍氣而吃逆者用蜜水吐此乃
燥痰不能出○痰者以陳皮半夏○氣虛人參
白朮○陰火黃連黃柏滑石○欬逆自痢者活
石甘草炒黃柏白芍藥人參白朮陳皮加竹瀝
服

戴元禮云欬逆因痰與熱及胃火者極多
橘皮竹茹湯 胃熱多渴噦逆不進飲食

赤茯苓

陳皮

枇杷葉

麥門冬

竹茹

半夏

各二分

錢

甘草

炙

人參

一錢

分二服

每服

姜七片水煎

一方只用人參陳皮甘草竹茹

小柴胡湯

加姜三片柿蒂三枚輕服治同上

橘皮乾姜湯

胃寒欬逆

陳皮

通草

乾姜

桂心

人參

甘草

各等

分水煎

丁香柿蒂散

病後胃中虛寒欬逆至八九聲相連收氣不回者難治

人參

茯苓

陳皮

半夏

良姜

炒丁香

柿蒂

各二分

生姜

一兩

甘草

五錢

水煎服調蘇合

香丸服尤妙

一方只用良姜丁香柿蒂甘草

四味水煎服

柿蒂湯 胃滿欬逆不止

柿蒂

丁香

各三錢

一方加入人參姜五片水煎服

皂莢半夏湯

治欬逆欲死

半夏

一兩

皂莢

八錢去皮

為末煉蜜丸梧子大

每三丸東陽吞日三服夜一服

羌活附子湯 吐痢後胃寒欬逆

羌活 附子炮去皮臍 半兩 炒炙
羌活 附子炮去皮臍 半兩 炒炙 乾姜炮 丁香

兩各一 每二三錢水一錘鹽少許煎七分服

灸欬逆法 乳下一指許與乳相直骨間陷處婦人三壯男左女右只灸一處火至則瘥不瘥即不治又云其穴只當取乳下骨間動脈處是無病偶然致餓此緣逆氣而生宜小半夏菝苓湯加枳實半夏湯或用煎湯泡蘿蔔子研取汁調木香調氣散乘熱服逆氣用之佳

人參白朮湯

人參 黃芩 柴胡 乾姜 甘草炙 桔子仁
錢各五 白朮 防風 半夏炮 五味子 每服

五六錢加姜五片水煎服

宣明桂苓白朮散 消痰止欬逆散痞塞開堅結痛悶進飲食和臟腑

乾生姜 官桂各二錢半 菖苓 半夏各一兩 白朮

橘紅 澤鴻各五錢 右末麵糊丸小豆大姜湯下

三十丸日三服一方加黃連半兩黃柏二兩

水丸効尤速

噫門 俗作嗳氣

靈樞曰寒氣客于胃厥逆從下上散復出于胃故為噫又曰心為噫胃為噦釋之者曰神不守心故噫胃精內竭故噦傷寒書上焦不至其部故為噫中焦不至其部故為噦什之曰上焦竭善噫以上焦受中焦氣中焦不和不能消穀故令噫又曰緩者胃氣有餘噫而吞酸此言有餘者謂胃中有穀物未消故使噫而吞酸由此觀之

一由于胃寒一由于胃有宿食然亦有胃火衝逆而致者也有陰虛火因上炎而致者難以槩論也治法寒者溫之熱者涼之中焦未和者則消導以通之至于病久虛憊而噫則為神不守心而為死症矣

噫與欬逆不同噫乃出氣欬逆則為入氣然治法胃寒亦宜橘皮乾姜湯胃熱宜橘皮竹茹湯中焦未和而熱壅鬱或以調胃承氣下之或以加減平胃散以消之陰虛宜以四物湯或芎歸湯

加知母甘草以滋之

靈樞註云噫象火烟隨焰出心不受邪故噫出之宜甘草瀉心湯以生姜易乾姜若有微熱時噫

者小柴胡湯

二陽一陰發病主驚駭背痛善噫欠也

仲景旋覆代赭湯 治痞而噫

本事方枳殼散 心下蓄積痞悶或作痛多噫敗

卵氣 枳殼 白朮

各五錢 香附一錢 檳榔二錢

為末每二錢米飲調下日三服

丹溪云噫氣胃中有痰有火

又云曾治宣州一人氣上築心膈噫氣脉之右

關短弱左關尺洪長而大數此肝有熱宜瀉肝

補脾

青皮

一錢

白朮

二錢

木通

甘草

二分

水煎下保和丸十五粒抑青丸二十粒

清胃中痰火 鬱熱嗳氣

南星

製半夏各一錢

軟石膏

香附

各二兩半

山梔子

每八錢水煎服

下氣門

下氣屬心虛經云夏脉者心也心脉不及下為氣泄者是也

河間云腸胃鬱結穀氣內發而不能宣通于腸胃之外故善噫而或下氣也

診論云顛癇癆瘍若氣下泄不止者必死此真氣竭絕腸胃腠理閉塞穀氣不能宣通于腸胃之外故從腸胃中泄出也

漏氣走哺門

病者身背皆熱肘臂掣痛其氣不續膈間厭悶食

入則先吐而後下名曰漏氣此由上焦傷風開其腠理經氣失道邪氣內著麥冬湯主之

麥門冬 生蘆根 竹茹 白朮 人參 甘

草 茼苓 陳皮 菓蕤

走哺病者下焦實熱大小便不通氣逆不續嘔逆不禁名走哺人參湯主之

人參湯即前方加知母石膏黃芩

嘈雜門

生生子曰內經云胃為水穀之海無物不受若夫

溫麵魚腥水果生冷以及烹飪粘滑難化等物恣食無節脾氣受傷失其健運之常清痰稠飲由此而生嘈雜由此而作也夫嘈雜之為症似飢不飢似痛不痛而有懊惱不自寧之態是也或薰煖氣痞滿惡心漸至胃脘作痛數者多挾痰火故丹溪云嘈雜是痰因火動治法宜以南星半夏橘紅之類以消其痰芩連知母石膏梔子之類以降其火蒼朮白朮芍藥之類以健脾行溫又食欒者梔子姜炒黃連山楂之類又有

溫熟欒滯不喜食者宜三補丸加蒼朮倍香附蔣氏云心嘈索食白朮黃連陳皮作丸白湯下七八十丸數服而愈要在臨症加減

脉法

右寸脉緊而滑兩寸弦滑胸中有留飲寸脉橫者膈上有橫積也右關弦急甚者為木乘

土位欲作胃反難治

嘈雜亦有中氣不足者以六君子湯加竹茹黃連三補丸

黃芩

黃連

黃柏等分

蒸餅糊丸服

三聖丸

白术四兩

黃連四錢

陳皮一兩

神麴糊丸姜湯下

右關脉沉嘈雜

二陳湯加藿香

若吐而有

物有声者加砂仁

有声無物加姜炒黃連

眩暈門

丹溪曰眩言其黑暈言其轉

林氏曰眩者玄也謂忽然眼見黑花昏亂少頃方定暈者運也謂頭目若坐舟車而旋轉運也甚

有至于卒倒而不知者

丹溪又曰此症屬痰者多蓋無痰不能作眩雖因于風亦必有痰痰在上火在下火炎上而動其痰則作眩也治宜二陳湯加黃芩蒼朮羌活菝氣虛者亦治痰為主兼補氣降火如東垣止木半夏天麻湯之類傷溫者降溫湯加川芎左脉數熱多脉澀有死血右脉實有痰積脉大久病眩運不可當者以大黃酒炒為末茶湯調下甚効○戴云有因虛致暈雖暈然醒時面常欲得

熟手按之蓋頭者乃諸陽之會陽氣不足故耳
有頭眩而耳中常鳴頭上如鳥雀啾啾之聲切
不可全謂耳鳴為虛此頭腦挾風所為也○原
病式曰諸風掉眩皆屬肝木風主動故也所謂
風氣甚而頭目眩暉者由金虛不能制木而復
生火風火皆屬陽陽主動兩動相搏則為之旋
轉也成無己曰傷寒頭暉與眩冒者皆發汗吐
下後所致由陽虛也○嚴用和曰眩暉之症經
雖云皆屬於肝風上攻然體虛之人外感六淫

內傷七情皆能眩暉當以脉証別之風則脉浮
有汗項強不仁寒則脉緊無汗筋痺掣痛暑則
脉虛煩悶溫則脉沉重則吐逆及其七情所感
遂使臟氣不平鬱而生涎結而為飲隨氣上逆
令人眩暉眉稜骨痛眼不可開寸脉多沉此為
異耳若疲勞過度下虛上實金瘡吐衄便利及
婦人崩傷產後去血過多皆令人眩暉當隨其
因治之○張子和曰頭風眩暉手足麻痺胃脘
發痛皆風寒暑濕之氣雜至合而為痺也在上

為之停飲可用獨聖散吐之吐後服清上辛涼之藥○劉宗厚曰眩暉一証人皆稱為上盛下虛所致而不明言其所以然之故所謂虛者血與氣也所謂實者痰涎風火也原病之由有氣虛者乃清氣不能上升或多汗亡陽當升陽補氣有血虛者乃因亡血過多陽無所附當益陰補血此皆不足之症也有因痰涎鬱遏者宜導痰開鬱重則吐下有因風火所動者宜清上降火又有外感而得者嚴氏雖分四氣之異皆當

散邪為主此皆有餘之症也世所謂氣不歸元而用丹藥鎮墜沉香降氣之法蓋香竈散氣丹藥助火其不歸之氣豈能因此而復耶內經所謂治病必求其本氣之不歸求其本而用藥則善矣○林氏曰淫慾過度腎家不能納氣歸元使清氣逆奔而上此眩暉出于氣虛也吐衄崩漏肝家不能收攝榮氣使諸血失道妄行此眩暉生于血虛也氣虛者宜益氣補腎湯血虛者宜補肝養榮湯若專用溫熱鎮墜丹藥多致飛

越之元其害有不可勝言者矣

生生子曰按劉林二公慎丹劑戒燥熱俱為保金水二臟真陰而言也木之有餘則挾火勢而侮肺金金受火侮津液枯涸降令不行生化之源絕矣况斲喪枯燥之腎曷能為其母復仇耶由是假藥餌以相濟也既知其腎虛不能納氣歸元矣寧復更以燥熱傷其母可乎都緣滯于溫補下元之說不體認夫真陰真陽之虛實以故相循習俗而為流弊也凡物各有屬也肺出氣

腎納氣今氣不歸元是腎之真陰不足當益腎陰以全其職可也腎雖屬陰臟而用藥亦自有氣血之分焉氣虛則用補骨脂杜仲菟絲子之類如安腎丸之謂也若血虛則以山藥山茱萸熟地黃之類如六味地黃丸之謂也氣是無形者至清所以能走空竅而施精明非有形之丹石所能鎮墜二公辨之允矣或曰經云形不足者溫之以氣精不足者補之以味吾子以溫補為謬可乎予曰前人已註之矣溫是溫存之溫

非專指溫暖之藥而言也味是味之厚者乃陰
中之至陰本乎天造非偏厚出于人為之味也
是皆不以溫熱為補明矣前証若果屬腎虛木
旺火亢金衰則當從東方實西方虛瀉南方補
北方之治則其氣自平而無偏倚之患也矣

眩暉一証前賢著述病因方藥可謂周且備矣原
其著述各有所發明也劉河間之肝木兼于風
火之化成無已之傷寒引汗吐下後之虛嚴用
和之四氣七情張子和之停飲吐法朱丹溪之

痰火溫熱氣虛血虛死血久病戴氏之陽虛劉
宗厚林億公之陰虛戒溫熱香竈之丹劑各剖
其裏製方立論誠後學之寶鑑一展視之毫髮
畢覩原其設意蓋以人之司命為重故不以研
心為勞也庸是窮究精微不為成說所縛補前
人所未盡開來學之蒙蔽得非仁人之心其心
歟今之醫者每每檢方治疾至于經旨病機全
不攷究甚至有得一僥倖之方就以足為世世
傳家至寶不妄泄人噫何其鄙哉方前諸君子

吐心露膽者為何如人耶聖人未嘗以聖自期也蓋以其有公天下之心立德不羨而後人稱之也賢人未嘗以賢自待也蓋以其有同天下之志繼聖不怠而後人誦之也後之視今亦猶今之視古也學者能不以聖賢之心為心焉

鈎藤散 肝厥頭暉清目

鈎藤 陳皮 半夏 麥冬 茶芩 石膏
人參 甘菊 防風 錢各五 甘草 半錢
每服四錢姜七片水煎溫服

肝厥狀如癇疾不醒嘔吐醒後頭虛暉發熱
麻黃 鈎藤取皮 石膏 乾姜 半夏曲

柴胡 耳草 枳殼 甘菊

每四錢姜三片枣一枚水煎溫服

婦人患頭風眩者十居其半每發必掉眩如在車上蓋因血虛肝有風熱故耳余嘗取此方以授人比他藥捷而効速名曰芳薷散

川芎一兩 川歸三兩羌活 旋復花 蔓荆子
細辛 石膏 藥本 荆芥穗 半夏曲炒

防風

熟地

甘草

各半
兩

每五錢姜三片水煎溫服

天麻半夏湯

風痰內作胸膈不利頭旋眼黑兀

兀欲吐上熱下寒不得安卧

天麻

半夏各一

錢各半

橘紅

柴胡各七

酒芩

前胡

甘草炙

錢各半

白茯苓各五

分

黃連三分

姜三片水煎食後溫服

忌生冷酒麵

益氣補腎湯

淫慾過度腎家不能納氣歸元使

諸氣逆奔而上此眩暈出于氣虛也

人參

黃芪

蜜炙各二錢

白朮

二錢

山藥

山茱

蔓

各一錢半

白茯苓

一錢

甘草

炙五分

東二枚

水煎服

補肝養榮湯

吐衄崩漏肝家不能收攝榮氣使

諸血失道妄行此眩暈生于血虛也

當歸

川芎

各二錢

芍藥

熟地

陳皮

各一分

甘菊

錢一

甘草

五分

水煎食前服

若腎虛氣不

降者去菊花入前補腎湯

清眩化痰湯

痰火上攻作眩及氣不降胸滿者

川芎

酒芩

各一錢半

天麻

一錢半

湯泡

白茯苓

橘紅

各二分

桔梗

枳殼

各一錢

甘草

四分

痰結眩暉甚者加南星旋覆花各一錢

六合湯 風虛頭暉及血虛或去血過多

當歸

川芎

錢二

白芍藥

熟地

錢半

秦艽

一錢

羌活

分七

水煎食遠服

川芎散

勞倦後身體發熱眩暉神魂不安

山茱萸

各二兩

山藥

甘菊花

人參

茯神

小川芎

各二兩

右末每服二錢酒調下

安腎丸

腎虛頭眩牙齒疼痛腰痛

破故紙

炒胡蘆巴

炒茴香

炒川練

炒續斷

各三錢

桃仁

炒

杏仁

炒一錢

各一錢

山茱萸

茯苓

各二兩

右末蜜丸梧子大空心鹽湯下五十丸

六味地黃丸

見虛損門

加味參夏湯

七情相干眩暉欲倒者

人參

各二半

半夏

各二兩

肉桂

一兩

甘草

炙五錢

乳香

三錢

每五錢姜五片水煎服

又治七情之氣鬱

於心腹痛不可忍脉沉遲一服立効

枯礬散

治痰暉

枯礬為末姜湯調下一錢吐之立愈

清上丸 安神治痰火眩暈

| | | | | | |
|---------|-----|----------------------------|----|----|----------------------------|
| 石菖蒲 | 酸棗仁 | 膽星 | 茯苓 | 黃連 | 半 錢 |
| 夏 柴胡 | 神曲 | 橘紅各一 <small>七錢半</small> | 姜黃 | 青代 | 木香各 <small>一兩五錢</small> |
| | | 竹瀝打糊為丸食後茶下一 錢五分 | | | |

瘡門

瘡者邪入陰部也經云邪搏陰則為瘡然有二症
一曰舌瘡乃中風舌不轉運之類是也一曰喉中
聲嘶而舌本則能轉運言語也

瘴涎乘虛閉塞舌本之脉道令人瘡

丹溪謂一人年三十五連日勞倦發歇發瘡醫
與瘡藥三發後變為發熱舌短言語不辯喉間
痰吼有聲脈洪數似滑遂以獨參湯加竹瀝兩
酣殼許兩服後吐膠痰三塊舌本正而言可辯
餘症未退遂煎人參黃芪湯服半月而諸症皆

退粥食調補兩月方能起

一中年舌短言語不辯始傷寒身熱師與傷寒藥五帖後變神昏而瘡遂作體虛有瘻治以人參五錢黃芪當歸白朮陳皮各一錢煎湯入竹瀝姜汁飲之十二日其舌始能語得一字又服之半月舌漸能轉運言語熟除而瘡

足少陰脈挾舌本足太陰之脉連舌本手少陰別繫舌本若此三脉虛則痰涎乘虛而閉塞其脉道故舌不能轉運言語也若此三脉亡血則舌

無血營養而瘡

經云刺舌下中脉太過血出不止為瘡治當補氣血

一男子年五十餘嗜酒吐血補許後不食舌不能語但渴飲水脉畧數與四物各一兩參朮各二兩陳皮一兩半甘草二錢入竹瀝童便姜汁至二十餘帖乃能言凡此三脉風熱中之則其脉弛縱故舌亦弛縱不能轉運而瘡風寒客之則其脉縮急故舌強舌卷而瘡治在中風半身不

收求之也

脉要精微篇岐伯謂心脉搏堅而長當病舌轉不能言

丹溪治俞繼道遺精誤服參芪及升浮劑遂氣壅于上焦而音聲不出用童便浸香附為末調服而疎通上焦以治瘡又用蛤粉青黛為君黃柏知母香附佐之為丸而填補下焦以治遺十餘日良愈本草云童便主久嗽失音故治瘡多用之由其能降火故也

出音声方

訶子炮去核木通各一兩甘草半兩用水三升煎一升半入生姜地黃汁一合再煎數沸放溫分六服食後日三服

訶子治逆氣破結氣木
通利九竅治肺癰甚當

訶子湯 治失音不能言語

訶子

四兩生半半煨

桔梗

一兩生半半炒

甘草

二寸半炙半生

右末每服二錢童便一盞水一盞煎至七沸溫服甚者不過三服愈

桔梗通利肺氣訶子泄肺導氣童便降大甚速

又方

桔梗

三兩

大訶子

四箇

甘草

二兩

每服

三四錢水煎入砂糖一小塊不入童便時時細呷一日服盡其効甚速

發声散

治咽喉語声不出

括萎皮

白姜

去頭

甘草

俱炒黃等分為

末每溫酒調下三錢或生姜自然汁調下用五分綿裹噙化咽津亦可日二三次不拘時

肘後方

咽喉卒失音不出

陳皮

五兩

水三升煮取一升頓服

玉粉丸

冬月寒痰結在咽喉語声不出

半夏

炮次

五草烏

炒分

桂半

二分

為末生姜汁浸

餅糊為丸雞豆大每夜噙化一丸多年不愈皆効

黃帝針經中說寒氣客于會厭卒

然而啞此藥主之

蛤蚧丸治肺間邪氣胸中積血作痛失音并治久

欬失音

蛤蚧

一對

去嘴足溫水浸去膜刮了血脈用好醋炙

訶子煨

各

阿膠

炒生地

麥門冬

北細辛

甘草

五錢各

為末蜜丸棗子大每食後噙化一丸