



本草經疏

十三

特1
1558

映
入



国立国会図書館 タイトル『神農本草經疏30卷』 請求記号 特1-1558

ガラス使用

神農本草經疏卷之十三

木部中品

總九十二種今疏其要者二十六種

桑根白皮

葉耳根灰
枝黃附

竹葉

茹瀝

吳茱萸

檳榔

梔子

騏驎竭

龍腦香

蕪荑

枳殼

枳實

厚朴

茗苦茶

山茱萸

紫葳



本草經疏卷十三

綠君亭



胡桐淚

猪苓

烏藥

沒藥

安息香

仙人杖

海桐皮

大腹

合歡

五倍子

天竺黃

蜜蒙花

桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦
崩中脉絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水
腫腹滿臚脹利水道去寸白可以縫金瘡出土
上者殺人

疏○桑根白皮得土金之氣故味甘氣寒而
無毒東垣海藏俱云兼辛然甘厚辛薄降多
升少陽中陰也入手太陰經甘以固元氣而
補不足辛以瀉肺邪之有餘故能止嗽也凡
肺中有水氣及肺火有餘者宜之傷中者中
氣傷也五勞者五臟勞傷也六極者六腑之
中氣極也羸瘦者肌肉脫也崩中者血脫也
脉絕者氣血兩虛之至故脉不來也之數者



皆由陰不足則陽有餘陽有餘則火盛而內
熱火與元氣不兩立火能消物造化自然也
惟甘也可以補元氣惟寒也可以除內熱熱
除矣元氣生矣則上來諸證自瘳故本經終
之以補虛益氣焉別錄去肺中水氣者卽十
劑中云燥可去溼桑白皮之屬是已吐血熱
渴者熱傷肺火炎迫血妄行溢出上竅而兼
發熱作渴也其主水腫腹滿臚脹者卽利水


道除溼補虛之功也溼熱盛則寸白生消除
溼熱則蟲自不能留也縫金瘡者甘寒補益
宜於傷損也

主治參互

得天麥一冬款冬花百部薄荷甘草沙參貝
母枇杷葉五味子爲治嗽要藥 得芍藥薏
苡仁木瓜茯苓橘皮赤小豆爲治水腫之神
劑 經驗方治咳嗽吐血甚者鮮桑根白皮

一斤米泔浸三宿刮去黃皮剉細入糯米四兩焙乾為末每服一錢米飲下 肘後方治消渴尿多人地三尺桑根剝取白皮炙黃黑剉以水煮濃汁隨意飲之亦可少入米勿用鹽 肘後方治產後下血炙桑白皮煮水飲之 經驗方治墜馬拘損桑根白皮五斤為末以水五升煎膏敷之便止已後亦無宿血終不發動 子母秘方治小兒重舌桑根白

皮煮汁塗乳上飲之 聖惠方治小兒流涎脾熱也胸膈有痰新桑根白皮搗自然汁飲之甚效煎飲亦良 聖惠方治小兒天吊驚癇取家桑東行根研汁服 千金方治石癰堅硬不作膿者桑白皮陰乾為末烱膠和酒調傅以軟為度 蘇頌取皮中白汁主治小兒口瘡白漫拭淨塗之便愈又塗金刃所傷燦痛須臾血止仍以白皮裹之甚良 時珍



取汁塗蛇蜈蚣蜘蛛傷有驗 取枝燒瀝治
大風瘡疥生眉髮 子母秘錄治小兒鵝口
桑皮汁和胡粉塗之 聖惠方治小兒唇腫
桑木汁塗之即愈 摘玄方治破傷中風桑
瀝好酒對和溫服以醉為度醒服消風散

簡誤

肺虛無火因寒襲之而發咳嗽者勿服

○桑葉主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒


疏○葉本經無氣味詳其主治應是味甘氣
寒性無毒甘所以益血寒所以涼血甘寒相
合故下氣而益陰是以能主陰虛寒熱及因
內熱出汗其性兼燥故又能除脚氣水腫利
大小腸原稟金氣故又能除風經霜則兼得
天地之清肅故又能明目而止渴髮者血之
餘也益血故又能長髮涼血故又止吐血合
癰口罨穿掌療湯火皆清涼補血之功也



主治參互

四月採桑葉酒拌九蒸九曝爲末胡麻或黑
 芝麻去殼九蒸九曝另磨如泥各等分煉蜜
 和爲丸每五六錢空心饑時白湯下能益氣
 血祛風仙家餌之爲引年止饑之要藥 普
 濟方治青盲洗法昔武勝軍宋仲孚患此二
 十年用此法二年目明如故摘青桑葉曬乾
 逐月按日就地上燒存性每以一合於甕器

內煎減二分傾出澄清溫熱洗目至百度屢
 試有驗正月初八二月初八三月初六四月
 初四五月初六六月初二七月初七八月二
 十九九月十二十月十三十一月初二十二
 月三十 集簡方治風眼下淚臘月不落桑
 葉煎湯日日溫洗或入芒硝 千金方治頭
 髮不長用桑葉麻葉煮泔水沐之七日可長
 數尺 聖濟總錄治吐血不止晚桑葉焙乾



研涼茶服三錢只一服止後用補肝肺藥
直指方治癰口不斂經霜黃桑葉爲末傅之
通玄論治穿掌腫毒新桑葉研爛罨之卽
愈 醫學正傳治湯火傷瘡經霜桑葉燒存
性爲末油和敷之三日愈

○桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白沃血
病癥瘕積聚陰痛陰陽寒熱無子療月水不
調其黃熟陳白者止久洩益氣不饑其金色

者治癖飲積聚腹痛金瘡 桑耳煨存性研
細香附童便炒黑研細每用桑耳灰二分香
附末三分淡醋湯空心調服治血崩奇效過
於他木耳

○桑椹味甘寒無毒單食止消渴陳藏器利五
藏關節通血氣久服不饑安魂鎮神令人聰
明變白不老多收暴乾爲末蜜丸日服時珍
搗汁飲解中酒毒釀酒服利水氣消腫

一名文武

實

疏○桑椹者桑之精華所結也其味甘其氣寒其色初丹後紫味厚於氣合而論之甘寒益血而除熱其為涼血補血益陰之藥無疑矣消渴由於內熱津液不足生津故止渴五臟皆屬陰益陰故利五臟陰不足則關節之血氣不通血生津滿陰氣長盛則不饑而血氣自通矣熱退陰生則肝心無火故魂安而

神自清寧神清則聰明內發陰復則變白不老甘寒除熱故解中酒毒性寒而下行利水故利水氣而消腫皆自然之道也

主治參互

寇宗奭曰本經言桑甚詳獨遺烏椹然桑之精英盡在於此採摘微研以布濾汁石器熬成稀膏量入多少蜜熬稠貯斃器中每抄一二錢食後夜臥以沸湯點服治服金石藥發

熱口渴生精神及小腸熱甚。僂方日乾爲末蜜和丸酒服亦良。四時月令云四月宜飲桑椹酒能理百種風熱其法用桑椹汁三斗重湯煮至一斗半入白蜜二合酥油一兩生薑汁一合煮令得所瓶收每服一合和酒飲之亦可以汁熬燒酒藏之經年味愈佳。普濟方治水腫脹滿水不下則滿溢水下則虛竭還脹十無一活宜用桑椹酒治之桑白

皮切以水二斗煮汁一斗入桑椹再煮取五升以糯米飯五升釀酒飲。保命集治療癰結核文武膏用文武實即桑椹子二斗黑熟者以布取汁銀石器熬成膏每白湯調服一匙日三服。千金方治小兒赤禿桑椹子取汁頻服。聖濟錄治小兒白禿黑椹入罌中曝三七日化爲水洗之三七日神效。集簡方治陰證腹痛桑椹絹包風乾過伏天爲細



末每服三錢熱酒下取汗


簡誤

甘寒帶滑故潤而下行脾胃虛寒作泄者勿服

○桑柴灰味辛寒有小毒淋取汁與冬灰等分同滅痔疵黑子蝕惡肉煮赤小豆食大下水脹傳金瘡止血生肌即桑霜即灰汁以桑皮編紙襯淘羅底用滾水淋下甕器盛之重湯

煮乾別名木鹵能鑽筋透骨為傳癰疽拔疔引諸散毒藥攻毒之要品 得丹砂雄黃乳香沒藥牛黃龍腦香紅白藥子白及白歛傳一切腫毒止痛追毒有奇效 得鐵鏽蟾酥可拔疔

○枝味苦平性不冷不熱主遍體風癢乾燥火氣脚氣風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣欬嗽消食利小便療癰疽後渴嫩條細搗一升熬



香煎飲亦無禁忌久服終身不患偏風 聖
惠方治紫白癩風桑枝十斤益母草三斤水
五斗慢煮至五升去滓再煎成膏每臥時溫
酒調服半合以愈爲度

○桑黃氣味與白皮同其除肺熱之功殆又過
之山家老桑樹多生湖桑少見 同天門冬
百部山梔枇杷葉治赤鼻有神


竹葉味辛平大寒無毒主胸中痰熱欬逆上氣

疏○竹葉稟陰氣以生本經味辛平氣大寒
無毒甄權言甘寒氣薄味厚陰中微陽降也
入足陽明手少陰經陽明客熱則胸中生痰
痰熱壅滯則欬逆上氣辛寒能解陽明之熱
結則痰自消氣自下而欬逆止矣仲景治傷
寒發熱大渴有竹葉石膏湯無非假其辛寒
散陽明之邪熱也

主治參互

煎湯調酸棗仁炒熟末五錢臨臥服治心虛
 不得眠 同麥門冬酸棗仁遠志丹參茯苓
 丹砂犀角治心經蘊熱虛煩不眠 入白虎
 湯治傷寒煩熱大渴引飲 肘後方治時行
 發黃竹葉五升小麥七升石膏三兩水一斗
 半煮取七升細服盡劑愈
 ○淡竹茹味甘微寒無毒生嘔哕溫氣寒熱吐
 血崩中

疏○竹茹雖與竹葉同本然竹茹得土氣多
 故味帶甘氣微寒無毒入足陽明經經曰諸
 嘔吐酸水皆屬於熱陽明有熱則為嘔哕溫
 氣寒熱亦邪客陽明所致甘寒解陽明之熱
 則邪氣退而嘔哕止矣甘寒又能涼血清熱
 故主吐血崩中及女勞復也
 主治參互
 同木瓜橘皮麥門冬枇杷葉人參蘆根汁石



斛治胃虛有熱嘔啞不止 活人書治傷寒
愈後交接女勞復頭痛身熱耳鳴口渴腰骨
痛男子卵腫股痛竹皮一升水三升煮五沸
服汁 又方治婦人大病初愈有所動勞致
熱氣衝胸手足搖擗拘急如中風狀淡竹青
茹半斤栝樓二兩水二升煎一升分二服

簡誤

胃寒嘔吐及感寒挾食作吐忌用

○淡竹瀝味甘大寒無毒療暴中風痺胸中大
熱止煩悶消渴勞復

疏○竹瀝竹之津液也經云大寒亦言其本
性耳得火之後寒氣應減性滑流利走竅逐
痰故為中風家要藥凡中風之證莫不由於
陰虛火旺煎熬津液結而為痰壅塞氣道不
得升降熱極生風以致猝然僵仆或偏痺不
仁此藥能遍走經絡搽剔一切痰結兼之甘



寒能益陰而除熱痰熱既祛則氣道通利經
脉流轉外證自除矣其主胸中大熱止煩悶
者取其甘寒清熱益陰之功耳觀古人以竹
瀝治中風則知中風未有不因陰虛痰熱所
致不然如果外來風邪安得復用此甘寒滑
利之藥治之哉

主治參互

○同貝母栝樓仁霞天膏白芥子蘇子橘紅鬱

金童便麥門冬治似中風口眼喎斜語言蹇
澀或半身不遂等證 千金方治中風口噤
竹瀝加薑汁日日飲之 梅師方治產後中
風口噤身直而青手足反張以竹瀝飲一二
升卽甦 外臺秘要治破傷中風凡閃脫折
骨諸瘡慎不可當風用扇中風則發瘖口噤
項急殺人亟飲竹瀝二三升忌飲食及酒
千金方小兒傷寒淡竹瀝葛根汁各六合細


細與服 至寶方小兒狂語夜後便發竹瀝
夜服二合 產寶方婦人胎動妊娠因夫所
動困絕以竹瀝飲一升立愈 梅師方孕婦
子煩茯苓二兩竹瀝一升水四升煎二升分
三服 千金方時氣煩躁五六日不解青竹
瀝半盞煎熱數飲之覆取微汗 李絳兵
部手集欬嗽肺痿大人小兒欬逆短氣胸中
吸吸欬出涕唾嗽出臭膿用淡竹瀝一合服

之日三五次以愈為度

簡誤

寒痰溼痰及飲食生痰不宜用

吳茱萸味辛溫大熱有小毒主溫中下氣止痛
欬逆寒熱除溼血痺逐風邪開腠理去痰冷腹
內絞痛諸冷實不消中惡心腹痛逆氣利五藏
疏○吳茱萸稟火氣以生故其味辛氣溫有
小毒甄權辛苦大熱氣味俱厚陽也入足陽




明太陰兼入足少陰厥陰經凡脾胃之氣喜
溫而惡寒寒則中氣不能運化或為冷實不
消或為腹內絞痛或寒痰停積以致氣逆發
欬五臟不利辛溫煖脾胃而散寒邪則中自
溫氣自下而諸證悉除其主除溼血痺逐風
邪者蓋以風寒溼之邪多從脾胃而入脾胃
主肌肉為邪所侵則腠理閉密而寒熱諸痺
所從來矣辛溫走散開發故能使風寒溼之

邪從腠理而出中惡腹痛亦邪惡之氣干犯
脾胃所致入脾散邪則腹痛自止矣

主治參互

仲景吳茱萸湯治少陰病吐利手足逆冷煩
躁欲死者吳茱萸一斤人參二兩生薑六兩
大棗十二枚劈四味以水七升煮二升去滓
溫服七合日三服厥陰乾嘔吐涎沫頭痛者
同此方 又當歸四逆加吳茱萸湯治厥陰



證手足厥冷脉細欲絕其人內有久寒者當
歸三兩芍藥三兩炙甘草二兩通草二兩桂
枝三兩細辛三兩生薑半斤吳茱萸二升大
棗二十五枚以水六升清酒六升同煮取五
升去滓分五服 食療治冬月感寒吳茱萸
五錢煎湯服之取汗 聖惠方治陰毒傷寒
四肢逆冷用吳茱萸一升酒拌溼絹袋二箇
包蒸極熱更互熨足心候氣透痛亦即止累


有效 肘後方治寒疝往來吳茱萸一兩生
薑半兩清酒一升煎分溫服 聖惠方治食
已吞酸胃虛冷者吳茱萸湯泡七次焙乾薑
等分爲末湯服一錢 孫氏存仁方治多年
脾泄老人多此謂之水土同化吳茱萸三錢
泡入水煎汁入鹽少許通口服蓋茱萸能煖
膀胱水道既清大腸自固他藥雖熱不能分
解清濁也 和劑局方戊巳丸治脾胃受溼

下痢赤白腹痛米穀不化用吳茱萸黃連白芍藥各一兩同炒為末蒸餅丸梧子大每服二三十丸米飲下

簡誤

陽厥似陰手足雖逆冷而口多渴喜飲水大小便秘結小便或通亦赤澀短少此火極似水守真所謂禁慄如喪神守皆屬於火之謂耳此與桂附乾薑之類同忌嘔吐吞酸屬胃

火者不宜用欬逆上氣非風寒外邪及冷痰宿水所致不宜用腹痛屬血虛有火者不宜用赤白下痢病名滯下因暑邪入於腸胃而非酒食生冷停滯積垢者不宜用小腸疝氣非驟感寒邪及初發一二次者不宜用霍亂轉筋由於脾胃虛弱冒暑所致而非寒溼生冷干犯腸胃者不宜用一切陰虛之證及五臟六腑有熱無寒之人法所咸忌




檳榔味辛溫無毒主消穀逐水除痰癖殺三蟲
伏尸療寸白

疏○檳榔得天之陽氣地之金味故味辛氣
溫無毒大明言澀元素言苦以其感盛夏之
火氣耳氣薄味厚陽中微陰降也入手足陽
明經夫足陽明為水穀之海手陽明為傳道
之官二經相為貫輸以運化精微者也二經
病則水穀不能以時消化羈留而成痰癖或

溼熱停久則變生諸蟲此藥辛能散結破滯
苦能下泄殺蟲故主如上諸證也甄權宣利
五臟六腑壅滯破胸中氣下水腫治心痛積
聚日華子下一切氣通關節利九竅健脾調
中破癥結李珣主賁豚氣五膈氣風冷氣脚
氣宿食不消皆取其辛溫走散破氣墜積能
下腸胃有形之物耳

主治參互



同草果枳實橘皮治食瘧加三稜蓬茂礬紅
 紅麴山查麥蘖消一切堅硬肉食及諸米麩
 生冷食積成塊作痛 同黃連藟豆蓮肉橘
 紅白芍藥紅麴烏梅葛根枳殼治滯下後重
 同雷丸使君子白蕪荑蘆薈肉豆蔻胡黃
 連治小兒疳蚘 同棟根鶴虱錫灰薏苡根
 貫衆烏梅治一切寸白蟲 同蒼朮草果青
 皮甘草治山嵐瘴氣發瘧 直指方心脾作

痛雞心檳榔高良薑各一錢半陳米百粒同
 以水煎服之 廣利方脚氣衝心悶亂不識
 人用白檳榔十二分爲末分二服空心煖小
 便調下日二服 十便良方蟲痔裏急檳榔
 爲末每日空心以白湯調二錢 千金方寸
 白蟲病檳榔二七枚爲末先以水二升半煮
 檳榔片取一升空心調末方寸七服之經日
 蟲盡出未盡再服以盡爲度



簡誤

檳榔性能墜諸氣至於下極病屬氣虛者忌之脾胃虛雖有積滯者不宜用下利非後重者不宜用心腹痛無留結及非蟲攻咬者不宜用瘧非山嵐瘴氣者不宜用凡病屬陰陽兩虛中氣不足而非腸胃壅滯宿食脹滿者悉在所忌

梔子味苦寒大寒無毒主五內邪氣胃中熱氣面赤酒皰鼓鼻白癩赤癩瘡瘍療目熱赤痛胸心大小腸大熱心中煩悶

疏○梔子感天之清氣得地之苦味故其性無毒氣薄而味厚氣浮而味沉陽中陰也入手太陰手少陰足陽明經少陰爲君主之官邪熱客之則五臟皆失所主清少陰之熱則五內邪氣自去胃中熱氣亦除面赤酒皰鼓鼻者肺熱之候也肺主清肅酒熱客之卽見

是證於開竅之所延及於面也肺得苦寒之氣則酒熱自除而面鼻赤色皆退矣其主赤白癩瘡瘍者即諸痛痒瘡瘍皆屬心火之謂療目赤熱痛及胸心大小腸大熱心中煩悶者總除心肺二經之火熱也此藥味苦氣寒瀉一切有餘之火故能主如上諸證

主治參互

仲景治傷寒汗吐下後虛煩不得眠及心中

懊憹者有梔子豉湯用梔子十四枚香豉四合水煎服 入茵陳大黃湯治傷寒溼熱發黃腹脹梔子十四枚茵陳六兩大黃三兩水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三升分三服小便當利尿如皂角汁狀正赤一宿腹減黃從小便出也 同甘草黃檗為梔子檨皮湯亦治發黃身熱 同厚朴枳實為梔子厚朴湯治傷寒下後心煩腹滿臥起不安者



得吐即愈 同鼠矢作湯治大病後勞復小
便不利者小便利即愈已上皆仲景法 同
連翹麥門冬竹葉燈心草生甘草黃連能瀉
心經有餘之火加赤茯苓木通滑石澤瀉瀉
小腸火 同桑黃或桑白皮黃芩甘草桔梗
五味子乾葛治酒熱傷肺發出鼻齖 同茵
陳蒿滑石車前子秦艽黃連連錢草苜蓿治
酒熱發黃 梅師方治熱病後勞復及因交

接後發動欲死不能語者梔子三十枚水三
升煎一升服令微汗 救急方治湯盪火傷
梔子末和雞子清濃塗之 丹溪方治胃脘
火痛山梔七枚炒水一盞煎七分入生薑汁
飲之立止

簡誤

梔子稟至苦大寒之氣苦寒損胃而傷血凡
脾胃虛弱者忌之血虛發熱者忌之性能瀉



有餘之火心肺無邪熱者不宜用小便不通
由於膀胱虛無氣以化而非熱結小腸者不
宜用瘡瘍因氣血虛不能收斂則為久冷敗
瘡非溫煖補益之劑則不愈此所謂既潰之
後一毫寒藥不可用是也世人又以治諸血
證不知血得熱則行得寒則凝瘀血凝結於
中則反致寒熱或發熱勞嗽飲食減少為難
療之病凡治吐血法當以順氣為先蓋血隨

氣而行氣降則火降火降則血自歸經不求
其止而止矣此治療之要法不可違也

騏驎竭味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下止

痛破積血金瘡生肉


舊與紫釧同
條今分出

疏○騏驎竭稟土氣而兼水化故味甘鹹氣

平無毒丹房鑑源云稟於熒惑之氣生於湯

石之陰其色赤象火而味鹹則得陰氣也氣

薄味厚陰也降也入足厥陰手少陰經甘主



補鹹主消散瘀血生新血之要藥故主破積
血金瘡止痛生肉主五臟邪氣者即邪熱氣
也帶下者溼熱傷血分所致也甘鹹能涼血
除熱故悉主之蘇恭主心腹卒痛李珣以之
治傷折打損一切疼痛血氣攪刺內傷血聚
者誠為此耳此藥產外國極難得真者理傷折有奪命之功

主治參互

同乳香沒藥自然銅麻皮灰狗頭骨煅存性

麈蟲黃荆子骨碎補治一切打撲損傷同
髮灰乳香沒藥片腦輕粉象牙末紅粉霜為
細末摻一切金瘡及腫毒生肌止痛廣利
方金瘡出血騏驎竭末傅之立愈醫林集
要產後血衝心胸喘滿命在須臾用血竭沒
藥各一錢研童便和酒調服究原方收斂
瘡口血竭末一字龍腦少許大棗燒灰半錢
同研津調塗之摘玄方胸中血塊血竭沒



藥各一兩滑石牡丹皮各一兩同煮過爲末
醋糊丸梧子大空心服之 醫林集要嵌甲
疼痛血竭末傳之


簡誤

凡使勿用海母血真相似只是味鹹并腥氣
騏驎竭味微鹹甘似梔子氣也又云嚼之不
爛如蠟者爲上凡血病無瘀積者不必用日
華子云此藥性急不可多使却引膿用時勿

與衆藥同研化作飛塵也

龍腦香味辛苦微寒一云溫平無毒主心腹邪
氣風溼積聚耳聾明目去目赤膚翳

疏○龍腦香稟火金之氣以生本經味辛苦
氣微寒無毒其香爲百藥之冠凡香氣之甚
者其性必溫熱李珣言溫元素言熱是矣氣
芳烈味大辛陽中之陽升也散也性善走竄
開竅無往不達芳香之氣能辟一切邪惡辛



熱之性能散一切風溼故主心腹邪氣及風溼積聚也耳聾者竅閉也開竅則耳自聰目赤膚翳者火熱甚也辛溫主散能引火熱之氣自外而出則目自明赤痛膚翳自去此從治之法也別錄又注婦人難產者取其善走開通關竅之力耳

主治參互

同乳香沒藥雄黃紅藥子烏雞骨白及白欬

桑礪城牛黃傅一切疔腫癰疽神效 聖濟

總錄目生膚翳龍腦為末日點三五度 御

醫院方頭目風熱上攻用龍腦末半兩南蓬

砂末一兩頻嚙兩鼻 瀕湖集簡方風熱喉

痺燈心一錢黃檗五分竝燒存性白礬七分

煨過片腦三分為末每以一二分吹患處此

陸一峰家傳絕妙方也 又方鼻中息肉垂

下者用片腦點之自入 夷堅志傷寒舌出




過寸者梅花片腦半分爲末摻之隨手而愈
又方中風牙噤無門下藥者開關散措之
五月五日午時用龍腦天南星等分爲末每
以一字措齒二三十遍其口自開 經驗方
痘瘡狂躁心煩氣喘妄語或見鬼神瘡色赤
未透者用龍腦一錢細研旋以猪心血丸芡
子大每服一丸紫草湯下少時心神便定得
睡發瘡 總微論用獷猪第二番血清半杯

紫草汁半杯和勻入龍腦一分溫服良久下
瘀血一二行瘡卽紅活此治痘瘡黑靨惡候
醫所不治者百發百中

簡誤

宗奭云此物大通利關膈熱塞大人小兒風
涎閉塞及暴得驚熱甚爲濟用然非常服之
藥震亨云龍腦屬火世知其寒而通利未達
其熱而輕浮飛越喜其香而貴重動輒與麝




同為桂附之助然人之陽易動墮身虧不可
不思杲曰龍腦入骨風病在骨髓者宜用之
為引經若風在血脉肌肉輒用腦麝反引風
入骨髓如油入麩莫之能出也觀三公之言
則龍腦之為害可知凡中風非外來之風邪
乃因氣血虛而病者忌之小兒吐瀉後成驚
者為慢脾風切不可服急驚屬實熱可用慢
驚屬虛寒不可用眼目昏暗屬肝腎虛者不

宜入點藥設誤點之必致昏暗難療

蕪荑味辛平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中
淫淫溫行毒去三蟲化食逐寸白散腸中噎噎
喘息

疏○蕪荑稟金氣而生於春陽之令本經味
辛氣平無毒甄權加苦李珣加溫詳其功用
應是苦辛溫平之藥非辛溫則不能散五臟
皮膚骨節中邪毒氣非苦平則不能去三蟲




化食逐寸白療腸中噎噎喘息然察其所主
雖能除風淫邪氣之為害而其功則長於走
腸胃殺諸蟲消食積也故小兒疳瀉冷痢為
必資之藥

主治參互

同肉豆蔻胡黃連盧會使君子青黛五穀蟲
雷丸檳榔橘皮治小兒疳熱瀉痢及腹大羸
瘦面黃好喫泥土 本事方制殺諸蟲生蕪

莢生檳榔各四兩為末蒸餅丸如梧子每服
二十九白湯下 錢氏小兒直訣疳熱有蟲
瘦悴久服充肌用蕪莢一兩黃連一兩為末
猪膽汁七枚和入盃內飯上蒸之一日蒸一
次九蒸乃入麝香半錢湯浸蒸餅和丸菉豆
大每服五七丸至二十九米飲下 危氏得
效方蟲牙作痛以蕪莢仁安蛀孔中及縫中
甚效 入藥用大者小者即榆莢不堪入藥




除疴證殺蟲外他用甚稀故不著簡誤

枳殼味苦酸微寒無毒主風痒麻痺通利關節
勞氣欬嗽背膊悶倦散留結胸膈痰滯逐水消
脹滿大腸風安胃止風痛

疏○枳殼氣味所主與枳實大畧相同但枳
實形小其氣全其性烈故善下達如少年猛
悍之將勇往直前而一無回顧者也枳殼形
大其氣散其性緩故其行稍遲是以能入胸

膈肺胃之分及入大腸也其主風痒麻痺通
利關節止風痛者蓋肺主皮毛胃主肌肉風
寒溼入於二經則皮膚瘙痒或作痛或麻木
此藥有苦泄辛散之功兼能引諸風藥入於
二臟故為治風所需風邪既散則關節自然
通利矣其療勞氣咳嗽背膊悶倦者蓋亦指
風寒鬱於上焦則肺氣滯而為悶倦咳嗽經
曰肺苦氣上逆急食苦以泄之枳殼味苦能



泄至高之氣故主之也又肺與大腸為表裏
風邪入肺則并入大腸風熱相搏而為腸風
下血苦寒下泄之氣則血熱清而風自除矣
其主散留結胸膈痰滯逐水消脹滿安胃諸
證悉與枳實相同第其氣稍緩耳

主治參互

同蘇子橘皮桔梗木香白豆蔻香附治上焦
壅氣脹滿因於寒 同黃連槐花乾葛防風


荆芥芍藥黃芩當歸生地黃地榆側柏葉治
腸風下血初起者神效 同荆芥苦參防風
蒼耳草敗蒲煎湯沐浴治風疹作痒 同檳
榔芍藥黃連升麻葛根甘草紅麴滑石治滯
下裏急後重 得人參麥冬治氣虛大便不
快 同肉桂治右脇痛
不簡誤
枳殼泄肺能損至高之氣肺氣虛弱者忌之



脾胃虛中氣不運而痰壅喘急者忌之咳嗽
不因於風寒入肺氣壅者服之反能作劇咳
嗽陰虛火炎者服之立致危殆一槩胎前產
後咸不宜服今世多用以治婦人胎氣不安
或至八九月為易產之劑動輒資用殊不知
婦人懷孕全賴氣血以養胎氣血充足則胎
自易產且娠婦至八九月精神困倦四肢軟
弱飲食減少動息喘促何莫非虛弱之證而

更用此耗散之藥耶正經所謂損不足而虛
其虛豈不大謬哉古方有瘦胎飲者為湖陽
公主而設以彼奉養太過其氣必實故用此
以耗其有餘之氣則胎易產今人不知古人
立方之意一概濫施誤甚誤甚

枳實味苦酸寒微寒無毒主大風在皮膚中如
麻豆苦痒除寒熱結止痢長肌肉利五藏益氣
輕身除胸脇痰癖逐停水破結實消脹滿心下



急痞痛逆氣脇風痛安胃氣止澹洩明目

疏○枳實感天地苦寒之氣以生故其味苦
氣寒無毒別錄雷公加酸甄權加辛察其功
用必是苦為最而酸辛次之氣味俱厚陰也
入足陽明太陰經細詳神農主治與本藥氣
味大不相侔究其所因必是枳殼所主蓋二
物古文原同一條後人分出時誤入耳其別
錄所主除胸脇痰癖逐停水破結實消脹滿

心下急痞痛逆氣脇風痛安胃氣止澹洩者
是其本分內事皆足陽明太陰受病二經氣
滯則不能運化精微而痰癖停水結實脹滿
所自來矣胃之上口名曰賁門賁門與心相
連胃氣壅則心下亦自急痞痛邪塞中焦則
升降不舒而氣上逆肝木鬱於地下則不能
條達而脇痛得其破散衝走之力則諸證悉
除所以仲景下傷寒腹脹實結者有承氣湯



胸中痞痛者有陷胸湯潔古療心下痞滿者
有枳朮丸壅滯既去則胃氣自安而澹洩亦
止矣末云明目者經曰目得血而能視氣旺
乃能生血損氣破散之性豈能明目哉無是
理也


主治參互

同三稜蓬茂青皮檳榔為消磨堅積之劑然
須能食脾胃健者宜之 同白朮橘皮厚朴

甘草砂仁為枳朮丸治心下痞滿因於食
入陷胸湯治傷寒寒熱結胸 入大小承氣
湯治傷寒熱邪入裏結實脹滿痛不可當數
日不更衣者

簡誤


此藥性專消導破氣損真觀朱震亨云瀉痰
有衝墻倒壁之力其為勇悍之氣可知凡中
氣虛弱勞倦傷脾發為痞滿者當用補中益



氣湯補其不足則痞自除此法所當忌也脹滿非實邪結於中下焦手不可按七八日不更衣者必不可用挾熱下痢亦非燥糞留結者必不可用傷食停積多因脾胃虛不能運化所致慎勿輕餌如元氣壯實有積滯者不
得已用一二劑病已即去之即潔古所製枳朮丸亦為脾胃有積滯者設積滯去則脾胃自健故謂之益脾胃之藥非消導之外復有


補益之功也時醫不識病之虛實藥之補瀉往往概施損人真氣為厲不淺設誤投之雖多服參耆補劑亦難挽其刻削之害也世人多蹈其弊故特表以為戒

厚朴味苦溫大溫無毒主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去三蟲溫中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔不止洩痢淋露除驚去雷熱心煩滿厚腸胃



疏○厚朴稟地二之氣以生兼得乎春陽之氣而成故其味苦其氣溫甄權苦辛大熱應是辛熱苦溫之藥辛熱太過則其性宜有毒以其得陽氣之正故無毒耳氣味俱厚陽中之陰降也入足太陰手足陽明經其主中風傷寒頭痛寒熱氣血痺死肌者蓋以風寒外邪傷於陽分則為寒熱頭痛風寒溼入腠理刺氣血凝澀而成痺甚則肌肉不仁此藥辛

能散結苦能燥溼溫熱能祛風寒故悉主之也別錄又主溫中消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔不止洩痢心煩滿者何莫非腸胃氣逆壅滯及痰飲留結飲食生冷所致得此下洩開通溫熱煖胃則諸證不求其止而止矣至於淋露雖屬下焦為病然多因胃家溼熱下流三蟲亦腸胃溼熱所生苦能燥溼殺蟲故亦主之也本經又主驚悸




及別錄除驚去留熱者皆非其所宜驚悸屬
心虛於脾胃絕無相干氣味大溫之藥又豈
能去留熱哉至益氣厚腸胃蓋亦指邪氣去
正氣自益之謂積滯消腸胃自厚之意耳非
消散之外復有補益之功也用者詳之

主治參互

同陳皮枳殼麥蘖草果山查砂仁礬紅治傷
食腹脹 同橘皮黃連甘草蒼白朮葛根治


溼熱作瀉 同檳榔木香黃連滑石橘皮甘
草白芍藥治滯下初起 同白朮人參白芍
藥茯苓消腹脹 佐生薑橘皮藿香砂仁半
夏止胃寒嘔吐 同三稜蓬茂檳榔人參青
皮治積年冷癖堅塊 同蒼朮橘皮甘草為
平胃散治胸中敦厚之氣使飲食倍增 聖
惠方治痰壅嘔逆心胸滿悶不下飲食用厚
朴一兩薑汁炙黃為末米飲調下二錢匕



張仲景金匱方治腹脹脉數厚朴三物湯用
厚朴半斤枳實五枚以水一斗二升煎取五
升入大黃四兩再煎取三升溫服一升轉動
更服不動勿服 又七物厚朴湯治腹痛脹
滿用厚朴半斤甘草大黃各三兩棗十枚枳
實五枚桂二兩生薑五兩以水一斗煎取四
升溫服八合日三嘔者加半夏五合

簡誤

厚朴氣味辛溫性復大熱其功長於泄結散
滿溫煖脾胃一切飲食停積氣壅暴脹與夫
冷氣逆氣積年冷氣入腹腸鳴虛吼痰飲吐
沫胃冷嘔逆腹痛泄瀉及脾胃壯實之人偶
感風寒氣實人誤服參耆致成喘脹誠為要
藥然而性專消導散而不收畧無補益之功
故凡嘔吐不因寒痰冷積而由於胃虛火氣
炎上腹痛因於血虛脾陰不足而非停滯所



致洩瀉因於火熱暴注而非積寒傷冷腹滿
因於中氣不足氣不歸元而非氣實壅滯中
風由於陰虛火炎猝致僵仆而非西北真中
寒邪傷寒發熱頭疼而無痞塞脹滿之候小
兒吐瀉乳食將成慢驚大人氣虛血槁見發
膈證老人脾虛不能運化偶有停積娠婦惡
阻水穀不入娠婦胎升眩暈娠婦傷食停冷
娠婦腹痛瀉利娠婦傷寒傷風產後血虛腹

痛產後中滿作喘產後洩瀉反胃已上諸證
法所咸忌若誤投之輕病變重重病必危世
人不究其原一概濫用雖或一時未見其害
而清純冲和之氣默為之耗矣可不慎哉
茗苦茶茗味甘苦微寒無毒主瘦瘡利小便去
痰熱渴令人少睡○苦茶主下氣消食

疏○茗稟土中之清氣兼得春初生發之意
本經味甘氣微寒無毒藏器言苦然亦有不




苦者氣薄味厚陰中微陽降也入手太陰少
陰經太陰為清肅之臟喜涼而惡熱熱則生
痰而津液竭故作渴也瘦瘡者大腸積熱也
小便不利者小腸熱結也甘寒入心肺而除
熱則津液生痰熱解臟氣既清腑病不求其
止而止矣令人少睡者蓋心藏神神昏則多
睡清心經之熱則神常自惺寂故不寐也下
氣消食者苦能下泄故氣下火降而兼滌除
腸胃則食自消矣

主治參互

同黃連酸棗仁生用通草蓮實治多睡好眠
同當歸川芎烏梅黑豆生地黃土茯苓甘
菊花治頭痛因於血虛有火者 直指方熱
毒下痢蠟茶為末蜜水煎服白痢以薑汁同
水煎服兩三服即愈


簡誤



凡茶之種類極多方宜大異要皆以味甘不
澀氣芬如蘭摘於夏前者為良夫茶稟天地
至清之氣生於山谷礮瘠砂土之中不受纖
芥穢滓專感雲露之氣以為滋培故能滌腸
胃一切垢膩寧非木中清貴之品哉昔人多
以其苦寒不利脾胃及多食發黃消瘦之說
此皆語其粗惡苦澀品類最下者言之耳昔
雅州蒙山出一種茶服四兩即為地僊豈有


味甘氣芬者飲之反致疾耶但苦澀野氣葉
痿莖枯非道地所產者服之不利心脾故不
宜飲酒後不宜用能成飲證

山茱萸味酸平微溫無毒主心下邪氣寒熱溫
中逐寒溼痺去三蟲腸胃風邪寒熱疝瘕頭風
風氣去來鼻塞目黃耳聾面炮溫中下氣出汗
強陰益精安五藏通九竅止小便利久服輕身
明目強力長年



疏○山茱萸感天地春生之氣兼得木之酸
味神農氣平別錄微溫總言其得春氣之正
風耳岐伯甄權加辛然嘗其味必是酸多辛少
入足厥陰足少陰經陽中之陰降也其治心
下邪氣寒熱腸胃風邪寒熱頭風風氣去來
鼻塞面炮者皆肝腎二經所主二經虛熱故
見前證肝為風木之位經曰諸風掉眩屬肝
木此藥溫能通行辛能走散酸能入肝而斂


虛熱風邪消散則心下腸胃寒熱自除頭目
亦清利而鼻塞面炮悉愈也逐寒溼痺者經
曰邪之所湊其氣必虛總藉其辛溫散結行
而能補也至於三蟲亦腸胃溼熱所生溼去
則蟲自除能溫中則氣自下汗自出矣凡四
時之令春氣煖而生秋氣涼而殺萬物之性
喜溫而惡寒人身精氣亦賴溫煖而後充足
况肝腎在下居至陰之位非得溫煖之氣則



孤陰無以生此藥正入二經氣溫而主補味
酸而主斂故精氣益而陰強也精益則五臟
自安九竅自利又腎與膀胱為表裏膀胱虛
寒則小便不禁耳為腎之外竅腎虛則耳聾
肝開竅於目肝虛則邪熱客之而目黃二經
受寒邪則為疝瘕二臟得補則諸證無不瘳
矣輕身強力長年者益精安五臟之驗也

主治參互

同菟絲子肉蓯蓉巴戟天鹿茸牛膝白膠車
前子枸杞子生地黄沙苑蒺藜麥門冬能添
精固髓煖腰膝益陽道令人有子 同人參
五味子牡蠣益智子治老人小便淋瀝及遺
尿 同人乳沙苑蒺藜熟地黄人參麥門冬
牛膝甘菊花治腦骨痛腦為髓之海髓足則
腦痛自除 同石菖蒲甘菊花地黄黃蘗五
味子治腎虛耳聾 同杜仲牛膝地黃白膠



山藥治腎虛腰痛 入六味地黃丸為腎虛
而有溼熱者所須


簡誤

命門火熾強陽不痿者忌之膀胱熱結小便
不利者法當清利此藥味酸主斂不宜用陰
虛血熱不宜用即與黃檗同加
紫葳味酸微寒無毒主婦人產乳餘疾崩中癥
瘕血閉寒熱羸瘦養胎

疏○紫葳即凌霄花也稟春氣以生故其味
酸氣微寒無毒花開於夏而色赤味應帶苦
入肝行血之峻藥故主婦人產乳餘疾及崩
中癥瘕血閉寒熱羸瘦諸證至於養胎決非
其性所宜用者慎之

主治參互

同當歸紅花川芎牛膝地黃延胡索桃仁蘇
方木五靈脂治壯實婦人經閉 普濟方嬰



兒百日內無故口青不飲乳用凌霄花大藍
葉芒硝大黃等分爲末以羊髓和丸梧子大
每研一丸乳送下便能喫乳熱者可服寒者
忌之


簡誤

紫葳長於破血消瘀凡婦人血氣虛者一概
勿施胎前斷不宜用

胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿

水和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三三
兩灌之立瘥

疏○胡桐淚稟地中至陰之氣而兼水化故
味鹹苦氣大寒無毒氣味俱厚陰中之陰也
入足陽明經經曰熱淫於內治以鹹寒又曰
在高者因而越之若以湧吐寒以勝熱故主
大毒熱心腹煩滿取吐而效也牛馬性熱而
又犯熱病所以急黃黑汗也鹹寒能除大熱



故亦主之日華子以之治風蟲牙齒痛李珣謂其能治骨槽風齒墜元素言療癰非此不能除皆資其苦能殺蟲鹹能入骨軟堅大寒能除極熱之用耳

和主治參互

聖惠方牙疼出血胡桐淚半兩研入麝香少許夜夜貼之 又方牙疳宣露膿血臭氣者胡桐淚一兩枸杞根一升每用五錢煎水熟

嗽 聖濟總錄牙齒蠹黑乃腎虛也胡桐淚

一兩丹砂半兩麝香一分為末摻之除口齒

藥外他用甚稀故不著簡誤


猪苓味甘苦平無毒主痰瀉解毒蠱疰不祥利

水道久服輕身耐老

疏○猪苓稟戊土之陽氣得風木之陰氣本

經謂其味甘應兼淡苦其氣平而無毒氣味

俱薄降也陽中陰也入足太陽足少陰經其



主痲瘧者瘧必由暑暑必兼溼淡以利竅引
暑溼之氣從小便出所以分消之也淡滲之
性故利水道溼勝則身重溼去則身輕利竅
之藥必能走泄精氣其日久服耐老必無是
理矣解蠱毒症不祥義將安出亦未可盡信
也

主治參互

入五苓散為除溼之要藥 佐白芍藥白朮

苓人參橘皮朮澤瀉治水腫之屬陽分者

佐白芍藥生地黃桑寄生桑根白皮茯苓澤

瀉琥珀石斛薏苡仁肉桂治水腫之屬陰分

者均為要藥其功長於利水故善除溼

簡誤

寇宗奭曰猪苓利水之功多久服必損腎氣

昏人目潔古曰淡滲太燥能亡津液無溼證

勿服皆確論也有溼尚宜暫用久服斷乎不




可

烏藥味辛溫無毒主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼
氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背
脊婦人血氣小兒腹中諸蟲

疏○烏藥稟地二之氣以生故味辛氣溫無
毒然嘗其味亦帶微苦氣亦微香氣厚於味
陽也入足陽明少陰經其主中惡心腹痛疰
忤鬼氣天行疫瘴者皆足陽明受病陽明開

竅於口鼻凡邪惡鬼忤與夫疫瘴之氣侵人
悉從口鼻而入此藥辛溫煖胃辟惡散邪故
能主諸證也胃煖則宿食自消辛散則蠱毒
亦解又腎與膀胱為表裏虛則寒客之而冷
氣攻衝背脊辛溫能散寒邪其性又善下走
則冷氣攻衝自止也性溫走泄故復能散婦
人血凝氣滯微苦而辛故又能療小兒腹中
諸蟲也



主治參互

同沉香木香白豆蔻香附橘皮檳榔治婦人
 氣實暴氣壅脹 濟生方治七情鬱結上氣
 喘急用四磨湯降中兼升瀉中帶補其方以
 人參烏藥沉香檳榔各磨濃汁七分煎細細
 嚥之 和劑局方烏沉湯治一切氣一切冷
 補五臟調中壯陽煖腰膝去邪氣冷風麻痺
 膀胱腎間冷氣攻衝背脊俛仰不利風水毒

腫吐瀉轉筋癱瘓刺痛中惡心腹痛鬼氣疰
 忤天行疫瘴婦人血氣痛用天台烏藥一百
 兩沉香五十兩人參三兩炙甘草四兩為末
 每服半錢薑鹽湯空心點服

簡誤

烏藥辛溫散氣病屬氣虛者忌之世人多以
 香附同用治女人一切氣病不知氣有虛有
 實有寒有熱冷氣暴氣用之固宜氣虛氣熱




用之能無貽害耶以故婦人月事先期小便短赤及咳嗽內熱口渴口乾舌苦不得眠一切陰虛內熱之病皆不宜服
沒藥味苦平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下血目中翳暈痛膚赤

疏○沒藥稟金水之氣以生故味苦平無毒然平應作辛氣應微寒氣薄味厚陰也降也入足厥陰經凡惡瘡痔漏皆因血熱瘀滯而


成外受金刃及杖傷作瘡亦皆血肉受病血肉傷則瘀而發熱作痛此藥苦能泄辛能散寒能除熱水屬陰血亦屬陰以類相從故能入血分散瘀血治血熱諸瘡及卒然下血證也肝開竅於目目得血而能視肝經血熱則目為赤痛膚翳散肝經之血熱則目病除矣
主治參互

同延胡索乳香乾漆鼈甲琥珀為末治產後



血暈有神效 加人參澤蘭生地益母草蘇
 木作湯送前藥治兒枕痛及惡露未盡腹痛
 寒熱等證立效 同乳香白及白欵紫花地
 丁半枝蓮夏枯草忍冬藤連翹甘菊貝母治
 一切癰疽疔腫 同乳香當歸牡丹皮牛膝
 續斷川芎番降香穿山甲治內傷胸脇骨痛
 入一切膏藥能消毒止痛長肉 御藥院
 方筋骨損傷米粉四兩炒黃入沒藥乳香末

各半兩酒調成膏攤貼之 奇效良方金刃
 所傷未透膜者乳香沒藥各一錢以童子小
 便半盞酒半盞溫化服之 圖經本草婦人
 腹痛內傷疔刺沒藥末一錢酒服便止又治
 婦人血暈方同 婦人良方產後惡血沒藥
 血竭末各一錢童便溫酒各半盞煎沸服良
 危氏得效方女人異疾月事退出皆作禽
 獸之形欲來傷人先將綿塞陰戶乃頓服沒



藥末一兩白湯調下即愈

簡誤

孕婦不宜服凡骨節痛與夫胸腹脇肋痛非
瘀血停留而因於血虛者不宜用產後惡露
去多腹中虛痛者不宜用癰疽已潰不宜用
目赤膚翳非血熱甚者不宜用大槩其功長
於通滯血血滯則氣亦壅氣血壅滯則經絡
滿急經絡滿急故發腫作痛打撲踉跌亦傷

經絡血分血氣不行故壅滯作腫痛也沒藥
善通壅滯之血血行則氣亦行氣血流通則
腫痛自止矣故為諸瘡癰及金瘡杖瘡跌撲
傷損腹中血結作痛之要藥而不主諸虛也
安息香味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰

疏○安息香稟火金之氣而有水故味辛苦
氣平而芬香性無毒氣厚味薄陽也入手少
陰經少陰主藏神神昏則邪惡鬼氣易侵芬



香通神明而辟諸邪故能主鬼疰惡氣也

主治參互

同鬼曰犀角牛黃丹砂乳香蘇合香龍齒雄
黃麝香治鬼疰尸疰殺癆蟲寐魘暴亡及大
人小兒卒中邪惡氣 奇效良方小兒驚邪
安息香一豆許燒之自除

簡誤

病非關邪惡氣侵犯者不宜服

仙人杖味鹹平冷 無毒主噦氣嘔逆辟疰小

兒吐乳大人吐食竝水煮服小兒驚癇及夜啼

安身伴睡良又主痔病燒為末服方寸匕

疏○仙人杖此筍之將成竹時立死者得筍

之氣已過稟竹之性未全故味鹹氣平無毒

其功用在于竹茹竹黃之間所主噦氣嘔逆小

兒吐乳辟疰大人吐食痔瘡者竹茹之用也

療小兒驚癇及夜啼者竹黃之用也雖其形



已痿而其性尚存故能療諸證也 又秘方
用此蘸麻油於空室中燃之取滴下油塗癰
疽已潰長肉如神他用甚稀故無主治簡誤
海桐皮味苦平無毒主霍亂中惡赤白久痢除
疽蠶疥癬牙齒蟲痛竝煮服及含之水浸洗目
除膚赤

疏○海桐皮稟木中之陰氣以生本經味苦
氣平無毒然詳其用味應帶辛氣薄味厚陰

中陽也入足太陰陽明經二經虛則外邪易
入為霍亂中惡辛以散之溼熱內侵為疔蠶
久痢苦以泄之又脾胃主肌肉溼熱浸淫則
生蟲而為疥癬苦能殺蟲平即微寒溼熱去
而疥癬除矣其主漱齒洗目者亦取其苦寒
殺蟲辛平散風熱之意耳李珣以之治腰脚
不遂血脉頑痺腿膝疼痛之證其為辛苦之
劑無疑矣



主治參互

續傳信方治腰膝痛不可忍用海桐皮二兩
牛膝芎藭羌活地骨皮五加皮各一兩甘草
半兩薏苡仁二兩生地黃十兩煎浸洗焙乾
剉細以綿包裹入無灰酒二斗浸之冬二七
日夏一七日空心飲一盞每日早午晚各飲
一盞長令醺醺合時不得添減禁毒食此藥
治因風溼溼熱流注下焦腰膝為病若因陰

虛血少火熾而得者勿服 同真川槿皮輕

粉蛇牀子山大黃為末傳癰瘡

簡誤


腰痛非風溼者不宜用

大腹微溫無毒主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰

膈醋心竝以薑鹽同煎入疏氣藥良

疏○大腹皮即檳榔皮也其氣味所主與檳

榔大畧相同第檳榔性烈破氣最捷腹皮性



緩下氣稍遲入足陽明太陰經二經虛則寒
熱不調逆氣攻走或痰滯中焦結成膈證或
溼熱鬱積酸味醋心辛溫煖胃豁痰通行下
氣則諸證除矣大腸壅毒以其辛散破氣而
走陽明故亦主之也

主治參互

同白朮茯苓車前子木瓜桑白皮五加皮猪
苓澤瀉薏苡仁蠶魚治水腫有效虛者加入

參

簡誤

鳩鳥多集檳榔樹上凡用檳榔皮宜先洗去
黑水復以酒洗後以大豆汁再洗過曬乾入
灰火煨用性與檳榔相似病涉虛弱者槩勿
施用


合歡味甘平無毒主安五藏利心志令人歡樂
無憂久服輕身明目得所欲



疏○合歡稟土氣以生故味甘氣平無毒入
手少陰足太陰經土為萬物之母主養五臟
心為君主之官本自調和脾虛則五臟不安
心氣躁急則遇事拂鬱多憂甘主益脾脾實
則五臟自安甘可以緩心氣舒緩則神明白
暢而歡樂無憂神明暢達則覺照圓通所欲
咸遂矣嵇叔夜養生論云合歡蠲忿正此之
謂歟其主輕身明目及大明主消癰疽續筋
骨者皆取其能補心脾生血脈之功耳


主治參互

與白蠟同入膏能長肌肉續筋骨甚捷 獨
行方肺癰唾濁心胸甲錯取夜合皮一掌大
水三升煎取一半分二服 百一選方撲損
折骨夜合樹皮去粗皮炒黑色四兩芥菜子
炒一兩為末每服二錢溫酒臥時服以滓外
傅接骨神妙 子合橘核木瓜牛膝能治疝



溼熱者加黃檗寒溼者加茴香子
 氣味和平與病無忤故不著簡誤
 五倍子味苦酸平無毒療齒宣疳鬻肺藏風毒
 流溢皮膚作風溼癬瘡瘙癢膿水五痔下血不
 止小兒面鼻疳瘡
 疏○五倍子得木氣而兼金水之性其味苦
 酸澀氣平無毒氣薄味厚斂也陰也入手太
 陰足陽明經本經主齒宣疳鬻風溼癬瘡及

小兒面鼻疳瘡者皆從外治取其苦能殺蟲
 酸平能斂浮熱性燥能主風溼瘡癢膿水五
 痔下血者大腸積熱也大腸與肺為表裏肺
 得斂肅則大腸亦自清寧也藏器療腸虛泄
 利日華子主生津液消酒毒時珍謂其斂肺
 降火化痰飲止咳嗽消渴盜汗斂潰瘡金瘡
 收脫肛子腸墜下者悉假其入肺清金收斂
 固脫之功耳



主治參互

同地骨皮小薊皮硝甘草苦參葱頭煎湯洗
楊梅結毒 集靈方自汗盜汗用五倍子研
末津調填臍中縛定一夜卽止 化痰生津
噲化丸用五倍子安大鉢頭內用煮糯米粥
湯浸蓋好安靜處七日後常看待發芽黃金
色又出黑毛然後將箸試之若透內無硬卽
收入細瓦鉢中搗如醬連鉢日中曬至上皮

乾了又搗勻又曬曬至可丸方丸彈子大曬
乾收用其味甘酸能化一切膠痰 又方脾
泄久利五倍子炒半斤陳倉米炒一升丁香
細辛木香各三錢川椒五錢爲末每服一錢
蜜湯下日二服忌生冷魚肉 和劑局方玉
鎖丹治腎經虛損心氣不足思慮太過真陽
不固溺有餘瀝小便白濁如膏夢中頻遺盜
汗虛煩食減乏力此方性溫不熱極有神效

五倍子一斤白茯苓四兩龍骨二兩為末水
糊丸梧子大每服七十九食前鹽湯送下日
三服百一選方臙毒下血五倍子不拘多
少為末大鯽魚一枚去腸胃鱗腮填藥令滿
入瓶內煨存性為末每服一錢溫酒下直
指方大腸痔疾五倍子煎湯薰洗或燒煙薰
之自然收縮三因方脫肛不收用五倍子
末三錢入白礬少許水一碗煎湯洗之立效

婦人良方產後腸脫五倍子末摻之 博


濟方風毒攻眼腫癢澀痛不可忍者或上下
臉赤爛或浮翳瘀肉侵睛神效驅風散五倍
子一兩蔓荊子一兩半為末每用二錢水二
盞銅石器內煎汁去滓乘熱洗大能明目去
澀 楊子建護命方牙齦腫痛五倍子兩許
瓦焙研末以半錢傅痛處片時唾去涎內服
去風熱藥 端效方白口惡瘡狀似木耳不



拘大人小兒竝用五倍子青黛等分爲末以筒吹之 儒門事親赴筵散治口舌生瘡五倍子蜜陀僧等分爲末漿水漱過乾貼之院方加晚蠶蛾 杏林摘要魚口瘡毒初起未成膿者用五倍子炒黃研入百草霜等分以臘醋調塗患處一日一夜卽消 拔萃方一切金瘡五倍子降真香等分炒研末傅之皮肉自痊

簡誤


五倍子性燥急而專收斂咳嗽由於風寒外觸者忌之瀉利非腸虛脫者忌之咳嗽由於肺火實甚者忌之若誤服之反致壅塞喘滿以其酸斂太驟火氣無從泄越故耳 天竺黃味甘寒無毒主小兒驚風天吊鎮心明目去諸風熱療金瘡止血滋養五藏 疏○天竺黃竹之津氣結成其氣味功用與



竹瀝大同小異第竹黃氣微寒而性亦稍緩故爲小兒家要藥入手少陰經小兒驚風天吊諸風熱者亦猶大人熱極生風之候也此藥能除熱養心豁痰利竅心家熱清而驚自平主君安而五臟咸得滋養故諸證悉除也明目療金瘡者總取其甘寒涼血清熱之功

主治參互


同牛黃犀角丹砂茯神琥珀酸棗仁遠志鈞藤鈎治小兒驚癇癩疾有痰者加牛膽南星貝母竹瀝屬虛者去南星加人參 錢一方小兒驚熱天竺黃二錢雄黃牽牛末各一錢研勻麩糊丸粟米大每服三五丸薄荷湯下除小兒驚癇痰熱外無別用故不著簡誤蜜蒙花味甘平微寒無毒主青盲膚翳赤澀多眵淚消目中赤脉小兒麩豆及疳氣攻眼



疏○蜜蒙花稟土氣以生其莖萌於冬而開於春故氣平微寒味甘而無毒為厥陰肝家正藥觀本經所主無非肝虛有熱所致蓋肝開竅於目目得血而能視肝血虛則為青盲膚翳肝熱甚則為赤腫眵淚赤脉及小兒豆瘡餘毒疳氣攻眼此藥甘以補血寒以除熱肝血足而諸證無不愈矣好古謂其潤肝燥守真以之治畏日羞明誠謂此也形與芫花相似但芫花狹小而蜜蒙花差大為異用者宜詳辨之

主治參互


同空青木賊生地黃蟬蛻白蒺藜穀精草决明子羚羊角治青盲翳障 同甘菊花枸杞子生地黃白蒺藜穀精草治肝腎虛目不能遠視 同黃連赤芍藥防風荆芥穗黃檗甘菊花甘草龍膽草治風熱溼熱眼赤痛 同





特1
1558

胡黃連白蕪莖使君子蟬蛻木賊蘆會治小
兒疳積眼目不明 療眼疾外無他用故不
著簡誤

六十四





国立国会図書館 タイトル『神農本草經疏30卷』 請求記号 特1-1558

ガラス使用